




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Wellcome Trust, London.
726/D





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
726/D





D. IV

17/6

726⁽¹⁰⁾




aug.


67

4/


23055

Handwritten
22/4/69









THEATRUM
ANATOMICUM

CASPARI BAUHINI
Basileen. Archiatri

Infinitis locis auctum, ad mor-
bos accommodatum &
ab erroribus ab

AUTHORE

repurgatum, observationibus & figu-
ris aliquot novis aneis illu-
stratum.

Opera sumptibusque
IOHAN. THEODORI DE BRY.

M.DC.XXI.

B. ch. a. Calvani.

*Reverendissimo
&
Illustrissimo*

PRINCIPI AC DOMINO,
Domino

WILHELMO,

*ECCLESIAE HIRSCHFELDENSIS POSTVLATO
Administratori,*

HASSIAE LANDGRAVIO, COMITI IN CATZENELN-
BOGEN, DIETZ, ZIGENHAIN, & NIDDA, &c.

Domino suo Clementiss.

HANC

THEATRI ANATOMICI

Editionem secundam

CASPARUS BAUHINUS ILLUST. DUCIS
Wirtembergici &c. Medicus

demissae OBSERVANTIAE ergo devote dedicat.

ΤΤΧΗ ηϞ ΠΟΝΩ.

AD

Illustriss. & Potentiss. Principem ac Dominum, Dominum

MAURITIUM

HASSIAE LANDGRAVIUM, COMITEM IN
Catzenelnbogen, Dietz, Zigenhain & Nidda, &c. Princi-
pem Literatiss. Literatorum Mecœn. sum-
mum, Dominum suum Cle-
mentissimum.

PHILOSOPHIAM, sublimiorem illam melioris nostrae partis informatricem, θαυμασιαν genuisse, summi Peripateticorum principis edicto proditum (PRINCIPVM EMINENTISSIME) novimus. In corporis vero humani fabrica (quae nobis hoc opere subiecta est materia) ingerunt se tot, tanta, tamque singulari admiratione digna, ut veneranda illa antiquitas, HOMINEM animal admirandum, ac ulterius etiam progressa θαυμα θαυμάτων, omnium miraculorum dicere non dubitarit. Hinc Zoroaster antiquissimus ille Philosophus & Rex, qui Nini temporibus emicuit, veteris Theologiae scientissimus inventor, magicarumque artium, si Plinio credimus, in Perside primus, in magia sua hominis admirandam fabricam & immensam illam perfectionem contemplatus, in hanc exclamationem prorupisse proditur.

ὡ πολυμεροτάτης φύσεως ἄνθρωπε τέχνασμα. Nimirum ipsam adeo Naturam, per quam nos verius DEVM OPT. MAX. primum illum omnis Naturæ τεχνίτην, hominisque protoplastem intelligimus, audaciæ accusare ausus, quod tam admirandum opificium moliri sit ausa. At Plato philosophorum antistes, non contentus hominem miraculum appellasse, adiecit divinum miraculum. Et Mercurius nimirum ille cui τελεμεγίστη nomen indidere, hominem etiam secundum esse Deum vaticinatus est. Et in libello eius, qui est de voluntate Dei mirabiliter concinnatus, occurrit gravior illa sententia, consideratione digna, qua hominem miraculum magnum, animal adorandum & honorandum, diviniore quodam spiritu concitus & interiore scientia instructus, nuncupavit: quod in legibus idem Plato confirmat. Est sane si quod res est, fateri volumus, ἄνθρωπος nō solum θαυμαστὸς sed θαυμαστότερος summaq. admiratione à summis & maximis cuiusvis ætatis ingenii habitus. Nec immerito. Nā qui hominē admiratur, Deum admiratur qui totius magni mūdi epitomē propositurus, hominē veluti parvum mundum creavit: qui illum noverit, hunc noverit, cum ad eius imaginem efformatus sit. At sint sane, uti B. Augustinus in lib. de spiritu & anima scribit, quedā supra intellectum humanum, quedam iuxta, quedam denique infra: tamen qui hominem recte & probe

EPIST. DEDICAT.

probe noverit, Deum ipsum tanquam eius causam efficientem noverit. Vnde & augustum Dei templum & simulachrum dicitur à Theologis. Atque ut eleganter vir quidam magni nominis prodidit, ut in numismate charagma Caesaris, sic in homine DEI sculptura conspici-
tur. Sed & quæ iuxta sunt intellet, Angelos nimirum, quia non tantum cum illis intelli-
git, sed & Angelos à Deo humanis rebus, atque adeo sibi præfectos novit: imo Angelum
etiam de homine dici, & se aliquando in Angelum transmutandum; ut taceam Divum
Gregorium & ipsum Angelum, animal rationale dicere ausum. Quod si superiora se & quæ
iuxta sunt, intelligat, quis non manifeste colligat, eum & ea quæ in se sunt, & quæ infra sunt
longe eximius cogniturum? Ergo & se ipsum intelliget in se & quicquid cæli continetur am-
bitu, infra se, quod omne illud eius gratia à Deo sit productum. Quamquam ut ingenue fa-
tear se ipsum noscere, ad quod tamen (ut Plato in Alcibiade scribit) omnes incitantur, hu-
ius mysterii primum ac potissimum difficultatis opus videatur. Profecto hoc est illud *ῥῶ-
θισταυλον*, quod Socrates, si Platoni credimus, de cælo traxit, & è quo descendisse aperte fa-
tetur Iuvenalis. Referat nunc qui volet cum Cicerone *ἰδιώτης* ad modestiæ mediocritatis
que commendationem, aut ad ipsam ergastuli animæ nostræ attentam & philosophitam in-
spectionem, semper tamen credibit. Nam quotusquisque queso est, qui non ex contempla-
tione sui, hoc est, animæ suæ ergastuli, suam ipsius miseriam cum perfectione, ac nesciam sane
utram præ altera intelligat, nec inde non tantum sapientior, sed & humilior fiat, & ut paucis
dicam, melior. Sapientior, inquam, vel secundum Barbarum illum, quem non barbare, ve-
rum scienter pronuntiassent ferunt: rogatus namque, quid in hac quasi mundana scena ma-
xime putaret admirabile? Hominem respondit, omnem plane admirationis captum exce-
dere: ut qui non animalium modo princeps & rationis & mentis splendore divinus sit, ve-
luti natura totius interpret, sed tanquam Protheus, aut Chamaleon desultoria quadam po-
testate sese in quidvis subinde transformet. Ceterum exactissima illa omnium demutatio,
qua mente pia, oculis intentis ac vere philosophicus fabricam suam considerans, tandem in a-
nimæ florem revocatus ad DEVM architectum suum redit, hæc solida demum est sapien-
tia, ac vera humanæ excellentiæ admiratio. Ex qua quidem qui non ad se melior redeat, si
quis sit, qui vel cogitare possit, is mihi ne hominis quidem perfectionem agnoverit. Qui ve-
ro etiam is sit, qui non ex contemplatione sui fiat melior, non tantum non numisma Dei,
(quod D. Hieronymus ait in quadam epistola) fuerit, sed ne animal quidem rationale: quip-
pe in quo non ubi maxime opus est, rationis lumen sese ostendet, oportet enim nos ut scite A-
ristoteles in 10. Ethicorum, non quod monent nonnulli, humanatantum sapere, quod simus
homines, nec mortalia, quia mortales, sed quoad effici potest, immortalitati ipsos nos asserere,
cunctaque efficere, ut ea degamus vita, quæ ab eo profluat, quod in nobis est, præstabili-
simum: Quasane ratione homines Homericomore *θεοειδὲς* Deo similes: sicut mali ab eodem
nunc cervis, nunc tygribus, aut leonibus assimilantur. Sane & ipsa philosophia à Platone di-
citur similitudo Dei, quam homo consequi possit. Quid inquires? possit modo, nec sit iam iam
ad eam efformatus? Efformatus sane ad eam ut possit esse, ac revera sit, quod esse debet. Sui-
ipsius itaque speculatione, quæ oculis sit ac mente, animum surrigens agnoscit, verum & o-

EPIST. DEDICAT.

omnipotentem creatorem sui. Verum diversi in terrenā naturam reflectuntur, eamque unam & solam tractant, fallaciosis ambagibus illecti, oblaqueatique, hanc cogitant, huic affixi inhaerent, nec aliter magis efferuntur, quam ut persape quod M. Cato dicebat, sūdicias humanas faciant. Sed imperitiores miremur minus: quoniam (ut dicitur) nec Falernum canes. Ergo huc animum attendamus, huc oculos convertamus, ut nos ipsos inspicientes, ex nobismet ipsis sapere discamus & tantisper omnia admirari, donec prater unicum Deum admiremur nihil.

Atque ad hac quidem mysteria nos contemplatio nostri perducit, quae sane nihil aliud est, quam ipsamet vera & genuina universi contemplatio, cum in nobis ipsum universum tam pulchre, tam eximie elucescat. Sunt profecto in homine simulachra omnium quae sunt. Propterea hominem collimitum ac horizontem corporeorum & incorporeorum, Synesius, universi exemplar Theophrastus, & ἀντίκτυπον tandemque μίκροσκοπον veteribus dictum fuisse, iam translaticium est.

Verum idem Mercurius, nescio quid divinius etiam in homine agnoscens, cum in naturam DEI transire scribit, tanquam ipse sit DEVS. Quin in libr. de sapientia, & potestate DEI humane naturae potentiam eximiam admiratus, audendum esse ait dicere, hominem quidem terreum DEVM esse mortalem: DEVM vero caelestem esse immortalem hominem. Hic profecto tam est eximius, ut cum ad duas res (quod Aristotelicum est) natus sit, ad intelligendum & agendum, tam augustis, tamque felicibus auspiciis productus pronascatur, ut non elementis modo velocitate misceatur, & mentis acumine ad astra ascendat, descendat in maris profunda: sed haec omnia plane in eo sint, & mirabili, ne dicam ineffabili modo elucescant: nec caelum tantum videas in maiori mundo, sed in teipso cominus cōtempleris, intuearis, mireris: ut ni forsan videamur modestiae mensum transgredi, sit homo vel ipsis adeo caelicolis praestantior, vel saltem pari sorte potiatur, sicuti verus Theologus prodere non dubitavit. Certe potiore parte sui, corporis vero admiranda fabrica sit id, quod illi non sunt. Nam quicumque caelitem descendit ad terram, caeli deserit limitem: homo autem ubique simul esse videtur, nec videtur tantum, sed esse affectat omnia. Non inhaerebo amplius Anima, potiori parti eius: nec hominem totum ex anima & corpore constitutum, quem non obscure ipsum universum representare constat, sed fabricam corporis eius admirabilem toto hoc opere inspiciemus, eandemque quantum in nobis erit, graphice describemus, fabreg. depictam studiosae inventuti exhibebimus. Non quidem corporis universi appositam pulchritudinem, omnique usui accommodam, nec colorum, linearumque concinnitatem (quae alterius contemplationis est) quam veri Philosophi, fluxam & notham arbitrantur pulchritudinem, sed partium situm, figuram, numerum, magnitudinem, substantiam, actiones, usus &c. rimabimur. Nam & alia ἀνδραγόμενα, si vemo corpora laudabit, alia Hippocrates. Ille n. peregrinis magis & artificio omni venustatem, uti Galenus docuit, asciscit: hic veram pulchritudinem adiudicabit, quae optima corporis constitutione constet, partium efformatione legitima, numero debito, situ convenienti, magnitudine decenti, actioni obeunda commoda. Haec qui demonstrat, na is mihi vera Anatomia non modo fundamenta, sed & quicquid superstruendum superstructum ostendere videtur: quod nobis quidem, in hoc opere opus est propositum. Sed quid ad te, PRINCIPVM

ILLV-

EPIST. DEDICAT.

ILLVSTRISSIMORVM vere sapientissime & magnanime Heros, apud te, inquam quem Diva Pallas & Minerva condecorant, ac ita quidem condecorarunt, ut tui iam non multis, sed pene dixerim omnib., tanquam Sol ceteris stellis merito quodam tuo praeire, sed & prae luce scire videaris. Prater enim florentissimi Principatus negotia, in turbulento hocce Imperii statu sapientis felicitque administratione, cui magis literae cordi sunt, quis magis literatos clementia & favore prosequitur? prater enim Academia Marpurgensis & Cassellana proceres, quae te verum patronum & defensorem agnoscunt, etiam ceteri infiniti genium sublime admirantur. Et sane cum Germania hodie sit, literarum & literatorum splendore eminentissima, in eo tamen mihi etiam praeceteris mundi Regnis maior & celebrior videtur, quod Principes habeat, & te inprimis, literarum pariter & armorum admirabiles, ut iure de te illud Ennii dixerim:

Esse bellipotentem, ac sapientipotentem.

Quare de tali tantoque Principe sibi Germania gratulatur, de te tanquam Principe Orthodoxae fidei & fortitudinis exemplari, propemodum singulari, felices subditi gaudent, ceteri admirantes consentiunt & gratulantur.


Sed ut ad rem accedam, solebant **PRINCEPS INGLYTE** ij, qui apud antiquissimos Parthorum reges gratiam aucupabantur, non nisi munere suffulti, eorum atria spatari: res quidem etsi Barbarae initiaturae ad nostrorum tamē temporum praesentiam non illaudabiliter delapsa, ut quae de selectiori benignioris frontis animo, submissa interioris suae mentis deiectione, vadimonium aucuparetur. Quo sane impulsu & ipse ductus, has iam dudum tibi **PRINCEPS MAGNANIME** destinatas meas lucubrationes, hilariori, quam eorum tenuior genitura exigat, alacri illa magni ingenii tui promptitudine, mentis incomparabili perspicacia, animi magnitudine, clementia principali eo gratius accipies, quo libentius maximo tuo iudicio subicio, fretus singulari illa clementia (honorario splendido comitata) paucos ante dies erga me hic Basilea clementer exhibita.

Suscipe ergo has meas lucubrationes Anatomicas ex ipsa αὐτοψία & optimis quibusq. fontibus concinnatas, & novo Eiconum etiam novarum, nec hactenus editarum, accessorio illustratas. Merebuntur, uti spero, ut **T. C.** literarum & literatorum Patronus splendorem praebeat, tutamine muniat: sin minus, vel in eo honorificentius, ideoque confidentius prodibunt, quod tanti Principis patrocínio sint subiectae. Quod si vero a virulentis lividisque calumniatorum moribus defenderis Zoilus ilia rumperet, & ad Theatrum meum Botanicum absolverendum animus addetur. Vale Principum sapientissime & me in clientum tuorum numerum recipe. Dabatur prid. Kal. Aug. 1610. CV. Basilea.

T. C. E. L.

Humilis & observans.

CASPARUS BAUHINUS D. Anatomicus & Botanicus Acad. Bas. ord.





INDEX

LIBRORVM ET CAPITVM
IN TOTO HOC OPERE CON-
TENTORVM.

Libri I.

DE VENTRE INFE-
RIORE

CAP. I. Ventris inferioris Diuifio. fol. 10.	XV. Venæ magnæ ad portas hepatis & ramorum eius descriptio.	49
II. PARTES CONTINENTES COMMVNES.	XVI. De arteria cœliaca, mēfenteri- ca vtraque, quæ venæ portæ ramos comitantur.	55
de cuticula.		12
III. De cute	XVII. De intestinis.	57
IV. De pinguedine.	XVIII. De mēfenterio.	68
V. De membrana seu panniculo car- noso.	XIX. De pancreate.	70
VI. De membrana mufculorum pro- pria.	XX. De venæ cavæ ramis per infimum ventrem diffeminatīs.	72
PARTES CONTINENTES PROPRIÆ.	XXI. De arteriæ magnæ ramis, venæ cavæ ramos per infimum ventrem diffeminatas comitantibus.	77
VII. De mufculis in genere	XXII. De Renibus.	80
VIII. De mufculis decem abdomi- nis.	XXIII. De ureteribus.	88
IX. De peritonæo.	XXIV. De partibus virilibus gene- rationi dicatis.	90
X. PARTES IN INFERIORE VENTRE contentæ.	XXV. De vafis fpermaticis præpa- rantibus.	91
XI. De vafis umbilicalibus.	XVI. De paraftatis.	92
XII. De omento.	XVII. De Teftibus.	93
XIII. De vena porta & arteria cœ- liaca.	XXVIII. De vafis ſemen deferenti- bus, vel eiaculatoriis vulgo dictis.	70
XIV. De venis in genere.	XXIX.	
) (

INDEX CAPITVM.

<p>XXIX. De vesiculis seminariis dictis. 98</p> <p>XXX. De prostaticis. 100</p> <p>XXXI. De vesica urinaria. 101</p> <p>XXXII. De pene, seu virili mēbro. 105</p> <p>XXXIII. Muliebres partes generationi inferuientes. 111</p> <p>XXXIV. De vasis spermaticis præparantibus. 112</p> <p>XXXV. De Testibus. 113</p> <p>XXXVI. De vasis deferentibus, seu eiaculatoriis. 116</p> <p>XXXVII. De utero. 117</p> <p>XXXVIII. De uteri partibus dissimularibus. 126</p> <p>XXXIX. De ceruice uteri & hymene. 129</p> <p>XL. De pudendo muliebri, nymphis, clitoride & labiis. 134</p> <p>XLI. De utero ovis & canis. 138</p> <p>XLII. De Ano seu podice. 139</p> <p>XLIII. De Liene. 140</p> <p>XLIV. De Hepate. 147</p> <p>XLV. De vesica biliaria. 155</p> <p>XLVI. De ventriculo. 159</p> <p>XLVII. De Musculis & nervis in inferioris ventris cavitate sitis. 166</p> <p>XLVIII. De ossibus inferioris ventris. 167</p> <p>XLIX. Differentia ventris infimi mulieris, à ventre infimo viri, quæ ratione ossium obvenit. 170</p>	<p style="text-align: right;">& colli. 177</p> <p>III. De mammis virorum. ibid.</p> <p>IV. De mammis fœminarum. 178</p> <p>V. De musculis medii ventris. 182</p> <p>VI. De colli partibus. 183</p> <p>VII. De musculis intercostalibus. 184</p> <p>VIII. DE OSSIBVS ET CARTILAGINIBVS medii ventris. 187</p> <p style="text-align: right;">de claviculis. ibid.</p> <p>IX. De sterno, seu osse pectoris. 188</p> <p>X. De costis. 190</p> <p>XI. De Diaphragmate seu septo transverso. 193</p> <p>XII. De membrana pleura. 197</p> <p>XIII. De mediastino, seu intersepimente membrana. 199</p> <p>XIV. Partes in thorace contentæ. 200</p> <p>XV. De Thymo. 201</p> <p>XVI. De Pericardio seu cordis involucro. ibid.</p> <p>XVII. De humore in pericardio contento. 203</p> <p>XVIII. De venæ cavæ trunco ascendente. 205</p> <p>XIX. De nervis per thoracem & collum disseminatis. 211</p> <p>XX. De corde. 215</p> <p>XXI. De Substantia, ventriculis, & auriculis cordis. 220</p> <p>XXII. De vasis cordis & eorum valvulis. 226</p> <p>XXIII. De arteriis in genere. 231</p> <p>XXIV. De vasorum cordis in fœtu vitione, quæ in lucem editis aboletur. 235</p> <p>XXV. De Arteriæ magnæ ramis per thoracem & collum disseminatis. 238</p> <p>XXVI. De pulmonibus. 240</p> <p style="text-align: right;">XXVII.</p>
--	--

LIBRI II.

DE VENTRE MEDIO, SEU THORACE.

CAP. I. DE THORACIS structura &c.	175
II. De Cute, pinguedine, panniculo carnosio, & vasis cutaneis thoracis	

INDEX CAPITVM.

XXVII. De Aspera arteria.	248	XIV. De Glandula pineali, natibus, testibus & ventriculo quarto.	311
XXVIII. De oesophago.	251	XV. De infundibulo, glandula pituitaria, rete mirabili & cerebri v. su.	314
XXIX. De musculis & nervis in thoracis cavitatis sitis.	255	XVI. De cerebello.	322
XXX. De ossibus thoracis.	ibid.	XVII. De spinali medulla.	325
XXXI. De Scapularum ossibus.	256.	XVII. De Nervis in genere.	330
XXXII. De colli, seu cervicis vertebrae.	257	XIX. De Nervis cerebri, & primum de olfactus organis.	336
LIBRI III.		XX. De Nervis oculorum, seu de prima & secunda coniugatione nervorum.	337
DE CAPITIS, SEU VENTRE		XXI. De tertia & quarta coniugatione nervorum cerebri.	340
Tertio & supremo.		XXII. De Neruo auditorio seu de quinta coniugatione.	343
CAP. I. De capitis nomine, situ, forma & partibus.	259	XXIII. De Nervorum coniugationibus, sexta, septima & octava.	344
II. De capillis, imo pilis totius corporis.	261	XXIV. De Nervis à spinali medulla proprie dicta profluentibus, & primo cervicis.	346
III. De Cuticula, cute, Pinguedine, & membrana carnea capitis.	268	XXV. De Nervis thoracis.	350
IV. De Pericranio, periostio, & musculis circa caput.	269	XXVI. De Nervis lumborum.	352
V. De capitis figuris, futuris & cranij Substantia.	270	XXVII. De nervis ossis sacri.	353
VI. De capite, seu cranij ossibus proprijs.	277	XXVIII. Cerebri altera seditio.	355
VII. De ossibus capiti & maxilla superiori communibus, cuneiformi & spongioso.	284	De spinali medulla.	356
De osse spongioso.	287	De cerebello.	337
VIII. De meningibus cerebri.	289	De nervis oculorum.	358
IX. De Tenui meninge.	294	De olfactus instrumentis.	359
X. De vasis per cerebrum disseminatis.	295	De ventriculis cerebri.	360
XI. De Cerebri praestantia, situ, figura, substantia & temperamento.	299	De plexu choroide.	364
XII. De cerebri substantia eiusque partibus.	303	XXIX. De capitis altera parte, quae Facies dicitur.	365
XIII. De ventriculis cerebri, fornice, plexu choroide.	306	XXX. De vasis per faciem disseminatis.	367
		XXX. De musculis cutim capitis moventibus, frontalibus & occipitalibus.	368
		XXXII. De oculo & partibus circum	posi-

) () (2

INDEX CAPITVM.

positis.	370	LX. De neruo, qui ad nares fertur.	447
XXXIII. De superciliis & palpebris.	376	LXI. De Acre auribus implantato.	448
XXXIV. De palpebris.	377	LXII. Auditus quomodo fiat & de soni natura.	451
XXXV. De partibus oculum constituentibus & quidem de adipe.	383	LXIII. Glandulae ad aures.	454
XXXVI. De musculis oculorum.	384	LXIV. De Naso olfactus instrumento.	455
XXXVII. De vasis oculorum.	388	LXV. De ossibus, cartilaginibus, vasis, tunica & usu nasi.	458
XXXVIII. De membranis oculorum.	390	LXVI. De Naso interno & olfacientimodo.	461
XXXIX. De membrana vasa seu choroide, pupilla, iride & ligamento celiari.	395	LXVII. De Partibus, quae inter nasum, aures & mentum sunt.	465
XL. De membrana aranea, seu chrystalloide, vitrea, & retina.	400	LXVIII. De ore.	466
XLI. De oculorum humoribus.	402	LXIX. De Buccarum & labiorum musculis communibus.	467
XLII. De Humoribus oculi vtilitate & visione.	405	LXX. De labiis & eorum musculis propriis.	469
XLIII. De auribus.	411	LXXI. De maxilla inferioris musculis.	472
XLIV. De aure externa, siue auricula.	412	LXXII. De osse iugali.	478
XLV. De partibus aurem externam constituentibus.	415	LXXIII. De maxilla superioris futuris.	ibid.
XLVI. De musculis auris externae.	417	LXXIV. De ossibus maxillae.	481
XLVII. De Cartilagine auriculae.	418	LXXV. De inferiore maxilla.	484
XLVIII. De aure interna.	419	LXXVI. De Alveolis dentium.	487
XLIX. De canali, qui ex aure in os fertur.	422	LXXVII. De partibus in ore contentis.	ibid.
L. De membranula conchae seu tympani.	425	LXXVIII. De dentibus, de eorum nomine, definitione, figura, magnitudine, numero, situ & articulatione.	488
LI. De officulis organi auditus, & de chorea.	428	LXXIX. De dentium speciebus, & quidem de incisoriis & caninis.	491
LVI. De musculis auris externae.	437	de dentibus molaribus.	493
LVII. De cavitatibus ossis petrosi.	441	LXXX. De venis, arteriis & nervis.	den-
LVIII. De duabus Fenestellis.	443		
LIX. De labyrintho & cochlea, siue cauate secunda & tertia ossis petrosi.	444		

INDEX CAPITVM.


dentium.	496	IV. De ligamentis in genere.	556
LXXXI. De cavitare dentium interna & membrana.	499	V. De ligamentis humeri os cum scapula cervici iungentibus.	557
LXXXII. De dentium generatione & usu.	500	VI. De musculis thoracis seu respiratione.	556
LXXXIII. De palato & gargarone.	505	VII. De musculis capitis.	563
LXXXIV. De Fauibus.	508	VIII. De musculis cervicis seu colli.	566
LXXXV. De colli & faucium glandulis.	509	IX. De musculis dorsi.	568
LXXXVI. De musculis faucium, qui deglutitioni inferuiunt.	511	X. De ligamentis capitis, & vertebra-tum & thoracis.	571
LXXXVII. De osse hyoeide, seu osse gutturi.	512	XI. De musculis cubiti.	572
LXXXVIII. De musculis ossis hyoeidis.	515	XII. De musculis manus extreme	574
LXXXIX. De lingua.	517	XIII. De musculo palmari cum duobus aut tribus a panniculo carnofo prodeuntibus.	576
XC. De linguae musculis.	521	XIV. De Substantia cutim volae manus & digitorum, earumque tendines intercedente.	577
XCI. De sensu Gustus.	524	XV. De musculis digitos quatuor flectentibus.	578
XCII. De Larynge, vocis organo.	527	XVI. De musculis pollicem flectentibus.	579
XCIII. De musculis laryngis.	529	XVII. De musculis extendentibus digitos quatuor.	581
XCIV. De cartilaginibus laryngis.	534	XVIII. De musculis pollicem extendentibus.	583
XCV. De glottide & laryngis rimula.	538	XIX. De musculis metacarpi, seu interosseis.	584
XCVI. De Epiglottide, eiusque musculis.	541	XX. De musculis carpi.	585
XCVII. De membrana laryngis, quae eiusdem ligamentum existit.	544	XXI. De musculis radii.	586
XCVIII. De venis, arteriis, nervis & glandulis laryngis.	545	XXII. De ligamentis cubiti & summae manus.	588
XCIX. De sono & voce.	546	XXIII. De venis totius manus.	589
LIBRI IV.		XXIV. De arteria manus.	594
DE ARTV BV S.		XXV. De nervis manus.	596
CAP. I. De manu.	546	XXVI. De ossibus humeri & cubiti, siue radii & ulnae.	599
II. De musculis humeri seu brachii.	551	XXVII. De ossibus manus extremae,	siue
III. De musculis omoplae seu scapulae.	554		

) (3 siue

INDEX CAPITVM.

siue carpi, metacarpi, & digito- rum.	603	XXXVIII. De arteriis pedis.	640
XXVII. De digitorum ossibus	607	XXXIX. Deligamentis ossis ilii, & fa- cri, & quæ in toto pede habentur.	642
XXIX. De ossiculis sesamocideis.	613	XL. De pedis ossibus, & primum de femoris osse.	646
XXX. De pedis præstantia, figura & compositione, ac vsu.	610	XLI. De tibiæ osse utroque.	649
XXXI. De musculis tibiæ.	613	XLII. De patella, seu mola.	652
XXXII. De musculis femoris.	618	XLIII. De pedis minoris ossibus, quæ ad tarsum referuntur.	634
XXXIII. De musculis pedis.	624	XLIV. De ossibus pedii, & digitorum pedis.	659
XXXIV. De musculis digitorum pe- dis.	628	XLV. De ossibus sesaminis, & vngui- bus.	660
XXXV. De venis pedis.	632	Conclusio totius operis.	663
XXXVI. De valvulis, seu ostiolis ve- narum.	635		
XXXVII. De nervis pedis.	638		

CASPA-





CASPARI BAU-
HINI BASIL. ARCHIA-
TRI, ET PRAXEOS PRO-
FESSORIS ORDINARIJ. ETC. IN
suam humani corporis Anatomen

P R Æ F A T I O.



OMINEM, quem summus Protoplastes DEVS,
ter optimus, terque maximus, creato Mundo, velu-
ti operi finem impositurus, ad sui imaginem & crea-
vit: & ut Regius Propheta β canit, cum propemo-
dum Deum fecit, tantaque gloria & autoritate do-
navit, ut operum suarum manuum Dominum fece-
rit, omniaque ejus pedibus subiecerit: hunc merito
Mercurius ille Trismegistus, miraculum γ magnū,
animal Deo similem, Deorumque interpretem vocavit: & divinus
Plato, δ γ αὐτῶν γανυμέτων. Quare hæc haud dubie causa fuit, quod Bar-
barus ille Abdalas, interrogatus, quidnam in rerum natura maxime ad-
mirabile putaret, non barbare, sed sapienter protecto, respondisse fertur,
Hominem unum esse qui admirationem omnem superet. Hinc uno fe-
re consensu omnes hominem $\mu\epsilon\gamma\alpha\lambda\acute{o}\varsigma\sigma\mu\omicron\nu$ appellarunt, & eo quod ejus
forma cæterarum rerum omnium perfectionem complectatur, siqui-
dem essentiam cum Elementis: vitam cum Plantis: sensum cum Ani-
malibus: intelligentiam cum Formis divinis communem habeat. Re-
cte ergo Theophrastus, Univerſi exemplar: & Synesius, Horizontem
corporeorum & incorporeorum nominavit. Et Protagoras, utroque
 ζ Philosopho referente, $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\omega\upsilon\chi\eta\rho\mu\acute{\alpha}\tau\omega\upsilon\mu\epsilon\tau\epsilon\omicron\nu$, omnium rerum men-
suram
compositione, quanta in Mundi: unde etiam in homine Oculus qui maxime solem refert. ζ Plato in Thoeteto & Cra-
tylo, an hæc Protagoræ sententia vera sit inquit: & Arist. 10. metaph. 6. contra hanc sententiam disputat.

α Genes. 1. v. 26
& 27.
 β Psal. 8. & S.
Paulus Hebr. 2.

γ cur miracu-
lum sit divinū
vide Ficinum
in lib. 1. de leg.
Platonis.
 δ 1. de legib.

ϵ Arist. 8. Phys.
17. & Averroi.
eo quod homo
& cætera ani-
malia ex se mo-
veantur, quem
admodum cale-
stia corpora.
Gal. 3. usu parte.
10. quia tanta
ars in hominis

*n hominis causa
natura cuncta
genuit Plin. in
proem. l. 7. l. 20.
et l. 22.
et Pierius l. 18.
hieroglyph.*

suram esse dixit: alii vero rerum omnium finem, cui sublunaria et omnia seruiant, ipse nulli, nisi forte homo, homini. Sic Plinius naturæ delicias & mundi epitomen: & recte, cum homo omnia quæ uniuersus Mundus habet, in se contineat.

Siquidem Ægyptiorum sacerdotes, licet Mundum θ ex mare & fœmina constare professi sint, attamen Mundi partes tres constituerunt: primam superiorem, quam angelicam & intellectualem nominabant, sedem intelligentiarum, quarum nutu hæc inferiora regantur. Alteram mediam & cælestem appellabant, in cuius medio Sol tanquam reliquorum Planetarum, omniumque syderum moderator. Tertiã Elementarem vel sublunarem, cuius in procreandis, augendis & alendis animalibus & plantis, insignis est fœcunditas.

Ad harum partium ipsius uniuersi imitationem, Hominem veluti paruum mundum, tres similiter partes obtinuisse, in confesso est, quas Anatomici, Ventres: appellare consuevere: quorum primus & supremus caput est, in quo tanquam in arce peculiarive domicilio Mens sive facultas animalis residet. Alter sive medius venter est in quo Cor, velut in altera uniuersi parte Sol, præest: quemadmodum enim Sol, suo perpetuo & motu & lumine & calore, omnia creata vivificat & illustrat: sic Cordis perpetuo motu vitalique calore, omnes hominis partes, vivunt, conservantur & augentur: & quemadmodum antiqui Solem, cor mundi, ita Cor, solem hominis appellavere: nam quemadmodum à Corde vitalis facultas, sic à cælo, cælestis manat: & ut hæc inferiorum conservatrix, sic illa cuiusque partis calorem insitum fovet & reficit: siquidem insitus à natura æ ignis, in sinistro cordis ventriculo sedem habeat: & quemadmodum cælum & motu & lumine in hæc inferiora agit, sic Cor perenni suo & arteriarum motu, & spiritu vitali, quasi lumine, partes singulas illustrat. λ Sciens & volens hic prætereo, similitudinem qua inter planetas λ & Zodiaci signa & corporis partes ab Astrologis proponi consuevere.

** Hipp. lib. de
Corde.*

*λ plura vide a-
pud Nancelium
Laurent. & Ti-
dicaum.*

Quod si lubeat ex Peripateticorum doctrina, λ utriusque Mundi cōparationem instituere, & hic sane merito Hominem paruum mundum dictum fuisse, fatearis oportet: Mundum enim ex corporibus simplicibus & mixtis compositum ostendunt: simplicia, Cælum & Elementa quatuor: Mixta, alia perfecta, ut Animalia: imperfecta alia, quæ Meteoræ appellantur, quæ ratione quadruplicis elementi, vel ignea, vel ærea, vel aquea, vel terrea sunt. Hæc si cum iis quæ & Hominem constituunt & in eo reperiuntur contuleris, analogiam invenies: nam in parvo mun-

P R Æ F A T I O.

3

vo mundo, simplicia corpora sunt, spiritus & Humores quatuor, ipsis Elementis quatuor per qualitates suas correspondentes, cuius nomine à Galeno μ elementa animantium sanguine prædicatorum nominantur. ^{u. 2. elem.} Mixta imperfecta, quæ Meteoris respondent diuersa sunt, nam fulguri, oculorum scintillationes assimilari possunt: sic tonitruum species, ventris rugitus, crepitus, ructus referunt: ipsos ventos, aurium sibili & tinnitus: pluvias & imbres, catarrhi à capite in pectus, vel sensim delabentes, vel impetu suffocantes: rorem, lacrymæ: grandines, sputa coacta: terræ motus, partium motus tremuli & palpitaciones: lapidifodinas & lapides, calculi in renibus & vesica. Mixtum perfectum est totum hominis corpus, affabre ex variis & diversis partibus compositum: & quia homo magnus habet idcirco Anaxagoras vñ omnium prudentissimum iudicavit: quod dictum Plutarchus repetiit, neque Aristoteles & neque Galenus a dissimulavit.

Quare hominis substantiam constituentia Hippocrates Medicinæ parens tali Aphorismo ^b expressit: τὰ ἰσχυρὰ καὶ ὁρμῶντα ἢ ἰσχυόμενα σώματα: & Medicorum coryphæus ^c Galenus, Præceptorem imitatus, ἰσχυρὰ καὶ ἐν ἰσχυόμενα καὶ ἐν ὁρμῶντα, sive continentia, contenta & impetum facientia, vocavit: cuiusmodi effedicat ^d τὰ στερεὰ μέρη τῶ σώματος, καὶ ὑγρὰ καὶ πνεύματα, solidas partes corporis, humores & spiritus. Continentia, ^d solidas partes nuncupat, ut quæ comprehendant tegantque humida: contenta, humores, ut qui à solidis comprehendantur: & impetum facientia, spiritus, ut qui momento temporis & facile, & citra impedimentum in omnem corporis partem ferantur. Quæ sententia adeo celebri & decantata, hoc voluit Dictator Hippocrates, quod Aretæus ^e elegantissime his verbis expressit: εὐτε μὲν γὰρ ἔρρωται ἡ φύσις, καὶ ἐστὶν εὐχερὲς, πάντων μὲν κατέχει: πᾶσι δὲ σημαίνει, καὶ ὑγρῶ καὶ πνεύματι, καὶ στερεοῖσι, καὶ τῇ τῶτων εὐταξίᾳ καὶ συμμετρίᾳ ἐς ζῶν διέπει τὸν ἄνθρωπον: Ubi natura robusta & probe temperata est, omnibus quidem dominatur: omnibus etiam sui significationem præbet, & per humorem & spiritum & solida, horumque omnium convenientem ordinem & probam com-
modationem, hominis vitam moderatur. Verum ex his, quæ κατὰ τὴν σωματικὴν constituunt, propositum nobis est de continentibus, seu solidis, vel partibus agere.

At cum divino Hippocrate ^f monente, τὸ θεῖον ἐν ἀνθρώποις ἀτίον εἶσι: divinum quoddam numen in homine existat: & ^g Galenus, Deum in I sag. 9. Alex. 2 q 14. & Theophrasti opifi-
cap. 10. d Gal. de trem. 5. 1. diff. feb. 1. & Alex. in: τὰ στερεὰ καὶ πνεύματα. c. 2. caus. & sig. acur. 3. Quam ista inter se relationem habeant, præter Galenum eleganter Syll. com. in Gal. lib. 1. diff. feb. explicavit. f Hipp. in princip. de natura muliebri. g 7. usq. part. 9.

A 2

opifi-

opificem laudare jubeat, si laudem justam & meritam illi non invidemus: quare^h se conditoris nostri, qui animalia fabricatus est, sapientiam ac potentiam ne laudare quidem satis pro merito posse, fateatur, cum ejusmodi opera, non laudibus modo, verum etiam hymnis sint majora: idcirco dum partium usum exponere vult, ait, ⁱ se conditori nostro verum hymnum componere, in quo existimet, veram esse pietatem, non si taurorum *ἐκ τῶν βοῶν* ei plurimas sacrificaret, & casias, aliaque sexcenta unguenta suffumigaret: sed si noverit ipse primus, deinde & aliis exposuerit, quænam sit ipsius sapientia, quæ virtus, quæ bonitas: ignorantia quorum, impietas sit, non si à sacrificio ac suffumigiis abstineat. Merito ergo, qui de hominis partibus dicere intendit, à Deo ipso protoplaste, à quo omnia, & sine quo nihil, principium sumere convenit.

Quare cum HUMANI CORPORIS FABRICAM nunc sexto describere aggrediamur, supplices Deum unum & trinum Hygiæ Panacæque parentem rogamus, ut huic nostro instituto adesse, totum opus dirigere & protegere, suamque gratiam nobis largiri dignetur, quo sine fuco, sine livore vera dicamus, quo hæc ad altissimi sui nominis gloriam, proximique utilitatem vergant.

Cum vero corporis nostri, Philosopho^k monente, variæ, imo sibi mutuo contrariæ sint actiones, ex una similique parte corpus constare non potuit; licet unum sit. Quemadmodum mundus causa partium, cum primarum, Cœli scilicet, & Elementorum, tum secundarum seu mixtarum, varius admodum & dissimilis apparet; omnino tamen & perfecte unus est. Ita corpus humanum (seu parvus mundus) unum est & varium: unum quidem efficit, simplex partium cōtinuatio, unio, earundem harmonia, consensus, conspiratio, propria denique^l circumscriptio. Varium vero, quia infinitis pene partibus, substantia, figura, situ, usuque discrepantibus constat, idcirco dividuum & multiplex est. Quare partes ipsæ materia, forma, sine & accidentibus distinguuntur; ita quidem, ut ratione materiæ remotæ, sed internæ, quæ semen^m est, cujus materia à toto corpore defertur (ut in eam rem cap. 8. lib. de partibus similaribus disputavimus) & sanguis, aliæ dicantur Spermaticæ, aliæⁿ Sanguinæ, aliæ ex utrisque mixtæ. Etsi Philosophus^o voluerit, omnes partes animalium sanguine præditorum ex una & eadem fieri materia, sanguine^p nimirum, cum totius corporis sit materia: Semen vero ipsum non materiam, sed solum formam exhibere: sicque corpus^q ex fœmina, animam vero ex mare esse: quam sententiam licet Galenus^r refutarit, quandoque

^k Arist. 2. hist. an. 1. & 2. part. an. 5. vide caput 1. lib. de partib. similaribus.

^l Gal. 1. us. part.

^m Gal. 1. Semin. 4. & 5. vide c. 6. de similaribus n Gal. 1. Sem. 10. de const. art. 6. in arte medie. & 1. de sanit. tuend. ^o Arist. 1. gen. an. 20. vide caput 5. similarium.

^p Arist. 3. part.

^q Arist. 2. gen. an. 4. & Gal. 1. Sem. 4. & 5.

doque tamen, ex sanguine omnes partes fieri^s pronunciavit: quatenus^f Gal. 2. nat. fac.
^t seminis parva est in uterum dejecta moles, nutrit autem istud & am-
 plicat sanguis: adde, quod & semen ipsum ex sanguine amplius elabo-
 rato fiat. Ratione vero materiae proximae, aliae^u simplices, aliae compo-
 sitae; illae^s similes, hae dissimiles dicuntur. Ratione formae, tot sunt^u
 differentiae, quot sunt qualitatum combinationes. Ratione finis, ^z sic
 aliae principes sunt, aliae ministrantes: Ratione denique accidentium,
^a varia & diversa exurgunt differentiae.

Quae tamen omnes simul generantur, augentur & discriminantur,
 Hippocrate^b docente his verbis: διακρίνεται δὲ τὰ μέλη ἅμα πάντα καὶ
 αὐξεται καὶ ὅτε ὡς ἕτερον ὅδ' ἔτερον ἑτέρως, οὐδ' ἕτερον: discernuntur au-
 tem membra simul omnia & augentur, neq; alterū altero prius, neq; po-
 sterior; Et rursus^c ἀρχὴ μὲν ἐν ἐμοὶ δοκέει ὁδεμία εἶναι τὸ σῶμα ὅλος ἀλλὰ πάντα
 ὁμοίως ἀρχὴ καὶ πάντα τελευτῇ. Κύκλος γὰρ γεγενῆσθαι ἀρχὴ ἔχ' εὐρέτη. Mihi
 quidem videtur, principium nullum esse corporis (id est, à quo reliquae
 partes ortu procedant) sed omnia similiter principium, & omnia finis:
 circulo enim scripto principium non invenitur. At quae pars primo o-
 riatur, solus Creator, ut pie Galenus, ^d evidenter novit, rationabile ra-
 men non omnes partes simul consistere: quare majores natura, ut ex
 Hippocrate^e habet Philosophus, ^f priores apparent: non enim om-
 nes simul & aequali temporis spacio exornantur, & perficiuntur, sed pro-
 ut singulae & ignem & alimentum fuerint nactae, ut divini senis nostri
 verbis utar.

Umbilicalis siquidem vena primo^g perficitur, & reliquarum par-
 tium, ratione subtegminis ex sanguine geniti, origo est. Absolvuntur
 autem communiter quadraginta quinque^h diebus, siquidem ut Aegi-
 dius habet,

Sex in lacte dies; ter sunt in sanguine trini:

Bus seni carnem: ter seni membra figurant.

Vel ita tempus exprimiⁱ potest:

Injectum semen sex primis certe diebus

Est quasi lac, reliquisque novem fit sanguis, at inde

Consolidat duodena dies, bis nona deinceps

Effigiat: tempusque sequens producit ad ortum.

Sed cum de Patris nominibus, definitionibus, differentiis, & de iis,

A 3.

quae mensibus con-

formationem

habent. Idem de nat. pueri, foemina 42. masculus 30. diebus absoluitur Tempus animationis in masculo spatium die-
 rum 40. in foemina vero 80. vel circa ait Panormitanus cap. si quis, de homine e. Fumus in aurea armilla, tit. aboritus
 part. 2. ii. Ronsaus de vita primordii c. 8.

quæ circa hæc controversa sunt, tam in genere, quam in specie à nobis Libro Secundo universalis nostræ Anatomies, qui de Similaribus inscribitur, dictum fuerit, cum eo loci partium Similarium Spermaticarum tractationem secundum quatuor causas ex Hippocratis, Platonis, Aristotelis, Galeni & recentiorum Classicorum doctrina proposuerimus, eo, & quidem ad secundam editionem, Lectorem relegamus: hic enim Corpus humanum considerabimus, prout ab Anatomicis, dum dissectione partes omnes & singulas accurate inquirunt, fieri consuevit.

Jam vero considerari potest primo, & totius, & partium facies externa; dein interna. Quoad faciem externam cum de ea in libro primo, qui de Partibus externis inscribitur, & tertio editus fuit, fuisse egerimus, in præsens præcipuas tantum partes nominare placuit, quas lector in fine libri duabus tabulis propositis, inveniet: quarum prima anteriorem, altera posteriorem faciem exhibet, de quibus Herophilus in Isagoge^{kk} seu Medico breviter verba facit.

Quare nunc internas partes explicare aggredimur, quas ut recte convenientique ordine pertractemus, totius corporis divisiones præmittimus.

Dividimus T O T U M, cū Galeno^a in Ventres, & Artus idest, insignes cavitates, in quibus viscus quoddam nobile reconditum est; quare, cum tria nobilissima viscera in animali sint, sine quibus vivere non potest, Cerebrum, Cor & Hepar: idcirco Ventres tres sunt, quibus principes hæ partes tanquam propriis domiciliis insident (quæ alias Galenus Principia^b vocat, quæ ipsum animal administrant) qui ratione harum partium & facultatum inde promanantium differunt. Primus est venter inferior, in quo Hepar ejusque ministri, cæteræque partes naturales sedem habent, & vulgo, sed improprie, A B D O M E N dicitur: de quo libro primo acturi sumus. Secundus venter seu medius, Cordis & partium vitalium domicilium, qui T H O R A X, de quo libro secundo sermo erit. Tertius est superior, qui Cerebrum, partesque animales continet, & C A P U T nominatur, cujus historiam liber tertius exhibebit. Artus vero, qui melioris vitæ causa divinitus concessi sunt, in summas M A N U S & P E D E S subdividimus, de quibus libro quarto. Quæ divisio magis placet, quam Æginetæ, ^c qui sequutus Dioclem Carystium, qui Antigono regi medicamenta expurgandis humoribus accommodata propositurus, corpus in Caput, Thoracem, Ventrem & Vesicam distraxit, pro fundamento ponens, in his quatuor cavitatibus potissimum morbos procreari: Aristoteles; ^d Ruffus, ^e & Oribasius, ^f in Caput, Collum, Tho-

kk cap. 10.

a de inæqual. in
temp. 1. 7. de us.
part. 21.

b us. part. 21.

c lib. 1. c. 100.

d 1. hist. 7.
e lib. 1. c. 3. &
lib. ult. c. 2.
f 25. coll. cap. 1.

Thoracē, Manus & Crura, divisere (quam forte & Galenus * imitari vo- * 5. de loc. af. 4. luit, dum corporis divisionem innuit, in Cerebrum, Medullam cervicalem, Medullam dorsalem, Medullam lumbarem & Artus) Thoracis nomine intelligentes non medium Ventrem, sed universum corporis *g Arist. 1. hist. 7. Thoracem enim partem & cavitatem appello quæ est à claviculis ad pudentiam usque. Hac alii qui ignorantes, Hipp. anatomices ignarum pronunciarunt, quod Hepar in Thorace locatum scripserit. lib. de arte tex. 17.* *i in introduct. c. 10. At Fernel. 2. method. 1. dividit corpus in regiones publicas & privatas. Publica seu communes sunt tres quæ in universum corpus extenduntur.* *I. à Porta radicibus incipit, per ejus ramos progreditur & terminatur in partes, ad quas Porta rami pertinent, ut sunt cava hepatis, ventriculus,*
 μον seu truncum, qui est à jugulis seu claviculis & ad inguina & pubem, utrunque nimirum Ventrem medium & infimum: imitati hac in re Hippocratem, ^h & Ægyptios: ille enim Hepar in Thorace locatum scribit: hi vero totum corpus, Herophilo ⁱ referente, in caput, manus, thoracem & crura divisere. Verum Galenum secuti, infimum ventrem à thorace distinguimus, cum Truncus Diaphragmatis interventu in duas cavitates seu ventres: dividatur: & cavitationem, quæ supra diaphragma est, thoracem seu ventrem medium; quæ vero infra diaphragma, imum ventrem appellabimus & has duas partes Hippocrates ventres vocavit, Galeno ^k authore, dum scribit Hippocratem ^l non solum inferiorem, sed etiam superiorem ventrem intellexisse, divisionem namque inter collum & crura ipsius trunci esse, qui duas capacitates maximas, priorem sub thorace, secundam sub peritonæo, contineat. Non tamē ignoramus diversam fuisse, tam Ventris superioris, quam inferioris acceptationem apud veteres: hi enim modo Thoracem ventrem superiorem & ventrem inferiorem qui sub diaphragmate est: modo ventrem superiorem nominant, in quem cibi assumuntur, id est, Ventriculum & quæ sub ventriculo sunt, ventrem inferiorem vocant: interdum quoq; sola crassiora intestina: sunt qui colon duntaxat, ventrem inferiorem nominant, ut Galenus ^m clare docuit.

Sic collum cum capiti seu fulcrum subiectum sit & thoraci jungat, ab eo non distinguimus: quamvis Aristoteles ⁿ & Galenus velint collum partem distinctam esse à thorace & capite: hic n. caput vertice & prima colli vertebra circūscribit: & Hippocrates ^o caput collo insidere scribit.

Diffe-
 cava hepatis,
 ventriculus,

lien pancreas, omentum, mesenterium, intestina, quæ proprium receptaculum habent, Ventriculum: proprias expurgandi vias, Intestina. II. Publica regio à radicibus Cava incipit, sursum & deorsum excurret, per grandes Cava ramos in Abdomine & Thorace inclusos, & per insigniores ramos in brachia & crura extensos, terminatur in tenues venas ad singulas partes: idem de Arteria dicendum: huc spectant convexa hepatis, Cava & Arteria rami, antequam in capillares desinant, quibus circumscripta tenentur & propria receptacula habet Vesicam utramque, proprias expurgandi vias emulgentes, ureteres & renum cavitates. III. Publica regio complectitur Musculos, Membranas & Ossa, & omnem corporis molem, membrana carnosam & cute obvallatam: quæ incipit ab ingressu venarum & arteriarum capillarium in partes singulas, ac in summam cutim terminatur: ex harum animadversione omnis fere medendi ratio derivata est. Private regiones sunt, quæ propriis sedibus consistunt, ut Cerebrum, Pulmones, Renes, Vterus. Hac Fernelius videtur desumpsisse ex Gal. qui 7. meth. med. ult. & 13. ejus. 15. docet Cava jecoris per Intestina: convexa per emulgentes & urinæ habitum corporis, per caca cutis spiracula ac sudores expurganda: Cerebrum, per nares, palatum: pulmones, per atheram arteriam & os: vide etiam 8. de diff. & 2. cum de vi purgatrice Aloes agit. & meth. 6. 1. lib. de ulcerib. in com. A. in lib. Hipp. de rat. victus aph. 112. n. 1. hist. an. I. o lib. de gland.

p Gal. 7. usu
par. 21. Ar. 2.
par. anim. 9.
Et 4. eiusd. 10.
Venter omnium
ossibus vacat,
ne tumori impe-
dimento sint,
qui per cibum
ingestum exsur-
gat necesse est,
atque ne in fo-
eminis incremen-
to partium ob-
stet.

Differunt autem hi tres ventres, & ratione compositionis & ratione situs. Ratione compositionis in eo, quod tantum supremus venter, seu Caput, totus sit osseus: huic enim natura os immobile sine musculis circumjecit, solos n. musculos infimo ut medio inter utroq; posito & ossa & musculos largita est. Cerebrum namque in nullos usus musculis indiguit, cum ipsum in omnibus animalibus motus voluntarii aliis partibus sit principium: quo fit, ut tãquam visceri nobilissimo, mollissimo & in excelsissimo corporis loco collocato, sicque variis injuriis obnoxio, cranium totum osseum immobile, quasi murus, jure circumdatum sit. Venter autem imus totus carnosus, membranofusque constitutus, ut ob assumendos cibos, foetusque dum gestatur, auctorem, facile extendi, & intestina ad faecum exclusionem comprimi possit. Si enim Hepati aut ventriculo septum ejus generis aliquod in orbem circumfusus fuisset, ubi cibus & potus exciperetur? ubi foetuum moles recondideretur? quo denique superflua excernerentur, si nullus musculus eis praesset? Quare si venter osse circumdatus foret, neque foemina concipere, nec homo semel ad saturitatem comedere posset; sed ut respiratione continua, sic esu assiduo indigeret, sicque vita nostra à Musis & Philosophia admodum esset aliena, neque rebus pulcherrimis operam dare liceret: jam vero cibo ac potu semel impleti, diem integrum sine molestia perduramus. Quod thoracem attinet, partim osseus, partim carneus conditus est: si n. ex solis ossib. factus fuisset, motum penitus amisisset, nec dilatari in inspiratione nec deprimi in expiratione potuisset, q. propter respirationem necessarium est: si vero p. contra totus carnosus & p. ex musculis solis, hi pulmoni & cordi incideret, eorumq; perennes motus impediret, nemine eos expellente; ut igitur simul spatium intus esset, simulque totum instrumentum prompte & expedite moveretur, & follis modo in respiratione elevari & deprimi posset, musculi, ossibus cartilagineis compagibus coagmentatis, alternatim interpositi fuerunt, hacque ratione magis cor ac pulmones muniuntur.

q Gal. 4. us.
part. 7.

At quoad situm; Venter osseus cerebrum continens, in suprema corporis parte locatus est, propter oculos, cum ii speculatorum munere fungantur, qui ope nervorum munus suum absolvunt, quos ob molliem cerebro vicinos esse oportuit. Thorax vero huic proximus esse debuit, cum vocis q. & respirationis sit conditor; in quo enim vox formatur, ea pars ori proxima esse debet, (cum per os aerem & attrahat, & rursus emittat) quo vox commode formari possit. His tertius venter succedit, qui si supremum locum occupasset, propter faeces quas continet,

P R A E F A T I O.

9

net, quæ deorsum mitti & expelli debuerunt, in prolapsu, cerebrum & cor polluisent: si vero medium locum occupasset, voci formandæ impedimento fuisset. Harum partium ^r rursus unaquæque in proximas sui, quæ ^{αγοα} Græce dicuntur, particulas dividuntur, hæque in alias subdividuntur, ut in cujuslibet ventris explicatione monebimus.

r Galen. in temp. 2.

Jam vero, cum propositum nobis sit, toto hoc opere sectionis methodum observare, à ventre inferiore exordiemur; cum hic venter sit in-
star cloacæ, in quam tum primæ, tum secundæ coctionis excrementa, amandantur; cum ab eo sectionis fiat initium, etiam Galeno ^s monente, ne si alterius alicujus ventris partes prius inquirantur, interim cadaver propter excrementa intestinis inclusa, foetere ac putrescere incipiat, sicque reliquarum partium sectio impediatur.

f 5. ad. an. 6. licet idem 1. ad. an. à Manu exordiat, ad imitationem librorum de Vsu partium.

B

LIBER



LIBER PRIMUS, DE VENTRE INFERIORE.

Ventris inferioris Divisio.

CAPUT I.

a ἀγέλη : com-
muniter Hippo-
crati, ut i. diat.
ab aliis κενέων :
à Suida ἰδέος :
Κένος Eschyl.
Schol.

b Homer. Odys.
1. apud Hipp. si-
gnificat omnem
cavitatem, quo
humor alendis
partibus conti-
netur.

c quia sit ven-
tris integumen-
tum, ut Piccol-
homineus credi-
dit.

d lib. 4. c. 1. imus
venter ab illis
ac pube abdo-
men sursum
versus ad pra-

cordia pervenit
e Columbo ea
pars corporis,
quam ventrem
inferiorem di-
cimus, Gracii

epi-
gastrium. f Gal. 7. usq. par. 21. Arist. 2. par. an. 9. 4. ejusd. 10. * de arr. f. 3. p. 47. g Com. 2. aph. 35. Rufus l. 2. in tres regio-
nes dirigit, superiorem stomachalem : mediam umbilicalem : inferiorem hypogastricam. † s. ad apat. 7. h Gal. 2. aph. 73. quibus
hypocondria distenta murmurant. Sic meronymicos 6. Epid. succosiones hypocondriorum consideranda, id est, par-
tium quae ibi continentur. Antonomasticos pro dextro, ut 3. Epid. sect. 1. hist. 3. hypocondrii distentio molliter, Crc.
k Vel quod τὸ ὑπογάστριον ὑπὸ τῷ κοιλίῳ. Ar. 3. par. 10. m Lib. 4. c. 10. c. 8. sed lata significatione, vel quasi proxime subiecta cordi.



ENTER inferior ^a qui proprie γαστήρ. Poetis ^b ἡνδὺς, δὲ τὸ τῷ ἡνδὺν τὸ σπέρμα, quod in eum cibaria congerantur : improprie ^c ἐπιγάστριον dicitur. La-
tinis venter & alvus : Cello, ^d imus venter : vulgo, ^e sed male, abdomen
nominatur. Est autem trunci mediapars eaque inferior, intrinsecus
diaphragmate à thorace distincta : quæ superne, cartilagine ensiformi :
inferne, ossibus pubis : anterieus, abdomine proprie dicto, posterius, lumborum ver-
tebris & osse sacro : ad latera utrinque, costis, ossibus ilium & coxendicis circumscri-
bitur : quæcum & nutritionis & generationis membra continere debuerit, cavi-
tatem omnium amplissimam obtrinit. Hic inferior est, quo recrementa utriusque
coctionis recipiat, & facilius extrudat : anterieus & ad latera totus ^f carnosus, quo ob-
alimenta assumenda, & foetus gestationem dilatari possit, & ob faciem exelusionem
comprimi. Hujus figuram, à reliquorum animalium ventre diversam, primus Hip-
pocrates ^g expressit, iniquens : hominem pro magnitudine corporis ventrem angus-
tissimum habere à posteriore parte in priorem, præcipue ad thoracem.

Dividitur in partem anteriorem & posteriorem. Anterior pars est, cui τὸ ἐμπύον ἐστὶν
g nomen Galenus tribuit, & Arabibus Mirach vocitatur : quam Galen. g in tria di-
vidit, ἐμπύον, ὑπογάστριον, & τὸ ἐν τῷ κοιλίῳ, ἢ τὸ ἐν τῷ κοιλίῳ : in quibus dexteram & sinistram partes obser-
vari voluit : & alibi ^h ventrem hunc in partes sublimes, partes supra umbilicum in-
telligens, & profundas, quæ scilicet infra locata sunt, divisit : quare eum imitantes, in
partem seu regionem superiorem, mediam & inferiorem subdividimus.

Superioris, ^h quæ cartilagine ensiformi & costarum finibus terminatur, partes
tres sunt, duæ laterales, quæ proprie ⁱ Hypochondria quasi Subcartilaginea, quod
pars corporis, ^k id est, sub cartilagine sint, eum costarum spuriarum cartilaginibus sub-
jaceant. Aristoteli ^l φρένες, eo quod sub diaphragmate sit eorum locus ; Cello ^m præ-
cordia,

cordia, quod sint circa ventriculi orificium, quod καρδίαⁿ vocarūt: in quorum dextro hepatis major pars: sinistro lien, & ventriculi major pars consistit. Tertia pars est anterior, inter hypochondria media, quæ proprie ἐπὶ γαστρὶον, cum ei venter sub-
jaceat, dicitur; ubi cavum illud, aliquibus καρδία, ὁ ἀ recentioribus scrobiculum cor-
dis dictum, observatur.

Media seu regio umbilicalis, per quæ finibus costarum & linea recta ossis ilei utrin-
que circumscribitur, & trium circiter digitorum, supra & infra umbilicum, latitudi-
nem æquat, tres quoque partes habet; duas laterales, quas, cum locus ossibus careat,
κενὸν, inania Galenus^q & λαγῶνας à laxitate Aristoteles^r vocavit, (ilia quibusdam:) in quarum dextra, cæcum intestinum cum coli parte: in sinistra, jejuni & coli pars:
& partem anteriorem, ubi umbilicus ὀμφαλός, totius corporis centrum, cui totum fe-
re jejunum subjacet.

Inferior denique pars, quæ sub umbilico est, & ad pubis os usque vergit, hoc est,
quæ à spina costæ superioris ossis ilei incipit, & ducta utrinque linea transversa ad
medium spatium inter umbilicum & spinas ossium pubis sese extendit, & nonnullis
lata significatione parvus venter dicitur. Stricte tamen eam tantum partem deno-
tare volunt, in qua sola vesica est, quo modo Diocles Carystius sumpsisse videtur,
dum corpus, in caput, thoracem, ventrem & vesicam divisit: siquidem venter hic
parvus à magno distinguatur septo interjecto, à peritonæi productione facto, quæ
productio à cervice vesicæ per ejus partem posteriorem & fundum usque ad umbi-
licum extenditur, quam ligamenta tria, duæ scilicet arteriæ umbilicales & urachus
dictus, sustinent. Dicitur Hippocratiⁱ ἡ τρεὶς. Galeno^t τὸ πρὸς γαστρὶον, Latinis imus ven-
ter & aqualiculus, quod eo fordes confluant, cum & Vesica & Ileon intestinum,
anteriori parte: posteriore vero rectum intestinum, & in mulieribus inter hæc, ute-
rus medius situs sit. Hæc in tres similiter subdividitur partes, in duas laterales ad pi-
lorum usque exortum, quæ Ilia Celso, * quod Ileon intestinum (& vasa spermatica)
contineant, dicuntur. Anterior vero & media pars ad penem usque, hypogastrium
y proprie nominatur, cujus pars dextra & sinistra in femoris flexu pubi assistentes
βουβόνης Aristoteli^z (quo nomine & tumores, & qui in eis exoriuntur, donantur) in-
guina Latinis appellantur. Tertia vero & anterior pars, ubi pilorum est æervus, ἡ βὴν
Hippocrati^{aa} & Aristoteli: pecten, pubes;^{bb} quamvis pubes proprie lanuginem seu
pilos significet, qui supra pudendum virile & muliebrem erumpunt, maribus decimo
quarto, foeminis duodecimo ut plurimum anno, quod maturitatis signum est: simul
enim (ut Hippocratis^{cc} verbis utar) ac via pater mensibus & genituræ, tum pilus in
pube pueri & virginis, cuticula (cutim veram intelligit) rariore reddita, nascitur. His
pudenda subsunt.

Posterior pars, quæ est à fine costarum ad ossis coccygis finem, δὲ ζυμῶν, cinctum
quidam vocant: dividitur in partem superiorem & inferiorem: superior, quæ est à
dorsi flexu ad nates usque quæ lumbos constituit, δὲ φῦες^{dd} Aristoteles nominavit,
quorum pars utrinque carnea, ψῶα, pulpa, ἀπὸ τοῦ ψαύσσει, à palpando dicitur: ad cu-
jus dextrum latus, ren dexter, sinistrum, ren sinister sedem habet. Inferiores vero
post lumbos partes carnosæ & globosæ, fissura, quæ διχάλα Herophylo, divisæ; Ari-
stot.

B 2

bertatis signa lateant. cc de nat. pueri. dd 1. hist. an. 13.

n Hippocrati.
ο σφαγή. Pol-
luc.

p quibusdam
ἐπὶ γαστρὶον ὡς
γαστρὶον, Volche
ro.

q & Ruffus.
r 1. hist. anim.
13. & Polluci.
λαγῶνας, Gal. 3.
de artic.

s 2. aph. 35. at.
lib. de nat. mu-
lib. veiaçç & γ

veiaçç: & Ar-
taus, vesicam
in τῇ veiaçç si-
tam scribit.

t 7. us. par. 22.
& Polluci.

u Persia: Sumē
Vesalio, Co-
lumbo & Fallo-
pio: alius Sumen-
aut Rumen, à
suum mammis-
aliis τὸ πρὸς γαστρὶον

x lib. 4. cap. 1.
Ilia inter coxas
& pubem posi-
ta sunt: κενὸν
ves, Gal. 5. ad
anat. 6. & dis-
sect. musc. 2 6.

y totius nomen
retinet, quia
Hippocrati de
humidorum u-
su τὸ πρὸς γαστρὶον
totus est venter
inferior.

z 1. hist. an. 14.

aa de nat. pue-
ri: at 1. de mu-
lierū. morb.

ἐπὶ κτενίων ἐπὶ
σειον Introd.

imus venter
Plinio: κτενί-
ot.

bb quod ibi pu-

ec 4. hist. an.
16. ubi dicit so-
lum hominem
ixia habere,
licet & apro &
leoni Homerus
tribuat.

ff 1. hist. an. 15.

gg Hoc docet

Gal. 5. u. part.

14. Sic 6. Me-

thodi. curim &

musculorum

partem infimi

ventris epiga-

strium nomi-

nat. Abdomen,

totum infimum

ventrem vo-

cant, Columb.

l. 5. c. 22. & l. 11.

e. 12. Fallop in

institut. cui ra-

quam saccus,

in quo viscera

continentur. At Laurent. anterior est infimi ventris pars: quod videtur & Celsus lib. 4. cap. 1. voluisse. Picolhom. par-

tes continentes tam communes quam proprias, Abdomen dicit. Platerus, ventris inferiorem & anteriorem sedem, qua hypogastrium. Sic Epigastrii varia acceptatio, I. totus infimus venter, Columbo: at Fallopius ait, multis inferiorem ventrem esse. II. Picolhom partes infimi ventris continentes atraque Gal. 6. met. III. Musculi octo, Gal. 5. u. part. 14.

IV. Anterior & superior infimi ventris pars. V. Media pars anterioris & superioris infimi ventris, Bauhino.

stor. ee ixia, παρὰ τὸ ἔχειν τὸς κατὰ μένους, quod sedentes sustineant, nominavit, cui & ff γλῶσσοι: Latini, nates ab innitendo cum pulvinaris loco sunt pinguibus, dixerunt. In horum medio coccygis os: his recti intestini ultimum, anus seu podex, tanquam in valle subjacet, Plura qui volet, caput 11. & 13. Libri primi, qui de partibus externis agit, consulat.

Constituunt autem infimum ventrem, partes duplices, quarum aliae exteriores dicuntur continentes seu investientes, aliae interiores quae contentae. Continentes, quae proprie Abdominis & nomine exprimuntur: siquidem viscera imo ventri inclusa abstant, & integendo tueantur, unde Graecis ἐπιγαστρικοί, & quasi circum ventrē, dictum volunt; etiam duplices sunt, aliae communes, aliae propriae. Communes sunt, Cuticula, Cutis, Pinguedo membrana carnosa, & tunica cuilibet musculo propria: hae communes dicuntur, quod una cum hoc ventre totum corpus undique cingant, pene & scroto excepto, quae pinguedine carent: ob quam causam aliqui pinguedinem & cuticulam quoque ut excrementum, & continentium numero excluderunt, quibus etiam partis de finitio propria non competit: hae ventrem inferiorem efformant & investiant. Propriae sunt, musculi decem, & peritonaeum, quae infimum ventrem cum ossibus constituunt, quibus nonnulli & omentum addunt: propriae dicuntur, quia huic ventri sint propriae, cum quilibet venter peculiare obtineat, communibus subjectas: de quibus primum, dein de contentis, & ossibus sermo erit.

PARTES CONTINENTES COMMUNES.

De Cuticula.

CAPUT II.

a an Hipp. de

carnibus diēg.

vide infra k.

Arist 8 hist. 17

γῆρας, id est,

senectus, quod

cutis ultima &

primi ortus oper-

culum: Galeno

4. aph. 77 πᾶ

δέμας ἐπι-

φάνεια καλεῖται

αὐτὸ δὲ ἐπιδερμίδα, id est, cutis superficies, quam epidermida vocant: Celso, cuticula summa: alius superior pellicula: Aquapen. cutis regmen & indumentum. b Piccilhom. Aquapen. c Gal. 1. semm. 11. & 13. de const. art. 6. med. 39. d nas-

CUTICULA, partium continentium prima, Graecis ἐπιδερμὶς & ἐπιδερμὶς, quasi summa vel ultima^a cutis, quod ei obducatur, dicitur. Latinis superficies & efflorescentia cutis. Est autem pellicula cuti supereminens, eamque ambiens, alba, densa, tenuis, ex sanguis, & sensus omnino expertis.

Cujus materia semen^b non est, cum facile deperdatur & regeneretur, partes vero spermaticae semel ablatae^c non renascantur: Nec ex partibus spermaticis, ^d nervis, venisve, ad cuius delatis simulque concretis: non ex nervorum finibus, alias sentiet: non venarum, alias sanguinem contineret. Non sanguis, ^b quia ex sanguine genita

genita

genita rubent, at cuticula albet, & ex sanguis est, ea namque dilacerata sanguis non effluit: esset parenchyma, quod filamentis spermaticis attextitur, at in ejus distractione, nullum filamentum conspicitur: dein in morbis diuturnis non absimitur, quo modo substantia carnosa absumi conspicitur. Non ab excrementis, quæ in triplici coctione secernuntur: non primæ, ^b quæ feces stercoreæ sunt: non secundæ, ^b quæ sunt urina & bilis utraque: non tertiæ, ^f quæ vel halitua, vel aquosa vel crassa sunt: non ex ^b halituosis, quia per poros insensibiliter evanescent: non aquosis, ^b quia serosi humoris reliquæ sunt, tenuibile perfusæ, quæ præ tenuitate eam componere nequeunt: non ex crassioribus ^b quæ sordium & strigmentorum specie cuti extrinsecus adherent, nam hoc modo cuticula in balneis abscederet.

Quare in prima generatione ex vapore humido & visoso generatur, dum scilicet in cutis generatione natura semini sanguinem probe miscet: tunc enim ab utraque materia vapor humidus & lentus efflorescens, ⁱ vi interni caloris protruditur, à frigiditate, serosi forte humoris in utero, in cuticulæ rudimentum convertitur: at extrinsecus ab aere frigidiore, ut etiam Hippocrates ^k voluit, condensatur cutique supernascentur, eo modo quo pulvis ex vaporibus elevatis, pellicula innascitur: quod ipsum Aristoteles ⁱ innuere videtur, dum Cutim (cuticulam intelligens) carne siccificante effici scribit, quemadmodum crustæ in pulve & super lac refrigeratum superducuntur: At ubi ablata est, à vaporibus humidis & viscosis, è subjectis partibus ad superficiem à calore elevatis, ab aere exsiccatis & refrigeratis & condensatis, eo modo quo è terra à Solis calore duplex exhalatio elevatur, humida scilicet & sicca: sic à substantia corporis vi caloris innati, duplex vapor elevatur humidus & siccus: ex sicco, pilos generari volunt: ex humido vero, cui & viscositas juncta est, cuticula: si enim ^b simplex vapor est, evaporat, sed propter lentorem non potest, quare cutis superficiei adheret & aeris frigiditate in pelliculam condensatur. Hoc sane opus fuit, cum attritu, frictione & scabie facile recedat, & ex motu, vel igne, vel aquæ ferventis contactu, citissime in vesiculas attollatur, & à cute abscedat, sed etiam à vaporibus humidis & viscidis, facile restituitur.

At prout tres hæc causæ, quæ ad Cuticulæ generationem requiruntur, materia scilicet viscida & lenta: efficiens causa interna, calor, à quo vapores illi elevantur: & causa efficiens externa, aer frigidus condensans, intensiores fuerint, vel remissæ, crassior aut tenuior Cuticula reddetur. Hinc in modo natis, cum cuticula tenuior sit, ac solum inchoata, ob frigoris sufficienter condensantis defectum, tota cutis rubra

B 3.

appa-
consistitiam
convertitur.

quod exemplo Æthiopum d. clarat, quorum infantes ex utero cutis nigredinem secum asserunt, quæ nigredo solam cuticulam afficit, ut in Æthiope dissecto viderit, in quo subjecto Cutis nive candidior apparuerit: addit, eos qui sine ea nascuntur, infeliciter vivere, donec producta fuerit: nam cum Ludovicus Vngaria & Bohemia rex sine cuticula natus esset, eaque inunctionibus enata, vel adolescens canos capillos alebat. Aquap. ex vapore oleoso, crasso, lento & humido, ex cute & subjectis membris ab interno calore elato, & aere frigidiore condensato. g Picolhom. h Aquap. i non ex sanguinis efflorescentia, propterea, quod sanguinis color effloresceret: idem. k de carnibus corporis extremum aeri expositum, à frigido & ventis ingruentibus necessario pelliculam contrahit. l 10. prob. 29. 2. gen. an. 3. & 6. cutis carne siccificante efficitur. *καταπνεύσει τῆς ἐφ' ἧς οὐκ ἔστιν ὕλη*: nec solum propter extremum generatio ejus, sed etiam quod lentitudo resideat cum evaporari non possit. Sic 3. hist. an. II. inest in cute animalium lentior quidam mucosus, verum aliis minus, aliis magis, ut in tergo bubulo, ex quo glutinum facere solent.

apparet, ac si nulla cuticula obducta esset: at mox ab externo frigore densior reddita & exsiccata albet. Sic astate tenuior, hyeme crassior existit. Et si frigiditati ^h coagulanti etiam siccitas densans accedat, tum crassissima fiet: quemadmodum in febribus diuturnis, tabidis, & rusticorum manibus & pedibus usu venit.

ⁿ Gal. 6. epid.

^{cam.} 2. aph. 30.

Densa est, non tamen nimis, ne transpirationem impediat, cute tamen densior ⁿ & compactior: hinc humores aquei à centro ad circumferentiam propulsi, cutim facillime permeant, Cuticulæ vero finibus continentur: unde ecchymata, phlyctides, & tot pustulæ ⁿ aquosæ quæ hydroa nominantur: Densa autem facta, & quo vasorum capillarium oscula obtegat: & ut ipsius caloris ^h halituosi transpiratus includantur, ne plus justo exhalent & sic non parva virium & caloris nativi resolutio sequatur. Hanc serpentes ^o singulis annis bis, Vere & Autumno, initio ab oculis ^p facto, exuunt, quæ semectus ^q & exuviz dicuntur: sic sericinos vermes quadraginta diebus, eam quater abjicere, Aquapendens asserit: homines vero non nisi per morbum & quando fucis utuntur.

^o Arist. 8. hist.

17.

^p Arist. loc. Plin.

l. 8. c. 27.

^q Plin. l. 20. c.

23. l. 28. c. 11. at

l. 8. c. 27. anguis

membrana.

Tenuis est, ceparum involucris, & membranis quæ in ovis sunt, non dissimilis: summe autem tenuis, ne primarum qualitatum occursum impediat & Cutis subjectæ sensum hebetet: At in vola manuum & potissimum pedum plantis, ubi ob continuum usum atteritur & quasi nova succedit, crassior & durior evadit: Sic Aquapendens aliquando sub vesicatorio medicamento, duplicem, & utramque tenuissimam observavit, sed superiorem inferiore longe tenuiorem. Duplex ergo videtur, altera interior, exterior altera apparens potius quam vera: hæc interior & vera tenuior & friabilis est, quæ scalptu squamarum modo auferri & ablutione detergi potest: & non difficulter à vera separatur, ut in partibus fonticulis circumjacentibus patet: vera autem neque friabilis est, neque scalptu auferitur, cum lenta sit & cuti subjectæ validius adhæreat. Illa, forte ex tertiæ concoctionis excremento crassio, in ambitu & superficie adhærente & in pelliculam quasi concretescente, generatur: vera vero, uti jam dictum ex vaporibus humidis & viscosis ex subjectis partibus elevatis: idcirco autem duplex, ut cum omnibus externis obvia sit, si externa pereat, altera & interior ad proprios usus reservetur.

^r in eam vena

arteria & ner-

visimantur,

Aquap. eam ta-

men non admit-

tis, idem.

^f Car. Stephe-

nus sensum ob-

rum tribuit.

Galenus om-

nem sensum ei

detrahit: quo

authore lepra,

psora, scabies,

ex anthemata hujus

membrane affectus

sunt, quas Hippocrates

turpitudines vocat:

& macularum qua

cutem detur-

sam esse, ad istas

maculas eradendas

& delendas: quamvis

id olim à vetulis

facilitatum, ut

cutis nova &

splendidior

renasceretur in

locum veteris

ex vii, Riol. &

de Cuticula usu,

Columbus nil habet.

Ex sanguis est, idcirco & alba, cum ad eam nec venæ, ^r nec arteriæ perferantur, quare per vaporem humidum & viscidum accedentem condensatum, renascitur: & ex anguis, quo densior fieret.

Sensus prorsus expers, ^f quo Cutim, quæ sensus instrumentum est, & cui nascitur, ab injuriis externis tueatur, & ejus exquisitum sensum attemperando, sensus tactus medium fiat.

Uusus ^r Primus ut sensus tactus medium sit: nam licet Aristotelici, plerunque carnem tactus medium appellent, existimantes tactus organum intus latere: Medici vero cum Galeno, & recte quidem, tactus organum verum, cutim statuunt, mediumque non agnoscant: verum cum inter cutim & obiecta tangibilia, cuticula in-

terce-

tercedat (quod negare non possunt, nisi sensui contradicere velint) quæ tanquam
tenue velum veræ cuti obducta est, hanc rationem mediæ habere quomodo nega-
bunt? in primis cum hac avulsa, dolorem per sentiamus, illaque parte, rerum contra-
ctum ferre non possimus, quod in ulcusculis in manibus, ob ablata cuticulam, quo-
tidie experimur: sicque cute subjecta nudata, sine iudicio & cum dolore sentimus,
idque ob mediæ defectum. Siquidem ut Aristoteles ^u scribit, omnia quæ sentimus u l. de anima
per medium sentiamus: ubi notandum illum dixisse omnia. Dein, quod non recte tex. 114.
sentiamus, nec diiudicare possimus, similiter ob mediæ absentiam contingit: nam, ut
idem Philosophus, nulla sit sensatio per immediatum contactum sensibilis & senso-
rii. Sic in lingua, præter cuticulam est salivæ humiditas, quæ res gustandas rigat &
emollit. Annon igitur recte & utrumque horum sensuum mediæ sibi connata habe-
re, affirmabimus? Alter usus, organorum communium fines operire ac tueri, ac va-
sorum capillarium oscula contingere, hæc enim vi quadam ablata, statim ex eorum o-
rificiis sanguis profluit: & propter nervorum extremitates detectas, dolor excitatur.
Tertius, cutim tegere, ne per ipsius poros patentes, continuo humor exudet, ut in in-
tertrigine & phœnigmi sit, ubi cutis semper maderet. Tandem, cutim asperam inæ-
qualem, mollem & lævem reddere.

De Cure.

CAPUT III.

*De cute ejusque meatibus egit Arist. 3. hist. an. II. & 5. gen. an. 3. Galenus 2. us. part. 6. & II. ejusq.
15. at de ejus Nervis. 16. us. part. 2.*

CUTIS vera ^a germanaque cuticulæ subjacet, quæ Græcis ^b *dermis*, ^b *ἀνδρὲς* *dermox*, ^a *Cutis* nomine ^c *dermis*, quasi ^c *dermis* vel ^c *dermis*, vinculū corpus nostrum colligans. Est enim cutis pars similis ex semine cum sanguine probe mixto, à facultate propria genita, ad omnium partium custodiam. Substantiam habet propriam, licet nervo & membranæ assimiletur, cum sit candida, extendi possit, sensusque sit exquisiti, cæteris tamen membranis crassior: quæ ex ^d semine cum sanguine probe mixto gignitur, quò tam de partibus spermaticis, quam sanguineis iudicium ferre possit: quare mediam naturam inter carnem nervumque adepta videtur: non enim, ut habet ^e Galenus, plane exanguis est, ut nervus: nec omnino sanguine abundans, ut caro: sed veluti sanguine præditus nervus. Verum in ejus constitutione pars spermatica sanguineam superat, cujus ut plurimum colorem refert; ejus quoque nomine tantum per mediam cicatricem coalescit.

Нѣс

min Herodoto, ἀρβύρινος. c. ne off. natu. τὰ ἐξ αὐτῶν πάντων ζῷα τὸν κ. ζῶντο. d. Columbus ex vasorum extremis dilata-
tate gigni credidit: eo quod videntur sentiat et in eam vasorum extrema deficiant: quod de plerisque partibus dici posset.
Alii ex nervis mollioribus in corporis superficiem expansis, sanguinis additione concurrente. Alii Varolo nervi mollio-
res ad corporis superficiem delati in exalitate expanduntur, in cutem degenerant, concurrente sanguinis additione:
quemadmodum folia lasiſſima nymphaea ex tenui pediculo expanso generari solent. Picchilom. fit ex semine, fuscus membra-
que factum involvens. Vesalius inter perium & musculorum carnem quiddam plane medium, ac si ex mixtis utrif-
que confisteretur. c. i. temper. ult.

f 3. meth. 5.
g in Tymao ex
1. simp. 4.
h 2. part. an. 1.
2. gen. an. 4.
(Sed hoc non
credendum, cū
cutis à subjectis
carnibus exco-
rari possit, &
inter cutim &
carnem inter-
iecta sint pin-
guedo & panni-
culus carnosus:
hoc verum est
de cicatrice,
quæ cutis est vi-
caria) Gal. 5.
simp. 16.

1 Lib. de succis,
qualis humor,
italis color in
cute efflorescit.
* non tamen ex
duabus pellicu-
lis conflata, ut
Massa voluit,
qui cutem inte-
riorem, candi-
dam ac mollem
externam du-
riorem: quas
acie novacula
dividi posse sta-
tuit.

k Arist. 3. hist.
an. 11. & 5. gen.
an. 5.
l Gal. 16. uf.

par. 2. 3. ad an. 2. at Arist. 3. hist. an. 11. sensu carere dixit, maxime capitis: quare alii putant Aristotelem cuticulam innue-
re, alii veram intellexisse, sed consideratam ut pars similis est, a nervo distincta. Non agnoscens Arist. veram cutis con-
stitutionem, credidit cutim extimam carnis portionem exsiccatam, veluti exustam esse: hoc forsitan credidit, quia in vul-
neribus & ulceribus vidit carnem cute privatam, exsiccantibus medicamentis, cute obduci, & extima parte siccasse.
Sed hac non cutis, sed cicatrix & cutis vicaria est: hac Piccilhom. & Laurent. m Arist. 5. gen. an. 3. de differentiis cu-
tis egit, & ingenii vires ex cutis & carnis (2. de anima 9.) substantia colligit, ut ingeniosi sint, qui molles: inepti, qui
duriorem & crassorem cutim habet. At Gal. 2. temp. ult. errare dicit eos, qui ex sola cute totius temperiem colligant.
n Gal. 3. meth. 5. o Gal. 1. simp. 4. p Arist. 2. de anima recipiens debet esse denudatum à natura recepti. Al-
bertus in solo homine temperatam credidit. q Arist. 5. gen. an. 3. τὸ πικρὸν τοῦτο πικρὸν τοῦτο πικρὸν τοῦτο cutis capitis crassissi-
ma est Columb. tamen dicit, Aristotelem cutim capitis tenuissimam fecisse. r quæ Celso Iliis, ab ina tenuissima char-
ta parte.

Hæc ergo cum ex majore seminis portione oriatur, & inter partes prima in foetus
producatur, ex carne subjecta & siccata generari non potuit, ut Galenus^f voluit, cum
pinguedinem interjectam habeat, & à subjectis carnibus facile divellatur: quare
semper reliqua carne durior est, ideoque cicatricibus nulli pili infiguntur. Et hæc ci-
caticum generatio Platonem & decepit, ut cutim ex genere carnis esse diceret: & A-
ristotelem, h ut cutim carnem siccata pronuntiaret: equidem ratione sanguinis si-
militudo quid cuti sit, nimirum cicatrix, estque ex carne velut exsiccata.

At cutis naturaliter albicat, pro ratione tamen humorum abundantium, etiam
Hippocrate docente, & subjectorum corporum, colorem variat. Humoribus qui-
dem, ut sanguinis, qui illam, ubi abundat, & cutis tenuis est, ut in facie, rubore tingit,
maxime si vel calore, vel aliquo animi motu excitatus copiosius affluat, quemadmo-
dum eo frigore condensato livida redditur: sic biliosorum pallet, melancholicorum
nigricat: sic humoribus vitiosis inquinata, ut in Ictero, flavescit vel nigricat. Ratione
vero corporum subjectorum, ut carnis, cui si adhæreat, ut in malis & manibus fit, ci-
tius rubet: sic & pinguedinis, quæ si copiosior sit, æqualem albamque reddit; qua
absumpta, cute rugosior reddita, & adumbrata, fusca fit; quemadmodum ibi, ubi ve-
næ majores sub ipsa feruntur, livet.

Crassa^{*} est munimenti gratia, at tenuior, k quam sit in aliis animalibus; quæ à
carne absque dolore avelli non potest, cum in eam omnium fere vasorum extrema
desinant, unde ex vasorum extremis dilatatis eam prodire credidere. Mollis est, sen-
suque l exquisito prædita, quo externas injurias, antequam internæ partes lædantur,
perferant.

Hæc pro ratione m partium vel mollior, rarior, ut in facie, pene & seroto: vel du-
rior, ut in cervice, dorso, cruribus & plantis pedum; quædam in duritie n & mollitie
media, ut est ea, quæ in interna manus sede, maxime in digitorum apicibus, cum iis
apprehensio, fiat, & in manus o, cute perfecta sit tangendi potentia; idcirco omnis
excessus plane expers & temperatissima (quia tactus judex, & omne instrumentum
qualitatis p alienæ expers esse debet) nisi laboribus callosa sit reddita, ut in fossori-
bus & remigibus. Sic quædam crassissima, q ut in capite: quædam crassa, ut in collo:
quædam tenuis, ut r in lateribus, unde citillatio: quædam tenuior, ut in vola ma-
nuum: quædam tenuissima, ut in labiis.

Figuram propriam nullam habet, sed à subjectis partibus eam acquirit, & sic alicu-
bi æqualis, alibi inæqualis existit.

Con-

Connexio ad partes eadem non est: quædā enim à subjectis partibus separari potest facile, ut in ventre inferiore & medio, brachiis & cruribus ab aliis ^{f Gal. 11. us. par. 15.} difficulter ob-
membranam carnosam, cui fibris & vasorum beneficio, pinguedine tamen iis in lo-
cis, ubi ab illa excoriari potest, intermedia nequitur: ab aliis vero vix, ut in plantis pe-
dum, volis manuum, quibus ad firmiorem apprehensionem penitus connascitur: ^{f Gal. 2. us. par. 6.}
carne frontis & totius fere faciei, maxime aurium & labiorum, propter ^{u in multis ani-} tendines &
musculos, maxime eum qui Latus dicitur, commixtos. Sic in fronte mobilis, in re-
liquo hominis ^{malibus cutis} corpore immobilis est. ^{mobilis: Sic E-}

Differentiæ enim cutis in universum quatuor sunt Galeno: ^{lephas, corruga-} una quæ pilorum ex-
pers, quæ exquisitè sentit, quæ à subjectis corporibus vix separari, neque ut cætera
complicari potest, ut in vola manus & planta pedum. Alia cutis est, quæ musculum
cujus gratia movetur, eumque tenuem substratum habet, ut in fronte. Tertia spe-
cies est, quam propter varium & multiplicem fibrarum carnosarum implexum, sive
musculum cutaneum, sive cutim musculosam dixeris, nihil refert, quæ labiorum &
buccarum natura constat. Postremum cutis genus est commune velamentum, quæ
cutis alicubi pilosa, alicubi pilis destituta, ubique motus experts, & quæ citra difficul-
tatem à connexis partibus diuellit. At hic de quarta differentia sermo est. ^{tione cutis mus-}

Continua universum corpus investit, nisi ubi meatibus ^{cas interficit: in} naturalibus, partim ma-
nifestis, certoque numero definitis, qui foramina dicuntur: partim obscuris & infi-
nitis, quos poros nominant, datur transitus, vel ob intromissionem, vel emissionem,
vel utrunque. ^{equo, cervo,}

Foramina ut: citra oculos palpebrarum, foramina transversa, visionis causa: aures, ^{mobilis, sic in e-} propter auditum ad sonorum intromissionem, & sordium expurgationem: na-
res, respirationis & odoris gratia, & mucoris effluxum: os, quo cibum &
porum recipiat, & nonnunquam vomat: papillas mammarum, ut per ea in mulie-
ribus infans lac sugat: penis glandem, quo semen vel urina emittatur: podicem, quo
stercora ejiciantur: in mulieribus, ad uteri sinum rima ad virgam admittendam, fœ-
tum excludendum, urinam & menstrua profundenda: in fœtu umbilicus, ut sangui-
nem & spiritum pro nutritione & vita admittat, & in extremis digitis, ubi ungues af-
fixi sunt. ^{rinaceo dum}

Porosa ^{corpus conglo-} est, exiguis foraminibus instar ^{bat.} cribri refertissima, quod sudores & pili ^{f 11. us. par. 15.} y Deporis videntur
qui erumpunt, comprobant; nam pellis humana si absque ulla præparatione exsicce-
tur, lata spiracula obtinet: quæ causa, cur Plato, ^{x Arist. 3. hist.} cutim nassiculæ, quæ pisces capi-
untur assimilarit: Sic & Regem quendam Persarum ad fenestras parandas usum scri-
bunt: id quod Oribasius ^{an. 11. contextu} ex historia sic refert: Jussit quidam Persidis imperator co-
rium à quodam tolli, atque inde aliquas umbras tegumenti fieri: Unde probatur, ho-
minem cutim habere patentioribus poris donatum, quam cætera animantia. Porosa ^{perpetuo cutis}

autem ^{in omnibus ani-} Alberto præse-
na. aa in Timao ^{malibus conti-} in enar. Aphor. Amatus cent. 4. cur. ult. pellem humanam præparari jussit, eo quo pelles alba evadunt
modo, ut postea nigra, vel coloris alterius ab artifice fiant, quæ ita apparatus, crassa, sed intus tomentosa evasit, similis om-
nino pelli cervinæ, quam Hispani & Neapolitani parare solent, ut ex ea caleos astivales conficiant. Herodotus l. 4. Scy-
tharum mores in hostes recensens, eos ex pelle detracta ^{bi interpellatur} & sicut bovis corium manibus ubi molliore, tanquam mantile
equorum suorum habenis appendunt: alii tanquam brutorum corium consuunt, quibus pro amiculis induuntur: multi
rotos homines excoriatos & super ligna extensos, supra equos circumferunt: est autem inter omnia coria humanum fe-
re & crassum maxime, & candore splendidum. ^{quam ubi natus}

autem esse debuit ad liberam transpirationem, quo tertiæ coctionis excrementa repurgari possint, (unde quibusdam emundatorium universale dicitur, cum internarum partium supervacua excipiat) qui exigui & fere insensiles, ne maxima fiat spirituum dissipatio: in aliis tamen angustiores, in aliis latiores, hique nullo negotio sudant, & ab internis minus afficiuntur: illi difficilime & facile excrementis retentis læduntur: qui ut aperti servantur cuilibet pilus mucosa albaque radice firmiter hæret, exceptis illis locis, ubi continuo atteruntur, ut in vola manus, &c. horum etiam ratione, quandoque fasciæ ^{bb} in deligatione cruentæ apparent: imo & sanguis purus, ut in sudore Anglico, effluxit. Hos, si laxari cōtingat, ut à profusiore gaudio & croci liberaliore usu, derepente hominem extinguere censent. Per eosdem aeris ambientis portionem quoque attrahi volunt. Quo vero nutriatur, vivat & sentiat, organa communia † di-
cta venas, arterias & nervos recipit.

^{bb} Gal. com de fractur.

^{cc} Addunt aliqui processus quos cutis emit, ut in facie, propter nasum

& aures: in thorace, propter mammas & papillas: in ventre, propter testes & penem. Sed de digitis manuum & pedum idem dicere possemus.

† Sic vocavit Gal. 1. sem. 5. 2. us. part. 19. 4. esu. d. 12. 1. meth. 6. hinc Aristoteles libro de Spiritu 5. Curis vena, arteria & nervo constat.

^{dd} Hipp. de ulimento.

^{ee} totidem arteria ramulos venarum committuntur, Laur. ff Gal. 3. fac. nat. 14.

^{gg} Gal. 16. us. part. 2.

Venas cutaneas dictas, duas à Jugularibus per caput & collum dispersas: duas ab Axillaribus per brachia, thoracem ac dorsum: duas ad Inguina, quarum altera à Cavæ ramo externo Epigastrica dicta (quæ in sectione rupturæ in inguine, sæpe cum periculo vulneratur) quæ cum arteria, versus ossis ilium spinam, fertur per cutim ad partes laterales nutriendas: altera magis interior, quæ sursum per abdominis cutim anteriorem ac lateralem deducitur, & extremis osculis jungitur cum cutaneis venis, quæ ab Axillari ortæ, thoracis lateralem partem nutriunt, & ad Abdomen descendunt. Sic à parte posteriore, sæpe à Lumbaribus & Muscula propagines habet, quæ per lumborum infimam regionem, pedes & infimum ventrem disseminantur, quarum dextræ cum sinistris, inferiores cum superioribus junguntur: quod in vena frontis, spina narium, sub mento apparet: sic in mammis, in hypochondriis: in lateribus abdominis ac thoracis, ubi vena ab Epigastrica ascendens cum Mammaria descendente invicem unitur (eo modo, quo intrinsecus sub rectis abdominis musculis fieri dicemus) ratione cujus concursus & unionis, inter nares & abdominis exteriores partes, quæ in hypochondrio continentur, consensus: cum venæ descendentes à Cavæ ramis jugularib. circa jugulum nascantur, à quib. narium venulæ ortu habet, harumq. conjunctione sanguinis è naribus fluxio sistitur, si dextra nare fluente hypochondrio dextro, sinistra sinistro, ex dictatoris nostri Hippocratis præscripto affigamus. Sic in cubito sæpe Axillaris cū Humeraria ita jungitur, ut aliquando nil refrat, live hanc live illā feces: Sic in crure, propagines Saphenæ cum ramis Ischiadicæ copulantur. Eadem conjunctio datur inter externas atque internas, ita ut jugularis externa cum interna, mamillares externæ cum internis, axillares, cum venæ sine parirami, per media costarum spacia jungantur. Sic abdominis cutaneæ, cum interioribus & in cruribus quoque internæ cum cutaneis necuntur. Vera ergo, divini Senis ^{dd} sententia, *ἐν ὅποιᾳ περὶ, ἐν ὅποιᾳ περὶ, ἐν ὅποιᾳ περὶ*.

Arterias vero ^{ee} paucas habet, quæ ad tempora frontem, penem, scrotum & digitos exiguæ, quia non tanta caloris copia requiritur, inter cutim & membranam carneam feruntur: quæ cum dilatantur, ^f aerem externum attrahunt: qua vero parte ad venas se aperiunt, id quod in sanguine tenuissimum, maximeque halituosum ad se trahunt.

Nervos non quidem proprios & definitos, sed ex nervis, ^{gg} qui ad subjectas partes mittuntur, fibræ producuntur, quæ inæqualiter disseminantur, & in exilitates expanduntur, si in

in cutim absumuntur: duorum tamen insignes circa papillas, unde earum exquisitus sensus, conspiciuntur: sic cuti volæ, plurimæ nervorum fibræ porriguntur, cum exquisitissimo sensu sit prædita, quemadmodum quoque ad unguum radices & pudendi extremum: in aliis vero hebetior est sensus.

Uusus: tactus ^{hh} exenni immediatum esse instrumentum, ut externas injurias, an- ^{hh Hipp. lib. de} requam interna lædantur, perferant: quemadmodum tactus interni sunt membranæ ^{humid. cutis} internæ. Dein, ut totius corporis ⁱⁱ commune & nativum sit tegumentum, muni- ^{quia nervo con-} tum & ornamentum, cum illad circumdet & obtegat, quo tutius sub ipsa vasa ^{juncta, calidita-} ferantur, muscoli & viscera collocentur (unde Aristoteles ^{kk} ad custodiam carnis ^{tem & frigidita-} constructam dicit) eaque vestis instar à calore, ^l nimioque frigore defendat, & ca- ^{tatem patitur.} loris nimium effluxum cohibeat. ^{Arist. 1. hist. an.}

^{4. tactus, ait, in} ^{parte corporis si-} miliari consistit, ut in carne, aut in aliqua generis ejusdem: denique in parte sanguinea, aut in ea, qua ex proportionem vi- ^{ce illius habetur. Vide 2. de Animac. I. ubi carnem medium tactus facit, non vero instrumentum: ac instrumentum} ce illius habetur. Vide 2. de Animac. I. ubi carnem medium tactus facit, non vero instrumentum: ac instrumentum ^{tactus esse quidam intus in corpore abditum, quod potestate tale sit, quale actu sit tangibile, sed quid sit, non exprimit.} tactus esse quidam intus in corpore abditum, quod potestate tale sit, quale actu sit tangibile, sed quid sit, non exprimit. ^{Averrhoes & Thomas dicunt esse nervum. Avicenna pinguedinem sensus instrumentum facit. Piccolhomino cutis est} Averrhoes & Thomas dicunt esse nervum. Avicenna pinguedinem sensus instrumentum facit. Piccolhomino cutis est ^{medium tactus. Varolo, cuticulam sensatione tactus, tanquam medium deservit. Laurentio, cuticula est medium ta-} medium tactus. Varolo, cuticulam sensatione tactus, tanquam medium deservit. Laurentio, cuticula est medium ta- ^{ctus, cutis organum tactus. Aristoteles, medium tactus cum animali conjunctum esse vult. 11. Gal. 3. ad an. 1. de caus.} ctus, cutis organum tactus. Aristoteles, medium tactus cum animali conjunctum esse vult. 11. Gal. 3. ad an. 1. de caus. ^{morborum, 6. 14. method. 2. k. Hipp. de carnibus Gal. 8. usq. part. 1. & 3. alimen. 11. cum ea omnia habeant, quibus est san-} morborum, 6. 14. method. 2. k. Hipp. de carnibus Gal. 8. usq. part. 1. & 3. alimen. 11. cum ea omnia habeant, quibus est san- ^{guis: Dein, cum exquisitissimi sit sensus, eorum que nocturna sunt, admonet.} guis: Dein, cum exquisitissimi sit sensus, eorum que nocturna sunt, admonet.

De Pinguedine.

CAPUT IV.

Pinguedo, quæ ^{πικρὰ} a Græcis & inter cutim & ^b membranam carnosam in ho- ^{a Gaxa vocem} mineferuntur, in brutis vero membranæ subjicitur, ex sanguinis ^c puri elabora- ^{πικρὰν apud} ti & absolute ^d cocti portione oleosa ^e tenuiore & aerea, è venis tenuioribus roris in- ^{Arist. male ad-} star exsudante generatur, quæ à calore ^f moderato (nimium enim exurens calor con- ^{tem vertit, cū} sumeret; nimium imbecillus, non concoqueret) ac membranarum respectiva frigi- ^{stas adeps sit,} ditate ac densitate coalescit, quare animalia hyeme densa cute pinguiora evadere vi- ^{unde plerique} demus. ^{indifferenter}

Quæ membrana nervea, tenuissima tamen sub cute universum corpus ambit, à ^{adipis voce u-} sequenti non [†] distincta, quo omne id, quod oleosum in vapores attenuatum inte- ^{cuntur.} riores membranas præter lapsum est, huic impingens adhæreat, & in pinguedinem ^{b Arist. 3. hist.} vertatur, ne aliquid, quod corpori utile esse posset, pereat, eo modo, quo videmus ^{an. 17. inter} ^{carnem & cu-} ^{inde tim 2. gen.}

^{an. 4. sub cute. Vesal. præter hominem & porcum & erinaceum, aliud quadrupes non occurrit, quod inter cutim} ^{& carnosam membranam adipem nanciscatur. c materia remotissima sanguis, 3. hist. an. 16. d Arist. 3. hist. 19. 3. part.} ^{9. an. 1. gen. 18. & 19. e Gal. 2. temp. 3. & 16. usq. part. 2. f Arist. 2. par. 5. a calore πικρὰ & stas sunt sanguis conco-} ^{ctus, & 3. part. 9. est finis probæ coctionis: secuti sunt Vega, Argentarius, Joubertus & Piccolhom. Galenus à frigido vo-} ^{luit. 1. temp. ult. & 2. temp. 3. quod oleosum in sanguine, fluxileque & pingue est, ubi in frigidum venit locum cogitur: se-} ^{quuntur Vesalius, Fallopius & Laurentius. Piccolhominus à sextuplo calore concoqui & concrecere asserit. 1. à calore} ^{ansito in oleoso sanguinis vapore. 2. à calore insito membranæ. 3. à calore influente à corde per arterias in membranas.} ^{4. à calore influente ab hepate per venas cum sanguine. 5. à calore per antiperistasin cum pulso à partibus circumje-} ^{ctis membranæ. 6. à calore, à partibus vicinis, corde, jecore, musculis, mutuo accepto. † quod Piccolho-} ^{minus voluit.}

in destillationibus fieri, ubi licet capitellum sit calidissimum, ob ejustamen densitatem vapores vi ignis sublatis, statim in aquam condensantur. Sic aere foris frigidus, vapores in conclavi aliquo calidi ad fenestras, cum corpore sint densiore partim, partim etiam frigidus, in aquam vertuntur: aere foris calido non item. Albet autem & in omnibus animalibus, propter membranas albas, quibus adjacet, à quibus sanguis albens leviter alteratur; at in homine minus, quam in cæteris alba est, in quibus modo subflava, modo albicans conspicitur.

g Ridendi qui
albam putant,
quod aerea sub
stantia compos
sit, cum osse, car
tilagine, liga
mento, tendini
bus, vix quid
cædidius occur
rat, quibus ni
hil aque terre
num in corpore
reperias, Vasa
h Sic in articu
lorum flexioni
bus impedimen
to fuisset, in ar
tubus dorsi spi
na, nisi in ex
treme obesitas.
i Gal. 13. usq.
part.
k 14. usq. part.
l 6. ad an. 6.

Hac ut partes, ita & ætates aliquæ destituuntur; partes enim, ^h quibus inutilis esse poterat commodam complicationem & distensionem impediendo, ea carent: ut sunt cerebri, palpebrarum, penis, scroti, testiumque membranæ: quare à continetium numero à quibusdam excluditur. Quibus vero adest, duritie & mollitie variat: cum in iis partibus quæ valentius ⁱ moveri debuerent, durior sit, adipis instar fibræ & venulis intertextæ, ut in vola manus, digitorum internis sedibus (cum ibi plures tendines, nervi, vasaque sint, quæ ab ea humectantur, & inania spatia replet, & melioris apprehensionis causa cutim æqualem reddit) & pedis planta, maxime calce, quo commodius innitamur, nunc sola, nunc cum humore crasso & lento (qui adipis munus explet) ad partes ad motum aptiores reddendas, earumque exsiccationem prohibendam, cui hinc inde multæ glandulæ adjectæ sunt: aliis vero partibus mollior & subflava. Sic in externis manus & pedis partibus, pauca: in clunibus, propter majorem usum, copiosa. In frigidis humidisque animalibus, ut homine, porco, copiosior: quare Galenus ^k mulierem viro obesiorem dicit, & in iis, qui otiosam ^l vitam agunt, abundat; calidis & siccis, ut simiis, canibus venatoriis, nulla aut exigua. Sic in modo natis, nulla: in consumptis vel fame, vel morbo, vel ætate, aut nulla, aut pauca reperitur.

Quare cum frigida pinguiora sint, & pinguedo non nisi locis respective frigidis adnascatur & animalia hyeme pinguiora sint, idcirco membranarum frigiditas cum earum densitate pinguedinis causa efficiens erit: frigidum dicimus, non quod actuale sit, sed respective ad colorem, quæ tamen ad cogendum sufficiens sit, qualis est debilis calor: quemadmodum & plumbum liquatum, quod ubi ab igne removetur, mox tamen cogitur, etiam si in locum satis calidum, igne tamen frigidior, effundatur.

Differunt autem ^m $\mu\epsilon\lambda\lambda\eta$, pinguedo (quæ in cornutis axungia, in porcis lardum dicitur) & ⁿ $\sigma\epsilon\alpha\epsilon$, adeps seu sebum, docentibus Aristotele ^m & Galeno, ⁿ quod pinguedo mollior sit & humidior, calore celeriter ^o liquefeat, nec facile ubi liquata fuerit, rursum concreseat ac cogatur. Adeps vero durior & siccior, non facile funditur liquefcitve, sed fusus, celerrime coit & congelatur, ac propterea animantibus totam naturam terrestriorem habentibus provenit, veluti humidioribus pinguedo. In homine pinguedo sub cute copiosa, quia ipsius materia à densiore crassioreque cute retinetur, quod comprobant ea animalia, quæ corium densum habent, hæc enim plurimum pinguedinis habent; ut ex terrestribus, sus; ex aquatilibus, delphinus. At adeps in omento, renibus, corde, oculis, ossium articulis, inter latum tendinem & cutem mediæ volæ manus, interiore quæ digitorum regione, veluti etiam pedis, habetur.

Venæ tres per ventris infimi pinguedinem disseminantur: quarum una à Mam-

milla-

m Substantia
et locis differre
ostendit 3. hist.
an. 17. sic 2. par.
an. 5. sanguinis
ratione differre
monet.
n 3. fac. alim.
11. et 4. ac 11.
simplic.
o Gal. 1. temp.
ult. Sic 6. ad an.
à calore liquefcit,
à frigiditate
conservatur.

d Gal. ad an. 2. rum propaginibus, quæ per hanc^d ad cutim prorepunt, accedentibus fibris membranis, pertinaciter connascitur: musculorum vero membranæ subjunctæ per fibras^d tenuiores adhæret. Et cum versus lumbos carnis speciem præ se ferat, dorsoque firmissime cohæreat, inde oriri dicitur, quæ membranæ similis est, & ad axillas progrediens, in canibus & simiis carnosior^e redditur. Verum in modo natis carnem, ob sanguinis copiam, qua tota est perfusa: in adultis vero ob continuam exsiccationem, membranam refert, ita tamen, ut in anteriore colli parte ac fronte, fibris suis carnis sic nectatur, ut ab ea vix separari possit, & musculo^f lato ita adhæret, ut eum constituere credatur. Sic in emaciatis, pinguedine colliquata, membranam solum refert: contra in oberrant qui pan-^gefis: adipi multo circumfusa est, ita ut membrana adiposa dici mereatur: maxime in mulieribus, ubi & superne & inferne copiosa pinguedine obducta est, ita ut inter pinguedinem media sit. In homine^g excepta fronte, immobilis: in brutis vero, hujus inventu cutis mobilis redditur, præsertim in collo, cujus motu muscas^h abigunt: at inferiore parte, qua musculorum membranas tangit, ob lentumⁱ humorem, quo & pleræque membranæ oblinuntur, lubrica, ne musculorum motum impediatur: sensum habet exquisitum, ita ut si ab humore acri vellicetur, rigor causetur.

*f Muscæ ad
200 pgs. Gal. 4.
ad an. 4. dici-
tur. vide inter
musculos buc-
carum.
g Audio, ait
Vesal. homines
fuisse, qui in
thoracis regione & alibi etiam in corpore cutim movere valuerint: quibus procul dubio membrana hæc similis equorum, aliorumque carnosarum membranis contigit. h Sic Elephantem cutis corrugatione muscas interficere asserunt: sic equi ex hujus motu, equitem minus exercitatum dejiciunt. i Arist. cuti tribuit. 2. gen. an. 6. k Gal. 3. ad an. 2. l Arist. 3. hist. 11. ubicunque cutis per se, ac sine carne est, vulnerata non coit.*

Ufus, uniuersum corpus ambire, integere & defendere. Dein ne à continuo musculorum motu pinguedo liquecat, impedire. Tum vasa etiam ad cutim^k abeuntia fulcire: cum inter cutim & hanc membranam ferantur, non solum capillares venæ, verum & ex, e quibus sanguis mittitur, arteriæ item, una cum nervis. Denique cutis laxa, cum sine^l carne non coeat, consolidationem iuvare. In brutis vero, sua densitate & crassitie sanguineos vapores retinet, ut in sanguinem convertantur, & quia proxime curi subjacet, eam mobilem reddit.

Membrana musculorum propria.

CAPUT VI.

*a nonnullis à
periostio.
b Differentiam
inter membra-
nam & tuni-
cam explicavit
6. ad an. 11. 7.
ejusd. 1. & 4.
us part. 9. vide
c. 27. lib. simi-
larium. c 6. ad an. 4. & 4. us part. 9 non scrupulosum esse debere monet.*

Membrana, quæ musculorum propria est aliarum membranarum instar tenuis, nervosa fibrosa que, à fibris nervosis^a musculorum orta, musculis tenuissimis filamentis annectitur; quam membranam, non tunicam vocamus: quod enim extrinsecus partes ambit, monente Galeno, ^b *ὀμὴν* & membrana proprie dicitur, quod nomen etiam ab essentia habet: tunica vero seu *χρῆνος* appellatio, vasorum corporibus, & quidem ab usu, debetur: quamvis & Galenus^c & cæteri Anatomici, indifferenter & membranæ & tunica nomine utantur, quemadmodum plenius in membranarum historia, in parte altera libri de partibus similaribus explicavimus.

Ufus

Uſus huius membranæ eſt musculos inveſtire, circumſcribere, & à cæteris parti-
bus ſeparare, & iſdem ſenſum ^d tactus præbere.

^d Piccolhom. membranas ſenſus tactus instrumenta ſtatuit. Lauren. ab iis ſenſus partium internarum.

PARTES CONTINENTES PROPRIÆ.

De Musculis in genere.

CAPUT VII.

Musculus, qui maximam partem corporis conſtituit, à Græcis ^a *μῦς* nominatur, a Hipp. lib. de
vel ab ejus officio ſcilicet ^b *ἐκ τῆς μύσεως*, quod eſt contrahere: vel à forma, quod
horum aliqui forma murem ^b excoriatum imitentur, qui capite & cauda gracilis eſt
& anguſtus: vel quod piſci, qui musculus vocatur, ſimiles ſint. Latinis etiam La-
certus, quod ^c Lacerto ſimilis videatur, dicitur: at cum varia ſit musculorum forma,
tam quo ad ventrem, quam tendinem, idcirco certa figura eis tribui non poteſt. Ve-
rum musculus conſiderari poteſt, vel ratione partium ex quibus conſtat, vel ratio-
ne ſui uſus. Ratione compositionis, Galeno ^d dicitur aliquando caro ex ſimplici car-
ne & villis contexta, aliquando nervoſum ^e corpus carne permixtum. Quare muscu-
lus pars eſt instrumentaria & diſſimilis, ex fibris ^f ſpermaticis, carne, ſeu fibris car-
noſis, venis, arteriis, nervis & g membrana propria conſtata. Instrumentariam par-
tem eſſe, ipſius actio oſtendit, & Galenus ^h inter primi generis instrumenta, cum ex
ſimilaribus componantur, retulit: quare & diſſimilis eſt.

Fibris conſtat ſpermaticis, quæ fundamenta ſunt omnium corporis partium, a Hipp. lib. de
uniusque ſunt ⁱ generis & plerumque rectæ: nam licet in musculis abdominis
fibræ obliquæ & tranſverſæ dicantur, tales quidem ſunt ſecundum earum progref-
ſum, a hilominus tamen rectæ ſunt: rariis duplices fibras habent, eaſque ſibi incum-
bentes mutuo: rariffime fibras longitudine inter ſe contrarias obtinent. Has fibras,
alii ligamentorum fibras (Gal. ligamenta ab oſſe pronata & in musculi caput ingreſ-
ſa) vocant: nam loco ligamenti, corpus nervoſum à capite musculi uſque ad ejus fi-
nem ^j diſſuſum, & à nulla parte pronatum, reperitur, ex quo velut in filamenta divi-
ſo fibræ producuntur, quæ carnem complectuntur.

Caro fibroſa his, non tam ad robur & ad molem circumfunditur, ut fibrarum
permiſſionem & ruptionem impediatur (quemadmodum fibræ ſpermaticæ ſeu li-
gamentales carnem, ne diſſolvatur, firmant & cuſtodiuunt, actionemque cum tendi-
nibus perfectiorem reddunt) ſuo inſarctu, ne contractus tendo à ſuo corpore ſece-
dat,

veluti rivus quidam ſunt, qui non eorum ſubſtantiam complent, ſed iis ſubminiſtrant ut in vita permanant. hæc fila-
menta in musculis cæteri præterire, Archan. g Gal. 1. uſ. part. 8. h Gal. de diſſ. morb. 4. vide & 1. elem. 9. 1.
meth. 6. & lib. de ſimilarib. part. 1. c. 25. i Gal. 6. uſ. part. 8. at 12. uſ. par. vix obliquæ fibra ſine rectarum additione
reperiuntur: & 1. ad ana. 3. quidam ſimplicem fibrarum naturam habent, nonnulli duplicem. † Galenus voluit li-
gamentum quod musculi caput ingreditur, proxime ab oſſe prodire, non autem à ligamenti circa articulum poſitis: at
nullum aut rariſſimum ligamentum extra articulationes extat: ergo nullum musculi caput ſubintrat: & illud quod ab
oſſe naſcitur ratione ſua originis in ſenſu iudicavit.

k Alexand.
l Carni muscu-
lorum nullum
adipem intexi
omnes hactenus
falso prodide-
runt, Vesal.
m Gal. 12. us.
part. 3.
n Gal. lib. artis
medica, caro fi-
broso propria
musculi substā-
tia. Arist. 3. hist.
an. caro praci-
pua pars cujus-
que instrumen-
ti Gal. 12. us.
part. 3. tendo
primum motus
instrumentum,
et musculus il-
lius gratia con-
structus: lib. de
plenit. nervus
princeps muscu-
li pars: quare
8. ad an. muscu-
lis commune, ut
si nervi ladan-
tur, totius sta-
tim musculi mo-
tus pereat, Ve-
sali, caro mus-
culorum praci-
pua auctor,
cujus beneficio
musculi crassior
redditus, sese
breviat et col-
ligit, et partem
moveret, et laxa-
tus remittit.
†† Aquapend.
in musculi pars;

dat, prohibeat, & ne vasa & fibræ spermaticæ ligamentave, à ^k perpetuo motu exsic-
centur, in ^l obesis etiam intercedente pinguedine, impediatur: visceribus ^m & parti-
bus internis propugnaculo sit, quam ut caro hæc non simpliciter caro, sed caro fi-
broso primaria ⁿ musculi pars sit (quemadmodum in visceribus caro præcipua eo-
rum pars statuitur) & actionis motionisve (facultate simul per nervos influente)
causa princeps: ita ut caro non actionem edere, sed tantum usum præstare possit,
sicque †† corpus nervosum actionem perfectiorem & nobiliorem reddet: cum in
reliquo corpore talem non reperias cum sola facultatis motricis influxum recipere
possit; sola etiam sese colligat, & remittat partem, quam trahit: nulla enim pars se-
ipsam movere potest, nisi fibrosa sit & carnea, qualis est musculi caro. Quare visce-
ra licet carnosa sint, cum tamen eorum caro non sit fibrosa, seipsa non movent: sic
etiam membranæ, & membrana carnea ubi nervosa est, seipsas non movent,
quia fibræ illarum non sunt carnosæ, quales sunt musculorum fibræ. Quare bene-
ficio ne fibrarum attractio, et entio & expulsio fiat, dubitatur: exempli gratia, venæ
attrahunt, retinent & expellunt quidem, verum hoc per fibras non faciunt, cum se
non moveant, sed id quiescentes faciunt similitudinis vel dissimilitudinis ratione, ve-
luti magnes facit, ut eleganter Fallopius.

Est enim caro ^o quadruplex: prima est caro propria dicta, p musculi interior pars
mollis & rubicunda, ex sanguine mediocriter resiccato genita, quam Galenus ^q sæpe
carnem fibrosam, propriamque musculi substantiam vocat: quare etiam apud Hip-
pocratem ^r aliquando caro, idem est quod musculus, cum ejus præcipua pars sit:
quare & natura & situ ab aliis distinguitur: caro enim in musculis secundum fibra-
rum nervosarum ductum porrigitur, at in parenchymatibus, nullo ordine disposita
est. Dein, caro est viscerum, quam similem & simplicem dixit Galenus: ^r Erasifi-
stratus ^{πνεύμων}, affusionem sanguinis vocavit: quæ propria est viscerum substan-
tia & insensibilis est: quæ in sitam tantum, non influentem facultatem habere Ga-
lenus auctor est: hæc viscerum vasa firmat, cum instar stæbes sive tomenti vasis in-
terponatur, sparia inania opplet & actionem ^t edit. Tum, caro ^u est cuilibet parti
peculiaris, quam carnosam substantiam Galenus ^x appellare solet. Piccol homi-
neus ^y novam partem similem facit; qualis est in oesophago, ventriculo, intestinis,
utero, vesicis conspicua, quæ membranarum calorem fovet & auget. qua de re vi-
de librum nostrum de partibus similibus. Quarto est caro glandularum, hæc va-
sorum divisionibus firmandis, quare mollis, apponitur, ut circa venam portæ, pan-
creas circa venas meseraicas, mesenterii glandulæ: circa divisionem cavæ in jugulo,
thymus: sic in cervice ubi jugulares, in axillis ubi axillares, in inguinibus ubi crura-
les in varios ramos dividuntur. Humores ^z superfluos, unde spongiosæ & raræ, ad se
allici-

præcipua est corpus tendinosum, quia pars similis est, et quia illi in universo corpore similis nulla reperitur: dein
quia pars est robustissima ut ossa movere et attollere possit, et quia ad se contrahendum apta est. o Gal. plures facit
carnis species, 1. nat. facult. 6. 7. ad an. et com. 6. in 6. Epidem. p Gal. 10. meth. 5. loc. affect. art. med. 59. et proam. lib. de
oss. q in arte med. r Lib. de arte quæcunque partes carnem in orbem circumscriptam habent, quam musculum vocant,
hæc omnes ventrem habent. 4. Aph. 16. et 2. de fractur. Vesal. nulla in universo corpore similis, p. 264. at Laurentio p.
122. hujus generis gingivarum caro et quæ penes glandem constituit. l Gal. 6. ad an. 11. t Arist. 3. hist. an. u Gal.
1. nat. facult. 6. x 10. meth. ult. in solidis partibus substantia triplex, inwōns, ipwōns et opwōns, qua villos facit.
y Vide c. 21. de par. similiari. z consule libellum Hipp. de glandulis.

alliciunt, ne in nobiliores partes ruant: quare & trium partium principum super-
 canea excipiunt, unde vulgo emunctoria dicuntur; hæ enim intumescences ^{aa} visce-
 ris pravam dispositionem indicant. Quasdam quoque partes suo humore rigant, ne
 exiccatae ad motum ineptæ reddantur, ut sunt, quæ ad Laryngem & linguam, sali-
 vam generant: sic quæ in oculorum angulis, eorum motum juvant. Hæc breviter de
 carnis generibus, redeamus ad musculum.

Venas, omnes musculi habent, tanquam canales, ut alimentum advehant. Arte-
 rias quoque, ut calorem eorum insitum perpetuo suo motu custodiant, vitalique ca-
 lore illustrent. Nervos, qui sensum deferant, cum nulla caro ^{bb} ex seipsa sensum ha-
 beat, & nullus musculus moveatur, qui idem non sentiat; præsertim vero virtutem
 motivam, cum musculus ^{cc} à cerebro per nervos motus accedat, & sine his motio
 fieri non possit: siquidem his secis, obstructis, aliterve læsis, motus pereat: Quare
 omnis ^{dd} musculus suum habet nervum, aliqui duos, ut diaphragma: aliqui plures, ut
 temporalis, qui quinque nervorum propagines recipit: hicque aliis in caput, aliis cir-
 ca medium, infra vero nullum unquam interi Galenus affirmat, & recte: nam si ner-
 vi in musculum non solum insertionem, sed etiam distributionem studiose intuearis,
 eum in minimos ramulos dispergi, in plexum quendam membranofum veluti uniri,
 & antequam in Tendinem vulgo dictum veniant, in fibellas minutissimas desinere,
 observabis: & rursus in aliis per musculi superficiem, in aliis per musculi substantiam
 disseminatur & cum musculi substantiam ingreditur in plures ramusculos divisus,
 instar arbusculæ hinc inde nudus * inferitur. Et sic venæ & arteriæ instrumentum
 naturale, at nervi instrumentum animale efficiunt.

Membrana (quam omnes musculi propriam & peculiarem habent) à ligamento
^{ee} pronata circumjicitur, ut musculum regendo contineat, alterum ab altero distin-
 guat, & à vicinis partibus separet, sensumque ^{ee} tactus præbeat: verum & quasdam ^{cc}
 propagines intro in ipsam musculorum carnem mittit, ut carnis ejus firmiori colli-
 gationi inserviat.

Ratione vero usus; Musculus pars est ^{ff} corporis organica, motus voluntarii in-
 strumentum: vel est instrumentum ejus motus qui secundum impetum fit: hoc est,
 ab interno principio, appetente scilicet facultate. Galenus aliquando voluntarium,
 sæpe animale vocat, ut à naturali distinguat: siquidem voluntarium hunc motum
 excitare possumus, frequentiore & tardiore facere, vel penitus sedare. Cujus
 motus instrumenta sunt cerebrum, nervi & musculus: Cerebrum imperat, ubi an fu-
 giendum, an persequendum dijudicaverit: nervus imperium & facultatem moven-
 di deferit: musculus: spiritibus animalibus illustratus obtemperat, & partem pro vo-
 luntatis imperio movet: & quemadmodum eques ^{hh} habenarum motu equum im-

D

pellit,

Piccolhom. vult primam definitionem tantum humanis musculus: alteram, & humanis & brutorum competere, volun-
 tatem duplicem esse, aliam ^{aa} αὐτογενή, aliam ^{bb} ὀρεγμένη: prior vigilantium, posterior dormientium est, aut quid
 minus attente facientium, Arist. vocat ἰσχυρὸν, spontaneum. Motus spontaneus in brutis est, non a voluntariis: in
 homine vero motus est & spontaneus & voluntarius. Per spontaneum, intelligendum est principium intrinsecum com-
 movendarum partium: hoc a principium intrinsecum duplex est: cognitio & appetitio, qua duo in brutis sunt cognitio
 sensitiva & appetitio sensitiva: præter hæc in homine est & cognitio intellectiva, & appetitio intellect. qua dicitur vo-
 luntas. hh Gal. de caus. resp.

aa Hipp. 6. Epi.

sec. 2. Gal. 13.

merb.

bb Gal. 1. us.

part. 8.

cc Gal. 1. motu

musc. 1.

dd Vesal. pag.

262. dicit ali-

quos musculos

nervo, vena, &

arteria cavere:

quem recte re-

prehendunt Co-

lumb. & Fal-

lopius.

* Gal. 1. fract.

nervus nudus,

nec carne cin-

ctus in suas fi-

bras divisus

progreditur.

cc Sic etiam

Archang. &

Laur. membra-

nam hanc ra-

tione sui origi-

nis insensilem

esse Galenus

scribit, quod

falsum est,

Riol.

ff Gal. 10. us.

part. 9. ἡγε-

αὐτογενή καὶ ὀ-

ρεγμένη ὁρᾶται πα-

ρα εἰς τὴν φύ-

σιν τῆς ψυχῆς.

gg Gal. 1. motu

musc. 1. ὁρᾶται

κινῆσθαι τῆς

ἡγετ' ὀρεγν' οἱ

μῦες εἰς τὴν: Sic

& 1. us. par. 10.

pellit, ita vis animæ cerebro insita, nervis quasi habenis musculos movet. Voluntas^{hh} enim similis est equiti, nervi habenis, & equus musculis & ut numero dicamus, Musculus officio vectis ejusdam fungitur: ut enim pondera, quæ manibus tollere non possumus, vectibus adhibitis attollimus: ita cum nervi ad motum inepti essent, carnem in auxilium acquisiverunt: ipse vero Tendo è nervosa musculi parte productus, vectis partem extremam, quæ ponderibus admoveretur, refert. Quare ut res[†] Galenus, † in corpore nullum membrum mobile reperitur, cui non musculus aliquis præfectus sit. Musculus, eo quo diximus modo ex similibus compositus, in tres dissimiles partes dividi solet, in principium, medium & finem.

ii Gal. 1. mor.

mus. 2.

kk Columb. di-

cit. quibusdam

musculus, tendi-

nem in exortu

cum carne mis-

ceri.

ll Piccolhom.

principium ner-

vosum, tendi-

nosum, mem-

branofum, non

raro carnosum.

mm Gal. 1. mor.

mus. 1. & 3. 1.

us part. 16. 5. e-

jusd. 14. 5. ad

an. 7. 6. meth.

4. diffec. mus.

26.

nn Gal. 1. plac.

9. 6. meth. 4. 1.

us par. 17. 11.

ejusd. 3. 1. mor.

mus. 1. hoc Ve-

sal. negat. pag.

263. Colum. dif-

ferentiam inter

nervum & ten-

dinem ostendit.

sed utrum ad

tendinē compo-

sitionem nervus concurrat, nec ait, nec negat. Fallop. in tendine nervi sunt commixti cum ligamento: idem & Piccol-

hom. oo 1. mor. mus. 1. & alibi, at 3. fac. alim. 4. secundum textum Latinum, non vero Græcum, sunt quidam ten-

dines sine sensu. pp Gal. in arte med. Oribas. Aug. 1. 9. c. 2. de sangu. missione. Fallop. puncto tendine fieri convul-

sionem tradit, lib. de partibus similar. c. 10. qq Gal. 1. mor. mus. 1. hoc de tendine dixit, non vero de toto musculo ut

Vesal. Galenum reprehendendo censuit. 2. reprehendit Vesal. Galenum quasi voluerit tendinem ex media portione ner-

vi & media ligamenti fieri: cum Gal. plus dicat de ligamento quam nervo concurrere. rr Aquap. nervorum liga-

mento misceri negat: quia nervus qui musculo inseritur adeo exiguum est, ut ad tendinē generandum robustus perveni-

re non possit, maxime cum in fibras insensiles consumatur: sic nervus mollis cum ligamento duro coire non potest, & se-

coiret movendi facultatem amitteret. Item musculi & finis & principium nervorum ejusdem natura sunt: atque

Principium est, quod caputⁱⁱ musculi dicitur, & ex ligamentis, quæ ab osse oriri creduntur, generatur: siquidem musculi plerique ab ossibus nascuntur, ^{kk} & in ossa implantantur, iisque contractis vel remissis, ossa in articulis flexuntur vel extenduntur: nonnulli tamen à cartilaginibus, alii à membranis oriuntur, & in eas desinunt. Quod in aliis sed rarius, carnosum, ^{ll} in aliis, & sæpius nervosum, in aliis membranofum quibusdam tendinosum: quare principium atque finem, a que tendinem vocari posse statuunt, cum ut plurimum principium & finis in substantia, tenuitate, lucedine & albedine conveniant: in aliis oblongum, vel brevius, crassius vel tenuius est: nec penitus sensu caret, cum in id sæpe nervus inferatur (& ibi principium musculi esse volunt) & membrana vestiatur: quare insensibile non est: siquidem principio puncto a que sæva symptomata ac sine læso gignantur: hoc etiam sine mollius est, cum sæpe finis in osseam & cartilagineam naturam abeat, ut in pedibus pennatorum observare licet. Medium ^{mm} quod ventrem seu corpus nominant, tota fere carnosum, & tumens pars est, & majorem musculi molem constituit. Finis, qui cauda & ⁿⁿ tendineus, quasi enervatio, quod tota fere sit nervea ^{mm} alba, dura, densa & pellucida: communiter vero ^{pp} tendo, à tendendo, & chorda dicitur. Hunc ex nervoso corpore compositum asserimus quæ Galenum ⁿⁿ imitati, musculi finē diximus, qui quæ ipso auctore ex tenuissimis tum nervorum (quare ^{oo} eo læso, vel in venæ sectione ^{pp} puncto, convulsiones sævaque symptomata, aliquando membri privatio, cōsequuntur) tum ligamentorum fibris confusis componitur: ita tamen, ut multo plures sint ligamentorum quam nervorum fibræ: ligamentum enim solum, quia immobile & insensibile, motum voluntarium edere non potuit: nec nervus solus ob molliem & tenuitatem membra trahere potuit: quare ex ambobus ^{qq} mixtis cōstitui debuit, quod ligamento esset mollius, nervo durius, & robustius, mediamque naturam retineret. Verum cum tendo non ad motum simpliciter, sed ad validiores ^{rr} res ^{rr} motus edendos, & graviora membra movenda, & ad robur musculi (ne diff-

rumpat-

nervus

nervus non in caput nervosum, sed in carnem vel ventrem musculi inseritur: ergo neque tendo nervum obtinebit. Cum ergo musculus ligamentum non recipiat, neque nervus ad tendonem constituendum concurrat, tendo non resultabit ex ligamento & nervo simul mixtis: neque tendo semper in extremo musculi consistet, sed in medio vel principio, aut per totum corpus. Sic nusquam apud Gal. legitur, nervum & ligamentum in principio musculi coire ad caput constituendum: at qui caput & finis ejusdem naturae sunt: quare totus musculus est Tendo, vel ex eo cum carne factus & concorporatus. Gal. 1. us. par. 2. opinionem Epicuri & Aesclepiadis impugnat qui negabant tendinis magnitudinem quicquam ad validas actiones conferre, sed robur & fortitudinem tendinis pendere ab exercitatione & laboris consuetudine: ut qui laboribus validis assuescerent, validos tendones consequerentur: qui vero otiosam vitam agerent, tendones graciliores & imbecilliores obtinerent.

sumptur) sit comparatus, ideo non omnes musculi in tendines desinunt. Musculi enim alii seipso tantum movent ad principium suum contracti, alii alia corpora: qui seipso tantum movent, ut sunt musculi ani & vesicae: quidam & cutim simul attrahunt, ut sunt qui in labiis, fronte & facie sunt, ab his nullus tendo nascitur. Qui aliud quippiam movent, aut os movent, aut aliud quippiam: qui os movent, plerique in tendines, vel majores, vel minores, terminantur, qui in partem movent, modo tereti, modo lato, modo longo, modo brevi, modo uno, vel duobus vel plurimis, ut in longissimo dorsi musculo & thoracis quinto (sic nonnulli perforati sunt) inseruntur: at non in ossum articulum, nec in ossum fines, unde oriuntur, sed ut plurimum in caput ossis movendi illud involvendo infiguntur. Qui vero aliud quam os movent, horum quibusdam sunt tendines, quibusdam vero non: aliud autem quam os movent, musculi oculorum, linguae, laryngis, testium & penis: ex quibus oculorum musculi membranas habent aponeuroses: penis autem & testium, carnis ipsorum particulis innascuntur: qui vero in faucibus, ut sunt linguae & laryngis, quidam tendines habent, quidam vero non. Sic quibusdam in medio tendo est, ut in quinto maxillam inferiorem aperiens, & quarto pari ossis hyoidis: paucis statim ab exortu cum carne quasi mistus descendit. Et licet aliud esse caput, aliud finem musculi dixerimus, non tamen inficiamur recte ab Aquapendente dictum fuisse, caput & finem musculi ejusdem naturae, scilicet nervosae esse: primo, quia eadem est proprietas tendinis & nervosi corporis, sive ligamenti quod capiti inseritur, cum eadem sit albedo cum luciditate, eadem durities, densitas & labor, ut clare in cubiti musculo bicipite dicto, & in tibiae musculis, seminervoso & semimembranoso apparet. Dein, quia continuum est corpus nervosum per totum musculus à principio usque ad musculi finem, ut in musculis crurum galli gallinacei observatur. Tum, quia nullum ligamentum ex se sensum suscipit, sed ligamenta in musculos porrecta sensum habent, quia moventur, motus autem sensum supponit. Hac ratione musculi considerati, in partes binas dividi poterit, in partem carnosam & tendinosam: & haec vel unita vel divisa erit: unita ubi tota pars à principio usque ad finem alba duraque apparet. Divisa vero, in multas minutas fibras, quibus caro circumfusa est, quae fibrae inter carnosas in porci musculo cocto observari possunt: sic in musculis crurum galli Indici, tendo à principio ad finem productus perspicue conspicitur: non tamen negandum, fibras hasce nervosas tendinem constituentes, aliquando in fine unitas, ac in principio separatas esse: ut in musculo deltoide: nonnunquam corpus hoc nervosum quod tendinem recentiores vocant, statim ab exortu cum carne mistum descendit. Et sic ejus naturam cum Aquapendente exprimere lubet, quod

D 2

Tendo

Gal. 1. mot. musc. 3. at 11. us. par. 5. omnes dicit in tendinem desinere: quare Vesal. eum reprehendit: verum Gal. de his loquitur, qui ossa movent. Gal. 1. mot. musc. 1. u. Omnes dixit Galenus Vesal. innumeri musc. tendine carent, illi tantum habent, qui longo ductu feruntur. Col. lum. non omnes musc. in tendines desinunt. Idem Fallop. & Laur. ad de musc. ossa moventibus, sic Fallop. non sunt 3. aut 4. qui ossa movent, qui non habeant chordas inter mille musc. quare prima sententia non tollenda. xx lib. de musculi artificio, & ex eo Rioli.

Tendo corpus sit omnino simile, simplex, sui que generis, ex semine, tanquam generationis principio, ut ceteræ partes spermaticæ productum, quod à principio ad finem musculi per ejus longitudinem cōtinuum progreditur, cujus dispensationis principium os est, cum ab osse oriatur & in os inferatur, licet nonnulli à cartilaginibus, quidam à tendinibus ortum habeant. Et quod tali proprietate præditum est, qualis in alia corporis particula non reperitur: utpote nerveum corpus peculiari substantia præditum, albedinem privatam habens luciditati & splendori permixtam: duritiem item, lavorem, densitatem, à ceteris omnino dissimilem. Hac ratione, musculus primum & immediatum motus voluntarii, spontaneive est instrumentum, facultate motrice à cerebro ^{yy} per nervos influente.

*yy vim moti-
viam musculus
consequitur per
influxum &
irradiationem,
ut torpido ma-
num piscatoris
stupefacit, fa-
cultate per rete
& tridentem
piscatoris trans-
missa, ut ma-
gnes ferrum tra-
hit: ut Sol mo-
mento totum
hemispharium
collustrat, Riol.
zz Gal. 10. us.
part. 9. & II.
ejusd. 4.
a Gal. 1. motu-
mus. 5. II. us.
part. 8.
β Gal. 6. us.
part. 8. & II.
ejusd. 9. 12. &
jusd. 8.*

Variant quoque musculi ratione substantiæ, quantitatis, qualitatis, situs, figuræ, ortus, implantationis varietatis partium, coloris & usus: Substantiæ, quod alii sint omnino carnosii, alii membranosi, alii seminervioli: quantitatis, quæ pro ratione dimensionum triplex est, longa, lata & profunda. situs, alii interni, obliqui, recti, transversii: figuræ, à qua denominantur ut deltois, cucullaris, &c. ortus, sic alii ab ossibus, alii à cartilaginibus, alii à tendonibus ut lumbricales in manu, enasci dicuntur: alii circa partem movendam orbiculatim revoluti sunt, ut Sphincteres vesicæ & podicis: implantationis & varietatis partium, quod alii sint bicipites, tricipites, alii bifidi inferantur: coloris, rubentes, candicantes, lividi, propter membranæ crassitiem. Horum autem adeo magna est multitudo, ut eos, ne numerare quidem facile sit: partim, quia natura ita inter sese coalescunt, ut unus videatur: partim quia alii ex uno plures, vel ex pluribus unum faciunt: attamen, quot sunt motus voluntarii in corpore humano, loco & tempore distincti, totidem ad minus sunt musculi suis terminis definiti.

Musculorum autem omnium actio est motio, quæ duplex est: primaria ipsius versus ^{zz} suum principium contractio, versus quod simul membrum, in quod insertus est, trahatur, quam oppositi ^a musculi relaxatio sequitur. Secundaria est illius relaxatio, quam oppositi musculi contractio comitatur: quod in musculis manus & pedis maxime conspicitur: singuli namque musculi ^β singulos habent & simplices motus. Nam à musculi actione ejusque varietate, variæ differentiæ exurgunt: attamen alii sunt qui seipso duntaxat dum contrahuntur movent, vel partem ad suum principium vehunt: alii sunt congeneres, vel oppositi: aliorum actio unica est, vel multiplex: alii peculiare motus præstant, ut extendendo, flectendo, in gyrum movendo. Sed de his omnibus acturi sumus in Libro tertio universalis nostræ

Anatomes, in quo partes similes sanguineas, hoc est, carnem ejusque genera, & mixtas sive cutim explicabimus.

De Musculis decem abdominis.

CAPUT VIII.

Musculorum Epigastrii histo- iam Galenus qui utrinque quatuor constituit, lib. de dissect. muscul. proposuit; & cur octo deberint esse, nec plures, nec pauciores, ex fibrarum positione ostendit, 5. de usu part. 14. & 15. At 5. administ. anat. 6. & 7. administrationem duplicem docet: quare ibidem & lib. de dissect. muscul. 26. eorundem verum situm exponit, quem admodum & 6. meth. meden. 4. At 5. loc. aff. 6. modum explorandi abdominis tumorem aperiri, quare recti primo loco posuit, tanquam eos, qui in medio sint abdominis, ut 6. meth. 4. loquitur.

Inferiorem ventrem obtegent musculi decem, utrinque ^a quinque, abdominis musculi dicti, qui hoc ordine ^b siti sunt, ut primi occurrant oblique descendentes duo, & totidem ascendentes, qui obliqui externi & interni forte rectius nominarentur: dein pyramidales duo, recti duo, & ultimo transversi duo; sic à fibrarum ductu denominati, quibus se mutuo, tum recti, tum oblique intercussatim secant.

Oblique ^c descendentes, seu obliqui externi [t. 6. AB.] à fibrarum obliquo, à parte superiore ad inferiora progressu [t. 6. II.] sic dicti, in lateribus siti sunt, luvique lateris totum abdomen obvelant: figura sunt triquetra, & inter abdominis musculos maximi ^d & latissimi: hi variis principiis veluti fibris ex parte inferna ^e costæ sextæ, septimæ, octavæ & nonæ, antequam in cartilagine desinant, carnosus & à membrana è ligamentis vertebrarum lumborum enati & dimidia ossis ilii appendice membranoso principio, ortum ducunt: & hujus principia fibrosa quæ postea in unum coeunt serrato ^f majori [t. 6. ee. t. 7. p. t. 8. 000.] seu 8 digitis [t. 6. bb.] quibusdam, quem admodum & Serrato ^h politico inferiori ad tres infimas costas, interseruntur: nonnunquam nervosa exilitate Pectorali ⁱ junguntur & partim lato [t. 6. cc.] nervoso ^k membraneoque tendine ad anteriora feruntur & in abdominis medio ad li-

D 3

neam

que quinque esse asserit: Subscribunt Plat. Piccolhom. & Laur. b Situs ratio à fasciis desumitur: quod transversa & profundiores fascia magis premunt, minus recta, in nimum obliqua. c Transversales superiores, Mundino: transversis, Zerbo. d Gal. dis. muscul. 26. & 5. ad an. 6. e Vesal. Fallop. Piccolhom. &c. ex 6. 7. 8. 9. costa & tribus inferioribus costis carni si & membranosi à vertebrarum lumborum transversis processibus. Laur. sequutus Aquapen. ab ossis ilii summitate carnosus & pubis osse nervosus: quia musculus ab aliquo immobili oriri debeat, & os pubis respectu costarum immobile est: dein quia musculus ad suum principium trahit, & obliquos descendentes respirationi inservire, quare costas pubem versus trahere. Rioli si quem opinionum novitas delebat, nova hæc sit de musculi his opinio: scilicet epigastrii musculos, præter rectos, à transversis lumborum apophyibus nasci, & in lineam albam inseri, ossibus pubis & ilium atque costis inferioribus firmari: quia nervos à lumbis recipiunt. & quia insertio semper origini opponitur: sed potius veteri doctrine standum. Nam insertio musculi, sua origini opponitur, at oppositio illa ex rectitudine fibrarum sumitur: dein nervus semper in caput aut prope ventrem musculi inseritur, obliquus autem ab intercostalibus recipiunt: tum quia omnis musculus in exitu suo carnosior est, quam in fine: præterea musculi qui in ossa inseruntur in tendines desinunt, &c. f secundus thoracis musculus, Ves. Col. Fal. g Gal. 5. ad an. 6. h quintus thoracis musculus, Ves. Fal. quartus, Col. i brachii i. Ves. Col. Fal. k in membranis nervosas degenerant, Gal. 5. loc. aff. 6. membraneum & validum tendinem, 5. ad an. 6. membranosos, tendines dicitur &c. dis. muscul. 26.

a Anatomici plerique utrinque quatuor statuerunt, Galenum secuti, qui 5. ad. an. 7. ait: πρῶτον τῶν μεσίων καὶ λοξῶν μὲν τῶν ὑπεραντίων, πέντε λοξῶν τετάρτῳ τῶν ὑπεραντίων, καὶ πέντε τῶν ὑπεραντίων. Vesal. octonario comprehendit, & Columb. octo tantum esse contendit, addens, vanum esse dicere decem esse. Fallop. utrin-

1 Gal. diff. musc. 26. m sic Vesal. & Fall. at Colum. & Laur. reprehendunt, quod hic os non moratur, sicque munere suo fungi non posse, etc.
 n Gal. diff. musc. 26. o 6. ad. an. ult. p linea quadam dividens & albicans diff. musc. 20. & 5. ad an. 7. q Gal. 5. ad an. 7.
 neam [t. 6. ddd.] candidam ita coeunt, ut simul velut ¹ tunicam universi abdomini obductam efforment, qui inferioribus quoque tenacis glutinis interventu committuntur: insuper carnosus ossis Ilii [t. 6. f.] summitati, & pubis ^m regionis [t. 6. g.] nervosus, ubi perforatus sunt implantantur. At Laurentii sententia est, ab osse ilium quo firmiores sint & osse pubis oriri, & octo costis inferioribus inferi, eo quod hi inspiratori thoracisque dilatationi inserviant: quam sententiam, fateor, in Theatri nostri editione prima adprobavimus: at cum postmodum diligentius Nervorum in hos musculos implantationem investigarem, animadvertimus, singulis fibris ex costarum nominatarum interstitiis, singulos nervos porrigi, & axioma sit Anatomice, nervum nunquam in finem musculi implantari, & fibrarum ductu ad lineam albam diligentius observato, eorumque actione considerata, nunc sententia mutata, Galeno assentimur. Nam licet abdominis musculi respirationi aliquo modo inserviant, eam tamen solum per accidens ^o adjuvant, thoracem contrahendo: nam cum ipsorum tendo ad lineam albam producat, abdomini movendo, quando in fecum excretionem & enixu, cohibito spiritu, dilatur & constringitur, destinati sunt: non vero thoraci, qui tunc immotus & dictorum musculorum actiones firmare videtur.

Linea p hæc candida [tab. 6. ddd. ta. 7. ee. tab. 8. ee.] in abdominis est medio, ex concursu tendinum musculorum abdominis (rectorum exceptis quorum tamen intervallum est) genita; cum obliquorum tendines ita arte uniantur, ut unus tendo videatur, & obliquorum inferiorum tendines transversorum tendinibus ubi recti à se invicem secedunt, adnascantur, in quam & Pyramidales implantantur, hæc, à mucronata cartilagine nervosa ad ossium pubis commissuram procedens, supra umbilicum latior, infra varo angustior est; estque alba, & cum nulla caro illi subiaceat, ejus ^r usus, musculos omnes tanquam communi termino continere, quo dextri in dextris & sinistri in sinistris remaneant; cui nonnunquam pinguedo adjacet. In gravidis quando venter valde distenditur, ex rectorum divulsione à cartilagine ensiformi ad ossium pubis conjunctionem, linea quadam sublivida per aliquot septimanas à partu remanet, quæ musculis rectis rursus inter se junctis sensim obliteratur.

1 Subcontrarii obliqui Gal. 5. ad an. 7. transversales inferiores, Mundino. t Gal. 5. us. part. 14. u dissect. musc. 26. x Gal. 5. ad an. 7. Col. inferioribus costis Piccolom. 12. & 11. costa carnosae copulantur & lato tendine 10. 9. 8. costa in parte cartilaginosa necluntur. y meminit Gal. diff. musc. 26. & 5. ad an. 7.
 Oblique ^r ascendentes [t. 6. D. t. 7. i. ab abdomine reflexus] seu obliqui interni, qui illos decussatim in speciem x ^t literæ [t. 6. IH.] suis fibris obliquis ascendentes interfecant, mediam abdominis partem occupant, & figura sunt triquetra, ab ossis illius appendice ⁿ carnosus, & à membrana prædicta, & ossis sacri spinis membranosis orti, carnosus fibræ adacti, ilia regentes, sursum tendunt, & quatuor ^x inferiorum costarum cartilaginibus carnosae necluntur, qui ad abdominis priora delati, in latum, nervosum membranosumque tendinem, desinunt: qui inter rectum masculum, qui ipsi subjicitur, & musculi oblique descendentes tendinem, medius intercedit, ita ut supra umbilicum quasi duplici tendine rectum completatur: infra vero umbilicum, simplicem tendinem sub recto transmittat, qui tamen cum tendine obliqui descendens iuxta recti marginem, adeo contumaciter hæret, ut absque dilaceratione separari nequeat: quam ob causam Galenus ^y & cum eo plerique hujus musculi tendinem in duos scindi voluerunt, quorum ^y alter supra rectum fertur, alter infra eum incedit.

incedit (cujus nomine Galen. ^z rectos musculos nullo externo musculo tegi, car-
nem intelligens, scriptum reliquit) ut hoc complexu recti propter eorum longitu-
dinem robustiores & tutiores a fractione reddantur, & ut in medio trium musculo-
rum constituantur; ubi non, ut prius musculus membranæ modo obducunt, sed
ita rectorum intersectionibus adhærescunt, ut ab ipsis tendo, difficillime avelli queat,
quos prætergressi, iterum coeunt, arte uniuntur, & uniti, ad lineam albam [t. 7. ee.]
quasi alteram membranam constituentes abeunt, & superne mucronatæ, cartila-
gini, inferne paulo ^{aa} infra umbilicum concurrunt, superior vero tendo ossibus [g.]
pubis inseritur. Hi quatuor venas & arterias habent à vena & arteria muscula, juxta
lumbos enata, quæ per abdominis & peritonæi regionem disseminantur. Nervos ab
extremis thoracis vertebra ab intercostalibus obliqui descendentes, at ascendentes à
lumbis recipiunt, qui juxta fibrarum ductus inferuntur. Ab hoc lumbari nervo, ra-
mulus productionem peritonæi ingressus, ad testiculum defertur. Verum inter ob-
liquum ascendentem & transversum versus lumbos, venæ multæ à lumbaribus &
hypogastricis enatæ occurrunt, quemadmodum & Nervi duo insignes, à duabus
dorsi vertebra prodeuntes, qui oblique supra costas spurias delati, juxta ultimam
costam in carnem obliqui & transversi distribuuntur. Usus proprius illorum qui-
dem simul agentium, & superiorem & ^{bb} lateralem; horum vero inferiorem & la-
teralem inferioris ventris partem, non totam, cum tendines paulo infra umbilicum
subsistant, sed ad pubem usque utrinque oblique comprimere, cum in cartilaginolas
& mobiles costarum partes inserantur.

Pyramidales ^{cc} à forma dicti, ab externo pubis ossis [r. 6. f. 1. 7. g.] principio carno-
so, non admodum lato, prodeuntes, Pyramidis instar juncti (rarius penitus uniti, ut
unum musculum constituent) capita rectorum, à quibus peculiari membrana &
dissimilibus fibris distinguuntur, obliquo fibrarum ductu conscendentes, in lineam
albam, nunquam in rectos, suo tendine, sed longitudine impares, vix quatuor digi-
tos transversos æquantes, acuti desinunt: & nonnunquam tendine gracili usque ad
umbilicum producantur. Quorum usus, vesicæ compressioni ^{dd} inservire; nam si
horum unus agat, lineam albam deorsum oblique, & si ambo simul agant, recta tra-
hendo pubis partem (hinc quibusdam ^{ee} *træsiis* dicti) & vesicam subiectam, dum
leviter mingimus, comprimunt; violentis enim expressionibus, una cum his cæteri-
bus abdominis musculi inserviunt, ipsum totum & una vesicam comprimentes; tum e-
nim manifeste abdomen ad inferiora contrahi sentimus; quare hi musculi oblique
ascendentibus in subsidium veniunt) forte & descendentes & transversis ean-
dem sunt.

^{cc} Massa pri-
mus meminit: Sylvio, succenturiati: Musculi vesicæ compressioni inservientes, Fallopio: musculi parvi obliqui, Pic-
cilhom. aliis Fallopij: Vesalius & Andernacus superius rectorum musculorum principium faciunt: Columbus car-
nosum rectorum principium vocat & negat musculos esse distinctos: contra Fallopius distinctos esse sex rationibus astruit
quas & Piscilhom. approbat. Primo, quia peculiaris membrana circumferuntur: Secundo, quia hujus fibra cum re-
ctis non commiscetur: Tercio quia fibras à rectis dissimiles obtinent. Quarto quia semper in mediam lineam albam de-
sinant Quinto ab effectu, siquidem vesicam dum leviter mingimus, leviter oblique ad pubem comprimant, cum obliqui
ascendentes, id præstare non possint. Sexto quod ipse & alii plures in seipsis hoc agnoscant. At Laurentius, accedunt ali-
quando in viris & mulieribus parvi duo triangulares, quos Succenturiatos vocant, quasi majoribus opem ferentes:
Sunt qui ipsosque, quia pube obtenduntur, appellare malunt. ^{dd} Gaude diff. musc. c. 6. us. par. rectorum parti inferio-
ri tribuit.

ee Fallopius as-
serit sibi nun-
quam datum
corpus in quo
desuerint. Et si
Columbus ex
eo probare velit
non esse muscu-
los, quod in ali-
quibus non repe-
riantur, qui sa-
ne hac actione
privati essent.
Resp. Fallopius
& Piccolhom.
si pratermissi
sint, non idcirco
non esse muscu-
los, quia palma-
ris aliquando
quoque deest:
quando tamen
adeest, pro mus-
culo habetur,
& suum mu-
nus obit. Co-
lumbus addit,
non inservire
erectioni penis,
quia illi non
adherent: quod
si iis penis sur-
sum trahendus,
& vulva sur-
sum traheretur
Fallopius scri-
bit, se hoc nun-
quam dixisse.

dem ob causam auxilio sunt, ita ut recte Succenturiatorum nomen ipsis tribuatur.)
Quando enim absunt ee pyramidales (quod rarum est) tunc oblique ascendentes
non primum ab appendice ossis ilii, sed inferius a ligamento valido, quod ab appen-
dice dicta ad ossa pubis percurrit, oriuntur: & tunc ii oblique deorsum comprimunt
ea, quæ sub pube sunt, ut vesicam urinariam: si vero adsint, tunc oblique ascendentes
altiore regionem habent. Verum & rectorum capitibus robur addere, in subjacē-
tium partium compressione: quemadmodum tertius pedis musculus, qui adeo par-
vus est, nihilominus primo, secundo & quarto, qui maximis sunt auxilio est, vel ne col-
lidantur, propugnaculi vel straguli loco esse videntur: rectorum enim principium al-
terum non est, ut quidam opinati sunt: si enim leviter mingamus, nec inspiratio nec
expiratio impeditur, quod fieret, si rectorum partes essent: siquidem rectis contra-
ctis, thorax etiam comprimitur: quare dum musculis contractis excernere vo-
lumus, inspirare non possumus, donec musculorum intensionem remitta-
mus.

ff Recti [t.6.EE.t.7.a.8.dependent & II.notatur,] qui a fibris rectis, & quod gg se-
cundum corporis rectitudinem sint locati, nomen habent, sub obliquo nervo-
sis tenuitatibus positi, & quibusdam locis connexi, eminentiorem partem occupant
(quare ipsorum tumores oblongi, ex positu facile agnoscuntur) ab anteriore hh &
superiore [t.6.bb.t.8.ch.1.2.] ossis pubis parte (non ab ossē pectoris, quia pubis i-
lium & coxendicis ossa non moventur) nervosi orti, mox carnosī redditi ventrem
conscendentes circa umbilicum ii quasi uniri [t.7.f.] videntur, cum in exortu sint
proximi: quanto vero altius ascendunt, tanto magis se junguntur, [t.7.ee.] latiores
que redduntur, & ad ossis pectoris latera kk ultimarum costarum verarum cartila-
ginibus, sine ll carnosio & amplo [t.7.cc.] adnascuntur: suntque carnosī & validi, ut
anteriora abdominis comprimant. In canibus vero & similibus, cum thorace sint lon-
giore, hisce tendo membraneus continuatur, qui secundum pectoris longitudinem
exporrigitur, & ad primæ & secundæ costæ intervallum carnosior redditus, in pri-
mam costam mm definit. Interfectiones tres, rarius quatuor nervosas & transver-
sas nn [t.6.ehar.1.2.3.tabul.7.ddd.] quasi internodia acceperunt (ita ut rectorum sin-
guli in plures musculos divisi videantur, cum fibræ non penitus rectæ sursum feran-
tur,

ff Longi seu recti, Carpo. gg Columbo & Piccolhom. hh Columbo, ut plurimum duo principia habent, nervosum al-
terum, alterum carnosum, quandoque unum solum carneum: intelligit Pyramidales. Vesalio duplex principium, unum
superius internum, alterum inferius & externum. ii Gal. s. ad an. 6. & 7. kk Gal. 5. us. part. 14. s. ad an. 6. 6. met.
4. s. loc. aff. 6. & de dissect. musc. 2. 6. hinc eos oriri voluit, & ad pubis ossa deferri: quem multi secuti sunt, ut Mundinus, de
Zerbis, Carpus, Curtius, Willichius &c. Riola a superiore parte enascuntur & quia origo imbecillior est, natura supe-
riorem partem geniculi roboravit, & eorum ortum interfectiones illa nervosa ab intercostalibus nervis contexta con-
vinciunt. At dices (addit) in partem immobilem inseritur: musculus rectus instar portitoris agit, qui dum cymbam ad
portum propellit, contum affigit ripe vel saxo, nō ut trahat ad se saxum, sed cymbam n ad ripam deducat: ita natura ossibus
immobilibus rectos affixit, ut abdomen comprimentes majori contentione agerent, alioqui relaxarentur, si ab ossibus pubis
exortis sterni implerentur: nam agentes thoracem deorsum traherent, sine ulla partium internarum compressione.
ll Hinc tendinum expertes dicunt Columbus & Piccolhom. mm Gal. de dissect. musc. 2. 6. rectorum vertex, tendo mem-
branosus, ad thoracis principium ascendens, quod dissectionis Professores latuit, quia pectoris musculi ipsi incumbunt.
nn A Galeno non puto notatas has circūscriptiones, impressiones, delineamenta, siue aponeuroses inscriptiones transversas,
licet in similibus reperiantur: Columbus tres, Vesalius aliquando quatuor observavit.

tur, sed ad has circumscriptiones obliquantur, non tamen distinctos musculos * agnosimus) quæ membranæ sunt solidæ & firmæ, quarum una sub umbilico, duæ vero, aliquando etiam tres supra consistunt, & tertia communiter directe umbilico opponitur: raro quarta in iis qui abdomine longiore sunt, invenitur: rarissime plane absunt: hæ partim ad eorum ^o robur, cum validis actionibus sint præfecti, potissimum in violenta expiratione: partim ut obliquati secundum orbicularem abdominis figuram, apposite peritonæum, obliquorum ascendunt tendinibus connexi (ne in profundum admodum contrahantur, & venter magis sphaericus relinquitur) simul premunt.

Venas habent, interne, versus eorum principia, quas recurrentes vocamus, & arterias ab Epigastrica [t. 8. II. fig. 2. b.] (à qua & rami ad uteri cervicem mittuntur) in plures furculos, pro eorum nutritione & vita divisas, quæ sub his musculis fursum delata cum Mammariis internis [t. 8. KK. fig. a.] quæ sub pectoris osse descendunt, circa [t. 8. figur. 2. cc.] umbilicum per Anastomoses ⁹⁹ seu extremis ¹¹ junguntur, quo sit uteri cum mammis, & abdominis cum naribus hinc in natum hæmorrhagia, cucurbitulas abdomini affigimus ratione unionis, quæ per externas fit, consensus; imo nonnunquam & altera vena à ramo Iliaco pronata, epigastricæ opposita est, quæ in collum uteri numerosa sobole distribuitur: unde fit ut (Sylvio monente) lac recta ab epigastrica in pudendam decurrat: hæcque anastomosis in puerperis & gravidis major & manifestior est. Augetur consensus hic uteri cum mammis, per venas inter-nas axillarem nimirum ramum, qui ad mammas abijt & hypogastricæ ramos, qui ad uterum distribuuntur. Probatum quod nutritibus lactantibus, si menses erumpant, lac deficit, mammae gracilesunt: si vero menses cohibeantur, mammae lacte turgent, per ea enim vasa sanguis & lac, ab uno termino ad alium confluunt. Verum etiam nutritioni gratia hæc vasa creata, siquidem etiam in viris reperiantur, ad musculorum abdominis & potissimum rectorum nutritionem, quæ tamen huiusque ad hypogastricas feruntur. Nervos habent aliquando quatuor, maxime circa medium ab extremis thoracis vertebrae ab intercostilibus prodeuntes, qui peritonæum perforantes, musculi intersectiones nervosas adeunt, easque ut quidam volunt, contextunt. Rectorum usus proprius inferioris ventris eminentiorem & mediam partem, non deorsum, sed recta ad spinam propellere & comprimere: & thoracis inferiora recta deorsum trahendo deprimere, & expirationi violentæ inservire.

^{uu} Transversi, qui situm infimi [t. 6. GG. t. 7. l. l. l. ac t. 8. M. portio ejus retrorsum flexa] quod positione transversi sint, à transversis ratione progressus (alias recti sunt) [t. 6. KK.] fibris, quas secundum corporis latitudinem habent: dicti, à ligamento ex osse sacro prodeunte & musculum sacrolumbum tegente & ab interioribus notha-

E

rum

est absurdum. ^{oo} Sicut filum quod plura habet internodia, non ita facile rumpitur, ut iis destitutum. ^{pp} Paulo supra umbilicum, hinc consensus uteri cum mamma Piccilhom. circa hypochondria in summa rectorum parte, qua consensus cervicis uteri cum mammis, Fallopius: in medio musculi, quod circa umbilicum est, saepe in recens dissectione cadaveribus vidi, ut nihil apertius putem, esse quidam dubitent, Laurent. ^{qq} Non omnes hanc unionem concedunt: & eorum qui concedunt, plerique volunt usum esse, ut per eas mammarum & uteri fiat consensus, quem Hippocrates, Galenus & Medici omnes celebrant. ^{rr} Gal. de diff. ven. 8. hæc anastomosis, à Vesalio & Laur. reijcitur. ^{uu} Latitudinales Mundino & de Zerbis: transversales, Columbo, Piccilhom. Gal. 5. loc. aff. 6. & de diff. musc. 26.

An Hipp. agnovit, dum lib. de inter. aff. prohibet ne hydropticam partem qua inter umbilicum & pubem est, ferro tangamus, propterea quod multis geniculis abundat.

Riol. in brutis musculus hic caret his intersectionibus.

Casseri, rectorum pro pluribus habet, quorum ut plurimum sint quatuor utrinque aliquando quinque utrinque, & tunc octodecim musculos facit. Riol. non probat, si enim unus esset contractus, in se non posset æqualiter omnes partes comprimere.

sectionum divisioni deberet, digestricus maxillæ musculus duplex esset, bronchius in plures divideretur, crocoides in medio nervosus duplex construeretur, quod

rum costarum finibus nervosi orti, carnosique redditi, ossibusque illi [t. 8. N. illi ossis sedes denudata, cui transversus & obliqui musculi committuntur] adnati; ubi jilia investiere, & ad exterius rectorum latus versus abdominis medium pervenere, tendine xx lato, nerveo, membranosoque obliquorum instar reliquum abdomen tegentes, supra ad cartilaginem ensiformem, ante ad lineam albam, infra ad pubem descendentes, peritonæo yy contumaciter suo tendini adhærentes, ut in homine ab eo integre vix separari possint, progrediuntur: in pube vero hæc aponeurosis peritonæum relinquit, ipsumque nudum apparet. Vasa habent ut & obliqui. Horum usus proprius mediam & lateralem infimi ventris partem, & potissimum colon intestinum, transversum comprimere.

xx Gal. 6. ad an. 5. diff. musc. 26. nentiquam enim membrana usi multi censuerunt, destituntur.

yy Oribasius de dissect. muscul. 48. scribit,

fuisse qui existimant corpus

ex his musculis

& peritonæo

compositum esse

Gal. diff. musc. 26. s. ad an. 6. & 6. met.

4. quod ex hac aponeurosi &

peritonæo conflatur, multi

Medici peritonæum opinati.

zz Columbus, Piccolhom.

Laurentius.

aaa Gal. 5. ad an. 6.

bbb Vesalius non novit, at

Columbus, Fallopius & Piccolhom.

ccc Gal. 5. us. par. 15.

ddd Gal. 5. us. par. 14. & 15.

eee Gal. 6. ad an. 14.

fff Gal. 5. us. par. 15. diff. musc. 26. super

fluorum musculi: alimenti instrumenta, qua

excremendis excremendis sunt

destinata s. us. par. 14. 6. ad an. 14.

ggg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

hgg Gal. 5. us. par. 15.

At tendines horum zz quemadmodum & obliquorum perforantur, ubi umbilicus prominet, ob vasa umbilicalia: dein utrinque zz oblique descendentes tendendo juxta ossis ilium spinam inferiorem perforatur, quemadmodum ascendentes & transversus, prope os pubis pertusus est (ita ut foramina utriusque musculi obliqui, non directe opponantur) ad vasorum seminalium præparantium ad testes descensum, indeque ejaculatoriorum ad prostates, quæ vesicæ cervici appositæ, ascensum; per quæ foramina [t. 8. *] peritonæi interiore tunica rupta, & productione dilatata, intestinum vel omentum illapsum aaa Herniam causat: in mulieribus bbb vero etiam perforantur, ad duorum processuum sive ligamentorum nervosorum ab utero procedentium, qui cremasteres dicuntur, transitum, qui in summam partem pudendi muliebris perveniunt & prope clitoridem desinunt; quare & mulieres bubonoccele laborant, & per sectionem sanantur. Quod vero transversus internum, recti medium, obliqui externum situm obtinuerint, ratio ex deligatura sumi potest, in qua fasciæ transversæ magis premunt rectis, hisque minus obliquæ.

Usus omnium musculorum abdominis (quorum substantia partim carnea, partim membranosa, ut ad motum firmiores sint) communis cum cæteris musculis est, ut dum quiescunt, partibus subjectis sint ccc propugnaculo; omnia in ventre contineant, & corpori calefaciendo opitulentur. Ubi vero una ddd collecti versus sua principia contrahuntur, & intro, cum subjecta mollia sint, curvantur, à Diaphragmate ex spiritus retentione depresso, adjuti inferiorem ventrem æquabiliter comprimunt: (seorsim enim agentes, modo hanc, modo illam partem premunt) qua compressione fæces, quæ in crassis intestinis violenter deturbatæ, musculo ani orbiculari eee qui sedem circulariter complectitur, relaxato, foramen recludunt & expellunt, idcirco excretionis instrumenta vocavit Galenus: fff at cum æqualis sit ab omni parte compressio, & que facile ad superiorem meatum ad stomachum, ac a- num propellerentur, nisi Diaphragma fff situ suo obliquo, spirituque retento ea deprimeret, & excretioni conferret. Et cum partes quæ comprimendæ sunt plures existant, pluribus musculis opus fuit, quo diversis locis secundum varios angulos, rectos transversos & obliquos subjecti comprimant, & earum partium expultricem facultatem adjuvent. Verum ut fœtus commode propellantur adjuvant: & hypochondria constringendo, costasque detrahendo, Thoracis motibus præ sunt: quatenus vocem ggg efformant, inspirationi & expirationi inserviunt & validam efflatio-

efflationem, & spiritus cohibitionem, quam Praxagoras (Gal. referente) *πνιγμα* appellavit, efficiunt.

Quare cum hi muscoli & Thoraci & inferiori ventri opitulentur, thoraci quidem, quatenus interdum ^{hhh} noctuque ad respirationem efficiendam inserviunt; at inferiori ventri, statis tantum temporibus, tum cum faeces deturbandæ sunt, eatenus thoraci potius inservire, & ad ejus motum primario constitutos esse existimari posset. At quatenus hi soli infimum ventrem comprimunt, thoracem vero alii quamplures distendunt & contrahunt, eatenus primarius ipsorum usus abdominis ⁱⁱⁱ compressio, cum ipsius ministerio addicti sint. Secundarius vero thoracis motus (& eatenus ad communes respirationis musculos referendi) statui potest. Quod si denique musculus quilibet solus agat, tum obliquus descendens, coxam in suum latus: dexter in dextrum, sinister in sinistram oblique trahit: obliquus ascendens pectus oblique ad coxas adducit: transversus vero abdomen, dexter quidem in dextram, sinister in sinistram partem trahit. Observatione quoque dignum est, horum musculorum figuram, ^{kkk} sive agant, sive quiescant, ab aliorum diversam esse, abdominis enim musculi priusquam agant, curvi sunt: & etiam in contractione, cum subiecta mollia sint, intro curvauntur: cæteri vero omnes dum quiescunt, recti sunt; dum agunt, & curvi redduntur, & propter ossa ad quæ impingunt, extra flectuntur.

compressa. Abdominis ministerio addicti sunt, licet thoraci quoque opem ferant, Colum. Fallop. respirationi inserviunt. Laurent. iii Cibi potius quam Spiritus instrumentis à natura conditi. Gal. 6. ad. an. 14. 5. us. part. 14. & 15. kkk Diversum illis qui sunt in abdomine ab iis, qui in artubus & facie: hi cum tenduntur & ad principium reducuntur, curvauntur: illi dum tenduntur, exporriguntur, curvauntur autem dum flectuntur Gal. 1. motus musc. 3.

De Peritonæo.

CAPUT IX.

Hujus historiam & usum Galenus 4. us. part. 9. & 10. administrationem vero 6. admin. anat. 4. & 5. exhibuit: huc quoque pertinet præcedens tabula octava.

A Blatis musculis eorumque tendinibus, membrana totam infimi ventris cavitatem succingens, occurrit, quam Peritonæum vocant, imitati Hippocratem ^a & Galenum, ^b quibus *περιτόναιον* dicitur; eo quod omnibus partibus, quæ inter diaphragma ^b & crura habentur *περιτεταμένον* ^c circumtendatur, vel quasi *περιτοῖον*, circumfirmo, cum omnia contenta viscera roboret. Arabibus, communi membranarum nomine Ziphach, ^d & nonnullis, abdominis membrana vel tunica nominatur.

Membrana hæc, quæ in imo ventre sita, ovalem ^e figuram [Tab. AABCD.] obtinet omnium membranarum ventres succingentium amplissima & maxima, sicuti

E 2

dem

τοῖον circumtendo, vel *ὅτι τὸ περιτεταμένον ὅτις τοῖς ἀγγείοις* quod alimenti vasis prætendatur, ^d Zimphac. & peculiariter Charmel. ^e Sphæra modo constructum est 6. ad. an. 13. oblongi ovi instar utrem seu sphæram aliquam, Vesalio sub sphærica, Col. globosa, rotunda oblonga, Piccolhomineo: sphæram oblongam vel vesicam refert, Plat.

f Quare ex sim-
plicium corpo-
rum numero,
que similia
dicuntur 6. ad.
an. 4.

g ex ligamen-
tis, que lumbo-
rum vertebrae
& os sacrum
illi ossibus com-
mittunt, Vesalio
& Sylvio, à
plexu nervo-
rum validissi-
mo, qui mensen-
terio ortum dat
Fallop. & Lau-
à vertebrarum
lumborum pe-
riostio, Fallop.
in instit. à me-
ningibus cere-
bri, Piccolhom.

h Gal. perito-
nei verticem
vocat. 4. us.
part. 10.

i Hipp. 15. in
Cœ.

k Gal. 6. ad. an.
4. & 5.

m simplex, ad-
dit Galen. 4.
us. part. 9.

n Galen. 5. ad
an. 6.

o Ut arcere possit, Arist. 3. par. an. 11. p. Ridiculum dicere peritonæum propter hydropem amplificabile esse, Piccolhom. q. Ut levis sit, & nihil ponderis afferat, Arist. 3. part. an. 11.
r Ut omentum, mesenterium & viscerum membranas: tenuius lieni & jecori obtenditur 6. ad. an. 4. & 5. f. Gal. 5. ad. an. 6. ac 6. ejusd. 4. & 7. item 6. meth. 4. t. hac prima est peritonæi utilitas 4. us. part. 9. u. fibras negat Vesal. se-
cutus Gal. 6. ad. an. 7. cui simplex omnino corpus est: at Fallop. si extendas & distrahās ut rumpatur, acie oculorum
in illud & oppositum lumen intenta, videbis triplici genere fibrarum contextum: dein in omento, quod peritonæi est
productio fibrarum sunt, multo magis peritonæo. Piccolhom. similiter probat, addendo & alteram rationem, à princi-
piis partium petitis, quæ ex filamentis spermaticis & affusis proprio parenchymate sunt. x. Vesalio: fortius, Co-
lumbo: firmitus, Laur. y. Gal. 6. ad. an. 4. & 5. hoc innuere videtur, at Columbo à dimidio abdomine sursum ver-
tere premendo ledant. At Fernelio, dua membrana circa spinam conspicua separantur, parte priorē adeo coherentes,
ut una censentur. Piccolhom. ubique ex duabus tunicis conficitur: & Laurentio, qui omnes humani corporis mem-
branas duplices facit, imo & piam matrem, hac in re Cabrolium Chirurgum & Anatomicum Monspeliensem secutus.

dem cavitatem totius corporis ea pacissimam succingat; longitudine & latitudine to-
ti inferiori ventri responder; ex filamentis spermaticis f & sanguine materno, paren-
chymatis forma affuso, tanquam principio ex quo, enascitur; live à meningibus cere-
bri, spinalem medullam & nervos investientibus, ad primam & tertiam s lumborum
vertebram producit, ideoque ibi crassius est; unde etiam tanquam à principio ubi
& à quo prodit, cum inde non nisi disrupta separari possit.

Connectitur superius h quidem, Diaphragmati ita valide, ut eo inflammato i hy-
pochondria sursum convellantur; inferius, ossibus pubis & ilium; antierius, linea
albæ, & transversorum muscutorum tendinibus pertinacissime connascitur, (pri-
vatim enim k & sola infra umbilici regionem ad pubis ossa consilist, quo enim k pro-
pius ad umbilici regionem accesserit, transversorum tenui tendini connectitur) re-
tro, transversorum exortibus, & membranæ nervorum à lumborum vertebrae pro-
deuntium (unde vulgo enasci dicitur) omnibusque visceribus, quibus membranam
largitur, jungitur.

Substantia hujus membranosa, m tenuis, n sed admodum valida & densa, o quo,
dum venter ciborum copia turgit, vel fœtus in utero continetur, distendi p laxa: ique
possit. Tenuis q parte anteriore, ne subjectis partibus oneri sit, ita tamen, ut in viris
à mucronata cartilagine ad umbilicum usque crassior sit, quam juxta pubem, at in
fœminis ab umbilico ad pubem validior est; in illis, potissimum crapulæ deditis,
propter ventriculum; in his vero, quo dum fœtus augetur, magis distendi possit.
Prope spinam circa lumbos crassior, quia in multas r membranas, quas visceribus
tribuit, extenuari debuit; latis aranearum s telis similis; firmissimam tamen, ut
viscera flatibus t distenta reprimat, & ne extensione retentove spiritu distrumpatur.
Intrinsicus ob viscerum lævitatem, lavis ac veluti humore oblitus: & interdum
adipem, quæ venas comitatur, præsertim circa ventriculum & os sacrum, adnatam
habet: extrinsecus aspera & x fibrosa, ut musculis aptius u adhæreat.

Est autem peritonæum ubique v duplex, præsertim circa lumborum vertebrae,
ubi externa tunica velut ex ligamentis lumborum pronasci videtur, non vero inter-
na quæ supra renes revoluta vertebrae non attingit: & inter duplicem hanc mem-
branam plexus nervorum renibus interjectus continetur, à quo plexu aliqui me-
senter-

scelerum oriri volunt. At hujus inferior membrana venæ cavæ, quo peritonæum parte sui inferiore, quæ ventris pondus sustinet, rupturæ minus obnoxium sit, quod contigisset si pertusum fuisset. Arteriæ magnæ & renibus substernitur: altera superior & interior, hæc contegens, ut vasa undique tecta suos ramos inter 2 geminas membranas tutissime mittant. Sic vasa umbilicalia duplicatum peritonæum permeant: arteriæ [tab. 9. aa.] quidem duæ ab inferioribus ad [tab. 9. C.] umbilicum, ita umbilico [tab. 9. D. ad E. superius] ad hepar vena ipsa sursum fertur. In hypogastrio quoque, ubi vesica locata est, manifeste aa in duas tunicas dividitur, quæ amplum spacium [connexus peritonei cum vesica. t. 11.] constituunt, ut inter has duas peritonæi membranas, Vesica contineatur.

Foraminibus bb ad vasorum transiitionem donatur, verum orificio proxime vasis circumnato, superne quidem, qua Diaphragmati adhæret, tria habet: partim à dextris ad Venæ cavæ, alterum à sin. stris, ad œsophagi cum ventriculo nexum cū coherentibus nervis: tertium ad Aortæ, Venæ sine pari & nervi sexti paris transitum. Inse ne circa anu n, vesicæ & uteri cervicem; venis, arterias & nervos, quæ ad crura mittuntur, & per peritonæum, abdominis musculos ac cutim distribuuntur. Productiones (quas veteres didymos, aliqui processus vocant) quoque cc duæ [tab. 8. HH.] oblonge utrinque à lateribus una, à peritonæi exteriori membrana renibus subiecta juxta os pubis, veluti canales laxiores, per foramina tendinum musculorum obliquorum & transversorum extra ventris cav. tatem in scrotum ad testes abeunt, latiusque se se explicantes, propriam eorum tunicam constituunt: per quas vasa spermatica preparantia descendunt & remeant deferentia, ad vesicæ cervicem una cum musculis & test. um in viris; in mulieribus vero, duo dd illi peritonæi processus ex interna & externa membrana contexti, ad inguina extra peritonæi cavitatem producti, uteri ligamentum rotundum continentes, ad supernam vulvæ partem abeunt: verum hisce productionibus interior membrana exactissime adhæret (à qua tamen juxta os pubis se jungitur) hacque disrupta ee & exterior dilata, prout vel intestinum vel omentum * vel utrumque illapsum fuerit tam in viris, quam in mulieribus, herniam causat: aliquando tamen solum musculorum abdominis tendines, peritonæi tunica illa lacerantur aliquando in magnis Herniis, musculorum tendinibus ruptis, peritonæum supra suam appendicem relaxatum & instar sacci distentum occurrit. Hæc productio sectione per cutim in inguine facta, si proxime ad abdomen vinculo intercipiatur, illapsum quidem impedit sed cum simul & vasa in viris ligentur, testis adimitur. Sin vero non proxime [ad ** t. 8.] injiciatur, tunc portio aliquæ intestini adhuc illabente, plurimum molestat etsi fortis nihil protuberare conspiciatur, vix etiam tactu deprehendi possit, novaq; sectio, novumq; vinculum requiritur, ut exempla quorundam nos docuere. Anterior deniq; in medio ventre, ubi umbilicus est in fœtu perforatur, vasorum umbilicalium gratia, quo alimentum à matre assumat, in adultis vero occlusum est; & si referetur, ff Herniam umbilicalem causabit.

E 3

Tuni-
forantur. Pinæ

dum intestina in inguina descendunt, naturalis productio dilatatur & nova producitur tanquam vagina: imo & uterus deorsum pellitur & sit & intestini & uteri prolapsus. * observavimus in septuagenario nobili & quidem secundo, id quod Vesal. monet, omentum in productionem peritonæi devolutum & mire adactum, ad 4. aut 5. lib. pondus, ut ventriculum detraheret, singultus causaret, & moriem, cum eger scrotum, ut solitus erat subligare neglexisset: & molles ramices ex omenti prolapsu sunt. ff δμφαλονήλη, Plat. Laurent.

2 Gal. 6. ad an. 4.

aa Quare nec extraperitoneum est vesica, nec amplo peritonæi ambitu continetur.

ut reliqua viscera, sed inter duas peritonæi tunicas latitat, Laur.

bb Fernel vulnus quædam perforatione, ait Sylvius.

cc Gal. 14. usque par. 13. meatus veluti fistula quædam 6. ad an. 13. 1. de sem. 15.

dd Vesalius in fœminis dari negat, quod in his testes penduli non promineant. Adstruit dari Fallop. Piccol. Plat. Laur. probant bubonocèle & curacione per sectionem.

ee Opinatur plerique rupturam fieri peritonæo perforato, ubi tendines musculorum abdominis perforantur. Pinæ

gg Hac quinta
est utilitas 4.
us. part. 9. &
17. 6. ad. an. 4.
hh in jecore &
liene tenuissi-
ma 6. ad. an. 5.
ii Visceribus su-
perne sitis, ut
est hepar, &
ventriculus, à
peritonæi por-
tione septo ad-
nata, quæ vero
inferius, ut ve-
fica & intesti-
na, ab ea portio-
ne, quæ ossibus
pubis commit-
tuntur, 4. us. part.
10.
kk diff. ven. 8.
ll Ridendi qui
sensum tactus
adimunt, cum
nervorum sur-
culos acquirat,
Vesal.
mm Hac pri-
ma utilitas
Gal. 4. us. par.
9. quam exi-
guam dicit,
cum intrinse-
ca à musculis

magnis, adipe multa & cute crassa tegi possint. nn Hac secunda est utilitas 4. us. part. 9. oo Tertia utilitas 4. us. part. 9. Vesal. dicit, Galenum cum cæteris velle peritonæum intestina comprimere ad sacum exclusionem: at hac exclusio cum sit voluntaria, à musculis fit, à quibus peritonæum impulsu compellit, sicque per accidens facies exprimit. Idem dicit Piccolhom. Respondet Laurentius. Galenum noluisse peritonæum per se & motu proprio: sed ex eventu hoc prastare, dum siccis alimentis excrementa tanquam manu premendo, citius propellantur. qq Gal. 4. us. part. 17. ii Quarta utilitas Gal. 4. us. part. 9.

Tunicæ quoque particulares ab eo producuntur, cum nullum ss sub Diaphragmate sit instrumentum quod non tunica à Peritonæo initium sumente operiatur; verum visceribus aliis tenuiorem, aliis crassiorem, prout cuiuslibet necessitas postulabat, tunicam largitur, hh ut renibus crassam: at ventriculo, intestinis, vesicæ, utero crassiorem, quæ viscerum proprias tunicas cingit & ii communis dicitur. Verum & duæ ab eo duplicatæ, prodeunt, omentum nimirum & mesenterium: sic & ligamenta, ut est hepatis ligamentum.

Venas & arterias obtrahit à vasīs vicinis, superius à phrenicis, posterius à mus-
lis, quæ ad lumbos abeunt, & per peritonæi latera [t. 8. LL.] excurrunt: antè &
superne [t. 8. KK.] à mammariis, sub sternò ad rectos descendentes; inferne ab
Epigastricis [t. 8. II.] sub rectis ascendentes furculos acquirit, pro nutritione &
caloris innati custodia: aliquando etiam à cava supra emulgentem, vel ab emulgente,
vel kk spermatica, ramuli communicantur. Nervos exiles habet, ab iis, qui abdomi-
nis musculis distribuuntur, ut sensus ll particeps sit.

Ulus est, partes in imo ventre contentas mm obtegere: dein, veluti medium nn ef-
se inter viscera & musculos, ne quid inter musculorum spacia, vel omentum, vel te-
nuium intestinorum nonnulla, vel etiam sub cutem (ut in ruptura ipsius accidit)
intercidat, sicque dolorem excitent, ipsorum motum impendant, & difficiliorem su-
petfluorum oo depulsionem causent: quod probatur ex peritonæo vulnerato, &
non recte curato. Tum, ut feces pp citius propellantur: cum enim muscoli abdomi-
nis & Diaphragma, pro varietate situs, sua contractione non penitus æqualiter ven-
trem comprimere possint, peritonæum sua continuatione, id præstat, ut tanquam
manu premente citius propellantur; quo modo succum ex herbis expressuri eas sac-
co indimus, & torculari subjicimus; unde torculari coarctato, ex omni sacci parte
succus emanat. Quarto, ut visceribus omnibus qq imi ventris tunicam largiatur, &
varia ligamenta producat. Quinto, ut omnia rr firmiora reddat, potissimum ventri-
culum & intestina, cum facile flatibus & facibus distenta divellantur, & colliger,
quo propriis locis fixa hæreant & contineantur. Tandem, ut vasa in longum produ-
cenda, turissime inter geminas ejus membranas excurrant.

PARTES IN INFERIORE VENTRE

CONTENTÆ.

CAPUT X.

Continetibus partibus explicatis, nunc contentas enarrare oportet. Conten-
tæ partes in imo ventre considerari possunt, vel quatenus aliquæ fœtus, in ute-
ro tanquam ergastulo conclusi, peculiare sunt: vel quatenus in homine tam in ute-
ro con-

ro contento, quam utero excluso considerari possunt. Priori modo occurrunt Membrana ipsam investientes, & Vasa umbilicalia alimentum deferentia. Posteriori modo duplices sunt; vel enim inserviunt Nutritioni præcedente coctione, vel Procreationi generisve propagationi. Ad Nutritionem facientes, alia ad chylicationem, alia ad sanguificationem pertinent. Ad Chylicationem; sic alia chylum ex cibo in ore masticato & saliva macerato, conficiunt & concoquunt, Ventriculus: alia coctionem adjuvant, Omentum & Pancreas: alia Chylum per pylorum transfusum suscipiunt, distribuunt & perficiunt, Intestina tenuia: alia chyli excrementa crassa recipiunt & educunt, Intestina crassa, quæ cum tenuibus Mesenterio connectuntur. Ad sanguificationem, alia chylum ex Intestinis exsugunt, alterant & sanguinis rudimentum tribuunt, Venæ Mesaraicæ, quæ eundem deferunt in Hepar ad Venæ Portæ radices, in quibus sanguis facultate ab hepate accedente conficitur; alia confectum distribuunt, Vena Cava cum suis ramis. Venæ enim sanguinis generandi simul & in omnes partes ferendi (ut Galeni verba habent) gratia factæ sunt: Alia adjuvant, Hepatis parenchyma, radicibus Portæ & Cavæ circumfusum, alia ejus excrementa recipiunt, & quidem vel bilem flavam, eamque vel tenuiorē, Vesica biliaria, vel crassiorē, Porus biliaris, qui recta ab Hepate ad intestinum abir, vel humorē feculentū, Lien, qui ex Mesaraicis antequam Chylus alteratus ad hepar feratur, ad se allicit, eum concoquit, & laudabiliorem partem in sui nutritionem reservat; excrementitium vero vel sursum ad ventriculum per Vas breve, vel in aliquibus deorsum ad Hamorrhoidas amandat: vel sanguinem serosum, Renes duo, in quibus segregatio fit seri à sanguinis portione, quæ in renibus pro nutritione eorum remanet: serum vero per Uteres in Vesicam deferitur, ubi coacervatur, donec vel quantitate, vel qualitate urina molestiam excitet, & tunc per Penem redditur.

Ad procreationem facientes, duplices quoque sunt, Viriles & Muliebres. Viriles alia materiam seminis deferunt, eamque præparant, Vasa spermatica; alia elaborant, Parastata; alia vim prolificam tribuunt, Testes; alia semen prolificum deferunt, Vasa deferentia, vel jaculatoria: alia semen & humorem oleosum recipiunt & conservant, Prostata & Vesiculæ seminatæ: alia in uterum effundunt, Penis: de Mulieribus posteriori loco.

Verum ad has partes omnes communia organa mittuntur, Venæ quidem, à venæ portæ & cavæ, quæ nutrimentum; Arteriæ, ab Arteriæ magnæ trunco descendente, quarum alia Portæ ramos comitantur, à Cæliacæ prodeuntes; alia Cavæ ramis junguntur; quæ omnes ad vitam & calorem nativum conservandum faciunt. Nervi, à sexto pari medullæ cerebri & medulla lumborum & ossis sacri, qui sensum, motumque iis quibus utile erat, communicant. De his singulis sectionis

ordinem observantes agemus; quare cum Vasa umbilicalia

inter duas peritonæi tunicas ferantur, de iis

primo sermo erit.

De Vasis Umbilicalibus.

CAPUT XI.

De his egit Galenus, libello de formatione foetus 2. & 4. Item 1. de semine 15. usu part. 4. & 5. lib. de dissect. ven. & art. 9. & lib. de dissect. uteri. 10. Arist. 2. gen. anim.

ai. hist. 13.

b Quare Hipp.

lib. de alim. n. de

ἀρεστέν ποσὶ

Δι. τὲ ἐπιγὰ

σελὶς ὀμφαλός:

id est antiquius

alimentum per

abdomen um-

bilicus.

c Gal. 15. us.

part. 4. & 6.

plac. at Vesalio

qui Varronem

lib. 6. ling. lat.

fecutus est, cor-

poris medium

exquisitissimū

in ossium pu-

bis symphysi con-

stituit: est Um-

bilicus quoque

ventris inferio-

ris centrum.

Gal. 1. ad an. 7.

& copulatur teste Hipp.

de octim. partu tex. 4.

e Hipp. lib. de alim.

Arist. 2. gen. an. 4.

f Quatuor esse vasa ple-

rique volunt, venam unam,

arterias duas, & Urachum.

g Gal. de forma foetus cap. 2. & 4.

ex semine ejaculato,

quod vulva vasorum orificiis adhærescit,

vasa generantur: idem 1. de sem. 13.

Vesalio oriuntur. vasa hac a venis & ar-

terius variis uteri fundum petentibus, qua à seminariis propagantur, qua peritonæum per foetus umbilicum sunt ingres-

sa. Vena quidem in propria rima in jecoris cavo, qua Porta caudex è jecore labitur, inserta. Arteria vero ad vesica

latera delata in magna arteria propaggines infixæ, & illas communes fieri, ac si ab ipsis principium ducerent, in partu

vero vasa ab utero & suis unde pronata fuerunt vasis quæ eo modo abscedant, quo maturus fructus, aut in autumno

folia suis pediculis ab arboribus abscedunt & abrumpuntur. Columbo vena umbilicalis à venis uteri oritur, & in

venam portæ terminatur. Arteria vero, à ramis magnæ arteriæ ad os sacrum oriuntur. Arantio, Piccolhom. &

Laurentio, vena umbilicalis ramus est insignis trunci venæ portæ: Arteria vero ex bifurcatione arteriæ magnæ ad os

sacrum oriuntur. Quare vena oritur ex matris venis uterinis, Vesal. & Columb. jecoris cavo inseritur Vesal. in ve-

nam portæ, Columb. portæ ramis bifurcata jungitur, Plater. Ex hepate critur & portæ ramus est, Arantio, Piccolhom.

& Laurent. Imo ex semine & ad jecoris portas accedit, Varolo & Bauhino. h Hipp. de carnibus, Gal. de form. foetus

2. 3. 4. & 1. sem. 13. 15. us. part. 4.

Vasa umbilicalia dicuntur, quod per umbilicum ferantur, & ex iis foetu excluso convolutis Umbilicus constituatur, qui ὀμφαλὸς ἀπὸ τῆς ἐμπεύς, quod est ἀναπνεῖν respirare, ratione arteriarum dicitur, quia foetus per umbilicum respirat. Aristote- li ἡ πύλα γαστρός, radix ventris, quod per vasa ^b alimentum ex placenta uteri, seu hepa- te uterino, tanquam ex terra eliciatur. Latinis umbilicus ab umbone, quod in me- dio ventris sit, imo totius corporis ^c medium & centrum, si brachiis extensis circu- lum dimeriamur. Est autem umbilicus [t. 9. C.] segmentum vasorum ^d umbilica- lium, per quæ foetus ^e in utero alebatur; idcirco medio imi ventris implantatus, cum in foetu sanguis tam alimentarius, quam vitalis ad hujus ventris partes primum accedere debuerit.

Vasa ^f hæc duplicia sunt; Vena una, in brutis gemina; Arteriæ duæ, rarius una ad umbilicum introrsum in duas divisa & Urachus in brutis: at horum vasorum unum solum, ipsa nimirum Vena embrii nutricula supra umbilicum, hepatis fissuram ingre- ditur: reliqua sub ipso sita sunt. Vasa hæc communi quadam membrana obvelan- tur, quæ Intestinulum (aliis funiculus vel laqueus) dicitur, ne vasa invicem impli- centur, frangantur aliave ratione lædantur. Vena umbilicalis [t. 9. D. ad B.] vena- rum omnium prima, imo omnium partium principium perfectionis, ratione car- nosæ substantiæ existit, cum sanguinem deferat & pro materia, ex qua omnia paren- chymata efformantur, & pro nutritione omnium partium: quare & venæ portæ ra- dix est; & una cum arteriis ex ^g semine ante ipsa ^h viscera efformantur (cum vasa ante viscera formari Hippocrates & Galenus docuerint, siquidem sanguine & spiritu pro generatione partium foetus opus fuit; hæc autem per vasa, cum sub mi- nistrantur,

Gal. 1. ad an. 7. d Umbilicus ut fasciculus quidam est, pars est ipsius foetus & hac una parte foetus matri adhæret & copulatur teste Hipp. de octim. partu tex. 4. e Hipp. lib. de alim. Arist. 2. gen. an. 4. f Quatuor esse vasa ple- rique volunt, venam unam, arterias duas, & Urachum. g Gal. de forma foetus cap. 2. & 4. ex semine ejaculato, quod vulva vasorum orificiis adhærescit, vasa generantur: idem 1. de sem. 13. Vesalio oriuntur. vasa hac a venis & ar- teriis variis uteri fundum petentibus, qua à seminariis propagantur, qua peritonæum per foetus umbilicum sunt ingres- sa. Vena quidem in propria rima in jecoris cavo, qua Porta caudex è jecore labitur, inserta. Arteria vero ad vesica latera delata in magna arteria propaggines infixæ, & illas communes fieri, ac si ab ipsis principium ducerent, in partu vero vasa ab utero & suis unde pronata fuerunt vasis quæ eo modo abscedant, quo maturus fructus, aut in autumno folia suis pediculis ab arboribus abscedunt & abrumpuntur. Columbo vena umbilicalis à venis uteri oritur, & in venam portæ terminatur. Arteria vero, à ramis magnæ arteriæ ad os sacrum oriuntur. Arantio, Piccolhom. & Laurentio, vena umbilicalis ramus est insignis trunci venæ portæ: Arteria vero ex bifurcatione arteriæ magnæ ad os sacrum oriuntur. Quare vena oritur ex matris venis uterinis, Vesal. & Columb. jecoris cavo inseritur Vesal. in ve- nam portæ, Columb. portæ ramis bifurcata jungitur, Plater. Ex hepate critur & portæ ramus est, Arantio, Piccolhom. & Laurent. Imo ex semine & ad jecoris portas accedit, Varolo & Bauhino. h Hipp. de carnibus, Gal. de form. foetus 2. 3. 4. & 1. sem. 13. 15. us. part. 4.

nistrentur, sequitur vasa ante partes generari) eo modo, quo semen in terram projectum, primo à semetipso initium trunci, simulque radicum producit, ut postea per radices truncus nutrirī possit: ita in nostra prima figuratōe, dum reliquæ partes formantur, simul etiam ductus umbilicalis producit, quo fœtus nutrirī & augeri debebat. Vena [t. 9 D. ad B.] per geminas peritonæi membranas delata, & in fœtu umbilicum egressa, aliquando gemina, aliquando statim ab umbilico divisa, ut duplex appareat, cum ¹ Arteriis membrana intestinulo dicta obvoluta ulnarum ^k aliquot longi- i Gal. 15. us. tude, Vena quidem ¹ varicosa, vel nodis ^m referta, ut sanguis diutius rema- part. 4. nens pro renelli fœtus alimento perfecte elaboretur: Arteriæ vero, cum spiritum ^k Sesquipedale seu semiulna longitudine Vesal. pro vita deferant, recte producuntur.

Vasa hæc ad secundinam delata, ramos insignes per eam distribuunt, minores ad exteriorem partem, ad hepar ⁿ uterinum seu placentam transeuntes, plexum reticularem efformant, donec in tenuissima capillamenta abeant; unde tanquam plantarum radices ex terra, sanguinem maternum alimentarium & vitalem cum spiritu (cum à venis & arteriis maternis sanguis eo deferatur) eliciunt; & venæ sanguinem in Venam portæ, & inde per Anastomoses in Venam cavam effundunt. Arteriæ vero, per quas fœtus transpirat, sanguinem vitalem ad Aortam, & inde ad cor ad nativum caloris custodiam & vitam deferunt. Hæc fœtu excluso, prius tamen sanguine pro fœtus alimento intro ^o represso, abscinduntur, & involuta umbilicum constituunt. Verum ut recte Aristoteles & in secando & deligando infantis umbilico prudentia & peritiā requirunt: in præcisione quidem ut iusta longitudo ^{*} relinquatur præsertim in musculis, in quibus præcipuum generationis organum, umbilici proportionem sequitur: (rationem hanc censemus, quod cum vesicæ ligamentum Ura- chum dictum, fundo vesicæ adhæreat, ipsius vero vesicæ collo, penis ipse, si nimium attrahatur extra corpus, cum cæteris valis umbilicalibus, necessum est sursum & vesicam & cum hac penem trahi, huncque breviorē reddi) sic in fœminis, curte nimium religatus, ætatis progressu, parienti conatus restringere potest. In deligatione vero, nam si ^o copula dissolvatur, fœtus sanguine effuso emoritur: sic sæpe visus est puer ^o emortuus nasci, cum ei infirmo, priusquam deligaretur umbilicus, sanguis in umbilicum & circa efflueret: quare obstetrices peritiores factæ ^o sanguinem de umbilico intro reprimunt, quo facto statim infans, qui modo exanguis deficiebat, recreatur vitæque restituitur.

Ne autem eorum portiones in corpore relictæ inutiles sint, p in ligamenta abeunt; Vena quidem, cum ex fissura [tab. 9. B. & 13. E.] quæ in hepatis cava parte est, prodire videatur, & inter duas peritonæi membranas ad umbilicum perveniat, Hepatis sit q ligamentum; quæ aliquando in hydropicis dehiscit, per quam aqua in hepate genita per umbilicum effunditur: nonnunquam referatur & per eum copiosum sanguinem per longa intervalla effusum vidimus: vel etiam fistulosa redditur &

F

tunc

jus carnis nullum vestigium spectatur: quare non propter finem ibi coagulatum esse credit Varolus. o 7. hist. an. 11. ^{*} Matth. Cornax: Mizaldus mem. cent. 1. aph. 16. p Non in nihil abeunt, sed velut ligamenta quadam deservunt. Quatuor hæc vasa in lucem edito semper in ligamentum degenerare solent, hepar & vesicam suspendunt: hinc tanta umbilici dignitas, ut Aegyptii pro supplicio grassatores hodie exuant corio, quos ita demum magno cum cruciatu diu vivere experiuntur, si carnis ex umbilicum ferro non attingat: eo resecto illico expirant, vasis quatuor concidentibus, Laurent. ex Scalig. exer. 246. & Leone Africano: Sunt tamen qui historiam fabulosam asserant. q Gal. 6. us. part. 21.

i Gal. 15. us. part. 4. k Sesquipedale seu semiulna longitudine Vesal.

l Similes anfractus in vasis spermaticis videre est.

m Ex quorum numero obstetrices generandorum liberorum numerum colligunt, ex Albucasi. in 1. introduct.

n Hipp. & veteribus chorion id est, secundina. Gal. 15. us. par. 5. Aristoteli Secunda, gener. an. 4. eo

quod non in prima formatione ex semine fiat, sed ut quid secundarium ex sanguinis partibus feculentius posterius advenit. Probatur exemplo abortus 30. aut 40. dierum, in quo circa umbilici radices jam factas hu-

a de abd. morb.

*b Plat. obs. l. 3.
aliquot habet
exempla. Laur.
in sua Anat.*

c de loc. in hom.

*d Paracetes
Plin. lib. 25. c. 13
perpunctionem
vertunt.*

e 1. tard. pass. 5.

f de aff. lib. de

int. aff. de loc.

in hom. 6. epid.

sect. 7. aph. 8.

et 6. aph. 27.

g 14. meth.

h Egin. l. 3. c.

48. Erius tot.

4. ser. 2. cap. 20.

i lib. 6. c. 50.

k Hipp. de int.

aff. hydropicos

per ferrum u-

rro et aquas

sensim ac pau-

latim et sic ut

et 2. aph. 51.

plurimum et

repente vacua-

re periculosum.

l 6. aph. 27.

m Gal. in com.

tunc per eam aqua inter peritonæum & infimi ventris musculos effunditur. Verum cum læpius in Asciticis ob aquarum concursum umbilici tumorem, vesicæ instar pellucidum observaverimus, qui etiam in aliquibus sponte fuit reſeratus, horumque aliqui ſanitati reſtituti fuerint, an non liceat eum compunctione apèrire, quæri poſteſt. Sane & tuto & cum ratione adminiſtrari poſſe cenſemus, modo & tempeſtively fiat, & priuſquam viſcera corrupta fuerint, his enim corruptis, fruſtra aqua educetur. Tuto autem fieri poſſe exemplis primum oſtendemus: Benivenius^a refert, hydropico in quo ſalutis ſpes nulla erat, poſt largiſſimum aquæ potum, umbilico ſponte ſoluto & aqua effluxa, ventrem deſumuiſſe & prudentis medici conſilio convaluiſſe. Hic Baſileæ^b pauperulam puellam in Xenodochio umbilico ſcalpello leviter diſſecto & aqua per aliquot dies ſenſim evacuata, reſtitutam vidimus. Tuto fieri poſteſt, cum nulla pars vulneretur præterquam cutis, veſicæ inſtar extenuata, muſculorum infimi ventris tendinibus illæſis, cum hoc loci propter vaſorum umbilicalium tranſitum perforati ſint. Id ipſum & ratio ſuadet, ut naturam ducem ſequamur, quæ ſæpe talem evacuationem molitur. Verum ubi euſtello acuto veſica diſſecta fuerit, ſtatim fiſtula ænea vulnere immittatur, & per eam aqua ſenſim & paulatim educatur: vel filum umbilico circumdatur, quo ſi aqua majori impetu erumpat, conſtringi poſſit. An hoc voluit Hippocrates^c dum inquit, quam tenuiſſimis & leviſſimis cruſtis, ut aquam emittere poſſis in umbilici ambitu inurito.

At veteres in hydropicis etiam ſectione utebantur, quam *παρακέντησις*^d id eſt compunctionem (à *παρά* & *κέντησις* pungo) nominabant, erat autem curationis ratio qua aqua hydropæ aſcite laboribus, ſcalpello in peritonæum adaçto, eximebatur (licet & curationis genus ſit in ſuſfuſione per punctionem acu trajecta, cærebratos oculos Aurelianus^e vocat) quam tuto fieri poſſe voluerunt Hippocrates, & Galenus^f & plures alii.^h Nec ratio diſſuadet, cum & in aliis tumoribus aquoſis, ut in Hernia aquoſa compunctio adhibeatur: imo, in hac ſectione nulla pars nobilis vulneretur, ut ex adminiſtratione colligere erit. Adminiſtrandi modum triplicem Eginetaⁱ propoſuit: ſectione una facta directe ſub umbilico, tribus digitis interpoſitis, ſi ſitis ab inteſtinis orta fuerit: alia facta à ſiniſtra umbilici parte, ſi affectus primario à jecore proficiſcatur: tertia, à dextra parte, ſi à liene originem traxerit. Fieri autem debet ad minus digitis duobus tranſverſis ad latus umbilici, ne muſculorum tendines nervoſi ad lineam albam vergentes lædantur, idque ſcalpello intra peritonæum adaçto, cavendo tamen ne inteſtina lædantur, dein foramini ænea fiſtula immittatur, per quam humor ſenſim, pro cuiuſque virium ratione effundendus, ſubitam^k & cumularam evacuationem ubique cavendo: propter periculum mortis ab Hippocrate^l propoſitum: quicunque, ait, empyi & hydropici dum uruntur aut ſecantur, ſi pus aut aqua univerſum effluat moriuntur. Nec movet obſectio, paucis profuiſſe & parencereſin & umbilici punctionem: cauſa enim quod debito tempore adhibita non fuerit, & quidem vel in extremo rebus jam deploratis, vel viſceribus jam corruptis: quare Hippocrates^m Hydropicos ſtatim ſecare, empyicos ſtatim urere jubet: ergo cum Hippocrateⁿ in morbi principio hæc fieri debent: aut certe cum Galeno, priuſquam viſcera corrupta ſint: Et umbilici puncturam veterum paracenteſi præ-

ſi præ-

si præferimus, quam etiam Celsus ° agnovit. Arteriæ [tab. 9. aa. tab. 11. k. l.] ab Iliacis
elata, vel potius ibi implantata per latera vesicæ [tab. 11. k. l. tab. 13. aa.] per geminas
quoque membranas ad umbilicum sursum feruntur, ejusque ligamenta lateralia
sunt, in infantibus, & iliacis & hypogastricis coherent.

Urachus [tab. 9. b. tab. 11. i.] denique, seu vas urinarium in brutis à fundo [tab. 9. H. tab. 11. g.] vesicæ enatus, inter binas arterias per geminas membranas peritonæi de-
latus, & per umbilicum longius egressus in duo quasi intestina vesicarum instar ex-
panditur, & Alantoidem tunicam, quæ brutorum est, constituit; in quam fœtus u-
rinam effundit, quæ ibi collecta tantisper asservatur, dum fœtus in lucem edatur. In
homine vero, à fundo [tab. 9. H. tab. 11. g.] vesicæ ligamentum Urachi [tab. 9. b. tab. 11. i.] effigie, sed nullo modo pervium exoritur, quod inter arterias [tab. 9. aa.] umbi-
licales abiens, umbilico [tab. 9. C.] firmiter connexum vesicam suspensam detinet,
ne hac atque illac moveatur, & disruptionis u periculum incurrat. In adultis vero u-
na cum Arteriis, in tenuissimum & vix conspicuum filamentum desinit, quo vesica so-
peritonæo adnectatur & sustentetur, quod ab arteriis maxime fit, ne cum vesica di-
stenta est, ejus cervicem comprimat. Sed de hisce vasibus umbilicalibus, quemad-
modum de membranis fœtum investientibus in fœtus historia dicitur amplif-
sime.

o l. 7. c. 15. a-
quam hydropi-
corum emit-
tunt aliqui sub
umbilico fere

quatuor digitis
à sinistra parte
interpositis: qui
dam ipso umbi-
lico perforato
facere consue-
verunt: qui-
dam cute pri-
mum adusta,
dein interiore
abdomine inci-
so.

Ex matris ar-
teriis urinis,
quæ à semina-
riis prodeunt,
Vesalio: ex va-
mis Iliacis, Co-

lumbo, Piccolhom. Arantio & Laurentio: ex semine ortum ducunt, & Iliacis implantantur, Varolo, & Bauhino.
Gal. 15. us. part. 5. Urachus in homine & brutis, Vesal. Columbo, Fallop. Flater. Piccolhom. Pinao: in brutis tantum,
Varolo, Arantio, & Bauhino. quæ de vasibus umbilicalibus & Uracho optime Arantius ita deprehendi, Heurnius de pro-
creat. c. 2.

Urina in fœtu excernitur per Urachum inter Amnion & Alantoidem, Vesal. Columb. Fallop. Flater. Piccolhom. qui
hanc opinionem acriter defendit exemplis quorundam adductis qui in urina suppressione, urinam per umbilicum e-
miserint. in fœtu humano per penem, Arantio & Bauhino: Varolus voluit in vesica fœtus retineri usque ad partum.
Quia totum illud, quod à sanguine remotum est, dum fœtus in utero remansit, in vesica colligitur: unde puerilis
tempore partus vesicam maximam lotio plenam habent, quare antequam escam capiant, plurimum mingunt, hæc
Varolus.

De Omento.

CAPUT XII.

De omenti ortu & officio egit Arist. 4. part. an. 3. & 1. hist. animal. 16. & 3. ejusd. 14. Galenus ve-
ro ipsius substantiam, usum & connexionem 4. us. part. 9. & 11. & 6. ad anat. 5. explica-
vit.

Omentum [tab. 9. 10. n.] quasi operimentum, Græcis a ἐπιπλωρον, ab ἐπιπλῶν, in- a Hipp. I. de
nato, quod ventriculi b fundo [t. 11. bb.] & superioribus intestinis [t. 11. cc.] in- morb. de natur.
fidens velut innatet, vel c supervehatur: quemadmodum propter errabundum va- mulieb. & 5.
forum ductum, quo retis piscatorii formam [t. 10. fig. 1. & 2.] refert γαργαλιῶν καὶ σαγίνης, aph. 46. Gal.
rete d & reticulum dicitur: Arabibus Zirbus, e hoc omnia sanguinea f donantur, 6. ad an. 5. &
sed reor Hipp. 5.

Epid. b Gal. 6. ad an. 5. c Gal. 4. us. part. 11. d Vel ut Piccolhom. quod quemadmodum rete capit a ves, ita omentum
sua densitate adiposos vapores capiat. e Zirbus adipinus Mauritanis, vulgo ventris mappa. f Arist. 3. hist. 14. & 4.
part. 3.

g. πῆς ῥῶ πῶν,
πῆς δὲ ἀπὸ μέλου
3. hist. 14.
h. Arist. 1. hist.
17. & 3. ejusd.

14. at. 4. par. 3.
πῆς ῥῶ πῶν ἔχου
στῆτα πῶν πῆς
δὲ πῆς πῶν πῆς
μῆς πῶν πῆς
1. A.
rist. 4. par. 3.

cuncta intesti-
na completitur
Gal. in homine
extensa in om-
nia intestina. 6.
us. part. 9. hinc
Piccolhom. am-
nia intestina.

us. part. 9. hinc
Piccolhom. am-
nia intestina.
usque ad ossa
pubis integrit.
At 6. ad. an. 5.
quibusdam a-
nimantibus.

ret.
haud multo in-
fra, quam um-
bilicus est, con-
sistit, in quibus-
dam ad pubis
ossa.

k. Hoc non so-
lum in suspen-
sis, sed & aqua
suffocatis, &
morbo mortuis,
in sanis ita no-
tauit, Vesal. su-
pra lienem quo
quesitum est,
licet secus scri-
pserit Hipp.

Col. 1 Quacunque præter naturam crassa non concipiunt, iis omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur
non concipient. Hipp. 5. aph. 46. & lib. de sterilib. Idem de natura muliebri, omentum præpingue super incumbens uteros
comprimit, neque genituram suscipere sinit. m. Gal. 6. ad. ana. 5. n. Gal. 4. us. part. 11. o. Gal. 6. ad. an. 5. aut marsupii,
sacculi aut peræ. p. Columb. reflecti dicit, volunt sursum reflecti & lieni & ei coli intestini parti committi, quæ proxi-
me ventriculum tangit, sicque duplicatum, formam marsupii referre, Piccolhom. q. Compositionem hanc nomine ori-
ginis expressit Gal. 4. us. part. 11. i. Gal. us. part. 9. tenuissima & densissima Piccolhomino nulli sibi is implicita, Vesal.
lio. i. Ex duplici peritonæo ceu plexu compositum procedit, Gal. 6. ad. an. 5. t. Altera superposita aut elatior, altera subdi-
ta 6. ad. an. 5. anterior & inferior omenti membrana, de diss. ven. l. u. Medio à ventre dependet, Arist. i. hist. 17. 3. ejusd.
14. & 4. part. 3. Piccolhomino origo duplex, ubi & à quo proxime, ubi fundus est ventriculi, inde enim proxime nasci-
tur, à quo proximum peritonæum est, remotum meninges cerebri. Ferretius omentum vult oriri juxta spinam sub dia-
phragmate, unde altero extremo in ventriculi fundum defigatur, à quo delapsum ventrem tegat, hinc reflexum colo in-
testino committi.

ret.
haud multo in-
fra, quam um-
bilicus est, con-
sistit, in quibus-
dam ad pubis
ossa.

k. Hoc non so-
lum in suspen-
sis, sed & aqua
suffocatis, &
morbo mortuis,
in sanis ita no-
tauit, Vesal. su-
pra lienem quo
quesitum est,
licet secus scri-
pserit Hipp.

Col. 1 Quacunque præter naturam crassa non concipiunt, iis omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur
non concipient. Hipp. 5. aph. 46. & lib. de sterilib. Idem de natura muliebri, omentum præpingue super incumbens uteros
comprimit, neque genituram suscipere sinit. m. Gal. 6. ad. ana. 5. n. Gal. 4. us. part. 11. o. Gal. 6. ad. an. 5. aut marsupii,
sacculi aut peræ. p. Columb. reflecti dicit, volunt sursum reflecti & lieni & ei coli intestini parti committi, quæ proxi-
me ventriculum tangit, sicque duplicatum, formam marsupii referre, Piccolhom. q. Compositionem hanc nomine ori-
ginis expressit Gal. 4. us. part. 11. i. Gal. us. part. 9. tenuissima & densissima Piccolhomino nulli sibi is implicita, Vesal.
lio. i. Ex duplici peritonæo ceu plexu compositum procedit, Gal. 6. ad. an. 5. t. Altera superposita aut elatior, altera subdi-
ta 6. ad. an. 5. anterior & inferior omenti membrana, de diss. ven. l. u. Medio à ventre dependet, Arist. i. hist. 17. 3. ejusd.
14. & 4. part. 3. Piccolhomino origo duplex, ubi & à quo proxime, ubi fundus est ventriculi, inde enim proxime nasci-
tur, à quo proximum peritonæum est, remotum meninges cerebri. Ferretius omentum vult oriri juxta spinam sub dia-
phragmate, unde altero extremo in ventriculi fundum defigatur, à quo delapsum ventrem tegat, hinc reflexum colo in-
testino committi.

ret.
haud multo in-
fra, quam um-
bilicus est, con-
sistit, in quibus-
dam ad pubis
ossa.

k. Hoc non so-
lum in suspen-
sis, sed & aqua
suffocatis, &
morbo mortuis,
in sanis ita no-
tauit, Vesal. su-
pra lienem quo
quesitum est,
licet secus scri-
pserit Hipp.

Col. 1 Quacunque præter naturam crassa non concipiunt, iis omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur
non concipient. Hipp. 5. aph. 46. & lib. de sterilib. Idem de natura muliebri, omentum præpingue super incumbens uteros
comprimit, neque genituram suscipere sinit. m. Gal. 6. ad. ana. 5. n. Gal. 4. us. part. 11. o. Gal. 6. ad. an. 5. aut marsupii,
sacculi aut peræ. p. Columb. reflecti dicit, volunt sursum reflecti & lieni & ei coli intestini parti committi, quæ proxi-
me ventriculum tangit, sicque duplicatum, formam marsupii referre, Piccolhom. q. Compositionem hanc nomine ori-
ginis expressit Gal. 4. us. part. 11. i. Gal. us. part. 9. tenuissima & densissima Piccolhomino nulli sibi is implicita, Vesal.
lio. i. Ex duplici peritonæo ceu plexu compositum procedit, Gal. 6. ad. an. 5. t. Altera superposita aut elatior, altera subdi-
ta 6. ad. an. 5. anterior & inferior omenti membrana, de diss. ven. l. u. Medio à ventre dependet, Arist. i. hist. 17. 3. ejusd.
14. & 4. part. 3. Piccolhomino origo duplex, ubi & à quo proxime, ubi fundus est ventriculi, inde enim proxime nasci-
tur, à quo proximum peritonæum est, remotum meninges cerebri. Ferretius omentum vult oriri juxta spinam sub dia-
phragmate, unde altero extremo in ventriculi fundum defigatur, à quo delapsum ventrem tegat, hinc reflexum colo in-
testino committi.

sed alia pingue, aliam membraneum obtinent: at homo^b & simia maximum ha-
bent; unde sæpe homines^b epiploocomistæ, quasi omenti gestatores dicuntur:
quemadmodum in iis, qui venationibus & cursibus gaudent, membranæ simile
est.

Membrana^h est ampla in anteriore parte sita ad ventriculi [t. 9. PP.] fundum, &
deorsum supra [t. 9. KKKK.] intestina ad umbilicum, rarius adⁱ os pubis (quem-
admodum in simiis & canibus) usque expanditur, & communiter^k secantibus lie-
nem versus convolutum occurrit: nonnunquam ipsorum etiam anfractus ingreditur,
& quandoque in mulieribus uteri & vesicæ fundum intercedit, utrique os^l com-
primendo, sterilitatem causare, Dictator statuit: nonnullis post partum circa ventris
medium collectum remanet, ita ut non leves sæpe dolores perferant. Quod si me-
tui in scrotum descendenti incidat, mollem herniam, epiplocelen dictam causat;
quo affectu^m nullum animal præter hominem & simiam tentatur: & si quando de-
labitur, in sinistrum potius quam dextrum latus propendet, cujus causa Epiplocele
sinistra frequentior est dextra.

Connectitur semper^m ventriculo [t. 9. M.N.O.] lieni & colo & præsertim iis par-
tibus ad quas splenicæ venæ rami mittuntur; [t. 10. fig. 2. GG.HH.] aliis vero partibus
modo jungitur, modo ab illis liberum est: non enimⁿ solum sublime pendere
debuisset, facile enim in seipsum colligeretur, multaque tegenda intesta relinque-
ret.

Formam Marsupii^o aucuparii [t. 10. fig. 1. & fig. 2. II.] refert, cum duplici mem-
brana in fundo connexa (velut aliqui^p volunt, reflexa) constet, orificium [t. 10.
fig. 1. bbb.] orbiculatum habet, quod posteriore sui parte elatius, quam anteriore as-
cendit, & inferius [tab. 10. fig. 1. & 2.] rotundum est: In hac cavitate spiritum natura-
lem contineri aliqui sibi persuadent.

Componitur^q ex membranis, vasis & pinguedine cœnosa & putrescibili, Mem-
branis^r duabus (unde peritonæum^r duplicatum quibusdam dicitur) subtilibus^r &
levibus (ne pondere intestina graventur) sibi ipsis^r incumbens, constat: altera
superiore, quæ ala [t. 9. KKKK. t. 11. aaaa.] superior, altera inferiore, quæ ala [t. 11.
cc.] inferior dicitur. Superior & anterior ad^u ventriculi, [t. 11. aa. bb.] fundum à pe-
ritonæo ipsum obvolvante, ejusque tertiā tunicam constituente oritur, & hepatis
atque lienis cavo, recta linea cum portione inferioris membranæ committitur. Infe-
rior

rior & posterior à peritonæo ad dorsum [t. 10. fig. 1. ccc.] statim sub diaphragmate, ortum ducit, quæ ad hepatis cavum delata ejusque portioni (sed * rarius) quem- x Gal. 6. ad. an. s. & spuria cus- dam costa. admodum & diaphragmati, dextro ventriculi lateri & duodeno fere toto, lienisque cavo adnascitur, & sub ventriculo * colo [t. 10. fig. 2. GG.] intestino (in canibus au- tem, nec colo, nec alio intestino, at in simiis dextræ coli parti alligatur) toto ductu, quo sub ventriculi fundo, cui adnectitur, fertur, pertinaciter adnascitur, ut ipsi [t. 10. fig. 2. HH.] mesenterii loco sit: cujus forte productio statui posset, cum ei conti- nuetur, ut ex Mesenterii membranis divulsis colligere est, sicque Mesocolon forte nominandum.

Venæ plures à sola vena portæ per has feruntur, ad superiorem quidem, à dua- y Gal. 4. u. f. bus ventriculi fundum petentibus, (quæ Gastroepiplois dextra [t. 12. H. & X.] & part. 9. sinistra) infinita sobole [t. 10. figur. 1. kk. mm.] deorsum oblique propagatis; ad in- ferio rem vero ab iis, quæ ad lienem [t. 10. fig. 1. u. X. f. 2. BCD.] & quandoque quadra- plici ramo (ut in Venæ Portæ dicitur historia) sparguntur, quo omnia ² nutri- 2 Gal. 4. u. f. anur. part. 19.

Jam vero cum omentum venis plurimis iisque magnis, à splenico ramo dissemi- natis, conspersum sit, duplicique membrana donetur, quid si huc Lienis illuvies ex parte deponatur, cum quandoque & tumores & apostemata purulenta, ibi veluti a Rouff. de par. in sacco coacervata, observata fuerint. Quare Galenus explicans Hipp. β aph. hunc cas. clas. 3. hist. 10. quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, iis venter aqua repletur & mori- 10. uncur, asserit in omentum nihil incidere posse nisi ex ventriculo, colo intestino ac β 7. aph. 50. liene: quare ex lienis venis effundi posse credimus. Et hæc cum Hippocratis γ sen- Greg. Horstius de morb. 7 lib. de locis in- tentia consentiunt, inquentis: ubi vasa pinguedine vacua fuerint & à liene florente y lib. de locis in- ac augefcente in omentum defluerit, utpote vicinum valde existens, & ut vasa ha- hom. bens eaque vacua, excipit, & ubi morbus semel in corpore factus fuerit, ad id quod est morbosum vertitur, nisi quis probe disponat ac curet.

Arteriæ [t. 10. fig. 1. u. fig. 2. C.] totidem, à Cæliaca & Mesenterio ramo, ut vivar. Nervi [t. 10. fig. 1. x.] valde exigui, à sexti paris ramo costali, ut alicujus sensus fiat particeps, disseminantur.

Pinguedo^{aa} multa undique vasis [t. 10. fig. 1. def.] (intermediis vero eorum aa Arist. 1. hist. 16. pinguis mē- spaciis nulla) circumfunditur, ut in mediocriter pingui ad libræ vel sesquilibræ pon- brana 4. par. 3. dus accedat: cujus membranæ inferiori Glandulæ paucæ, at superiori exiguæ & membrana est: quam plurimæ interjectæ, quo humidum feculentum in prima coctione segrega- in iis, quæ se- tum depascantur; quare cum non generetur ex sanguinis portione, ut pinguedo & vum habent, alius adeps, idcirco cœnosa est, feculenta, & facile putrescit: hinc si propter vulnus statim: qui aliquod è corpore exciderit, illico putrescit, quod pinguedini sub cute aliave parte pinguedinem non accidit. Ullus pinguedinis omenti, ventriculi fundum (cum superior pars bb ab bb Arist. 4. par. 3. hepate insidente fovetur, ejusque nomine omentum altiore loco non prodit) & in- cc Gal. 4. u. f. testinorum calorem, qui, cum membranosa & exanguia sint, parvus est, tueri, eun- demque^{cc} fovere, non solum calore suo, qui venis & arteriis plurimis intertextis par. 11. sunt qui- tantum calo- auctur, sed etiam dum sua densitate caloris dissipationem, & exterioris frigoris pe- rem fovere di- netratiōem prohibet, sicque concoctionem juvat: calefaciendi enim gratia factum, esse pem frigidum

F 3

statuunt: non a calefacere, cum tamen adeps calidus sit: & nonnulli adipem concretum frigidum, liquidum calidum, puerili distinctione dicant, Piccolhom.

dd Gal. 4. us. esse ostendit Galenus dd exemplo eorum, in quibus per vulnus abdominis cruentum
 part. 9. omentum excidit, lividumque factum, partem læsam adimere Medicos cogit (o-
 ee 1. de morb. mentum enim ex Senis ee nostri præcepto, si procidat, ut putrefiat, necesse est) qui
 in princ. minus concoquunt, & plurimis operimentis extrinsecus egent: maxime vero, quan-
 ff Omentona- tura abutitur do fere totum absectum est: ut cuidam gladiatori totum fere Galenus dd abstulit: qui
 ad cibi melio- rem concoctio- quidem confestim sanatus, sed facile à frigore lædebatur, quare ventrem lanis assidue
 nem, ut faci- obvolutum habebat. Et philosophus ff omentum meliorem coctionem facere pro-
 lius celeriusque nunciavit, quia pingue sit: pingue autem sit calidum, & calor concoquat. Alter usus
 cibis concoqua- intestina humectare, cum ea modo extendantur, modo corrugentur, prout chylo vel
 tur, 4. par. an. facilius replentur, aut inaniuntur. Tertius, ut per gg inediā calori nativo alimentum
 3. calor vim ha suggerat. Membranarum vero usus, ramos venæ Portæ & arteriæ Celiacæ in ventri-
 bet concoquen- culum, lienem, duodenum & colon exporrectos fulcire: dein ventriculū, colon
 di: τὸ δὲ πρὶν & duodenum dorso gg alligare: jecur & lienem copulare, & quo vapores lenti &
 ἵερὰ δὲ, τὸ δὲ pingues in imo ventre hh illis adhærescant & earum frigore ac densitate in pingue-
 ἐν τῷ αὐτῷ πρὶν. dinem cænosam condensentur, ne id quod in alimentum tempore inediæ cedere
 gg Gal. 4. us. possit, dissipetur.
 part. 11.
 hh Piccolhom.

Ex Hipp. de glandulis & hunc usum Laur. addit, ut copiosus humor ab intestinis influens, cum à glandulis excipi & absumi nequeat, in omento velut æstuatio, aservetur.

De Vena Portæ & Arteria Celiaca.

CAPUT XIII.

POSTeaquam de infimi ventris partibus continentibus tam communibus, cuticu-
 la nimirum, cute, pinguedine, panniculo carnosio & membrana musculorum
 propria, quam propriis musculis scilicet decem & peritonæo, dictum fuerit. Vasorum
 quin & umbilicalium & omenti historiam exposuerimus, nunc de venæ portæ &
 arteriæ celiacæ ramis, verba facienda sunt, cum horum vasorum distributio, ante-
 quam intestinorum historia tradatur demonstrari debeat, sic Anatomica methodo,
 ubi unius tantum cadaveris copia est, requirente.

De Venis in genere.

CAPUT XIV.

ET si de Venis in genere fuse actum sit à nobis in libro secundo universalis nostræ
 Anatomies, qui de partibus similariis fuit inscriptus, quo Lectorem relegamus,
 hic tamen pauca, ad institutum necessaria aspergamus. Vena instrumentum est
 corporis nostri commune, oblongum, teres, fistulæque in modum cavatum, ex tu-
 nica simplici & tenui & fibris compositum, sanguinem naturalem continens, &
 ad omnes corporis nostri partes nutriendas, una cum spiritu naturali vago deferens.
 At veteres venæ nomen, tam Venis quam Arteriis tribuerunt, illas non b pulsátiles,
 & has vānas c pulsátiles nominantes: alii venam, majorem d venam, & arteriam,
 mino-

minore venâ & aortam appellarūt. Quarum materia & principium ^{venosus} sive originis & q̄ ipsis esse dedit, semen ^c est glutinosum ^f & frigidum : materia vero alimentalis est sanguis. Ratione vero principii ^{discretus} sive ^h dispensationis est Hepar i a quo oriri dicuntur, ab hoc enim facultatem & virtutem accipiunt naturalem ^k facultatem cum spiritu & sanguine ^l per totum corpus distribuendi : sic & ratione ^{p̄gnotus} ipsū quoque Hepar, cum per id quasi per terram radices spragantur.

Substantia est membranosa, quo distendi, & rursus in se collabi possit. Tunica ^a unica est ⁿ tenuis & rata, ^o cum per eum sanguis pro partium nutritione transudare debeat : triplici fibrarum genere ^p intertexta, quæ ita obscuræ, ut potius potentia, quam actū inesse videantur, neque loco moveri possunt ob connexionem, atque densam mutuaque inter se texturam, (licet figura, quæ ^q Libro secundo, Tabula sexta habetur, clarius id demonstrat, quam in Venæ substantia conspici possit) quæ non ob privatam nutritionem, sed ut minus patiatur facta est. Nam cum sanguis aliquando nimium redundans, venas violentis extensionibus distendat, aliquando rectis, & aliquando obliquis opus fuit, ut tunica ad positiones rectas & obliquis directis, extendi, non autem lacerari possit, quod illis ob fibrarum ductum rectum, transversum & obliquum in ipsius substantia latantium accidit.

Valvulæ (seu ostiola) quæ tenuissimæ sunt membranulæ, & tunica propriæ venarum portuiculæ, in cavitate venarum, sed potissimum brachiorum & crurum post alarum & inguinum glandulas reperiuntur, quarum præcipuus usus est, sanguinis impetum in manum vel pedem, remorari : de quibus infra libr. 4. cap. 36 & libr. 2. de part. similaribus cap. 50. fult egimur.

Propriam hanc venarum tunicam sæpe altera ^r communis cum adhærente adipe investit, quam à vicinis partibus mutuatur, ut in ventre inferiore à peritonæo, in thorace à pleura. Nam si quando longiore ^s via duci, aut duriori ^t corpori ineunbere debuit, tum ex aliarum partium membranis conterminis aliam acquirit tunicam, eamque tenuem, tum ut tutius deducatur, tum ut vicinis partibus firmitus connectatur. At si visceri alicui vena inseratur, aut per musculi caput distribuatur, huiusmodi tunica destituitur, tum quia non indiget, ab ipsis corporibus, per quæ fertur, firmata; tum quia sanguinis è vena promptam transudationem impediret. At venæ quæ à membranis circumdantur, hoc est : quæ extramuseulos & viscera sunt, sentiunt ^{bb} sensu tactus : quæ membranas non habent non sentiunt : quare venæ si incidantur ^{cc} urantur sive laqueis excipiantur, ut & Arteriæ, nequaquam sentiunt : hinc Aristoteles ^{dd} Nervus ignem non patitur, cum Vena patiatur : Etenim venæ ex se suæque natura insensiles sunt, proinde iis affectis valida remedia imponere licet : sic in rescindendo varice, venæ pars sana refecatur, uritur, nec tamen dolor excutatur : sic & humerorū contentorum acrimoniam non sentiunt. Quod si sentiant, ob nervi vicinitatem fit : sæpe enim nervi & venæ una membrana conteguntur : sic cum venæ nimia repletionem dilatantur, dolorem ex compressione non venæ, sed vicinarum partium sentiunt.

Est autem amplissima juxta exortum, in hepatis parte gibba, ubi truncus est, qui

in ra-
at alias sibi fibras imaginari, quæ non magis adsint, quam in corio : nam venarum substantia discepta nulla fibra apparent : quidam fibras tribuunt, quia attractionem, retentionem & expulsionem per fibras fieri opinantur. q̄ Fig. 2. venæ. x 7. ad an. 5. l. us. par. 2. x 9. us. par. 5.

a Gal. 7. ad. an.
5. Vena totius
corporis ex pe-
culiari una
constant tuni-
ca : nam exte-
rior membrana
ipsis nonnun-
quam adhære-
scens, ubi colli-
gari quibus-
dam aut sulci-
ri aut contegi
desiderant, il-
luc solum acce-
dit.
b Gal. 7. comp.
f. loc. 1.
c Hipp. 2. epid.
Gal. 6. plac. 9.
d Arist. 7. hist.
4. & 1. 6.
e Gal. 1. sem. 5.
f. 1. lib. form.
f. 4.
f Hipp. de carn.
g Gal. 3. fac.
nat. 15.
h Gal. form.
f. 4. & 7.
i Gal. 4. us. par.
12. 5. ejus. 2.
k Gal. art. med.
9.
l Arist. 3. par.
an. 4. Gal. 1. us.
part. 16. diff.
m Hipp. de a-
lim.
n 1. sem. 13. 6.
us. par. 11. 7. ad
an. 5.
o 6. us. par. 10.
p Vesalius pu-
q̄ Fig. 2. venæ.

u16. us. par.
ult.

in ramos & propagines, hique in surculos & soboles desinunt : sic ad Cordis " ventriculum dextrum, ob caliditatem : sic & emulgentes " magnæ sunt, ob copiosum excrementum serosum. Inprimis ratione partium variant, nam quæ plurimo " alimento egent, venas maiores recipere : minores vero sunt iis in partibus, in quibus copiosum alimentum non absumitur, idque ob coloris inopiam, ut in cerebro " & ossibus : est & crassissima, cum ramus aliquis veluti à trunco deducitur.

x Arist. de spir.

4. vena cuilibet

sua arteria ad-

juncta est : at

Gal. de diff. ven.

et art. ult. non

omnes conjun-

ctas arterias ha-

bent : et 5. us.

par. 2. ubiq; na-

tura cum venis

arterias simul

divisit, nisi ma-

jus quid obster-

y caret vena

socia arteria,

ubi ad cutim

fertur 16. us.

par. ult.

z 16. us. par. 12.

aa 6. us. par. 10.

et 17. 9. ejus. 5.

bb 16. us. par.

2. lib. de plenit.

4.

cc 16. us. par.

12.

Connectitur cum arteriis, * ut plurimum enim omnis vena arteriam sociam ob-
tinuit, ita tamen ut plerunque arteriæ incumbat, vel ei adjaceat, quo ab illius motu
sanguis ventilatus à putredine conservetur : quare rarissime y vena sine arteria, nulla
vero z arteria sine vena reperitur. Insuper mutua est inter venas & arterias anasto-
mosis, aa osculis enim junguntur, ut sit inter ipsas conspiratio & materierum transum-
ptio : quod verum esse probatur venæ sectione, nam si omnis sanguis ex venis eva-
cuetur, & arteriæ evacuantur. Omnium autem manifestissimæ anastomoses, venæ ca-
væ & portæ in hepate, venarum & arteriarum in liene & vasīs spermaticis : venæ arte-
riosæ, cum bronchiis asperæ arteriæ in pulmonibus.

Ulus venarum communis est, sanguinem ut in loco proprio continere & conserva-
re, cum extra venas statim putrescat concreascit : & dein ad singulas partes corporis,
una cum sero, quod crassiorem sanguinem diluit, deducere & distribuere ; tum ca-
lorem & spiritum naturalem ad partes deferre ; hinc ligatis arteriis partes non statim
emoriuntur ; tandem sanguinem coquere & immutare, (ut dictum fuit in Secundo
Libro.) Aliæ tamen præparant, ut Mesaraicæ, aliæ concoquunt, ut Venæ portæ radi-
ces in hepate, quibus etiam pituita tempore inedia, in sanguinem mutatur ; aliæ ex-
actius elaborant, ut Venæ Cavæ rami majores. Quibusdam tamen peculiaris adhuc
utilitas tributa, ut Venæ Portæ ramis, vel potius radicibus Mesaraicis dictis, Chylum
è ventriculo & intestinis exsugere, ad hepar deferre. Alii excrementa, quæ in corpo-
re, maxime in venis redundant, velut sunt sanguis & serum expurgare. Sanguinem
quidem, si ve is quantitate aut qualitate peccet, ordinarie per Venas, quæ ad Uterum
desinunt, in menstruis expurgationibus ; Vel ad anum, in hæmorrhoidum evacuatio-
ne ; vel denique nullo ordine, per venas desinentes in nares & os, rarius per eas, quæ
sub cute sunt, quod in equis frequenter fit. Serum vero ordinarie venæ emulgentes,
ex Cava eliciunt, & ad renes deferunt, interdum inordinate per cutaneas in sudore
expurgatur.

Quaternario autem numero omnes venæ comprehenduntur : quæ cæterarum
omnium radices censentur ; licet principium corporis humani, seu pars, à qua reli-
quæ ortu prodeant, nullum sit, sed omnia dd similiter principium, & omnia simili-
ter finis. Prima est umbilicalis vena, quæ omnium venarum prima est, cum in eam
primo sanguis maternus influat, quæ foetus nutritioni, dum in utero est, subservit.
Altera est vena Portæ, umbilicalis propago, ex cava hepatis, tanquam principio dis-
pensationis emergens, quæ in ventriculum, intestina, lienem, vesicam biliariam, o-
mentum & mesenterium ramos suos spargit. Tertia vero est Vena Cava, venarum
amplissima, ex gibba hepatis prodiens, quæ ad universi corporis partes, tam intrinse-
cas quam extrinsecas innumera ramorum serie propagatur, ita tamen ut plures &
ampliores iis, quæ copiosiore ee alimento indigent, largiatur ; exceptis tamen iis
partibus quæ aliunde venas accipere : in abdomine quidem, quibus à Vena portæ
rami

dd 3 hist. an. 5.

dd Hipp. de locis

in homine,

sex. I.

ee 16. us. par.

ult.

rami fuere communicati; in thorace vero Pulmonibus, qui per Venam arteriosam sanguinem accipiunt; & in capite Cerebro, quod à Sinubus duræ matris sanguinem è venis in eos effusum, recipit. Verum in hepatis substantia, Cavae ramus cum Portæ propaginibus extremis ossiculis inter se connivent, & multis locis per transversum continuantur. Quarta vena est Arteriosa, quæ ex dextro cordis ventriculo pronata dicitur, cum tamen rectius ex Aorta, quemadmodum arteriam Venalem ex Cava primum nasci (ut in foetu observare licet) statuatur, & frequenti propagine in pulmones dispensatur: hæc licet Cava non sit continua, in communem tamen cavitatem, dextrum scilicet ventriculum ambæ spectant. Sed cum de Umbilicali dictum sit, & de Vena arteriosa in thorace agendum sit, nunc Venæ portæ, Cava postmodum historiam persequamur.

Vena magna ad Portas Hepatis & ramorum ejus descriptio.

CAPUT XV.

De Vena portæ nomine & mesaraicarum utilitate, Galenus 4. usu. part. 2. egit: at quomodo ejus truncum unum esse, ex usu fuerit, & quod commodiori loco locari non potuerit, 5. usu. part. 2. ostendit. Distributionem vero lib. de dissectione Venarum 1. explicavit, septem præcipuos ramos constituens, quem plerique Anatomici secuti sunt.

Quam Venam portæ nominare solent [t. 13.] & tanquam propago^a umbilicali a^a Objiciunt nobis minora non venæ^b continuatur, ex cava hepatis^c parte, quam (scilicet partem^c vel etiam bis minora non ingressingum) Galenus cum tota^d Asclepiadarum familia πύλας, portas vocavit, inter posse majorum esse principia: duas parvas Hepatis eminentias (ne à vertebrarum corporibus comprimatur) Hip- & qui flumini pocрати^e πύλας nuncupatas progrediens, Venarum est post Cavam maxima: quare num maximo Galeno^f μεγάλην, magna; cui Cava, μεγάλην, maxima dicitur: vel μεγάλην & φλέψ ἐπὶ πύλας, tum ortus, magna vena, quæ ad portas est: communiter venam^h ἐπὶ πύλας, vel τὴν ἰν πύλας πύλας, quam tū totius corporis nostri, quæ ad portas est, nominat, quod per ejus radices (vel secundum alios,) per ejus ramos, venas nimirum mesaraicas, & ramos, chylus ex ventriculo & intestinis exsuctus vel etiam maximarum arborum principium? velur per portam (unde πύλας ἢ ἡ πύλας) ad hepar deferatur, & idcirco hepatis manus bonum principium? mesaraicæ dictæ fuere. Vocavit & κτελεχμαῖον, quod caudici [t. 13. B.] truncove pium? sit similis, cum ab ea tanquam τελεχμαῖον truncus, rami, ad plerasque infimi ventris b Vesal. negat. partes mittantur. Medici Venam^l Portæ, Arabes Venam Lacteam, quod chy- asserit Columb. lum lacti similem alliciat, nominarunt. c diff. ven. 1. quam portas vocant.

Hanc, doctrinæ causa, dividimus in radices, truncum & ramos. Radices^m per hepa. d Gal. 4. usu. par. 2. ingressingum hunc portas sapiens vir, & cum eo Hipp. & tota Asclepiadarum familia vocavit. e de corpo. resect. Jecur vero

duos vertices habens, quos πύλας vocant, dextra parte locatos. At Gal. 4. usu. par. 2. ingressingum in hepar portas Hippocratem appellasse asserit. f Gal. 4. usu. par. 2. vena hepatis magna, quæ omnes mesarai venas excipit, & 5. usu. part. 1. g diff. ven. 1. h Sapiissime ita appellat, quia partem unde exit, πύλας vocat (φλέψ τῆς πύλας dici etiam potest) 5. usu. par. 2. diff. ven. 1. i Gal. 6. plac. 3. k Gal. 6. ad anat. 10. l Nonnullis porta jecoris, alijs janitrix: nonnullis non tota vena, sed duntaxat pars ipsius quæ primum à jecoris substantia libera cernitur, hoc nomine donatur: alii portam & ostiarum, vocant. m Gal. arboris similitudine usus, non has sed venas mesaraicas, radices nominat: quare Vesalio ex jecoris cava enata, aut verius rami in jecoris substantiam dispersi Columb. Piccilhom. & Laurent. radices vocant.

n Gal. de form. hepatis substantiam, uide tanquam à principio ^a distributionis & ^o radicationis o-
fer. 4. & 7. riuntur, disseminata [t. 13. ch. 1. 2. 3. 4. 5.] exigua & numerosa sunt, quæ sensim in ma-
plac. 3. jores, & hæ in grandiores adhuc coeunt, donec omnes versus ejus medium in he-
o Hipp. lib. de patis cava juxta dorsum unitæ insignem truncum [t. 13. B.] constituent, qui extra
alim. hepar fertur; ac radices hæ in hepate in medias ^p Venæ cavæ radices (ut Tab. 36.
p Extremis ca- pillaribus vena ostenditur) osculis junguntur, at in canibus tot soboles ^q producuntur, quot hepar
Porta, in profun- fibras obtinet, cum in ^q singulas singulæ dividantur, quæ tamen omnes in unum
do jecoris occur- truncum coeunt. Possunt tamen & radices & rami dici; radices, & quatenus hæc
runt extrema Vena hepatis germen dicitur, & quatenus sanguinem inde ad alias partes deferunt:
partes Cava, Rami vero, quatenus mesaraicæ, quas Galenus arbori assimilans, radices vocavit.
Piccolhom. chylum exsuctum, sursum per truncum in hos ramos per hepar distributos deferunt.
q Gal. diff. ven. Nonnunquam à Venæ portæ radicibus, ab extremo apice sinistrae partis hepatis,
2. & addit ci- juxta ejus ligamentum ramus egreditur, qui diaphragmati communicatus, per po-
bis à ventricu- steriora descendens, sub Pancreate cum aliis, ex Venæ portæ trunco enatis jungitur;
lo & intestinis aliquando etiam rami aliquot ex eodem loco lienem ad eunt, inque ejus substantiam
ad has partes disseminantur.
ascendit: hinc Truncus [t. 13. B.] ab Hepate ^r descendens paulum oblique deorsum ^s sub duo-
per venas ad deno fertur, sedem stabilem supra vertebra nactus, qui inter ventriculum & inte-
ipsas fibras in stina, tanquam loco commodissimo, & inter utraque medio distribuitur, cum æqua
secur, permeat. debuerit venarum ad omnia nutritoria instrumenta distributio esse. Si enim magis
x Gal. 5. us. par. descendisset, à ventriculo secessisset: si magis ascendisset, & ab intestinis distaret,
2. & in ventriculum, cum is modo distendatur, modo concidat, lubricum accessum
f diff. ven. 1. habuisset. Quare ab hac plures propaggines in imo ventre in ventriculum, intestina,
x Laur. qua- omentum & lienem distribuuntur. Truncus [t. 13. B.] antequam dividatur, duas
tuor dicit, his parvas propaggines ex ejus sede anteriore de se mittit.
duabus addens I. Cysticas ^a gemellas [t. 13. C. & t. 37. g.] quæ ex sinistra magis trunci parte pro-
Gastroepiploi- deunt sursum & dextrorsum reflexit, ad vesicæ biliaris collum & corpus, exigua
dem & Intesti- capillorum modo (sicuti per albam oculi tunicam) distribuuntur.
nalem, quæ II. Gastricam ^x dextram [t. 13. D.] quæ multo inferius, & ex dextra magis trunci
ex Mesenteria parte exorta, dextrorsum delata ad posteriorem tantum ventriculi partem, & pylo-
emergunt. rum, tenues ramulos spargit.
u Cysticus Lau- Mox Truncus ^y sinistrorsum inclinans in duos Ramos insignes & inferiores [t. 13.
ren. E.] dividitur: in elatiorem ^z seu sinistram eumq; minorem, & hamiliorem ^{aa} seu dex-
x Gastricus tram & ampliorem. Elatior [t. 13. E.] licet totus fere in ventriculum & omentum ab-
Laur parvam sumatur, ab usu tamen Splenicus dicitur, quia crassiores succi partem ex chylo in
dicit Gal. diff. Mesaraicis alterato, antequam is ad hepar feratur, ad se alliciat, & ad splenem deferat
ven. 1. (ut in splenis historia dicitur) quare etiam supra Mesaraicarum [t. 13. G.] truncum
y Caudex di- locatus est. Humilior qui Mesentericus [t. 13. G.] quod pene totus per Mesenterium
videtur in duos feratur.
maximo trun- Splenicus ^{bb} omenti membrana & glandoso corpore suffultus, transversim ad
cos, Vesal. splenem
in aliquibus cum dua sint, in exortu mutuo se contingunt, Gal. diff. ven. aa Primus ramus ad concavum ventris, Gal. diff. ven. 1.
simis initio uni- bb Sinister ramus, Vesalio: quartus ramus Columbo: tertius Piccolhom. Splenici quatuor surculi, Gastricus minor,
cus, statim ab Epiploicus dexter, Coronaria stomachica & Epiploicus posterior, Laur.
exortu bifa-
ram scinditur
p. ante una ven-
rem, altera lie-
nem adit: &

splenem fertur; & antequam in eum absumatur, ab eo prodeunt rami alii ante, alii post ipsius divisionem. Ante divisionem, alii ab elatiore, alii ab humiliore sede, promanant; & ab elatiore duæ.

I. Gastrica minor [t. 3. K.] & sinistra, in ventriculi gibbosam partem posteriorem paucis ramis diffunditur.

II. ^{cc} Gastrica major, [t. 13. N.] quæ omnium ventriculæ aduentitium capacissima, sub ventriculo ad superius orificium oblique fertur, & in eum dispergitur, tribus de se missis ramis, quorum utrinque [t. 13. Oo.] unus ad ventriculæ mittitur: medius vero, sursum pergens ipsius superius orificium instar coronæ cingit & ^{dd} Coronariam stomachicam [t. 13. Q.] constituit (quæ in canibus valde conspicua est) à qua rami alii exigui sursum ad œsophagi finem, alii deorsum ventriculo offeruntur. Nonnunquam & alter ramus ab altera propagine pronascens, deorsum fertur, & antè [t. 13. R.] pylorum frequentibus furculis ambit.

Ab humiliore tres.

I. ^{cc} Epiplois dextra [t. 13. L.] gracilior, deorsum ad dextram omenti membranam inferiorem, & ad colon ei annexum furculos derivat.

II. Epiplois postica [t. 13. S.] insignior, in duos ramos plurimum separatos dividitur, ex quibus furculi deorsum ad omenti membranam inferiorem, qua colon instar mesenterii dorso connectit; & coli partem excurrunt. In canibus, à splenico ramo, nulla vena ad colon mittitur.

III. ^{ff} Pancreas [t. 13. M.] inter utramque Epiploide in tam superne quam inferne, venarum pilorum instar graciles, in Pancreas disseminantur.

His propaginibus productis, truncus [t. 13. F.] Splenicus in ramum superiorem & inferiorem [t. 13. T.] finditur, hique in alios.

A ramo superiore, rami modo tres, modo etiam plures enascuntur, modo unus à summo prope splenem ramo, ^{ss} quem VAS BREVE, [13. Z. superius] aut venosum vocant; quod in aliis majus, quemadmodum in melancholia hypochondriaca laborantibus, quibus lien tumet, sæpe calami scriptorii crassitie & longitudine in ventriculæ hians occurrit: & forte per hoc Vas etiam aliquid è ventriculo in lienem rapi potest, ex Hippocratis ^{*} sententia, siquidem in splenetis quandoque statim atque frigidam bibere, rugitus atque murmura exaudiuntur. In aliis minus, (hi que facilius, illi difficilius in ediam ferunt, hinc etiam nonnulli si minimo intervallo edendi tempus præteriverint, in syncopen incidunt; per hunc quoque ramum sæpe lethales vomitiones nigrae fiunt) qui superiore omenti membrana suffulti, in sinistram partem fundi ^{hh} ventriculi, aliquando altius, ⁱⁱ inferuntur, ut sanguinem melancholicum naturalem, qui in splenis alimentum mutari non potuit, in ventriculi fundum, quandoque ejus os ⁱⁱ eructet, quo aciditate sua torpescens ^{kk} appetitum, antequam ob nimiam indigentiam os ventriculi corrugetur, excitet; acetosa

G 2

enim
culo de potu tra-

bit. ^{hh} Alienis capite ad gibba ventriculi, diff. ven. I. ⁱⁱ Ad fundum præcipue eructat, quod superius orificium corrigerit, nunquam vidi. Vesal. à liene in os ventriculi surrigitur, Piccolhominus à liene versus orificium superius vena pertingit, Varolus: in ventriculi fundum & os. Laur. ^{kk} cibum capiamus, cujus multis sæpe magnique negotiis præpediri, obliviscemur, Columbus. II Gal. 5. us. part. 4.

^{cc} nonnunquam, quam rarius, priusquam ad splenis caput pertingas, magna vena ad ventris gibba extollitur, ramostum ad splenem, tum ad concava ventris usque ad os ipsius emittens, Gal. diff. ven. 1. ramus primus Columbo & Piccolhom. ^{dd} primi rami pars altera, Columbo.

^{cc} In inferiore omenti membrana venula exigua ab iis orta que sub concava parte ventriculi periguntur. Gal. de diff. ven. 1. Tertius ramus, Columbo quartus Piccolhom. ^{ff} diff. ven. 1. ^{gg} Gal. 5. us. part. 4. 6. ad an. 10. diff. ven. 1.

^{*} 4. de morb.

Splen subagrotans ex ventriculo de potu tra-

enim appetitum promovere, ac etaria, quæ in cœna proponuntur ad novum appetitum provocandum, docent; & adstrictione sua ¹¹ id corroboraret, & ventriculi concoctionem promoveat. Nonnunquam & ab altera hujus ramipropagine, venæ ad ventriculum feruntur. Hæ splenem ventriculo pertinaciter colligant: & quando vomitiones nigre fiunt, quæ sæpe lethales, tunc per Vas breve materia in Ventriculum eructatur: quando vero tam per superiora quam inferiora, eodemque tempore & quasi momento sanguis rejicitur, venis tam superioribus quam inferioribus à ramo Splenico prodeuntibus, tam in ventriculum, quam in colon referatis, id contingit. Sunt qui notant conjunctionem Vasis brevis cum Phrenica, quæ cum venæ cavæ propago sit, per hanc viam in lienosis sanguis per nares expurgari potuit, cum lienosos hæmorrhagia narium levare, Hippocrates † scriptum reliquerit.

† 2. epid. exemplo Bionis spleneticæ & Aristoteli uxoris fractis sublienosis probatur. Vide & 4. epid.

mm Gal. diff. ven. 1. hujus & sequentis rami non meminit, Laur. nn & Vesalius monuit.

oo Gal. diff. ven. 1. illarum utrinque quibusdam membranis insident per elatiorem ventriculi gibbum circumveniunt: concava vero partis venæ corpori ipsius adnectuntur & insident. pp diff. ven. 1. maxime circa ejus mediam sedem multis in ipsum veluti radicibus inserta.

A ramo inferiore duæ prodeunt:

I. mm Epiplois sinistra [t. 13. V.] ad sinistram inferioris membranæ omenti partem, uno atque altero furculo distribuitur; potissimum quando Epiplois postica augustior est: quare hæc non semper ⁿⁿ reperitur.

II. Gastroepiplois sinistra [t. 13. X.] satis insignis dextrorsum reflexa, fundum ventriculi sinistra parte cingit; cujus exigui ramuli cum dextræ ramulis implicantur, & extremis sese mutuo ^{oo} contangunt, & superiori membranæ omenti à sinistris frequentes ramulos largitur. Reliquum utriusque rami, numerosa sobole [t. 13. Y. Z.] in cavam & pp mediam splenis lineam, variè implexa implantatur, & per totum ipsius corpus distribuitur, ut fœculentum ^{qq} succum expurget, eumque deferat.

A dextro venæ portæ [t. 13. G.] ramo, qui ^{rr} humilior & amplior est, antequam dividatur, duæ venæ prodeunt.

I. f Gastroepiplois dextra [t. 13. H.] ex latere rami supra divisionem, in Mesentericas, nonnunquam extrunco; rarius ^{tt} ex sinistro ramo prodit, & à dextris ventriculi fundum, antè & postè multis furculis exiguis, cavitatem ejus subeuntibus intertextit, & omenti superiorem membranam perrepat, & ad mediam ventriculi sedem ramulis suis cum Gastroepiploide sinistra [t. 13. X.] jungitur. In canibus modo ab intestinali prodit, modo deest, tumque sinistra utriusque loco est.

II. Intestinalis [t. 13. I.] quæ ex ramo, nonnunquam etiam ex trunco, promanat, ad duodeni medium & jejuni principium, secundum eorum longitudinem recta deorsum fertur, ramulis nonnullis per superius omentum, & per pancreas capillorum modo prætenuibus dispersis. Mox totus ramus, [t. 13. G.] ubi mesenterio committitur, in ramos tres Mesentericos abit, & inter duas mesenterii tunicas delatus distribuitur.

Mesenterica dextra [t. 13. b.] duplex, ^{xx} quæ in jejunum, ileon, cæcum & colicam partem

qq Communis sententia, ut simul lien alimentum deferant, & ex jecore fœculentum sanguinem expurgent, Vesal. rr ramitres, Hæmorrhoidalis, Cæcalis, Mesentericus, Laur. f diff. ven. 1. meminit: ramus tertius ex trunco, Gastroepiploicus, Laur. tt Hic secundus est ramus, Columbo & Piccolhom. uu Gal. l. c. hanc primam facit: dein alteram quæ ad pylorum mittitur: mox in ramos insignes dividit. xx Gal. l. c. postquam Gastricam quæ ad pylorum abit, & intestinale recensuit, hanc subjungit, quæ in jejunum primum, dein in omne deinceps tenue intestinum fissura multiplicat dividatur: postrema parte cum cæcum intestinum, tum exiguum coli partem, &c. Ramum s. & 6. faciunt Columbo & Piccolhom. Laur. ramum dextrum vocat, & in Hæmorrhoidalem, Cæcalem, & Mesentericum dividit.

partem dextram, posteriori seu cava parte implantatur, in ramos ut plurimum quatuordecim secta, in innumeras venarum soboles, velut arboris cuiusdam radicum
 yy tenues extremitates, quibus proportionē respondent, divisa, venas Mesaraicas [t. yy diff. ven. I. 13. dddd.] constituit; quæ inter duas Mesenterii membranas, quibus plures glandulæ
 securitatis gratia interjectæ oblique feruntur, & ab intestinis (ad quorum tunicam, non cavitatem, cum eam crusta succingat, *αυστη*, *22* seu osculis hiant) chylum, quemadmodum radices à terra succum exugunt: quare in jejuno & ileo frequentiores, cum ex his, quam ex crassis plus succi sit exsugendum. Verum non solum ut succum hunc deducant *aaa* creata, sed ut attrahant, simul & Hepati præparent, modo (ait Galenus) quo ipsum similimo, cum natura ipsi sint ad similes, & primum germen ex illo ducant: quare posteaquam ei sanguis *bbb* principium, rudemque formam tribuerit, & ex iis, & ab eo crassior pars à Splene per ramum splenicū [t. 13. F.] attractus fuit, ad Hepar deferunt. Quo enim modo bajuli *aaa* in promptuaria repurgatum frumentum, in communem civitatis officinam concoquendum deferunt, ut mox ad nutriendum utile fiat, sic venæ Mesaraicæ, alimentum in ventriculo elaboratum, ad communem totius animalis coctionis locum, Hepar nimirum deferunt, non *ccc* ut in ejus substantiam effundant, ut ibi in sanguinem commutetur, sed in Venæ portæ radicibus in interiore & cava hepatis parte reservetur & elaboretur, cum iis sanguificandis vis ab Hepate *ddd* tribuatur, ut pluribus in hepatis historia ostensuri sumus. Verum mesaraicæ eadem, per quas ab intestinis ad hepar chyli sit distributio, etiam sanguinem ab hepate ad intestinorum nutritionem *ccc* devehunt; at non eodem *fff* tempore, sed cum vacua sunt, & nutritione indigent. Quod si quando eodem tempore fiat, quod Galenus quoque *ggg* concedit, tum pro diversa partium trahentium natura, desiderio & robore, hepatis venæ chylum, intestina, sanguinem rapiunt; (quemadmodum si ex paleis & ferro pollinem tenuissimum conficias, simulque misceas, mox succinum calefactum applies & magnetem, illud pælearum polli- nem, hic ferri limaturam, tametsi mixta sint, attrahet; ob diversas naturas, & diversa trahendi desideria) quod fieri non posset, si ipsum extremis orificiis Valvulæ

G 3

hhh adposi-

sanit. tuend. ult. de diff. morb. 7. 6. epid. 5. com. 1. At Vesalius negat membraneo & coriaceo vena corpori sanguificationis vim inesse, & si quæ esset album procrearet, non secus quam ventriculus omnia in lacteum colorem emutat. Sic Columbus sanguificationem his adimis, propter tenuem venarum tunicam, albamque earum substantiam: probare conatur exemplo ventriculi, testium & mammarum. At Varolo, ubi sanguificam dispositionem in venis mesaraicis acquirit, secur ingreditur, sanguinisque supremam dispositionem adipiscitur. *ccc* Communiter creditur per ejus substantiam dispergi, ut ab ea coquatur, & in rubrum sanguinem, qualis ipsa est, convertatur. *ddd* Gal. 1. us. par. 16. Sanguinis autem generandi simul & in omnes partes ferendi gratia vena facta sunt: Vena autem ab hepate virtutem naturalem accipiunt. & p. fac. nat. 9.

eee Natura, ait Gal. 4. us. par. 19. toti mesenterio venas efficit proprias intestinis nutriendis dicatas, haudquaquam ad hepar trajicientes. *fff* Cum in venis ait Gal. 3. fac. nat. 13. quæ multum spatium inter hepar & partes circa ventrem occupant, abundantia fuerit alimenti, sursum fertur in hepar: cum autem vacua sunt, & nutriri avent, per easdem ipsas ex hepate rursus trahitur. Ibi per easdem venas simul & alimentum in hepar defertur, & rursus ab eo in ventriculum trahitur, sed non eodem tempore. Sicut alio tempore spiritum recipimus, alio rursus foras mittimus: ita alio tempore secur ex ventre, alio venter ex jecore trahit. *ggg* Admirantur (ait 4. us. par. 19.) nonnulli si per quas venas prius distributio ad hepar facta est, per easdem rursus aliquando sanguis benignus recurrit, cum aliorum naturæ operum ignari, tum vero roboris in attrahendo, instrumentorum nutritione egentium.

h h h Columbus
censuit extre-
ma unicuique
mesaraicarum
membranam

apponi, qualis
vesica cavitate
extremis urete-
ris apposita,
quod à nemine
sit animadver-
sum: At Lau-
rentius, figmen-
ta mera esse di-
cit: Piccolhom.
rationibus plu-
ribus refutat.
1. vena in pun-
ctum desinunt,
puncto valvu-
la adponi non
potest. 2. quan-
do sanguis ad
intestina alen-
da egredietur.
3. quomodo pra-
vi humores vel
sponte, vel ope
medicamenti à
toto intestino
protrudi possent
si membrana
adesset, egres-
sum impediens.
4. aliarum
venarum extre-
mis addenda e-
rant, ut impe-
dirent à parti-
bus in venas re-
fluxum. Dece-
ptus fuit à cri-
sta illa qua ex

adpositæ forent. Verum hæ Valvulæ etiam humorum à toto corpore in inte-
stina protrusionem (cum per venas Mesaraicas, maxime inferiores, totius
corporis fiant ⁱⁱⁱ purgationes) quæ vel sponte, vel medicamenti sit, impedi-
rent.

Mesenterica ^{kkk} sinistra [t. 13. C.] in sinistram & mediam mesenterij partem dif-
feminatur, & eam coli [t. 13. ee.] regionem, quæ à ventriculi sinistra sede ad rectum
usque intestinum ^{kkk} pertinet, adit. Mesentericæ sinistræ ramus est insignior ⁱⁱⁱ Hæ-
morrhoidalis interna [t. 13. gg.] (externa enim à Cavæ ramo ^{mm} Hypogastrico
prodit) quæ toti colo sinistro furculos largiens sub recto [t. 13. ff.] intestino descen-
dit, cujus extremum seu anum [t. 13. gg.] aliquot furculis exiguis, orbiculatim am-
plectitur; per quas (sæpe in splenis ⁿⁿⁿ obstructionibus) sanguinis faculenti ni-
mium redundantis, qui in nonnullis statibus temporibus excerni solet, expurgatio fit.
Hæc aliquando à ramo splenico, à quo & Vas breve, at à Liene rarissime, originem
ducit. Differunt autem Hæmorrhoidalis interna ab externa: origine, quia interna à
Portæ ramo, externa à Cavæ ramo hypogastrico prodit: implantatione, interna re-
cti intestini substantiæ membranosa, externa in ani musculosam substantiam inseri-
tur, quia illa sanguinem crassiores in liene elaboratum, hæc puriorem in hepate
confectum requirebat: numero, quia interna una, externa triplex est: usu, quia per
internas cacoehymia evacuatur, splenis obstructiones juvantur, nam sanguinis ex
his venis profluvium veræ & jam factæ ^{ooo} melancholiæ maximum remedium est,
ob quam causam hirudines admoventur: à quibusdam etiam circa podicem a-
periuntur, cum nullus alius Venæ portæ ramus ad cutim feratur, qui incidi possit, sed
non facile sectio hæc tentanda, cum incurabilia ulcera sectioni secuta observaverim-
us. Per externas vero plethora minuitur, vena cava depletur, morbi à sanguine
causati curantur. Sanguinis effusi qualitate & quantitate & modo etiam differant:
nam internarum sanguis crassus & niger est, nec ita copiosus, ac cum dolore: exter-
narum, tenuior & rubicundior & quandoque ita copiosus, ut vel hydrops sequa-
tur, ob hepar refrigeratum, vel interdum mors: qui sine dolore evacuatur. Hactenus
de ramis Venæ portæ.

Differunt autem Vena portæ à Vena cava, quod illa sit laxior & mollior, hæc den-
sior: quia illa magis attractioni, quam expulsionioni, cum per splen & Hepar plus at-
trahant, quam expellant: hæc vero contra magis expulsionioni, quam attractioni in-
serviat: cum per cavam sanguis ad universum corpus, concurrente tamen omnium
membrorum attractione, expellatur.

Ufus

excrementis tertie concoctionis genita, intestina succingit, quæ velut operculum ora venarum mesaraicarum obducit:
sicuti cuticula omnia venarum cutanearum ora cooperit. ⁱⁱⁱ Gal. 3. fac. nat. 13. ^{kkk} Gal. diff. ven. 1. ^{III} Hic septi-
mus ramus est Columbo & Piccolhom. ^{mm} Quare non solum è porta, sed etiam cava sanguis exhauritur: hisque
fluentibus morbi abdominis sæpe fuere curati: sic & morbi sanguinei thoracis & capitis, quod Hipp. in Aphor. monuit.
Columbus, à Splenico ramo ortum ducere vult. Fernelico 1. phys. 11. à ramis vena cava in anum deducta Piccolhom. à
Splenico à quo & Vas breve. ⁿⁿⁿ Per hunc sæpe in lienis obstructione, aut alio ipsius vitio quando non universus fa-
culentus sanguis, vel nullus in lienem absumitur, vel in ventriculum eructare nequit, melancholicus sanguis per inter-
vaila excernitur: Vesalius probat exemplo cujusdam qui diu hæmorrhoidibus laboravit, in quo splen post mortem par-
vus reperiatur. Idem sentit & Laur. ^{ooo} Gal. com. 4. aph. 25. bonum quando nigra evacuantur, h. e. quando hominis na-
tura multum talem sanguinem accumulaverit: aliter non est assuefaciendum ei evacuationi quæ per hæmorrhoidas fit,
quæ utramque immoderantiam periculosam habet, sive supra modum sanguis excernatur, sive ex toto supprimatur.

Uſus Venæ portæ, ut ab ea rami diſtribuantur, qui aut ad nutritionem faciant, ut qui partibus naturalibus quibus Cava ramos non impertit, ſanguinem deferant: aut alicujus excrementi expurgationem, ut ramus Splenicus, qui craſſum ac ſœculentum humorem ad ſe ex trunco Venæ portæ, antequam chylus ad hepar perveniat, multo tamen laudabili ſucco perſuſum allicit, ut in Splene dicitur: Vas breve, & Hæmorrhoidalis. Alii rami ad cibi in ventriculo cocti, & in chylum commutati, & in iis alterati, & pro ſanguine PPP præparati ad Hepatis portam diſtributionem faciunt; quales ſunt venæ, quæ ad ventriculum & inteſtina, quæ Meſarai-
cæ dicuntur, mittuntur. Alii denique ſanguinem conſciunt, quales ſunt radices di-
ctæ Venæ portæ per carnem hepatis diſſeminatæ. Tota autem Vena portæ intrinſe-
cus latitat, nec ad cutim pervenit, circa podicem, ubi Hæmorrhoidas conſtituit &
in mulieribus ad cervicem uteri.

ppp Gal. 4. uſ.
par. 2. partibus
divina quæ-
dam virtutes
à conditore in-
dita: venis qui-
dem, non ſolum
deducere nutri-

mentum ex ventriculo, ſed attrahere ſimul & hepati præparare modo quo ipſum ſimillimo: quippe quæ natura ipſi ſine
adſimiles, & primum germen ex illa ducant. Ariſt. de ſpir. 4. ad inteſtina & ventrem Vena & Arteria committuntur,
quas par eſt alimentum attrahere & venis in carne, mox diſtribuendum.

De arteria cœliaca, meſenterica utraque, quæ venæ Portæ
ramos comitantur.

CAPUT XVI.

De hujus diſtributione conſule Galenum libro de diſſectione venarum & arteriarum cap. 9. 6.
admin. anat. 6. & cur venam comitetur. 5. uſ. part. 2.

Arteria magna quæ *ἀόγη* a dicitur, & de cujus origine & ſubſtantia in Thoracis
hiſtoria dicturi ſumus, è ſiniſtro cordis ventriculo: tanquam à principio ^b diſ-
penſationis & radicationis egreſſa, in duos dividitur truncos, minorem qui ſurſum
delatus per ſuperiorem thoracis partem, brachia, collum & caput diſtribuitur: ma-
jorem qui ad ſpinam deſlexus deorſum mittitur, ex quo velut omnium Arteriarum
trunco rami prodeunt, alii per inferiorem thoracis partem, alii ubi jam diaphrag-
ma ^c permeavit, per infimum ventrem propagati, antequam truncus ipſe ſubdivi-
datur, & in crura excurrat.

a *ἀόγη* Hipp.
lib. de corde
quæſi *ἀεί* *ἀόγη*
id eſt ſemper ve-
ſibilis, quod et-
iam in carne
exanguis appa-
reant: vel ut
loquitur Ariſt.
3. hiſt. an. 3.

Truncus, qui per inferiorem ventrem deſertur, ramos daum generum profert: quod nervoſa
alios, qui Venæ Cavæ ramos alios qui Venæ Portæ comitantur: de his nunc ſermo
erit. Arterias enim cum venis per totum pene corpus ^d jungi hæc tamen differen-
tia, quod Arteria candidior, craſſior, minusque plena quam Vena conſpiciatur, infra
dicitur.

quod nervoſa
ejuſ pars in mor-
tuis conſpici
poſſit. Gal. 7.
ad. an. 1. non
ἀόγη ſed *ἀόγη*
vocat. Ariſt. 3.

Arteriæ, quæ Venæ portæ ramis undique attenduntur, tres ſunt, Cœliaca, Meſenterica ſuperior [t. 14. fig. 15. t. 17. ch. 10.] & inferior
[t. 14. fig. 1. m. t. 17. ch. 6.] Meſenterica ſuperior [t. 14. fig. 15. t. 17. ch. 10.] & inferior
[t. 17. ch. 12.]

Cœlia-
3. ejus. 3. ſimpli-

citer Aorta: & 3. hiſt. an. 3. vena minor. b Hipp. de corde & de carne. Ariſt. 3. hiſt. 4. Gal. 1. uſ. par. 16. & 6. ejus. 22.
16. ejus. 2. 1. plac. 7. 6. ejus. 6. diſſ. ven. & art. an. ſanguis in art. 1. c Hipp. lib. de corde, arteria magna diaphragma
perpetrans, in ventrem inferiorem, meſenterium & inteſtina excurrit. d Gal. 5. uſ. part. 2. 6. ejus. c. 17. & pluribus a-
liis locis docet venas cum arteriis curare ſe debere.

Cœliaca [t. 14. fig. 1. m. & t. 17. ch. 6.] sic dicta quod plurimos ramos ad ventriculū mittat, arteria est insignis, quæ cum ad Portæ similitudinem ventriculo, omento, duodeno, jejuni initio, coli parti, hepatis, vesicæ biliaræ, pancreati & lieni varios ramos offerat, de ea ad imitationem Portæ agemus, suisque ramis nomina imponemus.

e Gal. 5. us.

part. 1.

f Gal. diff. ven.

9. interdum ex

una radice bi-

fariam deduci-

tur, altera ven-

triculo, lieni &

hepatis: altera

intestinis per

duo mesente-

ria.

Hæc ex Aortæ ad spinam sitæ ^e anteriore ^f corpore, cum conjuge careat, prodiens elatiori sede inferiori omento toto ductu suffuleitur & sub hepatis cavo descendens supra venæ portæ truncum in duos dividitur ramos, dextrum [t. 14. fig. 1. n.] graciliorem & sinistrum [t. 14. fig. 1. u.] paulo ampliorem, qui ex una quasi radice emergunt, & sub ventriculi posteriore sede venæ Portæ in Pancreate adnectuntur.

Dexter [t. 14. fig. 1. n.] sursum ad hepatis cavum abiens, aliquo usque progressus plures spargit ramos, alios ab elatiore, alios ab humiliore parte: ab elatiore parte,

I. Gastrica dextra [t. 14. fig. 1. d.] quæ è medio ductu prodit, furculos in ventriculi orificii dextri posteriorem sedem distribuit.

II. Cysticæ gemellæ [t. 14. fig. 1. f. fig. 2. x. t. 17. c. 8.] duæ exiguæ, ad bilis vesiculam abeunt.

Ab humiliore vero parte:

I. Epiplois dextra [t. 14. fig. 1. o. fig. 2. h.] quæ inferioris omenti dextræ sedi & colo ipsi adnexo, offertur.

II. Intestinalis [t. 14. fig. 1. q. fig. 2. d.] quæ ad duodenum & jejuni initium mittitur.

III. Gastroepiplois dextra [t. 17. fig. 1. r.] insignior ad dextram fundi ventriculi sedem retorquetur, & superiori omento innixa, in fundi ventriculi anteriora & posteriora, usque ad ejus medium ramulos frequentes spargit.

Reliquum rami dextri in hepatis superficiem parte cava [t. 14. fig. 1. t. fig. 2. y. t. 17. ch. 7.] ut vitalem ei spiritum deferat, terminatur.

Sinister ramus [t. 14. fig. 1. v.] seu Arteria Splenica obliquo & flexuoso ductu per ipsum [t. 14. fig. 2. i.] pancreas ad Lienem [t. 14. fig. 2. m.] progreditur, & dextro ramo insignior, ne facile obstruatur, cum non solum vitalis spiritus copiam lieni suggerat, verum etiam crassiorem & fœculentam spirituosi sanguinis in Aorta contenti materiam in lienem, quasi evomat & expurget, quæ Splenicæ venæ attensa, pari ratione cum ipsa soboles distribuit: ab hac enim ante divisionem parte superiore duæ prodeunt.

I. Gastrica major [t. 14. fig. 1. x.] quæ ventriculo posteriore & elatiore sede propaginem offert, à qua soboles [t. 14. fig. 1. y.] in mediam ventriculi sedem: altera Coronaria stomachica [t. 14. fig. 1. z. g.] ad orificium superius, illud coronæ instar cingit, ramulosque corpori ventriculi & stomacho tribuit.

II. Gastrica sinistra [t. 14. fig. 1. æ.] majoris est soboles, dextrorsum in ventriculi superiora exporrecta, quæ utrinque distributis furculis pylorum adit.

Ab inferiore vero parte:

I. Epiplois postica [t. 14. fig. 1. β. fig. 2. e.] prodit, quæ mox in duos valde diductos dividitur furculos, hiq; in alios, qui in inferius omentū & colon illi adnexum ppagantur.

II. Epi-

II. Epiplois sinistra [t. 14. fig. 1. r.] etiam ad inferius omentum mittitur, & in ejus latus sinistrum excurrit. Rami hujus [t. 14. fig. 1. u.] reliquum lienem accedit, & in ramum superiorem & inferiorem dividitur, & hi in alios divisi, donec plurimis ramis lienis [t. 14. fig. 1. d.] cavum attingant, & per ipsius substantiam dispergantur, unde

I. Gastroepiplois sinistra [t. 14. fig. 1. s.] ex ejus inferiore parte pullulat, quæ superiore omento suffulta dextrorsum contorquetur, ut sinistram fundi ventriculi sedem perreptet, geniculatim ramulos anteriori & posteriori parti & superiori omento largiens.

II. Vas breve arteriosum [t. 14. fig. 1. e.] ex ejus superiore parte in sinistrum fundi ventriculi latus superius inferitur.

Mesenterica vero duplex est, & utraque ab anteriore sede, superior quidem infra cœliacam, inferior vero infra spermaticas, prodit.

Superior [t. 14. fig. 1. & fig. 2. p. t. 17. ch. 10.] in superiorem ac propemodum universam mesenterii partem propagatur, suisque propaginibus numerosis in jejunum, ileon & coli partem ad dextrum renem spargitur, & Arterias mesaraicas constituit.

Inferior juxta os sacrum enata [tab. 14. fig. 2. q. t. 17. ch. 12.] humiliorem mesenterii sedem subit: ac potissimum in coli sinistram partem, ac rectum intestinum distribuitur, & cum venis ad extremum podicem descendens, Hæmorrhoidales [t. 14. fig. 2. *] constituit. Harum usus non tam calorem largiri, quam suo motu & spiritu vitali, mesenterium cum intestinis, à putredine & corruptione conservare; non desunt,

qui velint has purissimam chyli portionem ad sanguinis arteriosi generationem exsugere, & in sinistrum cordis ventriculum deferre. Verum valvulae arteriæ magnæ principio appositæ, quæ jam ab arteria in cor, & non contra, occludunt, obstare videntur.

Arteriæ plurima copia in rectina accedunt, ut purissimam chyli partem ad sanguinem

generandum idoneum exsugant & ad cor deferant: qua sententia de actione & usu Arteriarum mesaraicarum à communi opinione remota. In sinistro ventriculo cordis hunc sanguinem generari omnes fatentur: at nullus transiens à dextro in sinistrum, quare hæc materia ab intestinis desumitur, & per Arterias recta ad cor fertur. Accedit quod in foetu duæ Arteriæ umbilicales in lumborum regione Aortam ingrediuntur, quem situm considerantes veteres dixerunt arterias sanguinem arterialem ad cor infantis deferre. Valerius Gal. 3. fac. nat. & 4. us. part. dixit arterias mesaraicas portionem chyli ad se ipsas ex intestinis trahere, Val. l. 3. c. 4.

De Intestinis.

CAPUT XVII.

Intestinorum structuram explicavit Galenus, tenuium quidem 4. us. part. 17. & 5. us. par. 3. at crassorum 4. us. par. 18. ordinem vero 6. admin. an. 9. Tunicas 6. admin. anat. 9. & 4. us. par. 8. Aristoteles vero 3. par. anim. 14. & quomodo ratio intestinorum animalia inter se differant 2. hist. animal. 17. quæ ex anguibus & sanguineis tribuit 4. hist. anim. 3. vide & Isagogen Herophili Galeno adscriptam, cap. 11.

Intestina seu interanea, Græcis ἀντρώπινον, πύλον τῆς κοιλίας, quod in intima corporis sede locata sint: hæc majorem infimi ventris cavitatem implent; [situm eorum in ea derivetur] situm eorum in ea derivetur. Hæc majorem infimi ventris cavitatem implent; [situm eorum in ea derivetur] situm eorum in ea derivetur. Barbari, chordas appellant: hinc fides testudinum, cum ex arecentibus fiant intestinis, chorda dicuntur. Veteres

Comici in aera ^{rum naturalem tab. 11. & 12. exhibet} & cum ventris longitudinem plurimum superent, ^{ne vocarunt, unde antiqui exenterare.} quo in eo contineantur, variis modis convolvi [tab. 11. 12. & 15.] debuerunt, quo modo funem longum in sacculum reposituri, variis circumvolutionibus obvolvimus: hæcque Mesenterii beneficio [ut tab. 16. ostenditur] connectuntur eoque & omenti interveniu dorso colligantur, & ab illi ossis cavitatibus sustentuntur. Sunt autem corpora oblonga, & quidem communiter sexies ^b longiora eo homine, cujus sunt intestina: teretia, globosa, quo capaciora sint, minusque injuriis externis obnoxia: concava, sed non æque capacia: conversionibus ^c orbiculatis donata (excepto ipsorum principio [t. 15. fig. 1. e. 2.] & fine, ne ingressum & exitum impediatur) ne alimentum ^e ocyus elaboratur, non absoluta chyli distributione, & sic subito ^e alium adsumere cogat, sicque gulositatem infatigabilem suggerat: & ut loquitur Plato, a Philosophia & Musis revocet; quemadmodum ea animalia, quorum intestina a ^e ventriculo ad anum aut recta aut laxa sunt, infatigabilia & gulosa sunt, cum laxitas ^d intestini aviditatem cibi augeat, rectitudo aviditatem acceleret (hinc Aristoreli ^d voracia dicuntur) quare quæ continentiora ^d esse convenit, hæc anfractus plures habent: tum ut fæces contineant, ne crebrius ejicere necesse sit more animalium voracium, quæ ut assidue pascuntur, sic assidue egerunt, sed per longam intervallam reddamus. Quæ cum ventriculi orificio dextro seu pyloro continuantur, propter connexionem, non quod ab eo exoriantur: sunt enim substantiæ ^e tenuioris, & tunicarum situs in ventriculo & intestinis variat, cum intestinorum interna carnosa sit, quæ in ventriculo media est: quod & fibræ ostendunt, quæ in ventriculo quidem & gula eadem sunt, in intestinis vero non item. Sic ob innumeras venas, quas jejunum & ileon habent insertas, brevi tempore quam plurimum, & per plurimas venas alimentum hepatis adsumit: quod non fieret, si alius secundus ventriculus priorem exciperet: tot enim venarum orificia applicari non possent, sicque tarda & diuturna fieret distributio, & plurima alimenti pars, venarum apprehensiones effugeret.

Et licet ab orificio dextro ventriculi ad anum usque ^f unus sit ductus, ita ut unum tantum dici possit Intestinum; tamen cum substantia, figura, situ, magnitudine & anfractu numero & officio variet, idcirco plura esse dicuntur: at ratione substantiæ duo constituentur Intestina, Gracile ^h sive tenue & Crassum: sive amplum.

Gracilia [t. 15. fig. 1.] quæ & tenuia ob membranarum tenuitatem dicta, Plauto lactes, tria sunt, duodenum, jejunum & ileon, quæ licet eandem propemodum amplitudinem servant, tamen situ, longitudine & venis mesaraicis distincta inter oscuntur: & jejunum circa principium, qua dorso connectitur, interdum amplius observatur.

Crassa

rum substantia, haud multum a ventriculo diversa est. Columba, substantia nervosa ventriculi substantia non dissimilis. Fallop. substantia omnium nervosa. & Arist. 2. hist. an. 17. g Hipp. duo, colon & rectum. Polluci quinque primo praterito & Gal. 6. loc. aff. 2. Intestinorum natura quatenus intestina eadem est, sed magnitudine & anfractu numero evariat: elephantis latissima: sui in multos orbes convolutum & longissimum, 6. ad. an. 9. h Mince & in pæ Gal. rigo lacio, quod chylum alluciant: pantes etiam prisco vocabulo nominant. Laurent. i Hipp. de gland. pæ ræda vocat etiam intestina inferiora, quæ serous colligunt, libro de carnibus. Aristoreli pinguis.

Crassa quæ sic dicta, quod membranam crassiorem habeant, tria quoque sunt [t. 15. fig. 2. & 3.] cæcum, colon & rectum, situ, figura, magnitudine & figura differentia, quorum colon & rectum illis capaciora sunt: quare veteres & in sex divisere. Ratione figuræ, alia recta, ut duodenum & rectum; cætera anfractibus donata: ratione officii, quædam chylo & perficiendo ^k & distribuendo destinata, tenuia nimirum ^{k Gal. 4. us. par. 17. & 18.} & angustiora, quo minima cibi portio ab ipsorum tunica & vasis tangatur: quædam facibus colligendis dicata, ut sunt crassa.

Ipsa tenuia, partim ut nobiliora mediam [tab. 12. R. S. T. tab. 16. CCCC.] sedem totam fere umbilicalem, & hypogastrii regionem occupant (secus vero in canibus ^{1 Hipp. de carn. inferiora intestina vocas quæ facies colligunt.} unde veteres tenuia ¹ superiora, crassa inferiora, quod humanis corporibus non convenit; cum colon eminentiorem sedem occupet, dixere) partim vero, ut Mesenterii centro [t. 16. H.] sint proxima, quo venarum & arteriarum mesentericus ramus brevi spatio ad ea feratur, & chylum cito ad hepar transferant: crassa vero ad latera [t. 12. & 15. fig. 2. t. 16. EEEE.] locata, partim ut tenuibus cedant (& colon etiam ventriculi [t. 12. E.] fundo annexum) partim ut valli instar tenuia & circumdant & tueantur, ne comprimantur, quare etiam à sinistris infra lienem instar pulvinaris tenuia suffulciunt: hæc etiam illis, ut multa colligere possint, ampliora sunt.

Gracilium primum [t. 15. fig. 1. 1. ad K.] quod ab Herophilo ^m ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³

reperiatur, idq; propter mesaraicas * innumerabiles & magnitudine insignes chylum attrahentes, quæ prope intestini tunicam interiorē *ἀνωστον* osculifve inhiant: innumerabiles sunt (quemadmodum & arteriarum) ut si quid y alimenti in transitu per primam circumvolutionem effugiat, per alteram ora vasorum, quæ elaboratum & coctum succum rapere debent, contingat: si hanc quoque per tertiam, vel quartam, vel aliquam sequentium, & sic tandem alimentum ipsis venarum osculis occurere cogat: unde fieri nequit, ut y corporibus naturaliter se habentibus, succus nutriendo idoneus elaboratur. Dein, propter hepatis viciniam promptissime alimentum rapientis. Tum, quia chylus præteriens adhuc fluidus est. ^{aa} Principium [tab. 15. fig. 1. M.] ipsius à dextris sub colo ubi intestina convolvi incipiunt, coloris est lividi: supra umbilicum, cujus totam fere regionem occupat, multifariam in ^{bb} orbem convolutum, situm, in Ileon finit, & longitudine duodecim palmos & tres digitos: latitudine, si non inflatum sit, digitum parvum æquat. In cujus principium ^{cc} seu duodeni finem [t. 15. fig. 1. L.] Porus bilarius inferitur, ut postquam chylus jam præterlapsus, bilem ab hepate deferat, qui sua acrimonia intestina irriter, ut ad fæces contentas expellendas & pituitam lentam adhaerentem deturbandam insurgant: unde quoque fit ut reliquis inanius inter ^{cc} diffecandum occurrat.

Tertium, quod ^{cc} *λεπτόν*, tenue, propter membranarum tenuitatem & *εἰλεόν*, *ἀνώστον*, circumvolvendo quasi intestinum circumvolutum dicas, & volvulus, ob plures circumvolutiones ad longiorem cibi moram utiles, qui & Ileo morbo si ve Iliaca passione, ex ejus inflammatione vel obstructione ortæ nomen dedit. Subter umbilicum ad ilia & coxas utrinque situm est; quod licet jejuno continuum sit, & substantia ^{ff} simile, differt tamen, quod angustius appareat, neque ^{ss} vacuum reperiatur, neq; tot vasis scateat: quare ejus principium ubi intestinum rubere ^{hh} incipit, & pauciores minoresque mesaraicæ inferuntur, quod sub dextro rene à crasso amploque intestino, quod instar globi [t. 15. fig. 1. O.] cujusdam præmagni extuberat, excipitur, & in ipsius latus sinistrum, ubi duo foramina obtinet, unum Ileo continuum, alterum vero humilium cui cæcum jungitur, finit [t. 15. fig. 1. 2. 3. N.] Estque intestinum longissimum, palmum unum & viginti excedens: vel ut Ruffus tredecim cubitorum: imo omnium intestinorum simul junctorum longitudinem duplo superans, in latitudine digitum æquans. Et cum intestinum hoc solum in scrotum ⁱⁱ delabi possit, solum etiam Herniam intestinale causabit.

Crasso-

Laur. acrimoniam tertiam causam statuunt. ^{bb} Gal. 6. ad. an. 9. ^{cc} Gal. 5. us. part. 3. ^{cc} 4. in exor. tum paulo supra jejunum inferitur. Vesal. Fallop. & Laur. in duodenum. At Columb. ad intestina & jejuni summitatem. Piccolhom. in duodeni finem. ^{cc} Gal. 6. ad. an. 9. 5. us. par. 3. diff. ven. 1. in introd. 11. *λεπτόν* *ἐν τῷ* *ἐν τῷ*. ^{ff} Gal. 6. ad. an. 9. ^{gg} In introduct. 11. Vesal. nihil minus jejunum ab Ileo, quam inanitione dirimi potest, neque minus duodenum quam jejunum inane reperitur. ^{hh} Vesalio jejuni initium rubicundius, ilei finis magis albicat: jejuni initium forte inter secandum magis inane Ilei termino: ac in medio ducta omnia sunt media: quare ubi Ilei initium sit statuendum non satis conjicere valeo. Columbo, utriusque eadem substantia, idem color: horum discrimen investigo mesaraicis quæ in jejunio majores & frequentiores. Laurentius his tribus notis distinguit, jejunum pluribus scatet vasis, paulo est rubicundius & vacuum magis apparet. Riol. rubicundius est ob hepatis viciniam & ilei principium, ubi intestinum angustius & lividius esse incipit. ⁱⁱ Ileon stercore plenum non raro in scrotum delabatur, & propter stercoreis duritiem intro remeare non potest. Quare falsum cibi reliquias stercoreis formam, cum primum cæcum attingerint acquirere. Probatur rupturæ & Iliacæ passione, ubi stercore vomitione rejicitur: non enim à cæco reslit in Ileon, quia à nullo crassorum ne statim quidem in tenuia remeare potest. Piccolhom.

Crassorum ^{kk} intestinorum initium [*tab. 15. fig. 1. 2. 3. O.*] est, ubi à dextris instar globi cuiusdam prae grandis extuberant, unde appendix ^{ll} propendit, quod crassorum est primum, & *πυλων*, ^{mm} caecum [*tab. 15. fig. 1. 2. 3. P.*] dicitur, & ab obscuro usu nomen habet, alii monoculus, quod unum tantum foramen habeat; cui nonnulli ⁿⁿ duo tribuunt, quæ in eadem sint superficie, adeo tenui interstitio distincta, ut unum videatur: verum unum Ilei intestini [*tab. 15. fig. 1. 2. 3. N.*] terminis est, alterum vero cæci seu appendicis initium. Hoc ex duobus * capitibus Ilei sine [*tab. 15. fig. 1. 2. 3. N. & O.*] & coli principio (nisi mavelis in hoc coli intestini extremum desinere, cui, ubi enascatur, ileon continetur.) substantia satis crassa ortum ducit: in homine quidem appendix tenuis ^{oo} oblonga & crassiori [*tab. 15. fig. 1. 2. 3. P.*] lumbrico convoluta, vel cuidam parvo sacco (unde & sacculus dicitur) acuminato similis, cæteris omnibus intestinis angustius & arcuius: longitudinem quatuor digitorum & latitudinem pollicis æquans, reni dextro, mediante peritonæo, à mesenterio omni libera, adne- ^{mm} *Arist. 3. part. an. 14.* ditur † in canibus nō item, quibus multo amplius est, & ortu nonnihil ab homini variat, cum in canibus ex dextra magis, quam sinistra coli initii sede principium ducat. Verum Galenus videtur appendicem hanc, quæ velut ipsius coli appendix existit, ⁿⁿ *Sunt qui non unum* caecum pp vocasse (unde ex veteribus aliqui in brutis tria, in homine duo intestina crassa constituunt) sed id, quod à tenuium intestinorum infertione ad colon pp usque porrigitur, & globi alicujus [*tab. 15. fig. 2. ad O.*] ampli instar extuberat, pro cæci intestino sumpere; quare Galenus ** caecum ad dextram dixit, ad sinistram autem colon emergere per dextra prius illa sursum ductum. Hoc veterum caecum, quod coli initium dicimus, in similibus, canibus, suis & bobus maximum existit, quibus prodesse videtur, ne cum prona incedant, in maximis ad anteriora motibus faeces ad tenuia recurrant. Et in quibusdam hominibus illa globo similis extuberantia aliquando amplissima & ipsi ventriculo pene æqualis observata fuit. Usus cæci qq dixit Galenus, coli initium intelligens, cum sit veluti venter quidam crassus, ut excrementa recipiat; ut si quid in transitu per tenue intestinum distributionem fefellerit, ^{ll} *sunt, per unum ileo vicinum.*

H. 3.

lerit,

in cæci capacitatem chylosa materia ingreditur: per alterum colo viciniori, stercus egreditur Piccolhom. * Hoc voluit Ruffus Ephesius l. 1. c. 27. dum scribit, ex gracili biceps prodit exortus, vocatur autem altera ejus pars: caecum, quoniam revera caecum est, altera colon & venter inferior: id Homerus *πυλων* appellat. ^{oo} Coli pars videtur, cui sua adest appendix. Columb. Colon in duos quasi ramos dividi videtur, alterum caecum, sed breve, alterum vero ileon producens Fallop. Colon habet quandam appendicem veluti sacculum oblongum, altera sui extremitate perforatum, caecum appellatum, Varol. Appendix hac lumbrici speciei, intestino cæci appendix est, in qua multa asservantur, non per dies tantum, sed etiam per menses: sic cæcorum nucleos post quartum mensem rejectos vidi Laurent. † Galenus voluit, solum caecum omni vinculo solutum esse, ob id facile in scrotum delabi. pp alius Pollux hoc intellexit, dum ait: quod utrinque tenuis illius intestini termino annexum est, intestinum caecum nominatur, tergo quidem adhaerens, sed iuxta dextrum lumbum jacentis: & Ruffus l. 2. c. 11. caecum recta in duplum inguem spectans. Gal. 4. usque part. 18. sic & Columb. Non ignoro, quod hodie plerique contradiciant, decepti, quod inter crassiora intestina censent id, ubi coli initium Galeno recensetur, ac si amplius quippiam sacculus esset. Galenus suas caudatas simias fecit, quæ appendice hac destituntur: At veteres qui homines secuerunt, appendicem hanc caecum appellarunt. Hæc Vesalius ** caecum instar alterius ventriculi, magnum describit, nulla facta mentione epiphyseos membranosa, quam primus Carpus detexit: Sylvius existimat caecum intestinum in appendiculam contorto lumbrico similem degenerasse quia invenerit in multo cæci crassitie minoris digiti & solidum, quibus ab ileo mox in colon stercus transit. At Massa, in multis caecum amplum non invenit, sed ejus loco appendicem oblongam, quæ in illis quibus caecum amplum obrigit, non reperitur. qq Alimento recipiendo accommodatum dicitur in introduct. 11. & Piccolhom. voluit caecum datum, ne quid humidi, liquidi ve alimenti disperdatur, sed in illud tanquam in sacculum conjectum asservetur, dum in secur rapiatur.

lerit, & venas mesaraicas sit præterlapsum, id omne diuturna in cæco mora plane ex-
fugatur. Verum appendicis hujus usus est, dum fœtus in utero continetur, ut fæces
plurimæ & liquidiores, quæ pluribus mensibus collectæ sunt, excipiat, ubi vero adul-
tiores facti, quia proportionē habitæ fæces in colo minor copia colliguntur, nec non
aridiores & crassiores sunt, hujus appendicis usus cessat, quia fæces plurimum dimi-
nutæ, ut recte Constantinus, non amplius ad ipsum propelluntur, unde ut pluri-
mum contractus remanet, eadem quidem longitudine, sed non latitudine, qua in-
fantia præditus erat, quemadmodum cum umbilicalibus vasis fieri supra ostendi-
mus.

Secundum crassorum [*tab. 15. figur. 1. & 3. ab O. ad Z. tab. 12. ab I. ad O. tab. 16. EEEE.*]
quod laxius ^{rr} est intestinum, καλον, ^{ss} colon dicitur, à καλῶς retardo, quod ratio-
ne cellulatum [*tab. 15. figur. 2. 3. TT.*] quibus varie extumescit, fæces remoretur: vel ^{tt}
ubi ^{tt} cras- sum vocat ^{tt} τὴν καλὰς καὶ τὴν ἀσπιδίου † à torquendo, propter dolorem colicum, sive tormina quæ in eo fiunt:
9. laxius inte- stinum, quod colon dicitur. hujus principium cæcum [*tab. 15. figur. 1. 2. O.*] veteribus dictum, amplum est, & capa-
cius multo, quam alia in parte, & rotundum. Hoc in dextro ilio situm [*tab. 12. ab I.*
Arist. 3. par. 14. ad K.] cum ^{tt} ibi idoneum locum vacuum habeat, rene dextro altius appenso, cui ad-
hæret, & sub hepate bilis vesiculam contingens (cui aliquando etiam necitur, ejus-
que contactu quandoque luteo colore, idque forte ob bilis tenuioris transudatio-
nem, tingitur) sursum reflectitur & convolutum transversim sub ^{uu} ventriculi [*tab.*
12. à H. ad L.] fundo cui omenti interventu connectitur (hinc alvo minus responden-
te à fœtore in ea coli parte retentorum, appetitus prostermitur) & supra gracilia inte-
stina (ut hac ratione eminentiorem ^{xx} sedem obrineat, sed non in cane) progre-
diens ad sinistra splenis [*tab. 12. G.*] tenuissimis membranis necitur cavo à liene ad
os pubis [*t. 12. ab L. ad M.*] mox in posteriora flectitur ad renem sinistrum, cui firmiter
5. us. part. 3. diff. alligatur (hinc fit, quod sæpe nephriticus dolor ^{yy} cum colico confundatur,) & ar-
cus Scythici speciem exhibet: sed hoc in loco angustius est, ne splenem comprimat,
quare quibus splen tumet, flatus vix erumpunt, nisi splen premarur: cellulis carer: &
rursus sinistrorsum, quasi ad umbilici [*tab. 15. figur. 2. & 3. ab S. ad T.*] sedem ascen-
dit anfractum constituens ad ossis sacri initium delatus, ea fere regione, qua in alte-
ra asurgebat, recta in [*tab. 12. N.*] rectum desinit, à quo angustia ^{zz} quadam veluti
strictim premente [*tab. 15. figur. 2. à T. ad T.*] vinculo disjungitur: & ob hunc anfra-
ctum qui à sinistris est, hoc loci doloris colici cruciatus gravissimi fiunt, partim ob
flatus, partim ob excrementa in angusto conclusa: quo in etiam vermes sæpe col-
liguntur misere ægrum torquentes: nonnunquam ob humores putridos collectos
abscef-
plenum.

^{tt} Gal. 4. us. part. 18. ^{uu} Colon procedens in dextrum supra umbilicum inter jecur & lienem deorsum rursus fertur,
totumque amplexum abdomen in rectum intestinum desinit Gal. introduct. 11. Aliis visum eum conscendere, & super
equitare, Vesal. non supra ventriculum, ut Mundinus voluit, qui calide commentus erat, dum excrementa in hoc inte-
stino detinentur, ventriculi coctionem adjuvari, Colum. Colon ad ventriculi fundum ascendit, cui superequitat ad
alterum latus, & c. Fallop. fundo ventriculi infernitur Piccolhom. ^{xx} Talis situs propter nutritionem & coctionem,
cum multa alimenta dura assumantur, qua nec ventriculus nec tenuia intestina satis conficere possunt, hac in coli an-
fractibus detinentur, & cum colon ventriculo & hepatis tanquam fonti caloris infernatur, concoquuntur, & apta ad
alendum reddantur, unde à mesaraicis rapiuntur. Piccolhom. ^{yy} Gal. 6. affect. 2. ^{zz} Gal. 1. loc. aff. 1. ortum supra in-
guina parvum, at suppuratum cum jam medicus incideret, stercus subsecutum, in colo abscessum esse declaravit.
Hic locus propter clysteres & colicos cruciatus à Medicis considerandus, quod & Vesal. monet.

abscessus^{zz} genitos & per cutem maturatos (ubi & stercora excreta) eosdemque curatos vidimus. Er quia à splene usque ad intestini recti principium mesenterio non jungitur, à quo non secus ac cætera intestina humectari potuisset, idcirco extrinsecus secundum ejus longitudinem pinguedo cænoſa adposita, quo ad faciliorem fecum depulsionem humectetur. Hujus longitudo [demonstratur tab. 15. fig. 2. & 3.] est circiter palmarum septem totidemque digitorum, & in latitudine pugni magnitudinem æquat.

Amplissimum est omnium, quo flatuum, quos sæpius rugire audimus, in prima coctione tam in ventriculo, quam intestinis genitorum, & portionis chyli inutilis & feculenti, quæ versus tenuium intestinorum finem remanserat, sit receptaculum, ne fæces^{aaa} assidue dejicere cogamur, quemadmodum continuo intra corpus ex nutritione segregamur, sed multa copia contineantur, & convenienti tempore excernantur: ad quod ipsius [tab. 12. Q. Q. tab. 15. figur. 2. 3. XX.] cellulæ^{aaa} plurimum faciunt. Hinc aves^{bbb} quædam, quarum intestinum fornices has non habet, subinde excernunt, quare & inferiorem ventrem quidam nominant. Ne ergo impetu elabantur, vel vim expultricem perpetuo stimulent, sursum primo [tab. 15. figur. 2. & 3. ab O. ad Q.] fertur, dein deorsum vergens iterum prope finem [tab. 15. figur. 2. & 3. ab S. ad T.] ad superiora reflectitur istar S. Romani: idcirco communiter excrementa bis reddere cogimur, primamq; dejectionē altera statim sequitur. Et quia amplum; idcirco^{ccc} Ligamentis duobus fortib. donatur: altero, quo supernis, altero quo infernis partibus valide alligatur, & beneficio membranæ externæ, ab inferiore omenti membrana enatæ, dorso jungitur, quo modo reliqua intestina mesenterii interveni-
tu dorso colligantur; at in canibus nulla ex parte omento alligatur, & ligamentis hisce caret. Præterea beneficio omenti seu vinculi, ipsum ventriculo & lieni ne infra umbilicum decidat, connectitur. Si enim ut tenuia, angustum foret, distentum perpetuo torqueretur.

Sed quia ex ventris compressione, quæ per musculos abdominis fit adjuvante diaphragmate, in alvi excretionem, non minus fæces, putridique status ex Colo in ileon relabi (cum ex ileo [tab. 13. figur. 3. ab N. ad O.] sursum in Colon ferantur) poterant, chylique distributionem perturbare, ac vomitum stercoraceum provocare; quam per inferius foramen exire: quemadmodum in Iliaca fit passione, ubi intestinum tenue digito longius in se mutuo ingressum & implexum, tantam alui constipationem causat, ut cibus non descendat, per vomitum fæces liquidæ stercoris nidore inquinatæ, dein & stercus, non tamen ex erassis rejiciantur. Quare * VALVULA ad-

posita
Leidenſis: alii
vix semel atq;
iterum à me

observatam voluit: alii ut Patavinæ scholæ Anatomica lumina, Aquapendens & Placentius (absit invidia dicto) in demonstrationibus Anatomicis, ejus inventionem mihi tribuere solebant. Alii Andernacum invenisse voluit, sed locum eos ostendere vellem, cum in sua Medicina per dialogos edita, ne verbum extare asserere possim. Riolanus asserit, Varolium ante natum Bauhinum (parcius) descripsisse & post eum Salomonem Albertum: de his paucis, suo loco plenius: An Varolius inventor fuerit, me ignorare fateor: at hoc assero ipsius scripta primum circa annum 1591. à Cl. Ioh. Baptista Corresio, nunc Panormi in Sicilia medico professore edita & ab ipso mihi oblata fuisse, cum jam annis undecim Anatomis presuissem, in quibus Valvula hujus descriptionem reperi: Sed non ante Bauhinum natum, cum is Bononia vixerit, cum cum Patavii studiorum cursu versarer: sed levia hac relinquamus, modo inventa sit, & magis servata. Remus: & brevibus quæ de hac habentur subnectamus. Varoli verba: ubi Ilium jungitur Colo, protuberat ex parte in-

terna membrana quadam, quæ est ultimus finis Ilii, eo usque producti, quam ego ejusdem inventor operculum Ilii appello: unde feces ex compressione ad superiora regurgitantes, operculum prædictum supra Ilii foramen reclinant atque claudunt, atque ita superiora petere nequeunt. Salomon Albertus in suis orationibus anno 1584. editis, intra capacitatem, ait, intestini, ubi Ileum & Colon sunt contermina, jam in secundo cadavere sese exhibuit Valvula, satis crassa, firma ac rigida, quæ ita Ilei foribus obderetur, ut feces illabenti jam exsucta ab intestinis gracilibus cedere possit, nam intro spectat margini coli quæ id dextro reni & femur moventi musculo objacet affirmata. Piccolhomini in suis prælect. Anatom. anno 1586. editis: Valvula tres quemadmodum in corde, ad Cæcum intestinum sunt addita, tanquam ostiola quadam deorsum spectantes, ut materiam intestinis gracilibus inclusam deorsum illabi sinant, & ne sursum resiliere possit impediunt. Ioan. Sigfridus in suis Anatomicis anno 1598. editis: Valvula quadam insignis ad ingressum ex Ileo in Colon &c. Laurentii verba in textu habentur. Greg. Horstius lib. de nat. hum. in primis his consideranda Valvula ad Cæcum intestinum addita, de qua vide Bauhinum & Archangelum. Knoblochius in disp. anat. alii Valvulas tres defendunt, ut Archangelus, alii unam, vide Bauhin. lib. de part. caef. & lib. de part. simil. Cap. Bartholinus in anat. ad Coli initium apponitur Valvula crassa & membranosa satis, à Bauhino inventa, sursum spectans, non deorsum ut scribit Laurentius, &c.

posita est Coli [t. 15. fig. 3. †] principio, ubi Ilio id jungitur, quam ab Anno 1579. in omnibus nostris Anatomis hæcenus (& quidem antequam ullum legerimus, qui hujus meminerit) demonstravimus; quæ membranosa & crassa est, orbicularis & circularis sursumque spectat, cum cibi excrementa ex Ilio in Colon non descensu, sed ascensu [t. 15. fig. 1. 2. 3. ab N. ad O.] ferantur: hæc facili labore invenitur, si aqua per Rectum intestinum infundatur, & una cum Colo suspensum teneatur, nihil enim aquæ, imo ne flatus, nisi vi adigas, pertransire videbis: eandem quoque expurgatis intestinis invenies, sed jam à transfusione aquæ, cum id requiratur ad eorum expurgationem, labefactam. Hinc & ipsorum Clysmatum materia, etiam Galeno^{ddd} docente ad tenuia naturaliter pervenire nequit, etsi eorum vis medicamentosa etiam altius subire possit. Hanc Andreas Laurentius in novo suo & elegantissimo opere Anatomico his verbis descripsit: Ad Coli principium Valvulam sæpe observavimus, deorsum spectantem hostioli instar, quam eleganter descripsit Bauhinus (pro hac honorifica nostri mentione, gratiam debemus) hæc facum & inutiliam humorum refluxum ad supernas partes prohibet, quare Varolus operculum Ilei Piccolhomini cæci valvulas vocat; hicque tres esse scribit, Substantia Coli cæteris est carnosior, pluribus cellulis [t. 12. Q. Q. t. 15. fig. 2. 3. TT.] seu concameratis concavitatibus, quæ variis extuberantiis inæquale reddunt, donatur, tu si quid duriusculum ad alendum idoneum, nec nec in ventriculo, nec in tenuibus intestinis satis concoctum ad Colon pervenerit, in ejus cellulis diutius hærens concoquatur, quatenus Colon ab Hepatis [t. 12. ad CC.] & ventriculi calore (hæc enim causa ipsius situs) foveatur & concoctum à venis mesaraicis exsugatur. At gracilia cellulis carent, ne chyli excrementa in iis retineantur, chyli distributio impediatur, neve majorem locum occupent. Ne vero cellulae hæc dissolvantur, per hujus mediam & superiorem partem, secundum ejus longitudinem Vinculum (eleganter à Laurentio descriptum) latitudine medii digiti excurrit, quo laxato aut rupto, statim dissolvuntur. Ubi vero ad Rectum accedit, teres [t. 15. fig. 2. & 3. V.] red- dicitur (cujusmodi colon in canibus est) quo facilius excrementa, imo & flatus, qui modo taciti, modo cum crepitu exeunt, excludantur, & in portionem angustam & rectam definit.

Tertium crassorum [t. 12. O ipsius initium sub vesica fundo, t. 11. f. 2. 3. Z. & t. 16. F. G.] Rectum

ddd Sic inquit
5. meth. med. 11.
superioribus in
testinis ulcera-
ris, utendum est
medicamentis
per os assumptis
quod enim per
sedem injicitur
ad ea quæ sunt
vicina ventri-
culo subire ne-
quit. Sic. 13.
meth. 17. quæ
per sedem infu-
sa sunt, ea om-
nino ad jejuni-
um usque ascen-
dere nequeunt:
imo si admodum
nitari, fortasse
tenuæ tantum
intestinum con-
tingent.

Al Interna ex- rimum cocta & attenuata. Harum prima [t. 15. fig. 4. ff.] seu exterior, ^{III} membrano-
zior, membrano sa, valida tamen, majori ex parte fibris transversis donata; fibris etiam carnosis perfu-
sa magis ac du- sa, ut calorem augeat, ad portiones chyli minus elaboratas præterlabentes conco-
rior est, Vesal. quendas, utque Musculorum instar intestina contrahant, ad exigua quædam, quæ
externa cras- abdominis compressione excludi non potuere, expellenda: huic superinducitur,
sior quam inte- veluti velum quoddam spissum, tenuissimum tamen, ex fibris rectis quamplurimis
rior, quanquã textum.

contrarium as- Altera interior, [t. 15. fig. 4.] in tenuibus magis tamen in jejunio quam ileo, ^{mm} ru-
serat Vesalius, gosa (in colo, rugæ sunt in cellulas expansæ) ut chylum delabentem moderate re-
estque carnosã, moretur, ut si portio aliqua minus sit elaborata, concoquatur; dein, ut à venis com-
Fallop. exterior mode absorberi possit; rugæ hæ transversæ, hanc, illa siue exteriori (& quidem qui-
tunica propria busdam locis duplo triplove) longiorem reddunt, idcirco quoque rugari debuit:
intestinarum, quæ rugæ mobiles ex uno loco in alium propelli possunt, ut moderate & non violen-
crassior est in- ter, chylum retineant. Est quoque nervosa, sed carnosã apparet, propter crassam
terna, Piccol- membranæ speciem exhibentem, ex tertiæ coctionis excrementis ipsorum intesti-
hom. interior norum genitam, eam succingentem, ne ora Mesaraicarum in interiori tunicam
nervosa, Laur. provenientia, obstruantur; ne interior tunica ex perpetuo chyli transitu, quemad-
mm Fallo- modum & Venarum ora callosa reddantur, cum per eam veluti per filtrum, tenuior
pius assimilat chyli portio à venis mesaraicis exsucta, transcoletur: quæ forte substantia, Valvulæ
cuti exteriori officio fungitur, & chyli refluxum impedit. Utraque tamen tunica propria, ad fi-
pudendi virilis nem Coli & in recto crassior & densior est.
ha non solum

inverso intesti- Fibras habent omnis ⁿⁿ generis quæ ipsis robur addunt: interior, obliquas, ut
no conspicuun- retineat: media, ^{ooo} transversas, ut expellat: rectæ pauciores ad PPP transversarum
tur, sed etiam tutelam, ne à sese PPP mutuo divellantur, additæ: quare extrinsecus à rectis veluti
non exverso digi- ligamento colligantur; quemadmodum fasciis circularibus retinendis vinula rectæ
tis percipiuntur injicimus: ipsisque fibris post dysenteriam cruentam erosæ & consumptis, alvi fluxus
dum in exteriori- involuntarius sequi solet. Sed rectæ in tenuibus pauciores, in crassis ut in colo se-
ribus intesti- cundum ejus impressiones plures: in recto, propter multa & dura excrementa illic
num ipsum congesta maximæ sunt.
comprimimus:

si quoque statu Vasa [t. 13. hæc ostendit.] obtinent. Venas qqq quidem à vena [t. 13.] portæ; Ar-
turgidum luci terias, à Cœliaco [t. 14.] ramo & Mesenterico; ad duodenum enim & jejuni prin-
exponatur ap- cipium Intestinalis longo ductu mittitur: jejunum vero & ileon, & coli pars à dex-
parent. Piccol- tro ileo ad renem sinistram, Mesaraicas [t. 13. ddd. 14. fig. 2. 000.] obtinent, quæ per ge-
hominis rugo- minas mesenterii tunicas, ex ipsius quasi centro ex alto latusum & obliquo ductu fe-
sam, ait, depre- runtur. Venæ quidem, ^{rrr} ut chylum ab intestinis ad hepar deferant, & ab hoc san-
bendes, s; ab ex- guinem pro eorum alimento referant. Arteriæ, ut sanguine vitali perfundant, &
teriore dujun- earum motu perpetuo, à corruptione & putredine conserventur, quamvis & cibi
xeris, eam du- modicum assumere dixerit Galenus ^{fff} ad reliquam vero coli partem & rectum in-
plo triplove lon- testinum
giorem compe-
ries omni genas
fibras consecu-
ta est, ex s; obli-
qua sint conspe-
ctiores

ⁿⁿⁿ Non tantum transversis constant ut opinati sunt Anatomici, sed omni fibrarum genere, Fallop. ^{ooo} Gal. 4.
us part. 8. villos transversos habent, ad impellendum idoneos, attractrice enim non indigebant & 6. ad. an. 7. pleraque
circulares sunt, pauca recta ipsis superposita sunt. ppp Gal. 4. us. part. 17. qqq Arist. de spirit. 4. ^{rrr} cum obli-
quo ductu inter duas tunicas vena feruntur, idcirco non rubet chylus permissione sanguinis in intestinis. Laur.
^{fff} 4. us. part. 17. Vesal. & hæc mihi ex intestinis aliquid elicere videntur.

testinum à Mesenterica vena sinistra, & Mesenterica arteria inferiore recta produ-
cuntur. Verum Recti finem, venæ duplices cingunt, altera, à Venæ portæ ramo
Mesenterico sinistro, quæ aliquando à Splenico ramo propagatur. Altera, à Venæ
cavæ ramo Hypogastrico: & illa Hæmorrhoidalem internam, hæc vero externam
constituit. Sic & Arterix duplices, altera à Mesenterica inferiore, (altera sed non
semper) ab Hypogastrica prodit, & hæc quoque Hæmorrhoidales dici possent. Ner-
vos à sexto nervorum pari; duodenum quidem, exiguos à stomachicis pylorum
cingentibus, cætera vero intestina utrinque à ramo, qui radicibus costarum expor-
tigitur, infinitos surculos acquirunt, unde sensum acutissimum habent, quo bilis &
excrementorum stimulationem sentiant, quem mucus oblinens hebetiorem reddi-
dit: At recti fini five ano, nervi quatuor à quinta conjugatione ossis sacri infigun-
tur: hinc exquisitus ejus sensus, & insignis pruritus, ob bilis affusionem, vel asca-
rides: hinc quoque in tenesmo, insignis molestia præsentitur extrinsecus.

Pinguedine quæ pituita est naturalis excrementitia sed utilis obducuntur extrinse-
cus, intrinsecus vero mucus oblinuntur, & scitilium ^{tit} vasorum modo invitantur, quo ^{tit} Ex Rhafi:
propter lubricitatē ^{uuu} citius alvi faeces præcipitentur (sunt qui ^{xxx} velint colon intus ^{at Piccolhom.}
adipe infarctum esse) & ne ob exquisitissimum eorum sensum perpetuo irritentur: ^{vult in crassis}
quemadmodum autem pituita hæc intestina oblinendo hominem præservat, ne ob ^{verum esse adi-}
bilis acrimoniam semper, vel frequentissime Colica biliola laboret: sic ipsa bilis, ^{pem, in gracili-}
quæ quoque naturalis excrementitia & utilis est, eundem præservat ne Colica ab ^{bis humidita-}
obstructione corripiatur, dum sua acrimoniam intestinorum facultatem expultricem, ^{rem. Varolus,}
à pituita oblinente pigram redditam ad fœces excernendas clysteris instar stimu- ^{hunc hunc mu-}
lat. ^{cum pinguedi-}
^{nem canosam}
^{appellat. Lau-}
^{rentius, pin-}
^{guem & con-}
^{cremum heumo-}
^{rem.}

Ufus intestinorum communis, ut sint instar terræ ^{yyy} partibus alendis: nam ut
in terra est alimentum plantarum, unde radicibus attrahunt; sic in intestinis chylus
est, quem radices Mesaraicarum exsugunt, ut hominem nutriant. Dein intestino-
rum tenuium, ut sint instrumenta distributionis ^{zzz} alimenti, aliud enim coquen-
di ^{zzz} aliud distribuendi instrumentum esse debuit; (si enim idem fuissent, facile
venæ simul cum elaborato, crudum alimentum adsumpissent) quare hanc ob cau-
sam facta sunt: siquidem chylus in ventriculo confectus, ad alias partes utiles ab ex-
crementitiis segregari, quod per venas fit mesaraicas: quæ tamen ex ventriculo om-
nem exsugere non poterant, ob chyli copiam, quæ venarum oscula obturaret, eo
modo, quo multa aqua phialæ inclusa, eadem inversa, ex angusto orificio, aut nul-
lo modo, aut guttatim & difficilime exit; quare oportuit chylum longissimo ductu
protrahi, ita ut in quolibet loco exigua quantitate contineretur, tunc enim portio
conveniens per oscula vasorum attrahitur. Idcirco ex pyloro, intestina tenuia &
longissima dependent, ad quæ chylus ex ventriculo transmittitur, & per eorum
longitudinem distribuitur. Verum in ipso transitu ^{zzz} coquitur adhuc alimentum,
ut in venis etiam omnibus sanguis, cum iis facultas quædam concoctrix insit: quare
& eorum ^{zzz} substantia, ab ipsius ventriculi hand multum diversa; maxime si forte

I 2

portio per adipem tan-
quam lubri-

cum, celerius foras exeant. ^{xxx} Colon multo intus adipe inæquali infarctum visitur: Veteres intestina satuo regi
comparabant, qui bellum non nisi laceffitus gerit. Laur. ^{yyy} Arist. 4. part. an. 4. ^{zzz} Gal. 4. us. part. 8. 17. & 18. in
introduç. 11.

aaaa Gal. 4. us. portio chyli aaaa minus elaborata exciderit, ab iis (cum facultas concoctrix insit)
 par. 18. ar. Vesol. concoquatur: quare & omento, cum intestina membranosa sint, & paucio calore
 ut prius à ven- donentur, teguntur, ut pinguedine sua foveantur. Tum, ut ipsa crassa, & faeces cras-
 triculus confecta bbb relinquantur excrementitias, & bilem ab Hepate per meatu demandan-
 absolutius pau- datam, una cum flatibus, qui continue colliguntur, contineant; hæc etiam de corpore
 lo in ipso ductu expellendis dicata sunt, ad quod & crassi aaaa intestini latitudo facit, qui ceu
 immutentur. secundus venter ipsis, quemadmodum vesica urinæ subijcitur, ad quod tamen mus-
 Gal. 14. us. par. culani, qui instar cccc claustrici cuiusdam circumjiciuntur, plurimum faciunt, ut in
 14. intestina & Anihistoria dicitur.
 ventriculus ex
 duabus tuni-
 cis constat, ut
 quæ conditionis potius essent instrumenta, quam superfluum receptacula, carnosior substantia erat accommodatio-
 bbbb Colon excrementa ex distributione segregata suscipit, in introduct. 11. cccc Gal. 4. us. par. 19.

De Mesenterio.

С А Р У Т Х I I X.

Galenus hujus Historiam 4. us. part. 20. proposuit administrationem & administ. anat. 5. 6. & 7.
Aristoteles vero 1. hist. 17. & 4. part. animal. 4.

Mesenterium a μεσεντερων, à situ dictum, quod sit membrum εν μεσση των εντερων, Gal. 4. u. part. 20. *h. 16. c. 1.* hist. 16. c. Pol-
luci, mesen-
terium mem-
brana est ex:
venarum &
nervorum com-
plicatione.
b Gal. 6. ad.
an. 6.
c. 3. de nat. deor.
in medio inte-
stino usque ad
portas jecoris
ductus, ac dire-
ctus via. Vesa-
lius ait Cicero-
nem putasse Græcos intestinum aliquod intelligere: d Arist. 1. hist. 16. super air. e Αγειω & ventrem & omne intesti-
num vetustissimi Græci appellarent, ex quo nomen μεσεντερον derivatum, Ruff. l. 1. c. 27. Gal. 6. ad. an. 5. & 6. 4. u. par-
20. 5. ep. 1. & in introduct. 11. f. 4. part. an. 4. nonnullis pinguis membrana peculiariter dicitur, cum reliquis omni-
bus pinguior sit, & nonnullis medianum, Vesal. Sic Ruffus 2. part. 11. inter intestina media latescunt, quos mesenterii
atque mesarai vocabulo insigniunt: at idem 1. part. 27. totum intestinum vinculum ac firmamentum mesenterion
ac mesaraon vocant. g diff. ven. 9. per duo ait mesenteria tum id quod ad dextram situm habens primarium, est coli
partium, tum id quod est omnium intestinorum medium, nam tertium mesenterium quod prope sedem pertingit, in si-
& 6. epid. sect. 4. aph. 6. vult ex ligamento prodire ad spinam. Fallopius duplex est mesenterii origo, superior circa pri-
mam, inferior circa tertiam lumborum vertebra. & quidem à nervo simplex: idem voluit & Piccolhom. ligamenti
lumborum vertebrae connectentibus, & os sacrum illi ossibus committentibus, Laurent.

ferantur; coli item doloris in partes in artuum transmutat. Componitur enim ex mem-
branis, i nervis, venis, arteriis, glandulis, & adipe.

Membranas habet^k duas [t. 16. fig. 2. II.] mutuo accumbentes (in canibus ubi
vasa non admittit ita connata ac si simplici membrana constaret, cum adipe destitua-
tur) easque firmas & robustas; tum ad vasorum robur, cum vasa^l permulta fre-
quenti concursu deferantur ad intestina, quibus instar vinculi ac validi munimen-
ti est; tum ne intestinorum situs in violentis motibus confundatur, & ea fortius dor-
so alligentur.

Venæ Mesaraicæ [t. 13. ddd. & t. 16. fig. 2.] per has diffusa sunt innumera: tenuis-
simæ veluti arboris^m cujusdam radicem tenues extremitates, quas natura, ut in ar-
boribus exiguas radices in crassiores colligit; ita hæc vasa sensum inⁿ majora, & ea
rursus in alia majora cogit, usque dum omnia in unam venam, quæ ad portas abit,
& ad Hepatis sinum est, coegerit.

Arteriæ duæ, [t. 14.] Mesenterica superior & inferior ad intestina mittuntur,
quæ Mesaraicas constituunt, quæ per Mesenterium quoque excurrunt, ut assiduo
suo motu ventilando, & spiritu vitali illustrando, Mesenterium & Intestina à corru-
ptione tueantur, quæ etiam omnes^m in unam eamque magnam, dorso incumben-
tem junguntur; quas Galenus^o aliquando ex una radice statim bipartiri, aliquando
statim ab initio duplices, observavit.

Nervi item p plurimis furculis sparguntur; duo quidem utrinque singuli, ab iis,
qui à sexto pari costarum radicibus exporriguntur, qui membranæ modo dilatati, ar-
teriarum ramos investiant, quo nervi frigidiores, arteriarum contactu calidiores red-
diti, facilius vim animalem à cerebro manantem, intestinis communicent; tum à
nervis q è lumborum vertebriis prodeuntibus idque sensus causâ, quo molesta sen-
tiens expultrice excitata, ea in intestina deponat. Hi, cum venis & arteriis simul Me-
senterii [t. 16. fig. 1. & 2. II.] centrum subeunt, per totum diffunduntur, & numerosa
sobole inter ejus tunicas ad intestina feruntur.

Glandulæ [t. 16. fig. 1. & 2. KK.] plures (ad quas venulæ etiam à^r mesaraicis capil-
lorum modo prætenues perveniunt) infinitis ramorum venæ portæ & arteriæ ma-
gnæ divaricationibus interjectæ, proportionem in magnitudine cum distributis pro-
paginibus servantes; horum tamen maxima [t. 16. fig. 1. & 2. II.] ad ipsius centrum,
ubi sit vasorum distributio, & ubi magis vasa collecta sunt: tum, ut vasa fulciant^f &
dividant: tum, ut eorum compressionem impediunt, ne chyli distributio retardetur;
unde his [t. 16. fig. 1. & 2. II.] aliquando scirrhum patientibus, torius corporis absum-
ptio sequitur: tum cum plurima vasa sublimia^f atque erecta, atque tenuia ad Portæ
truncum producantur, quæ longo interstitio à principio distant, tutum non fuit sine
præsidio deduci; quare^f glandulæ, veluti cunei quidam, ipsorum divisionibus in-

I 3.

cum-

venarum multarum ac frequentium. m Gal. 4. us. part. 20. 6. ad. an. 6. & diff. ven. 1. non solum Hippocrates, sed qui-
cunque Anatomi celebres fuerunt arboris trunco assimularunt, &c. n Gal. 4. us. part. (ait Vesal.) vult intestinis &
mesenterio venas offerræ in jecur non terminantes: forte aliquas cave propagines in intestina disseminari judicavit,
quæ ipsis nutriendis conducerent: quæ me adhuc latent: o 6. ad. an. 6. p Gal. 6. ad. an. 6. exiguis admodum 5. us. par.
2. q Hosperique ignorarunt. r Gal. diff. ven. 1. & 6. ad. an. 7. f Gal. 4. us. part. 20.

* Hipp. 6. epid.

f. 4. aph. 7. Ho-

mo crassiora in-

testina (αδύον)

ad instar canis

habet, majora

tamen ex meso-

colis suspensa,

hæc vero ex nar-

vis à spina sub

ventriculo vi-

de etiam in lib.

de off. nat. apud

Hipp. qua sen-

sientia aliqui

volunt præci-

pue appendiculi

mesenterii si-

tum & origi-

nem indicari:

& Hipp. per ner-

vos hic ligamen-

ta intelligit,

Galeno in com.

monente:

i Arist. 1. hist.

16. Latiore est

membrana &

pinguiscente:

4. part. 4. mem-

brana est.

k Gal. 4. us. par.

20. & 6. ad. an.

6. quare non

nullis perito-

naum duplex

dicitur, ut Lau-

rent.

l Arist. 1. hist.

an. 16. pendens

ex vena mayo-

ri atque aorta

venasque per-

multas frequen-

te concursu de-

ferunt. 2. part.

3. & 4. plena:

*et Fallopio, hic
usus nullus Pic
colhom. aliquot
rejecit utilita-*

*tes: ut non da-
tas esse, ut ve-
na rectius divi
dantur, alias in
omni venarum*

*diductione et
propagatione so
rent, quod non
est: nec ad ipso-
rum diductio-
num tutelam,
quia multa ve-
narum diduc-
tiones sunt,*

*quæ his glandu-
lis privata sunt
Laur. ut sint ve-*

*luti ligamenta
vasorum, ne in
violentis moti-
bus disrumpantur.*

*u Gal. diff. ven.
et art. 9. in de-*

xtram, sinistram et mediam. Columbo, in tres partes divisum, quorum pars colon: alia, tenuia intestina: tertia vero

*crassa continet. Piccolhom. duorum intestinorum et ratione originis, duplex videtur, sed quia origines illa statim coe-
unt, idcirco unum existimatur.*

*x de ossum nat. et 6 epid. sect. 4. aph. 6. y Gal. 6. ad. an. 6. et tempus μαστερεως nominat: et idem com. in 6. epid. utrius-
que originem describens, continuum totum ad unam quandam lumborum vertebram post diaphragma positum perve-
nit, hac autem sub ventriculo est. z de diff. ven. et art. 9. per medium existimat Vesalius illum intelligere, quod seju-
num et ileon colligat. aa Gal. 4. us. part. 20.*

cambunt, ne in violentis^t motibus collidantur, vel disrumpantur: & denique ut intestina humectent, quo ipsorum coctio fiat elixatione, hoc est, in calido & humido.

Adeps copiosus ex sanguine hic est vasis elabente, & membranarum densitate re-
tento his circumfunditur, quo media spatia impleat, & illarum partium calorem fo-
veat, ad chyli qui per eas partes fertur præparationem pro sanguificatione.

Hoc licet unum sit & continuum, tamen & ratione duplicis exortus, & ratione
intestinorum, quæ connectit & ratione Venarum Cumeæ quæ per tenuia, ab iis quæ
per crassa distribuuntur variant, Galeno authore & duarum arteriarum dividi possit
in id, quod tenuia intestina [t. 6. fig. 2. L. MM.] in medio ventris, & *μαστερεως* dicitur,
& in id quod colon [t. 16. fig. 2. N. ad O.] in dextro & sinistro [t. 16. fig. 2. P. ad Q.] late-
re (non autem sub ventriculi fundo, cui omenti [t. 16. fig. 2. O. ad P.] beneficio jungi-
tur) connectit, & inferiori sede [t. 16. fig. 2. Q. ad R.] recto intestino adnascitur, &
μαστερεως, Hippocrati, * dicitur: partem etiam habet, y quam Mesenterii [t. 16. fig.
2. Q. ad R.] appendiculam nominant, ligamenti natura præditam; quare Galenus
z in dextram, sinistram & mediam divisit.

Ufus ipsius est, intestina tanquam communi ligamento invicem colligare, & lum-
borum vertebris annectere, ne vel temere implicantur, vel ob pondus deorsum
labantur, excepto colo, quod ea sede, qua ventriculo subtenditur, per omentum
dorso colligatur; dein, geminis suis membranis, vasa, quæ per eas feruntur, inter-
sepire & aa fulcire, ne simul complicata se mutuo impedian; & quo tuto ad inte-
stina pertingant, & ne illa, dum homo salit aut cadit, disrumpantur.

De Pancreate,

CAPUT XIX.

De hoc egit Galenus 5. us. partium 2.

*a Gal. 4. us.
part. 11.
b πένκρεας
diff. ven. 1. Co-
lumbo affuso*

et lactes. c

Caro quadam informis et laxa ante lienis portas et jecoris, circa multas vasa concrevit, quemadmodum

circa radices umbilici in fetu secundina. Quare propter eandem necessitatem in nobis fuit, propter quam Hipp. docuit

*in fetu secundinam fieri, cum utriusque substantia prorsus similis sit, utrumque colligatur proxime antequam alimen-
tum extrinsecus adveniens hepar ingrediatur, Varolus. d Gal. 5. us. part. 2.*

PAncreas^a quasi totum carnosum, ob similitudinem quam habet cum carne in
corpore moderato, etsi in pingui pinguedo videatur: dicitur & *πένκρεας*. Cor-
pus^c informe & laxum, totum^d glandulosum (quare Pandenon dicendum potius
Piccol-

Piccolhominus censuit) & magnum, tres aut quatuor digitos latum, ad primam lumborum vertebram enatum: quod posteriori ventriculi parti ejusque fundo, duodeno [*tab. 3. 7. fig. 1. 2. & t. 39. fig. 2. 3.*] & Venæ portæ quam intra se comprehendit & aliquando à multo humore intumefactum vel scirrhosum redditum, Venæ portæ truncum constringendo, chyli in melsaricis alterati influxum cohibet, qui cum ad Hepar commeari non possit, in intestina refluit, sicque corpus necessario contabescit) ad renes usque ad hepatis & lienis sedes diffusum subjicitur. Membrana tenui vestitur ac veluti suspenditur, ne pondere suo Venam cavam & Arteriam magnam premendo, sanguinis & spirituum transitum impediat: quæ aliquando ab humorum affluxu crassior reddita, veluti saccum refert. Venas e habet à Venæ portæ *e diff. ven. 1.* exiles, pro nutritione: arterias à Cæliacæ, pro vita: nervos à sexto pari & glandulas. Hoc in hominibus minus, quam in canibus rubet; & in brutis propter primum incessum ventriculo superjacet: quod vero medio album est, ipsius est parenchyma; & propter candorem ac molliem quibusdam Lactes dicuntur.

Ulus præcipuus, ramorum venæ portæ, cæliacæ arteriæ & nervorum, qui ad ventriculum, duodenum, & potissimum ramum splenicum, qui ad lienem fertur, quemadmodum & vas bilem continens (cum omnium ibi sit divisionis principium) divisiones fulcire, & à comprimantibus illæsos conservare.

Dein, quatenus est glandulis confertissimum, reliquias pinguedinis cœnosæ (seu crudiorum pituitosiorumve sanguinis portionem, quam cœnosam humiditatem Hippocrates vocavit) quam omentum & mesenterium continere non potuerunt, depascere, quo postmodum in internas partes purior sanguis illabatur. Hinc est quod pancreas in corpore moderato, totum carnosum videatur: in corpore vero pingui, totum adiposum appareat: & hoc f una cum omento, mesenterio ejusque venis, ut & lienis, febrium intermittentium & melancholiæ hypochondriacæ, aliorumque multorum affectuum sedes est, & quasi publica sentina, in quam omnis humorum colluvies confluit. Tum f ut ventriculi actio seu chylicatio elixatione fiat, hoc est, in calido & humido: dum enim crudiorum & humidiorum sanguinis portionem depascuntur, ab his infiniti vapores humidi & calidi exspirant, qui ventriculo circumfusi eum complectuntur, ac si in balneo Mariæ foret. Tandem, ventriculo & aliisque subjicitur pulvinaris instar, ne is repletus lumborum vertebra innixus, eorum duritie lædatur: sic ventriculum & aortam intercedit, ne aorta à ventriculo plus justo repleto comprimatur, sicque spirituum vitalium liberior transitus ad inferiora impediatur.

f omnium febrium intermittentium propria sedes & origo, in prima est corporis regione, circum præcordia, circum ventriculum, diaphragma, jecoris cavam, lienem, pancreas, omentum aut mesenterium, Fernel. 4. febr. 10.

De re-

Fallopianus hunc usum non admittit, quia in brutis supra ventriculum jaceat: & Piccolhom. rejicit, nam sic in brutis quæ prona incedunt, frustra esset: Crediderunt nonnulli falso, pylorum ne quid inconcoctum effluat, occludere, ait Vesal.

De vena cava ramis per infimum ventrem disseminatis.

CAPUT XX.

De origine venarum, ex quonam viscere ortum ducant, egit Galenus toto libr. 6. de placitis Hippoc. & Platonis : quemadmodum de distributione venarum per totum corpus, 16. de usu par. 13. & 14. libello item de dissect. venar. & arter. à cap. 2. ad 9. Apud Hippocratem multa & obscura habentur in libris de locis in homine, de sacro morbo, de ossium natura, & de natura hominis.

a Gal. 14. us.
part. 7. diff. ven.
1. 6. loc. aff. 5.
h^gilix 5. us.
part. 2.
b Arist. 1. hist.
16. qui à Porta
vena non distin
guit, vult enim
ab hac & aorta
(ita appellat
venas & arte-
rias) venas ad
intestina ferri.

c Gal. 4. us. par.
5.
d 2. Epid. Gal.
h^gilix 5. us.
diff. ven. 1.
Vesalio inter-
dum quemad-
modum & por-
ta & l^gilix &
h^gilix dicitur
nonnunquam
caudicis vena.
e Gal. de form.
f^gilix 4. & 7. de
placit. 3.
f Hipp. 1. de dia-
tatex. 23. de loc.
in hom. 1. 1.

Arist. 2. gen. an. 1. g Hipp. de alim. At idem lib. de locis in homine, venarum initium à quavis parte sumi posse scribit ac proinde à venis capitis exorditur : ex hoc loco illustratur obscurus Hipp. locus 1. de nat. hom. Venarum è capite fontes & paria quatuor emanant : quem locum Galenus vitiosum esse existimat. h Gal. 4. us. par. 2. 5. ejusd. 2. 6. plac. 3. cava nulla certa designatur origo, cum sit generalis vena universum corpus pervadens, Plater. i Arist. 3. hist. 3. 2. part. 9. & 3. ejusd. 4. 2. gen. an. 4. & cum eo Vesalius, qui dicit Galeni commentum falsum, quo cavam qua hepatis gibba committitur amplissimam esse astruit, & idcirco è corde prodire negat quod non similiter ut aorta enascatur, hoc est, quod mox ab ortu in duos truncos non dividatur, sed recta secundum cordis latus ducatur. Sed hac de re Piccolhom. Laur. & alii.
k Gal. 6. us. part. 4. l Gal. 16. us. part. 14. & Arist. 2. par. 4. & 6. 3. ejusd. 5.

Vena cava quæ *h^gilix* a *h^gilix* *μεγάλη*, ^b cava & magna, ob insignem cavitatem veteribus & Galeno, cui nonnunquam *μεγίστη* maxima dicitur. Hippocrates, *ήπαρ* jecorariam nominavit. Hæc omnium venarum, excepta umbilicali & vena portæ mater; principium aliud habet *επίσπασ*, originis, semen ipsum, sicque eodem tempore cum reliquis spermaticis orta, cum hæc eodem tempore generentur, sed non ^f simul perficiantur, & exornentur : aliud *επίσπασ* *h^gilix* *μεγίστη* id est, dispensationis & radicationis, ipsum Hepar : ejusque nomine à ^h gibba Hepatis, ubi major & crassior ipsius substantia, enata dicitur. Nam licet cavæ orificium ad dextrum Cordis sinum multo sit amplius, quam illius corporis amplitudo ullibi sit, non tamen exinde sequitur, ex dextro cordis ventriculo eam, ut Aristoteles ⁱ voluit, prodire.

Ad Cavæ vero constitutionem [t. 35. fig. 2. & 3. & tab. 36. hoc ostendit.] ex summis & orbicularibus hepatis finibus, in gibba sede [t. 13. f. 2. CC.] innumera venularum [t. 35. f. 4. CC. 36. EEEE.] propagines antrorsum dispersæ, & sensim versus medium posterioris sedis [t. 36. CC.] ipsius hepatis prorepentes, in insigniores venas coeunt; & hæc rursus in majores, donec in elatiore hepatis parte, qua dextram dorsi sedem respicit, in duos insigniores [t. 35. fig. M. N.] ramos altero in sinistram hepatis sedem disperso, abeunt, qui in unum caudicem [t. 35. f. 2. F. fig. 4. A. t. 36. A.] desinunt, qui venæ cavæ truncus dici consuevit. Quare cavæ truncus à dextris ^k ad posteriorem hepatis partem se applicat, & quasi sinum ingreditur, ejusque substantiæ brevissimo ductu connascitur, qui secundum dorsi longitudinem situs, recto ductu per utrumque ventrem fertur, quo dum totam animalis longitudinem percurrit, sanguinem ^l omnium partium nutrimentum, in radicibus [t. 35. f. 4. FF. t. 36. KKKK.] venæ portæ in hepate elaboratum, & per cavæ radices; [t. 35. f. 4. CC. t. 36. EEEE.] quæ per hepatis carnem confuse sparguntur, implicantur, & cum Venæ Portæ radicibus multis

multis [t.35.f.4. & t.36. hoc ostendunt] in locis in transversum se contingunt; ^m multæ quoque venæ portæ radices, extrema sua in medias [t.35.f.4. GGGG. & t.36. LLL.] per hepar expor-
cavæ radices, quemadmodum multæ cavæ in medias portæ infigunt, quo per has a-
na. ^{omoses} sanguinis fiat transitus, quem acceptum per totum corpus suis ra-
mis diffundit. Cava enim, est ceu ^o aquæ ductus quidam, sanguine plenus, qui ri-
vos habet quam plurimos à sese manantes, parvos & magnos in omnes partes distri-
buto: cum summa ^P namque æquitate natura parvulas venas distribuit, cum om-
nes partes alimento indigeant, & nutrirī necesse sit, quod ea vacuentur, & oporteat
alimentum æquale esse copię ejus substantiæ, quæ defluit, quare tantum mittit ali-
menti, quanto indiget. Sic cum à calidis ac mollibus corporibus, & iis, quæ assidue
aut vehementer moventur, ut exempli gratia, à pulmonibus multum defluat, ve-
nam habent maximam: at quæ frigida & duriores, & quæ moderatas edunt actiones,
iporum substantiæ minimum dissolvitur, ut ossa: quare exiguas valde habent ve-
nas, in quorum medio omnes reliquæ sunt partes, quarum aliæ magis, aliæ minus va-
cuantur & alimento ^P indigent.

Hanc licet truncus unicus sit, à divisione circa os sacrum, usque ad jugulum, do, ait Vesalius
attamen doctrinæ causa in [t.7. lib.2. A.] truncum ^q superiorem [t.35.f. D. f. 4. A. t. o Gal.4. usq. par.
36. supra A. & inferiorem [t.35.f.2 ad C. f.4. B. t.36. DD.] dividimus: ille Diaphragma
pertransiens, & sursum conscendens, quam plurimos ramos in omnes superiores par-
tes distribuit, de quibus in Thoracis historia dicitur.

At truncus [t.17. K.] descendens (qui respectu ascendentis angustior est, cum par-
tes superiores plus sanguinis requirant, plerisque partibus in imo ventre contentis,
à vena portæ ramos accipientibus) à dextris vertebrarum corpori adherens (cui à si-
nistris [t.17.] Arteriæ magnæ truncus accumbit) ante quam hepatis non amplius con-
nascatur, parvos ramulos in ejus substantiam dispergit, qui non in omnibus eodem
numero sunt. Mox hepatis non amplius connatus, non nihil oblique introrsum con-
tortus descendit, & plures de se ramos deorsum spargit, de quibus nunc.

Truncus [t.17. K. t.7. lib.2.] venæ cavæ interior, ^t dividitur in Truncum & Ramos:
à Trunco, qui ad magnam vertebram, ut Hippocrates ^f loquitur, seu os sacrum
[t.17. n. t. & 7. lib.2. o.] excurrit, communiter utrinque quatuor venæ prodeunt: ra-
rissimum enim est Venæ cavæ truncum descendantem supra renes bifurcari, unde
dein utrinque venæ pares prodeant.

I. Ad ipsa sinistra [t.17. g. t.22.3. l. tab.7. lib.2. n.] ex sinistro ^t trunci latere prodi-
ens, mox divisa partem priorē ad adipem & ad exterioris membranæ renum superio-
rem partem nutriendam, usque ad renis medium furculos mittit, ut ad glandulam re-
ni impositam: ad ipsum quoque diaphragma [tab.17. A.] qui interius satis insignes
apparent & cum venis diaphragmaticis uniuntur. Alteram vero partem in humi-
liorem membranæ sedem distribuit, cui aliquando etiam ab emulgente ramulus ad-
ditur. At dextra raro à trunco, sed ab elatiore parte, & medio ductu emulgentis
[tab.17. f. t.22. h. t.23. k. tab.7. lib.2. n.] oritur, quia hepar hoc loci crassius [tab.17. B. C.]
K
viam
nutri-
antur.

^t Harum venarum ductum exposuit Gal. diff. ven. 8. ^f Hipp. 2. epid. sec. 4. ait: Jecoraria per lumbos ad magnam
usq. vertebram dorsum fertur: ex hepate vero sublata per diaphragma cor recta, dein jugula petit. ^t Eustachius con-
trarium vult, dextram à trunco, sinistram ab emulgente prodire statuens.

viam ad cavam præcludit, quare sinistra dextra plerumque superior, eodem modo quo sinistra distribuitur, aliquando etiam glandulam reni impositam furculo perforans, qui tandem in membranam exteriorem renis absimitur. Raro utraque ab emulgente producitur: adhuc rarius duæ venæ à cava supra & prope emulgentis ortum, prodeunt, quæ in hanc membranam distribuuntur: quarum superior, glandula propaginem largitur: inferior vero ei ramo, qui à spermatica ejusdem lateris occurrat, furculo jungitur.

u Aliquando ab emulgente una oritur Gal. diff. ven. 8.

x Vas venosum maximum Gal.

14. us. part. 7.

y Gal. diff. ven.

3. α γ ε ζ φ λ θ δ

δς maxima arteria & vena

in renes 5. us.

part. 5. idem in

Hipp. de nat.

hum. com. 2.

tex. 12. at 6. an.

13. vena & ar.

teria in renes

hanc exigua

magnitudinis.

z Gal. 16. us.

part. 14.

aa Gal. 14. us.

par. 7.

bb Si dexter

ren, ut plerun-

que accidit si-

nistro elatior,

tunc emulgens

dextra elatior

& contra, Ve-

sal. & addit, si

sinistra emul-

gens sit superior

rum adiposam

sinistram ex ea

prodire.

cc In tres qua-

tuor & quin-

que nonnun-

quam divise,

Colum.

dd de off. natura

ee Gal. de ren.

ff. 3. at Arist.

vena renum cavum non subeunt 3. hist. 4. & 3. part. 4. sed intelligere videtur sinum, in quem urina percolatur.

Quod si emulgens sinistra^u altior sit, tum aliquando ex ea adiposa sinistra originem ducit, ipsa vero dextra à trunco. Sic nonnunquam à dextris inter adiposam & emulgentem alia vena prodit, quæ in diaphragma, superiorem partem substantiæ renis & in glandulam ejus lateris ramulos dispergit. Mox ubi cavæ truncus ad duodecimam thoracis & primam lumborum vertebrae pervenit, tum ex ea ducitur.

II. Emulgens^x ab officio, seu renalis ab insertione dicta, quæ omnium à trunco^y prodeuntium [t. 17. d. e. t. 22. m. n. t. 23. h. i. t. 7. lib. 2. o. i.] amplissima est, admodum crassa & brevis, quia sunt veluti^z stomachi attrahentes & renibus inservientes communiter in homine & simia, quemadmodum & Arteria utrinque una [t. 17. sub. d. e.] aliquando tamen dextra ab exortu [t. 24. fig. 1. ch. 1. 2.] duplex, aliquando triplex, rarius utrinque gemina, dextra tamen parte potius quam sinistra, quarum altera supra, altera infra spermaticam à Cava prodit: magnitudine impares, aliquando pares: quæ varietas non modo in diversis cadaveribus, verum etiam in uno & eodem reperitur: ita ut vasa dextri lateris, ab iis, quæ à sinistris sunt, plurimum varient. Horum exortus è directo sibi raro correspondent, ne alterius^{aa} functio impediatur: siquidem sinistra dextra^{bb} altior, in homine, non vero canibus: cum sinister ren ob lienis parvitatem altior sit: dexter vero, cum hepatis magnitudini [tab. 17.] cedere debuerit, inferior. Est quoque sinistra longior, ob venam spermaticam, quæ [tab. 17. i.] inde prodire debuit. Nonnunquam etiam ab emulgentis sinistræ humiliore sede, quæ in renem implantatur, ramulus prodit, qui ad inferiorem pinguis membranæ partem mittitur, & sæpe cum spermatica jungitur. Sic ab emulgente sæpe ramulus, qui partim in diaphragma, partim in glandulam ren incumbentem, partim in renis substantiam distribuitur. Utraque emulgens brevi & obliquo (aliquando magis, aliquando minus, rarius transverso) [ut tab. 24. ostendit.] itinere, (quod pictor non observavit) delata, circa mediam & concavam [t. 23. ee.] renis sedem sæpe in ramos, antequam eorum cavum ingressæ sint non divisæ sæpe in medio ductu in duos^{cc} ramos, secta & singuli in alios dividuntur: primi portio una glandulam perforat, altera in renem fertur: secundus spermaticam producit, dein bipartitus renem etiam infigitur: aliquando in tres, nonnunquam altera in quatuor, altera in quinque ramos, simul cum arteria dividitur, quasi anchoris quibusdam, ut Hippocrates^{dd} loquitur, jactis in eorum^{ee} cavitatem, quasi divisis renum partibus, una cum vena ipsa arteria, descensu (non ascensu, quod rarum est, & tum quando humiliore loco prodit) implantatur, hique in renum substantiam numerosa ramorum serie, donec in capillares abeant, digeruntur: sic quandoque ab ipsa emulgente qua parte spermatica oriri solet, quatuor rami ab una radice simul oriuntur [tab. 2. renum fig. 1.] quorum primus simul cum emulgente in renem tendit: alter sursum juxta vertebrae reflexus, cum Venæ sine pa-

ri alte-

in altero extremo coit: tertius in partes proximas disseminatur: quartus spermaticam constituit. Nonnunquam ipsa emulgens, ubi Arteriam magnam praterit, in quinque ramos dividitur [tab. 3. renum fig. 3.] quorum superior in renis partem superiorem, glandulam & membranam pinguem abit: alter oblique deorsum tendit & bipartitus in renem medium inseritur: tertius sursum oblique reflexus, priorem instar X interfecans, renis parti superiori insigitur: quartus oblique deorsum vergens, in renis humiliorem sedem mittitur: quintus retrosum ad lumbos reflectitur & inter primam & secundam ejus vertebra, ad medullam spinalem penetrat. Hæc cava serum & sanguine emulgent & alliciunt, ut illum excolant, simul & sanguinis portionem pro renum nutritione deferunt. At ne in cavam remeet, natura valvulis in emulgentibus locatis, quemadmodum & in venis splenis observavimus, prospexit. Ab hac ramulus mittitur ad glandulam reni incumbentem: ab eadem, parte inferna ramus insignis in lumbos abit, ad quem furculus venæ sine pari parte sinistra producit: rarus est, venam ab emulgente pronatam, supra musculum lumbarem ad rectum intestinum ferri.

III. Spermatica ^{ff} seu feminalis, quarum dextra [t. 17. h. t. 22. & 23. o. t. 7. lib. 2. 44.] ff Gal. diff. venarum aliquando ^{ss} duplex, ex ipsius trunci eminentiore sede [tab. 22. ad u. t. 23. p.] ex- 8. ostendit diffuberante origine infra emulgentem, rarissime ad emulgentem, à qua tamen non-ferentiam hujus vena in feminis & aliis nunquam ^{hh} & ramulum acquirit, enascitur: sinistra [tab. 17. i. t. 23. q. tab. 7. lib. 2. 22.] ius 14. us. part. 7. ab emulgente fere media humiliore sede oritur, idque ne Aortam [tab. 17. L.] su- 8. diff. ven. 8. pergrederens propter venæ parvitatem periclitetur: à cujus perenni motu vel dis- 8. Gal. semel rupta, vel à proprio munere impediretur: huic etiam aliquando & ramulus à hh Gal. semel trunco [t. 22. n. y.] prodians jungitur & vena spermatica constituitur. Verum & in notavit, dextra hac vena natura ludere solet: siquidem dextra aliquando ab emulgente ante divisio- à trunco accessisse: & Ves- nem, aliquando à duplici emulgente prodit: aliquando principia duo habet, alte- lius spermaticam dextram rum à Cava, alterum ab emulgente: nonnunquam licet emulgens duplex sit, ab in- totam ab emul- feriore tamen oritur. Sic sinistra sæpe ab emulgente ante divisionem principia duo- genae. habet: rarius à trunco Cavæ emergit: aliquando spermaticæ ramulus adiposæ ab e- mulgente enatæ, jungitur. Hæc oblique descendentes, & in progressu partibus vicini- ramulos plures impertientes, & peritonæi productiones [t. 22. y. t. 24. fig. 2. x. tab. 7. lib. 2. ad p. x.] transcentes supra os pubis ad testium caput in varios anfractus convoluta, corpus varicosum [tab. 7. lib. 2. y.] adeunt, eo seminis materiam à toto corpore deferentes, ut plenius libro de partibus similibus ostendimus. At in mulieribus, licet idem sit exortus, [tab. 28. fig. 1. G. fig. 2. & 3. aa.] peritonæo tamen non excidunt, ii Vasa semina- nec ad pubis ossa pertingunt, sed membranis pinguibus suffulta, altera portione ⁱⁱ ad- ria in mulieri- testes [tab. 27. dd. ee. tab. 28. f. 1. I.] altera ad uteri fundum [tab. 27. ll. tab. 28. fig. 1. H. fig. 2. bus non ferun- h. & fig. 3. bb.] disseminatur: quin etiam furculos graciles peritonæo [tab. 28. fig. 2. bb.] tur in testium ac tunicis testes, ac vasa hæc ambientibus largiuntur: aliquando à spermatica sinistra caput, sed deor- juxta ejus originem rami tres ^{ll} enati, qui in medullam spinalem definunt. Sic ra- sum in matri- rum est spermaticarum exortum inverti ^{mm} ut sinistra à trunco, dextra ab emul- cis substantiam Columb. gente prodeat [quod tab. 2. append. fig. 1. ostenditur.] kk per singula

IV. Lumbares duæ [t. 17. mmm. t. 7. lib. 2. 5.] aut tres ^{kk} ab ipsius inferiore sede foramina sin- gula diff. ven. 8. vertebras spectante (ita ut non nisi Cavæ trunco elevato, aut inverso, conspiciantur) inter quatuor lumborum vertebras geniculatim per foramina nervis in vertebra-

¶ *Ande his Hipp. lib. de generatione, per quas materia spermatica à cerebro per spinalem medullam ad testes confluit.*
 mm Duretus in Hollerium scribit, in mulieribus interdum fieri, quod in vivis dignoscatur possit, si mulier pragnans incipiat progredi crure sinistro & manu sinistra frequentius utatur.
 nn Arist. 10. prob. 6. visum semen labi per spinam.
 oo Gal. diff. ven. 8.

pp Medici haerent sunt arbitrat, Hymenem sibi in puellis consingentes non perviui, & ob stare, quominus quicquam ex utero fundat per ipsas cervicem de-

fluere possit, &c. Sed cum hymen carnea sit membrana transversim posita, oblonga sectione pervia, facile sanguinem transmittit, quemadmodum album profusum in puellis, quod admodum puellis obvenire, Aristoteles notavit, Vesal.

rum lateribus exsculpta ad spinalem medullam irrigandam, feruntur. A quibus venæ duæ II ad spinalem medullam latus utrinque una in cerebrum ascendit vel si maveris dicas à jugulari interna duas venas ad medullam spinalem descendentes & lumbis occurrentes, per anastomosis in his jungi: per quas forte cerebri spiritus, vel materiam seminalem portio à cerebro defertur.

Post has truncus ad sacrum os descendens [t. 17. II.] ad quartam lumborum vertebra (ne ossis duritie & continuo arteriarum motu lædatur) arteriarum magnarum [t. 17. ch. 14.] se subjicit, & in duos æquales ramos Ilios, vel Iliacos [t. 17. p. t. 7. lib. 2. O.] dividitur: & literæ A vel X inversi figuram referunt, qui oblique supra os ilii & pubis ad crus abeunt, ex quibus utrinque ante divisionem venæ duæ prodeunt.

I. Muscula superior [t. 17. np. np. tab. 7. lib. 2. π.] quæ statim in ipsa divisione à ramis latere exteriori, nonnunquam à trunco, ante cavæ partitionem prodit & transversim per musculos 00 lumborum & abdominis & peritonæum disseminatur: at non idem est utrinque exortus: & in canibus manifestior est.

II. Sacra [t. 17. oo. tab. 7. lib. 2. φ.] quæ parva, modo simplex, ex ipsa trunci divisione modo gemina, à ramo Iliaco enata, per superiora & anteriora foramina ad ossis sacri medullæ nutritionem mittitur.

Tum utrinque truncus Iliacus [tab. 17. r.] in progressu bifurcatur in ramum anteriorem [tab. 17. s. tab. 7. lib. 2. ς.] & interiorem [tab. 17. g. tab. 7. libr. 2. ρ.] hicque illo gracilior est. Ab interiore ramo venæ duæ prodeunt.

I. Muscula media [tab. 17. sss. tab. 7. lib. 2. τ.] interioris rami exterior propago, quæ in musculos femoris exteriorem coxæ sedem occupantes, natium cutem, partesque vicinas frequentibus ramulis transversim [tab. 17. ff.] fertur.

II. Hypogastrica [t. 17. uu. t. lib. 2. ψ.] interioris rami interior propago, vena est insignis, aliquando in latere sinistro gemina, quæ cum in omnes fere hypogastrii partes alendas distribuatur, multifariam dividitur: hujus pars altera, ad intestini recti musculos fertur, & hæmorrhoidales externas constituit, per quas sanguis aliquando abundans & tenuis, ex cava huc decumbens sine dolore & torsionibus ventris, aliquando etiam sine dolore in ano (qui tamen in hæmorrhoidibus internis à venæ portæ ramo constitutis, adest) expurgatur: altera ad vesicam in viris & quidem furculis majoribus, in ejus cervicem penemque exporrigitur: in mulieribus vero parum deducta, pingui membrana [t. 28. EE.] suffulta furculis quibusdam in vesicam, sed frequentioribus uteri humiliorem sedem, ipsiusque collum, [tab. 28. fig. 2. e.] per quas sæpe gravidis, & ut quidam volunt, virginibus pp menses expurgantur, dispergit: & hæc aliquando Pudendæ unitur. Reliquum hujus interioris rami ad os pubis abit, & ab externo ramo sobolem adsumit & simul [t. 17. y.] venam efformant, quæ peritonæum, dein decimum femoris musculum perforat, & ossis pubis foramen permeat.

Ab exteriore ramo [t. 17. p.] qui oblique crus accedit, venæ tres, duæ antequam & una postquam peritonæo excidit, promanant.

I. Epigastrica [tab. 17. ch. 1. 2. tab. 7. lib. 2. Γ.] quæ ab elatiore sede externi rami, rarius

rius à Crurali, emergit; peritonæo, abdominis musculis & cuti ramos offert. Huius ramus præcipuus peritonæum permeans, utrinque sub recto musculo [tab. 8. II.] sursum fertur, variis ramulis in transversos & obliquos distributis, & circa umbilicum aliquot furculis Mammaria venæ descendenti 99 jungitur [tab. 7. lib. 2. p. 1. 8. q. Gal. diff. lib. 1. fig. 2. cc.] per quas tantus sit uterum cum mammis 99 consensus: siquidem hæ exitum habeant, ab ea divisione, unde & illæ, quæ uterum & ejus sinum accedunt, & extremis finibus cum Mammariarum, quæ per internam thoracis regionem descendunt, & ad medium rectorum feruntur, quæ in descensu ramos per cartilaginum intervalla ad mamillarum radices mittebant.

II. Pudenda [t. 17. ch. 15. tab. 7. lib. 2. ΔΔ.] quæ ab exterioris rami sede interna supra coxendicis os in femur prolapsi & peritonæum jam egressi, procedit, transversum osium pubis medium accedens, viris in scrotum; penisque cutim: at in mulieribus ad sinum muliebrem in pudendi labra, nymphas, vicinasque partes numerosa foliole distribuitur: per hunc ramum & sanguis ab utero ad mammas refluere, & lac ab Epigastrica recta ad uterum decurrere potest: & hæc quibusdam (sed in mulieribus) Epigastrica interna, quod Epigastricæ externæ directe opponatur, dicitur.

III. Muscula inferior [t. 17. ch. 3. t. 7. lib. 2. Ω.] ab exteriori sede externi [tab. 17. 5.] rami deprompta, coxendicis articuli sedem pervadens in illius loci musculos, & cutim diffeminatur. Reliquas propagines ab utroque trunco [t. 17. 8. 5.] prodeuntes, qui jam non amplius Ilici, sed Cruales dicuntur, in historia pedis explicabimus.

De arteria magna ramis, venæ cave ramos per infimum ventrem diffeminatos, comitantibus.

CAPUT XXI.

Arteria magna per infimum ventrem distributionem, Galenus explicavit libello de dissect. venarum & arteriarum cap. 9. libro 16. de usu partium cap. 10.

Arteriæ a magnæ truncus [tab. 17. L. t. 18. R.] ad undecimam thoracis vertebram a diaphragmatis fissuram [t. 17. ch. 4.] transiens, per infimum ventrem delatus, sinistra vertebrarum corporum sedi innixus, & venæ [tab. 17. K. t. 18. Q.] cavæ sinistro [tab. 17. L.] lateri succumbens, vel ut ei locum det, declinans, priusquam ad penultimam lumborum vertebram, in nonnullis ad os sacrum [t. 17. ch. 14. t. 18. I.] in duos truncos dividatur. Ramos septem profert, quorum alii venæ portæ ramos comitantur, ut sint coeliaca [vide tab. 14.] & mesenterica duplex, qui ad ventriculū, mesenterium & intestina mittuntur, de quibus jam dictum fuit supra capite 16.

Alii vero cavæ ramos peritonæo intactos comitantur, de quibus nunc; natura enim ubique fere: cum venis arterias simul dividit: partim, quo membranæ, part. 2. quibus venæ teguntur, ac vicinis partibus colligat, etiam arteriis sint usui: partim, c. diff. ven. 9. ostendit quænam sint venæ, quæ conjuge careant arteria exceptis iis, quæ summam cutim percurrunt: omnium autem a trunco prodeuntium hic ordo est.

K 3

I. Cæ feruntur.

I. Cœliaca [t. 17. ch. 6. t. 18. s.]

II. Mesenterica superior [t. 17. ch. 10.]

III. Emulgens seu Renalis [t. 17. de tab. 18. a. b. sub venis.] tam dextra quam sinistra,

8 Duæ magni-
rudine praci-
pua ad renes,
diff. ven. 9. cur
ea magnitudi-
ne effecerit, vi-
de 5. us. 4. par. 5.
9. Arteries in re-
nes insertæ, om-
nium, quæ à
maxima arte-
ria oriuntur
sunt prope ma-
xima. Gal. 2.
nat. fac. 4. in re-
nes maximum
arteriarum ju-
gum perrept.
16. us. par. 10.
e Arteria non
aliter, quam
vena in renes
inferuntur 14.
21. part. 7.
f Arterias se-
rum expurgare
docet Gal. 5. us.
part. 4. lib. con-
tra Erasistrat-
um, an sanguis
in arteriis.
g Antequam
ad sinistram cor-
dis cavitatem
accedat, Varo-
lus: à corde se-
rosam humidi-
tatem vitali
sanguini permi-
scam attrahunt
Piccolhom. &
plus seri in ar-
teriis quam ve-
nis contineri,
vult Laurent.
h per paucis à
sinistra emulgente, ut Galenum voluisse Columb. dicit. i Et ab his arteriis umbilicales ortum ducere voluit Columbus.
k Columbus plures ramos non recenset: Musculam addit Laurent.

(raro enim tres vel quatuor, vel plures reperiuntur) insignis^d & omnium, quæ à magna arteria oriuntur prope maxima, ab utroque trunci latere, ubi prima & secunda lumborum vertebraligamento copulatur prodit, raro sibi è directo respon- dens, quandoque enim dextra humilior est sinistra & oblique procedens in ramos modo duos inæquales, modo tres, modo quatuor, aliquando quinque instar Venæ (magna enim ex parte Venæ distributionem^e imitantur) dividitur, cum qua renis cavitati implantantur, & in eo absumuntur: à qua ramulus ad glandulam reni in- cumbentem, mittitur. Aliquando præter emulgentem consuetam, aliæ duæ vel tres à trunco procedunt & cum vena emulgente feruntur: si duæ harum, altera su- pra spermaticas, altera infra oriuntur: si tres [tab. ren. 3. fig. 3.] harum una è regione inferioris Arteriæ mesentericæ orta ad renem tendit: altera in medio divisionis Ar- teriæ magnæ, quæ in lumbis sit, oblique sursum ad renis posteriora fertur: tertia (quæ quinta est) à ramo Crurali prodiens, oblique sursum ascensum, in anteriorem & imam renis sedem inseritur: talis à dextris divisio observata, ubi tum à sinistris tri- plex fuit, quam prima juxta renem sit partita: altera sub Arteria mesenterica inferio- re enata, etiam bipartita reni inferebatur: tertia paulo ante divisionem in lumbis e- nata, sursum delata, reni inferebatur.

Harum usus non tam vitalem spiritum deferre, quam serum, ^f quod copiose in Aorta continetur à vitali sanguine ^g expurgare: vix quicquam tamen arteriæ re- num membranæ pingui communicatur.

IV. Spermatica [t. 17. ch. 11. t. 18. h. i.] utraq^h ex anteriore trunci parte, conti- guis [t. 22. a. 23. r.] principiis prodit, quæ descendentes, dextra quidem cavæ trun- cum supergrediens, sui lateris venæ spermaticæ, quemadmodum sinistra sinistra ve- næ, mediante peritonæo attenditur, & arteriæ venis se immiscet. Et in viris per peritonæi [t. 22. v. t. 2. f. 2. 1.] productiones testibus (quibus ut & tunicis furculos præbent) flexuoso ductu applicantur, ut ad eos sanguinem tum venalem, tum arte- riale cum spiritu vitali deferant: in foeminis vero, media pars ad testes, altera ad u- teri corpus ⁱ fertur: interdum dextra ab emulgente: sæpe & sinistra in mulieribus ab emulgente pronascitur: rarum est utramque abesse [tab. 4. app. f. 2.] & his defi- cientibus sterilitas causatur, ob semen quod infœcundum, ob spiritus vitalis defe- ctum excernitur.

V. Mesenterica inferior [tab. 17. ch. 12. t. 18. k.]

VI. Lumbares [t. 17. mmm. superius.] posteriore parte, quæ arteriæ truncus ver- tebris committitur, per foramina vertebrarum lumborum geniculatim delatæ, ad spinalem medullam, nec non musculos vicinos & peritonæum distribuuntur: sed hæ quoque ad medullæ latus, una cum venis, sursum ad cerebrum feruntur. ^k

VII. Muscula superior [t. 17. mm. inferius.] quæ ad lumbares etiam refertur, cæteris grandior, ad abdominis latera, ejusque musculos frequenti sobole excur- rit.

VII. Muscu-

læ inferior [t. 17. mm. superius.] quæ ad lumbares etiam refertur, cæteris grandior, ad abdominis latera, ejusque musculos frequenti sobole excur- rit.

His ramis constitutis Arteria magna in lumborum regione, in qua ligamentum est cartilagineum, quo tertia & quarta vertebra lumborum colligantur, & quidem supra quartæ lumborum vertebræ corpus (alii ad ossis sacri principium) [tab. 17. ch. 14. t. 18. l. t. 22. i.] cavam¹ conscendit, non propter^m dignitatem, sed ne ad os al-
dens, cum perpetuo arteria moveatur, lædatur, & ut cava in duos truncos Iliacos di-
ctos, instar bipartitur, sub cujus bifurcatione Sacra [tab. 17. oo. tab. 18. n.] prodit,
quæ suis furculis in ossis sacri foramina, ejusque medullam fertur. Truncus, vero
quilibet [t. 18. p.] non procul à divisione in ramum interiorem [t. 17. e.] graciliorem
& exteriorem [t. 17. s.] majorem, qui crus petit, dividitur.

Ab interiore duæ propagines prodeunt, exterior altera, altera interior.

I. Muscula inferior [t. 17. ff.] exterior propago, transversum [t. 17. f.] ad exte-
riorem os sacrum & coxendicis os, in musculos ilium os & coxendicis articulum in-
regentes, multis furculis distribuitur. Sic ad inguina, nonnunquam ab alterutro
trunco, ramus satis insignisⁿ oritur, qui cutim petit, & partes cutaneas ad pubem, ad
ilia & abdomen pertinentes, fovet.

II. Hypogastrica [t. 17. mu.] ejusdem rami interior propago, omnium est amplissi-
ma, & recta deorsum in ossis sacri humiliorem sedem ad vesicam ejusque cervicem
(nonnullis ad podicem, quæ etiam hæmorrhoidales dici possunt) & musculos os pu-
bis tegentes, distribuitur: at in mulieribus major est, & in uteri fundum numerosa
sobole distribuitur, ejusque cervicem & vesicam furculis intertextit. Ramum quo-
que profert, qui sub bifurcata penis origine, ad duo ejus corpora cava mire implica-
ta, ut veluti plexum efformet, ad glandem usque deferretur: reliquum rami interioris
[t. 17. e.] deorsum repit, & Arteriam umbilicalem [t. 17. ad x.] secundum longitudi-
nem. Aortæ delatam, & ad latera^o vesicæ tutelæ gratia membranis fortibus alligatam,
per quam fœtus in utero vivebat, & transpirabat, & in lucem edito in funiculum
abiit, admittit, de quibus supra: mox assumpta ab externo [t. 17. s.] ramo, ubi in
crus est prolapsurus, propagine [t. 17. y.] quæ oblique deorsum mittitur, per pubis
ossis foramen transit, & in musculos foramen id occupantes & vicinos, dispergi-
tur.

Ab exteriore duæ propagines promanant, altera ante, altera postquam perito-
naum permeavit.

I. Epigastrica [t. 17. ch. 2. z.] propago exterior sursum reflectitur, rectum muscu-
lum conscendit, & cum Mammaria circa umbilici regionem præcipuis ramulis
jungitur, reliquos furculo transversum in humiliorem abdominis sedem dispen-
sans.

II. Pudenda [t. 17. ch. 15.] interior est propago exigua, quæ non in tot ramos,
quot vena dividitur: hæcque transversum & introrsum secundum pubis ossis com-
missuram ad pudenda, & in penis^p cutim absumitur: aliquando etiam arteriolæ ad
inguinum glandulas mittuntur. Sæpe etiam ad inguina, ab alterutro ipsorum ramus
medioeris producit, qui non solum partes cutaneas ad pubem, sed etiam eas quæ
ad ilia & abdomen pertinent, fovet. Arteriæ reliquum [t. 17. ch. 16.] in
crus fertur, & Crurales arterias constituit, de qui-
bus in pedis historia.

1 diff. ven. &
art. 9.

m Vesal. hoc vo-
luit: addit ut

scilicet vena in-
star subster-
culi cujusdam

arteriam inibi

subeat, persua-
sum est omni-
bus.

n hæc ab Ana-
tomis negle-
cta, Fallop. in-
obser.

o Gal. 15. usq.
part. 4. diss.
ven. 9.

p Ne una qui-
de cutim subit,
nisi forte exilis
quæpiam in pe-
nis involucrium
diffundatur.
Vesal.

De Re-

Renum historiam explicavit Galenus 4. us. part. 6. s. ejusdem. 5. 6. 7. 8. libro de dignotione & curatione affectuum Renum: de vasis, 14. us. part. 7. & 16. ejusdem 14. de usu eorum 1. nat. facult. 15. 16. & 17. Administrationem 6. administrat. anat. 13. Aristot. 1. hist. 18. maxime 3. part. animal. 9.

a Arist. 2. hist. 16.

b Arist. 4. par.

an. 1. humor in

corticem te-

gentem, ut avi-

bus in pennas

absuntur,

cum exiguo po-

tu contenta sint

propter exan-

guem pulmo-

nis naturam.

c Arist. 3. part.

an. 9. in non-

nullis avibus,

caruncula qua-

dam latiuscu-

la speciem re-

num ostenden-

tes sed cum nul-

lam habeant

vesicam, his re-

num munus

tribui non po-

test.

d Gal. de ren.

affect. 3.

e Gal. 4. us. par.

6. juxta hepar

5. us. par. 5.

f Arist. 1. hist.

18. ad ad spi-

nam paulo al-

tius quam ilin.

Gal. de ren. af-

fect. 1.

g Gal. 4. us. par.

66. ejusd. 5. & 1. nat. fac. 15. & 17. h. Gal. 6. ad. an. 13. i. Gal. 4. us. part. 6. k Gal. 6. ad. an. 4. l Tenue &

aquosum excrementum 4. us. par. 6. serosum excrementum 4. us. par. 6. serosum excrementum 16. us. par. 14. aquosum in

sanguine. 6. loc. aff. 3. serum, qui a ejusmodi, quale in lacte 1. sanit. tuend. 12. m. Simul cum appellatione usum ostendens.

4. us. par. 5. n Gal. 5. us. part. 6. vāgēd' rē pūgē' rē' i'g'v, inquit Hipp. & Gal. dig. ren. 3. p cōtrarium habetur 5. us. par. 5. &

6. 14. ejusd. 7. 6. ad. an. 13. dexter in omnibus animantibus eminet altior: apud Arist. 1. hist. 18. 3. par. an. 9. quod in brutis

abseruatur. Vesalio, dexter sinistro elatior plerunque Piccilhom. idem sentit, Columbum arguens, qui contrarium vo-

luit, huncque suum natura legibus consentaneum esse Eustachius, qui homines secant, sinistrum altior dextro saepe

Renes δὲ τὸ πρῶτον, quod per eos materia urinæ fluat, & νεφροὶ, quasi mingentes ἀπὸ τῆς νεφροῦ, à mingendo a dicti, hominibus & omnibus quadrupedibus, quæ animal generant, nullo autem pennato, b nec squammato b excepta testudine, dati sunt. Situs: hi post intestina & d ventriculorum paulum, e sub hepate & liene [t. 18. G. O.] juxta f spinam cavæ & Aortæ lateribus [t. 18. Q. R.] non tamen æquali recessu (concava h in sese conversa habentes) accumbunt, ut expeditius serum eliciant, quo quicquid i in cavam sanguinis assumitur, confestim purgetur, quo is purus k pertotum corpus, pauca aquosa l humiditate admista feratur. Humor enim hic aquosus, licet excrementum sit, & nulla pars eo nutriri possit, necessarius tamen fuit, quamdiu alimentum in mesenterii & hepatis venis continebatur, quo hujus humoris seu feri tenuitate, fluxile redditum, per angustas eas venas penetrare queat: quare, alimenti vehiculum, Hippocrates m appellavit. At ubi sanguis in cavam pervenit, non amplius multo vehiculo eguit, cum per amplas vias vehatur, & cum magis fluxilis sit redditus, propter hepatis i & cordis calorem. Adversam quoque positionem [t. 22. & 23.] sæpe non habent, ne tractioni n mora, ut voluit Galenus, adferatur, vel portio quædam feri præterfluat: quod potius vasorum exortui [t. 23. h. i.] adscribendum censemus; & emulgentibus forte hoc peculiare, quia attractio in ipsis major est, & magis ex usu. Hi lumborum musculis, quos φῶες vocant, cruri flexendo dicatis, sima parte incumbunt, circa ipsorum capita, non multo humilior, quam infimæ sint costæ, inanibus partibus, quæ inter costarum extrema & os coxæ interjectæ sunt: inter geminas peritonæi membranas, quarum altera ipsis substernitur, altera supponitur, (ob quam causam renes & vulnerari & incidi possunt, infimi ventris capacitate integra & illæsa: an ergo Renum calculosorum, ubi urina penitus suppressa, sectio secure adhiberi potest?) unde calculosorum crus frequenter è dextro o stupet, cum ob musculi, cum ob nervi illac descendentes compressionem.

Horum licet situs inæqualis sit [tab. 1. 2. 3. append.] communiter tamen dexter p in homine [tab. 22. & 23.] sinistro inferior est, propter hepatis molem cui proxime subjacet, ipsi tanquam nobiliori cedens, & ad tertiam lumborum vertebra suum fine descendit, rarissime in sinistro elatior est: & tunc, quando brevior est, pars Hepatis ei proxi-

proxima excavata est: raro etiam situ pares sunt, propter hepatis & lienis positionem: addunt etiam aliqui, propter elatorem demissoremque vasorum emulgentium originem: sinister vero ex parte lienis sub sternitur, qui propter loci vacuitatem, cum lien illic tenuius sit, elatior est, ita ut nonnunquam ad undecimam vertebra thoracis ascendat: neuter tamen unquam alterum adeo superat, ut dimidia pars alterius vertice eminentior sit. At in brutis, ob procerum incessum & quia lien deorsum magis vergit, contrarius eorum situs est, ita ut in canibus, quo dexter altius collocetur, sinus hepatis impressus est, quo ren altius ascendere possit, quamvis etiam inter fibras hepatis se abscondere queat. Verum causa varii situs sunt, renum magnitudo aut parvitas, vasorum longitudo aut brevitates: eorumque positio magis minusve obliqua. Præterea, dexter propter venæ emulgentis brevitatem, trunco cavæ proprius accedit sinister, propter suam emulgentem duplo ipsa dextra longiorem, longius à cavâ situs est. Inter se tamen quatuor aut quinque digitorum intervallo distant: rarius proximiores, ut Galenus notavit, & tum à vasis reni sinistro insertis, rami ad dextrum testiculum maris, in feminis vero, ad dextram uteri partem, distribuuntur.

Connectuntur beneficio membranae externæ à peritonæo pronatæ, lumbis, diaphragmati & dexter quidem cæco intestino, nonnunquam hepatis: sinister uero colico (quare dolores nephritici flatuum & excrementorum copia exacerbantur, & colicus à nephritico sæpe non distinguitur) & lienis: quamvis & aliæ fibræ adhuc à peritonæo in renum partem gibbam inferantur: cavæ vero & aortæ per vasa emulgentia [tab. 19. a. b. i. 22. m. n. 1. 23. b. i.] ipsi vero vesicæ [t. 18. p. c. d. i. 1. 23. m. n. i.] mediantibus ureteribus jungitur.

Verum in publica Anatome, quam anno 1589. administravimus miram sane renis sinistri formam & situm quemadmodum & vasorum tam emulgentium, quam spermaticorum invenimus [t. 24. fig. 1.] Ren enim supra divisionem arteriæ magnæ & venæ cavæ circa os sacrum [d. e.] ea in cavitate, in qua vesica [f.] locatus erat, at in figura renem paulo à situ suo removimus, quo vasorum emulgentium implantatio rectius conspici possit. Tres enim venæ emulgentes, & arteriæ duæ in eum infigebantur: harum venarum duæ cavæ trunco [6. 6.] prodeuntes, rectæque descendentes, lateri dextro implantabantur: tertia vero emulgens [9.] ex sinistro cavæ venæ lateri promanans, sub aortæ trunco delata, & in descensu cum Spermatica sinistra paulum conjuncta [16.] progrediens, in sinistram renis partem inferebatur. At arteriarum altera, sub bifurcatione ex ramo Iliaco dextro [7.] altera paulo supra bifurcationem ex ipsa aorta [8.] originem ducens, illa simplex in dextrum latus, hæc in ramos aliquot divisa, in latus sinistrum se insinuabat. Sic & ureter sinister brevis à renis parte inferiore [19.] prodiens, in vesicam [f. 20.] infigebatur. Denique eo loci ubi Ren sinister collocari debebat, ejus loco natura substantiam glandulosam & adiposam [c.] constituit, ad quam & vena & arteria emulgens [4. 5.] ferebantur: quemadmodum & à vena emulgente superiore, Spermatica sinistra [4.] ortum ducebat. An forte in iis qui circa os sacrum summos per intervalla dolores perferunt, & omnia nephriticorum signa habent, talis sit alterius renis situs.

Duo sunt, propter actionis suæ & necessitatem & continuitatem, quia unus purgando & tanto excremento aquoso non sufficiebat, cum serosus & humor, utramque bilem

qrenum positio
inequalis 16.
us par. 10.
Gal. 14. us.
par. 7. 16.
ejusd. 10.
Arist. 1. hist.
18. 3. part. 9.
Russ. 2. part.
12. Oribas. 24.
coll. 27.
Gal. 14. us.
par. 7.

renes proxime
jecori appensi,
Aret. 2. acut.
morb. cur. 8.
u laxum inte-
stinum per tu-
nicam perito-
næo copulatur,
Gal. in 6. epid.
com. 1. tex. 6.
xnum nervi ab
Hipp. lib. de nat
oss. vocatis?

y Gal. 5. us. par.
6. vide et de
ren. aff. 1.

z Non concedit
Piccolhom.

quia natura
nihil sit molita
contra causas
maleficas, for-
tuitas, & spon-
taneas. Fore-
stus monet, uno
rene obstructo,
alterum inuti-
lem & viciem
reddi, propria-
que actione de-
stitutum, uri-
na fluxum in-
tercipere.

a Alterum de-
ficere notavit
Arist. 4 gen. an.
4. Ferne. unum
vidit mira ma-
gnitudinis. Ve-

sal. unum ob-
servavit in ha-
bitibus ven-
tre impense
prominentem.
b Eustachius
semel vidit me-
dia spina inni-
xum, Piccolh.
unum magnū
transversum
supra cavam
& aortam.

c Laurentius
unicum, tres,
& quatuor ob-
servavit.

d Gal. 5. us.
part. 5. 6. ad. an.
13. at. de ren.

aff. 1. assimilat
Graca litera
Sigma. Hippo-

crates de natura
off figuram cordis
tribuit, quia ventres
habent cordis instar.
Aret. 2. de signis diut. morb. 3. testibus si-
miles. Ruffo 2. part. 12. rotundi: in testudine
rotundos dicit Eustachius & semini Mandragora
similes. e Gal. 6. ad. an. 13. f Gal. 5. us. par. 6. g Ruff. 2. part. 12. dexter paulo
altior grandiorque. * Archang. Piccolhom. glandula
duae vel plures renibus incumbentes nonnunquam,
non vero in omnibus comperiuntur, quae carnem,
ipsorum renum carni per-
surgis sic haec ex copiosiore seminis portione
e renibus parentum ortu processisse, jure
existimari potest. Placentinus renes
succentariatos: quidem capsulas atrabilarias
vocant.

bilem excrementitiam copia superet: sic sanguinis serosi fortior attractio fit, & utra-
que pars in attrahendo æqualis est; sicque z uno obturato, ipsius tamen attractio &
profusio non cessat. Quod si unus a foret (quod rarum est) necessario ob vim seri
attracticem requisitam, ambos magnitudine y æquare debuisset; at sic corpus y in
æquilibrio non foret, nisi mediæ spinæ b imponeretur, cavæ & aortæ, resima facie in-
cumbens: hic vero situs, tum sanguinis, tum spiritus per cavam & aortam descen-
sum liberiolem, compressione impedivisset: quare Natura pro magno duos parvos
creavit, ne aut venter eminentior esset, aut animal in alterutrum latus inclinaret. Ve-
rum æque rarum est, tres c aut quatuor dari, sed eam conformationem non retinent.
Tres semel notavit Eustachius; (ex quo aliquot figuras desumptas huic editioni ad-
posuimus) quorum unus in dextro latere qui naturaliter se habebat: duo à sinistris
præter naturam, quorum superior admodum parvus, figuræ quasi triangulæ & satis
depressæ, sola substantia naturali similis, venam habens emulgentem à qua sperma-
tica, sed arteria emulgente & uretere carens. Inferior in sinistro spinæ latere situs &
à summitate quartæ lumborum vertebræ, usque ad ossis Sacri initium produceba-
tur, superius angustior, inferius latior: ad quem venæ & arteriæ emulgentes geminæ
ferebantur. Sic & Botallus renem plane monstrosū exhibet: erant enim renes
quatuor in una mole conjuncti, sinibus tamen ac vasis inter se divisi, ut figura ex ipso
desumpta, in appendice exhibet.

Figura d oblongi sunt, lati; superiore tamen parte latiores, quam inferiore: ante-
rius & posterius compressi, sed anterieus eminentiores, non semper eandem figuram
in homine servantes, quamvis aliquo modo phascolorum sine figura, sed non ita per-
fecte ut in brutis, & si superficiem planam spectes, folii asari: exterius (quam partem
dorsum [t. 21. fig. 1. c.] vocant) ad ilia e gibbosi, & rotundi; interius, qua venam ca-
vam spectant, partim gibbi, partim concavi, d simi, ita ut quasi in retusa lineæ spe-
ciem curvati videantur; talis enim pro vasis admittendis, & cavitate constituenda,
requirebatur.

Magnitudinem habent f quæ ipsorum actioni, serosi humoris expurgationi ob-
eunda sufficiat, quamvis frequenter g magnitudine [t. 21. fig. 1.] partes non sint, dex-
tro sinistro majore; nec pro corporis ratione conveniens proportio, magis tamen
longitudine variant, quæ fere quatuor vertebrae æquat, at latitudo trium, ut pluri-
mum digitorum est, & sinister sæpe dextro brevior, & quidem in scetibus insignis
magnitudinis existit: nam in homine renum dissimilitudo magna est, non solum ra-
tione situs & vasorum, sed etiam ratione magnitudinis figuræ, & coloris: contra in
brutorum renibus, eadem renum conformatio, & plerumque eadem, non tamen
semper, vasorum distributio.

Glandulæ (quarum primus Eustathius meminit) duæ utrinque * una reni cuili-
bet [t. 19. f. 1. B.] parte superiore qua venam cavam spectat, supra adipem incumbit,

ejusque

ejusque membranae exteriori firmiter adheret: quandoque renibus, sed diaphragmati valide alligatur, ita ut saepe non observanti, rene exempto, ipsi diaphragmati juncta relinquatur. Figura rarius renibus ^{††} respondent, sed ut plurimum placentae ^{††} in ovis reni depressae & latae, aliquando satis oblongae similes sunt: longitudine duorum digitorum, unius latitudine, mediocri crassitudine: hae magnitudine non semper pares sunt, frequentius enim dextra sinistram superat, rarius hanc illam. Substantiam habent renibus laxiorem, quibus cavitas impressa, quae humorem faeculentum nigrum continet. Vasa acceperunt, venas quidem ex mediis emulgentibus, rarius simul ex re-
nibus, aliquando à cava juxta hepar, aliquando ab adiposa, quandoque ab omnibus furculi partim in eorum substantiam, partim in renum superficiem mittuntur. Arteriola quoque modo una, modo duae, ab arteria emulgente principio communi pronatae, his infiguntur. Nervos & jam habent ab eo plexu nerveo retiformi, quem nervi costalis & stomachici aliquot propagines, circa Arteriae mesentericae principia inter duos renes efformantur. Usus: sunt qui velint, eas ad firmandam hujus plexus nervosi divisionem, adpositas esse. Sed cum in his humor niger faeculentus contineatur, an forte portio aliqua humoris biliosi nigri & excrementitii, qui renum meatus angustissimos permeare non potuit, huc reponi dicemus: à quo nimium coacturatio, forte etiam urinae nigrae aliquando reddantur.

Adeps ^h renum membranae exteriori copiose circumfunditur [t. 22. 00. pp.] cum propria vasa nutritionis gratia acceperit, ita ut in obelis penitus fere occultentur: cuius usus, ⁱ renum calorem fovere, ne ob seri copiam continuo dilabentem, calor sensim languescens extinguatur, sicque omnis renum actio concidat, & ne vasa distentione periclitentur: quare & intrinsecus, ^k inter membranam distributionem vasorum succingentem, & inter ureteris ramos in homine: ^l in cane vero, inter membranam, quae renum cavum efformat, instar mollissimi straguli subternitur, & sua leni ac lubrica humiditate, seri acrimoniam obtundit.

Membrana duplici renes teguntur; exteriori ^m à peritoneo juxta humiliorem diaphragmatis sedem, quae peritoneo nectitur pronatam, quae ipsis pertinaciter non adheret [t. 22. 00. pp.] qua cum involvantur, renū fascia dicitur, hanc venam adiposam [t. 18. X. t. 22. l. h.] recipit aliquando etiam ab emulgente furculum accipit, & copioso adipe obvolvitur, sicque renibus involucri, vinculi & mollis simul straguli loco est. Altera vero membrana, quae renum propria, & proxima tenuissima est, & à facciore sit: hoc tunica communi vasa quae renes ingrediuntur, (cum vena tantum cum unica tunica ingrediatur) cingente dilatata producit, quae validissime ipsis connascitur, ut ipsorum carnem alias firmam & densam compactiorem efficiat: & licet superficiem lubricam & splendentem reddat, adipe tamen caret, nullisque vasis intertexta est: hanc intus reflexa, vasa comitatur, ventres ⁿ subit, & ea undique cingendo, firmiora reddit.

Substantia [t. 19. fig. 2.] ipsorum caro ^o est dura, cordi similis, nisi quod fibris

L 2

(quarum

^{9.} non intra renes, cum densum sit viscus, sed circum renes. ^l Vesalius caninum secare jubet tanquam macilentum: hominis enim & ovis, nimium pinguem esse. in Gal. 6. ad an. 4. ⁿ Cava renum non subire voluit Arist. 3. part. 9. ^o Hipp. de corp. res. off. malorum speciem referentes. Aretaeus de acut. morb. cur. l. 2. cap. 9. hepatis speciem tribuit: Gal. inter viscera retulit. Hipp. inter glandulas collocavit, forte quia multa humiditate delectantur: vel ut Gal. 3. alim. 5. quod substantia tales putentur. Renum generatio ex materia parum glutinosa, ab exiguo calore, multoque frigido per concretionem geniti. Hipp. lib. de carnibus. ^p Hac ratione Galenus de ren. affect. 1. renum corpus ex fibris & carne constitutum describit.

^{††} in ovis reni
exiguo consimi-
lis: in homine
nullam rexis
formam praese-
fert: in pueris
etiam inveni-
tur Rioli.

^h Democritus.
Hipp. de nat.
hom. Arist. 3.
part. 9. vice
carnis eos obse-
ptos muniri a-
deo 3. hist. 17.
ut ex visceri-
bus maxime
pingues sint.
Voluit Arist.
1. hist. 18. & 3.
part. 9. dextrū
minus pinguem
quod natura
dextra partis
facciore sit: hoc
falsum credit
Eustachius.
ⁱ Arist. 3. part.
9. vult alimen-
ti concoctionem
& humoris se-
cretionem pro-
curare.
^k Arist. 3. part.

p Hac ratione (quarum vicem vasorum *p* fibræ suppleant) careat, densa ⁹ & compacta, quo calor inhaerens fortius & facilius attrahat id quod adeo propinquum erat (ad trahendum enim excrementum à longinquo ¹ instrumentum laxum aptius est) & expellat, neve ¹ sanguis, cum eo nutrirî debuerint, cum urinis elabatur (qui si renes probe nutriturus est retineri, ac undique diffundi debet) quod fieret, si caro immodice laxa foret. Verum utrinque ad sinus [t. 23. ee.] ubi vasa emulgentia in majores ramos dividuntur, eorum substantia laxa admodum & inæqualis est. Hæcque intrinsecus ductibus ab ureteribus per ipsam excurrentibus perforatur, & partes à carne extuberantes notantur, quæ substantia, figura & officio glandularum (unde forte quidam ¹ ad glandulas retulere) naturam emulantur. Extrinsicis vero, superficie est instar hepatis lævi & lubrica, colore (in recte valente) subobscurus ¹ & à colore phaeolorum rubrorum non longe distante, rarius intense rubro & splendente; in male affectis quemadmodum & hepar & lien varie colorantur. Est quine etiam rarissimum hominis renes extrinsecus ¹ inæquales esse, & quasi ex multis renibus seu glandulis exiguus componi, quemadmodum in bove observatur; quod in duobus foetibus, & in puella undecim annorum, & in quodam viro Romæ Eustachius notavit; quemadmodum adposita figura ostendit, quam Doctor Saltzmannus Argentinenſis Medicus in hac arte studiosissimus, (qui in factu & notavit & [tab. 21.] depinxit) ad me misit. Sunt tamen qui ex renum carunculis, postea explicandis, instar racemi conglomeratis, infantium [tab. 21.] renes efformari, ad modum renum vitulorum velint: dein ætatis progressu ex sanguinis affusione, carnosum integumentum circumjici, quod renis superficiem æqualem reddat: propterea in rene per dorsum dissecto, carnem sublividam renis corpus ambientem observari: alteram internam rubicundiorē, ex glandulis illis simul unitis concretam, quibus ren pueruli constabat. Sic urſi renes ex pluribus, quasi glandulis ceraſorum magnitudine cogmentantur, quæ tenuis membranæ beneficio invicem junguntur & alligantur, quarum divisiones copiosum pingue replet, Eustachio monente.

Ventres duos habent, exteriorem & interiorem; exterior improprie sic vocatus, [t. 23. d.] quem Portam ^x vocant in ſima parte; ubi totus quasi curvatus & reductus plærunque in tres partes dividitur; tubere enim illic prominente, in duos sinus satis alte prominentes rursus distinguitur, & vasorum bipartitorum [t. 23. l. b.] ramus unus superiori ejus sinus angulo, alter inferiori offertur, in Renum substantiam disseminandos, ex hoc & ureter progreditur.

Vasa quæ ad renes mittuntur, sunt venæ, arteriæ, & nervi. Venæ à cava ² prodeunt; harum altera adiposa, [t. 18. X. Y.] quarum dextra raro à truncato, sed ab emulgente, sinistra à Cava oritur, & ad exteriorem tunicam, eam irrigando, numerosa lobole distribuitur: interdum glandulæ reni impositæ, ramulum offert, qui eam perforans rursus in tunicam absumitur: altera, ab officio emulgens [tab. 18. a. b. t. 23. h. i.] (quam cum arteria meatus Aristoteles ^b vocavit) communiter utrinque ¹ utere cava, non ut alii scribunt ¹ sis subjectis, verum etiam in eodem sæpiſſime variant) insignis & omnium à Cava ^d pro-

b Sed non ad cavam pertinere voluit Arist. 1. hist. 18. vas venosum maximum in utrumque renem. Gal. 14. us. part. 7. sunt tanquam stomachi attrahentes, 16. us. par. 14. & 4. ejusd. 6. Arctæus de acut. morb. cur. lib. 2. cap. 6. alveolos vocat. c Similis singula utrinque: alii autem quibusdam animalibus bina. 9. ad. an. 13.

va^d prodeuntium amplissima, non quod multo alimento^e indigeant, sed ut libe-
rior & expeditior seroso sanguini transitus sit, à Cava^f trunco raro è directo prodi-
ens, brevi & obliquo [t. 2. 4.] itinere deorsum lata, in simam^g renum partem in duos
ramos bipartita inferitur, serosum sanguinem ex Cava eo deferens: in quibus valvu-
las feri refluxum in Cavam impediētes, observavimus: cum eis ramus unus aut al-
ter venæ sine pari (qua de re in thorace) unitur, ut sit inter thoracem & renes con-
sensus. Aliquando cava à trunco Iliaco pronata, sursum oblique tendens, infimo re-
num sede inferitur:

Arteriam^h habet utrinque unam [t. 18. sub a. b. t. 23. sub h. i. t. 2. 4. ch. 3. 5.] ab arteria
magnæ trunco emulgentem, insignem quoque, iⁱ quæ serosam humiditatem è san-
guine^k in arteriis, & quidem copiosissimam contentam expurgant; & una^l calo-
rem suppeditant, quo eorum frigiditatem; quam à seroso excremento recipere vo-
luit^l Galenus, evincere possint. Hæc vasa primum bipartita cavitatem^m ingressi,
statim in ramos quatuor vel quinque dividuntur, qui in multos alios rursus divisi, per
renis substantiam vario modo dispensantur [tab. 20. fig. 1. GG. & t. 5. renum fig. 2.] ac in-
vicem permixti uniuntur; & denique in tenuissimos, visumque propemodum fu-
gientes furculos cessant. Si enim ren incisus comprimitur, multæ sanguinis guttæ ap-
parent; quæ vasa p^r renis substantiam dispersa esse (quæ cerni non possunt) osten-
dunt. Hi vero furculi capillaresⁿ, carunculas adeunt; ut per eas feri fiat percolatio.
Alio vase tertioⁿ pro sui nutritione non fuit opus, cum purum excrementum non
trahant, quemadmodum utraq; vesica, quæ vasa alia habuerunt, per quæ illis ali-
mentum suppedicitur: aliquando alia à ramo Iliaco ortum ducens, cum vena reni in-
figitur. Et ipsa arteria, inter venam & ureterem media sita est, ut suo motu sangui-
nem serosum in renes propellat, forte etiam ut feri jam percolati descensum accele-
ret.

Nervos^o utrinque à sexti paris ramo stomachico (unde tantus ventriculi & re-
num consensus, & in nephriticis ventriculi subversio & vomitus) habent, qui deor-
sum ad radices vertebrarum lumborum descendunt, & in renum membranam p^rpro-
priam distribuuntur: verum etiam circa principia arteriarum mesenterii, non pauci
nervorum furculi invicem mixti prodeunt, quorum pars renes & incumbentes glan-
dulas adit; pars altera una cum arteriis emulgentibus cavum^q renum subeunt, &
per ipsorum substantiam distribuuntur: hinc Nephritici non modo gravitatis sen-
sum, sed vehementissimos^r quoque in renibus dolores experiuntur: quando vi-
delicet calculus extra carnem renum, in una ex fistulis ureteris subsistit; non tantum
idcirco, quod eorum cavernule, ut Galenus^s loquitur, non sint late, sed angustæ,
& renes ob firmitatem substantiæ non diducantur, ut vesica, sed propter ureteris
ramos nervosos per renum substantiam dispersos: major tamen dolor est, cum lapis^t
I. 33

k Erasistratus putavit renes solus venas expurgare, s. us. par. 5. l Gal. de ren. aff. 1. m Gal. de aff. ren. 3. renum ventres in
4 aph. 78. Piccolhom. negat recta in cavitates in renibus excavatas produci: contra quam Gal. 5. us. par. 5. perexigui
nervi, Gal. in 6 Epid. com. 1. tex. 6. p Gal. 2. loc. aff. 4. Colum. ad tunicam: Vesolito in internam tunicam potius, quam
in illorum corpus. Eustachius cap. 21. & 24. plures nervi in renes & hepar inseruntur, non modo membranam, sed
etiam substantiam. Piccolhom. in membranam & substantiam, quod accuratissime Fallop. notavit. q Contra Gal. 2.
loc. aff. 3. & 4. addit. proinde Hippocrates primus omnium scripsit, in rene dolor gravis (6. epid. part. 1.) & de ren. aff. 3.
r Aristi. renes omnium maxime sentire scripsit: Gal. modo nullum, aut saltem obscurum tribuit, modo perspicuum: nam
in 6. aph. 5. dolor inquit acutus sentitur. s de ren. aff. 3.

d de ven. & ar.
diff. 8. amplissi-
ma & brevis,
14. us. part. 7. s.
jus. s. Sic & in
Hippocr. de nat.
hum. com. 2.
text. 12. haud
exigua magni-
tudinis, 6. ad.
an. 13.
e Sed ut sunt
tanquam sto-
machi attra-
hentes, 16. us.
part. 14. vide
causam 5. us.
par. 5. multum
vero & sangui-
nis attrahunt
5. us. par. 6.
f De harum or-
tu ac dispensa-
tione, non eo-
dem semper mo-
do Hipp. agit, ut
videre est de
nat. hum. de
off. nat. de loc. in
hom. sed in lib.
de resect. corp.
relic.

g Gal. 5. us. par.
h Gal. 5. us. par.
7. 6. ad. an. 13.
i Gal. 5. maxi-
mum arteria-
rum jugum in
renes prorepat
16. us. part. 10.
j hoc dicit
prope maximas
2. nat. fac. 4.
causam reddit
5. us. par. 5.

Ureterem integrum ingreditur & propter sensum, & propter angustiam: & quamdiu is in uretere hæret, dolor & paroxysmus Nephriticus persistit: ubi vero vel ejicitur, vel ex uretere in renum substantiam redit, dolor & paroxysmus, solo gravitatis sensu remanente, remittunt: donec iterum calculus loco moveatur qui ureteres re-

Arif. 3. part. deat.

9. Interior ^u venter ^u sinum, quem pelvim sine infundibulum nominant, continet ^u Membranam ex nervea membrana factum, quem non emulgentia vasa ^y producant, cum in tenuissima capillamenta abeant, sed ureteres, qui in renum cavo latiores [t. 20. fig. 1. F.] primum redditi sinum hunc constituunt: alia enim cavitas in humano rene querenda non est, quam ea quæ ab uretere ob suorum ramorum concursum efficitur ad cujus utrumque latus, antequam vasa in minores ramos dividantur, renum substantia laxa & inæqualis (aliis Anatomicis modo cavernosa, modo spongiformis, modo erosa nominata) apparet, ubi adeps, qui undique circumfusus est, diligenter remotus est. Dividuntur autem Ureteres in ramos [t. 19. f. 2. ccc. & t. 5. appen. f. 1.] majores primum binos ternosve, (ut clarius sequenti capite) hique in alios quamplurimos, non quidem aliorum vasorum modo in capillamenta attenuatos, sed in fine latos (ita ut octo ^z vel decem rami observentur fistularum seu ductuum forma) quo carunculas excipiant.

Carunculæ autem ex renis substantia productæ, renum carne duriores, minusque coloratæ, acuminatæ sunt & parvas glandulas referunt, singulorum ductuum ureterum extrema ingrediuntur & operculi modo obstruunt: per quæ veluti tubulos serum, ^b seu aquosus humor bile perfusus segregatur & ab eis veluti lac ^e papilla exudat, & sensim in has fistulas ureterum seu canales membraneos, eo modo quo lixivium per foramen angustum stipula obturatum percolatur, (quod Colatorium est) & in communi illo sinu, quem pelvim vocant, colligatur, indeque deorsum per Ureteres in vesicam mittatur: plures esse debere, ad actionem celerius absolvendam, ut sic sanguis serosus veluti in plures renes distributus, minore labore à sanguine renum futuro alimento, serum segregetur. Hæ si secundum longitudinem dissecantur, in iis sulci & canaliculi, non secus ac ^a pili tenuissimi exsculpi observantur, vel veluti lineæ à centro ad circumferentiam protractæ, quarum causa ejusmodi carunculæ, quasi ex pluribus fibris concurrentibus intextæ apparent. Hæ angustissimæ (ut vix capillum admittant) perforari debere, ne sanguis, qui pro renum nutritio- ne, & quidem vi eorum attractrice propria per emulgentes allectus, una cum sero & bile effluat (quod aliquando renum facultate segregatrice & retentrice labefactata, nonnunquam & meatibus latius ^c patefactis, & quidem absque dolore evenit) cum

num differre, cum in humano ejusmodi cavitates non reperiuntur. ^z Fistula in renibus humanis sex, septem, octo, novem, quarum non meminit Ves. nec Columb. quia belluinos tantam secure in quibus non sunt Piccolhom. * an Hipp. intellexit dum lib. de gland. scribit & renes glandulas habere, quia & hi multa humiditate exsiccantur: majores & jam hac parte quam alia glandula existunt: influens enim humor in renes non imbibitur, sed perfluit infra in vesicam: & num de his carunculis 4. aph. 76. intelligendus? quibus in urina crassa existente, caruncula parva aut veluti capilli una exeunt, iis à renibus excernitur. Hollerius, in ulceratione renum, similes carunculas excretas vidit. Has Rondeletius processus mammillares vocat, & se primum inventorem ait. a Gal. de ren. aff. 1. b Hipp. de off. nat. per renes aqua veluti excolatur: spongia enim simile est quod ab his ad vesicam tendit, illicque urina à sanguine percolatur & se- cernitur. Gal. 5. us. part. 7. foramina quadam, per quæ urina percolatur renum substantia concedere videtur, ne sangui- glabatur. c Gal. 6. Epid. com. 1. tex. 6.

eum hæc non coctione, sed transfusione secernantur, nō negantes tamen, adhuc amplius in iis elaborari. Qui sanguis à renū carne quasi fugitur, & instar facis cuiusdā ei aspergitur: inde paulatim vaporis modo in totū dispergitur, adherescit, unitur, atq; de mū alimentum fit renib. nō n. sero † nutriuntur, cum nulla pars excremento nutriatur. Verum cum ob tenuitatem parum alat, subinde multus attrahitur multumque seri, quod retento sanguine per carunculas sensim exstillat. Hæc etsi à plerorumque sententia aliena sint, commode tamen demonstrari possunt, si vasis ingredientibus, & ureteri egredienti, stylus indatur, & ad simam partem sectio instituatur: elegantius adhuc, si visceris carnem ab ipsi vasis separaveris, quemadmodum figura nostra [t. 20. f. 1. at multo elegantius t. 5. appen. f. 2.] exhibet; quæ sane separatio, licet alias aliter senserimus, nos veritatem docuit qualis etiam in suum renibus demonstrari potest. Sed hæc de canibus, cum eo modo non inveniuntur, & frequenter studiosi in eorum sectionibus, ob humanorum cadaverum penuriam, exerceri soleant, breviter eorum structuram subijciemus.

Renis canini structura [huc facit t. 20. fig. 2. & t. 6. appen.] talis est; membrana renem proxime involvens ejus cavum subit, intus reflectitur, & non secus ac corpus membraneum, à quo ureteres prodeunt, hinc inde expanditur, cui adeps adheret, eique emulgentium in renem distributio incumbit; hæc plurima foramina habet, vasis in renem iter præbentia. Succedit corpus membraneum dictum, quod in plures remos dividitur, & tanquam operculum vasorum & adipi circumponitur, quod cum priorē membrana in extremis partibus connatum, cavitatem quandam efformat, quæ eadem vasa & adipem continet. Huic corpori membraneo renis cavum, quod ab eo & renis substantia constituitur, incumbit; in cujus medio, portio substantiæ renis gibbam ejus partem respiciens, colore ab aliis varians, & membraneo operimento carens, formaque nascentem lunam referens, non secus ac septū quoddam pendet, & membraneo corpori ita incumbit, ut ejusdem renis cavitas gemina esse videatur: & revera in cane cavitas simplex non est, sed gemina sibi invicem juncta, primam, quia instar cribri perforata est, in cerniculum, secundum pelvim aliqui vocant. At in humano rene ejusmodi cavitates non inveniuntur, sed vasa emulgentia, & ureteres in varios ramos per ejus substantiam dividuntur, & ab his cavitates, quæ in renibus sunt, efformantur.

Ulus renum, propria facultate attractrice, serosum humorem ob totius substantiæ similitudinem, à sanguinis tam s venosi, quam arteriosi massa per vasa emulgentia trahere, sicque utrunque sanguinem à sero repurgare: quæ enim particula per amplā orificia succum accommodatum trahunt, illum solum, purum & sincerum trahere non possunt, sed alterius & diversi generis admistione; quare cum

riunt, aves piscesque non habent renes, 2. hist. 16. f. Erasistratus quod urina segregatio fiat, scribit, sed qua ratione non docet, 1. de nat. fac. 16. & 17. & 4. us. part. 13. serosus humor tripliciter colligi potest: Vel propria natura adeos fertur: vel vasis transmittitur, vel à renibus attrahitur. Aerros voluit sua sponte ferri, quemadmodum & alimentum ad membra feratur, non autem à membris attrahi. Renes ad se allicere docet ex Hippetiam sententia Gal. 1. nat. fac. 15. & quod Vena ad renes non mittant, ostendit 2. ejusd. 16 loc. aff. 3. de rer. aff. 19 compos. med. secundum loc. 2. g. Ex vena humoris excrementum ad renes Arist. 3. part. 9. à vena, quæ in gibba hepatis Gal. de util. respir. ex concava vena attrahitur, 6. loc. aff. 3. h. Gal. 5. us. part. 5. i. Sanguis universus, quæ ad cavam pervenerit, à renibus expurgatur, 4. us. part. 13. 5. ejusd. 5. 6. de plac. 4. & quidam perfecte 5. us. par. 6. de renibus aff. 2.

d Gal. 5. us. part.

6. hic notandū

secundarii dicti

humores, quæ

male ab Ara-

bib. inveni di-

cuntur, de qui-

bus & Hipp. de

alim. pūdor

ago pū, oioy ago

pū, & ago pū

Gal. 5. fac. nat.

13. & & & & &

& & & & &

epicloris, & 10

meth. in febrī

hectica, siccita-

res quatuor

ostendit.

† Subertus de-

cad. 2. parad. 6.

hoc statuore vi-

detur.

e Frustra à na-

tura conditos

quemadmo-

dum & Ure-

res Asclepiadis

sectatores affir-

mant 1. nat.

facul. 13. & E-

rasist. quando-

que id asserit 2.

nat. fac. 4. Ari-

stoteli nulla ne-

cessitate haben-

sur, sed ut me-

lius & locuple-

tius, 3. part. 7.

forte quia par-

tes, quæ anima

libus necessario

insunt, omni-

bus etiam ine-

runt: at anima

lia, quæ ova pa-

sero & sanguinis humidioris & tenuioris multum, & multum ^k bilis flavæ à jecoris vesica non repurgate, attrahitur. At serum à sanguine in ipsa alimenti concoctione, vi renum ^l segregatur, eorumque facultas attractrix, sanguinem in eorum substantiam pro ^m nutritione, reponit: serum vero tanquam inutile, facultas expultrix per caruncularum sulcos in fistulas membranosas (per quas & arenulæ è corpore renum, una cum ⁿ urina transeunt) ureterum ^o percolat, quod in cavitate ureterum majore colligitur; per hos ^p ad vesicam demandatur, ibi colligitur, statò tempore retinetur, & tandem inde tunc, cum ^q ratio jubet, sphinctere laxato, per penem expellitur. Bilis vero cum urinis permeat, ut ureteres eo modo quo intestina mudentur, unde & urinæ flavescent, ^r

m Derenum affect. i. n Lycius Macedo censuit urinam esse excrementum nutritionis renum, I. nat. fac. 17. s. u. f. part. 5. o Gal. 5. u. f. part. 6. p Hipp. de homin. struct. Gal 6. plac. 4. q Gal. 5. u. f. part. 5. r Opiniones de feri percolatione. I. Omnibus recepta fuit ante Vesalium opinio, adhuc à nonnullis reservata, in renibus duos esse sinus secundum vicis longitudinem sitos, unum elatiorem, alterum demissiorem, quos transversa quidam membrana, quæ cribri modo sit pervia (quam renis calatorium vocarunt) distinguit in superiore sinus, emulgentes serosum sanguinem fundere inferiori sinum, ex quo ureter prodeat, & urinam colatam excipiat: II. est Vesalii (qui caninum aut caprinum sumere jubet, sibi ab humano ob pinguedinem metuens) & plerorumque ante Fallopium, qui renes duos sinus obtinere voluerunt: alterum, æ emulgentium renem subeuntium extremis contextum, quod vasis modo cavum, per renem corpus distribuitur, mox in partem anteriorem & posteriorem divisum, quorum quilibet sex, septem & plures crassos ramos producat, æ qualiter à se distantes, ita tamen, ut anteriores cum posterioribus in exteriori sede circulum constituentes uniantur, sicque mutuo cavitatem constituere, quæ serosum sanguinem suscipiat. Alterum, à posteriore parte esse, inter illius corporis membranæ ramos, qui portione aliqua substantia renum (citra tamen nexum) intercedente in duas partes dividatur, bique serum à substantia renis destillans suscipere, & ad ureteres mittere, hunc inter dissicandum humidum & exanguem occurrere: illum vero sinum sanguine plenum semper inveniri. III. opinio à Fallopio primum, dein clarius ab Eustachio proposita, ea est, quam tanquam veriori sequimur.

De Ureteribus.

С А Р У Т XXIII.

De his egit Cal. 5. us. part. 5. & maxime 13. 6. admin. ana. 13. I. nat. fac. 6. & 13. Arist. I. hist. animal. 18. & 3. par. animal. 9.

a Asclepiadis
discipuli nega-
bant meatus
manifestos à re-
nibus ad vesti-
cam, I. nat. fa-
cul. 13.

b *Ab urina*, 6.

ad.an.13. c.Gal.5.uspar.5.6.ad.an.2.&13. Græci quoque *ἐσπερος* & *νύκτερος* ἑσπερινὰς vocarunt. Arist. 1. hist. 18. *πορὶ* & *νενε* cava & nervosa 3 part. *πορὶ* fovea meatus: at Gal.6. ad an.13. *alius vas, alius meatus* (ut Hipp. 4. de morb.) *aliis arteriis, aliis vena dicitur.* Stomachi 4.uspar.5. Hipp.arterias appellasse videtur, lib.nat.off.2. Epid. sect.4. *venas in vesicam*, Hipp.de off.nat.vocat. d. Deglandulis, & de resect.corp. c. Gal.1.nat.facul.13. *Æschulionem* notavit. Eustach. non raro duos, ac etiam plures. Carolus Stephanus in sua anat. scribit, se in humano cadavere vidisse remem-

utrumque non amplius seminis mandragora figura, sed habens duas cavitates veluti crenas quasdam in sui parte interiore, quæ ad venam cavam est, quorum utraque crena porum unum ureticum emitteret, quasi duplicem renem in una & altera corporis parte judicare posset, cum ab utroque renes duo ureteres prodirent, neque minores quam in aliis corporibus conspici solent, qui tamen circa os pubis antequam vesicam ingrederentur in unum coibant. Simile fere apud Fallop. in obser.

renibus, inferius vesicæ, cum renes & vesicæ committantur modice versus interiora reflexi, ne obliquum nimium ductum efficiant, descendentes vesicæ [t. 21. f. t. 22. ch. 18. 20.] junguntur: quandoque duobus, & tribus, etiam plurimis ramis renem egreditur [t. 3. app. fig. 1. f. 2.] qui tamen paulo sub rene, vel supra vesicam in unum coeunt. Duo quoque utrinque observati fuere, qui in renibus binas cavitates, membrana intercedente constituiebant, qui æqualiter magnam vesicam delati, eorum alter in fundum Vesicæ, alter juxta cervicem inferebatur. Verum & in his varietas observata [t. 3. app. fig. 1. 2. 3.] cum interdum juxta exitum satis latifint & aliquando alter instar oblongæ vesiculæ appareat, renis simam partem perreptans, in quem plures meatus ex rene feruntur, qui interdum multis arenulis pleni sunt. Aliquando sinister, rene magno existente, ex eo meatus tres egrediuntur, quorum inferior tribus principiis donatur, qui cum medio coit, ac unus cum eo efficitur: dein etiam cum superiore unitus, cum hoc ad renis humiliorem sedem unus Ureter efformatur. Sic & dexter, in principio satis latus ex quinque propaginibus conflatus, oblongam vesicam instar peræ pastoris recurvatam refert, aut Threicium gladium altera parte flexum repræsentat, quod aliquando calculis plenum inventum est.

Figura teretes palmum circiter longi, paleam latitudine imitantes, in calculosis sæpe ad modum intestini alicujus dilatati, (in quorum altero aliquando subsistit, & si descendere nequeat in renem remigrat, tuncque omnis dolor cessat; non temere ergo calculum movere oportet) concavi, literæ f. instar obliqui, in mulieribus vero lati, recti, & breves, hinc minore cum dolore calculos rejiciunt.

Substantiam habent proprie albam, unde nonnullis venæ albæ dicuntur, & exanguem, crassam, nervosam (quare aliis nervosi canaliculi) ideo & validi sunt, quæ in nulla alia parte reperitur, nisi in vesica, cujus substantiæ interiori similes sunt, eique continuantur: ratione cujus substantiæ, & quod à vesica citra fractionem, à renibus vero integri separari possint, à vesica originem eos ducere, pronunciare liceret, etsi à renibus enasci dicantur. Quam substantiam, quæ fibris obliquis ad distentionem donatur, si quis eorum propriam & peculiarem tunicam appellare volet, quam membrana communis à peritonæo pronata, roboris gratia investiat, non contradixerimus.

Verum ureteres, ubi interiorum renum ventrem succinxerunt [t. 20. fig. 1. f.] & fistulas octo vel decem constituerunt, è sima renum parte egrediuntur: vel si major dicas, ubi ureter renem (hominis non canis) ingressus est, latior paulo redditus in duas quandoque in tres partes dividitur [t. 5. renum fig. 2.] quarum una sursum, altera deorsum tendit, ambæ vero in alios ramos, interdum quatuor sæpe quinque dividuntur: quo fit, ut eorum divisiones octo vel ad summum novem, aut decem sint,

M

quæ

an. 13. n Gal. 5. us. par. 13. 6. ad. an. 13. o de cavo renum, Arist. 3. hist. 4. ex rene in vesicam enascuntur, Hipp. de off. nat. ex renum ventriculis, Gal. 6. Epid. com. 5. tex. 4. p Ureteri unica peculiaris tunica, 6. ad. an. 13. non habet duas tunicas, nat. fac. 6. duas habet tunicas, Eustach.

g Gal. 5. us. par. 5. vesica ex renibus dependet, Arist. 3. part. 9. 1. loc. aff. 1. Uretes oblique vesica implantantur.

h Gal. 6. ad. an. 13. forma triangularis. Hipp. de ref. corp. i Celso lib. 4. c. 1. Venarum corpori similima Ves. arteriarum instar, Col. nervea admodum Laur. nec arterias, nec venas, nec nervos esse ostendit, Gal. 1. nat. fac. 6. k Arist. 3. part. 9.

l Arist. 1. hist. 8. nervosi canaliculi, Aretæo 2. de causis fig. diut. morbor. 3. m Arist. 3. part. 9. prælongi fortes, Gal. 5. us. par. 5. & 6. ad.

quæ in latum finem rotundum desinunt, quo singulæ carunculam mammillarum papillæ similem, à renum carne pronatam, instar operculi carnosæ excipiant, quo per eas serum in singulas fistulas percoletur: sæpe etiam plerique ex his ramis in medio quoque perforantur, quæ non secus, ac extrema ipsorum oscula carunculam similiter admittunt. Implantantur autem in vesicæ posteriorem ⁹ & humiliorem [t. 12. 4.] sedem (quia commodius non poterat, cum vesicæ recto intestino adhæreat) non longe ab ejus cervice ad ejus musculum inter duas vesicæ proprias membranas ad parvi digiti latitudinem delati, à se invicem duorum circiter digitorum distantia, obliqua ¹ insertione, angusto meatu, vesicæ cavitatem penetrant & sic serum non transudant, sed per manifestos ductus vesicæ infunditur. At obliqua hæc implantatio, ob vularum instar & follium membranulis similes, à vesicæ substantia ¹ minime diverfis, ureterum insertionibus adpositis, plures adscribunt: quarum etiam usus sit, urinæ in vesicam fluenti cedere, & ne eadem vesicæ admodum distenta, vel etiam in ventris compressione, regredi possit, ureterum meatus occludere: & sane ita occluduntur illi meatus, ut ne statum, ^u cum vesicæ alicuius suis à pueris inflatur, & ad collum arctissime colligatur, erumpere sinant. Quare Galenus hos meatus ^x prædicans, argumentum dicit esse excellentis cujusdam sapientiæ Conditoris nostri, simul & providentiæ in animalibus condendis: sed impropria hæc est membranulæ vel operculi appellatio.

Vasa quoque recipiunt, capillorum modo tenues, venas & arterias à vicinis partibus: quarum aliquæ etiam satis evidentes, elegantissime dispositæ in tunicam exteriorem disperguntur. Nervos vero à sexta conjugatione & medulla lumborum, unde eximius ^v eorum sensus, & exquisitus dolor, cum calculi, vel in iis sunt, vel pertranseunt circa illi regiones.

Uusus horum, ut eorum tanquam canalium interventu serum cum tenui bilioso excremento à renibus eorum ^z vi à sanguine secreta, in vesicam, longe ab illis distantem, & in ima ^z dominis parte veluti cisternam quandam sitam, deferant, ubi tunc nomen mutat & urina dicitur; per quos & arenæ & aliquando calculi transeunt.

Uusus horum, ut eorum tanquam canalium interventu serum cum tenui bilioso excremento à renibus eorum ^z vi à sanguine secreta, in vesicam, longe ab illis distantem, & in ima ^z dominis parte veluti cisternam quandam sitam, deferant, ubi tunc nomen mutat & urina dicitur; per quos & arenæ & aliquando calculi transeunt.

De Partibus Virilibus Generationi dicatis.

CAPUT XXIV.

Ad animalis generationem

quomodo viri ac mulieris semen concurrat, & unde sexus discrimen fiat, vide Gal. 14. us. part. 7.

Etsi partes ad nutritionem facientes, nec dum absolverimus, cum tamen Anatomicæ methodus, (quando unius tantum corporis copia datur) nunc Generationi dicatarum partium demonstrationem requirat, earum historiam subnectemus; quæ cum duplices sint, Viriles & Muliebres, de virilibus primum sermo erit. Viriles licet variæ sint, omnes tamen in unum conspirant ut semen conficiant, ex quo tantamquam

quam principio, sua vi formatrice apto, homo generatur: hoc autem cum præparatione, coctione & elaboratione opus habuerit, pluribus ad id instrumentis eguit. Quare alia materiam seminis deferunt, eamque præparant, Vasa spermatica: alia elaborant, Parastata: alia vim prolificam tribuunt. Testes: alia semen prolificum deferunt, in propria conceptacula, vasa deferentia: alia ipsum veluti promptuaria recipiunt, & in tempus coitionis conservant, Prostatæ: aliud in uterum effundit, Penis: ex quibus si unum defuerit, omnis procreandi vis conidit. Ne vero canalis penis ab acrimonia seminis, vel urinæ lædatur, oleaginosum humorem natura creavit, & Vesiculis indidit, quas seminarias alii vocant.

De vasis spermaticis præparantibus.

CAPUT XXV.

De his vide Galenum 14. usq. part. 12. & 13. de semine 15. Aristotelem 3. hist. animal. 1.

VASA spermatica, ^a quæ in ^b maribus majora, duplicia sunt: alia præparantia, alia ejaculatoria. Præparantia [t. 22. t. x. a. tab. 23. fig. 1. o. q. r.] quæ ^a πρὸς φλεβῶν Arist. 3. hist. 1. Vasa lumbaria Galeno ^a dicuntur, quatuor sunt. Venæ duæ [t. 22. t. x. tab. 23. o. q.] Arteriæ duæ utrinque una [t. 22. m. t. 23. h. i.] Vena dextra [t. 22. t. tab. 23. o.] paulo infra ^c emulgentis [t. 22. m. t. 23. h. i.] exortum à trunci Cavæ ^d superiore, & anteriore sede, quasi oblongo & crassiusculo [t. 22. n. t. 23. p.] tubere oitur, (cui ab emulgente surculum accedere, Galenus notavit) quo puriorem magisque coctum sanguinem deferat: sinistra [t. 22. x. t. 23. q.] non à trunco prodit, nam si ex eodem, quo dextra, loco ortum traheret, arteriam magnam [t. 23. g.] necessario supergrederetur, à cuius continuo elevationis & depressionis motu, cum exilis sit, vel disrumpere, vel à proprio munere impediretur, vel utraque sibi invicem impedimento fuissent: quare ad hæc evitanda, ab emulgentis humiliore sede [t. 22. n. t. 23. i.] principium ducit, (cui nonnunquam à cava trunco ramulus [t. 22. y.] commiscetur) & sanguinem magis serosum ^e devehit.

Arteriæ duæ sibi proximæ [t. 22. a. t. 23. r.] ex Aortæ trunco medio, longe sub emulgentibus prodeunt, ut tenuiorem ^f sanguinem & spiritum magis defæcatum, deducant: quarum dextra, Cavæ trunco [t. 23. fig. 1. f.] conscendens, oblique ad venam properat; sinistra suilateris venam accedit, quæ aliquando deest, tumque venam ipsa amplior est. Venis enim arteriæ ampliores sunt, quia plurimum caloris & spiritus vitalis in testes influere debet, quo semen perfectum, plurimo spiritu & calore vitali sit confectum. Rato enim utraque arteria deest: an forte iniis, qui steriles sunt, eum spiritus vitalis non influat? Hæc vasa, dextra venâ cum arteria, & sinistra vena cum sua arteria, parum distantia [t. 24. fig. 2. 00.] peritonæo incumbunt, & deorsum protensa fibrosis nexibus [t. 24. fig. 3. NN.] committuntur, supra ureterem [t. 22. q. 22. q. mulgente prodibat, Vesal.

M 2

rurum est utrumque ab emulgente prodire. e Gal. voluit sic serosum sanguinem semini communicari, cuius acrimonia vi in semine emissionem pruritus excitetur: quod Vesalius multis rationibus refutare studet. Et Colum. exempla adducit eorum, quibus ob herniam testis sinister ablati, qui tamen postmodum eadem voluptate, qua ante perfruebantur, & Erasistratus in arteriis sanguinem negavit: & Aristoteles, seminales arterias sanguine vacuas voluit.

22. q. q. t. 23. fig. 1. m. n.] oblique ducuntur, (sirculis peritonæo [t. 22. β. t. 21. f.] in transitu communicatis) & ad inguina, peritonæi productionem [t. 22. γ. t. 24. λ.] quæ exactissime vasorum lateribus connascitur, cum nervo gracili à sexto pari, & Cremastere musculo [t. 22. ψ.] permeant, & tum extra ventrem delata, ad Parastatas [t. 22. ε. t. 23. u.] & elatiorem testis sedem feruntur; ubi arteria cum vena commixta, unum corpus & pyramidem [t. 22. δ. δ. ad i.] utrinque depressam referens, efformant, quod ab innumeris venarum & arteriarum ramulis per Anastomoseis junctis, quibus intertextitur, plexusque constituitur, *κερσοειδής* h. *παρὰ στήθους*, corpus varicosum [t. 22. δ. t. 23. t. & tab. 24. f. 2. κ. fig. 3. C. initium, D. basin notat] & à pampinorum forma, pampini forme dicitur: lubet corpus varicosum pyramidale vocare, ad differentiam Parastatarum, quæ etiam [t. 22. ε. t. 23. u.] corpora varicosa dicuntur. Horum vasorum usus, non solum sanguinem tum venalem, tum arterialem cum spiritu vitali, ad testium nutrimentum & vitam deducere; verum etiam materiam (excrementum benignum, i. utilis & ultimi, k. alimenti) ab omnibus l. corporis partibus, delapsam & jam immutatam, ut plenius in libro Similarium partium ostendimus, recipere, & ad Parastatas pro seminis generatione deferre, cujus prima sit non solum sanguinis dealbatio, quæ post dimidiam eorum productionem observatur, sed præparatio in prædictis plexibus vi à testibus affulgente: quare corpus hoc basi sua intimæ testium tunicæ, et ramulos largiens pertinaciter adnascitur, non vero testis corpus integreditur, licet quidam m. velint, multos ramulos pertransire, & per testis substantiam disseminari, tenuissimis tunicis donatos, quo vis seminis procreatrix celerius à testibus in ea vasa influat, quemadmodum in hepate, venarum per ipsius carnem disseminatarum, tunica tenuissimæ sunt, quo facilius sanguis alteretur & concoquatur. *περὶ δὲ τοῦ αὐτοῦ*

g Corpus hoc nidum erucis aut lumbricis plenum, aut seminis rustici sura temporum v. cutim varicibus turgidam refert, perraro autem varices capreolorum ac pampinorum vitis imaginem exprimunt, Vesalio.

h Ruffo 1. part. 29. Gal. 1. de sem. pampini forme: lumbricium quibusdam Arabum interpretibus, nonnullis *τοῦ* tur.

retiformis plexus, corpus varicosum, Vesal. Laur. vas varicosum, Plat. i. Arist. 1. gen. an. 18. k. hoc est, portionem sanguinis in partium assimilatione redundantis, ipsarumque viribus præditi, qui ab omnibus partibus in cavam remissus, & inde ad testes. l. Hipp. de genit. m. Vesal. implicato præparantium ad testes descendit, & perforato Epididymo, ad testium substantiam penetrant. Columb. testiculo inseruntur, non tamen ita ut testis caput ingrediantur, Fallop.

De Parastatis.

CAPIT. XXVI.

De his Galenus 14. us. part. 11. 13. & 14. 1. de semin. 15. & 16. & libro finitionum Medicorum.

a Gal. 1. sem. 15. & 14. us. part. 14. Parastatas varicosos communiter Anastatici nominant: at Fallopio, Epididymus: vas deferens semen à teste ad vesicæ cervicem, Vesal. & Plat.

Parastatas, quasi superficialiter testibus adstant, & *ἐμδιδυμίδες*, a quod testibus imponantur, nominantur corpora extra abdomen in scroto sita, quæ testibus [t. 22. ε. t. 21. u.] (quibus cum natura, aut similitudine, aut usu similia) tunica interminuter anaadhuc obvolutis [t. 22. ζ. t. 23. f. 1. x.] tutelæ gratia imponuntur, capiti & fundo validissime alligantur, in medio se junguntur; quæ à corpore varicoso pyramidem referen-

referente [t. 22. tab. 23. t.] per continuationem oriuntur, & oblique posterius versus inferiora ad testis fundum prorepunt, indeque rursus sursum [t. 23. fig. 2. v. a. 3.] citra connexum tamen, reflectuntur, & ^b in orbem revoluti compacti capreoli formam referunt; quare ^c *κισσιδεῖς μαργαρίται* ex Herophilo ^e Galenus vocat. Sunt enim alba, oblonga, crassa, ^d teretia, convolutionibus instar xylocampi distincta, quæ sensim angustiora fiunt, & utrinque in vas deferens (cujus vasis principium aliqui ^e dicere maluerunt) quod teretē nervum refert, desinunt: & cum horum substantia, testis substantia aliquantū solidior sit, mediam inter ^f vasa & testes naturam obtinent, duriores scilicet his, & molliorem illis: Hæc etiam exterius membranosa, nervosa, & ubi convolutiones non sunt, levia, intus vero glandulosa, & si secentur fungosa, & quasi ex minimis ^g veluti glandulis formata forent, conspiciuntur: ubi vero à testis tunica (à qua separari possunt) acutiori cultello remonentur, aspera, nec meatibus pervia apparent: sunt tamen qui velint, perexiles fistulas cum testibus continuatas, ut pereas vis spermatica à testibus promanet.

Ulus harum est, vel ut semen nondum elaboratum, è vasis præparantibus in ejaculatoria delabi non sinant; vel ut semen præparatum, ad perfectam ⁱ elaborationem, testium irradiatione adjuvante, perducant: siquidem sæpe semine referti reputantur, ita ut testiculos ^k liceat appellare ad testium differentiam. Dein, ut impedian, ne libido ^l vehemens crebraque excitetur.

^b Gal. 14. us. part. 12. & 1. sem. 14. dicit varicum infiar.
^c Gal. 14. us. part. 11. & 13. 1. sem. 15.
^d Durioris nervi modo dura, Vesal.
^e Vesalius & Plat.
^f Sic Galenus aut divinis, aut ab Herophilo sumens, Fallop.
^g veluti etiam gurgulio: in crudo: & cocto teste observes.

Fallop. ^h Innumera fibra candida & crispæ capreolorum vitis in modum convoluta, per testium carnem varie disperguntur, ab ipsis testibus tanquam à terra succoplena, perfectum semen attrahentes, & ad varicosum canalem seu vasa ejaculatoria spermatica deferentes, Vesalius. ⁱ Excoquendo & dealbando semen perficiunt, auctori definitionum: & in iis semen fieri ostendit Galenus. Sed de seminis generatione, materia & loco consule Gal. 14. us. part. 10. & ^k *κισσιδεῖς* testiculum appellare possumus. & cum ipsi testi adhæreat, ^l *ἐνδιδυμίδω*, Fallop. ¹ Arist. 1. gener. 2. 4.

De Testibus.

CAPUT XXVII.

Historiam testium vide apud Galenum in introduct. 11. lib. de dissect. vulvæ 6. 14. us. part. 10. 12. & 14. 1. de semin. 15. & 16. Apud Aristot. 1. hist. anim. 13. & 3. ejus. 1. De ipsorum vero musculis egit Gal. 14. us. part. 14. & lib. de dissect. muscul. 27.

Testes sive testiculi, quod virilitatem ^a attestentur, ^b *ἄρχαι* ^b forte *ἀπὸ τῆς ἀρχῆς*, a Unde in car- quod non nisi cum impulsu semen effundatur; vel *ἐργαζόμενοι* quod lasciviendo mine magnis testibus res ista semen profuat: ^c *διδυμοί* ^c gemelli, Herophilo, quod communiter bini ^d sint ad fructum agitur, id est, candidatem: rarius enim unus, rarissime tres. ^e simul reperiuntur: nonnunquam maxime viriliter. Sed non M. 3: tuber-

solum virilitatem, verum etiam masculorum salutem, mortem quandoque testantur: Si enim cum scroto laxati & oblongi, virum enervatum & moribundum: Si sursum contracti, & in angustum adducti servatum iri, muliercula testantur. ^b Ab *ἀρχαῖς*: *ἄρχαι* autem dux est populi: quasi animantes, testiculos habentes sint ductores totius gregis, Piccolhomino dicuntur etiam *ἄρχαι*, *ἀρχαί*, *κισσοί*: vide lib. nostrum de partibus externis cap. 12. ^c Unde in Græcorum monumentis legitur, Didymum tubicinem in adulterio deprehensum, ex nomine suspensum. ^d Arist. 1. hist. 13. ^e Piccolhom. unicum aliquando reperit.

tenuior est, efformatum, cui nihil pinguedinisⁿ adjectum est, quo facilius extendiⁿ haec peculiar-
cum testes semine turgent, & corrugari & crassius, ut sit loco complurium membra-
narum, effici possit. Licet enim membranæ adsint, exque vasis plurimis inter-
textæ, quas potissimum ad pinguedinis generationem requiri ostendimus, nul-
la tamen pinguedo adest, quia nihil oleosi remanet, quod in pinguedinem
concrelescere possit; cum omne illud, quod à nutritione testium redundat,
in semen commutetur. Hoc parte sinistra laxius est, idcirco testiculus sinister
* magis propendet. Alterum^o *δυσπρός*, quod facile ab aliis separetur, dictum, quod
à panniculo carnofo [t. 18. t.] longe quam alibi tenuiore, venis & arteriis referto
producit. His, ne nimio calore frigoreve lædantur, sicque infæcundi reddantur,
investiuntur & suspenduntur, Peneque flaccido, magis dependent: eo vero disten-
to, cure tunc collecta & corrugata, & sursum cum Pene retracta, sursum quoque al-
licuntur.

Propria tunica, quæ quemlibet distinctum investiunt, duæ p sunt. Prima exte-
rior, *ἐλκυσσώδης*, & vaginalis [t. 18. u. ubi adhuc integrat. 2. 4. f. 2. 1. 1. t. 2. 2. ad 2. x. ψ. dissecta]
à forma, dicitur *ἐλκυσσώδης*, id est, capreolaris Paulo; à peritonæi¹ processibus
emata, valida est, & tenuis, quæ exterius fibris quibusdam membraneis [t. 18. u. ad
t.] frequentibus, ut aliqui¹ peculiarem tunicam censuerint Darto connascitur, &
nonnullis fibris utraque vaginalis committitur, interius tenuis, & aqueo humore
obducta, venisque abundans. Huic quandoque exiguæ fibræ carnosæⁿ affundun-
tur, (unde *ἐγὺς* *δυσπρός* ab *ἐγὺς* *δυσπρός*, rubesco, Oribasio dicta) quæ ad testis fundum ab-
eunt, hasque fibras aliqui alteram propriam tunicam facientes, erithroidem vocan-
tes, ab elytroide distinguunt & à musculo cremastere dilatato produci assèrunt, quæ
herniæ carnosæ ortum det: quare hernia hæc non nisi avulso teste perfecte curatur:
at notavimus ubi hernia hæc etiam corpus ingreditur (quod balneo explorari de-
bet) non sine vitæ periculo sectionem tentari. In canibus vero, fibras has carno-
sas à peritonæi productione acquirit, quæ coeuntes, in muscoli morem eorum testes
sursum trahere possunt. Hujus membranæ usus existimatur, ut dum testes vaginæ in-
star involvit, vasa spermatica testibus arcte nectantur; vel ut vasis in testes fiat rudis
seminis infusio: vel potius, ut à testibus facultas vasis affluat. Altera interior, Albu-
ginea^x dicta [tab. 22. f. t. 24. f. 2. u. fig. 3. QRS.] quæ à vasorum spermaticorum^y tu-
nica oritur, alba, crassa, & valida admodum (unde *ἐγὺς* *δυσπρός* *αἰγός* *φύσις*, Ruffo) quod glandis
immediate testis substantiam involvit, quo ejus carnem mollem [t. 24. fig. 3. T.] ac calicem repræ-
laxam fulciat, & veluti constringat, ne laxior reddita, inutilis fiat; ejusque interven-
tu tanquam medio, vasa quæ dura sunt, & quæ testium substantiæ molli committi de-
buere¹ Quod ab ea-
oriatur, mem-

brana, in qua venarum & arteriarum sunt helices, hujus posterior pars omnia. t. à nervosa musculorum obliquorum
descendentium tenuitate, Columb. & Piccolhom. t. Columbo hac propriarum secunda *δυσπρός* dicitur, ex peritonæi sub-
stantia pronata, Piccolhom. sic dicta à *δυσπρός* cubando, quod in ea resles quasi cubare videntur. u quibusdam à ve-
narum copia sic dicitur. x immodicè quia circa testem proxime extensa, Sylvio, Vesalio & Piccolhom (sed male ut
Fal. ostendit) Columbo, qui propriam & tertiam dicit, at Galenus per Epididymida tunicam non intelligit, ut ex 14. u.
part. 14. colligere est. Dartos veterum Vesal. & Plat. Verum improprie sic dicitur, quia extorriari non potest, & est con-
tra Galeni sententiam.
y nonnulli à peritonæi: at Piccolhom. à meningibus nervos in testes propagatos involventibus. Columb. Fallop. &
Laur. unde oriatur, non offendunt. z Dura & solida Laur.

buere, adnasci statuunt: & hæc à teste, nisi mollis ac putris fuerit, separari non potest: & inter has duas proprias tunicas, aliquando humor aquosus colligitur qui hydrocelen causat.

a Gal. diff. ut. 9. paulo admodum oblongiores, Vesal. figura orbiculari, at non acquisita, sed oblonga ovorum instar, Columb. magnitudo communis instar exigui gallinacci ovi leviter utrinque compressi, Piccolhom.

orbiculares, rotundi, sed paulo oblongi Laur. b Arist. & Gal. ut Pauli: inferior vero pars, Polluci nudum dicitur. c Vesalius negat discrimen aliquod esse, & aliunde quam a maiore vel minore implexu masculorum & foeminarum procreationem pendere.

d Hipp. 6. Epid. sect. 4. inest in viro, sic in muliere semen virile & muliebri, id est validius & frigidius.

*e Quare Gal. 14. us. part. 7. testiculum sinistrum in maribus & matricem sinistram in foeminis sanguinem impurum adhuc atque excrementosum humidum ac serosum recipere, dixit: & partes dextras masculorum, sinistras foeminarum esse generatrices. * Arist. natura semper intendit generationi maris per se, tanquam id quod perfectum: foemina vero sit quando natura impedita non potuit marem gignere, unde mulier sit quasi monstrum natura.*

f Arist. 1. hist. 13. nec ejusdem natura cum carne, nec multum à carne diffidet. g Gal. diff. vul. 9. h Alba & mucosa veluti ex pituita concreta constructi, ut ratione similitudinis requisita inter generans & id quod generatur, semen tale, quale est, produci possit, Varolus. k Gal. 14. us. part. 10. l Galen. dissect. muscul. 27. m 14. us. part. 14.

Figura sunt rotundi sive ovali, ^a parvorum ovorum instar utrinque leviter depressi, quæ tamen figura nonnunquam variat, ut sint propter adnata vasa obliqui, & propter parastatas protuberantes, maxime in iis, quibus Parastata ita laxo nexu cum testibus junguntur, ut in lascivis, ac si gemini Testes essent; horum pars superior protuberans caput, ^b inferior, quæ obtusior & amplior, fundum nominatur; dexterque, qui propter vasa à Cava & Aorta puriorem sanguinem & spiritum adferentia eo delata calidior est, varicosior ^c creditur, ejusque lateris semen magis perceptum censetur, quare ^d Hippocrati dictus. Sinister vero, qui venam majorem habet ^e vulgare, eidem, semine refertior est, eo tamen imbecilliore & serosiore, ^e cum ab emulgente materia deferatur; unde natura foeminarum generationi * potius intenta videtur: hinc vulgatum illud mares à dextris & in dextris, foeminas à sinistris & in sinistris generari: hi membranarum interventu conjuncti, ex ossibus pubis & pene propendunt.

Substantia ^f testium glandulosa ^g est, alba, ^h lactea, quibus enim semen & testes flavescent, vitio aliquo laborant, mollis, laxaque ^k in viris, & ob venulas frequentes, & exiguas [t. 24. fig. 3. uu.] dispersas, spongiosa, nullam tamen cavitatem obtinente. Musculum utrinque ^l unum obtinere eumque oblongum [t. 22. v. t. 24. fig. 2. x.] gracilem, ex fibris rubicundis carnosis & rectis conflatum ab osse ^m illum pronatum, vel à ligamento valido, quod à spina ilii ad ossa pubis percurrit, ea regione, ubi infimi ventris muscoli transversim finiunt, quorum tanquam partes isti muscoli esse videntur, & pertendinum obliquorum foramen egrediuntur, & extrinsecus juxta inguina vasibus testes accedentibus, eorumque capiti adnascuntur: nonnunquam ab anteriore ossis pubis parte fibræ aliquæ carneæ his communicantur, ut geminus (sicuti in simiis) ortus observetur. Horum beneficio Testes, cum natura penduli sint, suspenduntur (unde ⁿ suspensores, sive suspensores dicti) ne vasis seminariis oneri sint: verum etiam in coitu eos retrahunt, quo canali seminario brevior reddito, citius & facilius semine suggeratur: & ut Galenus ^m monet, motus voluntarii sint participes, in iis qui pro arbitrio testes retrahere possunt & rursus dimittere, quod musculis robustioribus existentibus contingere potest. Similis caro, sed brevior & angustior in mulieribus invenitur, quæ peritonæi productioni imposita est.

Vasa

Vasa ut nutranturⁿ & vivant, à venis & arteriis spermaticis [t. 20. v.] materiamⁿ acceperunt. Nervum mediocrem^o à sexu patris propagine costali [t. 9. f. 1. iii.] interdum etiam duo nervi à vigesimo primo pari medullæ, p in lumbis prodeunt (ut cum extra corpus propendeant, acutissimo sensu tactus præditi sint) qui vas spermaticis p postea conjuncti, deorsum feruntur, & in testium tunicas implantantur.

Ulus horum q (cum sine his, neque semen gigni, neque generatio perfectorum animalium perfici possit calore) & facultate sua insita semini non tam formam & colorem, cum in substantiam testiumⁱ non excidat, quam nomen & vim prolificam tribuere, & ita validam ac robustam, ut animal perfectum ex eo generari possit, quæ in masculis roboris & virilitatis, in foeminis muliebritatis causa existit; ob quam facultatem, testes prima generationis instrumenta, & partes principes statuuntur. Verum & corpus, robore, multaque caliditate adaugent, ut ex castratis patet, quibus temperamentum, substantia, habitus & mores mutantur, idque ob partium superiorum cum testibus consensum maximum, ab Hippocrate^u quoque expressum. Testis intumescens ex tussi commonefacit nos consensus, qui est pectoris, mammarum, genitura & vocis; * & quanta sit partium spiritalium cum genitalibus communio, sic ostendit: Tussi sicca vexantur, quibus testes intumescunt, & tussis in testium tumore solvitur vena secta, & inflammatione tentati tussunt, quin etiam ex inguinum tumoribus febricitantibus, tussis succedunt. Denique præstantia cordi sunt similes, siquidem epithemata cordialia testibus applicata in summo virium languore, non minus quam cordi admotâ, profunt.

q Arist. 1. gen. an. 4. voluit, non propter necessitatem, sed propter commodiorem usum animantibus esse concessos: & testes tanquam textorum pondera, ut vasa seminalia deferentia extendant, quo commodior fiat seminis ejaculatio. r Semen gignunt 14. us. part. 10. & 13. sed non soli testes: contra hanc enim opinionem Galenus disputat 1. sem. 14. nequam inquit, in vasis semen reperiretur, si nihil ad seminis generationem facerent.

i Testium substantia ingenita facultate materiam per ipsarum substantiam diffusam, in semen convertunt, quem admodum hepatis caro sanguificationis opifex censetur, Vesalius. Idem addit: vasa materiam testi preparatam, semini que efficiendo opportunam communicare, sed non id in unam amplam testibus incisam cavitatem, sed in tenuissimam eademque tunica subtili admodum formata vascula, per testis substantiam frequentissima serie distributa: ut testis substantia (quemadmodum jecoris caro) facultate sibi insita perfectam seminis naturam impertiat. At Laurentio in testium substantia semen excoquitur & perficitur, ut in mammis lac, in cerebri substantia spiritus animalis, in hepatis parenchymate, sanguis. Columbus, Fallopius & Fernellius affirmant materiam seminalem, testis substantiam non ingredi, sed vas deferens tantum epididymidi continuari: at Rioli contrarium auctoritatem docere asserit: testes enim laxos & cavernosos humorem seminalem excipere: dein vasis deferentis & ejaculantis substantiam esse diversam, nec esse continuam: quare semen in vasis deferentis extremitate preparari, in testis substantia elaborari, in vasis ejaculantibus perfici. t Gal. 1. sem. 15. u 2. Epid. sect. 1. x 4. Epid. aph. penult.

De vasis semen deferentibus, vel ejaculatoriis vulgo dictis.

CAPUT XXVIII.

De his Aristot. 3. hist. animal. 1. Gal. 1. sem. 15. & 16. 14. us. part. 12. & 13.

Vasa Spermatica deferentia [t. 24. fig. 3. H. I. separata à testibus] nōgo: σπερματικὰ He^a Canalis seminarius, Fallop.
rophilo^b partim extra abdomen in scroto, partim intus, in coxarum antro sita, Laur. Vas se-
duoⁿ men deferens a-
liquando & jactatorem vibratoremque dicimus quia à teste semen assumit, & ad penē defert, Vesal. proprius deferentia
quam

quam jaculantia, Piccolhom. quibusdam vasa ejaculantia. b Gal. 14. us. part. 12. Parastata pori sunt à testiculis ad penem semen deducentes, Poluci.

duo sunt; utrinque unum ad caput testis, à Parastatis, quibus continua sunt, producta: continuantur enim vasa preparantia [t. 23. f. 1. f. t.] parastata [t. 23. f. 1. t. ad y.] & vasa deferentia [t. 23. f. 1. v. ad. 3.] quibus pro vario officio & situ, nomina imponuntur.

Substantia sunt nervosa, ad humiliorem testis sedem [t. 22. n. deferentis vasis descensu, ad x. reflexus: & tabul. 23. fig. 2. y. exortus hujus vasis: descensus a. ejus revolutio. 3. t. 24. dici possunt, Pic fig. 3. ab E. ad F. deorsum.] contorta & ubi à testibus recesserunt, teretia & candida, cavitate d perobscura, [t. 24. f. 3. H. deferentis vasis superficiem porosam, qua testis involucri vasi semen deconascitur, ostendit] cum semen ratione spirituum, quibus turget, facile permeet; hæc sursum e feruntur [t. 24. fig. 3. G.] & ipsi preparantibus [t. 22. ad d. e.] connectuntur; mox per f productiones peritonæi [tab. 22. ad O. t. 24. fig. 2. o. e.] via, qua testium communio est, quod exsectione patet. Varolo, Vasa deferentia à testibus oriuntur 24. fig. 2. n. n.] deducuntur, & sub posteriore sede vesicæ, super rectum intestinum, Columbo, à preparantibus vas deferens oritur. d quemadmodum & foramina, qua à recto per intimam ipsius tunicam ejus corporis revolutionem per timent, Vesal. e sursum ad ilia, Gal. 14. us. part. 12. f. Gal. 14. us. part. 13. 6. ad. an. 13. & 1. sem. 25. diff. vul. 9. 1. sem. 16. Arist. 3. hist. an. 1. h. eorum minus semen è testibus & epididymide in vesiculas tanquam penu & promptuarium transportare: coquendi enim & aliterandi nulla vis eis tribuitur, Laur.

Ulus horum vasorum h semen in Parastatis elaboratum à testibus prolificum redditum ad Prostatas, tanquam in promptuaria quædam deferre; ubi dextrum vas cum sinistro coit, ut utriusque testis semen simul eo feratur, & in uterum per instrumentum ejaculatorium seu Penem ejaculari possit: ipsorum vero ductus obliqui, perfectioni inserviunt: quemadmodum enim dum aquam vitæ paramus, videmus liquorem prius ascendere, mox descendere: ita semen, quod corpus spumofum futurum erat, per hujusmodi sublimationem & descensum, fieri debebat. At post prostatas, vasis deferentis utriusque orificio intra penis canalem caruncula adposita est, quæ utrinque veluti valvula ocludit, ne invitis, sed secundum naturam se habentibus semen offundatur, neve urina in canalem protrusa, regurgitans in vasa seminata fluat. Utrinque infra carunculam tria foraminula, per quæ semen è prostatico canalem exprimitur, occurrunt: quæ vesica aperta ejusque cervice dissecata, conspiciuntur.

Ulus horum vasorum h semen in Parastatis elaboratum à testibus prolificum redditum ad Prostatas, tanquam in promptuaria quædam deferre; ubi dextrum vas cum sinistro coit, ut utriusque testis semen simul eo feratur, & in uterum per instrumentum ejaculatorium seu Penem ejaculari possit: ipsorum vero ductus obliqui, perfectioni inserviunt: quemadmodum enim dum aquam vitæ paramus, videmus liquorem prius ascendere, mox descendere: ita semen, quod corpus spumofum futurum erat, per hujusmodi sublimationem & descensum, fieri debebat. At post prostatas, vasis deferentis utriusque orificio intra penis canalem caruncula adposita est, quæ utrinque veluti valvula ocludit, ne invitis, sed secundum naturam se habentibus semen offundatur, neve urina in canalem protrusa, regurgitans in vasa seminata fluat. Utrinque infra carunculam tria foraminula, per quæ semen è prostatico canalem exprimitur, occurrunt: quæ vesica aperta ejusque cervice dissecata, conspiciuntur.

De vesiculis seminariis dictis.

CAPUT XXIX.

a Ex vana & arteria coarctata juxta defin. medic. nucle-

Vesiculæ Seminariæ [tab. 23. fig. 1. 22. aperta ostenduntur] inter vesicæ urinariæ & recti intestini ligamenta, ad latera a vasorum deferentium, paulo antequam crassiora

rem compositi. At Gal. 14. us. part. vas ejaculatorium cum praeputendum accessit, veluti quosdam sinus flexuosos habet, quos natura ita formavit, ut essent affluentis seminis receptacula. Vasa deferentia in hos anfractus dilatari vult Arantius.

crassiora reddantur & uniantur, positæ nerveæ, satis insignes & magnæ, quæ non instar aliarum vesicarum unam cavitatem habent, sed anfractuosa & varicarum instar implicata sunt (quare *νεφελίδες* b *νεφελίδες*, varicosos adlites Herophilus vocavit) ita ut plures esse videantur: Etenim vasorum deferentium extremitates has vesiculas constituunt, quibus constitutis, cum opposito vase deferente coalescit & in glandulas Prostatas desinit. In his vesiculis semen multis mensibus coacervari statuunt. Cum enim natura conservationis humanæ speciei appetens sit, omne tempus ad procreandos liberos opportunum esse voluit, ad quod opus fuit, ut materia apta perpetuo subministraretur: at quia homo perpetuo illi incumbere non potest, & excrementum sit excernendum, idcirco etiam aliorum excrementorum instar colligi, & coacervari alicubi debuit, & ad tempus opportunum asservari, ut inde ejacularetur; quare vesiculas has creatas ajunt, in quibus semen continuo exoneretur: at ne copiosum semen in una cavitate contentum, corrumpatur, plures in his vesicis meatus & anfractus existere: qui etiam impediunt, ne uno coitu totum semen effundatur; quare semen ex his varicibus se sensim explicans, tutius & moderatius exire.

Verum hæc enus vesiculas has humore oleaginoso flavescere (quem illi Prostatis includunt) plenas observavimus, qui per foramen caruncula obturatum in penem effunditur, quo meatus semini & urinæ communis illinitur, ne seminis vel urinæ acrimonia lædatur: vel ne exsiccatus consideat & prohibeat, quo minus facile per canalem lubricum, lotium ac semen ferantur: hoc enim in coitu repente ac simul labitur, una cum semine & sui sensum facit: reliquo tempore, paulatim & sine sensu: addit Gelenus^d hunc ad venerem humorem excitare, inque coitu delectare. Hujus humoris defectu stranguriam aliquando exoriri, Galenus authorest: quare licet testiculi ablati sint, tamen cum ad hæc vesiculas plurimæ venulæ & arteriolæ deferantur, humorem hunc generari necesse est, quo canalem urinarium illinat: & quia Galenus voluit humorem hunc quoque venerem excitare, haud dubie etiam eorum quibus testes exsecti sunt partes genitales titillabit, & ad coitum stimulat & excernetur: qui forte etiam à glandulis prostaticis albidus redditus, castratis persuadebit se semen, quod tamen seminis nomen non meretur, effudisse.

N 2

De Prostatis
que columnis

apponi solet, hujusmodi enim pilas Græci parastatas nominarunt, sic enim Philander in Vitruvium. At Laurentius tradit recentioribus primum Rondeletium, & post eum Fallopium descripsisse, & has vesiculas semen asservantes, Laur. vocat. c Fallopius vult in his semen multis mensibus coacervari: Vesalius & Columbus harum vesicularum non meminere, nisi glandosum corpus intellexerint, in quo gyri & obvolutions sint. Plater. vesicas semen suscipientes vocat. Laur. ex his vesiculis veluti per tubulos & helices sensim ad vesicæ cervicem, sicut lac ex mammis exprimi scribit. Varolus ait, sub testibus minoribus duas vesiculas, sicut cystim sub hepate locari, quæ semen perfectum resudatione colligant, & inde sicut lotium de vesica emitti. Si enim altero testes digitis comprimas, abque vesicularum compressione, nihil exire: Si vero vesicæ premantur, illico semen, veluti lac ex mamma, ad fistulam virgæ exprimi. d Gal. 14. us. part. 9. & 2. de sem. 6. humor, inquit, quidam spermatis similis verum longe tenuior, quem periti quasi uno ore omnes semen dixere, continetur, contra quos disputat, & 14. us. part. 11. ad venerem excitare, & meatum urinarium madore aspergere scribit. Verum in glandulis prostaticis collocavit Galenus, & distinguere oportet vesiculas hæc à Prostatis, illa enim oleaginosa, hæc candidam materiam continent.

b Gal. me-
nium semina-
lium extremā
partem sic ap-
pellavit: vari-
cosa & sinuosa
corpora vocat
Fallopius qui
inter nootericos
elegantior de-
scripsit, & à Ve-
salio prætermis-
sas scribit, cum
que potius va-
sa seminaria
canina nobis
descripsisse asse-
rit: & ab He-
rophilo in arte
Anatomica
exercitatis. pri-
mo observatas
opinatur. Caro-
lus Stephanus
pro parastatis
has vesiculas
sumit, quæ si-
mul junctæ cor-
pus continuum
& latum effun-
gunt, quod pi-
la cuiusdam
formam habeat
que columnis

De Prostatis.

CAPUT XXX.

De his egit Galen. 2. de semin. 6.

^a Columbo, parastata: Arantio, glandosum parastata: glandosum assistens Fallopio: siquidem Vesalius, qui glandosum corpus vocat, & Varolus voluerit nuncupare, ad hoc dicitur. Herophilo dicitur. Varolus duos testes appellat prioribus minoribus.

^b Gal. 2. de sem. 6. 11. us. par. 11. at 14. us. par. 9. & 11. ad hoc dicitur. Piccolhom. scribit, se non meminisse, Galenum de his egisse.

^c Gal. 14. us. par. 9.

^d Caudata semine maximas obtinent, & instar nubium

exterius revolutas. Vesal. c. Piccolhom. pro quatuor vel quinque fetusibus. Columbo, ut tres, quatuorve fetus fieri facile possint, praesertim in fecundioribus: unde non mirum, etsi Aristoteles tanquam admirandum proposuerit, taurum cui existerant testes, tamen genuisse. ^f Sunt qui velint ad seminis generationem conferre, siquidem nullibi plus seminis reperitur. Hoc si fieret, tum castrata animalia ejus excretionem peterent, quod Galenus refutat. Varolus vult, in termino vasorum deferentium, duos alios testes minores positos esse, quod mini extremam absolutionem pretebant, cum ad eos vasa deferentia ferantur, quemadmodum preparantia ad testes. Laur. prostata & semen densant & tenuem humorem gignunt ad irritationem excitandam.

^g Gal. 2. de sem. 6. oleosum humorem continere voluit: & 14. us. par. 9. humor quidam spermatis similis, sed tenuior ad voluptatem in coitu, & 14. us. par. 11. humor, qui in corporibus glandulosis gignitur, in meatum urinarium effunditur, in masculis una cum semine in matricem delatus: in feminis & foras & in muliebri pudendum effusus. Alii semen tantum continent, at Fallopio oleoso humore semper plena: utrumque continere, Laur. voluit: statuens semen prolificum excipere & asseruare: semen incrassare, oleosa humiditate ureterum irrigare: tenuem humorem gignere ad irritationem excitandam.

PROstatae, ^a quod ante flant, ^b Herophilo dictae; binae sunt [tabul. 23. fig. 2. n. n.] glandulae, utrinque: ^c una ad humilimam [t. 22. e.] vesicam partem, ejusque cervicem supra Sphincterem [t. 22. e. tab. 23. fig. 2. o.] vesicam musculum, vel potius inter collum vesicae & musculos inferiores penis ad ejus radicem, ubi vasa deferentia [t. 23. fig. 2. d.] uniuntur, quorum coalitus duabus hisce glandulis obvallatur, quae in cavo abdominis locatae; anterieus & posterius depressae, à lateribus rotundae, in quas, tanquam alteros testes vasa deferentia desinunt. Membrana, quae vasa deferentia investiebat, involvuntur densiore, ne cum prostatae spongiosae sint, per earum foramina parentia, licet angustissima sint, semen sponte defluat, tenuissima tamen, & complurimis caecis spiraculis pervia, quae primo intuitu non sunt conspicua, sed cum primum glandulae comprimuntur, apparent, quod per ea spiracula semen veluti granulatim, & instar seminis milii (eo modo, quod Mercurius, in corio arte conclusus, exprimitur) in communem ductum exprimitur ad seminis quantitatem satis evidentem, unde in congressu voluptas excitatur, cum etiam exquisitissimo sensu praedita sit. Substantia earum dura est spongiosa, reliquis glandulis candidiore: quoniam & magnitudine ^d insignes sunt, quia tantum seminis in se continere existimantur, quantum ad quatuor vel quinque ^e fetus procreandos, satis sit. In his glandulis quemadmodum & Vesiculis seminariis dictis, gonorrhoeae sedes est.

Uusus harum, ^f semen elaboratum & prolificum à vasis deferentibus ^g recipere, & ad tempus profusionis reservare, forte & perfectionem quandam tribuere: cum in his crassius & candidius, in ceteris vero partibus, tenue & serosum existat, & inter dissicandum in nulla parte plus seminis reperitur. Haec à musculis inferioribus penis [tab. 25. fig. 1. & 2. H. I.] à sphinctere ani [tab. 25. fig. 1. M.] pronatis, parte posteriore compressa, semen in ductum communem [t. 25. fig. 2. G.] quem parte anteriore aperiunt, exprimunt: in quem insertio conspectum fere fugit, & tempore excre-

excretionis^b seminis aperitur. Verum & solida sua substantia vesicæ cervicem sustinent, ne concidat, quo foramina angusta plerumque insensibilia, ad extremum cervicis vesicæ producta, recta maneant, ne semen in exitu impedian: quamvis ipsius collapsu, urinæ excretio remoretur.

labrans, hos meatus omnes apertos & laxos habuit, maxime vasorum deferentium in cervicem vesicæ.

De vesicâ urinaria.

CAPUT XXXI.

Hujus historiam vide apud Aristotelem 1. hist. animal. 18. 3. ejusd. 15. 3. part. anim. 8. 4. ejusd. 1. Galenus de ipsius tunicis egit 5. us. part. 11. & 16. de ejus musculo 4. us. part. 19. 5. ejusd. 16. lib. de diff. muscul. 28. 6. administ. anat. 14. de vasis vero, 5. us. part. 8.

Vesica urinaria, quæ *κύστις*, *δὲ τὸ κύστιν* id est, *κρύπτειν*, ab abscondenda^a urina, & *κύστις* *δὲ τὸ κύστιν* dicitur, in ^b hypogastrii cavitate cum recto intestino sita est, quam cavitationem os sacrum, ossa coxarum & pubis efformant: & ipsius cervix^c recto intestino adjacet & connectitur: in foeminis vero, inter collum uteri [t. 26. T. vesicam, L. an. uterum, at t. 27. f. vesicam, p. uterum notat.] & os pubis locata; tum, quia ad imas partes excrementorum^d alimenti eductoria, ob commoditatem excernendi, locata esse conveniebat; tum, quia viscera nutritioni inservientia, & tanquam nobiliora locum supernum occupant: quamvis & tutelæ gratia ossa hæc (non quod ad vesicæ custodiam antrum hoc natura confecerit) circumjecta sint. Verum inter duas quoque peritonæi tunicas quæ quasi proprium ventrem constituunt (unde forsan Dioscorides^e corpus in caput, thoracem, ventrem, & vesicam divisit) sub osse pubis, quando vacua est, sedem habet^f in homine: nam cum is erectus incedat, ne ab intestinorum incumben- tium pondere comprimatur, duplicato peritonæo includi debuit: quare cum inanis est & pyri majusculi magnitudinem non excedat, in sectione non cognoscitur, nisi peritonæi tunica interiore ablata: quando vero plena etiam in ventris cavitationem protuberat, & tactu in pectine deprehenditur. Hanc ea tantum animalia, quæ pulmonem sanguineum habent obtinuerunt, & inter ea quæ pulmone calidiore sunt, vesicam capaciorem obtinuerunt: idcirco hominis vesica, proportionem quam cæteris animalibus amplior existit, cujus capacitas spectatur, dum inflatur, aut impletur: facile enim distendi & amplificari posse, pueri dum suum mactatorum vesicas inflant, ostendunt. Quod si in viventibus urinæ copia distendatur, urinæ suppressionem causat, eo quod ira dilatata, fibras suas contrahere non potest, quare coherere immisso, urina educenda venit.

Connectitur fundus & anterior sedes peritonæo [t. 9. l. t. 11. *] laxè tamen auxiliantibus & ligamento [t. 9. l. t. 11. i. t. 25. fig. 7. & 8. VV.] ab ipsius fundo [t. 25. f. 7. & 8. vesica ventris capacitate in-] *incidi possit.* *g* Sic Galenus, solent pueri suam vesicam spiritu implere ac juxta ignem super cineres sic eas confricare, ut caleant, nec tamen laedantur: estque is usus in Jonia & in aliis gentibus non paucis per frequens. Accinunt^g vero

a *τὸ κρύπτειν*
b *ἐν τῇ κοιλίᾳ*
c *ἐν τῇ κοιλίᾳ*
d *ἐν τῇ κοιλίᾳ*
e *ἐν τῇ κοιλίᾳ*
f *ἐν τῇ κοιλίᾳ*

b In imo abdomine quod appellant Columb.

c Gal. 5. us. part. 16. supra intestinum re-

d Gal. 5. us. part. 5.

e in epist. ad Antigonum regem & Ægin. l. 1. c. 100.

f Rosseus de partu casto- stendit cysto-

tomiam ad calculum extrahendum, se- cure perfici pos-

se in hypoga-

strii parte in- feriori, cum vesica ventris capacitate in- agra & illa sa-

vero interficandum versus quosdam numeroso & carne & rithmo suntque ea omnia verba adhortatio vesicae ad incrementum. Ubi vero illis abunde extensa videtur, rursus inflant ac magis distendunt & iterum fricant, idque subinde faciunt, quoad amplificata vesica satis augmenti accepisse videatur.

7. & 8. Q.] enato, & ad umbilicum [t. 25. f. 7. & 8. r.] delato, quod Urachum vocant in foetu, quo medio vesica annectitur; & duabus Arteriis [t. 9. aa. t. r. k. l. t. 25. fig. 7. & 8. X.] umbilicalibus reficatis, ne cum homo rectus incedit, fundum cervici incumbens excretionem impediat & Ischuriam causet. Cervix vero in viris intestino recto, in foeminis collo uteri & vicinis coxarum ossibus, beneficio membranae à peritonæo pronatae connectuntur. In canibus, processus tantum à peritonæo vesicae offertur, fundus vero non adnascitur; sed omni nexu solutum, intra peritonæi capacitatem velut oberrat, sola cervice intestino recto connexa: estque alba, & ad fundum levis, lubrica, (quemadmodum & [t. 23. f. 1. s.] intrinsecus) aqueo humore oblita.

h Duplicem vesicam Coiter in virgine invenit, alteram naturalem & in sua sede collocatam, alteram ex matricis colli dextro latere prognatam, naturalem vesicam quasi duplo majorem, lorio plenissimam & duabus tunicis quoque praeditam: hic nullus meatus aquam vel immittens vel emittens conspiciebatur. Rioli refert in cadavere Casauboni veluti duplicem vesicam deprehensam, vesica sacculus quidam appensus erat, in quo lapis stabulabatur. i Rotunda, & circularis. Col. sphaerica. Fallop. globosa, Archang. rotunda & oblonga, ut cucurbita, Plat. k quod in Illustriss. Principis Onolsbacensis cadavere nuper observatum. l Gal. in com. 6. aph. 18. vesica quia nervosa, tenuis & ex sanguis agglutinari non potest, at collum quia carnosum est, sanari quotidie videmus cum calculus extrahitur. Et Hipp. l. c. Vesica discissa lethale est: ubi Gal. vult intelligendum de tunica divisa usque ad spatium interius. Et Fernellius vesicam non inflammari, sed tantum cervicis musculum, sive cervicem quae sphincteris circumjectu carnosum est.

Unica est naturaliter rarissime ^h gemina: figura ⁱ oblonga, aliquantulum rotunda; [t. 23. f. 2. s. t. 25. fig. 3. 7. & 8. Q.] quam aliqui sphaerae, aliqui cucurbitae rectius pyro majusculo assimilant: si enim globi modo rotunda foret, à circumjacentibus partibus nimium premeretur: concava, ^k quo humorem copiosum excipiat: cavitatem unicam habet (rarissimum enim est eam membrana quasi septo in duas ^k partes dividi) in qua praeter urinam & arenulam & calculi saepe continentur: quamvis saepe intus velut saccum habeat inferne protuberantem, in quo calculi saepe magni haerent, qui cathetere immisso detegi ac deprehendi non possunt: quod in nobili quodam observavimus, in cujus cadavere vesica putrefacta, calculi insignes intra abdominis cavitatem delapsi inventi fuere: qui multis annis stranguria laboraverat & saepissime & quidem à diversis cathetere immisso nullus calculus detegi potuit. Cavitatis haec sensim in angustum coarctata, in cervicem angustam definit: quare vesicae partes duae sunt, fundus & cervix seu collum.

Substantia ipsius partim membranosa, ^m nervosave, ad robur commodam extensionem cum subinde impleri, & urinam continere debuerit, quo non semper, sed interposito convenienti temporis spatio ad urinam reddendam urgeamur, & ejusdem corrugationem post urinæ evacuationem: partim vero carnosam existit: praeterquam cervix, propterea incisa & vulnerata ^l coalescit.

Membranam ⁿ triplicem habet, communem unam, & proprias duas; illa exterior à peritonæo, robusta, densaque, qua integitur & firmatur, ut urinæ copia distenta, minime divulsa, frangatur, hacque vicinis partibus alligatur: circa quam extrinsecus in homine, non brutis, copiosa pinguedo conspicitur. Propriae vero duae simul junctae, ^o mo-

ⁱ Rotunda, & circularis. Col. sphaerica. Fallop. globosa, Archang. rotunda & oblonga, ut cucurbita, Plat. ^k quod in Illustriss. Principis Onolsbacensis cadavere nuper observatum. ^l Gal. in com. 6. aph. 18. vesica quia nervosa, tenuis & ex sanguis agglutinari non potest, at collum quia carnosum est, sanari quotidie videmus cum calculus extrahitur. Et Hipp. l. c. Vesica discissa lethale est: ubi Gal. vult intelligendum de tunica divisa usque ad spatium interius. Et Fernellius vesicam non inflammari, sed tantum cervicis musculum, sive cervicem quae sphincteris circumjectu carnosum est.

^m Arist. 3. hist. 15. nervosa crassa satis Columbo totam nervæam fecerunt, cum tamen partim carnosam, partim nervosam sit, Fallop. in observ. at in instit. nervosa substantia dixit. ⁿ Tres tunicas habet, ut ventriculus Fallop. Piccolhom. Laur. duas Vesal. & Columbo.

etæ, modo crassiores, modo tenuiores sunt, prout distenduntur aut arctantur: quæ in fundi elatissima parte, & circa cervicem, ob ureterum insertionem duriores & crassiores existunt. Quarum interior lucida, candidissima, tenuis, nervea, exquisiti sensus, omni fibrarum p genere nervoso densissime texta, quemadmodum omnes membranæ, quæ plurimum distendi & contrahi debuerit; quarum rectæ intimæ, transversæ extimæ, obliquæ vero mediæ, pro functionum, ut volunt, ordine, attractionis, retentionis & expulsionis, quas dicimus ad urinam continendam & expellendam factas: hæc facile, si vesica aliquantulum inflatur, ab exteriori separari potest. At ne urinæ acrimonia, cum exquisitè sentiat, lædatur, ipsius fundi interior capacitas veluti rugosa & mucosa (aliqui veluti villosam dicunt) vel potius crustosa tunica munita, quæ excrementis tertie concoctionis vesicæ generatur. Proprium membranarum exterior sive inter utramque media crassior est, fibris carnosius confersa, non ut in musculo rubentibus, sed subalbidis, quales in ventriculi & intestinorum tunicis apparent: tales autem videntur, quia membranis candidis interjectæ, quæ nonnunquam ex sanguinis affluxu ita fiunt conspicuæ, ut membranam carnosam diceret.

Fibras has obtinet, tum ob custodiam non solum caloris alias imbecilli, sed etiam ne internæ membranæ fibræ in repletionem valde distentis, urina excidat: tum ut versus suam originem contractæ, musculorum parvorum instar, vesicam, quæ harum beneficio quasi motu voluntario se constringit, coangustando, exigua in eo contenta excludant.

Foramina tria habet; duo in posteriore, & humiliore sede paulo antequam in cervicem desinat, ubi ureterum [tab. 23. f. 1. & t. 4. f. 28. f. 1. M.] inter duas proprias tunicas est insertio. per quæ serum à renibus expulsum in eam sponte effunditur, non per resudationem, sed per parentia [t. 28. f. 1. M.] foramina, quibus ne regurgitare possit, præter obliquam ureterum insertionem utrinque membranulam seu valvulam, pari fere cum foliis y rationi apponi volunt, sed impropria hæc est valvulæ acceptio. Tertium urinæ præbens exitum in ejus. Cervicæ est, quæ oblonga² satis, angusta, sub ossibus pubis delata, penisque corporibus subjecta, aliquantulum idcirco^{aa} contorta, sursum ab ano ad^{bb} pudendi missa fistula exortum fertur, quo Penis canalem constituat. In mulieribus^{cc} vero brevior [t. 25. f. 8. circa N.] & latior [27. t.] quæ ita dilatari potest, ut magnum digitum facile intro admittat & recta deorsum protensa, pudendo muliebri juxta anteriorem & superiorem ejus finem implantatur, longitudinem^{dd} internodii digiti æquans, extrinsecus sphinctere obvoluta, intus nigricans & ejusdem cum Vrethra viri substantiæ, quo seipsum per quam fœminis urina, masculis vero urina & semen excernitur: quare his posteriorius^{ee} quadam manus esset fistulam arripit.

u Vesalius & Plat. inter tunicam à peritoneo propriam perreptare volunt: inter duas proprias Fallop. & ut Asclepiades voluit hoc meatus ignorans: contra quem Gal. 1. fac. nat. 13. disp. Gal. 5. us. part. 16. y Sic etiam Vesal. & Columbo. z Semidigiti spatium Columbo. aa Gal. 5. us. part. 16. bb Gal. 15. us. part. 3. cc Gal. diff. vuln. 1. lib. 15. us. part. 3. breve & angustum Fallop. dd Univeris in suis obs. notavit extremitatem albi vesicæ exteriorem, non in cunctis fœminis eodem loco apparere, pluribus supra cervicis uteri angustias exteriores sub nymphæ conspicitur: paucis introsum in superiore pudendi parte latet.

o Quæ solidior, crassa & dura sunt, ne urinæ copia acrimoniae & caliculi asperitate divellantur, Laur. p Gal. 5. us. part. 11. qui unam solam tunicam agnoscit. q Fallopius vult has fibras omnes expellere.

r Varolus. s non membranam sed musculum totam vesicam circumvolventem, A. quæ pend. facit. t Nulla pars se ipsam movere potest nisi fibras habeat carnosas (exceptis arteriis) ut secundum illarum ductum seipsam colligat & contrahat. Fallop. Hinc aliquid quando intro missa fistula argentea, ut super pressum locum educatur, manifestum motum persentimus, quo seipsam constringit & veluti si quadam manus esset fistulam arripit.

ee Gal. 14. us.
 part. 9.
 ff Vesica col-
 lum musculo-
 sum est 4. us.
 part. 19.
 gg Gal. 5. us.
 part. 5.
 a Gal. 6. ad. an.
 14. 4. us. part.
 19. et 5. ejusd.
 16. 1. loc. off. 1.
 b Simulque u-
 rinam qua per
 ipsum fertur
 propellit. diff.
 musc. 28. 5. us.
 part. 16.
 c Rursus con-
 tractis excretio-
 nem accelerari
 ait Galen. con-
 tra hoc Vesal.
 inquit, quan-
 to magis re-
 mittitur, suam
 que compri-
 mendi vim im-
 pensius laxat,
 tanto liberio-
 rem reddit mea-
 tum qui aper-
 tus & amplius
 majorem uri-
 na à superiori-
 bus sedibus
 compressa, co-
 piam transmit-
 tit, quam si mus-
 culus non pro-
 fus laxatus non
 nihil suas fi-
 bras ad expul-
 sionem fluentis
 urina, intende-
 ret, imo angu-
 stiorem redde-
 ret.
 d Gal. 4. us.
 part. 19.
 e Aegin. l. 6. c.
 60. f Aetius tot. 4. ser. 4. c. 26. e Vasa utrinque tria vesica collo infixa, 5. us. part. 8. f Gal. 5. us. part. 7. g Gal. 5.
 us. part. 8. h Gal. 5. us. part. 5. i Arist. 1. gener. an. 18. k Arist. 3. hist. 15.

rius [t. 23. ff. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R.] duæ glandulæ ee prostata crassa & albæ appositæ
 sunt, valorum semen deferentium insertionem excipientes. Est autem cervix
 fere ff carnea, plurimis fibris contexta, aliis quidem rectis, sub quibus transversæ la-
 titant, quæ ad ejus principium, & quidem supra dictas glandulas, sitæ, eam con-
 stringunt, ne nobis invitis gg quovis abdominis compressu, & valida spiritus reten-
 tione, assiduo urina guttatim effluat: idcirco ab usu sphincter a musculus; à figura
 vero literæ Græcæ Sigma, Sigmoides dicitur: quib. non nisi per voluntariam ac validā
 musculorum abdominis & diaphragmatis compressionem, urina ipsa quantitate, vel
 qualitate, seu acrimonia, vesicam jam stimulantē laxatis, cum conatu emingitur
 rursusque supernarum b partium compressione cessante, contractis c reliquiæ mea-
 tum adhuc inhaerentes expelluntur. Hunc latentem transversum musculum, inter fi-
 bras rectas tunicae exterioris, glandularum corpori connatum qui videre volet, vesi-
 cam leviter elixet. Verum etiam infra glandulas fibras aliquot transversas videbis,
 canalem orbiculariter [t. 23. f. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. N.] cingentes, quas pro Sphinctere
 haecenus demonstrarunt; quod si foret, tum nunquam semen sine lotio, quemad-
 modum etiam in gonorrhæa egredi posset: hac enim parte musculum in coitu dila-
 tari oporteret, quo dilatato simul & urina excideret, ut in iis sit quibus superior
 Sphincter deest. Quod vero Sphincteris usus sit vesicæ cervicem constringere, pro-
 batur exemplo eorum, quibus ob musculum vel paralyti d labefactatum, vel refrige-
 ratum involuntarie & sine sensu urina effluit. Verum post extractionem calculi vesi-
 cæ, sæpe stillicidium urinae remanet, quando scilicet fibræ hujus musculi dissecti
 sunt, nam sectio fit in perinaeo sive interfemineo, hoc est inter anum & testes, quæ
 non juxta medium interfemineum facienda, sed ad alteram partem versus nates, &
 quidem obliqua debet esse, quo inter fibras fiat: non transversa, alias fibris dissectis
 stillicidium remanebit. Quia etiam plerumque ii quibus calculus exsectus est ad ge-
 nerandum inhabiles sunt & infœcundi, idque propter feminis meatus occæcatos, &
 hi pro deploratis ad generandum habendi sunt.

Vasa e habet, venas & arterias utrinque ad cervicis latera (ne per longam viam
 sine munimento ducantur, & tuto inferantur) quæ bifariam dividuntur: quorum
 pars una in totam vesicam multis surculis distribuitur; altera pars quæ in viris pro-
 pter penem major est, in mulieribus minor, deorsum secundum ipsius collum fertur:
 illa ad nutritionem (non enim urina alitur, nec cum urina portionem sanguinis, ut
 Renes suscipit, sed f purum excrementum, idcirco venis indiguit) hac ad vitam
 calorisque recreationem, à venæ g cavæ & aortæ bipartito scisso ramo Hypoga-
 strico; [t. 17. uu.] quare in vesicæ inflammatione vena malleoli interna secanda: in
 mulieribus vero, à vasis quæ uteri cervicem adeunt. Nervos insignes à sexti paris ra-
 mis [t. 9. lib. 2. fig. 1. 2. 3.] costarum radicibus, exporrectis, & medulla ossis sacri ra-
 manantibus ad sensum excretionis eorum, quæ molesta sunt; unde & acutissimi
 dolores, quando exulcerata est.

Usus, serum h humidum i alimenti excrementum sensim à renibus colatam, &
 per ureteres delatam; & alia sicca k excrementa, ex quibus calculi conficiuntur
 instar

ANATOM. LIB. I.

105

instar lagenæ suscipere, & quidem non à vesica¹ attractum, sed eo à renibus depulsum, & sponte suoque pondere delapsum, unde corporis matula nonnullis, ubi tunc urinæ nomen accipit, quam meatu constrictio ad tempus excretionis opportunum retinet, quod partim facultate naturali, partim animali perficitur.

¹ quando naturaliter urina reddatur, vide Gal. 1. loc. aff. 1. Gal. 3. facult. nat. & 5. aff.

part. 7. statuit utramque vesicam vim habere propriam trahendi excrementum: at contrarium sentire videtur 6. loc. aff. 3. in diabete.

De pene, seu virili membro.

CAPUT XXXII.

Penis situm explicavit Aristoteles 1. gen. animal. 5. quemadmodum rationem & structuram Galenus lib. 15. aff. part. 1. ubi ostendit nullo commodiore loco collocari potuisse, 2. & 3. at de ipsius musculis, lib. de diff. muscul. 29.

Penis qui à pendendo nomen habet, & *κυνόδης*, virga dicitur, diversa tam apud Latinos, quam Græcos nomina obtinuit, quæ qui scire voler, quemadmodum & eorum nominum rationem, librum nostrum quem de partibus externis humani corporis scripsimus, consulat.

Situs est, ad externam imi ventris partem [t. 25. fig. 1. & 2.] qui ad anum propius collocari non debuit, illi enim incumbens egerentibus negotium exhibuisset: nec supra^a pubem vel ad hypogastrium, cum^b nullum ibi sit os, quare ex ossibus pubis omnino exoriri debuit (ex posteriori enim parte ne potuit quidem) & quidem ad eorum radices, idque ob coitionis commoditatem, intromissionis in sinum pudoris utilitatem, & ne aliarum partium actiones impediatur: hic cum sit sine conjugē, idcirco in medio positionem habuit.

^a Gal. 15. aff. part. 1. ^b Gal. 15. aff. part. 2.

Oblongus^c est, [t. 25. fig. 1. & 2.] rotundus, sed non exacte, cum elatiore sede, quam dorsum Penis vocant, paulo latior sit, & in obtusam acutiem desinat, & si testes jungas; tormentum bellicum referet. Crassitie & longitudine variat, tam ratione speciei, quam individui: ratione speciei, tanta est, quanta speciei necessitas ad prolem procreandam requirebat; brevior tamen homini, quam multis aliis animalibus, cum homines, non ut bruta parte postica, sed per mutuum complexum, coeant. Ratione individui, communiter pro membrorum proportionem formatum, nonnunquam parvi magnum habent, propter copiam ejus portionis seminis paterni, ex qua penis factus est; quamvis & coitus abstinentiam magnum efficere voluerit Galenus. ^d Longior censetur futurus, si vasa umbilicalia [t. 25. f. 7. VVX.] non proxime ad umbilicum in puello modo nato ligentur, idque obligamentum, quod ex fundo [t. 25. fig. 7. X.] vesicæ (urachum vocant) umbilicum accedit, ita ut proximius ligato, vesica sursum trahatur.

^c Longus rotundus Piccolhom.

^d Vide 6. loc. aff. 6. circa finem.

^e Nobis gratia quoque deest Columb. aliis ne sensus obrundatur & voluntas minuetur, per attritum pinguedine li-

Integitur penis pars propendens, cuticula, cute non admodum crassa, quæ in flacido laxa, in rigido tensa est, ipsius longitudini æqualis, ipsiusque ad glandis inferiorem partem connexa: & panniculo carnosio, qui hic nervosus est. Nulla pinguedo interjicitur, ne in nimiam molem excrescat^e & ipsius actioni impedimento sit, neve ipsius mollities erectionem impediat.

O

Penis quatu.

Penis pars duplex est: alia, & quidem præcipua ventri proxima & non pendula, quæ ^{corpus} ~~corpus~~ nominatur, infra ossum pubis commissuram consistens, ipsiusque medio in perinæo ligamenti & musculis validissime connexa, sursum sub testibus delata supra scrotum teres conspicitur. Altera pars est, quæ ^{caput} ~~caput~~ dicitur, & à superiore pubis ossium sede à corpore propendet, si languidus sit, vel si distentus sit, sursum erigitur: hicque tantum fere quando rigidus est, prominet, quantum uterus intra muliebri corpus delitescit, quo intra mulieris sinum immissus, ad uteri orificium usque, sobolis gratia, semen ejaculari possit.

Debuit autem virile membrum tale formari, quale ad commodiorem coitum, feminis cum voluptate ejaculationem, & venereos pruritus requirebatur. Osseum ergo non debuit esse, ut incane, lupo, vulpe, Utero enim fuisset molestus, nihil voluptatis attulisset, quin & rigidus semper prominendo, & indecens, & multis peragendis impedimento fuisset. Non cartilagineum, quia distendi non potuisset, siquidem cartilago cavitatem non habeat, nec flaccescere: non venosum, non enim tam celeriter repleti aut vacuari potuisset, & quia simplex ejus tunica, tensionem validam non ferret: non arteriosum, licet tunicam crassam & duram habeat propter pulsum continuum, cui imperare non licet: non nervus est, quia nervi peripicuam cavitatem non habent, nec sua natura dilatantur, ipsorum quin etiam mollior tensionem impediret, non ligamentum, licet ad tensionem esset utile, nullam tamen cavitatem haberent, & cum sensu careant, pruritus non excitarent: non tendo, quia cavitatem non habent, & minus duri quam ligamenta: multo minus ex carnibus, vel glandulis componi debuit, neque ex musculis, vel membrana.

Peculiaris ergo substantia aliqua, qualis in alia & corporis parte non est, requiritur. ^{g.} Corpus nervosum à pubis ossibus enatum, & unum & omni humore vacuum & asensibile. ^{part. 1. hujus exortibus non debite Galenus expendit, asserens, id ex superioribus pubis ossis sedibus prodit, Vesicæ non à superiore, ut male Galenus, Columba.} batur (quare hic quoque opificis sapientiam miratur Galenus.) quæ dura, quo citra molestiam, & cum spiritu ^h sunt referti, erigi & etiam flaccescere possit, & sensu exquisito obcoeundi voluptatem, propter obscœnam actionem, prædita foret. Ejusmodi autem sunt duo, ⁱ corpora [*t. 23. fig. 2. ii. t. 25. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. A. B.*] quibus tertium nerveum, & candidum interjectum est, quæ cum canali penem constituunt, quæ dura sunt, nervosa, & ligamenta ^k æmulantur (utrinque unum, quæ ab inferiore: ^l ossis pubis, parte [*t. 25. fig. 2. 3. CC.*] ubi id crassius & teres est, & superiore conxendicis parte, tum propter propriam substantiam, tum propter ipsius actionem, tanquam à corpore stabili, utretum ^m & stabile pudendum servetur; ortum ducunt; quæ exterius teretia [*t. 25. fig. 4. & 5. EE.*] interna sede plana, & inferne ad exitum ⁿ diffident [*t. 25. fig. 4. & 5. EE. duo corpora, G. canalis*] quo canali, ^o à vesicæ producto locum dant, mox sursum delata, circa ossis pubis medium invicem committuntur.

h Gal. 15. u. par. 2. i Si diffeceris non unum concavum reperies nervum aut ligamentum à pubis offe enatum, ut Gal. 15. u. par. docuit, sed duo corpora, quæ non vacua & humiditate indiga, ut Gal. voluit, sed fungosa & velut carnea, ut Aristoteles. 1. hif. 13. innuit & addit. Galenum nunquam hæc corpora refecuisse, nec agnovisse, Vesalius. Ligamenta, Piccolhom. nervi. Laur. coreaciam fistulam referentia, Vesal. 1. Ex superioribus ossium pubis partibus Gal. 15. u. par. 2.

in Gal. 15. us. partium 1. n. Aisi manuum indices partibus internis jungeres, Vesalio. o de hoc Gal. 15. us. part. 3.
 411 τοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ δicitur: Vesalio, seminario vesicae mentis.

mittuntur [t. 25. fig. 4. 5. F.] ita tamen ut interventu septi alicujus membranci tenuissimi & pellucidi, nervosis & robustis fibris transversis formati, si penis per transversum secetur [t. 25. f. 4.] observentur: inde deorsum reflexa ad glandem [t. 25. f. 4. 7. 9. D.] usque in acutum angulum interne abeunt, Penisque longitudinem cum canali efformant, iisque glandis substantia obnascitur: sicque Penis totius figura, aliquo modo & refert, quod notare convenit, propter usum catheteris, cujus in suppressione urinæ usus est, qui nisi dexteritate quadam intromittatur, vel canalem, vel vesicæ collum lædit, ita ut sanguis subsequatur, vel in vesicæ cavitatem non pervenit.

Substantia eorum est quidem fistulæ modo p. excavata (unde nervi cavi & 9 car- p Non cava est
vernosi appellantur) sed fungosa & materia [tab. 25. fig. 4. 5. EE.] atroque sanguine ut per trans-
(unde nigricat, quod propter putridi penis sectionem notandum) repleta: quæ versum secanti
spongiosa, ac si ex innumeris venarum & arteriarum [tab. 23. fig. 1. m. t. 25. fig. 5. b.] manantem ab-
(quæ insignes ex regione ossis sacri [t. 17. tt.] eo mittuntur) Arcubulis tenuissimis va-
rie implicatis, rete efformetur: rara & porosa, quo spiritu sanguineque tam ve-
nit. Vesal. cava
fistula modo ex-
cavata, Laur.
q Gal. 5. us.
part. 2.
homini artes tractanti, præsertim mala navium scandenti, impedimento fuisset, & r Fungosa &
injuvis obnoxius, ac si quis manum semper protensam circumferat: si semper laxus, veluti carnea,
inutilis fuisset ad id, cujus gratia creatus, quare solo coitus tempore tendi, tumidus, ut recte Arist.
rigidus & erectus esse debuit. Tumidus quidem & ad tantam magnitudinem ex- 1. hist. 13. mo-
pansus, quantum opus fuit ad cervicem muliebrem amplam apte replendam, quo- nuit, materia
utriusque pudenda incallescant: si enim semen intus conclusum extra tractu quo- & plurimo ni-
dam evocandum erat, caliditate fieri debuit, & quidem ex motu virilis membri in- guine instar far-
tra muliebrem sinum facto. Rigidus vero & rectus non solius coitus y causa, sed ciminis implen-
quo meatu diducto ac directo semen quam longissime ejaculetur. Si enim obli- tur. Vesal. fun-
quus esset (ut in 1. anat. 2. 2. quibus ob vinculum, quod ad finem penis habent gosa materia
meatus contorqueretur, idcirco non nisi vinculo abscisso generare possunt) aut ali- plena, non car-
neat, ut ex Arist.
cubi in sese concideret, tum ibi semen hæreret. At ne spiritus influens per substan- Vesalius asserit
tiam spongiformem cito dissipentur, hanc substantiam tunica quædam membra- sed nervea ac
ita dura, ut
nosæ, densæ ac robustissimæ, à superna parte symphyseos ossium pubis enata quasi nervi du-
ritiem excedat,
(quas aliqui ex vasorum & nervorum, qui ad penem feruntur, commixtione ortas Fallop. cava
volunt) ea obducunt & fulciunt, (forte & penem sustinent) quæ corpora penis sunt, carnem
nervosa idcirco dicuntur: quæ etiam crassa, quo distendi possit. Quando enim in raram admo-
appetitu venereo, per venas & arterias sanguis & spiritus plurima copia influunt, dum & fungo-
membrum illud, sicut intestinum flatu repletum, illico intumescit & induratur: sam continent,
quod à musculo sphinctere, qui cervicem vesicæ & radicem corporum penem con- idem in insti-
stituen-
tut.

O 2

f. Auctor lib.

de genit. hoc videtur velle, dum venas & nervos ab universo corpore in pudendum desinere tradit. & penelienis sub-
stantia similis, quam crassis induit ligamentis, Columb. u non à flatibus sicuti putabant colus distenditur, Plat.
unde Arist. 4. part. 10. x Gal. 15. us part. 1. Arist. l. c. y Gal. 15. us part. 3. z Gal. l. c. At Æginet. libr. 6. cap. 54.
Hypopadæus vocat, quibus glans ab origine non perforata est, sed sub pene foramen habent, de his Arist. 4. gen.
an. 4.

a Sicut vide-
mus jugulares
venas in risu
et quavis com-
pressione thora-
cis, nec non ve-
nas cubiti ob-
constrictionem
ligatura expan-
di ac indurari,
Varol.
b Gal. 15. us.
part. 3.

c De hac nil ha-
bent Vesal. Co-
lumb. Fallop.
Plat. Varol.
Laur. &c. Pic-
colom. interio-
ris meminit.
d Substantiam
canalis. Vesal.
Fallop. Plat.
Varolus non ex-
plicavit: Co-
lumb. & Laur.
nihil aliud,
quam vesica
substantia ad
penis fines elon-
gata.
e Arabes tres
meatus in pene
constituunt,
unum urinae,
secundum se-
mini, tertium
viscido humo-
ri, qui hume-
tum penem
subinde reddit
viro. impenitus
concupitum
appetente.
f Meminit Ve-
sal. juris studiosi

Forojulienfis qui duplicem habuerit. g Gal. 15. us. part. 3. h. Locus in quo Galenus de his erat acturus in lib. de ad-
anat. una cum quinque et dimidio ejus operis libris intercidit, una cum ipsius de musculis peculiari libro. At 15. us.
part. duos solum habet secundum Urethram per totum penem digestos à me hactenus non reperiros, ait Vesal. p. 394. Pic-
colom. imitatus à Gal. duos priores non proponit. At Laur. quatuor descripsit, duos secundum penis longitudinem à
superiore ossis ischii parte: alios à lateribus ossis pubis enatos, per latera penis delatos. i. In meiando quoque opem ferre
vult Columb. k Illis similes qui à pectoris osse ad os porriguntur, Vesal.

stituentium & extremitates in testinorum cingit, si contrahatur a & spiritum in illis
partibus abundantem ad penem exprimat, fieri videtur, ita ut motus voluntarius
non solum ad erectionem, sed etiam ad indurationem concurrat.

Canalem [t. 25. f. 1. 2. 4. 5. 7. G.] quem *eghedon*, & fistulam urinariam vocant, & po-
rum spermaticum aliquando Galenus b nominat, à vesica [tab. 23. f. 1. a. à vesica e. tab.
25. f. 6.] prodire volunt, quare ejus collum productius censetur, cum tamen ejus sub-
stantia à vesicæ diversa sit, & vesica cocta ab hoc canali recedat: hic sub corporibus
penis [t. 25. f. 4. 5. G. sub. EE.] positus, cum iis reflectitur (in quo reflexu si semen pu-
tridum in gonorrhœa subsistat, ibi canalem exulcerat) ac medius constitutus se-
cundum longitudinem ad glandis initium, à corporibus simul coeuntibus [t. 23. fig.
4. 5. P.] amplexus porrigitur; cum enim per ipsum semen fluere debuerit, fistula
hæc insculpi debuit.

Membrana c duplici donatur, altera interna tenui, qua & glans integitur, ex-
tenui meninge nervos penis convestiente enata, (in qua circuli leviores conspiciun-
tur,) quæ exactissimi sensus, ut voluptatem à semine excitatam, cum per eum de-
currit, percipiat: dein, ut canalem hunc circumscribat. Alteram habet externam
carnosam, ex fibris transversis ad feminis & urinæ expulsionem constatam. Hujus
canalis substantia cum duobus corporibus penem constituentibus simili, laxa fungo-
sa & prope vesicam magis quam in medio ductu nigricant, d [t. 25. f. 6.] quo simul
cum corporibus nervosis ad feminis effusionem distendi, & urinæ commodiorem
excretionem flaccescere possit: qui ductus semini & urinæ & humori oleaginoso
communis est, & anteriore sede in foramen, per quod excretiones hæc fiunt, dehif-
cit; quod in juvenibus collectum, in aliis pro ut cutis retracta est, plus minusve didu-
ctum est. Rarissimum enim est, f distinctum meatum dari, urinæ alium, & alium
semini dicatum: cum enim g vesica prope esset constituta, non erat melius ad ex-
cernendum lotium alium efficere meatum, sed meatu feminis uti: quare vesicæ col-
lum sursum ab ano ad penis exortum fertur. At cum motu voluntario hæc absol-
vantur, musculis indiguit.

Musculos ergo quatuor h habet, intra femora prope scrotum sitos, copiosa pin-
guedine reectos, duos collaterales, utrique unum, qui à coxendicis [tab. 25. fig. 1. 2. K.
L. in figura 1. adhuc hærentes principio figur. 2. dependentes ad insertionem] appendice infra
corporum penis principium nervosi enati, mox carnosius, breves, & sequentibus
crassiores, iursum oblique delati, in corpora penis, non procul ab exortu [t. 25. f. 2.
CC.] inseruntur, & penem, (qui jam motu voluntario à spiritu & sanguine ex con-
stricto ani sphinctere eo propulso, erectus est) in congressu dum simul contrahun-
tur, deorsum & anterieus muliebri sinui inferendum, flectunt & donec opus absol-
vatur i sustinent. Alii duo inferiores [tab. 25. f. 1. 2. H. I. adhuc adnati, at fig. 2. à principio
dependentes] utrinque unus, ab ani sphinctere [tab. 25. fig. 1. M.] carnosius k exorti, lon-
giusculi

glaſculi ſunt, qui internis lateribus uniti, recta ſubtus ſecundum longitudinē delati, ad medii canalis latera [t. 25. fig. 1. G.] implantantur (& invicem diviſi, penis corpora nonnihil amplexantur) quo inferiorem canalis partem, utrinque deorſum retractā, pene erecto manente, dilatent, brevemque reddant; ne in corporum nervoſorum repletionē, præſertim in obliquo penis inflexu cōſtipetur, ſicque ſeminis exitum, vi ſpirituum in canalis cavitatem impulſi, qui totus ſibi ipſi continuus, confertim quam celerrime & recta ad uteri os pervenire debet, ^m impediatur, idcirco, latiffimum ſimul & rectiffimum ſervari oportuit.

Verum & proſtatas [t. 25. fig. 3. & 7. RR.] comprimunt, ut ſemen, quod in iis turget, tempore ejaculationis per earum membranam granulatim in canalem, ubi dein ſimul miſcentur, exprimant, tum etiam in miſtione, aliqui ⁿ canalem diſtendere; alii ^o in miſtione ſine urinae reſiduum in cervicis ſine ſubſiſtens, exprimere volunt. Si vero omnes quatuor ſimul agant, penis radicem, quæ erectionis tentiginisve quandam vim obtinet, voluntario motu trahunt. Inter hos muſculos, in perinaeo [t. 25. f. 1. inter M. & H.] ſeu inter ſcæmineo (ſic enim ſpaciū penem & anum intercedens nominatur) calculi erūntur: fiſtulæ & ulcera hoc loco frequenter infeſtant, quare hic locus diligenter obſervandus venit.

Vafa duum generum ad penem feruntur, alia externæ, alia internæ: venæ & arteriæ externæ [t. 17. tt.] ſeu cutaneæ, per ejus cutim diſtributæ, à Pudenda prodeunt, quæ copioſæ & nonnunquam tanquam varicoſæ nigricant. Venæ vero internæ geminæ ab hypogaſtrica [tab. 17. uu.] prodeunt; quæ cum ad bifurcationem mediam pervenerint, ferre ſemper in unam coaleſcunt, & per penis corpora inter medias arterias ducuntur & in iis ſimul obliterantur. A qua ſub oſſe pubis propago quædam inſignis abdomen ingreſſa, per ligamentum, quod veſicam oſſibus pubis neſcit, diſſeminatur.

Arteriæ ^p geminæ internæ ab hypogaſtrica [tab. 17. uu.] inſignes ad bifurcatam penis originem ejus corporibus inferuntur, & per penis longitudinem diſſeminantur. In medio autem ubi ſeptum tenuius eſt, per fibrarum ſpatia, arteriæ ramulos hinc inde mittunt, dextra quidem in corpus ſiniſtrum & ſiniſtra in dextrum, ita tamen ut inter eas vena media, per dorſum penis una cum nervo ad glandem valde implexata (forte fungoſam ſubſtantiam conſtituentia) ferantur, quo ſpiritu & ſanguinem in ſpongioſam ſubſtantiam penis ipſo per pruritu irritato effundant.

Nervi ^q quoque utrinque duo inſignes contigui ad penis radicem, ab oſſis ſacri medulla prodeunt, quorum unus cutaneus circa medium penem in ipſius & teſtium cutim abſumitur, ut externas moleſtias ſentiant: alter interius iſq; inſignis ſub oſſibus pubis per mediam bifurcationem ad penis radicem aſcendens, & inde ad ipſius muſculos, & totum ejus corpus, una cum arteriis per dorſum ad glandem uſque varie diſperſus percurrit, quo ſenſum exactiorem peni, præſertim glandi pruritus cauſa, quo ob actum venereum eget, tribuant; in his ganglia ſiunt non doloroſa, quæ in

O 3

cauſa Columbus. At

nas arterias & nervos agnoſcit, quos ait, cæci ipſi & viderunt & videre poſſunt, cur enim venis privatus in ſoliciore ſit conditione reliquis partibus? & movetur muſculus, hi autem per nervos agunt, &c. Alias dicendum erit, arterias vehicula eſſe craſſioris ſanguinis pro nutritione: eaſdem facultatem motricem vehere.

q Nervi inſignes ac valde manifeſti, ita ut niſi luſcioſos latere poſſint, Fallop. 1 Gal. 14. uſ. part. 13. nervi plures ad virgam &c.

Gal. 15. uſ.

part. 3. Piccol-

hom. hoc tri-

buit, duobus

muſculis ab in-

feriore parte

oſſis pubis ortis,

qui per penis

truncum ſparſi

ad glandem ſe-

rantur.

m A muſculis

juvari ſeminis

excretionem,

in epilepticis

pater, in quibus

ex convulſione

compressis muſ-

culis, ſic glandu-

larum compres-

ſio & involun-

taria ſeminis

excretio.

n Veſalius vo-

luit.

o Fallop. in in-

ſtit. & Piccol-

hom.

p Arterias &

uſum earum

(qui eſt ſubſtan-

tiam flaccidam

ſpirituum af-

fluxu erigere)

nemo ante me

agnovit, per

quas alimen-

tum quoque

fertur, cum in

pene nulla ſit

vena, nullus

nervus, ut ma-

le Veſalius, hac

cauſa Columbus. At

Piccolhom. ve-

fi In observ.

causa sunt ut dum penis erigitur, veluti arietinum cornu intentum, ut Fallopius ¹ loquitur, turgat & non distendatur. At quo venæ, arteriæ & nervi hi rectius conspiciantur, corpora penis lateralia ab ossibus ² paranda sunt.

et Piccolhom.

Tandem summa penis pars carnosæ [*tab. 25. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. D.*] tumens & reliquum ejus corpus (quod truncum ³ aliqui appellant) ambitu excedens, quo reliquis partibus veluti cucurbitulæ fundum magis incalescat, æqualis & turbinata, caput ⁴ βάλανος, glans dicitur, quæ coronæ modo (unde ⁵ *sepalum*) circulo cingitur, quæ mollis admodum est, ne uterum lædat: non nihil acuta, ut uteri orificio se melius accommodet, meliusve ingrediatur; exquisiti sensus, pruritus causa, siquidem magis alteri debuerit, cum ex motu & frictione, accendente imaginatione intensissima, feminis fiat ejaculatio, tenuissima membrana proxime intecta, quam Canalem succingens produxit, corporibus penis obnata; substantia spongiosa, quæ intus non cava, sed paulo solidior est.

u Gal. 15. us.
part. 3. cutis epi-
physin appellat.

Quo vero levis, mollis & lubrica asservetur, involucrio donatur, quod à penis cute producta atque reflexa, oritur, & cum ex cute reduplicata fiat, duplici tunica constat, quod idcirco monendum, ne dum in phymosi secatur, tantum externa membrana tangatur: hoc ⁶ *πρόσθη* præputium à putando, ejus vero prominētiō pars, dicitur, q̄ in coitu nunc sursum nūc deorsum fertur, ut hoc attritum magis incalescat, cum mulierum voluptate & tentigine: & ornamentū quoddam adferre nonnulli volunt: hoc in extremo aliquando contrahitur, ut reduci nequeat, nec glans sine medica manu aperiri possit. Et quo rursus regi possit, membrana vel vinculo, quod ⁷ *χαλινόν* frenum seu fibulam appellant, & ex nervorum extremitatibus compositum quidam volunt, in inferiore parte cum summa glande ligatur, quod & feminis profusionem causat, dum per canalem motū & calorem Prostatidis semen continēbus communicat: sæpe enim libidine turgente, levissima ejus ⁸ perfrictione, semen effunditur.

x κύων ὁ κη-
νέδομος cani-
num vincu-
lum Piccol-
hom. ligamen-
tum vocat.

y Quemadmo-
dum à cibo co-
piose assumpto,
si quis digito
supremum gu-
la contingat,
ob partium con-
tinuitatem con-
trahitur, ci-
bumque con-
tritum vomitu
rejecit.

z Plato in Ti-
mao pudendum
dirile animal
quoddam esse

In hujus medio foramen, ut per hoc tum semen tum urina profundatur, cum communem canalem ambiat, quo loci amplius est, rursusque arctatur, quasi seminis mora intentiorem delectationem in glande efficere debeat: quare hoc quoque loco gonorrhœa laborantes, propter seminis putridi in hac amplitudine asservati acrimoniam, ulceribus infestantur.

Ufus; factus penis est, quo mas & fœmina, eorundemque semina concurrentia, simul misceantur procreationis ⁹ causa; eo etenim deficiente, omnis procreandi potestas adimitur; ipse vero canalis, ut semen à Prostatidis usque ad orificium uteri, qui profunde in mulieris ventre locatus est, ejaculetur, unde instrumentum jaculatorium quibusdam dicitur: per hunc quoque urina, licet propter ¹⁰ hoc nequaquam constitutus fuerit, cum sine eo mulieres mingant, tanquam per canalem aliquo usque, ne nos conspurcemus, derivatur.

MU-

sensuit quoniam ei insita vis quæ geperandi valde est appetens: non est animal, quia pars est animalis. Dein vis generandi appetens, non illi sed cerebro insita, quæ in hunc funditur. Ergo non animal, sed animalis instrumentum ad procreationem comparatum. ¹¹ *aa* Quemadmodum natura nasum dedit ad odorandum, quibus secundo uritur ad mucosa excrementa cerebri expurganda.

Muliebres partes generationi inservientes.

CAPUT XXXIII.

Omnes partes viri in mulieribus reperiri, sed positione differentes, Galenus 14. usq. part. 16. ostendit.

PARTIUM genitalium. ^a constructionem, si earum compositionem, magnitudinem, conformationem & reliqua omnia diligenti animo perpendantur in utroque sexu, admirabilem esse, recte Galenus. ^b monuit: Sunt autem duplices, viriles, de quibus jam dictum fuit, & muliebres, de quibus nunc sermo erit. Galeni ^c fuit sententia, foeminam omnes partes habere, quas & masculus habeat: forte quia, cum foemina homo nata sit, quaecunque in homine masculo extabant partes, eadem in foemina reperiri debuerunt: & in eo duntaxat discrepare, quod in mulieribus quidem haec intus sunt conditae, in viris autem extra ad perineum sitae, quod in Talparum oculis etiam accidit. Quare partes aliae materiam seminis a toto deferunt, venae nimirum & arteriae spermaticae; aliae semen elaborant, corpus varicosum & testes; aliae semen perfectum deferunt, vasa deferentia; hocque una cum virili semine recipit, conservat, elaborat, pro foetus generatione, uterus. Uterus vero scrotum virili a Galeno ^d assimilatur [vide 31. f. l.] quasi scrotum, uterum sit inversus, ab osibus pubis propendens: sicque scrotum & uterum solo situ & inversione distarent. Si enim scrotum inversum inter vesicam & rectum intestinum intro trudi singas, tunc testes, qui in scroto erant, utrinque extrinsecus assistent, & quod antea scrotum erat, nunc uterum rationem obtinebit. Uteri vero collum loco penis erit, cum collum & penis idem sint longitudine, frictione & refractione, ab iisdem in eundem ductum semen effundatur. Differunt tamen nomine situs, quod in mulieribus intus, in viro extra sint ducti, in muliere amplius, in viro angustius, parietibus ductui circumjectis, qui in mulieribus tenues, quidem, at in viris crassius sunt, sed potius dicamus, collum uteri collo scroti respondere: & peni virili, penem muliebrem quem clitoridem vocant. At Fallopius uterum figura peni virili admodum similem dixit, cum uteri corpus glandi respondere videatur: sinus autem seu collum, peni; ac si penis cum glande ad intra inversus esset: testes vero cum vasis, virilibus assimilari posse: ac si natura masculos similiter ac foeminas iisdem organis praeditos esse voluerit, ut sibi penitus similes generare possint. Quare cum in prima formatione foetus & foeminae, & masculo eadem membra generentur, sit ut pro maiore vel minore calore, masculus vel foemina generetur, ita ut quando caloris vi haec extra propelluntur, masculus fiat; quando vero praecaloris imbecillitate extare & foras emicare non possunt, sed intus remaneat, foemina nascatur. Quare foemina tanto est imperfectior, quanto frigidior, quam tamen imperfectionem magna utilitas consecuta est, cum foeminam quandam esse oportuerit: idcirco summus opifex, partem totius generis nostri dimidiam, sua sponte imperfectam creavit, tanquam ad generis instaurationem commodam; cum foemina facta sit, ut esset receptaculum seminis, ex quo novus homo generaretur: sed hac de re in tractatu nostro de transmu-

transmutatione sexus foeminei in virilem, plenius dicturi sumus. At magnam esse diversitatem inter viriles & muliebres partes generationi inservientes, ex sequenti historia facile erit colligere.

De Vasis spermaticis preparantibus.

CAPUT XXXIV.

De his Galenus egit 14. us. part. 10. & 12. & libello de dissectione uteri, cap. 5.

^a Vena & arteria seminales, materia seminis attrices, vitestium ab universo corpore, Piccolhom.

^b Gal. diff. uteris. a cava vena & arteria magna duae vena & arteria: addit alia quatuor vasa in quibusdam mulieribus Herophilum vidisse, quae ab illis qua in renes tendunt, exortu vulvam ineant, quod ait se in nullis aliis animalibus, nisi in simiis invenire potuisse.

^c Arist. & Erasist. ut testatur Gal. lib. proprio, solo spiritu plenas esse volvere, quibus Bonacciolus & Mercatus lib.

2. cap. 1. assentire videntur.

^d Vesal. hoc voluit p. 659. Fallop. vasa spermatica testantur Anatomici misceri antequam ad testes veniant, uti in viris, cum se juncta ferantur ultra testem ^e Gal. 14. us. part. 9. ^f Testes mulierum Epididymidas non habent, aut si habent, ita parvae sunt, ut vix appareant. 14. us. part. 14. Gal. 2. sem. ult. & 14. us. part. 11. parastata sola magnitudine a virilibus differunt, uteri cervici accumbunt, humorem qui Venerem excitat & in coitum attrahat continent, qui in mulieribus cum in coitu vehementius oblectantur, effluit. ^g Piccolhom.

Vasa spermatica ^a materiam seminis a toto deferentia, & preparantia dicta quatuor ^b sunt, duae venae & duae arteriae. Venarum dextra [t. 23. dd.] a trunco cavæ infra emulgentem, juxta os sacrum pullulat: sinistra [t. 25. ee.] ab emulgente sinistra prodit, quia hoc latere arteria magna prope venam cavam sita est, quæ arteria cum perpetuo moveatur, si vena spermatica a trunco cavæ prodiisset, super arteriam deferri oportuisset: sicque periculum fuisset, ne tenuis vena a perenni arteriæ magnæ motu rumperetur. Arteriæ vero ambæ [t. 27. g. h.] ab arteriæ magnæ trunco, sub emulgente prope os sacrum exoriuntur, spirituoso sanguine ^c plenæ. Hæc licet eundem cum virilibus exortum habeant, & ut in viris, vicinis partibus infinitos ramulos largiantur, non tamen, ut in viris peritonæi cavitate excidunt, nec ad pubis ossa pertingunt, (non enim foeminam foras maris instat, sed in suum uterum semen emittere conveniebat) nec etiam antequam ad testes ^d veniant, miscentur, quare infertione & divisione variant. In muliere namque intra duplices membranas ligamenti lateralis uteri [t. 28. f. 1. EE.] suffulta feruntur ad testes [t. 27. iit. 28. f. 1. F.] quos antequam attingant, facta quadam venæ cum arteria anastomosi, in duas partes dividuntur, quorum pars una, seminarium [t. 28. f. 1. I. K.] vas, corpusque varicosum constituit, ramulis tribus aut quatuor testibus & eorum tunicæ pro nutritione communicatis. Altera vero pars infra testiculum in tres furculos scinditur, quorum unus uteri fundum petit, eique alimentum defert: alter, sub membrana communi uteri lateris perreptans, os uteri internum accedit, & sæpe cum venis hypogastricis jungitur: per quæ vasa, menses in mulieribus non gravidis expurgantur: tertius in uteri tubam & ligamentum distribuitur. At in viris tota in corpus varicosum absumuntur, Differunt quoque a virilibus brevitate viæ; cum enim semen muliebri tanta elaboratione non indigeat, quanta virile, propterea ea vasorum longitudine opus non fuit, quæ intra ventrem minime contineri possit. His admirabili anastomosi ad seminis delineationem implicatis, parastatæ ^f adeo exiguæ constituntur, ut illas dari, non immerito aliqui negarint, cum & testes parvi sint, & vasa spermatica parva, a quibus exigua vasa in testes dirigi ^g volunt.

De Te-

Galenus de testib. egit 14. us. part. 10. ac differentiam inter viriles & muliebres, cap. 12. & 14. ejusdem libri ostendit, libro de diff. uteri 9. Cur autem alia animalia testes extra habeant, alia intus, vide Arist. 1. gener. animal. 12.

Testes, qui infimo ventri [t. 24. M. N. f. 25. II. t. 26. fig. 2. II. & fig. 2. ff.] ob innatam mulierum frigiditatem inclusi sunt, quo calidiores, magisque fecundi, intus utrinque singuli, ^a uteri lateribus, sed duorum digitorum latitudine ab eo remoti [t. 26. uteri fundum L. testes M. N. f. 27. uteris p. testes II. t. 28. f. 2. & 3. c. uterus, testes II. & ff.] ^{a Gal. 4. us. part. 12. & diff. sect. ut 9.} supra fundum in non gravidis accumbunt: in utero vero genentibus, eam fere se-
dem occupant, qua ilium ossa sacro committuntur, & laxis membranosis uteri liga-
mentis [t. 26. OO. QQ. f. 28. fig. 1. EE. 30. M. N.] ^{b Omenti & mesenterii glandulas referunt, Ves. & Plat.} a peritonæo productis, quæ mediam quoque testium partem integunt, continentur.
Differunt à marium testibus situ, cum intra abdominis cavitatem lumborum ^{c Multis in- musculis incumbant; figura, quia non ita crassi & rotundi, sed antè & postè qualib. tuber- culis opplera, Ves. p. 658.} musculis incumbant; figura, quia non ita crassi & rotundi, sed antè & postè
lati ^a & depressi [t. 28. f. 22. II.] ^{d Vasorum se- minalia or- tus & ductus} superficie externa inæquali, ac si plures exiguæ [t. 28. f. 23. II.] ^e glandulæ ^f inæquales, cum aliæ majores, aliæ minores sint, jungerentur, si-
ve ex quinque vel sex vesiculis simul conglobatis contexerentur: oblongi [t. 28. f. 1. f. 3. f. f.] ^g sinuosi & cavi, & præter exiguos in ipsis vasis plexus, humore ^h aqueo
instar crassiusculi lactis feri simili, in sanis pleni, in ægris vero, veluti vesiculæ humo-
re aquoso, alias limpidi, alias croceo, luteo tingente & graveolenti, referti, unde u-
teri ⁱ stangulatus causatur. Humoris hujus in sanis usus videtur similis, humori o-
leaginoso in vesiculis virorum contento, quem in mulieribus etiam necessarium
Galenus judicavit: an hic forte qui in mulieribus, ex clitoride confricata, titillatio-
nem & causat & effunditur? Differunt quoque magnitudine, quia multo minores:
substantia, quia humidiores & ^f molliores: nec ita compacti, cum semen imperfe-
ctius genituri essent: temperamento, & quia frigidiores, unde earum semen est
humidius, tenuius & aquosius. Forte ut ex hoc tenuiori, tanquam ex aqua, & ex
masculo crassiori, tanquam ex farina, fiat veluti pasta in utero ad hominis generatio-
nem fermentanda. Si enim utrumque semen, crassum, densum compactum ac gluti-
nosum fuisset, non potuissent per minima permisceri. Involucris differunt, cum uni-
cam ^h tunicam propriam [t. 28. f. 1. K.] habeant, quæ immediate eorum substan-
tiam cingit (siquidem in abdito, tutoque loco contenti pluribus opus non habuere) ⁱ alias luteo, a-
liis limpidi tur-
gentes: semen

vero tantum in vasis spermaticis, vel delatoriis vocatis. Resp. Piccolhom. tantum male affectas secuisse Fallopium, quod probetur, quia dicat, se vidisse in ipsis, veluti vesicas aqua plenas. ^c Duo exempla humoris foetidi in testibus, quarum altera strangulatu interit, habet Vesal. 658. ^f Substantia non ut virorum testes molli, verum duriores. Vesal. at Columbo non ita crassi & molles, quemadmodum in viris. ^g Gal. 14. us. part. 10. ^h Gal. diff. uteri 9. davros habent, cum careant clitoride & scroto. Columbo vero una duntaxat membrana epididymis à nobis dicta circumdatur, & à peritonæo. Platero tunica interiore propria & exteriori à mem-
brana uteri deducta, investuntur.

* Oribasius 24.
col. 31. ex Sora-
no inquit, non-
nulli inter quos
est Chius, vo-
lunt æquales te-
stium appendi-
ces, quæ Cre-
masteres dicen-
tur, testiculis
committi, id
quod nos pro-
priis oculis in
muliere intui-
ti, cui intestina
in serotum de-
lapsa erant bi-
storia manda-
vimus.

quæ Dartos dicitur Galeno, crassitie & duritie tunicæ virili cedens, quæ ipsis val-
dissime adnascitur, ac si cum eorum substantia continuum corpus essent: verum &
aliam communem à peritonæo habent, quæ testium mediam tantum partem invol-
vunt, ubi vasa spermatica suscipiunt. Tandem & musculis, * in viro enim benefi-
cio Cremasterum suspenduntur, mulieribus vero à ligamento lato ipsius uteri &
firmantur & continentur.

Verum hic monere convenit sæpe in hystericis, licet virgines adhuc sint, adeo hu-
more seroso turgere, ita ut testes pugno grandiores reperti fuerint: ita ut mirum non
sit, si aliquando tumor instar magni globi in ipsorum ventre tactu deprehendatur.
Quare & Hydrops testiculorum datur, qualem in præstantissima matrona observa-
vimus quæ fere toto biennio tumores magnos in latere dextro habuit & inter cæ-
tera symptomata (quæ plurima erant in obs. ad Rouff. ti hysterotomoticiam addi-
tis, fuscæ enumerata) aliquot ante mortem septimanis fuerunt, ventris dextri lateris
intumescencia, tibiæ præsertim dextræ, & labri dextri ipsius pudendi tumor cum
puris & sanguinis copioso per alvum fluore: post mortem aperta, ex dextro testi-
culo vix apparente, prodibat tumor ingens tunica crassa obductus & quibusdā
locis parti dextræ peritonæi adnexus, ex quo aperto ad novem feri libræ efflueret:
huic alter tumor insignis parte interna adhærebat simili humore plenus & circum-
circa hydatidum copia: at sinister testiculus magnitudine fere malum cotoneum æ-
quabat, multis magnis hydatidibus scatens, qui in capacitatem ossis sacri prolabe-
bantur, haud dubie vesicam comprimendo, eum excitabant insignem dolorem
quem circa pubem patiebatur. Vena spermatica utraque valde anfractuosa erat sed va-
sa ejaculatoria admodum extenuata: in uteri collo fistulæ duæ ad anum vergentes:
in ejus fundo omnia naturaliter se habebant. Hepar maximum albicans, nec scir-
rhosum, nec putrefactum: Lien parvus sanus, sed circa ejus vasa duæ veluti cochleæ
callosæ: vesica biliaria parva, gypsea, dura & alba materia plena.

Sed & hoc notandum, aliquando pilos numerosos non solum muliebri testiculo
succrescere, sed etiam pilis repleti: posterius historia comprobabimus: Anno 1618
paupercula quædam in Xenodochio nostro per aliquot menses, ut Hydropica decu-
buit, cujus misertus aliquoties invisi: hæc referebat se cum ante annum puellam æ-
nixa esset, statim ventris tumorem persensisse, sicque indies infirmum ventrem au-
ctum esse, ita ut cum in Nosodochium nostrum adduceretur, venter tantæ molis e-
rat, ut tympanum classicum inversum referret: tumore duro, renitente & hæmisphæ-
rico: umbilicus, ab aquæ copia ad pilæ fusoriæ magnitudinem prominebat, ex quo
altero ante obitum die disrupto, circiter sedecim mensuræ (qualibet trium libra-
rum) effluxere chirurgo permittente, & vesperi rursus referato foramine, aliquot
mensuræ effluxere: & nocte subsequenti placide obiit. Cadavere à Clar. Doctore
Thoma Platero Collega & compatre meo, in mea & plurium Doctorum ac studio-
rum medicinæ præsentia aperto, prius tamen per umbilicum mensuris circiter se-
decim feri emissis, Hepar durius compactius & minus, ipsius tunica fissa, Liene recte
se habente, repertum. Sed quod præcipue notatu dignum Testiculus dexter ovi an-
serini magnitudine propendebat & huc illuc lagenulæ instar moveri poterat, cujus
tunica forinsecus lævis, lubrica albaque: at novacula incisus, pilis oblongis
albis tunicæ infixis plenus repertus, quibus mucosa & purulenta materia, non ta-
men.

men fœrens (haud dubie semen corruptum,) interjecta erat: sinister vero testiculus à naturali statu non recedebat. At in pube pili nulli conspecti fuere.

Quid quæso de horum pilorum generatione statuendum? Galenus in lib. de usu partium, pilos herbis è terra nascentibus assimilavit, & dixit illos nec in arenoso nec apprimè humido solo succrescere. Jam vero herbae non fiunt ex terræ excremento, tanquam materia: nec formam à terræ meatibus, aut ejus temperamento suscipiunt: sed unaquæque herba propriam habet facultatem formatricem, in propria materia seminali positam, quæ tamen convenienti terræ temperamento indiget, ut semen ex potentia in actum deducatur. quo deductum facilius per illam erumpere possit, ut erumpens denique ab eadem bene temperata fomentum atque incrementum suscipiat. Sic pilorum materia, cum vapor sit pinguis in tertia coctione relictus, tanquam excrementum utile, ex quo etiam semen generatur, & quidem ex eo vapore, qui determinatæ partis alterationem subiit, cui alia tertiæ coctionis excrementa permiscuntur, præsertim pituita, subinde fumus ac fuligines, à quibus fuliginibus & fumis ipsi pingui ac pituitosæ substantiæ vario modo cõmixtæ pilorum colores producuntur: patratione pili facultatem formatricem propriam habent, in materia lenta ac tenaci seminali forte repositam, quæ poris cutis facillime adheret, quæ si cutim mollem ac perforatam inveniat, in pilorum formam protruditur & ab eadem ante probe temperata, & substantia hac tenaci & pingui referta, conservantur & incrementum suscipiunt: sin locus, & ipsa materia acris fuerit, & humores vitiosi qui pilorum radicibus apponuntur, cutisque temperamentum vitiant, non modo pili non nascuntur sed geniti defluunt, quemadmodum in luce Venerea & elephantiosi contingere videmus: sic quoque si cutis densior fuerit, licet reliqua recte se habeant, pili non erumpunt, quemadmodum in hac postrema historia contingit. Sed de pilorum natura, si Deus volet, in tertio libro universalis nostræ historiæ, sermo erit.

Uterus testium, i vi insita semen fœcundum reddere: quarum enim testes male dispositi, hæ infœcundæ & steriles sunt. Fœminæ namque non secus quam mares, semen, sed frigidius effundunt, etsi hoc Aristoteles^k neget: qui voluit humorem qui secernatur per collum non esse humorem seminalem, sed loci proprium, uteri nimirum excretionem, quæ aliis eveniat, aliis non, ut quæ fuscæ sint, & viragines: cum monente etiam Hippocrate^l & Galeno, ad perfectam generationem, utriusque semen mistum concurrat, & singularum partium forma potentia contineatur: quare opus fuit loco, quod reciperetur, talis autem uterus est, de quo mox sermo erit.

P 2

De in ipsarum divaricatione

fulcrum quoddam necessarium fuerit. Columbo, seminis generationis gratia conditi: Piccolhom, semen absolventes id fœcundum reddunt. Laurentio, semen elaborant: Platero, forte ad seminis aliquam elaborationem vi sua aliquid conferunt, licet materiam seminis minime admittant: vel potius ad humectationem & divaricationem vasorum, quibus adjacent.

^k 1. gener. an. 20. ^l Hipp. I. de diata, & lib. de nat. puer. Gal. 14. usq. part. II. egit de semine muliebri. Semen, inquit, in matricibus manet, cum fœmina est conceptura, quod principium seu origo est membranarum & vasorum omnium. Ipsum enim amplius coquitur, & initio statim ex semine fœmina nutritur, tanquam id natura familiars magis sit, quam sanguis.

Galenus de his egit 14. usq. part. 10. & lib. de dissect. uteri 9. ubi hæc Dioclem, Praxagoram, Philotimum, Aristotelem, Herophilum & Eudemum ignorasse refert.

VAs deferens ^a semen utrinque [t. 27. mm. tab. 28. f. 1. * f. 2. gg. f. 3. gg.] unum est, quod alii ^b à præparantibus, forte rectius à ^c testiculi extremitate inferna, quod per ligamentum uteri, tanquam fulcro sustentatum fertur, durum candidum, nerveum, gracile, parvi digiti longitudine: dein circa testem ^d ad latera fundi uteri, utrinque corpus latum & membranofum rubicundum, fistulosum & nonnihil complicatum & rugosum, vesiculas seminarias, quales in viris ad prostates reperiuntur, constituit: & ultra vesiculas in medio hujus corporis fistulosi foramen insigne in nervosum vasculum, uteri lateribus affixum, tubæ extremo orificio simile (hincuteri tubam Fallopius, ^e alii cornu fistulosum nominant) abiens observatur: Tubam hanc vasa spermatica ambiunt [t. 27. n. t. 28. f. 2. hh.] & capreolorum modo in se crispatur, cum magis rugosum [t. 28. f. 3. gg.] & flexuosum sit, quam in viris propter viæ brevitate, ut viæ brevitatis flexuum multitudine compensetur, cum non uti in viris, per peritonæi productionem efferatur, quia testes non propendent. Vasa hæc deferentia, ubi à testibus paululum recessere, & uti dictum, fistulosum corpus constituere, & ubi ad uteri latera [t. 28. f. 3. k. k.] quæ cornua dicuntur (unde nonnulli ^f vasa deferentia prodire volunt) pervenire, utrinque [t. 28. f. 3. hh.] viduntur, & harum pars altera brevior sed amplior in sui lateris cornu [t. 28. k.] medium ^g locove proximo implantatur, & in id uterique capacitatem (intra uterum enim porus aliquando manifestus deprehenditur) semen perfecte coctum effundit: pars vero altera, quæ angustior est, sed longior [tab. 28. f. 3. ii.] secundum uteri latera ad ejus cervicem [t. 28. f. 3. d.] utrinque inter duas tunicas fertur, & infra os interius.

^a *ay. sem. omig. p. m. m. g. diff. uteri 8.*
^b *Laurentius & à Castro.*
^c *Pineus qui à testibus exeunt meatus seminarii, eodem modo ut in maribus continere semen conspiciuntur. Gal. diff. ut. 9.*
^d *Juxta testes lat. sunt & foramen sensu evidens habent diff. ut. 9.*
^e *Ita se habere ait in omnibus non solum humanis, sed etiam ovinis, ac vaccinis cadaveribus, reliquisque omnium brutorum. An de hac tuba Ruffus Ephesius 1. part. 29. intelligendus, dum scribit foeminas varicosis affl. ribus carere, Herophilus plane existimavit: nos vero in pecudis utero, vascula à testibus enata & utrinque varicis instar re-voluta conspeximus, quæ uteri cavum perforatum subibant, è quibus numerosus quidam humor, si quis exprimeret habent, dissectiones seorsum declarabunt.*
^f *Riol. per quod semen exugi & in uterum transferri credit, quia intra uterum porus deprehendatur, qui vasis ejaculantis huc desinentis extremitas est: addit jure dubitares aliquis: an per istos canales fetus intra uterum respirare queat, vel potius fuligines in gravidis evacuatur: Vas spermaticum deferens, testiculum subit ac penetrat, huiusmodi seminalem in ipsum demittit.*
^g *Fallop. & Plat. g. Gal. 14. usq. part. 10. in foeminis tum in ipsas matrices vasa inseruntur, tum constituunt, ut in capacitatem internam semen excernerent, & cap. 11. ad semen à propriis testibus trahendum, cornua fuerit comparata: ad virile semen, meatus quem collum vocant, & ad pudendum vergit: Varolus sperma in testibus genitum ad uteri cavitatem accedit: nam à testibus plurima exeunt vascula per membranam quandam, velut mesenteriolum distributa, quæ in aliud vas insignis deferens dictum desinunt, quod in supremam ejus partem im-plantatur, & cavam ingreditur.*

interius sub cervice in prostates: ^h inseritur ⁱ quæ non ita ut in viris sunt conspicuæ, ^h Columbus, cum seminarum semen non sit corpulentum: quæ semen ad tempus coitus conservant; perque hanc viam [†] gravidæ in coitu, non vero orificio uteri interiore re-
ferato, semen effundunt (An vero hæc altera portio, à priore & vasculo uteri tubæ inserto; & in uteri fundo simul junctis, producat, hæcenus non licuit observare.)

Cum enim facta conceptione os uteri [t. 28. f. 1. inter C. & D. & f. 4. G.] exquiritur vitæ, in claudatur, mulieres tamen gravidæ coeuntes, semen profundant, necesse fuit alia via quam semen excerni, cum per cavitatem uteri undiquaque repletam, neutiquam ad orificium ejus semen migrare possit. Et licet concessio in cavitatem uteri gravidæ effundi, cum os uteri non recludatur, nec ob metum abortus ^k recludi debuerit, sequeretur sentiant, in matricis cornu voluit Gal. & Vesal. matricis tantum cavitatem, Columbus in matricis cavitatem & cervicem, Varolus & Laurentius: non in matricis cavitatem, sed in cervicem, Herophilus & Piccolhom. Vesiculas & glandulosos prostates, mulieres non habent, Laur. prostates concedit, Piccolhom. [†] ex Herophylli sententia, Fernellius sic loquitur, è testium involucri iter esse censuerunt, in nervosum uteri cervicem juxta illius os interius: alii è testibus tum in cervicem, tum in capacitatem uteri vias duci volunt, quorum ego sententia subscribo: & 6. Pathol. in gonorrhæa mulierum ait, semen non ab uteri capacitatem, sed è vasculis spermaticis in uteri cervicem profluere. ^k Sunt qui in coitu perpetuo os uteri recludi volunt, licet enim virile semen in uteri fundum non recipiatur, muliebri tamen exitum requirere: quod vero non simul factus ejiciatur, fieri quia alligatus sit & immaturus: idcirco primis mensibus coitum periculosum esse, dum embryo adhuc tenuissimus sit, & ligamenta parum valida. 1 Gal. 6. loc. aff. 5. major noxa ex retento semine, quam menstruis.

De utero.

CAPUT XXXVII.

Uteri situm, descriptionem & differentias Aristoteles 3. hist. animal. 1. proposuit: at Galenus libello proprio de Uteri dissect. & toto fere libro 14. de usu partium de eo egit.

Uterus natura ^a campus est, in quem semen tam viri, quam mulieris partim effunditur, partim attrahitur, sanguisque muliebris affluit, quo nova humani generis proles generetur, nutriatur, augeatur, & usque ad debitum tempus, partu con-

P 3

serve-

servetur. Anima namque naturalis vegetansve, quæ potestate in semine latitat, per totam seminis molem æquabiliter diffusa, in actu produci debuit. Quare uteri recipientis viribus & calore, accedente facultate efformatrice, quæ in semine viri potentia continetur, in actum educitur, & ex semine utroque procreat, & conformat æquabiliter, simul & semel eodem tempore omnes corporis partes, quoad fundamenta spermatica & substantiam solidam, quæ ὑπόστασις. & ὑπερσύνδεσις dicitur: quoad vero fundamenta sanguinea, & substantiam σαρκοειδῆ, seu propria parenchymata, diversis temporibus ea perficit, prout singulæ & alimentum & ignem fuerint nactæ: sicque partes hepatis viciniores, prius quam remotiores, perficiuntur: & cæ quidem prius, in quæ prius sanguis maternus illabatur: illabatur autem primo in venam umbilicalem, ideo primo absolvitur sua substantia carnosa, à qua sanguis dein in alias partes deferitur, ut plenius in historia foetus dicturi sumus.

Infidus, utrum dictum putat, quod duplex sit ab utraque parte unus, Plinio l. 11. c.

37. in ceteris animalibus vulva potius dicitur: idem tamen l. 8. c. 43. asina utero tribuit. Dicitur etiam ἡ μήτρα de vulva suilla numerata quondam in deliciis apud Plutarch. 8. sympt. prob. 9. & Langium in epistolis. c. 2. epid. & Galeno citante de dissect. uteri 29. πρὸς λέγειν τὴν μήτραν, καὶ τὴν μήτραν.

Dictus autem fuit Uterus, qui proprie mulieris est, ab utre, quia cavus est, & utris modo foetum continens impleatur & distendatur. Hippocriti ἡ μήτρα: ac communiter, quemadmodum & Galeno ἡ μήτρα, e quod extremum locum inter viscera obtineat, si non exacte, at saltem ἡ μήτρα: iisdem quoque μήτρας, & mater five matrix, quia foetuum mater est: nonnullis h vulva mulierum, loci & utriculus nuncupatur.

Situs, i est in corpore [t. 26. l. t. ab 27. p. t. 30. l.] quia semen ejectum, ut suscitetur, multo calore eget: in infimo ventre, nam cum supremus & medius ossibus circumdetur, in eo locari non debuit, quia foetu crescente dilatari non posset, sed foetus compressus, suffocaretur: & quidem parte ejus infima, quem hypogastrium & parvum ventrem vocant: partim, ne instrumentis alimentum conficientibus impedimento sit: partim propter facilem coeundi modum, facilioremque foetus inclusionem: quoad inferiora, & ad crura exitus foetui sit futurus facilior. In eo corporis antro & cavitate, quæ pelvis dicitur, ita ut antè ab osse pubis, postè ab osse sacro, à lateribus ab ossibus Ilium, quam firmissimis vallis k tutela gratia circumdetur, uterus scilicet non gravidæ: cum in his fundus sacri ossis initium non superet, nec aliud præter rectum intestinum [tab. 26. K. tab. 27. q.] ei incumbens tangat, nec etiam antè vesicam [tab. 26. T. tab. 27. f.] etiam vacuum superet: inter i utrumque namque & vesicam & rectum intestinum locatus, quo postè vult l substerniculum quoddam ad spinam habeat, ne ossium duritie lædatur: antè autem vesicam, cui succumbit, & quæ ei præponitur, sit veluti propugnaculum

d de princ. med. de superfæ. Sic de locis in homine cū ὑπερσύνδεσις omnium morborum muliebrium cause sunt. e Gal. diff. ut 3. & 4. 14. u. part. 3. & 15. ejus. 3. at 6. loc. aff. 5. non oportet sollicitos esse, utrum ὑπερσύνδεσις ἢ μήτρας appellemus: Sic Platon in Timæo μήτρας καὶ ὑπερσύνδεσις Arist. 1. hist. 13. f Soranus lib. de ute. & Pollux lib. 2. quamvis ὑπερσύνδεσις & ὑπερσύνδεσις dicantur etiam secunda, id est, omnia qua editum in lucem infantem statim sequuntur, apud Dioscoridem. g Sic Gal. libellum de utero inscripsit: at lib. de u. part. modo μήτρας, modo ὑπερσύνδεσις dicitur: Hipp. de loc. in hom. de superf. de his enim de superfæciat ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς μήτρας. Arist. 3. hist. 1. interior pars ὑπερσύνδεσις καὶ δελφίς μήτρας δὲ ἡ μήτρα, καὶ τὸ πρὸς τῇς ὑπερσύνδεσις: matrix dicitur de collo & ore uteri. Dicitur & ὑπερσύνδεσις καὶ ἀγλαῖον κοιλίαν, vas foetum conservans. h Lucillo bulga, quasi folliculus & locus: hinc forte Gaza vocem ὑπερσύνδεσις apud Aristotelem, locum reddidit. i Situs explicatur 14. u. part. 3. at ab Arist. 3. hist. 1. 1. gener. an 9. & 12. & 3. ejusd. 1. k Hoc & Columbus voluit: at Piccolhom. hos nihil dicere ait, quia uterus extensus supra umbilicum veniat resp. recte quidem in gravidâ, sed ut plerumque uterus vacuus est. l diff. uteri. 1. 14. u. part. 14.

culum. Hinc colligas splendidum primæ nostræ habitationis domicilium, ut qui ex fragili & peritura materia, inter sterus & urinam nati sumus, & in terram & pulverem redituri: quare, qui superbimus, Plinii dictum sedulo perpendamus, inquit: Heu dementem ab his initiis existimantium ad superbiam se genitos in infimi ventris medio, quo ^m corpus sit in æquilibrio: eamque ob causam pelvis in mulie- m Gal. 15. us. ribus amplior, unde & nates illis grandiores & ampliores. At fœtu crescente, cum part. 2. parte superiore liber sit, sensim ad superiora extenditur ad umbilicum [tab. 30. L.] usque gracilibus intestinis incumbit, ilia quoque in partu vicinis insigniter implet, nec ad amissim mediam sedem occupat, sed magis in dextram aut sinistram inclinat, quod subinde ratione diversitatis sexus ipsius fœtus evenire solet, non tamen perpetuum est. Nonnunquam inter vesicam & uterum omenti portio incidit, & ob uteri os compressum, sterilitas ab Hippocrate ⁿ proposita, causatur.

o Connecitur partim substantia sua, partim ^p ligamenti quatuor, quorum duo superiora sunt, & totidem inferiora: verum fundus [tab. 27. p.] antèr, postèr, & superius nulli parti adjacenti connascitur, sed liber est, quo commode in gravidis distendi, in coitu & cupiditate concipiendi, nunc sursum, nunc deorsum se movere, & ad penis summum tanquam animal hiare possit: unde Platoni, q ^zo, se ^m quoniam, quod libidinem explendo animal generet, dicitur: qui & odorum suavitatem allectus, movetur.

Ligamenta superiora duo sunt lata & membranosa à peritonæo ^r enata, [tab. 26. 0000. tab. 30. IK. tab. 28. fig. 4. III. quæ vala quoque utero deducunt, & vesper- lionum [tab. 28. fig. 1. EE.] alis velut Aretæus, navigatorum velis expansis (ut uteri fundo elevato conspiciuntur) assimilari possunt, quibus ossis Ilii lateribus alligatur: quæ nonnunquam carnis fibris [tab. 26. PP.] intertexuntur, quare nonnullis mus- culi ^s dicuntur) quorum beneficio uterus, cum in utramque ejus partem distribu- antur, detinetur, quæ licet valida sint, attamen laxa ^r admodum sunt, & mollia, ita ut in nulla alia parte adeo laxa reperiantur, quia cum toto utero extendi, & ipsum sequi citra lacerationem debuerit, cum uterus gravidæ, qui amplius maxime fuit, post partum in summam angustiam contrahi debuerit. Sed his quoque ligamentis, tanquam frenis coerceri volunt, cum sæpe, ut cum Hippocrate, divinus voluit ^u philosophus, per totum ventrem, maxime steriliū oberret; modo sursum, ut Hippocrates ^x loquitur, diaphragma & hepar comprimendo, suffocationis metum

causans:

musculi, Gal. 14. us. part. 14. diff. ut. 4. ubi vult in utraque partes uteri distribui. Vesalio duo musculi, quorum be- neficio uterus volu- rto motu nonnihil & obscure deorsum, dum mulieres Iliā contrahunt, adducitur & interdum, adeo crassescunt, ut hæc cornua uteri esse aliquando crediderim. Piccolhom. cremastres uteri, quod cum suspendant, alii asserunt esse membranas suspensorias: alii musculos: nos putamus esse membranas musculorum participes, sive processus membranosos musculorum parvarum participes, &c. Columbo duo lata particula membranæ, &c. Gal. 14. us. part. 14. u Plato in Timæo, ut habetur apud Gal. 6. loc. aff. 5. uterus cum sit animal, prolem generare cupiens, si diu infructuosum fuerit, succensens agre fert, & errans per totum corpus, & spiritus meatum obstruens respirare non sinit, in extremam anxietatem dejicit, & multos alios morbos excitat. x De his qua utero non gerunt: at Gal. 6. loc. aff. 5. negas ad diaphragma pertingere, imo ne quidem ad ventriculū (intellige successione partium.) Absurdum etiam humoris desiderio ad viscera ascendere, cum per suavia multa, ex concava vena sanguinem attrahere possit. Hipp. de artic. sect. 3. & 1. morb. mul. asserit, uterum aridum & exsuccum suoque genio defraudatum, ad hepar gratiosi humoris fontem excurrere ut humectetur. Fernelius sæpe tactu deprehendit instar globi cujusdam in ventriculū ef- ferri, eumque graviter opprimere, manu depressum in propriam sedem propelli.

n 5. aph. 46.
o Quibus con-
nectatur & ad-
jacent, explica-
tur, diff. ut. 4.
p Ligamenta
qua deorsum
vocat, explicat
14. us. part. 14.
qua & ægrius
ex vincula 6.
loc. aff. 5. nomi-
nat.
q In Timæo, re-
ferente etiam
Gal. 6. loc. aff. 5.
Pythagora ani-
mal per sei-
psum distin-
ctum: Aretæo,
viscus prope
animatum,
& velut ani-
mal quoddam
in animali.
r A lumborum

causans: nunc ad lumbos, * & coxas irruit, doloresque excitat: maxime tamen sinistram latus molestat: quare eas quæ conceptus inutiles gerunt, potissimum de molestia, dolore & morsione sinistri lateris conqueri, sæpissime observavimus; nunc de-

¶ Arist. 7. hist. 2. multis desiderio coitus, vel iuvenilis ataviratione, vel quia diu abstinerunt, descendunt uteri & menstrua saepe ter in mense citantur, donec conceperint, quo facto ascendit, & suo situ constituitur. 2 Gal. 6. loc. aff. 5.

a De articulis, ubi popliteis articulum non secundum naturam moveri posse ostendit, quia coxa consentiat.

** Soranus & Aretæus, tunicam internam carnosam qua uteri corpus constituit, ad inguinalem delabi dicunt, tunica exterior membrana, quæ paribus vicinis firmiter alligatur, inius remanente.*

b Libro de par-

tu Casareo quinto edito, ubi docetur modus factum virum ex matre viva sine periculo vita extrahere. Idem testatur Avenzoar. cap. de exitu uteri: & Benivenius lib. de abditis, cap. 11. c Avenzoar. lib. 2. tract. 5. cap. 4. scribit extrahi matricem posse mulierem vivere. & Egineia l. 3. c. 72. idem testatur. Soranus scribit, referente Oribas. 24. col. 31. minime existimandum esse Uterum principatum ad vitam obtinere, quia is non solum procidat, sed in quibusdam etiam precipitatur, nec tamen mortem adferre, ut Themison literarum monumentis commendavit: præterea in Galitia sues habitiores & valentioris alimenti fieri ajunt, postquam uterus abscissus fuerit.

d Gal. diff. ut. 4. c Hipp. lib. 1. mulieb. f Vesalius non meminit. Columbo, processus uteri, quorum usum nemo ante ipsam exposuerit. Fallopius in institut. habet & Plat. Varolus, uteri cornua vocat, Piccolhom. ligamenta uteri Laurentio, quibusdam uterini cremastres.

orsum fertur. ¶ dum libidine turget, & nonnunquam vesicæ cervicem comprimens, alium locum discurrit, propriamque sedem relinquit, sed duntaxat dimovetur, & ab extensione retrahitur, cum ex menstruorum retentione, venarum & ligamentorum uteri, plenitudo oritur; & si aliquid descendit, id exiguum est. Et quando ad ventriculi fundum retrahitur, fit propter convulsionem vasorum, quæ modo ex repletione, modo ex inanitione oritur, non quod uterus vel animal sit, vel voluntarium motum possideat, vel supra ventriculum conscendat. Sed dum uterum sic moveri dicimus, non solum uteri fundum, sed & ejus tubam, vasa & testes intelligimus, quæ dum semine putrido turgent, per hypogastrium moveri possunt: nam uterus vix supra os sacrum effertur. Et Hippocrates a id videtur innuere, uterum non per se transmutari, sed à quibusdam aliis trahi. Nonnunquam tamen ita à pondere fetus, vel difficultate partus, ligamenta relaxantur, ut uteri fundum deorsum feratur, & in sinum decidat: aliquando quoque inversa cervice extra pudendum, penis modo, intra earum femora magna molestia propendet, * ita ut quandoque Chirurgi manu auferatur, vel etiam sponte totus è corpore, ligamentis putrefactis, excidat, ut alibi exemplis b ostendimus, cum femina sine utero c vivere possit: cum ipsius ad individui conservationem nulla sit necessitas, sed ad speciei tantum conservationem, & fetus generationem maxima nobilitas. Cervix vero seu canalis, cum vicinis partibus, non tamen undique, connectitur. Ad latera membranis quoque adnascitur, & illarum interventu laxè peritonæo connectitur: posterius ossi sacro, d & tenuioribus fibris cum aliquanta d pinguedine recto intestino, cui toto ductu incumbit, & supra pudendum cum ano unita coalescit, ut aliquando ex ulcere ster- cus per pudendum excidat: non tamen & intestino & uteri cervici paries utrique communis est, quia cervix à recto intestino, sine ulla laceratione separari potest: anterius, vesicæ urinariæ cervici [tab. 27. t. tab. 27. fig. 1. O. fig. 4. L.] & cum uteri cervix latior sit, etiam ossibus pubis, beneficio membranarum à peritonæo enatarum, ne- ctitur: hinc inflammato utero, tenesmus e & stranguria causatur.

Ligamenta f inferiora [tab. 27. o. o. tab. 28. fig. 2. k.] fæminæ tantum propria similiter duo sunt, quæ nonnullis *νεμυστες* dicuntur, cum tamen nulla ex parte testiculos attingant: Sunt autem processus nervosi, rotundi, lumbricis similes, ruben- tes con-

res, concavi, sanguine repleti, præsertim in extremo, ut insculptam membranam vaginalem referant, quæ cavitas aliquando & pinguedine infarcta reperitur. Hæc a latibus fundi [tab. 27. ad p. 1. 28. ad 6.] uteri ^h utrinque prodeunt, & in suo exortu ^g Carneo ro-
 vasa semen [tab. 27. m. o. t. 28. fig. 2. g.] deferentia contingunt, ad inguina, ubi super- ^{extra perito-}
 ne & inferne glandulis suffulciuntur, ascendunt, & per peritonæi productionem du- ^{naum, muscu-}
 plicatam, quo modo vasa spermatica virorum feruntur, & tendines musculorum ^{lum cremasto-}
 obliquorum abdominis pertranseunt; hac productione dilatata, ubi tamen prius ^{rem illi adne-}
 interior tunica eam constituens rupta fuerit, quemadmodum in difficiliori partu sæ- ^{xum, continet,}
 pe accidit, hernia mulieribus, ut in viris contingit, & ligatura post sectionem curan- ^{Fallop.}
 tur. His, extra abdomen fibræ carnosæ ab osse Ilium prodeuntes, junguntur, quæ ^{h A testibus de-}
 musculos ^{orsum ferun-}
^{per musculos,} seu suspensores admodum parvos quibusdam volentibus con- ^{tur Fallop. ab}
 stituunt, cum tamen nullam cum testibus communionem habeant, secus quam vi- ^{anteriori of-}
 sis, quorum vasis spermaticis assident. ^{sum pubis par-}
^{te, a membra-}

Ligamenta hæc supra os pubis [tab. 28. fig. 2. l.] in latam ac nervosam exilitatem degenerant (cum membrana quæ anteriorem ossis pubis partem tangit & investit, quasi permista) cui Clitoris ^h inhæret, ac alligatur, ut cum nervea sint, ideoque exquisitissimi sensus, ex ejus attritu imaginatio huiusmodi ligamenti, & ab his, vasis semen de- ^{na ossa pubis in-}
 ferentibus, communicetur. Horum usus uterum, ne extra pudendum excidat, sus- ^{vestiente, &}
 pensum tenere (quemadmodum Cremasteres ^{ascendunt ad}
 & roborare, tum propter gravia onera, quæ sæpius diutius continet, tum propter in- ^{tendines muscu-}
 gentes conatus in partu excludendo, tum quoque propter humores à toto corpore ^{lorum abdomi-}
 huc defluentes, qui non tantum humectare, sed etiam partem relaxare possunt. Ve- ^{nia, & penetrat}
 rum distorum ligamentorum nervosa & membranosa pars reliqua sub Clitoride, in ^{foris intro & in}
 femoris interni pinguem membranam, fere usque ad genū ^{corporis uteri}
 causam, sæpe gravidæ primis mensibus, de femorum interiorum dolore conquæ- ^{fundum latera}
 runt. At cum ligamenta hæc fistulosa sint, humores partium genitalium super- ^{liter inferun-}
 fluos instar canalium ad inguinis glandulas devehunt: hinc fit, nonnullis recte mo- ^{tur, Pinxo.}
 rentibus, ut in quibusdam hysteriis tam virginibus quam mulieribus inguina tu- ^{in Vesalius de}
 meant, femorum interiora doleant, ob horum ligamentorum convulsionem: ab hu- ^{musculus cre-}
 moribus enim distenta breviora sunt, sicque corporis erigendi & femoris extenden- ^{māsteribus nil}
 di commoditate impediunt. Sic ubi partes seminales, quæ luce venerea infectæ ^{habet.}
 sunt, si robustæ fuerint, per hæc ligamenta, humorem virulentum in glandulas in- ^{k nullibi Clito-}
 guinum, quæ uteri emunctoria sunt, & in quibus bubones excitantur, transmi- ^{rim, ut Colum-}
 tunt. At quatenus fibræ carnosæ intertextuntur, eatenus motui ^{bus putat, at-}
 lunt, & virilis seminis attractionem voluntariam à collo in uteri capacitatem adju- ^{ringens, ait Fal-}
 vare. ^{lopius.}

^l Figura est rotunda [tabul. 27. p. 1. 28. f. 1. A. f. 2. c.] quo sit capaxior, minusque ^{Opinor, ut scæ-}
 injuriis obnoxius supra aliquantum depressa [tab. 28. fig. 3.] vesicæ similis, si apices, ^{ninx omnes}
 quos Cornua vocant, excipias; cum uteri & vesicæ fundus amplius sit, & cervix ^{partes adessent,}
 angusta maxime in gravidis: at in non pregnantibus fundus latitudine cervicis la- ^{qua sunt in vi-}
 titudinem non superat: nonnulli cucurbitulæ ^{ro, ideo pro cre-}
 runda inversæ, assimularunt, & formæ & attractionis causa, cum virile semen ad ca- ^{māsteribus &}
 vum uteri non perveniat, nisi ab eodem attrahatur: quod si uterum cum cervice ^{tunicis vagina-}
^{libus à natura}
^{factos hos proces-}
^{sus geminos.}
^{Fallop.}
^{Auctor ana-}
^{virvor. liga-}
^{menta inferio-}
^{ra ad pedes res-}
^{que perducit,}
^{superiora vero}
^{ad mammillas}

oculos ascendere scripsit. m Pinxo. n de diss. uteri. 3. figura proponitur. o ex Sorano Fallopius.

p. Figura ac ma-
gnitudine pyro
majusculo simi-
lis. Piccolhom.
Laur. Pinæo.
q. de diff. ut. 2.
ubi fundum
ad umbilicum
pertingere vo-
luit, quod in
gravida conce-
di potest: etiam
in brutis, argu-
ens Galenum.
r. Tres quatuor
ve digitos lon-
gus, & totidem
latus, Plat.
f. Gal. 14. us.
part. 4.
† Moschio in
gynæceis, partes
uteri sic enume-
rat, orificium
externum, & b-
ugo: de in col-
lum, & uterum
tum cervicem,
αὐτὴν: omnis
horum concur-
sus, & uterum
dicitur: ubi uterus
superne dilata-
ri incipit, hūe-
rus αὐτὴν voca-
tur: partes pau-
lo superiores,
αὐτὴν, late-
ra: ubi utero
tunditas conclu-
ditur, fundus
αὐτὴν: fundi
pars media, & αὐ-
τὴν, & ma-
nitur, qua in
medio est, ven-
ter conceptacu-
lum, & αὐτὴν
nos appellatur. Si Soranus collum à cervice distinguit, & quod Moschio χέρον vocat, ille αὐτὴν appellavit & addit
τὸ κοῖνον quod in medio cuncto est. r. de diff. ut. 6. duas dicit exteriores simplices: interiores sive proprias dupli-
cem, quæ firmissime cohaereat, ut vix discerni possit. Quare 14. us. part. 14. unicam dixit. Vesal. in Galenum invehens
duas dicit unam à peritonæo, alteram peculiarem & unicam, cum tantum continere debuerit. Columb. & Laur. duas
propriam alteram propriam, alteram à peritonæo. Piccolhom. duas proprias sic & Pinæo, qui & communem facile in duas, instar
reliquarum membranarum excepta pia matre dividi posse asserit. u. νευρωδιστος φλεβωδιστος. diff. ut. 6. x. diff. ut. 8.

Magnitudo ¶ ipsius in omnibus non æqualis est, sed pro ratione ætatis, corpo-
ris, & imprægnationis variat; in virginibus, quia nondum perfecte, & adhuc au-
gentur, parvus est, & vesicæ matricibus majores sunt, contra in perfectis; sic & in iis,
quæ venere non utuntur, & in vetulis, quia exsiccata, parvus (ut quam minimum
cætera comprimat organa) & crassus existit. Latitudine ¶ duos digitos parum ex-
cedens, & longitudine v. x. unquam trium digitorum longitudinem (fundum intel-
ligas) æquat, vix ossis pubis & vesicæ altitudinem superans: in ætate florentibus
major (sed ejus quæ nunquam concepit, multo minor est) has enim magnitudi-
nem ¶ convenientem ad concipiendum habere oportebat: illis vero tanquam otio-
sis, magnitudo superflua erat. Sic quæ utero gestarunt, majorem aliis habent, non
tamen multo majorem, quam manu comprehendi possit: in gravida, pro fœtus ma-
gnitudine in omnes dimensiones augetur. Sic à principio ad pudendum non æqua-
lis est in omnibus fœminis, ut plurimum tamen undecim digitorum spatium in aliis
octo est, in iis quæ venere utuntur.

Partes ¶ habet duplices: simplices & compositas. Simples, ligamenta, de qui-
bus diximus, membranas, venas, arterias & nervos, quæ ipsum uterum constituunt.
Compositas quatuor, fundum, os uteri, cervicem sive canalem, & pudendum exter-
num.

Membranas ¶ duas habet, anteriorem & posteriorem, quarum natura, ut mul-
tum & distendi & facile contrahi possint: exterior [tab. 28. f. 4. H. H. t. 26. oo. Q. Q.]
quæ communis dicitur, & nervosa est, omnium quæ à peritonæo oriuntur crassissi-
ma, quare valida & uteri lateribus utrinque adnata, & duplicata, quem tutelæ cau-
sa investit & roborat. Interior [tab. 28. fig. 4. EE. t. 31. f. 1. ABCD.] seu propria, (quæ
duplex est) adeo tamen firmissimæ junctæ, ut vix discerni possint, nisi in exulceratio-
nibus, inter quas, sicuti inter geminas ventriculi tunicas, carnosæ fibre collocatæ
quæ ii, qui utero unam tunicam tribuunt, non tunicam, sed uteri substantiam appel-
lant, cum tamen una cum exteriori, uteri substantiam constituent, membranofam,
densam, compactam, quo dum fœtus augetur, dilatari, ubi exclusus sit, contrahi
collabique possint: at ratione interioris membranæ carnea est, & admodum crassa,
quod semen & fœtum calore foveat: & porosa, cum juxta augmentum fœtus ex-
tendi debeat. Quare, reliquas ventris tunicas crassitie superat, non tamen undique
eadem crassities, nec etiam semper eandem crassitiem servant: prima namque æta-
te, sicut parvæ, ita etiam tenues sunt: profluentibus vero jam menstruis, pro ma-
gnitu-
gnitu-

gnitudinis ratione crassitudinem augent: minuitur vero tam ^x magnitudo, quam crassitudo, cum mulier concipiendi tempus excessit, vel menses non amplius fluunt: quorum principium & finis sunt, quando femina apta nata est concipere. Sic cum menstruum purgatio instat, crassa ac tumens apparet, utpote sanguinis humiditate irrigata. Sic ejus quæ jam uterum gessit, crassior: crassissima ejus, quæ sapissime. At conceptus ^y tempore crassescit, mollior redditur, & ubi concepit, crassior ^z est, & ^y In principio circa tempus partus ^a crassissima, ita ut postremis mensibus duorum pene digitorum crassitudinem, non uno tantum loco, sed ubique maxime versus elatiorem fundi ipsius partem, in quam uteri vasa coeunt, & secundinæ cohærent, æquet: cum non solum in amplissimam circumferentiam extendatur, sed etiam semper crassior fiat, ^z for quidem, sed & secundum quamcunque sui partem à primo conceptu ad partum usque augetur. Ex copioso enim sanguinis affluxu, ob plurimas venas & arterias sparsim per eas disseminatas, substantia ipsius carnosæ, fungosæ, spongix similis, & fungorum modo in multis cortices dividua (ut sanguinis & spirituum copiam pro fœtus nutritione & vita contineat) redditur, cum calore insito adaucto ad fluxum necessario fit, sicque tumescit, & distenditur: & post partum non amplius affluente tanta copia, ad pristinum statum redit. Si enim eam carnositatem & molliem nunquam acquirat, sterilitas perpetua causatur. Si vero aliquando talis non fiat, sterilitatem ad tempus inducit. Unde videmus aliquas mulieres, quæ prius conceperant, postmodum annis aliquot steriles esse, & tamen denuo concipere.

Fibræ carnosæ ^b inter has feruntur, quæ ipsius parenchyma constituunt, quo uteri calor ad conceptionem augeatur: quibus forte musculorum ^c instar, uteri motus voluntarius excitatur, ad semen virile ad ejus orificium jaculatum in capacitatem recipiendum, & ad conceptionem arte completendum, at in iis, quæ jam aliquandiu utero gerunt, in interiori tunica, triplex fibrarum spermaticarum genus, multo manifestius conspicitur: rectæ quidem interiores, cum semen allicere debeant, quæ pauciores, quia opus ipsorum facile, cum recto membro ocyus eo feratur: obliquæ mediæ plurimæ & validissimæ, quod id quod conceptum, diutissime retineant: transversæ extremæ, validissimæ quoque, quia tum earum usus cum fœtus excludi debet.

Venarum ^e & arteriarum inter uteri tunicas excurrentium duplex genus excurrit: duæ enim venæ, totidemque arteriæ à spermaticis [t. 27. ll. t. 28. f. 1. H. f. 2. ff. fig. 3. bb.] eodem mittuntur, totidem ab hypogastricis, quæ ab inferioribus [t. 28. f. 2. e. & t. 31. f. 1. FF.] sursum feruntur, quo ab omnibus corporis partibus tam superioribus, quam inferioribus sanguis ad eum accedat: cum non solum ^f utero, sed etiam fœtibus alimentum deferant, & quo universum mulieris corpus in menstruum purgationibus exoneretur. Nam cum Galeno scribente, in universo corpore mulieris nulla sit pars attero imbecillior, idcirco quicquid ex alimento sive bono sive malo, superfluum est, id à validioribus membris ad infirmiora depelli solet: unde femina quia frigidum

Q 2

& im-

Hoc in brutis, non vero homine concedimus. ^a Arantius, Plat. Varolus, Rossetus & Laur. Heurnius libr. de procr. cap. 5. credite Arantio & mihi qui hoc vidi in secta gravida & c. 6. quæ de corticosa substantia uteri in ingravida-
tio observavit Arantius, ita deprehendi sectione mulierum. ^b Fibrarum genus omne habet, cum semen attrahere, & fœtum expellere debeat, 14. us. part. 14. ^c An forte & sordes quasdam uteri excludunt, quæ solum musculorum abdominis compressione exturbari non poterant? Piccolhom. ^d Uterus è profundis cuniculis serpentem narium inspiratu allicit. ^e De vasis vide de diff. ater. 5. & 14. us. part. 13. ^f diff. ut. 5.

* 2. diutur.
morb. II.
g Volunt ali-
qui, has qua ad
latera ossis sa-
cri prodeunt, in
cervicem ute-
ri: illas à sper-
maticis, in ute-
rum ipsum, vel
fundum propa-
gari: verum
junguntur et-
iam, Fallopio
monente.
h Gal. 14. u.
part. 9.

i Hanc con-
suetudinem ab A-
natomicis ne-
glectam dicit
Fallop.

† Carolus Ste-
phanus vult,
venas & arte-
rias uteri sub-
stantiam ingre-
dientes, cum pri-
mum implan-
tantur tunica
proprias amitte-
re & in uteri
primam mem-
branam confu-
mere: in ipsa
tamen uteri sub-
stantia ductus
& canales an-

fractuosos, quales in spongiis videmus reperiri, qui inter utrumque parietem latiores & ampliores sint quam in extre-
mis. Vide Gal. 6. loc. aff. 5. 1. Menses non per diapedesin, seu per resudationem, ut voluit Arist. 2. gen. an. 4. sed per a-
nastomosin expurgantur, verum non solum per uterum expurgantur, sed ubi obstrictio est vasorum, etiam per alias vias
quibusdam per nares, alius per os, & quidem vomitu, in quibus ex cava in porta ramos, ab his per meseraicas in jejunum
intestinum, pylorum & ventriculum fertur: nonnullis per mammas, Hippocrate testante: alius per alvum fluere abjer-
vavi: sunt jam (à Castro referente) visa quibus per minimum digitum, & per annularem singulis mensibus sanguis per-
funditur: altera cui per majorem oculi sinistri angulum fluunt: alius per sanguinis sputum.

& imbecillum animal est, multis excrementis abundat, quæ ad partes genitales ori-
nium imbecillimas confluunt, a quibus morborum ilias oritur: hinc Areteus * ute-
rus ad purgationem & partum bonus est, sed morborum & infinitorum malorum a-
cervum congerit. Proinde verissimum est Hippocratis dictum *ei is egi paiton tui vo-*
onpoutos al'non elon. Verum venæ arteriis majores sunt, & harum 5 altera, quæ à sper-
matica, & à superioribus descendit, per totum corpus ejus, maxime per fundum,
ut ei alimentum adferatur, disseminatur: fines tamen vasorum, quæ ^h in sinistram
partem feruntur, cum finibus eorum, quæ in dextram ejus partem sunt distributæ,
uniuntur; quo, Galeno monente, dextra pars exiguam serosam humiditatem assu-
mat, sua acrimonia actionem excitet, & voluptatem præbeat, quemadmodum hu-
mores serosi, qui sub cute sæpe colliguntur, si incalescant, pruritum excitant, & suo
motu aliquam voluptatem adferunt: per hanc quoque venam, sanguinis menstrui
pars potissimum in mulieribus, sed non gravidis, prorumpit: verum spermaticæ hæ
non solum uterum irrigant, sed ad cervicem usque producuntur: hæ aliquando, ut
in gravidis & puerperis observatum fuit, digiti parvi crassitiem adæquant. Altera
à cavæ ramo hypogastrico ad latera ossis sacri, circa os pubis, quæ major est, & per
latera cervicis, seu canalis usque ad medium uterum ascendit, ubi cum superiori-
bus coit. Hæc partim per uteri fundum, partim per ipsius cervicem seu canalē
distribuitur. Vasa autem, quæ per fundum feruntur, semper aliquot ramis uniu-
tur, ⁱ & quidem vel extra uterum, vel in ipsius substantia. Extra uterum superio-
ris venæ rami cum inferioris furculis ad cervicem uteri [t. 28. f. 2. e. cum h.] ubi utrius-
que multiplicia vasa sunt, eaque insignia, quasi digitatim disposita, junguntur, & u-
nita ejus substantiam penetrant, & in cavitatem desinunt: quæ anastomoses in gra-
vidis, & quibus fluunt, aut fluxuri sunt menses, magis conspicuæ sunt: quod si vero
non uniantur, tum ab inferiore vena, rami aliquot sursum feruntur, fundo inferen-
di. Hujus hypogastricæ venæ rami uteri substantiam [†] ingressi, cum superioribus à
spermatica prodeuntibus ramis coeunt, & oscula interiorē uteri cavitatem sub-
eunt, quæ cotyledones, seu acetabula dicuntur, quibus in conceptione hepæ uteri-
num seu secundæ adherent, unde conceptus per umbilicalia vasa alimentum acqui-
rit, & utero foetus committitur: per hæc copiosior sanguis, quam pro ipsius nutri-
tione requirebatur, toto illo tempore, quo mulier concipere potest, defertur; quo
ubi conceptio fieri debet, sanguis præsto sit, tanquam alterum generationis princi-
pium; & quo foetui jam formato, alimentum subministretur: quare toto gestatio-
nis tempore copiosius, copiosior tamen, quo pluri nutritione foetus indiget, af-
luit. Eo in lucem edito, ad mammas pro lactis generatione refluit: at reliquo tem-
pore, cum copiosior sit, quam uteri nutritio requirat, ideo tanquam supervacuis
singulis mensibus ¹ expurgatur: siquidem retentus corrumpatur, variæque hyste-
ricas

ricas passiones (quæ tamen magis exeretento semine, quam menstruis causantur) excitat: cum quo nonnunquam etiam alia excrementa in sanguine contenta, humorumque colluvies, aliis trium, aliis plurium dierum spatio expurgantur: ^m & communiter nova luna juvenes, vetulas plena luna expurgat: quod idcirco notandum, quo virginibus menstruis suppressis, ad ea provocanda in fine mensis aut principio novilunii remedia administremus. Altera tandem inferioris venæ ⁿ pars in cervicem seu canalem [*tab. 28. fig. 2.e.*] inseritur, quo si nimius sanguis, dum mulier gravida est, pervasa spermatica deferatur, per has venarum anastomoses, non reformato officio uteri, in cervicem exoneretur. Quare per has ^p gravida nonnullæ plethoricæ, primis mensibus copiosiore sanguine, quam pro fœtus nutritione opus est, affluente evacuantur: non vero ex fundo, ut alias menstrua, tam mulieribus, quam virginibus ^q recta expurgari solent, alias sanguinis copia fœtus suffocaretur, & uteri officium, cum periculo abortus, referari necesse esset. Idem de Arteriis, quæ venas comitantur, statuendum. Arteria enim (præter spermaticas) utrinque insignis ab hypogastrica in uteri cavitatem distribuitur, à qua ramulus uteri corpus intra duplicem membranam, anfractuose perreptans ad testiculum ascendit, qui in prægnantibus & quæ utero gestantur varicosior est. Arteriarum in prægnantibus, quam in non in gravidis usus, calorem uteri augere, sanguinem spiritumque vitalem, cum facultate & calore vitali pro ejus vita deferre; & motu suo, calorem innatum ventilare, sanguinem agitare, sicque à putredine conservare. An vero mensium tempore sanguis vitalis redundans expurgeretur, ignorare ^{††} nos fatemur. Verum à prædictis valis, & à pudenda, exigua quoque venæ & arteriæ, in pudendum & ejus colliculos feruntur.

Nervi licet exiles, plures tamen retis modo inter se impliciti, quo sensum exquisitum conferant, eo mittuntur: ad elatiorem quidem fundi partem, à sexti paris propaginibus extremis, qui costarum radicibus exporriguntur: ad cervicem & humiliorem fundi sedem, à medulla lumborum & ossis sacri (unde mirus uteri & cerebri, præsertim parte posteriore consensus) ut molesta sentiendo expultrix exsurgat, in congressu voluptas percipiatur (quare plures ^f ad cervicem mittuntur, & ad partes, quæ circa pudenda sunt, cum sensum exactiorem ob coitum venereum postulent) motus uteri ad virile semen alliciendum & complectendum excitetur, cum in utero fibræ sint, eæque carnosæ, loco minimorum muscutorum. Hactenus de simplicibus & similibus uteri partibus, nunc de similibus agendum erit.

Q 3

De
tibus ora vena
rum in cervi-

cem aperiantur, sanguinem excernunt. Et *5. aph. 60.* ait, utero gestantium sanguis, qui ipsi interdum lunariis purgationibus defluit, non ex uteri venis, sed cervicis promanat.

^q Ex ignorantia fabricæ hymenis, quem nequitiam perforatum existimarunt, sinxerunt in virginibus ex venis humilibus, quam hymen consistentibus, in cervicem uteri deductis, purgari. *Vesal.*

^{††} Heurnius sic lib. de proc. hominis c. 6. sanguis menstruus, non est vitiat, imo potius benignus purpureusque dicitur esse, utpote qui fluat ex venis & arteriis.

^u De his *Gal. de diff. ut. 4.* & *Gal. 14. us part. 13.*

m Ex uteri venis, non vero cervicis sanis proveniunt, quia mulieribus uteri pro-cidentia laborantibus ex ore fundi uteri sanguinem hunc excerni vidit Vesal. per oscula in uteri cervicem desinentia, Plat. per venas in uteri cervicem desinentes, purgantur gravida. Piccolhom. Colubus vero probat multas purgari per colliam potius, quam uteri corpus, quia multo plura & majora vasa, quam in ulla alia uteri parte: probat etiam exemplo suspensa. Hic Pinus quoque duo adducit exempla.

n Dissect. uter. p Gal. 6. loc. aff. s. cum prægnantibus ora vena rum in cervi-

quo mares, & sinistrum, in quo foemellæ ex Hippocratis & Galeni decreto concipiuntur (cum hos monente, ⁿ in dextro foemineus foetus raro contineatur) beneficio non alicujus septi, quod rarissimum, † sed tantum suturæ vel potius lineæ [t. 28. f. 4. c. D.] leviter ut in seroto & lingua, obscuriore tamen prominente, per ipsius superficie internam, sive membranam carnosam mediam, antè & postè se- cundum longitudinem perducta, quem ^{διχοστον}, medianam Aristoteles ^ο nominavit, dividi solet: idcirco antiqui matrices, petinde ac si duæ forent, appellarunt & mam- mis numero correspondere dixerunt, atque hoc sensu muliebris uterus ^{διχοστον} bis sinuatus intelligendus est: & cum aliquando muliebris uterus ^p bipartitus inventus fuerit, observandum erit, num mulieres quæ superfœtare solent, aut plures foetus quam duos generant, utrum quemadmodum bruta bipartitum habeant: Cavitas hæc [tab. 28. f. 4. A. B.] levis est, admodum angusta, fabæ vulgaris vix capax, semen utriusque recipit, eoque repletur, cum quævis seminis portio ingressa eam repleat, quam undique amplecti debuit, siquidem in quolibet seminis minimo, tota vir- tus formatrix adsit, ex quo misto & fermentato foetus generatur: sensim quoque san- guine, pro ejus nutritione & incremento, affluente ampliatur, simulque uteri sub- stantia exercet. Porositatibus pluribus quoque fundus donatur, qui pori cotyle- donum ora existunt, quo sanguis nullo obstante, facile è venis uteri in ejus cavi- tem gestationis tempore pertingat. In non prægnantibus, ut plurimum viscido quodam, & subalbido muco illitus est, & colore inter pallidum & rubrum medio. Substantia pudendis durior & compactior, cervice vero mollior, & in suis angulis ru- gosior.

At ex humilima fundi regione, tanquam rotundo & amplo corpore, portio in- signis protuberat, quæ corpus constituit quasi penis glandem [t. 26. f. 1. CD.] refe- tens, quod rotundum & oblongum, trium circiter digitorum longitudine intra cer- vicem (cujus tamen latera nusquam attingit) exporrigitur, quod durum pollicari crassitie, foramine angustissimo donatur, ut vix stylum, aut ad summum parvum ca- lamum scriptorium admittat; sed aspera, ne semen attractum facile effluat, quod in in iis mulieribus fit, quæ ob vitiosos humores lubricam & hanc partem habent, ejus- que nomine steriles sunt: quam partem, quæ fundi principium & ipsius os in- tercedit, à Galeno, Sorano & veteribus, cervicem nominatam fuisse, Fallo- pius credidit: intra veræ cervicis canalem foraminula quædam occurrunt, quæ extremitates sunt vasculantis eo definentis & in quibusdam caruncula inferne posita est.

Præterea foramen hoc [t. 28. f. 1. inter C. & D.] ingressus est in fundum uteri, qua- re Hippocrates ^{τὸ πρῶτον τῶν ὀστέων}, vel ^{τῶν ἰσχυρίων}, os uteri, Galenus ^ο cervicis in- ternum

n Hipp. 5. aph. 48. factum ma- res in dextro, foemina in sini- stris sunt potius Gal. 14. us. part. 4. c. 7. ut pluri- mum masculus in dextra, foemi- na in sinistra, c. 6. loc. aff. 5. raro aliter eve- nire comperit- est. Discrimen- sexus ostendi- tur, 14. us. part. 7. partim ex se- mine, partim ex matre. † Lutetia ann. 1599. in scholis Longobardo- rum mulier dis- secta, cujus ute- rus septo me- dia divisus erat. 03 hist. 1. dix. 6. as. 6. uterog. habent omnes sinus geminos, c. 6. p. Vide exem- plum in appen- dice lib. de par- tu Casareo. Sylvius etiam in puella ute- rum veluti bi- cornem ut in multiparis ob- servavit: sed id uteri brevi- tari testium & spermaticorum

vasorum distantia longiori adscribit. An hoc voluit Julius Obsequens dum memorat, in muliere olim Romæ duplicem uterum inventum fuisse.

q Uterus semen genitale respicit si humidus sit. Arist. 7. hist. 2. ex Hipp. de his quæ utero non gerunt. 1. 5. aph. 51. f De his quæ utero non gerunt: vocat etiam ^{στυγχοι}, superfætant mulieres, in quibus stomachus post primum conce- ptum non ita clauditur. Lib. de superfer. sæpissime hac voce utitur. 1. Os uteri aut fundi ipsius, Vesal. os matricis, Co- lumbo. Hippoc. ^{ἐμφίδον} ut Gal. in exog. explicat, summa uteri osculi extremitas rotunda labrum cucurbitula similis. Idem λέγει apud Hipp. exponens extremitatem uteri osculi oram, adscribens ex translatione à vestimentorum oris & sim- bris, dici. u τὸ ἐν τῷ στυγχοι, τὸ αὐχένος. 14. us. part. 3. de hoc egit de dissect. ut. 7.

ternum orificium nominavit: per hoc enim fundus recta in cervicem dehiscit: hoc transversum est, oblongum forma os catelli * in iis quæ utero gestantur aut tincta, vel lucii piscis, quando uterus siccus est, foramen penis glandi insculptum referens & mensibus * fluentibus molle ac ovale est, ita ut totum orificium cum rimâ transversa, quasi literam Θ referat: parvum & angustissimum, ne vel semen semel conceptum facile effluat, neve quid noxii uteri cavitatem subeat: recta fundum respicit, quo semen virile recta ad orificium hoc per cervicem ejaculetur, & ab utero facile attrahatur. Si enim vel aversum vel transmutatum sit, multa mala facere Hippocrates docuit: y tum enim uterus semen non concipit, sed z confestim foras effluit. Sic & menses nullo modo, vel non nisi violenter & cum morbo prodeunt. Semper connivet, eo excepto tempore, quo uterus in coitu semen virile in uteri fundum attrahit, eoque concepto, ita exquisitè a clauditur, ut vix acum b vel specilli aciem admittat, & quidem c novem mensibus adeo exacte clauditur (non enim cum gravidæ semen effundunt, ex uteri fundo id deferitur, sed ex cervice, uti dictum fuit cap. 36. rarum etiam est referari, ut parvi conceptus salvo fœtu ejiciantur. At in superfœtatione recludi necesse est; sic quando uterus non concepturus, utriusque parentis semen iterum eruat: aut cum in pollutione, aut affricione in non gravidis semen excernit, aut quando menses in non gravidis, humoresque vitiosi repurgantur, ut in muliebri d profluvio, ubi sæpe universum corpus, utero non affecto, expurgatur, vel vitiosi conceptus ejiciuntur: vel denique ubi fœtus excluditur; eo enim perfecto usque adeo distenditur, & pater, ut à fundo uteri ad pudendum usque, una prope æqualis sit cavitas, quo per ipsum fœtus egredi possit, quod mirari e possumus, intelligere non possumus: quare sapientiam & potentiam Conditoris & Protoplastes nostri, vel hic maxime agnoscere, admirari & deprædicare debemus: quando ad magnitudinem infantis referari necesse est, quod sensum dilatatur, cum crassiore & densiore [r. 28. fig. 4. ad G.] sit substantia, quæ ante partum crassior redditur, eique viscidum quoddam corpus, glutino fere simile, connascitur, quo in partu commodius & citra lacerationem vel divulsionem distendi, & naturaliter aperiri possit: hoc coronæ f modo rotundum sit, & quoties dehiscit, orbiculare redditur. Orificium hoc si nimia humiditate, ut flore uteri, vel nimio coitu, ut in meretricibus, nimium laxetur, vel plus æquo g apertum sit, sterilitatem causat: quemadmodum etiam si præpingue & crassum: sic si callosum reddatur, obstruitur: nonnunquam cancri (in hac enim uteri parte, eum carnosior sit potissimum cancer nascitur) & scirrhii incurabiles, maxime menstruis deficientibus superveniunt.

Quo vero semen exceptum facilius retineretur, intra canalem cervicis inferiori ejus parti tuberculum oblongum additum, quod foramen exquisitius occludit: & in mulieribus similem usum præstat, atque in viris caruncula extremitatibus vasorum ejaculantium apposita.

De

* Corpus, Columb. Laur.
* fieri potest ut longior penis, dum orificium cervicis uteri apertum est, fluentibus menstruis in id ostium introdu-
tus & apprehensus aliquantulum retineatur & constringatur, ut in canibus simul junctis accidit. Riol.
y 1. morb. mulier. & de his, quæ in utero.
z Hipp. de his, quæ in utero: aliquando rō sō pōt nūc asq̃t q̃en, & in co-
xendicem prolabitur, tum digito immisso a coxa avellendum Hipp. 1. mulieb.
a Hipp. 5. aph. 51. Quæ utero gerunt, iis uteri os comprimitur & Gal. in com. si os uteri claudatur conceptio nis indicium.
b Gal. 14. us. part. 3. 15. ejus. 7. diff. ut. 7.
c Gal. 6. loc. aff. 6.
d Gal. 6. loc. aff. 5. e Cum Gal. 15. us. part. 7. arcana quadam ratione uteri ostium aperitur, ait Ætius tot. 4. ser. c. 3.
f Obstetrices Galla, coronam: Germanæ, rosam vocant. g Hipp. 1. morb. mulieb. 5. aph. 46. lib. de aere aquis & locis.
h in muliere nobili 55. annorum, matricem exiguam durissimam ac ferme cartilagineam, quæ tres liberos tantum susceperat, intra canalem vere cervicis glandulam inveni inferne positam, tanquam pessulum ostio obditum: hac Riol.

De cervice uteri & hymene.

CAPUT XXXIX.

Tertia pars uteri ^a cervix est [tab. 28 fig. 2. & 3. d. fig. 4. KK. fig. 1. cervix sursum evasa BB.] in quam penis immittitur, quam Galenus communiter ^b αἰχλὴν τῆς μήτρας, collum vocat, cui & στέμνος ^d dicitur. At Aristoteli ^e μ-
τρα, μήτρας ἢ στέμνος τῆς ἐστέρας, matrix, cervix, & ostium uteri: Latinis, cervix seu collum
uteri, & canalis, quibusdam vagina penis, meatus est intra peritonæi cavitatem, pel-
vim dictam inter rectum intestinum & vesicam situs, fundi superficie magis candi-
cans: cavitatem habens profundam & latam (unde Fallopius ^f maluit sinum pu-
doris appellare) os vero multo angustius, quia ab interno seu fundi orificio [t. 26 f. 4. G.] ad os externum seu pudendum [t. 28 f. 4. o.] fertur & cum oblongus sit, que
semen viri ad uteri os ^g perveniat, vaginæ instar virile membrum [†] cui respondet, re-
cipit, quare amplitudinem convenientem habet, latitudine vix rectum intesti-
num excedens; qui in coitu, pro ratione penis nunc brevior, nunc longior,
nunc latior, nunc angustior fit, & pro mulieris libidine turgidior, angustior
fit, & directior redditur, quare ipsius longitudo, ^k non minus difficulter,
quam penis, describi potest, & licet cum fundo continuetur, diversam tamen
substantiam obtinere videtur: membranofus enim ⁱ est, & nervosus, ut dilatari &
contrahi possit, in mollitie ^k & duritie mediocriter se habens: substantia ^l nonni-
hil fungosa, & spongiformis, instar penis virilis. Utenim penem augeri opus fuit,
quo canalem hunc impleat, ita quoque conveniebat hunc in coitu ita arctari posse,
ut penem strictius comprehenderet, quod ab arteriosis variis, quæ spiritu canalem
replent accidit, sicque minor redditur: quare in libidine turgentibus extuberat, ca-

^a Cervix, Vesal
cervix seu col-
lum, Columb.

^b αἰχλὴν τῆς μήτρας, & Plac. anterii

^c μ- muliebres, Va-

^d στέμνος, dicitur, At Fallo-

^e π- pius (quem Pi-

^f αἰχλὴν τῆς μήτρας, ait in utero cer-

^g vice Anatomis-

^h coscere omnes

ⁱ aliquantisper

^j lapsos videri,

^k veram cervi-

^l cem ignorantes

^m dum totum

ⁿ meatum, cui

^o penis inditur,

^p cervicem vo-

^q cant. Verum

^r Galeni loca pla-

^s ra, præsertim

^t duo, quæ subji-

^u ciemus, contra-

^v rium ostendunt.

^w b τὸν ἐστέμνον αἰ-

^x χλὴν τῆς μήτρας

^y c H

R

run-

αἰχλὴν αἰδίου πλεονεξία. 14. us. part. 3. στέμνος ὁ καλὸς αἰχλὴν ὅν ἐστὶ τὸ γυναικείον αἰδίου κατὰ τὴν 14. us. part. II. c H
μὴν στέμνον τὸ γυναικείον αἰδίου ὅν ἐστὶ τὸ στέμνον 15. us. part. 3. αἰ μὴν δὲ εἶναι πρὸς τὴν τῆς μήτρας, 14. ejus-
dem 4. at 6. loc. aff. 5. modo τῆς μήτρας, modo αἰχλὴν, eodem capite nominat. d ὁ στέμνος in muliebres pudendum desinit.
14. us. part. 4. Sic & 14. ejus. 3. & 13. Sic Hipp. lib. 1. de morb. mulier.

e 3. bist. 1. ostium autem & cervix, matrix dicitur: at 1. bist. 14. ἐπὶ τῇ 14. us. part. 3. & 11. clare
τὸν γυναικείον αἰδίου γυναικείον dici. At Gal. fundi cavitatem καλῶς appellavit, ut ex 14. us. part. 3. & 11. clare
colligitur, sed decipit forte Fallopius locus Galeni, qui libro de diff. uter. 7. habetur: παραπρὸς δὲ αἰχλὴν ἑστὸς, εἰς τὸν
γυναικείον καλῶς ὀνομαζόμενον, &c. ubi loquitur de collo, quod in fundum uteri desinit, non autem in pudenda. Aran-
tium secutus Fallopius, muliebrem sinum, sive vaginam penis, negat inter partes uteri numerandam esse.

g Virile semen omnium opinione recta in uteri corpus injici debet, ut fiat utriusque seminis occursum & conceptio: ve-
rum hac angustia docet potius, ut matricis semen attrahi quam virge industria injici. Pinus.

† quamvis nulla generatio fiat sine penis intromissione, Galeni iudicio omniumque Medicorum consensu, vidimus ta-
men Parisius mulierem quæ ex difficili partu, partes genitales laceratas habuerat, cuses nympha & quatuor caruncula
tam arde coaluerat, ut vix specilli cuspide foramen admitteret, nihilominus decimo quarto abhinc anno concepisse.

Intra pudendi labra effusum semen uteris huius pabuli avidissimus attraxit, quemadmodum & profundis cuniculis
cervicis serpentes varium in spiratu allicit. Cum instaret partus introducto speculo matricis foramen dilatatum fuit in

eam amplitudinem, quæ ad egressum foetus necessaria erat, sicque foetum perfectum emisit mulier incolumis & super-
stes. Rioli. h Alii undecim alii duodecim digitorum dicunt: quod ridiculum, Vesal. longitudo undecim digitorum,

Columb. i Rugosus & membranofus non cartilagineus, ut Herophilus voluit, Columb. rugosus ut bovis palatum,
Laur. rugosus & asper, Pineo. k Gal. 14. us. part. 3. l Substantia musculosa cervicis uteri carne dura & cartilagi-
nea confians, eujus naturam Herophilus gutturis summa parti comparat. Gal. diff. ut. 7. & 14. us. part. 7.

m Gal. 14. us.
part. 3.

n Fernel. ex A-
vicen. 21. ter-
tiii cap. 1. &
Rhasis 1. ad Al-
man. 6.
o Gal. de anat.
vivor. in pri-
ma defloratio-
ne dilatur
collum matri-
cis. & rumpun-
tur quadam ve-
na subtile, qua
sunt in dextra
parte ipsius colli, & exit sanguis. p Gal. diss. ut. 7. 14. us. part. 3. ex Herophili sententia.

q HYMENEM poete, Zonam castitatis vel Zonam virginem Catullus vocat: & in primo concubitu sanguinem profuere, virginis atque signum esse ex Dent. 22. & ab omnibus recepta opinio constat: sed ob quam causam fiat inter authores non convenit.

I. Opinio est Arabum, qui ex v. nulis panniculum contexi volunt: nam Avicenna 21. tertii c. 1. inquit in ore matricis sunt panniculi contexti ex venis & ligamentis subtilibus ortus ex membro quod destruit violator & currit quod in eis ex sanguine est. At Nicolaus dicit prope os: Mundino velamen hoc virginale est in superficie oris matricis. Rhasis 6. ad Almanf. sunt vena quinque quae panniculum constituunt, quem Arabum interpretes, centonem vocant. Averro 1. col. ult. orificium vulvae virginis est crispum & ex crispitudine illa oriuntur vena multa habentes pectusculam u- nam contextam duabus texturis, quarum una tendit in longitudinem & minor est, alia in latitudinem. Carpo, vena orta ab adjacentibus particulis panniculum virginalem facit, qui rarus est instar retis, nam per eum virginibus menstrua penetrant: sunt tamen subdola mulieres, quae cum stipticis sibi collum matricis corrugant, dein aliqua via obliqua sanguinem emittere fingunt.

II. Esse angustiam solum loci: Sorano membrana non est, sed sinus muliebris angustia, facta ex quibusdam rugis collectis, quae a vasis ex utero illuc prodeuntibus contrahuntur, cumque in coitu ha rugae extenduntur & vasa dirumpuntur, dolorem & sanguinis effusionem, veluti si victima esset mactata causare. Fernel. l. 1. c. 7. uterique cervicem medio circiter progressu plerique tradunt in virginibus exili membranam dirimi venulis conspersa, quae primo concubitu prota connivere, quae primus concubitus magna ex parte devellit.

III. Opinio, dari membranam, quam alii crassam, alii tenuem, eamque alii cribri modo, alii in initio solum transversam perforatam, alii in extremitate, alii in colli medio: alii aliquando dari, aliquando non item scribunt. Vesal. 15. c.

runculae prominent (quod in vaccis & canibus ita apparet, ut eorum pudenda magnis inflammationibus laborare videantur) cavitas arctatur: in Juvenclis delicatior & mollior est, & indies durior fit: ita ut quae saepius concepere, vel vetulae sunt durum, callosum, & quasi cartilagineum ob crebrum attritum, & assiduum mensium fluxum, rugis oblitteratis, habeant, quare Herophilus asperae arteriae assimilavit. Haec ubi non distenditur, instar palati bovis rugosa est: si admodum diducatur, laevis & lubrica, praeterquam ea parte, quae in pudendum terminatur. At in canalis ingressu, & parte anteriore, rugae sunt complures orbiculares, ad maiorem amantium voluptatem, quae extirillatione ab attritu oritur, dum glandis circularis prominentia ad dictas rugas, in mutuo complexu & naturali, non qui pecudum more sit, concubitu affricatur. Haec rugae in juvenclis laeviores & arctiores, canalisque angustior, ut digitum indicem vix admittat: non enim canalis cervicisve latera connivent, sed cavitas medio-cris inest, per quam non tantum sanguis menstruus in virginibus grandioribus expurgatur, sed humores alii vitiosi in fluore albo, quas etiam in puellulis (ab Aristotele admoniti) quatuor & quinque annorum expurgari vidimus. Harum rugarum attritu & extensione, voluit Soranus in venerem nondum expertis dolorem causari, & cum per eas venae ferantur, iis disruptis, sanguinem veluti si mactata esset victima, emanare. Verum cervix, quando nec semen intro fertur, nec foetus excluditur, contorta atque obliqua est: Nam laxata in seipsam concidens, rugas nonnullas & contorsiones habeat necesse est, quo partes in utero contentas a refrigeratione tueatur, quare tum angustior & brevior existit; at in coitu, ad penis, in partu, ad foetus formationem diducitur; est menstruus fluentibus, maxime vero parturientibus, cum cervix recta fiat atque aperta, & admodum distendatur, mulieres maxime refrigerantur.

Hymen seu eugion dictum in cervicis hujus sine, immediate supra collum [tab. 28.]

15. c. 15. à tergo colli vesicae insertionis, paulum interius in cervice uteri carnem occurrit in virginibus membrana, transversim posita & longa sectione instar rime pervia, ne mensum purgatio impediatur, quae citra dissectionem in puellulis, diuictis illarum cruribus, persape visitur. Fallop. in obs. revera in virginibus membrana quadam nervea, non autem carnea, quae sinum pertransversum claudit, in medio perforata, ut in adultis minimi digiti apex ingredi possit: hoc virginal claustrum est. Idem Piccolhom. qui membranam exilibus venis confersam scribit. Joubert. l. 5. c. 4. pellicula gemina, canali urinae subiecta, quae humore viscido veluti glutine molliter copulatur. Wiero l. 2. praef. c. 37. Zona virginitatis omnes virgines ab initio ditata. Platero, orificium exterius uteri in virginibus membrana ex parte oclusum est, quae foraminis huius amplitudinem, ante congressum inutilem, nonnihil occludit & simul pudendi latera, ligamenti linguae & preputii instar, colligat. Pareus, in virgine 17. annorum vidit. Columbus, sub nymphis, inquit, in nonnullis virginibus non omnibus alba membrana cernitur, quae cum adest, raro autem adest, obest quominus penis in uterum immittatur, nam crassa est valde: hunc Piccolhom. reprehendit.

IV. Opinio membranam non dari: Oribasio 2. 4. coll. puta tenuem membranam esse, quae sinum pudoris intercipiat falsum est. Laurentius, segmenta sunt quae de transversa illa membrana & perforata multi scripserunt, nam quis foret illius usus: quod si sala reperiatur, quod non nego, prater naturam institutum esse puto, & morbum esse organicum in vitiosa conformatione.

V. Opinio. Pinei & Laurentii, qui pro Hymene habent carunculas illas quatuor myrtiliformes in longum sitas, membranarum tenuissimarum interiectu ita unitas, ut violento concubitu & carunculis attritis & membranulis laceratis sanguis effluat: quem caruncularum coitum florem virgineum Pineus vocat, quod caryophyllo flori nondum plane explicato persimilis sit. Sed monet Vesalius, intellexisse se ab obstetricibus, quibusdam puellulis membranulam hanc velut frustra datam, statim effringere ut lingua vinculum. Addunt alii, nonnunquam virgunculas ex petularia eam rumpere: quod si aliquando adest, prater naturam abesse. Sic de notis virginum consule, Severini Pinei in eam rem opusculum & Horatium Augenum epist. & consule. tom. 2. lib. 1. & cap. 1. ad 8.

1. Perustiss. comicus Navius hoc nomine usus est, sine Eugio puellam invenit, vitiatam subindicans: Lucilius in epist. & hymnis, eugium & hymenem simul conjungit: quo loco Nonius, eugium pro media parte inter naturalia muliebrina accipit.

[tab. 28. fig. 2. m. fig. 3. e. fig. 4. L.] vesicae in virginibus collocant [tab. 28. fig. 4. ad n.] quod multi voluerunt membranam esse tenuem, nerveam, non admodum crassam, per Fallopio & transversum sitam, quae sinum claudat, in medio tamen annuli instar perforatam, ita Piccolhom. tenuis Vesal. ut minimi digiti apicem in adultis facile admittat, quo menses effluere possint, venis Vesal. carnea: Colum. crassa valde. nulis confersam, quae primo concubitu disrumpatur, unde & dolor & sanguinis profusio (qui sanguinem florem virginitatis vocant) causetur, & tandem veluti in viris dum glandis frenum laceratur, evanescere: hanc etiam simul pudendi labra colligare, cum huius foraminis amplitudo ante congressum inutilis sit, qualis mihi in duabus dum Patavii viverem, ostensa fuit, ut in lib. secundo universalis nostrae Anatomies cap. 25. in quo de membranis totius corporis egimus & in nostrarum institutionum Anatomiarum editione secunda, tertia, quarta & quinta monuimus. Sed veram hymenis historiam, prout fuisse Severinus Pinæus regius chirurgus exhibuit, paucis subjiciemus. In medio fossa, quae in magna rima est, orificium sinus pudoris virginum semper absconditum manet, quod non in extremitate sinus, sed in extremitate productionis, quae sinui appensa est, locatur. Haec productio virginibus propria, longitudinem medii transversi minimi digiti aequat, quae superne circularis quaedam cavitatis incigit: figura est rotunda, in acumen definit, & in ejus extremo foramen unum, satis insignis, ut minimi digiti apicem admittat. Substantia est partim carnosa, partim membranosa, cum ex carunculis & membranis componatur: Carunculae quatuor myrthi baccas referunt, quae singulae in quolibet sinus pudoris angulo, quasi in quatuor angulis sitae sunt, quae in virginibus rubicundae sunt & inflatae & in corruptis attritae flaccescunt.

& fibris quibus inter se colligantur, disruptis ab invicem abscedunt. Harum caruncularum superior, cæteris major bifida est, ut intra se foramen Vrethrae admittat & occludat: inferior versus interiora, fossam habet & instar aggeris opposita est, ne semen injectum confestim egrediatur: aliæ duæ carunculæ laterales, minores sunt has membranæ carnosæ connectunt (Hymen quibusdam) quæ non transversum locatæ, sed omnes recte ab inferno sine sinus pudoris deorsum tendunt, & singulæ in singularum caruncularum interstitiis locantur, cum quibus æqualiter fere portantur. Verum hæ & carunculæ & membranæ, in aliis breviores vel longiores, crassiores vel tenuiores, quam in aliis existunt: quemadmodum & orificium in ejus extremo, in aliis latius, in aliis angustius, & tum maxime parum patet, quando carunculæ & membranæ carnosæ parum à se invicem distatæ sunt: unde major aut minor in primo concubitu (quam coitionem acerrimam Terentius dixit) difficultas. Hæc autem simul formam calycis parvæ rosæ semi expansæ, cui foliola barbata capulam constituentia sublata sunt, referunt: Vele etiam productio hæc cum pudendis, Betonica garyophyllatæ majoris flori expanso, assimilari potest. Hanc productionem, Galenus¹ membranam præputio similem videtur appellasse, cum sit producta, & in extremo perforata, quæ tamen præputio paulo carnosior & mollior est. Vocant hymen, quasi limen, columnam, & claustrum virginale: florem virgineum: siquidem integer virginitatis notam illam solus² significet. Quando enim penis sinum subierit, tunc membranæ carnosæ inter carunculas positæ, penitus ad sui radicem usque lacerantur, carunculæ ita atteruntur & diducuntur, ut aliquando conjunctam fuisse neges: vasa insignia aperiuntur, & dum lacerantur, dolor fit, qui in juvenulis major est, propter partium siccitatem, minor tamen sanguinis propter vasorum exiguitatem profusio: in grandioribus vero, & quibus menses jam fluere cœperunt, minor dolor propter hymenis humiditatem & laxitatem, major tamen sanguinis, cum ampliora vasa sint, effusio fit. Omnes enim virgines, quamvis ætatem nubilem attigerint, primos congressus habent difficiles, & dolores aliæ aliis majores patiuntur, nisi tunc menstruis laborent, vel tribus, quatuorve diebus ante fluxerint; tum enim facile & sine molestia penem intromittunt, ob partium humidarum relaxationem & lubricitatem, quare & nullo fere dolore membranæ dilatantur: quam ob causam nonnulli suarum nuptiarum, alias castissimarum puellarum virginitatem, suspectant habere. Quare vel matres, vel mulieres, quæ honoris & famæ sponсарum curam habent, videant, ut sponfos, de sponсарum purgationibus, si patiantur, præmoneant: patiuntur autem sæpius, dum nubunt virgines viro maturæ, bene habitæ, singulis mensibus expurgari solitæ, quia tunc plurimum lætantur, corpusque magis saltando movent, hinc ipsis menses accelerantur, diutiusque fluunt.

Productionis hujus membranæ laceræ, in extremo ambitu serratæ, seu dēratæ ali- quādo utrinque in laterib. juxtarimam, valvarum instar (unde valvæ Pinæo)³ propen- dent, quæ Nymphis, cum quibus⁴ figura & usu conveniunt, multo minores sunt, quæ non deperduntur, sed quamdiu mulier nondum peperit, sursum ad cervicis col- live orificium multo latius factum, reflexæ, reservantur: in his vero, quæ sæpius, & quidem magnos infantes peperere, aut quibus uterus prolabitur, & cervix invertitur, cum semper imminuantur, cervicem versus sursum reductæ contrahuntur, & cum carunculis quibus adherent, ita perfecte uniuntur, ut omnino deletæ videantur.

Carun-

x diff. ut. 2. pu-
dendum (ait)
muliebres ex-
trinsecus polli-
culam quan-
dam innatam
habet, vivorum
præputio corre-
spondentem.
u Virginitatis
signum dicunt,
Asylum ab ex-
tremo naso per
mediam fron-
tem ducatur
ad sagittalis fi-
nem: & hoc
collum ejusdem
puella in se com-
prehendere pos-
sit, Pinæo.

x Ex Jouberto
lib. 5. de errori-
bus popul. ca. 4.
y Ex his aliqui
et nymphas
constituere vo-
lunt, sed ex ma-
le intellectu Ga-
leno in intro-
duct.

Carunculæ vero quatuor^a myrti baccas referentes, ad interitum usque servan-
tur, cum in mulieribus etiam senio confectis conspiciantur, sed in iis quæ nunquam
utero gestarunt, magis integræ remanent: quarum usus, quemadmodum & mem-
branarum, cum sursum reflectuntur, proxime & immediate orificium cervicis (ve-
luti carnea productio collum vesicæ) obturare, & ingressum aeris frigidioris, pul-
veris, aut corpusculi alicujus impedire (quod & Nymphæ & labra pudendi adja-
vant) & in congressu, maris pudendum titillare: his enim calefactis & spiritu tur-
gentibus, penis ita constringuntur potissimum in juvenculis, ac si manu undique
obductus comprimeretur.

Rima altera rugosa inde occurrit, quæ tanquam in fossa seu pronao magnæ rimæ
sedem habet, & tanquam vallis angusta in circulari cavita aditum ad interiora præ-
bet, & orificium cervicis constituit, quod Galeno^b *τὸν τεύχος*, & orificium exter-
num cervicis seu colli etiam nominant: per quod virile membrum recipitur, ut mu-
lietis partes ad seminis effusionem excitet, & suum in id effundat. Quod orificium
aliquando supervenientibus Rhagadibus, vel magna cicatrice per morbum, angustius
redditur, ita ut maritos amplius admittere non possint: nonnunquam etiam ob exul-
cerationem post partum penitus coalescit, quod semel in nobili matrona notavimus,
in qua ne vestigium quidem foraminis vel rimæ apparuit, eo modo quo præter na-
turam in imperforatis puellis quæ *ἀπέρται* dicuntur, observatum aliquoties fuit, quas
sic concreto genitali in fausto omine gigni Cornelia Grachorum^c mater indicio fuit:
quem morbum Hipp.^d notavit, ubi monet conceptam propter membranam osculi
uteri præpositum impediri. Sed quæ cum toto anno^e, ipsa malum celante à men-
struis non fuisset purgata, variis histericis convulsivis affectibus conflictata, tandem
opem nostram & aliorum imploraret, rem detexit: quare loco inspecto, ubi os pu-
dendi membrana valide obfirmatum deprehendimus, ut rasorio membrana hæc dis-
secaretur consulimus: at ipsa reculante, & cauterii potentialis applicationem expe-
tente, illud sed frustra impositum, antequam enim eschara matura esset, vita functa
est, & totus uterus sanguine grumoso plenus repertus. Alteram sub cura habuimus,
cui post primum partum, ob insignem exulcerationem neglectam, jam gangræna
acceperat, Dei beneficio conservavimus, sed tanta phymosi relicta, ut recte quidem
restituta fuerit, sed ob angustius foramen virum admittere non potest.

Ligamentum hic cutaneum, in parte postica orificii exterioris ipsius cervicis
observandum, quod in virginibus constrictius est; & ab eadem fossa contegitur:
in iis vero, quæ pepererunt, multo laxius existit, ita ut hæc ligamenti seu cutis li-
gamentosa laxitas, cum semper factis, iisque solis adsit (nisi uterus prolabatur
in aliis)
R 3

vel potius mole sua magnis amygdalis similes apparent, Rioli. b Nympha tegit τὸν πυλῶνα τοῦ ὕδατος τῆς μήτρας
xix. 15. ut part. 3. c phymosis est compactio ora aut collo uteri ab ulcere precedente orta, Aetius l. 16. cap. 97. Egin-
l. 6. c. 72. meminit & Celsus l. 7. c. 28.
d Aetiol. 16. c. 98. ar Avicenna l. 3. fen. 21. tr. 4. c. 1. membranulas ejusmodi circa pudendi osculum quandoque adnasci
asserit, vitium illi clausuram nuncupans: quod Albucasis l. 2. c. 72. altricam appellat. e Plin. lib. 7. cap. 16.
f lib. de steril. & morb. mul. Benivenius de abdit. cap. 28. Viresus libr. 2. de prestig. cap. 38. Arist. 4. gen. an. 4. inter
conceptionis impedimenta & monstrorum naturarum procreationem morbum hunc connumerat his verbis. Jam
fœminis nonnullis os uteri compressum, concorporatumque ab ineunte ætate ad tempus usque menstruum persevera-
vit: mox urgentibus mensibus, doloreque infestante, aliis sponte disruptum est, aliis dissectum à medicis: nonnulla in-
serierunt, cum aut per vim disrumpere, aut dirumpi non posset.

in aliis) foeturæ signum unicum sit: nonnunquam tamen & rugositas cutis infimæ ventris accedit.

De pudendo muliebri, nymphis, clitoride, & labiis.

CAPUT XL.

^a Vide 14. us.
part. 6. II. 14.
15. ejusd. 3. ejusd.
Hipp. de
superf. 1. de
morb. mul. Gal.
diff. ut. 1. & 2.
At Aristot.
γυναικες αιδειον
uterum nomi-
nat.
^b Forte à cuneo
aut impressione
effingere solet,
Pinax.
c lib. 14. us. par.
6.

Ultima uteri pars dissimilari, Galeno ^a αιδειον γυναικειον, pudendum muliebre [t. 28. f. 2. l. fig. 4. circa n. 6.] dicitur: quibusdam Vulva, quasi vallis seu valva, cum per rimam amplissimam in duas partes dividatur, quæ ut valvæ, quando opus est, facile aperiantur & claudantur: dicitur & muliebre genitale, os genitale, os cervicis uteri & cunnus. ^b Est autem pars ea, in quam cervix seu canalis definit, quæ extrinsecus anteriori ossium pubis regioni innititur, & veluti cutacea quædam colli (ut Galenus ^c loquitur) epiphysis, sive additio, masculorum præputio respondens: ubi partes plurimæ ac diversæ etiam citra dissectionem conspiciuntur. Harum enim, hæ plane externæ sunt, quæ absque labiorum diductione se offerunt: aliæ internæ, quæ non nisi facta labiorum digitis, in utrumque latus separatione, patent: de his primo.

Fossa est ampla, in qua sunt foramen cervicis vesicæ [tab. 28. f. 2. m. f. 3. e. f. 4. l.] cum caruncula Nymphis & Clitoride: licet enim Hymen, ipsiusque membranæ ac carunculæ, cum rima & orificio cervicis, absque dissectione etiam conspici possint, tamen cum non ad pudendum, sed ad cervicem referenda sint, ea jam explicavimus.

Foramen, ad cervicis uteri finem immediate sub pubis osse, fere supra pudendum, parte anteriore est, quod ex vesicæ urinariæ colli implantatione prodit, per quod urina in extremam cervicis uteri partem, vel si mavis, in pudendum effunditur: quemadmodum in masculo, per canalem semini dicatur, urina quoque promanat: in hujus ambitu caruncula est [t. 28. f. 4. p.] seu monticulus carnosus, à quo foramen hoc tegitur, ne post redditam urinam, aer externus vesicam per ipsius collium breve & latum subeat, quæ caruncula etiam, qua fossam spectat, claustrum virginale roborat.

^d Vesaliolaxi
implexus, cuti-
cularis carun-
cula, quæ vru-
phi, μύστρον
δισκός, & αλίσ-
ς Græcis.
^e 15. us. part. 3.
^f Sorano, Fal-
lopio.
^g Alii distin-
guunt Nym-
phas & alas.
^{*} an juvenalis
hanc partem
cristam intellexit, dum inquit, Callidus & crista digitos impressit Aliptes Ad summum Domina femur: exclamans
coegit.

Nymphæ ^d νύμφαι, Galeno, quia hæ ^e primæ sponsum admittant: vel ab officio quod aquis præsent, ut infra dicitur: ^e aliis αλεγομενός τε ην αλεπύριον, ^f alæ & Latinis, nonnullis carunculæ cuticulares dicuntur: productiones duæ sunt, utrinque una in principio fere junctæ, quæ ex limbo ligamentoso cutis in posteriore parte orificii cervicis incipiunt, & inter utrumque labrum delitescunt & ubique fere sese tangentes ad ossium pubis commissuræ finem ascendunt, quæ junctæ eminentiam carneam producant, & ipsum Clitoridem instar præputii integentes uniuntur, & ad magnæ rimæ apicem, prominente linea ascendunt, & ab earum medio, quandoque produ- ciores per magnam rimam extra labra pudendi aliquantum propendent, & quidem angulo obtusiore, cum figura sint veluti triangulari: figura & colore cristam galli, quam sub gutture habet, referentes: substantia partim carnosæ, partim membra- nosa.

cristam intellexit, dum inquit, Callidus & crista digitos impressit Aliptes Ad summum Domina femur: exclamans coegit.

rosa molli, fungosa, tunica tenui tectæ, † quæ pro ratione ætatis variant, magnitudine & crassitie inæquales sunt: in virginibus enim tenues nec admodum latæ: in mulieribus & in iis quæ nunquam utero gestarunt breviores, crassiores & latiores sunt: & nunquam ultra labiorum dimidiam partem naturaliter descendunt. Aliquando tamen uno in latere, rarius in utroque, & rarius in virginibus, quam mulieribus in tantam longitudinem, vel ob humorum affluxum, vel ob attractionem, quæ digitis fit, excrescunt: ut propter impedimentum & dedecus (cum multis nationibus insignis impudicitie argumento sint) quod adferunt, excisione sit opus (quæ tamen satis cruenta, & cicatricem difficulter suscipit) præsertim apud Ægyptios, quibus, Galeno^h referente, hic affectus familiaris est; quare virginibus proxime nupturis, antequam longius propendeant, amputare solent. Hæ præter magnam delectationem, quam feminis in coitu pariunt; etiam uterum ab externis tuentur, dum cervicis orificio inserviunt, quemadmodum præputium peni virorum: nam hæ non solum labiorum instar rimam melius occludunt, sed etiam, ne aer frigidior, aut quid noxii cervicem uteri aut vesicæ ingrediatur, cum utrumque orificium immediate muniant, prohibent. Sic & urinam tanquam inter duos parietes è rimæ fundo acceptam, tanquam è tubulo in oblongum spacium effusam, deducant, & ne in cervicis cavitatem destillet, dirigant: unde late & cum sibilo, absque labiorum pudendi irrigatione, foras effunditur. Quare nymphae dicuntur, cum meatui urinario & orificio cervicis uteri, è quibus tanquam è fontibus, quibus Nymphae præsent aquæ & humores prosiliunt, adstent, & quia in ipsis venerorum delicia, propterea Poetæ Nymphae per saltus & nemora Satyros, qui astuabant quærere referunt. In virginibus videntur ligamenti officium præstare & pudendi externi partem inferiorem circumrem velut constringere, quemadmodum musculus ipsius labra. In Nympharum apice, clitoris est.

Clitoris. Græcis κλειτορίς^k ab obsceno verbo κλειτορίς^k; quod est lascive, vel i hac particula lascivius contrectata, semen effundere^l proprie virga, vel penis muliebri: dicitur Avicennæ^m Albathara, id est, virga: Albucasi, tentigo: processus est parvus, in superiore, anteriore [t. 28. f. 4. m.] & media pubis parte pinguiore, in rimæ majoris apice, ubi nymphae conveniunt virili membro respondens, situ, substantia, compositione, spirituum repletionem & erectionem: differens vero ab eo longitudine & canali^o communi. Constat enim ex tribus corporibus, quorum duo lateralia (quæ ligamenta^p quibusdam) ab ossis ischii tubere interno enata, initio distincto, sed quæ aliquantulum progressa uniantur & corpus Clitoridis constituunt, satis durum & solidum, quod in extremum glandi simile desinit. Hæc nerosa, rotunda, dura & crassa, intus nigricantia & spongiosa, ut spiritu influente extendi, eoque dissipato flaccescere possit, quare sanguine crassiore & spirituoso ut in viris referta sunt: tertium medium & candidum à supera parte conjunctionis ossium pubis enascitur.

Caput

μύρον^q appellatur. Soranus in epistola ad Cleopatram Landicam vocat. l Laberius, puellitari interpretatur. m Lib. 3. sen. 2. circa finem, Albucasi lib. 2. c. 71. & quos primus Fallopius sequutus est. n Parvo peni qualem cumniculi habent, respondet Plat. o Varolo caruncula veteribus nympha, præterquam foramine, magnitudine virili membro responder.

p Ligamenta dicit Laurentius: & Rioli ex duplici veluti nervo intus spongioso, Piccolbom.

† intra labra ex cutis reduplicatione, membranosa corpuscula alarum modo expansa consistunt, nymphas vocant. Rioli.

h In introduc. & Ægin. lib. 6. cap. 70. sunt qui non nymphas, sed clitoridem, Ægyptios excidisse velint & Jorvial. 3. hist. & Beilonio 3. obs. 28. referentibus, adhuc apud Abderitis seu Presbyteri Johannis gentem ex lege Hebraeorum observatur.

l Vesalius de Clitoride nihil habet. Columnbus sibi tribuit Fallopi. eleganter descripsit, qui Anatomicos penitus neglexisse ait. Idem habet Piccolbom. Laurentio, mentula muliebris & penis femineus. k Russo, vide & Pollucem quæ vñm qñ &

¶ Ut penis mus-
culos habet &
venas, Plat.
exiles musculos
quatuor, Laur.
¶ Rioli. unus
paris defectu à
virili differt,
Pinus.

¶ Juvenali sa-
lunt.

zyl. 6. clausit
adhuc ardens
rigida contigi-
ne vulva.

¶ in quadam
muliere collum

anferinum cras-
sitie & longitu-
dine aquasse,

vidit Plat. in
obs. minimi di-
giti longitudine

in nobili obser-
vavit Schenck

in qua si vene-
ris astro percita

augebatur, &
intēdebatur: at

Rioli. minimo
digito parem in

longitudine &
crassitie vidit

¶ Leo African.
lib. 3. peregr. de

fricantib. in
Afric. & Mar-
tialis in Triba-

dum historia.
l. 1. epig. 91. &
l. 7. ep. 66. Hoc

de duabus Tur-
cis Thessaloni-
ensib. Amatius

cent. 7. car. 18.
refert, & Ro-
deric. à castro

testatur se vi-
disse Uliſſipona

ob simile scelus
aliquos mulie-
res publice pu-

niri: Tribades dicuntur à Caelio Aureliano, fœmina inquit Tribades appellata, utramque venerem exercent, mulieri-
bus magis quam viris misceri festinant & eadem invidentia pene virili sectantur, subigatrices à Plaut. ¶ Hoc vult
Columb. negant Fallop. & Plat. ¶ Columb. præcipuam summam delectationis sedam se invenisse ait, quæ sit in binis liga-

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

mentis, quæ à lateribus matricis in hanc etiam partem desinant. u Gal. 14. us. part. 2.

Caput ipsius tentigo^r proprie dicitur, quod tenuissima cute ex nympharum conjun-
ctione veluti præputio regi videtur; foramen habet, non tamen pervium: vasa
quoque exilia per ejus dorsum, non secus ac per penem virilem feruntur. Hoc
quemadmodum penis 9 virilis, musculos quatuor exiles obtinuit, quorum duo su-
periores rotundi longioribus ligamentis insident & ex eodem loco enascuntur: alii
duo inferiores lati & carnosi ab ani sphinctere prodeuntes, pudendi labra perrep-
tantes ad Clitoridem ascendunt: hos eidem officio, quo virili peni inservire vo-

Hoc licet plerunque leviter tantum sub nymphis latitans producat, nec nisi fir-
miter digitis duobus indice & medio appressis percipiatur, nonnunquam tamen a-
deo excreſcit, † ut extra rimam, penis instar propendeat, præsertim cum vestibus ar-
tritum & confricatum turget, & virilis penis modo inflatur, eoque mulieres ad libi-
dinem irritatæ abutuntur, cum aliis mulieribus virorum instar, coeuntes (hinc con-
temptum virorum vocitant) & confricantes, † & mutuis coitibus incubis ac sicur-
bis se se polluant. Hujus usus, qui & frenuli in pene: cum enim testes plurimum à
pede distent ex Clitoridis motu & attritu cum ligamentis † inferioribus uteri, quæ
exortu suo vasa semen deferentia contingunt, inhæreat & alligetur, imaginandi fa-
cultas ad spermatica vasa, alte admodum latitantia delata, seminis motum & profu-
sionem in ipsis pro prolis susceptione excitat; ad quod magnitudo insignis non re-
quirebatur: quare licet, per foramen hoc semen non ejaculetur, per hujus tamen
frictionem mulieres titillatæ, ipsarum facultas imaginandi ad seminis profusionem
compellitur: eximium enim pruritus efficit, præsertim in iis, quæ raro venerem ex-
ercent, eandemque expetunt, in quibus blanda etiam hujus contrectatione, semen
effunditur: hinc æstrum Veneris, & Columbo dulcedo amoris dicitur, cum in hoc
delectationis mulierum præcipua † sedes, dum Venerem exercent, statuatur. Natu-
ra enim, quæ optasset, si fieri posset, suum † opificium (inquit Galenus) immortale,
omnibus animalibus & concipiendi instrumenta, & ipsis instrumentis eximiam
quandam voluptatis effectricem, tribuit, quo nullum animalis genus pereat, sed in-
colume semper sit & superstes: quod sane necessarium videtur, ut homines concitati
coitu, alioqui actione turpissima, ad generis conservationem oblectentur: quæ volu-
ptas à seminis contactu, ejusque calore moderato ac benigno, vias nerveas, ac maxi-
me sentientes tranſeunte, causatur.

Partes denique, quæ extrinsecus conspiciuntur, sunt, rima magna, labia & pubes:
Quamprimum enim pudendi labra à se invicem diducuntur, rimæ tres se offerunt:
una maxima, quæ prima est & exterior: duæ minores & collaterales inter Nym-
phas: quarum usus, ut partes melius claudantur. At rima, quæ † † †, seu fissura
major & oblonga, & Cunnus vulgo dicitur à labiis constituitur, & ab ossibus pubis
deorsum versus posteriora ad natium plicaturam ad anum tendit (cum foramine
longior esse debuerit, ne foetus exitum impediatur, cum cutis ipsis membranis crassior
sit) quæ, quo magis retrorsum vergit, tanto magis in latum & profundum augetur, &
tanquam

tanquam in fossam seu vallem cavam, & latam naviculæ figura (hinc fossa navicularis quibusdam dicitur) degenerat, & in limbo orificii cervicis terminatur; in cuius fossæ medio, orificium cervicis seu canalis locatum est, quod in virginibus, ut Soranus loquitur, tantum quantum orificium externum patet: at in iis quæ pepererunt, majus est: hæc rima est, quæ penem admittit, quæ pars visu obscena censetur, ita ut defunctorum etiam foeminarum cadavera, auctore Plinio, * contra quam virorum

prona fluitent; seu natura earum pudori pacent: quamvis causa quoque referri possit in mulieris ventrem ampliorem, & quia aqua per pudendum ingrediens, ventrem magis implet: & in pondus mammillarum, quæ eas pronas reddunt. Labia, quæ ^{negativa} Hippocrati, * genitalis mulieris ambitus, Celso, aliis vulva labia, duo succedunt, quæ rimam orificii externi constituunt: quæ oblonga sunt & molliora, substantia cutanea, carnosa, quodammodo glandulosa, spongiosa, cui duriuscula pinguedo substernitur, & quasi callosa, cute tenui contexta, quæ in mulieribus lavigatiora & depressiora existunt. His aliqui musculos duos adscribunt, à penis sphinctere enatos, qui tenues & lati rotam internam labiorum faciem investiant, quorum ope labia hæcce constringantur & in quibusdam moveantur. Sic labiorum cutis ligamentosa, frænum labiorum dicitur, & horum commissura in virginibus tensa, contracta, in corruptis laxa, in puerperis valde relaxata: quare ex hujus cutis laxitate, summaque depressione, scaturæ signum certissimum asserunt.

Horum extuberantiæ, colles seu monticuli dicuntur, in mulieribus magis depressi, & mons Veneris & in ambitu magnæ rimæ imprimuntur: qui in maturis pilis decorantur: Pars autem superior pilosa quibusdam & pilorum acervus, Pubes & Pecten, ^{alis} dicitur. Erumpunt vero pili ex cute, circa annum decimum quatum, in mulieribus quidem ob frequentem coitum crispi magis, quam in virginibus, & ad labra, quo rima melius lateat, pertingunt. Labra vero extiterunt, tum ornamentigratia, tum ne uterus refrigeretur, operimentum enim instar opponantur.

Quod si vero in demonstratione uteri à partibus externis ordini lubeat, beneficio specilli uterini progrediendum erit, & hoc ordine partes veniunt demonstranda: regio ossis pubis; pili in pube: monticuli, quibus pili infixi sunt: labia duo: rima maxima exterior, inter labia os exterius constituens: fossa naviculæ figura: rimæ duæ minores inter nymphas: nymphæ duæ: tentigo, quæ Clitoridis est caput à nymphis tanquam præputio tectum, ejusque foramen, sed non pervium: Clitoridis duo corpora, duoque muscoli: foramen cervicis vesicæ, cum monticulo carnoso: ligamentum cutaneum: rima rugosa os cervicis constituens; caruncula quatuor, membranaque quatuor in virginibus hymen constituentes: cervix seu canalis uteri: hæc omnia sine incisione, cætera per incisionem conspici & demonstrari possunt. Hæcenus de utero.

Qualis vero sit Hermaphroditorum seu Androgynorum constitutio peculiari libro ostendimus: in quo & ipsorum & monstrosum partuum naturam, ex Theologorum Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum & Rabinorum sententia proposuimus.

S

De vulnere à regione preciosa Joannis juxta urbem Babel melec, qui filiolarum vulnus consuevit.

* L. 7. c. 17. de Rhodig. l. 3. c. 10. causa, quod ob mammas & uterum in feminis, partes anteriores sunt. Addit Dalechamp. in Plinium: Sed & in maribus uteri loco pendenda sunt foris exposita, ac propendentia, quæ si id tantum spectamus, gravitatem corporis anterioris aque augent ac uterum in feminis. y Ala Vesalio. Nota, incolat Pegu puellis insantibus prudenda filo consueve ad usum naturæ duntaxat relicto exiguo foramine: postmodum sponsus membrum rescari suo arbitrio curat, nunquento seu oleo ad medellam vulnere infuso. Linscotus cap. 17. Idem refert Rodericus à Castro lib. 1. c. 3. adhuc in felici Arabia reperiri, non pro-

De utero ovis & canis.

CAPUT XLI.

Consuevimus in defectu cadaverum, Galenum imitati, juvenes privatis sectionibus in aliorum animalium dissectionibus exercere; quare singulis annis ovem prægnantem vivam propter motum fœtus, vasaque umbilicalia, & membranas fœtum involventes dissecare solemus; qualis ergo sit & ovis & canis uterus breviter perstringemus.

In ove ergo à pudendo cervix uteri ad sacri ossis summum pertingit, ubi uteri fundus incipit, in lumborum regione sese aliquantum expandens: qui corporis oblongi compressi speciem refert: mox in duos processus, sursum spectantes, abit, qui instar cornuum arietis [t. 29. f. 2. E.] extrorsum curvantur. Fundi superficies externa membranosis à peritonæo pronatis, vicinis partibus connectitur, per quæ etiam vasa ad uterum missa disseminantur. At fundi processus, qui invicem dividuntur, lateribus internis læves etiam sunt, multisque partibus connascuntur, sed externa latera ipsi fundo membranis continuantur. Fundus duas quoque [t. 29. f. 2. D.] cavitates obinet, quæ ad ejus orificium [t. 29. f. 2. C.] quod in ejus cervicem pertinet, coeunt: qui sinus subflavi sunt, plurimisque tuberculis donantur; quæ tubercula in utero, qui modo concipit, se aperiunt, & sinu efformant. Quod si unicum fœtum gerant, una tantum uteri cavitas dilatur: sin vero gemellos, tum in cavitate qualibet unus continetur. Duplici donatur membrana, externa [t. 29. f. 2. FF.] à peritonæo, à qua ligamenta procedunt, & quæ vasa ad uterum deducunt: interiore altera [t. 29. f. 2. G.] ac propria, quæ uterum cingit. Inter quas tunicas, magnus venarum & artiarum occurrit numerus, mirusque implexus, qui multo manifestior, quam in mulieribus, & si tunica divellantur, conspicitur, circa quæ corpora rotunda verticillos referentia, quæ Acetabula dicuntur, quæ in mulieribus [t. 28. fig. 4. circa B. & D.] exigua, & vasorum oscula sunt.

Testes ad uteri latera [t. 29. f. 2. A.] sub cornuum apicibus locantur. Vasa vero uterum testesque adeuntia, eadem fere sunt & ortu & ductu cum muliebribus, exceptis vasis semen in uteri cavitate deferentibus, quorum implantatio manifestior est, ita ut specillum facile admittant. Talis est & capræ & vaccæ uterus.

Canum vero uterus [t. 29. f. 1.] cervicem [t. 29. f. 1. L.] ad sacri ossis principium productam habet: at fundus statim^a in duas [t. 29. f. 1. F. G.] partes dividitur, quæ sensim in mucronem abeunt, & non in gyrum circumvolvuntur, sed recta producuntur, & cum multi fœtus in singulis partibus contineantur distinctim, partes istæ intestinorum modo implicantur & obliquantur. Desinunt autem hæ duæ [t. 29. f. 1. F. G.]

^a Mirabile, quod Gesnerus & alii scribunt in Paria pro- vincia haud procul à Paragonum regione

animal reperiri semivulpam à nostris dictum, cui natura duos concessit uteros, internum unum ad generandam prolem, sicuti reliquis animalibus: alterum externum subter communem illum, ad fovendos, defendendosque carulos suos, quos inde non nisi lactandi causa promittit.

R.F.G.] fundi partes in commune orificium [t. 29. f. 1. K.] quod in superiorem cervicis sedem pertinet. Tunicam duplicem habet, exteriorem à peritonæo [t. 29. f. 1. DD.] à qua processus obtinet: alteram interiorem. Testes [tab. 29. f. 1. C.] ad apicem duarum fundi partium collocantur. Vasa etiam, quemadmodum in ovino; quæ tamen tuberculis in suis Cavitatibus destituuntur.

De Ano, seu Podice.

CAPUT XLII.

De hoc 4. us. part. 19. 5. us. part. 14. & 15. at cap. 16. comparisonem inter vesicæ & ani sphincterem instituit: & administrandi modum 6. ad. anat. 14. & lib. de diff. musc. 30. proponit. Aristoteles 2. hist. an. 17. & 4. gen. anim. 4.

Podex *πεδός* a *πῶς*, *πῶς* Aristoteli, recti intestini finis, tribus ^c donatur muscu- a Arist. 3. par.
lis, quorum primus Ani constrictor [t. 15. f. 2. 3. d. & t. 34. f. 1. E.] seu Spincter ^d di- an. 4. quæ pars
citur: qui ab inferioribus vertebrae ossis sacri enatus, orbicularis (hinc *δευτήριος*, an- *κυστῶν* ἐστὶ τοῦ
nulus) & latus fibris transversis secundum intestini longitudinem, satis longo spacio *δὲ ἀπὸ μύσλων*
ejus fini circumfunditur, quod studiose notandum, propter exactionem, excrescen- *ἀλλ' ὅτι μύσλος*
centiarum & fistularum in ano, ita ut licet portio aliqua dissectur, non tamen ipsius *ἀλλ' ὅτι μύσλος*
ulcus ita facile tollitur. Hic elatiore sede crassior quam inferiore, ubi cuti ita con- *guedine est.*
nexus est, ut ab ipsa separari non possit, ut in palpebris & fronte quoque fit. Quare *b Arist. 2. hist.*
Galenus ^e duos fecit musculos, quia pars ejus superior crassior est: pars inferior, cu- *an. 17. Hipp. de*
ti inseparabiliter connexa, primum & inferiorem cuti commixtum, cuticulofum *carnibus, qui-*
musculum, vel carnosam cutim vocans: superiorem vero secundum & transversum, *busdam vides*
Connectitur ^f posterius ossi coccygis, quod ei subjicitur: antè fibrosos nexibus *sedes, ab ἑσπέρῳ*
vesicæ meatui, & peni [t. 15. f. 2. 3. d.] cujus musculis [t. 25. f. 1. H. I.] principium [t. *sedeo.*
25. f. 1. & 2. M.] exhibet, & uteri cervici: ad latera, ligamenti teretibus à sacro osse *c Fallop. qua-*
in coxendicis os productis, & sequentium musculorum insertionibus mire com- *tuor esse dicit*
miscetur. Hujus munus anum sua innata constrictione ad amissim constringere, *ani musculos,*
& involuntariam egestionem, ut turpissimum & sordidissimum incommodum prohi- *sphincterem in*
bere (quibus enim ex paralyti resolutus, aut quoquo ^g modo vitiatus fuerit, quem- *duos dividens:*
admodum & vesicæ, iis invitis faeces excidunt) at necessitate urgente & sphinctere *Laurent. nu-*
à pondere & excrementorum acrimonia lacerato, accedente voluntaria compres- *merum non po-*
sione, quæ ratione jubente musculis abdominis utrinque una cum diaphragmate *nit, & sphincte*
contractis, adjuvantibus thoracem coarctantibus, & spiritum continentibus mus- *res nominat.*
culis, ventrisque cavitate undiquaque angustata absolvitur, ano aperto & extrorsum *d Hippocrati,*
protruso, foras propelluntur. *ut habet Gal.*

Duo alii ^h ani levatores [t. 15. f. 2. 3. b. c. & t. 34. f. 1. B. C.] sub vesica latitantes non ^f Gal. 6. ad. an.
magni, ⁱ sed membranosi latique, & tenues, à ligamenti pubis, coxendicis & ossis ^{14. & diff. musc.}
sacri ab internis partibus exorti, deorsum delati ad sedis utramque partem produ- ^{30.}
cti, intestinum ambiunt, ejusque tunicae exteriori, sphincterisque [t. 34. f. 1. E.] su- ^{h Vesal. monet}
periori ² cere: hos Laur. ^{aliquoties fa-}

non describit. Piccolhom. ani levatores quoque nominat. i Gal. 6. ad. an. 14.

k Gal. de diff.
musc. 30.

periori parti inferuntur, & portione quadam [t. 34. f. 1. D.] radici penis & uteri collo (unde nonnulli tres fecere hanc portionem pro tertio musculo recensentes) adnascuntur. Hi post excretionem praesertim magnis conatibus factam podicem^k sursum retrahunt, unde iis resolutis aut labefactis, podex modo difficulter retrahitur, modo exterius propendens manet & si imbecilliores, resolutive fuerint, vel podex humorum pondere gravetur, intestinum digitorum opera in suum locum restituitur: verum hi muscoli simul quoque pudendi originem trahunt.

De Liene.

CAPUT XLIII.

De Liene Aristot. 1. hist. an. 18. 2. ejusd. 15. 3. part. an. 7. 4. gen. anim. 4. Galen. vero us. part. 4. 15. & 16. 6. ad anat. 10. egit.

a Celso lib. 4.
Plinio, Persio.
b quod viscus
sit & intus ab-
ditum.
c Gal. 6. ad. an.
10. Arist. 1. hist.
an. 18. lien à la-
tua aequale in
omnibus.
d Non enim ut
vulgo creditur
sano homini ad
abdominis qua-
si medium, &
anteriora pro-
minet, nec ta-
tu admodum
deprehendi po-
test Vesal. 626.
e Gal. 4. us. par.
16. 6. ad. an. 10.
f Gal. 4. us. par.
15. Arist. 3. par.
4. Lien hepatis
adversus in iis,

Lien, quod *σπλην*, Splen, ^a *δὲ πρὸ τῆς ἀσπληνίας*, id est, ^b viscere; vel potius *δὲ πρὸ τῆς ἐκείνου ἐνταύθου τοῦ φαντασθέντος τῶν ὀνείων*; ab eo, quod in seipsum aterahat malignos (ut creditur) humores, Græcis dicitur: in inferioris ventris sede [t. 18. 00.] elastissima, ^c hypochondrio sinistro sub diaphragmate posteriora versus (quare in sanis ^d tactu deprehendi non potest, sed in iis, quibus præter modum intumuit, ut ad abdomen medium porrigatur) ipsis vertebis & costis spuriis, quæ ipsius telæ sunt, gibba parte innitens, concavo ipsius ^e in dextram converso hepatis, ^f veluti sinistrum hepar oppositus, inter ventriculū & costas, ubi locus supererat, & in quibusdam altiori, ^g aliis decliviori loco situs est. Communiter ^h unus, rarius duo vel tres ⁱ sibi invicem impositi, magnitudine neutiquam pares, sed tunica & valis distincti, qui rarissime deest, ^h & raro ejus cum hepate situs immutatus, ut illud ^k dextrum, hoc sinistrum hypochondrium occupet, reperitur.

Connectitur Peritonæo & ^l omento exterius diaphragmati (in canibus nunquam) & renis sinistri membranæ externæ, gracilibus (nec tam validis ut hepar, cum tam ponderosum non sit) membranæ à peritonæo, qua diaphragma succingit, tantumque vinculis enatis: ita ut bene habito corpore, infra costam ultimam non propendeat: quibus ligamentis relaxatis, vel ruptis ⁿ in hypogastrium prolapsus, tunicis causam in imo ventre præbet. Interius vero superioris membranæ [t. 34. f. 2. CC.] omenti, quæ lienis [t. 18. P. 1. 34. f. 2. HH.] lineæ adnascitur, & vasorum interventu antè ventriculū, ^m quandoque posterius dorso jungitur.

Magni-

qui exquisitus constat. ^g Hipp. 6. epid. sec. 2. quibus lien dorsum vergit, huiusmodi & genua calenti, nasus & aures frigent. ^h Liene carens & duplici liene visum Arist. 4. gen. an. 4. corpus sine hepate & liene visum, cuius historiam vide inter observationes, additas lib. de partu Casareo, quem Latinum fecimus: in quo vasa ex carnosis relictis intestinis prodibant. Hollerius mulierem sine liene vidit. Laur. meminisse cadaveris Lutetia dissecti sine liene, in quo Splenicus ramus in exiguum corpus glandosum desinebat, & vena duas hamorrhoidales faculens sanguinem expurgantes. ⁱ Triplisi liene reperi, unum iusta magnitudinis, alterum dimidio minorem, tertium magnitudine ovi columbini, ut prodigiose inquit Plinius l. 11. c. 37. ^l Gal. 4. us. part. 9. ^m Ventri lien annectitur, quæ omentum obducit Arist. 1. hist. 18. ⁿ Cabrolus Monspel. chir. in nobili hoc notavit, & Richin muliere Lutetia, qui per biennium Mola spectemendicos sefellix.

Magnitudine, colore & ° figura variat: homini enim crassus, magnus; sed hepate longe minor est, quia tantum pro infimi ventris partibus ad quas splenica ramos mittit sanguinem conficit: hepar vero, quia pro toto reliquo corpore sanguificat longe majus est, ne ventriculi dilatationem impediatur; in nonnullis grandior, quoniam facile humorum affluxu ob laxam raritatem augetur; & in quibus à natura melancholicus succus copiosior, his Lien grandior est, aliquando in lienosis adeo increfcit, & distenditur, ut interdum longitudine sua ad inguem perveniat & latitudine jejunum contingat. At magis parvum quam magnum probatur Hippocrati nam quibus corpus floreret, his lien minuitur, quibus vero id viscus magnum & tumens augetur, his corpus gracilefcit & cacoehymicum redditur. Et licet humor hic, respectu bilis flavæ & feri, paucus sit, tamen cum longo viæ tractu allici oportuerit, & propter crassitiem contumax ductuque difficilis, idcirco paulo major esse debuit. Color non idem, siquidem in fœtu, cum sanguine puro à materno liene repurgato nutritur, ut hepar rubet: in adultis vero, cum succo crasso alatur, ex atro & obscuro nigricat, cum talis sit melancholici humoris naturalis color. In quibus vero Lien præter naturam habet, talem colorem exhibet, qualem humor sortitus est, lividum, plumbeum cinereum, porraceum: aliquando membrana instar cartilaginis & coramplumbeum cinereum, porraceum: aliquando membrana instar cartilaginis & colore crassitie & duritie intectus: in cane vero, splendidius hepate rubet, si ex ore nigricat, in sue magis albicat.

Figura ejus varia est, modo longa, modo quadrata, modo rotunda [t. 34. f. 2.] quamvis pro ratione partium, quibus accumbit, variet, est & oblonga, quantum ventriculi sinistra pars detecta requirebat; laia quodammodo & quadrangularis, linguæ bubulæ, (quare linguosum viscus quibusdam, vel vestigio humano, ut habet Hippocrates) & similis: superne paulo latiore, & in gremium obtusum angulum, inferne in unum desinente; extrinsecus & latere sinistro aliquantulum gibba, & quadiaphragma spectat, ita ut aliquomodo figuram globosam imitetur, aliquando à coactis [t. 34. fig. 2. LL.] impressionibus * habet: interius & latere dextro modice concavatus [t. 34. fig. 2. inter HH.] ut ventriculo cedat, vel potius incumbat, ejusque concavationem foveat (in canibus longior, arctior, magisque cavus) per cujus cavitatis longitudinem mediam linea alba, [t. 18. P. & t. 34. f. 2. HH.] nonnullis eminentiis prædita, quo venas & arterias [t. 34. f. 2. N.] cum omento [t. 34. f. 2. BB.] admittat, ducitur. Si præter naturam sit varia est figura, triangularis, penitus globosa, variis extumescens, exasperata, acuminata, bipartito secta, aliisque modis varia. Cum enim viscus fit rarus & spongiosus, & quamvis humiditatem facile combibat, hæc, illam partem in quam imperum facit auget, sicque naturalem ejus figuram facile immutat. At quandoque

S 3

doque

obscuri colore in homine nigricat, Vesal. subnigricans, Plat. ruber nigore perfusus, Piccolhom. & Ejusmodi notavit Andernacus, & ego quoque in nobili Gallicadavere hydropico à me condito in acidulis Griesbachianis anno 1601. Lien quadratus, trium palmarum latitudine & longitudine, crassitie quatuor digitos aequante & undique cartilaginea substantia incrustatum, in quodam Abbate qui per duos menses continuo tremulos ac palpitantes pedes habuit, tandem stupore rotius corporis superveniente, interiit, notavit Rioli. Sues vero & boves albicantem magis habent. Homini viscera utiliter aliquando in aqua elixantur, aut in calidam submerguntur, cum fluxilis sanguis examini obstat Vesal. y Longus Gal. 4. us. part. 16. Arist. 1. hist. 18. & De reser. corp. † vidi sepius splenem cavum, antrosum fœtus aut septenis digitationibus fissum, suæque cavitatis arte ventriculum per suas digitationes amplexantem, Rioli. * Non enim ut hepatis aut renum exacte lavis est, sed obscuris ruberibus quemadmodum elephantiorum cutis, variis extumescere consuevit, etiam ejus cutis colorem exprimens Vesal.

o Gal. 6. ad. mor. 10.

p Fernel. scribit

lienem visum

mole & magni-

tudine natura-

lijecori ad san-

guinis conse-

tionem opitu-

lari. Vesal. tam

grandem lie-

nem vidit, ut

ventriculum

operiret & ad

jejunum pertinge-

ret ipsi adna-

tus, in quodam

qui ictero nigro

mortuus. An-

dernacus vi-

ginti librarum

observavit.

q Arctavius 1.

morb. divit. 14.

Ætius l. 10. c.

7. & 17.

r de locis in homi-

Gal. 2. facult.

nat. 9. unde

Trajanus, uti

Dion refert,

fiscum lienem

appellabat: ut

liene crescentis

corpus reli-

quum extumescit, ita discec-

te fisco, populus

depauperatur.

f Gal. 5. us. part.

6.

t Sublividus,

Columb. atro

& per quam

doque lien parte superna, quam Hippocrates & Ruffus caput nominarunt, crassum & rotundum occurrit: parte vero inferiore, quæ cunda Hippocrati, gracilior est.

a Gal. 4. us. par.

15. vas veno-
sum dicitur.

Columbus Ga-

lenum reprehendit,

quasi venus

arterias non

viderit in liene

cui respondet

Piccolhom. fal-

so reprehendi

Galenum, cum

dixerit Gale-

nus ramum ad

lienem ferri à

Porta: dein 4.

us. par. 15. agit

de arteriis, &

addit Piccol-

hom. Colum-

bum & Vesali-

um pleraque

esse furatos à

Galeno, cuius

non memine-

runt, nisi cum

falsum adscri-

bunt.

b Gal. 5. us. par.

6. & 7.

c Hæc nunc in

portam & in-

testina per eun-

dem ramum

Splenicum: nunc

in ventriculi

fundum, per

vas breve aut

venosum: nunc in

sedem per hemorrhoides: nunc in

renes per arterias

emulgentes amandatur, Laur. d

Avicena per

venam coronariam ad os ventriculi,

priusquam lienem ingrediatur,

melancholicum succum ferri credidit. Gal. 3. fac.

nat. à liene in omentum, inde ad tenuia intestina, per hæc ad pylorum & tandem ventriculi fundum pelli scribit, at 4.

us. par. per vas breve, à summo prope lienem ramo, ad ventriculi fundum protenso: lib. de diff. ven. vas breve in qui-

busdam tantum, non in omnibus reperiri affirmat. Laur. hoc canali obstructo remeare potest in Splenicum ramum, &

ab hoc, nunc in coronarium, nunc in hemorrhoidalem, nunc in mesentericas venas. e Gal. 6. ad. an. 10. f Alii utile di-

cunt, & amicum ventriculi functionibus sicut bilis flava ventriculo hostis sit: Alii hanc bilem, quæ acerbæ & acida

sit, omnes ventriculi functiones adstringendo & colligando, corroborare. Alii vim ventriculi appetitricem isto excre-

mento incitare statuunt. g Gal. 5. us. par. 4. h 4. us. par. 15. Vesal. vult à ramis lienem aduentibus tres non plures ra-

mos enasci, qui in sinistram ventriculi latus excurrant, non usque ad superius orificium.

i Tertia vena splenica ad podicem abeunt, & quicquid est sanguinis alimenti lienis superfluum, deferunt pro inferio-

rum partium alimento, ne disperdatur: dein si quid superioris excrementi propter gravitatem deorsum feratur per hæc

venas in compressionibus alui, per cacaillarum spiracula una cum cibi reliquis expellitur. Piccolhom.

Vasa: Renæ portæ [t. 13. B.] ramus^a Splenicus [t. 13. F.] infra hepar locatus, truncus insignis inferiore [t. 32. f. 2. BB.] membrana omenti suffultus, transversim ad lienem (aliquor prius de se missis ramis in Portæ historia explicatis) mittitur, & ad cavum [t. 34. f. 2. HH.] ejus divisus plurimis ramis [t. 34. f. 2. N.] in ejus substantiam [t. 34. f. 2. I. K. & 13. AAAA. & t. 14. f. 3. I. L. M.] absimitur, non quidem, ut in hepate conspicius, sed adeo tenuibus, paucis exceptis, ut fibræ potius quam vasa videantur, quibus crassus sanguis obducitur.

Hic succum crassum & terrestriorem futuri sanguinis partem à vena portæ ad lienem defert, ut ibi conficiatur^b fiatque Spleni alimentum: At cum ab hoc succo pars aliqua crassior, quæ à liene attenuari & subigi non potuit, idcirco alendo inutilis, segregari debuerit, vasa duplicia, quæ id recipiant, creata sunt. Alia quidem per quæ sursum, in sinistram partem^d fundi ventriculi, nonnunquam vero versus ipsius orificium^e sinistram humorem hunc eructat, qui sua aciditate appetentiam^f post chyli in venas hepatis ingressum excitet; quemadmodum acetaria in cena proponi consuevere, ut novum appetitum ex prandio quasi extinctum, provocent: dein quatenus adstringendi facultate participes est, ventriculum^g corroboraret, quo omnis illius actio firmior sit, quod modo tribus, modo pluribus ramis à Splenica prodeuntibus, nonnunquam uno à summo prope lienem ramo, quod vas breve [t. 13. 2. act. 14. f. 1. arteria & notatur] seu venosum stomachum Galen.^h vocat, protonato, perficitur: hinc vomitiones nigrae aliquando obveniunt: qui postmodum, velut humor melancholicus excrementitius inutilis, cum alimentis ad intestina deferretur & excernitur. Hujus rami beneficio quartana laborantes, vomitu ante & post paroxysmum, multum juvantur; in quibus, quemadmodum omnibus fere melancholicis affectibus, non modo lien, sed etiam os ventriculi afficitur. Aliud vero vas, per quodⁱ deorsum mittitur: aliquando enim ramus deorsum ad extremum recti intestini Hemorrhoidales [tab. 13. gg. & t. 14. fig. 2. vena & arteria * notatur] internas (cum externæ à Cava sint) constituens mittitur: quamvis hic humor sæpe expurgetur per arterias, non solum in intestina, sed ad emulgentes demandatus ad renes, ita ut recte in affectibus melancholicis naturam imitantes, diureticis utamur: & licet rarum sit à vena, emulgente ramos ad lienem mitti, rarum quoque à Cœliaca in arteriam

riam magnam, indeque in emulgentem in renes, tamen lienem per renes expurgari Hippocrates* docuit & medicamēta hydragoga † lieni cōferre: imo omnes fere lienis morbi contumaces copiosa mictione sive naturalis sive artificialis fuerit, solvuntur, cū hæc Hipp. auctore lienosis salutaris existat. Sed hic quæri posset, cum videamus eos, qui potu acidulari ad libras plures utantur, eas aquas citius quā binis horis mingendo excernere, per quas vias ad renes ferantur. Respondetur: à ventriculo & intestinis per venas mesaraicas ad hepar, inde per venam cavam & emulgentes ad renes decurrere: an potius aquæ hæc ex ventriculo per vas breve à liene rapiuntur, & inde per arteriam splenicam in Cæliacam, in Arteriz magnæ truncum à qua renes per suas arterias emulgentes rapiunt, deferuntur?

Arterias numerosas (plures quam hepar) & magnas [t. 14. f. 1. u.] recipit à Cœliaca [t. 14. f. 1. m.] quæ ab Aorta sub diaphragmate prodit, eadem fere ratione, eodemque numero, quo venas, non solum, ut ei facultatem vitalem largiantur, sed etiam, ut perpeuo suo motu, calorem innatum succo sæculento pene obrutum, ventilando & fovendo corpus lienis tueantur, crassusque sanguis mutari & confici possit, sicque Lien expurgetur; Verum etiam humores serosos, una cum sanguine tenui & frigido, qui per Anastomoses vasorum (arteriarum cum venis lienis in parenchymate, præsertim una insignis ante vasorum in lienem ingressum) assumpti sunt, ad Aortam deferunt, qui ab emulgentibus arteriis in renes deducuntur; hinc enim feri copia, quæ in Aorta est. Quare cum venis & arteriis plurimis confertum sit, idcirco si inflammatum sit & lienis regioni manus apponatur, palpitate deprehenditur, & æger aviculæ vel tantis subsultum percipit.

Nervos [t. 9. f. 1. lib. 2. *] exiles, à sextiparis ramo sinistrilateris costarum radicibus exporrecto ipsius membranæ, non vero ejus substantiæ, insertos recipit. Membranam habet unicam tenuem & simplicem ab omenti membrana, quæ lienis rectæ lineæ innascitur, & à peritonæo fuit producta, enatam, quæ omni ex parte carnem ejus, cum mollis sit & laxa, munit & cingit.

Substantia ipsius [t. 34. f. 5. IK.] parenchyma est laxum ac fungosum, innumere venis & arteriis confertum: nam nihil aliud videtur esse, quam crassus, niger admodum & concretus sanguis, fibris frequentibus implicitus, cum sit caro (quam Erasistratus vocavit, quod ipsius tenuissimis vasis fibras æmulantibus circumfundatur) mollis, rara, laxa admodum & spongiosa, per quo facilius crassos succos à longinquo attrahat, (talis enim substantia aptior est, quam si densa foret) attractos excipiat; quare & venæ per eam disseminatæ, molliores sunt & laxiores, ut facile humor excidat.

Veteribus consuetum fuit in antiquis lienis affectibus, hypochondrium sinistrum urere, sed non ad lienem usque ferro adacto, cujusmodi unctionem Hippocrates commendavit, modum ipsum Ægineta l. 6. c. 48. & Albucasis proposuere: & sane felicem hujus unctionis successum ante quadraginta annos in Doctore Adamo Henrico Petri IC. & apud nos Professores vidimus. Sic Rossetus refert à Turcis cursoribus lienem inuri, qui etiam vidit in quibusdam ad hypochondrium sinistrum sauciatis, lienem corruptum feliciter * extirpatum. Sed potius Aræto assentior qui asserit, eos

ex utraque tota lienis regio barbaricis ferramentis candentibus inusta erat, quem duobus tribusve diebus medicamentis per os exhibitis purgavit &c. at Tagautius & Aquapend. omnia lienis vulnera lethalia esse volunt.

VII. Rondeletii, referente Laurentio, negant liem esse humoris melancholici receptaculum, quia humor is dum naturalis est, totus in offens, aliasque duras corporis partes impendatur, & cum ejus in nobis portio minima sit, ei excipiendo nullam partem dicatam esse: uti neque sanguinis excrementis quæ sudoribus & insensibili transpiratione abeunt.

¶ 4. n. part. 15.

excremento solum recipiendo creatus foret, non in superiore, sed inferiore loco positus esset, ut vesica biliaria, quo commodius ponderosum illud excrementum susciperet. Dein cum paucissimus sit humor hic, natura liem majorem non fecisset, quam vesiculam. Tum, amplam fecisset cavitatem crasso excremento suscipiendo accommodatam, quemadmodum bilioso humori tenui. Quanto nulla pars, quæ excrementis secernendis ordinata fuit, per eosdem meatus excrementa & suscipit, & per eosdem naturaliter expurgat, quod exemplo & renum & vesicæ biliaris edoceri potest. Quinto, nulla pars excremento, quod ad se trahit, alitur, sed sanguine laudabili. Sexto quemadmodum meatus biliaris per hepatis substantiam inter cavæ & portæ radices dispersi sunt, quo bilem excrementitiam hauriant: sic quoque ex Splenico ramo propagines per hepar spargi deberent, quod tamen non fit. Et tandem si ex hepate feculentus sanguis expurgatus ad liem feratur, tum necessum erit, excrementitium huncce humorem in venæ portæ truncum regurgitare, cum ex hoc multum infra hepar & supra Mesaraicarum venarum truncum, ramus Splenicus ortum ducat.

Quare censemus, Lienem datum esse ad sanguinis u confectionem, quem usum Aristoteles primus invenisse videtur; & Galenus libello de respirationis usu, quemadmodum & Aphrodisius & Aretæus confirmant; Vesalius vero & Fernellius suspicati sunt: & Piccolomini alterum ipsius usum fecit.

Lien ergo partem crassiores & terrestriorem a chyli in venis mesaraicis jam alterati, & sanguinis aliquam dispositionem adepti, ex venarum mesaraicarum truncis, antequam chylus ad hepar feratur, ingenta facultate per portæ ramum Splenicum ad se allicit, quo postmodum hepar rectius chyli partes laudabiliores attrahat: alias ipsius vasis, à crasso illo crudoque sanguine obstructis, non modo laudabilis sanguificatio fuisset impedimento, sed etiam icteri, hydropes, febres, scirrhi, aliaque mala causata, ut fieri consuevit, quando liem suo officio non probe defungitur, & vel ob ambecillitatem, vel meatuum obstructionem, crassam & terrenam illam chyli partem non attrahit, quæ vel in hepar translata, vel in mesaraicis relicta, obstructiones illas contumaces parit: ita ut hepatis & mesenterii obstructiones non tam hepatis aut ventericuli, quam lienis vitio contingere soleant: quod etiam rami Splenici situs, qui in-

Columb.
nulla pars
excrementis
nutritur, liem
excepto, qui a
tra biliaris hu-
more nutritur:
cum is sangui-
nem melanchol-
icum ab hepa-
te deferat.

u Averrhoes
contrarium sen-
tit in paraphra-
si de animal.

Lien, ait, ex se
sanguinem non
gignit: signum
est, quod una
vena à stoma-
cho ad liem
protenditur,
qua liem à me-
lancholia ex-
purgatur, non
autem chylus
attrahitur.

x 3. par. 7.
y 2. Prob. 44.
z 1. de caus. &
sign. chronic.

a Hanc sententiam approbant Greg. Horstius lib. de nat. hum. & Rioli. in anthropographia. b Vitio lienis hydropem nasci ex Hipp. in epid. colligitur, dum ait, Cresiphonem splenicum hydropicum factum esse: & lib. de inter. aff. At quomodo à liene producatur i. morb. mul. docet: si splene magno & aquoso existente mulier aqua intercute laboravit: liem aquosus ex ejusmodi affectione evadit: cum vehemens febris hominem detinuerit & non reliquerit, sitisque vehemens corripuerit & biberit, ac non revomerit: nam quod in vestem deferitur per urinas ejicitur: liem reliquum ex ventre ad se raptum suscipit, ut qui rarus est & spongiformis & prope ventrem situs: hisque se se habentibus si non exadaret, neque alvus laxetur, ab hoc splen attollitur, idque magis si aqua epota fuerit. Unde vero & per quam viam in liene coarctetur & qua via educi possit 4. de morb. ostendit, inquit: Nunc vero dicam de aqua quomodo & cur copiosus in corpore oritur & quomodo liem ad se trahat: Asserit vero autem ubi quis amplius biberit & corpus & liem ad se tra-

here:

here: & si plus traxerint quam oporteat, statim hominem laborare. Postquam autem lien traxerit, optimum est si aqua vetus qua ventriculo aut lieni inest, ad vesicam percoletur & per hac expellatur: nam per superiora aqua à liene non purgatur, nisi quantum ejus vasis qua à liene procedunt, inest: sed in ventriculum & vesicam repurgatio fieri potest. Plato in Timeo, quando propter corporis morbum jecur sordibus abundat, lienis raritas id purgans, eas combibit, cum membrum hoc concavum sit & exangue: unde purgamentis impletum excrecit tumetque sanie: ac rursus cum corbeat, corpus præ alimento immodico languescit: & propter humoris hoc confluxum, sæpe lienosis ventres præduri efficiuntur: quomodo is qui supra modum mingunt ex humoris diverticulo. Avicenna. magnitudo lienis ad hepatis de-
uens: altera est cum debilitate virtutis hepatis secundum semitam qua ei contrarius est & quod prohibet ipsum sanguinem bonum generare. Vesalius cap. de liene multis exemplis demonstrat in hydropse alii que affectibus, qui ab hepate manare creduntur, lienem vitiatum, hepate sano & illo deprehendisse. Gal. 4. us. part. 15.

c Gal. 4. us.
part. 15.

d Vesal. sic ha-
bet, auctor lib.
de respir. usu
Galeno falsam
tribuit, lienem
ex ventriculo
& intestinis
confectum cre-
morem, per ve-
nas ventriculi
& intestino-

rum assumere, ac sanguificationis organum esse contendit. Et nonnulli Medici, quemadmodum in 4. de morb. Hipp. lienem jecore male affecto, nomine jecoris sanguinem elaborare affirmant.

fra hepar est, & nequaquam ab hepate prodit, comprobatur. Nec verisimile, succum crassissimum in hepate jam confectum, per angustissimas hepatis venulas regredi: non tamen negamus, in hepate sanguinem melancholicum gigni, sed eum, qui pars sit massæ sanguineæ. Verum & chyli portio, per venas à Splenico ad sinistram fundi ventriculi partem missas, exsugitur. Hunc exceptum, quo rectius confici possit, per longos circuitus deferri voluit, quem in innumeris vasis tenuissimis, fibrarumve implexibus per ipsius substantiam disseminatis (quemadmodum & altera chyli jam alterati pars, in plexibus vasorum per hepar disperforum, in sanguinem coquitur) multo otio, multaque præparatione conficit & elaborat, & in tenuiorem succum beneficio caloris innati, adjuvante arteriarum plurimarum (cum succus sit crassior, quam is qui ad hepar fertur) perpetuo ac valido motu concoquit; quo partim ejus portio aliqua, Lienis fiat alimentum: partim vero, ad ventriculum, intestinum colon, omentum & mesenterium per venas à Splenica prodeuntes, pro nutritione deferatur; hæ enim partes sanguine fervidiore nutrirī debuerunt: quia ventriculus membranosus, coli intestini calor velut ab excrementis obruitur & omentum lienis crassam illuviem excipiens simili sanguine nutrirī debuit: quemadmodum Galenus concedit, venas mesaraicas ex ventriculo & intestinis chylum hepatis offerre, & per easdem rursus sanguinem illis ipsis & omento adducere; cum enim eadem sit venarum à vena portæ propagatarum principium & substantia, eadem quoque erit earundem actio. Hujus forte pars aliqua in proximas arterias rapitur, in aortam mittitur, ad calidissimum sanguinem à sinistro cordis ventriculo hauritum contemperandum, & spiritus in eo mobiles remorandos, quod ad ingeniorum constantiam plurimum facit. Quando vero hepate calloso, vel exeso, eoque non sanguificante, Lien ejus vices obit, portio elaborati sanguinis per ramum Splenicum in hepatis venas transmittitur, & per cavæ radices & ramos in partes alendas, non secus quam sanguis is, qui in hepatis venis fuit elaboratus, distribuitur. At quod in sanguinis utilis speciem, ob nimiam alimentī crassitiem, à liene transmutari non potuit, & ad nutriendum inutile est, partim in ventriculum, partim in venas Hæmorrhoidales effunditur; interdum in portæ truncum, aut per arterias splenicas ad renes deferitur: unde in Lienis affectibus, urinæ sæpe nigrae conspiciuntur. Quare Lien hepatis sanguinis con-

centiæ sedes sit. Latinis jecur, quod juxta cordis vires suam potestatem exerceat. Inter partes principes merito recensetur, cum facultatis naturalis, animæque altricis sedes sit & domicilium; quo omnia sanguinea donantur, & inter viscera omnia primo perficitur. Venarum ^d principium est, non ratione originis, cum venarum principium semen sit, & vasa ante viscera sint genita, sed distributionis & ^e radicationis: ex eo enim duarum ^f validiorum venarum exortus est: inferne ex cava portæ vena; superne vero ex gibba, cava vena prodire dicitur; cum tamen cava ipsius posteriori sedi [t. 35. f. 2. F. G. f. 3. MN.] duobus insignibus ramis per ipsius substantiam dispersis, innascatur: quæ duo vasa, tanquam e terra arborum radices enascuntur (quemadmodum enim radicibus terra, sic venis hepatis caro circumfunditur) per quas toti corpori alimentum subministratur: quare & ^g sanguificationis officina dicitur.

Situm est [t. 9. FF. t. 12. CC.] in infami ^h ventris elatiore parte, quo velut in medio corporis locatum, sanguinem æqualiter sursum & deorsum distribuat; sub ⁱ diaphragmate digiti circiter transversæ distantia, ne ipsius ^k motum impediat; licet aliquando in mortuis ei contiguum sit, totumque sub costis demersum. At majori parte dextrum ^l hypochondrium (rarius in homine ^m sinistrum occupat; partim ut ventriculo [t. 9. EE. t. 12. FF.] & lieni [t. 12. G.] in sinistris locum relinquat (cum hæc tria totum spatium occupent, unde his tumentibus, ob loci angustiam, respirandi magna difficultas oboritur) partim propter dextrum cordis ventriculum, ut ad eum sanguis evehatur: rarius utrumque hypochondrium occupat & per ligamentum ipsi lieni annectitur. Verum & superiori, anteriori & dextræ ventriculi [videt. 9. & 12.] parti leviter insidet, ne hunc sua mole premendo, materias in eo receptas protrudat; & portione aliqua in sinistrum latus pertingit, quo corpus in ⁿ æquilibrio sit (in canibus propemodum utrumque latus, cum lienem gracilem & longum habent, occupat) maxima tamen parte costis nothis subcingitur, iisque ab injuriis munitur: quandoque infra costas, maxime in mortuis, prominet.

Figura ⁿ propter [t. 35. fig. 1. & 2.] partes adjacentes varia est, cum ipsius manus nulla propriam figuram expetat, sed magnitudinē & crassitiem sufficientē: est tamen facies alia exterior, quæ superior & posterior, lævis, æqualis, convexa [tab. 17. B. G. tab. 20. bb. tab. 35. f. 1. AA. fig. 2. CC.] & rotunda (quæ ^o gibba & caput dicitur) quo in prima fœtus diaphragmati cedat, ejulque cavitati congruat; posterius vero sinus [t. 35. f. 2. ad F. G.] est ob-

re videtur. ^e τὸν φασὶν ἰσχυρὸν Hipp. de alimento. ^f Gal. 5. us. part. 2. ^g Hipp. de morbis, in ^h μολίῳ dicitur, fons & origo gratiosi humoris: veteres τὴν βουγγερον γῆν, id est, terram frugiferam vocarunt. ^h Hipp. de arte, in thorace collocavit: per thoracem intelligens totam capacitatem, quæ est inter clavas & ossa pubis. Sicut interpretatus est Arist. 4. de part. ⁱ Arist. 1. hist. 17. ὅτι τὸ διὰ τῶν πνεύματι δέξις, καὶ τὸν τὸν πνεύματι. Gaza reddit; Jecur supra septum positum est a dextro latere. At inq. non solum supra, sed etiam ultra significat: voluit Arist. primo cor & pulmones: sub pulmone septum: & ultra septum a dextro latere jecur; & lienem a sinistro situm esse. ^k Gal. 4. us. part. 14. ^l Arist. 2. hist. 17. 3. part. 9. ^m Arist. 4. gen. an. 4. locis permutatis, jecur latere sinistro, lien dextro continere visus est: 1. hist. 17. jam enim legitimum illum locum in nonnullis quadrupedum lienem cum jecinore permutasse visum est: addit 2. hist. 17. hoc si in dissēcio quadrupede visum est, prodigiose id e venisse purandum est. Et Gal. 6. ad an. & sinistram partem occupare paucis in hominibus, non autem in paucis animalibus, vere prodidit Herophylus 2. de consēct. libr. solius leporis mentionem faciens.

Attestantur aves, quibus jecur æqualiter in utroque latere positum est. ⁿ Figuram globosam imitatur, Piccolhom-tantum non exacte spherica est. Columb. ^o κυρτὸν ὡς, gibba & sima.

est oblongus, quantus amplectendo Cavæ p caudici [t. 35. f. 2. FG.] sufficebat, ne hujus gravitate, vel diaphragmatis motu comprimeretur. Alia interior & seu inferior, inæqualis, & [t. 17. CC. t. 18. BB. & tab. 3. f. 1. BBC.] cava (quæ summa dicitur) ut ventriculo assumptorum copia [t. 12. FF. t. 18. E. t. 22. CC.] turgenti cedat, & cum eum immedieate complectatur, tegat, suoque calore primam chyli concoctionem foveat; quæ facies, hepatis regiones dicuntur, & seorsim affici posse cum Galeno statuunt, ita ut gibba laborante, concava illæsa manere queat: & gibbæ per venas, cavam per alvum evacuare jubent. In hac parte sinus duo sunt, alter à dextris insculptus, ut vestigula bilariæ [t. 37. f. 1. P.] medium corpus excipiat; alter à sinistris [t. 35. f. 2. L. t. 37. H.] ubi stomacho transeunti cedit; in canibus privato sinu renis dextri partem admittit. Ubi vero vena portæ exit, propter eminentiam aspera [t. 37. f. 1. FF.] est, ne vena à ventribus corporibus comprimeretur. A dextris rotundum [t. 12. C. C. t. 35. f. 1. AA.] & crassissimum, à sinistris sensim attenuatur, & quasi in acutum angulum [t. 35. f. 2. ab L. ad I.] fertur, & parte anteriore in ambitu tenue est.

Unicum est, cum magnitudo numerum compenset & in homine maximum, & inter eos, qui corpore sunt majore, majus habent, cum sanguinis copiam pro toto corpore continuo conficere debuerit, non solum pro ejus nutritione, sed quæ etiam spirituum procreationi & dissipationi sufficeret, cum plures sint in homine, quam brutis animæ functiones, quæ plus spiritus animalis dissipant, qui ex spiritu vitali, & hic ex sanguine gignitur, idcirco sanguine copiosiore in homine opus fuit; in timidis ac gulosis quoque majus, in illis, quia illorum facultas vitalis imbecillior, propter frigidioris corporis temperiem, qui defectus facultatis naturalis robore suppletur, in his propter cibum copiosorem assumptum; nam cum copiosius nutritur hepar, grandius quoque evadit.

Est plerumque integrum, ut cum homo rectus incedat, cava parte ventriculum [t. 9. & 12. hoc ostendunt] tegat, excepta anteriore & dextra parte, ubi fissura [t. 35. f. 1. ad B. t. 37. f. 1. E.] foraminis forma, quæ propter umbilicalis venæ [t. 9. D. ad B. t. 12. E. t. 17. L. t. 35. I. B.] transitum necessaria fuit: & parte posteriore, portiuncula cavitatem quam ventriculi utrumque officium relinquit, implet. At in brutis in lobos seu

T 3

piunas

guorum cognosci Rhafis & Avicenna prodiderunt, quod non caret ratione, etiamsi reclamet Averroes, Rioli. Avicenna notavit hepatis parvitatem semper esse noxiam, non autem magnitudinem, quia nunquam, aut raro nimis amplificatur. Rioli. Parisius observatus fuit ingens & vastus lien, cum exiguo hepate vena circumfusa, quod renis magnitudinem non excedebat. u An belluones idcirco, quia grandius hepar: an contra, utrumque esse potest. Etsi aliqui velint, cranula adeo absumi, ut ad nucis duntaxat molem redeat, Vesali. in muliere famelicæ, post mortem hepar viginti lib. inventum, Cor. Gemma.

An plures in homine lobi Hipp. de ossium nat. & 6. epid. in lobos quinque secat. Arist. figura rotunda, tubulo hepatis simili. Gal. 6. ad. an. 8. ex Theophrasti sententia, non omnibus hepar simile datum: in quibusdam continuum est, sine ulla divisione: in aliis duobus lobis sectum: in aliis in quatuor lobos divisum. Et 4. us. part. 8. & eadem Theophrasti Protospatarius secutus Rufium Ephesium, lobos nominibus propriis insignivit: Sic enim 1. part. 28. quæ in sacrificiis aruspices portas, mensam, gladium & unguem appellant, in homine quoque sed obscura & incerta reperiuntur, ad nullumque medicinæ profectum necessario nominatur: ac Protospatario 1. focus 2. mensa 3. culter quod humores dividat. 4. auriga, quod recte ducat. Vesalius hepar quibusdam digitis ventriculum ad unguem complecti: nec unum ipsum numerum esse in singulis animalibus, quia nec figura, nec magnitudo ventriculi omnibus exacte sit eadem quod nunquam in feras divisum vidit. Fernelius aliquando in quinque lobos divisum notavit, quale forte Galeno occurrit, frequentius autem solidum nullis fibris divisum reperit. Columbo, in homine integrum non in lobos divisum, ut Galen. Poluit.

Piccol-

Piccolhom. semel in duos lobos distinctum prater fissuram invenit. Riol. interdum gemini duo lobi vena porta accumbentes, magnis duobus substernuntur: addit, se vidisse hepar humanum ab anno elixatum, quod sub scammis schola medica asservatum fuerat, nullo modo corruptum & rancidum, sed eum odorem redolebat, qui est in recenter elixato: proinde expendo Plinii l. 11. c. 37. sententiam scribentis, securi in mortuis vetustatis patiens, centum durare annos obsidionum exempla prodidere.

pinnas quatuor, vel quinque, vel sex, quæ solo venarum interventu continuantur, dividitur, quo ventriculum instar digitorum manus, cum eum ut homines vestibus fovere nequeant, completatur; si enim integrum esset, cum prona incedant, id fieri non posset; quare aves, cum magis rectæ stent, bipartitum habent.

Connektitur spinæ lumborum, diaphragmati, aliisque partibus beneficio peritonæi, à quo ligamenta tria valida, ne, cum grave sit, aliquando decidat, accipit; quorum primum [t. 12. D. t. 17. H. t. 22. d. t. 33. f. 2. H.] membraneum, latum, nervosum & insigniter validum, à peritonæo, qua diaphragma succingit, enatum, ipsum hepar, superne toti diaphragmati, veluti per unum & continuum ligamentum, quod diaphragmatis nervum corpus constituere videtur, stricte alligat, & suspensorium dicitur; quare hepate graviore reddito diaphragma detrahitur, & respiratio corpore erecto vel supino difficilior fit. Alterum vero fortissimum quoque, latum duplicatum, itidem à peritonæo hepatis tunicam constituyente, pronatum, cartilagini ensiformi firmiter adheret & tenuiorem ipsius partem diaphragmati quoque nectit, ut utrinque jecoris latera suffulta sustineantur; sed & costarum & notharum cartilaginibus quandoque tenuissimis fibris cohaeret. Tertium, vena est umbilicalis [t. 9. D. ad B. t. 12. E. t. 33. f. 1. B.] foetu excluso arefacta, qua abdomini ad umbilicum [t. 23. f. 7. & 8. Z. ad Y.] nectitur, ne hepar concidens diaphragma deorsum trahat; & consequenter ipsum cor, cum pericardium ipsi adnektatur, sicque ex suffocatione mors subita sequetur: quamvis & vena hac umbilicali abscisa, contingat hepar sursum retrahi, sicque diaphragma comprimatur, ita ut tam inspiratio libera impediatur, & homo illico suffocatur, quamvis etiam, ubi Portæ [tab. 18. I.] principium est, omenti portio adnascatur; sic & posterius gibba parte, ubi cava transit, peritonæo adhæret.

Membranam habet ^a tenuissimam & simplicem, à venarum ^b altera membrana, quæ à peritonæo est, enatam, quæ substantiam ejus cingit, & venarum ora obtegat. Et licet substantiam ejus arctissime cingat, aliquando tamen à materia ex venarum osculis effusa, vomica inter membranam & carnem colligitur, & quibus ait Galenus ^a in membrana pus est, nihil patiente, substantia hepatis omnes salvantur, quibus vero usque ad carnem, hepatis corruptio contingit, moriuntur: & tales veteres, Hippocrate ^β monente, inurere solebant.

Substantia ipsius, cum nil aliud sit, quam sanguis è venis effusus, cujus nomine rubet, & mollis est, ipsique circumfusus, qui à membrana circumjecta contentus, con-

crescit,

^y Ligamenta
duo agnoscit
Columb. alterum circa venam cavam, alterum suspensorium, quo diaphragmati jecur affigitur.
^z Sybionus & Hollerius hoc observarunt, ac Archæus, asserit se nunquam ret.
potuisse reperire quoniam fortasse in mortuis concidente jecore, ob tenuitatem disrupta, obliterantur.
^a Gal. 4. us. part. 14. & 6. ad. an. 11.
^b A ligamentis hepatis Vesalio: à peritonæi

membrana, Columb. Fallopio, Piccolhom. à peritonæo. Laurent.

^a com. in 7. aph. 46. ^β 7. aph. 40. in coacis aph. 451. Egin. lib. 6. cap. 47. Cels. lib. 2. cap. 8. sebat autem in usio perfusos buxos oleo ferventi intinctos, aut perfungos, ut habetur apud Hipp. libr. de inter. affect. aliquando usio simul & sectio adhibebatur 7. aph. 45. & Aretæus lib. 1. chron. cap. 3. qui simul periculum edocet.

et crescit, idcirco *παρ' ἑαυτὴν*, id est, affusio Erasistrato dicitur; Galenus. ^d carnem Hippocrates carnosum viscus vocavit, quod in viventibus facile corruptionibus ^{* ob-}noxium sit.

Hæcinania ^c spacia inter venarum cavæ & portæ radices, paucis arteriis interjectis, explet, quæ inordinate per ipsius substantiam, ut abstracta ipsius carne [tab. 33. f. 4. & maxime tab. 36. hoc ostendit] apparet (ut ab annis triginta septem in nostris Anatomiis demonstrare consuevimus) disseminantur; ita tamen, ut longe plures radices portæ [t. 33. f. 4. & tab. 36. radices nigricantes portæ sunt] per inferiorem ejus partem, pauciores per superiorem, & contra longe plures cavæ [t. 33. f. 4. & t. 36. radices albicantes cavæ sunt] per superiorem, pauciores per inferiorem (quare copiosior sanguificatio in summa, distributio vero copiosior in convexa sit) innumeris propaginibus diffundantur; invicem per transversum [tab. 33. f. 4. GGGG. t. 36. LLL.] per Anastomoses ^f commissis; quamvis aliquando cavæ radices extrema sua in medias portæ radices infingant, per quæ sanguinis ex portæ radicibus in cavæ sit transitus, ita ut hæ radices mirabilem & plexum (cujus nomine hepar venarum principium forte dictum) ad perfectiorem sanguinis elaborationem constituent: sive venarum in toto corpore unus connexus esse videtur: nam si in recens natis mortuis Vena umbilicalis insuffletur, pene aerem radices & Portæ, ut intestina & cavæ, ut Cor & Pulmones distendantur, penetrare observatur, quæ præcipuæ sunt à quibus reliquæ oriuntur & invicem in hepate mirabili nexu junguntur. At peculiaris & insignis Anastomosis notanda, quæ canalem [t. 36. M.] æmulatur, & veluti communis & continuus ductus existit, qui stylum satis magnum admittit, à quo in omnes undique tam Cavæ quam Portæ venarum fibras minimas, via patet. Notandæ profecto sunt diligenter hæ venarum anastomoses, cum per eas materia peccans transeat, quando habitus corporis dejectionibus expurgatur. Harum radicum [t. 34. KKKK. t. 33. fig. 4. FF.] inferiores paulatim colliguntur in crassiores, hæque in alias, donec in humiliore hepatis parte in unum venarum portæ [t. 33. f. 4. FF.] inferiores paulatim colliguntur in crassiores, hæque in alias, donec in humiliore hepatis parte in unum venarum portæ [t. 33. f. 4. EE. t. 36. HH.] truncum coeant. Superiores vero etiam [t. 36. EEE. t. 33. f. 4. CCCC.] paulatim in majores, & hæ in alias coacervantur, usque dum induos [t. 33. fig. 3. MN.] maximos ramos in anteriorem Cavæ sedem coeant, quæ hepati innascitur, & diaphragmati incumbit, pertinentes, unumque truncum constituunt [t. 34. AC. t. 33. f. 2. F. 3. D. f. 4. B. hinc ex sima hepatis, portæ vena [t. 17. A.] ex gibba vero, cava [t. 17. K.] oriri vulgo dicitur. Inter has radices, surculi [tab. 37. f. 2. Q. t. 38. f. 1. D. D. f. 2. AAA.] tenues & graciles, venarum corpore donati & in unum caudicem [t. 37. f. 2. A. t. 38. f. 1. E.] collecti, bilem ab hepate ad vesiculam deferentes disseminantur, qui cum portæ radibus junguntur, quo sanguis antequam in Cavæ ramos assumatur, à bilioso excremento repurgeretur. Verum eadem substantia vasa quoque amplectendo: fulcit. Ad hujus nutritionem sanguis in radicibus portæ elaboratus effunditur, & reliquum in radices Cavæ, pro totius corporis nutritione, & expellitur & attrahitur.

Arte-
satis aperte co-
gnosci. Piccol-

hom. in jecoribus & crudis & coctis maximorum animalium conjunctiones extremorum diligentissime perquiri, has adhesiones nunquam tamen deprehendere potuit: nam multis locis se non tangunt, & quæ tangunt in transversum, non longum se tangunt, ut angulos rectos constituere videantur. u Gal. 4. us. part. 13. quare non junum fecerit natura, sed plexum, explicat.

c Gal. 6. ad. an.

11.

d 4. us. part. 13.

Hipp. l. de ver.

med. Hepar.

propter tereni-

tudinem & san-

guinitatem abs-

que doloribus

esse non potest

& propter has

causas dolores

acutissimi &

frequentissimi

circa eum lo-

cum commin-

gunt suppura-

tionem & tu-

bercula pluri-

ma:

c Gal. 6. ad.

an. 11. separa-

tionem carnis

hepatis à venis

obscurè propo-

nit.

f Multi has

non agnoscunt.

Ves. ait. utrius-

que vena ra-

mularum ex-

trema osculis

inter se conni-

vent, & mul-

tis locis congre-

di & continua-

ri apparent:

Fallopium vero,

conjunctionem

vasorum in he-

pare, quod ex-

trema porte

cum osculis il-

larum quæ à

cava sunt se-

muljungi, &

sibi invicem re-

spondere, non

Arteriæ etiam [tab. 14. f. 1. r. & fig. 1. y. tab. 18. L.] ad ipsius simam partem, ubi portæ
 g Gal. 6. ad. an. 11. rami in suum caudicem coeunt, magis venis & candicantes, pauciores tamen & exi-
 les à Cœliaca [tab. 14. fig. 1. m.] in ipsius corpus diffusæ, ut calorem nativum eventi-
 lando conservent; quare simam tantum percurrunt; cum convexa pars à perpetuo
 diaphragmatis motu, tanquam flabello ventiletur; verum & calorem vitalem defe-
 runt, ut geminato calore sanguificatio felicior fiat; & ut vitalis facultatis fiat parti-
 ceps: in toto namque corpore venæ & arteriæ mutuas sibi tradunt operas, hæ illis
 spiritum, illæ his sanguinem subministrantes.

Nervi ^h duo parvi [t. 14. f. 2. y. t. 18. M.] à sexto pari, alter à ramo, qui ad orificium
 ventriculi [t. 37. f. 1. O. t. 38. f. 1. O. t. 9. lib. 2. f. 1. x.] superius mittitur, alter [t. 37. f. 2. f. tab. 9.
 lib. 2. f. 1. y.] à ramo, ⁱ qui costarum radicibus dextrilateris exporrigitur, per ipsius tur-
 nicam disperguntur, ne sensus expers sit, & à planta differat: exiles sunt, quia exiguo
 sensu, cum sit pars nutritioni tantum deserviens, opus habebat, hinc non acuti, sed
 obtusi & gravantes potius hepatis dolores sunt, ejus vero profunditas, propter tot
 humorum in eo motus, omni sensu caret.

Ufus hepatis, vasis affundi ne cohæreant, eademque fulcire & stabilire, tum calo-
 re suo venas, cum eo loci subtilissimam ^k habeant tunicam, fovere, ^l quo sanguifica-
 tio, quæ in radicibus Portæ in hepate fit, recte absolvatur: ipsis virtutem naturalem
 tribuere, quasi irradiatione, eo modo, quo vasa seminaria à testibus vim seminificam
 accipiunt: quin & spiritum ^m naturalem procreare, & tandem animam altricem,
 quæ omnibus partibus insidet, custodire. Quomodo autem sanguificatio fiat, cum
 diversæ sint opiniones, quas libro de partibus similaribus recensuimus, nostram sen-
 tentiam subjiciemus.

Alimenta tam solida, quam liquida per os assumpta, & post masticationem de-
 lata, ab ipso concoquuntur, & in chylum convertuntur: hic postmodum pyloro re-
 ferato, in intestina protruditur, & si quæ ipsius portio minus elaborata ⁿ exciderit,
 in intestinis concoquitur: hujus tenuiorem & laudabiliorem partem (fæces enim
 alvinæ in crassa intestina deturbantur) cum humido illo, ^o quod veluti aqueum ex-
 crementum est, in ventriculi coctione genitam, venæ portæ (quæ hepatis concavo
 infixæ est) rami ad ventriculum, & potissimum ad intestina missi, exugunt. Venæ hæ,
 quæ mesaraicæ dicuntur, chylum assumptum attenuant, preparant, & ei primum
 p sanguinis rudimentum dant, chymusque fieri incipit: hic cum ad portæ truncum
 deferri cœpit, crassiorem hujus chymi partem Lien per ramum Splenicum allicit, ne
 si totus ad hepar feratur, obstructions causet, uti in Lienis usu exposuimus. Reli-
 quum chymi, ex trunco portæ deferretur in ejus radices, quæ per simam, quam plu-
 rimam

hunc in ipsius tunicam, illum in jecoris substantiam dispergi statui, ut à vi rationali concupiscibilis anima pars cohiberi
 possit, quibus ceu freno pro imperio utatur. Columb. ramuli sexti paris in ipsius membranam. Fallop. ab eo nervos ha-
 bet, qui mesenterio dispergitur, cum quibus etiam rami arteriarum in ipsius substantiam disseminantur. Plat. duo nervi
 in tunicam hepatis desinunt.

k Gal. 4. us. par. 13. qualis nulla in toto animante alia, 6. ad. an. 11. Sic Vesalio tenuior vasorum tunica quam alibi: at
 Columbo, portæ radices in hepate crassæ satis sunt, præsertim quo ad tunicam. l Laur. vult usum esse, ut insita vi san-
 guini ruborem tribuat, & ita per se & primo sola augeat. m Columb. dicit membrum esse sanguificationi
 par. 18. o Alias ex ventriculo in venas cōmode transsumi non posset 4. us. par. 5. p Gal. 4. us. par. 2. attrahit, & hepatis
 preparant modo, quo ipsum similimo, quippe quæ natura ei sunt affimiles, & primū germē ex eo ducant. Li. 4. us. par. 12.

rimæ & admodum graciles dispersæ sunt, tenuissima. 1. tunica (quemadmodum & Gal 4. us. Part. 13. Vesal. tenuior longe quam altorum qua per uniuersum corpus distribuntur. 1. Addit Piccolhom. idcirco etiam tenues esse, ut facile excidat & effluat sanguis in substantiam hepatis. Gal 4. us. par. 13. addit Piccolhom. propter citam & copiosam sanguinis procreationem, cum plurima sint partes, quarum substantia assiduo, ab ingenito calore dissipatur, eam assiduo reponi oportet, quare assidua & veloci sanguinis procreatione opus est, quod in radicib. portæ recte absolvitur. 1. Piccolhom. vult ex portæ radicibus in hepar effundi, inde in cava radices transsumi. 1. Vesal. p. 457. ab hepate sanguis in cava imderivatur, aut saltem ex portæ propaginibus in cava soboles assumitur. u Gal. 4. us. par. 5. DE SANGUIFICATIONE opiniones. 1. Cor. sanguificare, quæ Aristotelis, ut 2. & 3. part. an. & 3. hist. in hepate ut canali & rivulo sanguis continetur: in Cordæ tanquam fonte & conceptaculo ubi sanguificatio fit.

Sanguine in portæ radicibus absoluto, ipsis desiderium inest eum deponendi, partim in carnem pro nutritione effundendo, unde & hepatis desiderium attrahendi adest; partim in Cavæ radices, quæ potissimum per ipsius gibbam descendunt, quibus etiam desiderium inest illud rapiendi, & tanquam canalibus (in quibus elaboratior evadit) sanguinem purum ab excrementis repurgatum in omnes partes distribuendi: quæ Cavæ & Portæ radices licet nullo ordine per carnem hepatis distribuantur; multis tamen locis, exceptis ramis nutritioni hepatis deservientibus; per anastomoses junguntur, dum vel per transversum se contingunt, vel portæ extrema in Cavæ medias radices infiguntur & vice versa: sic enim ex Portæ radicibus 1. in Cavæ radices fit transitus. Quare quemadmodum caro in olla ab igne circumjecto coquitur, ita sanguificatio fit in venis tanquam in olla, facilitate sanguifica ab Hepatis calore accedente: hinc hepatis parenchymate læso, etiam sanguificatio læditur.

Quo vero sanguis per angustissimos vasorum ductus transire possit, tenuis & a quoque humor Serum nimirum, à quo nulla particula nutriti potest, vehiculum præ-

11. in hepate & corde: Averroes enim voluit in hepate preparari, in corde perfici & ad alendum inutilem, ni cordis arteriarum facultas affulserit.

III. in venis fieri sanguificationem, cuius sententia Galenus pluribus in locis: 1. us. part. 16. sanguinis generandi & in omnes partes ferendi gratia Vena facta sunt: 2. fac. nat. 9. Vena sanguinem generant: 4. us. part. 17. venis facultas sanguinis generatrix inest, ne dum per eas fertur, tempus ipsi alimento frustra pereat: 4. ejus. 12. quæ ad ventriculum & universa intestina pertinent, inest facultas quædam sanguinis effectrix, qua succum qui ex cibis distribuitur, venis in sanguinem mutare naturale est, priusquam is ad hepar proveniat: 3. temp. 2. vena concoquendi instrumenta sunt: de diff. morb. 7. vena affectus obstat, quo minus sanguis utilis gignatur: 4. san. tuend. vena, qua ad intestina pertinent alimenta ad se rapiunt, mox in ipsis venis quoque ab alia in aliam traditur, ad eundem modum quo ex ventre in Venas hinc vero jam plane confectum in singulas animalis partes protrahitur, ubi tertiam concoctionem natum ipsi alendo corpori assimilatur: sic 2. plac. 8. in venis qua ex hepate in ventriculum pertinent primum sanguis generatur unde & com. 1. in 6. epid. 5. Joubertus de cad. 1. parant. 4. inquit, venas sanguificationi & perfectæ concoctioni inferuire: hepar vero vas affundi, ut cohereant, vasa stabilire, calore suo hematofin promovere. Fallopius inquit, portam chylum elaborando in sanguinem commutare.

IV. solum

IV. solum jecoris carni non venis vim ascribit. Gal. 4. us. part. 12. caro hepatis primum sanguinis gignendi organum: cap. 17. in hepate est velut officina sanguinis gignendi. Vesal. jecori quicquid humidum succulentumque à ventriculo conficitur vena portæ ramis, ex ventriculo & intestinis porissimum depascentes, offerunt. Quod vero iidem ramis prorsum quam jecori succulentum id porrigant, rudem aliquam sanguinis formam illi conferant, ut Galenus attestatur, modo jecori similimo ipsum præparent, non facile concessero &c. Idem nullam sanguificationis vim membraneo & coriæ vena corpori assignare possum &c. Columbo, chylus à portæ & ejus ramis ad jecoris concavum deferitur, ac per ejus venis vim sanguificandi penitus denegat.

V. & hepar & venas sanguificandi instrumenta statuit. Gal. 3. temp. 2. alii & hepar & venas concoquendi instrumenta vocant: sic 2. plac. 8. & venas mesaraicas & hepar & venam cavam alimentiprincipia dicit. 4. us. part. 17. ubi vim concoctricem chyli qua in intestinis inest, confert cum sanguinis in venis coctione & vim concoctricem ventriculi, cum sanguificatione in hepate confert. Idem innuit art. med. 6. 2. fac. nat. ubi hepar virtutem scil. concoctricem venis tribuere dicit. Fernel. 6. Phys. 3. Thomas à Vega in art. Laur. 4. an q. 2. Archang. Piccilhom. Sed quomodo id fiat, an bificationem considerant: venis omnibus hepatis proximis, vim insitam coquendi, alterandi, immutandi tribuunt: ruborem vero solam hepatis carnem, quia sola rubeat, tribuere. Quare sanguinem in venis coctum, per mediam hepatis carnem transcolari: Archangelo absoluta sanguificatio in radicibus portæ fit, vi sanguificandi à carne hepatis accersita, insurgere desiderium sanguinem sibi superfluum, quamquam optimum expellendi, simul quoque exurgere radicibus vena cavæ desiderium, illum exsugendi, rapiendi & in omne corpus distribuendi.

præbet, quare $\chi\mu\mu\alpha\ \tau\acute{\iota}\varsigma\ \tau\epsilon\phi\acute{\eta}\varsigma$ Hippocrates nominavit. At cum assumptorum diversæ fuerint partes, non omnes in laudabilem sanguinem mutari potuere, quare e modo, quo in primâ coctione, quæ in ventriculo & tenuibus fuit intestinis, alvinæ faeces segregatae fuere; sicut secundæ coctionis principio, quæ fuit in Mesaraicis, crassior & feculentior pars à chylo segregata fuit, & Lienî demandata: in ipsa vero venarum hepatis coctione, duo excrementa secreta fuere, ne simul cum sanguine permista, per totum corpus ferantur, q̄ per proprios meatus in sua receptacula reponuntur: & quidem primo biliosum excrementum, quod partim in vesiculâ partim ad intestinum mittitur, ut jam dicturi sumus: dein serosus humor, ubi jam ex radicibus portæ ex hepate in Cavam sanguis delatus, majorem feri partem, cum venis "onus sit alienum, tenes per emulgentes ex Cava (cum in hac quoque vena sanguis * multo adhuc humore tenui & aquoso plenus sit) quemadmodum & per arterias, ex Aorta attrahunt.

x Gal. 4. us. part. 6.

y Gal. 4. us. part. 17.

Sanguis ab excrementis repurgatus per Cavam ejusque ramos per totum corpus distribuitur, & alteratur, ne, dum per eos fertur, tempus ipsi alimento frustra pereat; & Cavæ ramis feri partem secum vehant, quo per tenuissimas capillares venas ad partes corporis alendas deduci possit, & carnibus adspersi, qui paulatim vaporis, rotisve modo in totum dispergitur, adhærescit glutinis instar, & demum alimentum fit, quod & humidum radicale, & partium substantiam nutriendo & restituendo, conservat. At feri illa per venas lata portio, tanquam inutilis in tertia coctione seu nutritione, quæ in omnibus fit partibus, per sudorem strigmenta sive sordes cutis & insensilem transpirationem, expurgatur.

Quo vero sanguis hic omnibus partibus viventibus alimentum aptum sit, spiritus & calore vitali ut illustretur necessum habet, sine quo nutritioni inutilis est; quam ob causam natura venas & arterias in toto corpore mutua anastomosi jungi & ostiolorum apertione transfundi & sanguinem & spiritum, per vias quasdam plane invisibilesat-

les atque angustas, ut plenius in Arteriâ usu dicetur. Nam alimentum alendo quodammodo simile esse debet, similitudo vero cum viventibus in sanguine comparatur ex colore & spiritu illo, quippe eisdem talis fere efficitur, quales partes viventes existunt: quod Gal. pluribus locis insinuavit: & id forte Aristoteles voluit dum Cor sanguinem generare asserit: hoc est id alimentum aptum partibus viventibus efficere: & Averroes sanguinem in hepate præparari, in corde perfici asserit, qui tamen ad alendum inutilis sit, ni cordis & arteriarum facultas affulserit.

De vesica biliaria.

CAPIT. XLV.

Aristoteles 2. hist. anim. 15. Galenus 4. us. part. 12. & 13. 5. us. part. 4. 6. & 7. 6. admin. an. 2. & 12. de hac vesica egit.

Vesica [t. 29. PP.] biliaria, ^a quæ ^b *κυστις* ^c *χοληδόχος* nominatur, ^e bilis flavæ synceræ receptaculum est, in dextra & cava [tab. 37. BB. hepatis parte (quo citius bilem recipiat) sedem habet: at hepatis sinus insculptus est, quo superior, & media vesicula pars ei tenacissime connectatur; altera parte extra hepatis corpus propendente, ubi dextrum ventriculi latus & colon attingit, utrumque sæpe flavitie tingens, & succo per tunicas exsudante imbuens: unde forsitan quibusdam perpetui stomachi ardores.

Figura [t. 37. f. 2.] est oblonga, ^d ne à ventriculo comprimatur, subrotunda, concava, quæ sensim angustior reddita in cervicem definit. Parva est, ^e lienis & renum respectu, licet succum tenuitate ac copia (inter eum, quem lien & renes attrahunt) medium trahat: quod aliis instrumentis omnibus hepar purgantibus, commodiorem & orificiorum trahentium majorem numerum habeat.

Substantia ^f membranosa, quo repleta dilatari, & inanita subsidere possit: duplici enim membrana donatur, altera à peritonæo fibris carente, qua ea sola pars, quæ extrahetur hepar propendet, cum sola propugnaculo indigerit, vestitur, eaque hepatis cavo alligatur. Altera propria, tenui densa & forti, talique proprietate prædita, ut à bile, à qua tamen reliquæ membranæ afficiuntur, non lædatur; quare licet una sit, robore tamen & densitate suppletur; omni fibrarum ^h genere donata, quo ipsius substantia firmior sit, & dilatationi aptior, rectis interioribus, transversis exterioribus; obliquis paucioribus & mediis. Hanc substantia quædam crustosa ex excrementis tertiæ coctionis ipsius vesicæ genita, ne à bilis aerimonia lædatur, succingit. ⁱ

Vasa habet; venas duas graciles, à Portæ ^k trunco cysticas [t. 37. f. 2. g. t. 38. f. 1. PP.] gemellas, quæ (ut in alba oculi tunica) ad nutritionem distribuuntur cum sanguine, ^c Aliis bursa quem-

V 2

quem-

cholera citrina.

d Forma oblon-

ga & rotunda longioris cujusdam pyri modo, Vesal. & Laur. Figura oblonga, Columbo: longiuscula & rotunda pyri modo angustata, Plat. Figura globosa, sed excavata & oblonga pyro minusculo equalis, Piccolhom. e Gal. 5. us. part. 6. f Membranea nervæque Vesal. & Plat. nervosa tenuisque substantia Fallop membranea, Columbo & Laur. g Aje-
coris tunica, Vesalio. h Gal. 5. us. part. 11. Laurentius ait intus rectis allicere, obliquis retinere, foras transversis expellere. i Piccolhom. & alterum usum addit, ne assiduò flexu & reflexu bilis, facies interior callosa reddatur, & sic ora
venarum excrescant, nec sanguinem pro nutritione alliciant, & sic vesicula contabescat. k Gal. 5. us. part. 8.

^a In quibusdā animalib. non est vesica, sed soli pori bilem ab hepate ad tene intestinum velut derivant

^{4. us. part. 12.} Quos vero homines vesica carentes Arist. 4. part. an. 2. refert & Plin. l. 11. c. 37. quos vitæ firmissima affirmant, ha-
denus non vidimus.

^b Piccolhom. dicta videtur, à πύρ & κύστις quod est vas piscatorium, quo ut capiuntur pisces, ita cysti capitur bilis.

^c Aliis bursa

1 An nutriatur quemadmodum omnes corporis nostri partes non bile ¹ nutriatur: & per alia [t.37. bile, vide Piccolthom. Juberet paradoxon scripsit, ratio- nes affert. Ve- rum sanguine ali constat ex Gal. 5. us. part. 7. & 12. bilem familiaritatem quadam traho- re, qua delecte- tur 5. us. par. 10. quare acrimo- nia non leditur & quia humo- ris attritu as- sueta, non pati- tur. m Gal. 5. us. part. 7. n Arteriam & nervum ab his, qua in viscus inseruntur, parvum utrin- que admodum & vix conspi- cium 5. us. par. 8. ha quia par- va admodum nonnulli vesi- cula denegatas censuerunt, Piccolthom. plu- rimi circa fellis vesiculam desi- nunt, ut bilem feculentam & chylo arteriali segregatam eo transmittant. Varolius. o Gal. 5. us. part. 8. sic Piccolthom. nonnulli propter parvitatem non videntes denegarunt, quia cum bilis acris, non debuit sensum tristem percipere. p Fundus sursum spectat cavo jecoris adherens, Piccolthom. * Asclepiades volebat bilem non a sanguine in hepate secerni, sed in ipsis venarum conceptacu- lis generari: contra Galenus meatus & ductus manifestos ad bilis expurgationem demonstravit. Sic Rioli in sch. anat. & Anthropol. superstitiose super poris cholidochia rixamur quicquid effugiunt & in arte medica nullius sunt momenti. q Vide 4. us. part. 11. & 13. item 5. ejusd. 6. praeferrim 6. ad anat. 3. r Gal. 3. fac. nat. 13. quemadmodum hominis excre- quendam multam delectabilia sunt: ita vesicula, ipsa bilis: voluit vesicam appetere & attrahere bilem a jecore per canalem duodenum. Sed 2. acut. tex. 31. voluit bilem recta propelli a jecore in duodenum. t Hoarnius in instit. quolibet triduo excrementum attrahat: hac autem bilis purum & syncerum excrementum est, quare a vesicula attrahi non poterit. Pars enim omnis trahit ut tracto fruatur, trahendi causa est familiaritas & cognatio, qua intercedit cum eo quod tra- hitur. At vesicula membranosa simplicitate tunica constat: non potest igitur bilem attrahere, neque ea oblectari: alioquin

Dividitur in fundum, cervicem & meatus bilarios. Fundus [t.37. f. 1. & 2. P. t. 38. f. 1. A.] amplior vesiculae pars est, qui inferiora respicit, [t.38. f. 1. hoc ostendit] quan- do cum hepate in sua naturali sede est: rotundus est, a bile quam continet flavo co- lore tinctus, aliquando & nigro, cum bilis diutius retenta exurit, & in calculos le- vissimos & multiformes condensatur.

Cervix vero, angustior [t.37. f. 2. b.] vesiculae pars est, quae fundo multo durior est, cujusque fini sinus [t.38. f. 1. B. f. 2. t.] peculiaris apponitur: est & oblonga, superiora respiciens, & paulatim in angustum meatum [t.38. f. 1. C.] desinens, qui semicircula- rem figuram efficiens, in portum bilarium [t.38. f. 1. H.] finit, ubi Valvulae tres bilis re- gressum impediunt sitae sunt & meatus communis [t.38. fig. 1. I.] constituitur, per quam natura post bilis fructum biliosam, eam ad intestina transmittit.

Meatus duplices sunt (qui πέποιτο λέγεται, quia bilem deferant, dicuntur) cum bi- liosum excrementum ab hepate bifariam expurgetur * impermixtum nimirum & syncerum: dein permixtum & crassum, ex Galeni 9 sententia. Bilem enim imper- mistam exakteque synceram, vasa [t.37. f. 2. Q. Q. Q. t. 38. f. 1. DDD. f. 2. aaa.] in hepate inter cava [t.37. f. 2. S. t. 38. L.] & portae [t.37. f. 2. R. t. 38. f. 1. E.] radices disseminantur, & simul in unum [t.37. f. 2. b. a. tab. 38. fig. 1. E.] meatum juncti ad se trahunt, & in ve- sicula effundunt, quae ibi aliquandiu coacervata, donec copia gravis & naturae molesta sponte fluat, t vel hepatis compressione (& ut quidam volunt) in eadem quidem animalibus ex vesicula ab hepate leviter compressa, brutis vero a ventriculo) expel- latur per canalem communem desinit: qui meatus tenuissimus, ita ut specillum vix admittat, praecipue ubi membranulae a. [t.38. f. 2. X.] bilis regressum impediunt, circa

chylo arteriali segregatam eo transmittant. Varolius. o Gal. 5. us. part. 8. sic Piccolthom. nonnulli propter parvitatem non videntes denegarunt, quia cum bilis acris, non debuit sensum tristem percipere. p Fundus sursum spectat cavo jecoris adherens, Piccolthom. * Asclepiades volebat bilem non a sanguine in hepate secerni, sed in ipsis venarum conceptacu- lis generari: contra Galenus meatus & ductus manifestos ad bilis expurgationem demonstravit. Sic Rioli in sch. anat. & Anthropol. superstitiose super poris cholidochia rixamur quicquid effugiunt & in arte medica nullius sunt momenti. q Vide 4. us. part. 11. & 13. item 5. ejusd. 6. praeferrim 6. ad anat. 3. r Gal. 3. fac. nat. 13. quemadmodum hominis excre- quendam multam delectabilia sunt: ita vesicula, ipsa bilis: voluit vesicam appetere & attrahere bilem a jecore per canalem duodenum. Sed 2. acut. tex. 31. voluit bilem recta propelli a jecore in duodenum. t Hoarnius in instit. quolibet triduo excrementum attrahat: hac autem bilis purum & syncerum excrementum est, quare a vesicula attrahi non poterit. Pars enim omnis trahit ut tracto fruatur, trahendi causa est familiaritas & cognatio, qua intercedit cum eo quod tra- hitur. At vesicula membranosa simplicitate tunica constat: non potest igitur bilem attrahere, neque ea oblectari: alioquin

appetitum animale habet præter naturalem, qui satiat nutritione facta per sanguinem, quem cystica gemella suspendunt a Valvulis, quas in medio canalis fixit & sinxit Laurent. nunquam potui observare, sed egressum vesicula arctissimum esse deprehendi & cervicem internam multis rugis interceptam vidi, ne tam facilis & lubricus bilis descensus esset. Adde: si bilis ab hepate delapsa usque ad medium canalis hepatici perveniret, ubi cum altero canali cystico jungitur & mutato cursu viam inflecteret ad vesiculam, propter impedimenta & obstacula ex membranis oppositis, non facile cervicem permearet, Riolo.

circa Cervicem extant. Canalem communem vocamus [t. 38. f. 2. z.] eam partem, in quam canalis exsticus & canalis hepaticus velut in unum meatum ad canalis hepatici (cujus pars est) fere medium conveniunt, & in intestinum jejunum infigitur. Biliolum vero crassum, & permixtum excrementum, ab hepate trahit alter meatus, Porus bilarius hepaticus dictus, qui etiam in iis animalibus ³ quæ vesicula carent semper adest [t. 37. f. 1. & 2. c. t. 38. f. 1. H. f. 2. yy.] & quandoque ab hepate bifurcatus, mox tamen ramulis in unum coalescentibus egreditur, inferiore membrana omenti suffultus, qui vas est oblongum, quod ab hepate ⁴ circulari etiam figura inferitur, non in ventriculi fundum, ad quem si conflueret ⁵ sua acri & mordaci facultate, omnem ventriculi actionem, ipsam scilicet concoctionem corrumpere, acrimonia sua ventriculi tunicas eroderet, cardialgiam continuam & vomitum perpetuum caufaret & sua mordacitate ventriculum ad chylum, antequam concoctus sit, excernendum irritaret: non ad sedem, idque non tam ob metum ruptionis ob viæ longitudinem, quam ut excrementum hoc dum excernitur, (hoc enim meatu obstructo icterus fit & excrementa alba sunt) pituitam plurimam etiam in tenuibus intestinis coacervatam incidat, internam eorum superficiem ⁶ detergat, & cum facibus in crassis intestinis collectis permista, ad excretionem sollicitet, quo una cum siccis excrementis per alvum rejiciatur: sed ad intestina tenuia, & quidem non ipsorum principium, ne bilis conficiens in ventriculum feratur, (quamvis, ubi ipsius consociata adest, ⁷ ad ventriculum regurgitare consueverit, quod biliosis naturis familiaris est, quoties his jejunis venter diutius torquetur) sed in duodeni ⁸ finem [t. 37. f. 2. d. t. 38. f. 1. M.] ad jejuni principium, inter utramque intestini tunicam duorum circiter transversarum digitorum longitudine oblique deducitur, ejusque interiori ad bilis evacuationem perforat, cujus extremitati inferiori, aliqui membranulas laxas ⁹ præpositas volunt: sed potius à membrana interna exteriori à chyli transitu proximius juncta (quo modo Ureteres membranas vesicæ subeunt) quæ intestino vacuo ab exteriori secedens, orificio dehiscens, bilem affluentem elabi finit: vel interioris tunicæ rugis archæ junctis foramen occudentibus, ne quid regurgitare possit. V 3

vehat, à quo deim bilis in duodenum precipitetur appellat Piccolhom. ¹⁰ cur in ventriculum non infixerit natura portione porum, cum non pauca bilis in eo generentur, vide 5. us. part. 4. u Gal. 5. us. part. 4. x Hipp. 4. de morb. trahit ad se folliculus in hepate quicquid illic biliosus inest: & si de repente copiosa bilis extiterit, hepar homini dolet, & copiosa ex ventre signatur: hoc enim si contingit, venter bilis propter multitudinem ad ventriculum fertur & inde termina in ventriculo oriuntur, & ipsius pars quadam per vesicam, pars vero per ventrem foras procedit. Vesalius biliosis naturis familiaris est, quoties his jejunis venter paulo diutius torquetur. y An duodeno vel jejuno affigatur. Gal. 6. ad. an. 12. ad intestinorum productionis initium: at 2. temp. 6. pylori & jejuni medio & quibus meatus unicus est, iis roga bilis in jejunum influit. Vesal. duodeno non procul à jejuni principio: Fallopio, ad duodeni initium: Varolo, duodenum intestinum ingreditur. Platero, per duodenum infusa: Laurent. in cephyfin: Columbo ad jejuni summitatem Riolo, in confinio duodeni & jejuni affigatur. z. Dux membranula ad orificii latus, Ves. quas etiam Sylvius admittit, scribens geminam membranulam porum bilarii osculum claudentem à bile everti. Riolo. nulla sunt valvula membranosa in extremitatibus duodeni.

a Sylvius, raro fit: aliquando bifidus a parvo interjecto spatio in idem intestinum inseritur, & bigeminum, solum permistam ad intestinorum facultatem post chyli exsuctionem ad feces excerpis simplicem: nendas irritandam, & pituitam (quam natura ejus tunicis adhærere voluit, ne à nimia bilisacrimonia lædantur) deturbandam, cum bile defert. Velum sæpe & crassa qualis est vitellina, æruginosa & isatodis, quæ in sanorum etiam hominum hepate sæpius generatur, per hunc quoque porum, fusque deque in Cholera morbo vacuatur, in quibus canalis hic dilatatus minimi digiti latitudine, vesicula valde turgente reperitur.

2. temp. 6. 2. Tertius meatus b nonnunquam, præsertim in quadrupedibus reperitur, qui divisio quædam est vasis, quod ad duodenum fertur & in ventriculum inseritur: & hi infelices dicuntur natura, & μικράλοι δυν, quod perpetuis vomitionibus biliosis infestentur: quemadmodum si meatus qui ad duodenum fertur, aut amplior sit quam oporteat, aut ad intestini jejuni finem desinat, hominem dejectionibus crebris vexat, & aliquando cum torminibus bile abradente, & hi μικράλοι ησπίτη appellatur, horumque dejectiones perpetuo biliosæ sunt.

Ufus vesiculæ c bilem flavam impermistam, exacteque d synceram (cum non per ampla orificia, ut lien & renes, sed angustis prorsus finibus vasorum à seipsa in hepar immisissorum, succum hunc attrahat) ipsique familiarem, quæ extra venas est ab hepate, quæ alias per univrsum corpus delata, plurimum obfusilet, icterum causasset, suscipere, continere e & expellere.

An vero bilis in vesicula collectio ad vitam necessaria sit, dubitamus, cum veteres vitam

bus naturaliter dari, cujusmodi sunt falco, accipiter & id genus rapaces aves, quæ crudis carnibus vescuntur: quia majore calore ad coctionem indigeant. At Argenterius in rapacibus animalibus hunc canalem reperiri negat, quem in lupis & vulpe invenire non potuit. Carolus Stephanus in multis corporibus duos canales vidit, per quos bilis flavæ excernitur: quorum alter in ecphysin prope jejunum mittebatur, ad facilem excretionem: alter priore minor in fundum ventriculi inserebatur paulo supra pylorum: & hoc est quod Gal. 1. alim. fac. 1. notavit, quodam minori negotio bubulam carnem, quam saxatiles pisces conficere, quod accidit ob peculiarem constructionem, qua quibusdam hominibus bilis è jecore ad intestina defluens in ventriculum regurgitat. Auctor lib. de an. vivæ vesicula biliaris tres canales adscribit, quorum unus ad ventriculi fundum, quo bilis ad digestionem roborandam transfertur: alter ad jejuni principium dirigitur: tertius qui bilem ab hepate sugat. Vesalius in uno tantum eoque remige observavit, qui ramen vomitionibus obnoxius non fuerit, ne quidem in maximis procellis nausea tentatum fuisse. Columbus constanter fatetur, se nunquam vidisse, sic & Fallopius: aliquando Anatomici invenerunt aliud ductum, qui est ramificatio vasis, quod ad duodenum fertur & in ventriculum inseritur, Mercat. de part. q. 116.

c Bilis ut repurgetur opiniones: I. est communis sententia, quam Sylvius, Vesal. Colum. Laur. & plures alii sequuntur, talis est vesiculam omnem bilem excrementitiam à jecore ad sanguinis defecationem allicere, quæ vesicula onusta, per cervicem ac porum biliarium in duodenum deponere. At Fallopius & Archangelus volunt bilem ab hepate ad intestinum primo deferri, at cum non semper egeat bile, nec pateat semper ob meatum in intestino à chylo occlusum, ne sursum in hepar remeat, & sanguinem iterum infuset & conspurcet, in vesiculam deferri, ibique contineri, donec meatus in intestinum pateat. Laurentius rationibus & experimentis Fallopii opinionem falsam esse probare nititur. Sed huic Fallopii opinioni Valvula, quæ circa cervicem vesiculæ, resistunt.

III. opinio est Galenijam proposita: & Rioli, Julij Jasinum novam nec absurdam de bilis excretionem opinionem ex doctrina Galeni de promptam proposuisse, quam Bauhinus secutus sit, nec eam sufficienter Anthonium Alvarum rassel, cujus inventum censeo posse in aliquibus corporibus contingere, quæ præter naturam & modum communem sunt constructa: quippe nullus Anatomicorum id observavit, nisi id natura errante contigerit.

d Gal. 5. us part. 6. c Nemescius libr. de nat. hom. flavam bilem sub hepate per se, atque per aliud reconditam fuisse scribit:

scribit: nam ad coctionem confert & excrementorum depulsionem movet, simulque calorem quandam corpori instat v&salis facultatis praebeat. Vesal. subtile commentum, bilem in vesicula asseruari ut jecur à putredine vindicet: verum sic ple&risque corporis partibus, vesicula bilis, ne putredinem contrahant, adhibenda essent. At Rioli. absurdum non est, et si Vesal. vident, fellis vesiculam suppositam & immensam fuisse jecori, ut bilis contactu & affluxu jecur à putredine vindicetur.

vita diuturnioris causam in fellis vacuitatem retulerint, argumento à cervis f deducitur Arist. 4. part. 4. & quae felle carent & diu vivunt. Contra Fernelius scribit non paucos è vivis creptos fuisse, in quibus non alia interitus causa comparuit, quam quod folliculus bile omnino exhaustus esset. *an. 2. & Plinius l. 11. c. 37. ait, sed hominum paucis non est, quorum valetudo firmior & vita longior. Idem testatur non omnibus animalibus fel datum, in Eubaea Chalcide nullum pecori, carent eo quia absinthium in Ponto vescuntur: quod Dioscorides cap. de Absinthio verissimum esse credit. g. 6. Pathol. contra Nemesius, vide lit. e. in marg. & Rioli. necessariam putat, quia in hominibus strangulatis, qui dum necem suam expectant, per duos vel tres dies inedia sese faciunt, folliculus nunquam felle vacuus apparuit, imo plenus & turgidulus neque in bobus, qui per dies quatuor fame macerantur priusquam jugulentur, cystis bile exhausta invenitur: adde quod foetus auluc utero conciniscus, vesiculam bile plenam habet.*

De Ventriculo.

CAPUT XLVI.

Consule Aristotelem 1. hist. an. 16. 2. ejusd. 17. 3. par. anim. 14. Galenum 4. us. part. 7. 6. ad. anat. 7. qui de tunicis & fibris egit 4. us. part. 8. quemadmodum lib. 5. c. 11. de fibris & cap. 12. & de tunicis & de utrisque ejusque situ libro 4. cap. 8. de ipsius nervis 9. us. part. 11. sic 6. ad. ana. 3. egit de differentiis ventricularum, quae pro ratione alimentorum, quibus animalia vescuntur, obveniunt.

Ventriculus tanquam parvus venter, qui *κνίλιος*, à cavitate, & *κασιγὴ* b (rectius *κασιγῆ*) c dicitur, cibi & potus commune est receptaculum, & corporis nostri a *Arist. 1. hist. 16. 4. ejusd. 3. 3. part. 14. Hipp. 6. epid. sect. 3. & 4. mdd. Hipp. de carnib. Apud Hipp. κνίλιος καὶ κνίλιος omnem cavitationem insignem significat: aliter, quando & parvas cavitates,* culina: homini d & animalibus utramque maxillam dentatam habentibus, unicus est; ruminantibus, d quae alteram tantum maxillam habent, quadruplex: pennatis vero aliquibus t duplex, de quibus omnibus Aristoteles ingeniose, etiam Galeno e monente egit.

Situs est non prope os, nec in thorace, cum nullus ibi sit locus, propter instrumenta respirationis & vocis, quae loca pectoris explent: dein, quia ossibus circumdatus est, quod ipsius extensioni impedimento fuisset: sed necessario in ventre inferiori, [t. 12. FF.] cum facile extensioni cedat, repositus est; & quidem in ejus par-

& meatus. b Hipp. καὶ κνίλιος & Galeno. c Ut Aristophani. d Arist. 2. hist. an. 17. quadrupedes oviparae, cornigerae, altera maxilla dentata, quaternos habent sinus. Gula ab ore ad ventrem se applicat majorem, qui intrinsecus asper ac prope gula commissuram: 2. sibi sium adnexum habet, quem Reticulum vocant, intus similis reticulis mulierum implexis, ventre minor. 3. hunc excipit Omasum, interius asper, cancellatus, crustatus, magnitudine reticuli. 4. Abomasum venter ab eo jungitur Omaso amplior magnitudine forma longior, cancellis intus & crustis multis magnis & larvibus: max. intestinum sequitur. Idem 3. part. ca. 14. venter, Arsinum sive reticulus: Omasum, Abomasum. At Piccolhom. ruminantibus geminum tribuit. t. καὶ λαβὸς καὶ κνίλιος, ingluviem & ventriculus Arist. 2. hist. 17. e Meum non est de his agere, cum de iis ingeniose Aristoteles: satis habemus, si solius hominis constructionem ad usum exponere possimus, ait Galenus 4. us. part. 17.

te, quoad fieri potuit, suprema, quo cavitati oris vicinus foret, cui per fistulam gulam dictam jungitur: proxime sub diaphragmate inter [t. 12. CC. *hepar G. lienem FF. ventriculum notat*] *hepar* & *lienem* inst. *ir lebetis* inter duos f. eos quo ab his incalcescat (an ergo verum Ventriculi calorem ab hepatis calore intenso minuit?) in medio s. quasi corporis transversim inter utrumque hypochondrium, quo cum intestinis continuaretur, non tam ob chyli distributionem, quam ut excrementa ^h commodius demissiore parte reponantur, ne tetrus vaporibus cor & cerebrum conturbent: maiore parte ⁱ sinistrum hypochondrium [tab. 12. *ostendit*] occupat, quia hoc plus vacuum est, & propter orificii, quod superius dici consuevit, implantationem per quod cibaria recipit, quo hepatis dextrum latus [t. 12. CC.] possidenti cedat, & hepatis pondus ad lienem compenset, sicque corpus in æquilibrio sit. Anterior nudus est, maxime cum turgit (contractus enim magis sub hepate occultatur) ut tactu facile deprehendatur; quare frigore facile afficitur, ejusque nomine præ reliquis partibus, quo melior fiat concoctio, custoditur: dextra vero superiore & aliquantum anteriore parte hepatis cavo [t. 12. F. sub C.] subjacet, & ab eo ^k amplexatur, ut ventriculi calori fomentum addat: à sinistris maiore sui parte diaphragma contingit, quare admodum repletus, diaphragmatis motum impediendo, dyspnoeam causat: sic sinistrae posteriore & humiliore parte Lien [t. 12. G.] substernitur: posterius autem sunt spina cui incumbit velut propugnaculum quoddam densum, & lumborum muscoli, tanquam substerniculum molle simul cum pinguedine adnata, quæ etiam ventriculum calefaciunt: inferius intestinis & omento adjacet, eique colon [t. 12. KL.] omenti interventu subtensum est, unde utriusque consensus non solum in colico dolore, sed etiam sumpto medicamento, sæpius nausea vomitusque causantur, hac excrementis ad rectum pertranseuntibus. Verum ad ventriculi latus sinistrum sub diaphragmate cavitatis membranæ inclusa occurrit, quam forte Hippocrates ⁿ intellexit, dum inter ventriculum & septum pituitam colligi scribit, quæ dolorem adferat exitum non habens ad ventrem, at morbum solvi ubi pituita pervenas ad vesicam mittatur.

Magnitudine ^a varius est cuius magnitudinem, licet Hippocrates quinque palmorum longitudine definierit, attamen certa non est, cum corporis magnitudinem sequatur, cuius proportioni respondere debet, alias morbo in magnitudine ^y laboraret. Verum exemptus [t. 39.] & inflatus multo major est, quam in corpore esse possit, attamen sive multum sive parum contineat, totum id ita proxime complectitur, ut nihil vacui relinquat, quo rectius concoctio perficiatur. Hinc Galenus: ^d quando Ventriculus retentrice facultate utitur & coctioni incumbit, tunc utrumque orificium arctissime coactum clauditur: quando expultrice utitur, omnia constringit, sed meatum per quem evacuare oportet quod propelluntur, aperit. Ejus tamen magnitudo ex oris magnitudine cognoscitur, tales enim voraces sunt. Ne vero repletus ^p odere suo decubaret, connectitur orificio sinistro (œsophago [t. 39. fig. 1. 2. G.] continuatus) ipsi ⁱ diaphragmati: dextro [tab. 39. f. 1. & 2. H. cum P.] duodeno jungitur: parte posteriore & superiore spinæ incumbens, primæ lumborum vertebræ incumbit: inferius ^m vero, omento; alibi liberum, quo liberius distendi possit: ipsius denique fundo, & præfer-

g Gal. 4. usf.
part. 7. in medio corporis pos-
situm assertit,
et cum eo ple-
rique Anato-
mici: quod de
superiori orifi-
cio dici posse,
non autem de
ventriculo,
vult Vesalius.
h Gal. 4. usf.
part. 7.

i Licet Gal. se-
cus sentiat, ait
Columbus,
quod inspectio
et ratio impro-
bant, Piccol-
hom.

k Gal. 4. usf.
part. 8.

a 7. aph 54.
p dilatarum ad
umbilicum us-
que pervenire,
Columbus vo-
luit: et cum

copiam nimiam ur-
get, etiam lon-
gius progredi,
censet. Piccol.
y Gal. art. med.
c. 71. cuidam
ventriculus
adeo parvus et
rotundus, ut
circumscriptio
propria et vi-
dentibus et tan-
gentibus appa-
reret.

d 4. usf part. 7.
l Non spina ut
plerique credi-
derunt, Piccol.

m Alii somniant anteriorem ventriculi sedem omento integri, Vesal. parte anteriore epiploon tanquam tegumentum obtenditur, Lauren.

praesertim pyloro, [t.39.f.2.HP.] & duodeno Pancreas, ut ea suffulciat [t.39.f.2.3.] n Gal. & quae
substernitur.

Figura [tab.39.] est o rotunda, quo p capacior sit, minasque laesioni obnoxius: *privatim tri-
buunt: Pan-
creas & quae
conferunt
auxiliari vo-
lunt, verum
tum necessario
orificium am-
biret & fibras
haberet, ut
sphincter, qui
dam libris edo-
fi, orbicula-
tim inferius ori-
ficium ample-
xi volunt, Ve-
sat.* quadantenus oblonga, q propter duo ipsius orificia, quae barbito q pastorio sive ti-
bia utriculari, similem faciunt; si duodenum adhuc junctum sit (in quadrupedibus
magis sphaericus est, quia dorsum habent acuminatum) quae pars cava est, quemad-
modum ea quae intestina respicit & tangit, convexa. A sinistris [t.39.f.2.M.] & in-
fundo amplior & rotundior, qui dextrorsum sensim attenuatur, ut hepatis cedat &
cibus inde gradatim recedat, quare dormituri conducit primum sinistro lateri usque
ad coctionis absolutionem incumbere, dein vero dextro: antierius [t.39.f.1.LL.] x-
qualiter gibbus; posterius [t.39.f.2.M.N.O.] dam adhuc in corpore est, duos gib-
bos ostendit, sinistram majorem, dextram minorem & depressiorem, inter quos si-
nus, quos ventriculus exemptus & inflatus non ostendit, & propter dorsi vertebrae,
[t.39.f.2.O.] & ut trunco Cavæ & Aortæ descendenti cedat: at in canibus, & ceteris
quæ prona incedunt, anterior pars ciborum copia extensa laxior est, quam posterior
& inferior, cum illa fundi officio fungatur. Extrinsecus lavis, planus & albicans; in-
trinsecus, [tab.39.f.4.] cum constrictus est, rugosus, subrubens. Concavus est,
ejusque cavitas amplissima, quo sufficientem cibi potiusve copiam recipiat, ne ob nu-
tritionem assiduo comedere cogamur, sed ut semel repleto, aliis muniis vacare possi-
mus, donec totus cibus una vice ingestus, concoquatur & distribuatur.

Orificiis duobus in elatissima ventriculi regione donatur: altero sinistro [tab.
37.f.1.L. tab.39.f.1.G.] in media fere regione (quod manifestius apparet, quo ventri-
culus magis turgit) circa undecimam thoracis vertebrae, oesophago [tab.39.f.1. & 2.
A.B.C.] continuatum diaphragmati annexitur: quod altero majus est, [tab.39.f.4.
I. respectum.] ejusdem cum oesophago amplitudinis, ne quid hic subsistat: spissius &
crassius altero, ne à transeuntibus divellatur, sed ut semimantos, duos, & crassos ci-
bos, quos magna aviditate famelici aliquando deglutimus citra offensam admittat.
Fibris circularibus carnosis [tab.39.f.4.I.] donatum, ut illud cibo potiusque adsum-
pto naturæ impulsu coarctet, ne fumi eleventur, quos plurimum ad perfectam con-
fectionem facere nonnulli voluerunt: siquidem ii, qui aliquid subito coquere volunt,
ollæ os operculo, ut fumi retineantur, tegant. Dein, ne vapores cor, vel cerebrum
petentes, quod & gulosus, & ob intemperiem humidam sit, vertiginem, hemicra-
niam, suffusionem & scetidum anhelitum causet: quibusdam ob merorem ita con-
stringitur, ut cibos solidos deglutire nequeant. Tum ne assumpta, prono supino ve
decubitu, in oesophagum & os regurgitent. Hoc ob nervorum copiam, qui hoc ori-
ficium admirabili telura cingunt & amplexantur [t.39.f.1. & 2.T.V.e.f.2.X.I.] exqui-
stis

X

Ventriculus oblongus quoniam inferne explanatio ad intestina est: superne autem ad oesophagum ipse idem progredi-
tur. q Sacco fistulam rusticorum refert Plat. in hominibus diversa est figura, modo corneam musam seu fistulam pa-
storalem refert: modo intestinum oblongum amulatur, versus lienem parum intumescens, & ab ea extuberantia quin-
decim aut sexdecim digitorum latitudine, in latus dextrum oblique dirigitur usque ad intestinorum revolutionem: in
muliere Æthiopica, ventriculus oesophago non ampliorem & latiore in intestino demonstravi, quam vis candidior &
crassior existeret, Rioli Gal. 3. caus. symp. 2. ventriculo duo sunt ora supernum quidem in gula, infernum in pyloro.
& 4. us. part. 7. Duplex productio, latior quidem quæ est ad oesophagum: strictior autem quæ inferne. Superne ubi ven-
triculus est strictior, stomachus factus est amplius: inferne autem ubi est latior, explanatio ad intestinū strictior facta est.

* Hipp. 4. aph.

17. 2. epid. 2.

aph. 1. mulieri

cordolebat, cui

in succum ma-

li punici polen-

tum inspergere,

semelque in die

cibum assume-

re profuit. Gal.

1. epid. com. 3. 2.

de plac. & de

caus. symp. 6.

[Gal. 4. us.

part. 14.

1. Triasignificat

1. oesophagum,

ut 3. Meth. 13.

ubi ait oesophago

seu gula, qua

proprie stom-

achus vocatur,

inflammato

spina dorsica-

raplasma impo-

nendum: 2. os

ventriculi, ut

4. de us. part.

stomachum exi-

mio sensu pradi-

tum statuit. 3.

ventriculum us

de cur. ad

Glauc. in sto-

macho crudita-

res fieri, & pi-

uitam coacer-

vari scribit. Di-

citur stoma-

chus xps. 1. ego

xps. 1. ego enim

idem quod os:

Hipp. in Concis.

metonymias s. d. &

quod sub pectore

contineatur, dum

s. d. & deign. &

mixtum, id est,

sterni morsum &

amaro-

rem dixit pro cardiao-

u. A dextris situm. Gal. diff. ven. 1.

x Non ut Anatomici ante Vesalium tradidere in inferiore regione, unde non admo-

recta deorsum fertur, ut sentiunt veterum plurimi, sed superiora spectat, Laur. 2. De hoc inter scriptores controversia

alii glandulas, alii glandulosa corpora sive tubercula, sive prominentias appellant: duo tubercula glandulosa Gal. &

Piccol. in pyloro brutorum glandulosa tubercula, quibus homo caret, Riol. † Gal. 4. us. part. 17. a Gal. de nat. facul-

annulum aureum imprudenter deglutitum prompte excretum refert. Vesalius habet exemplum Hispani qui quadra-

ginta uniones, cum aurea cruce quinque gemmis instructiss. & fide de voravit. Habeo filiolum, qui dum triennis, varti-

culum fusorium deglutivit. b Gal. diff. ven. 10. 6. ad. an. 12. * ex Gal. 3. symp. caus. 2. c Gal. 5. us. part. 12.

lissimi est sensus, ut indigentiam sentiat, quæ vim appetendi excitat, ut animal ad cibum potumque novum quarendum impellatur: quod verteribus *νεφελία*, * cor, quia ei cum corde societas est, quare eo affecto propter exquisitissimum sensum symptomata cardiacis similia (unde Cardialgia) oboriantur, & animi deliquia quæ ad cordis laxationem consequi solent, consequantur, quamvis & cor condoleat, non tam propter viciniam, quam propter nervos ab eodem ramo prodeuntes: aliis os † ventriculi, & vulgo orificium superius, nonnunquam & stomachus † ob amplitudinem dicitur: & cum hoc proprius ad spinam, quam cartilaginem ensiformem accedat, idcirco & parti posteriori ad finem dorsii & anteriori, quod usitatum magis, topica applicari possunt; toto vero ventriculo laborante parti anteriori localia imponemus.

Alterum seu dextrum [t. 37. f. 1. & 2. M. t. 39. f. 1. & 2. H.] orificium quod hepatis portione coopertum † est, in elatissima * quoque parte sursum † aliquantum reflexum, (quatuor fere digitorum latitudine à fundo distans) ne cibis sua gravitate recludat: huic intrinsecus præter fibras transversas, circulus, [t. 39. f. 4. m.] crassior & spissior musculi orbicularis forma, † sphincterisve modo (qui aliquando scirrhum patitur) circumjicitur, quo claudi, aperiri arctari & dilatari naturæ impulsu possit, quod obturatum manet, donec cibis perfecte sit † in cremorem liquidum & humidum mutatus & concoctus: quare & sinistro [tab. 39. f. 4. l. conferatur cum m.] angustius, quod tamen non minus dilatari potest, ut docent fructuum nuclei comesti, & alia † fortuito deglutita, quæ postmodum sine noxa rejiciuntur. Hoc postea in duodenum [tab. 37. f. 1. ad M. f. 2. N. t. 39. f. 1. & 2. P.] sensim laxius redditum & apertum, chylum suo robore, non pondere ad intestina à venis mesaraicis exsugendum, propellit, quare *πυλωρος*, † seu janitor, & communiter orificium inferius dicitur. Ubi ergo à sinistris in summo ventriculus crassior est, ibi principium ipsius est: ubi vero à dextris, ibi ventriculi finis & duodeni initium sequitur. Quod si pylorus nimium laxus fuerit, anhelitum foetidum, dentibus integris & pulmonibus sanis, causare potest, à vaporibus fœdis, ex intestinis continuo elevatis, & oris spiritus inficientibus.

Substantia membranosa & nervosa donatur, quo in repletionem cibi potusque commode extendatur, & iis distributis constringatur, & in maxima ingestorum copia admodum distentus non rumpatur, (nequaquam ergo prope oris cavitatem locari potuit) quæ ventriculo contracto & corrugato, crassa; eodem dilatato, tenuis fit; & in iis, qui crapulæ dediti, adeo ampliatur, tenuisque redditur, ut corrugari amplius non possit, pristinamque firmitatem vix recuperare queat, quæ in gulosis & voracibus sæpe * diuturnioris imbecillitatis ventriculi causa existit: quibus enim † corpus ventriculi gracile, ii deterius concoquunt, quam quibus carnosum.

Mem-

metonymias s. d. & quod sub pectore contineatur, dum s. d. & deign. & mixtum, id est, sterni morsum & amarorem dixit pro cardiao-

Membranis tribus^d donatus [t. 39. f. 3.] seu tunicis; una communi, & duabus propriis; prima quæ extrema & communis [t. 39. f. 3. bbb.] à peritonæo, e qua id diaphragma ad superius orificium succingit, pronata, quæ propriis robur addit; fibris rectis donata, & respectu aliarum à peritonæo prodeuntium, crassissima, cum ab ea omenti superior membrana prodire debuerit. Altera^f tota carnosa [t. 39. f. 3. i.] est fibris carnis & constans, ut illis contractis sponte vomitione excludat, quicquid ventriculo noxium est: nam vomitione ea quæ^{*} in capacitare sunt rejiciuntur: in singultu vero, quæ in ipso ventriculi corpore sunt: quamvis etiam calorem augendo ad concoctionem faciant, cum ad cibos^h coquendos calore vehementiore opus sit. Hæc sequenti immediate connectitur, transversas fibras obtinet [tab. 39. f. 3. i.] quibus obliquæ paucae & carnosæ subjacent, quarum aliquæ ab orificio superiore, unde ortum ducunt, ad pylorum feruntur, plures vero ad fundum versus pylorum descendunt: sub his circa os sinistram fibræ circulares carnosæ, quas orificium claudere diximus, suboriuntur: transversæ vero & obliquæ, si modice ventriculum constringant, cibos amplexatur: si valide, cibum confectum sensum & sine sensu pylorum velus, cum is sursum spectet, & chylus gravis sit, blande propellunt. Tertia interior & nervosa, [t. 39. f. 3. k.] in quam ipsa vasa terminatur, œsophagi tunica, labiorum, k & omnium quæ in ore sunt continua, quo os nihil, quod ventriculo ingratum sit, recipiat, & quia primæ coctionis præparatio in ore fit: hinc bilioso humore vel vapore elevato; lingua amaro & flavitie inquinatur, & sæpe oris ac linguæ exulcerationes ac vitia œsophago & ventriculo, horumque vitia illis communicantur: propter quem consensum caput^l per palatum evacuare non possumus, quin simul etiam ventriculum evacuemus.

Fibratum triplici genere ad robur & firmitatem, intertexta est, quo ventriculus extendi possit: rectis quidem, quas plurimas habet, & præ cæteris conspicuas, quibus ceu^m manibusⁿ cibum (inquiunt) attrahat, obliquis exterioribus retineat, & transversis elaboratum expellat: quæ tam dense intextæ, ut sine distractione non appareant. Est etiam^o rugosa (in ruminantibus aspera admodum & inæqualis, quasi cellulis seu favis distincta) beneficio crustæ carnosæ, quæ ex excrementis tertiaræ coctionis ventriculi pronata, quo eam ab assumptis durioribus tueatur, ne ipsa densiore & callosa reddita, oscula venarum excæcentur, sicque nec chylus à ventriculo exsugatur, nec ipse sanguinem pro sui nutritione allicere possit; ad moderatam quoque ciborum retentionem aliquid conferre videtur, siquidem sua asperitate & corrugatione, ne quidpiam indigestum prolabatur, prohibet: est spongiosa, meatus veluti

X 2

P si-
fior sit inferiore
& Columb.

neutiquam in fundo magis carneam, quam in superiore parte asserit. h Gal. 5. us. par. 12. i Obliquæ adeo exiles, ut quandoque aciem oculorum effugiant: idcirco huic solum transversa attribuantur, Piccolhom. k Gal. 4. us. par. 8. ubi causam explicat. l Noverunt antiqui, per palatum evacuare caput & thoracem, sed quod & ventriculus & corpus totum per palatum evacuaretur, non agnoverunt: non enim possumus caput per palatum evacuare, quin simul evacuemus ventriculum, quod fit propter dictam tunicam, Fallop. de medic. purg. c. 20. m Gal. & Vesal. rectas tribuerunt propter attractionem: at œsophagus omnia quæ devorantur, ad illum deducti, quare rectis non eguit: nihilominus quatuor virtutibus naturalibus præditus est, Columb. n Internamembranosior villis rectis donata, quibus tanquam manibus trahit cibum & potum per stomachum, 4. us. part. 8. o Durior & densior, quam intestinorum, quia ad patiendi difficultatem est comparata, cum duras, magnas & asperas moles sæpe deglutiamus, à quibus facile particula abraderentur, rarior etiam & mollior sit paulatim usque ad fundum ventriculi, ita ut mollior sit, quam in ore. 4. us. part. c. 8.

p Crusta hæc fe-

bris caret, eas

tamen refert ex

adhasu tunica,

ficus cera ex ad-

hasu sigilli, ve-

stigia in cera re-

linguuntur: qua

perspicue cerni-

tur, in lingua

praesertim bu-

bula caque eli-

xata, Piccolb.

habet veluti fi-

bras à centro

ad circumfe-

rentiam, velu-

ti in veluto, nō

vero rectas,

transversas,

obliquas, Fal-

lopius.

q Vesalio mo-

nente, qui ad-

dit nonnullos

ruminantium

omasis deceptos

cellulos & sinu-

bis abundare

falso scripsisse.

[Gal. 3. fac. nat.

& 4. us. part.

ventriculus

chylō reficitur

& nutritur.

Columbo nulla

pars corporis

praeterquam à

sanguine ali-

tur, quare ve-

narum copia

Fallopio in in-

stis exteriores

tunica nutri-

untur à sangui-

ne, interiores à

chylō magis

quam à sangui-

ne, dicant quicquid velint alii t Gal. 4. us. part. 8. u Hipp. de carnibus vena quæ per ventrem & intestina feruntur,

in quibus cibi & potus coacervantur, ubi incaluerint, id quod est tenuissimum & humidissimum attrahunt, crassissi-

um relictum in inferiorib intestinis in stercus abijt. x Gal. 4. us. part. 12. y Gal. 4. us. part. 15. Vesalius ait hujus vena-

munus, quod cum abis fatebor, ar timide, ut si quid lien in ventriculum evulsiat, vehiculum sint, & succulentietiam

aliquid, si autem nunc proloqui, ex ventriculo sugere videntur, forte & chylum exsugunt, & ad lienem deferunt, Plat-

z Gal. 5. us. part. 4. & Avicenna, humor melancholicus naturalis facis vinacea amulus sua adstrictione os ventriculi

stabilis, Piccolhom.

p fibras brevissimas à superficie intima ad exteriorem habens, ut per dictæ crustæ meatus tenuior chyli portio penetrare, & à venis exsugari possit: hæc crusta ab ipsa mēbrana, in brutis, ut bove & cane, etiam in hominis semicocto ventriculo separari potest. Sed neutiquam in fundo carnosior ac crassior est, quemadmodum circa utrumque os; & nonnulli q in sinistro fundi latere in obæsis adipem adnatum asserunt, quem copiosiore, diuturniore inappetentiam causare volunt, non secus ac humor alius dulcis illi adhærens causa est.

Vasa obtinet, venas quidem sex à Portæ vena progressas, quarum aliæ à trunco, aliæ à ramo vel Mesenterico, vel Splenico distribuuntur. A trunco Gastrica dextra, [tab. 39. f. 2. a.] quæ ad dextrum orificium: Gastroepiplois dextra [tab. 39. f. 1. & 2. b.] quæ ad ipsius fundi medium mittitur, à ramo Mesenterico profluunt. A ramo vero Splenico Gastrica minor [tab. 39. f. 2. c.] ad posteriorem ejus sedem: Gastrica major, [tab. 39. f. 1. & 2. f.] à quo Coronaria stomachica, [tab. 39. f. 1. & 2. ddd.] quæ sinistram orificium coronæ modo cingit: Gastroepiplois sinistra, quæ in ipsius fundi alteram partem mediam diffeminatur: & Vas breve [tab. 39. f. 1. & 2. g.] dictum de quibus in Venæ portæ historia egimus. Harum munus est sanguinem pro nutritione deferre, siquidem eo modo quo in foetu nutritur, non autem chylo, quo ipsum quidem oblectari, quæ imperfecta est nutritio, non autem ali, concedimus. Harum aliquæ etiam, dum chylus in ventriculo conficitur, sensim aliquam portionem tenuiorem & subtiliorem (pauca enim sunt, respectu earum quæ ad intestina mittuntur, cum in ventriculo coctio fieri debuerit, intestina vero jam coctum contineant, quem quam citissime distribui conveniebat) exsugunt, & in sanguinem, sic docente Galeno, antequam ad hepar perveniat, cum hoc illis naturale sit, mutant; forte ut eo ventriculi membranæ nutriantur; inter duas enim membranas venæ à splenico ramo propagatæ sanguinem suum effundunt, ob quam causam, Ventriculi fundus potissimum parte sinistra & foris & intus nigricans conspicitur, id quod diligenter notandum, cum hæc nigredo in quibusdam subito mortuis, veneni suspicionem præbuerit. Vel si mavis, dicas, hæc venas chylum exsuctum, modo quæ & mesaraicæ, ad radices Portæ, quæ per hepar diffeminantur, deferre, ut ibi in sanguinem commutetur: hinc citissimæ virium refectioes ex vino odorato, iusculis, aliisque corroborantibus assumptis; quæ non tam cito sequerentur, nisi hepar per eas à ventriculo alimentum exsugeret. Vas vero breve & dictum, quod à Lienis venis in fundum ipsius communiter aliquot ramis fertur, inter ejus tunicas se ingerens sursumque versus orificium repens, sanguinem acidum in ejus fundum, nonnunquam ad os ipsius, ad appetentiam excitandam, quæ tamen proprie ab indigentia excitatur, & adstrictione sua corroborandum, defert.

Arterias habet [t. 39. f. 1. & 2. a. b. d. f.] ab Aortæ ramo Cœliaco, quæ singulas venas, Gastrica.

Gastrica minore [tab. 39. f. 2. c.] excepta, comitantur, vitalis roboris gratia, ut suo motu ventilando à putredine defendant, ipsius calorem innatum suo calore & vitali spiritu foveant, recreent & augeant, quo melior fiat concoctio: sed de his ramis, Cœliacæ arteriæ historiam Lector consulat.

Nervos insignes accepit à sexto pari: ad orificia quidem [tab. 39. f. 1. & 2. T. V.] geminos, à ramis, qui recurrentes constituere & sarculos pulmonibus & pericardio largiti sunt, disseminatos, qui membranis fortibus propter eorum^a molliem, & iteris^a longitudinem obducuntur, & se intersecant, ut oblique securitatis causa fiant; & diaphragma^b transeunt utrinque bipartito dividuntur; horum dexter sinistra & anteriore parte sinister dextram & posteriore [t. 39. f. 1. & 2. T. V. X. I.] oris ventriculi sedem cingit, quæ ita involvunt, ut ex solis nervis compositum videatur, à quorum copia exquisitissimus^c sensus ipsi cõtingit, ut alimeti deficientis sensum, qui ex suctione oritur, excitent, cum ibi sit sedes appetitus, huicque soli^d sensum indigentia seu famis animalis natura tribuerit: eam enim partem, potissimum cum vehementer^e esurimus, contrahi sentimus; quam ex suctionis molestiam, si non per sentiremus, substantia nostra perpetuo diffuente, innato calido humidum continuo pabulante sine sensu flaccescentes, fame non percepta, sensum extinguemur, cum fames naturalis singulis partibus insita, tristem sensum copulatum non habeat, quæ sola assimilatione sedatur. Hi ramis deorsum missis, membranas ejus, quæ alias solum membranosa forent, nervosas reddunt, cum ad fundum^f usque disseminentur: hæ vim quoque nutricem fibris carnosus ventriculi tribuunt. At à sinistro nervo, ramus secundum elatiorem ventriculi sedem ad pylorum deducitur, quem ubi aliquot sarculis implicavit, ad hepatis cavum abit. Ventriculi vero fundum alii duo adeunt, etiam à sexto pari à propagibus secundum costarum radices deductis: aliquando sinistro lateri nervuli offeruntur, ab iis nervis, qui Lienem accedunt, promanantes: quin imo nervi stomachici complicantur, ut velut plexum reticularem juxta dorsi vertebrae supra renes, constituent (an is quem Fallopius ad basin cordis collocavit) ut inde in partes adjacentes sarculi distribuantur. Quare cum tot nervos obtinuerit ventriculus, mirum non est, si percusso & affecto cerebro, ventriculus quoque turberetur, & vomitiones (maxime in Hemiplegia) causentur: & ventriculo præsertim ejus orificio sinistro affecto, facultas animalis langueat, syncope cardiaca superveniat, melancholica symptomata contingant, sicque altero patiente, alterum compatiatur. Verum & ad fundum ipsius non nunquam meatus^g à vesica biliaria fertur, bilem eo deferens, & perpetuas vomitiones causans, quemadmodum Spiræ familiam esse audivimus, in qua singulo triduo bilem satis copiosam vomunt.

Usum^h cibum dentibus attritum, & potum in ore alteratum, per œsophagum recipere: hunc tantisper retinere usque dum ventriculus seipsum contrahat, & in ipso contenta complectatur, & orificio utroque artissime clauso, natura sua & facultate ingenua, insitoque calore meliorem partem in cremorem album, chylum dictum, substantiam talem, quæ sanguini gignendo idonea sit, convertere & concoquere: cum actio ipsiusⁱ propria sit concoctio, sitque primæ coctionis^k instrumentum, seu chylificos officina: cujus calorem ingenuum circumjacentes partes, hepar, ¹ dia-

X

phra-

^k Gal. 4. us. part. 8. ^l In hac prima alimenti coctione ventriculus ita se habet ad hepar, quemadmodum sedes, in qua alea per descensum extrahuntur, se habet ad ignem illi superimpositum Varolus.

a Gal. 6. us. par.

6. potissimum

9. us. part. 11.

b Nullum ra-

men diaphrag-

mati ramum

largiuntur, ut

dissectionum re-

dibus visum.

Vesal.

c Gal. 5. us. par.

4. & 9. ejusd.

11. & 16. ejusd.

d Gal. 4. us.

part. 7.

e Gal. 9. us.

part. 11.

f Gal. 4. us. par.

7. 9. ejusd. 11.

g Gal. 2. rem-

per. 6.

h Arist. 1. gen.

18. locus excre-

menti alimenti

utilis.

i Gal. 5. us.

part. 4.

phragma, lien, omentum, colon, copiosa pinguedine cœnosa circumfusum, Cava & Aortæ truncus (maxime calor per arteriam Cœliacam effusus) & adeps Venæ umbilicali circumjectus, ingeminant: quare tota ventriculi pars angustior dextrorsum vergens, sub hepate absconditur, & quemadmodum à dextris hepar ipsum completitur, ita à sinistris lien ipsi adjacet, ut ab his calefiat; quem confectum laxato pyloro in duodenum deorsum protrudit, ut omnibus partibus alimentum subministraretur. Quare Aristoteles, ^m ventriculum terræ proportionem respondere voluit: quemadmodum enim terra plantis, sic ventriculus partibus animalis alimentum subministrat; & ⁿ quemadmodum plantarum radices ex ventriculo, ejusque ductibus intestinis chylum rapiunt, ut eo in sanguinem mutato, omnium partium naturale alimentum fiat.

m 4. part. a-
nim. 4.
n Hipp. 4. de
morb. quoad
homo vivit,
ubi cibi & po-
tus in ventri-
culum decide-
runt, corpus
ex ventriculo
haurit, hauri-
unt & fontes
& expleti cor-
pori transmi-
tunt. Idem:
fontes cum ple-
nifuerint, sem-
per in corpus
transmittunt,
cum vero va-
cui ab ipso un-
dique obsidentur: sic etiam & ventriculus facit: velut si quis aqua in tria aut plura vasa aenea affusa, ea planissimo lo-
eo statuat, & quum optime coaptata disponat, conjunctis ad foramina fistulis, sensimque in unum vas aquam donec om-
nia impleta fuerint affundat: ex uno enim in reliqua vasa defluit, quoad cetera etiam impleta fuerint &c.

Hinc liquet ejus actionem ad vitæ usum necessariam esse, & inter partes nutritioni inservientes, ventriculo principatum deberi, cum ex ipso recte habente, reliquarum partium sanitas dependeat: cum eo male affecto, chylus minus recte elaboratus ad hepar feratur: & cum hepar primæ coctionis vitium emendare non possit, sanguinem impurum confici, quo partes recte nutriri nequeunt: hæc causa est cur ventriculo laborante, reliquæ partes corporis compatiantur & veluti contabescant. Quare Q. Serenus Samnicus præcepta digestionis & stomacho medentia proponens inquit:

Qui stomachum regem totius corporis esse
Contendunt, vera niti ratione videntur:
Hujus enim validus firmat tenor omnia membra,
Et contra ejusdem franguntur cuncta dolor.

De musculis, & nervis in inferioris ventris cavitate sitis.

CAPUT XLVII.

REmotis partibus enarratis, conspiciuntur adhuc Musculi, Nervi & Offa.

Musculorum paria duo vertebris incumbunt, quorum primum est femur moventium sextum, ^a seu flectentium primum, quos ^b Ilios, ^c & Lumbales vocant. Alterum est femur moventium septimum, ^c seu flectentium secundum, seu Iliacus internus, de quibus in historia musculorum femoris. Ad latera utrinque portio musculi latissimi, ^d qui brachium retro deorsum trahit, observatur, cui musculus Quadratus, ^e qui dorsi primus est, subjacet; in ipsa vero concavitate, Obturator ^f est internus, qui circumagentium femur secundus est.

Nervi & duplices per infimum ventrem feruntur; alii quidem à sexto pari medullæ cerebri prodeunt, à quo ad omnia hujus ventris viscera ramuli mittuntur, de

a Vesalio &
Fallop. 6. Co-
lumb. 5.
b Hipp. & Gal.
c Vesalio &
Fallop. 7. Co-
lumb. 6.
d Humeri &
brachii 4. Ve-
sal. Fallop. Co-
lumbo.

e Quintum par dorsi, Vesalio: primum par dorsi, Columbo: primum par lumborum, Sylvio. f Femoris 10. Vesal. Co-
lumbo, Fallopio. g Gal. 9. us. part. 11. & 16. ejusd. 3.

tur, de quibus sigillatim in cujuslibet visceris historia dictum fuit : ipsorum tamen h Gal. 16. us.
productionem & continuationem Thoracis historia exhibebit. Alii vero à Medul- part. 3.
la^h spinali, quatenus in vertebrae est lumborum & ossis sacri : quare duplices sunt, i Gal. de ossib. 11.
alii lumborum, alii ossis sacri : illorum modo quinque, modo quatuor paria; horum ossis sacri & coc-
vero pariaⁱ quinque, de quibus in medullæ spinalis historia sermo erit. cygis paria re-
senset.

De ossibus inferioris ventris.

CAPUT XLVIII.

De his egit Galenus libello de ossibus cap. 10. 11. 12. & 20. sic 13. usu partium 7. ossium vero pu-
bis separationem 6. adm. anat. 14. docuit.

Ossa, quæ inum ventrem cum partibus carnosus constituunt, etsi ventrem non
undique ambiant, quomodo cæteri duo ventres ab ossibus cinguntur, sunt ta-
men alia parte posteriore, alia partibus lateralibus, alia denique parte anteriore. Par-
te posteriore sunt Lumbi, os Sacrum, & os Coccygis.

Lumbi, qui tertiam spinæ partem constituunt, vertebrae^a quinque [tab. 40. f. 1. 2. a Gal. de ossi-
bus 10.
b. ad c.] omnium maximas & crassissimas habent, quæ per cartilagineas & ligamenta
crassiora connectuntur, nam ubique inter duas vertebrae cartilago crassa instar glu-
tinis interjecta est, omnesque vertebrae extrinsecus dura membrana conteguntur:
intus vero ligamentum membranosum & robustum, à supremis vertebrae ad os sa-
crum productum habent quod ad medullæ spinalis conservationem, præter alias
duas membranas circumjectum est. At hæ lumbares superne quidem cum verte-
bris [tab. 40. f. 2. a. ultimam thoracis vertebrae proponit.] thoracis, inferne vero ossi sa-
cro [tab. 40. f. 1 & 2. c.] incumbentes cartilaginis ligamentosæ intervæ articulan-
tur, ita tamen ut laxior sit lumborum, quam dorsi motus, quo facilius ad terram in-
clinare possimus: quæcum prima vertebrae à renibus dicta, quod ei renes incumbant:
ultima, quæ aliquibus ἀσφάλις, id est, fulciens & firmans dicitur. Hæ præter fo-
ramina lateralia transmittendis nervis dicata foraminulis crebris perviæ sunt: processus
habent ascendentes [tab. 40. f. 4. 5.] descendentes [tab. 40. f. 4. N.] transversos [tabu-
la 40. f. 2. ee. f. 3. 4. & 5. H.] cæteris longiores & tenuiores exceptis prima & quin-
ta, acutos, quos spinam vocant [tabula 40. f. 34. & 5. C. D.] reliquis crassiores &
latiores; ut iis & ligamenta & muscoli dorsi nectantur.

Hebræorum scriptores tradunt in humano corpore, post decimam octavam ver-
tebram, os quoddam esse, quod neque aqua, neque igne, neque alio elemento cor-
rumpi, nec ulla vi externa frangi, aut conteri possit: quod os Deus in extremo judi-
cior ore celesti irrigabit, & tunc reliqua membra ipsi rursus aggregabuntur, & in
corpus coalescent, quod spiritu Dei afflatum, vivum resurget. Os hoc vocant Lus,
b (non Luz) quod situm dicunt in spina dorsi, post decimam octavam vertebrae ad
os femoris. Hujus fabulæ pater est R. Utschaja qui anno Christi 210. vixit, circa
quod tempus conscripsit librum, qui Bereschit rabba, id est Glossa magna in Penta-
teuchum vocatur, unde sequentes Rabbini hoc figmentum hausserunt. Hoc in-
quiunt, parvum in fine
octodecim ver-

tebrarum spina dorsi: totum autem corpus putrescit, hoc os excepto.

e in libro A-
am fichti, id
est homo intel-
lectualis, in ex-
positione arti-
culi decimiger-
zii fidei Judai-
ca, de mortuo-
rum resurre-
ctione.
d ibidem ex ca-
pitulis R. Elie-
saris.
e in libro Lal
Kut in exposi-
tione cap. 12.
Ecclesiastici.
f in Messia suo.
g Plater. duo in
pedis pollice ma-
xime, quorum
interius, ex
quo hominem
tanquam ex se
mine resuscita-
turum tabulan-
tur, Arabes Al-
badaram vo-
cant.
h de mundi exu-
stione & die ju-
dicii lib. 5. c. 1.
pag. 170.
i Gal. de off.
ii. os latum,
vertebra ma-
gna Hipp. 2.
Epid. sect. 4. ut
vult Laur. a-
liis ὡς αὐτὸν
δύο.
k Gal. ex tri-
bus constare
voluit, tria
prima ejus of-
sa intelligens:
quia reliqua
sub osse coccy-
gis comprehen-
dit.

quiant, & non comburi, neque corrumpi in perpetuum, quia radix hujus ossis fit ex substantia caelesti & humectari rore, quo Deus resuscitaturus sit mortuos, tanquam fermento, quod est in massa farinae: volunt etiam hoc os ceteris diutius remanere, propterea quod non percipit gustum alimentorum hominis, sicut reliqua ossa & propterea durabilius esse reliquis, & esse fundamentum corporis, quod ex eo extructum est. Apud eosdem legitur, Adrianum Caesarem interrogasse R. Jehosnam, filium Chaninae, unde Deus hominem in futuro seculo erecturus sit. Respondisse, ex osse Lus spinae dorsum: tum Adrianus unde id sciret & quomodo probare, R. Jehosna os illud in conspectum ejus afferri curasse, quod aqua impositum, non fuit emollitum: igni, nec fuit adustum: mola, nec fuit attritum: incudi, & percussum malleo rupta fuit incus, os autem nullum defectum sensit. Munsterus inquit Rabbinos in collo esse dixisse. At Vesalius ossiculum hoc ab Arabibus & Albadaram vocari, & ciceri imagine respondere scribit, & dubitat num sit ossiculum interius duorum, quae ad primum pollicis pedis articulum spectatur, quod insigniter durum sit. Verum Hieronymus Magius refert, Thalmudistas aliosque Hebraeos commentos esse hoc iuxta calvariae basin, sive in ipsa basi aut nucca vocata: aliis primam & duodecim vertebri a qua thorax initium habeat, quae cum caput collumque inclinamus, maxime emineat & extuberet. Sed quae ille Adriano Imperatori respondit vera esse nemo persuadebit. Nam & si ossa Platone teste, maxime diuturna sint, nihilominus ea lapidibus, & malleis in pulverem comminui, flammis in cinerem verti, quotidie videmus: nisi dentes quod & Plinius testatur, & antiquitas animadvertit, super sint, quos demum ignis diuturnior, ut reliqua omnia perdomat & abolet. Sic solent hi circumcisi patres, quando rei difficilioris veram rationem explicare nequeunt, ad fabulas confugere, quas suis pro sacrae fidei articulis obtrudunt, ne aliquid ignorasse videantur. Sed facestant Hebraei, cum mendaciis suis: facestant etiam magi & occultae philosophiae sectatores: facestant Cabalists, qui in rebus manifestis, tam impudenter, & illudunt & imponunt.

Os sacrum, quod ἱερόν, quia amplum est, (antiqui enim magnum sacrum vocarunt) & omnium spinarum ossium maximum, & ὠλεον, latum immobile est, & dorsum basim constituit: ex sex ossibus [tab. 40. fig. 2. a. c. ad d. tab. 41. fig. 6. ab A. ad F.] tanquam ex propriis quibusdam vertebri per cartilagine nexis, compositum, quae in adultis ita conglutinantur & coalescunt, ut unum os esse videatur, at in puerulis ossa haec cartilagine intercedunt. Hoc figura est fere trianguli, anterius cavum, laeve & aequale; posterius incurvum, & propter ligamenta, ac musculos dorsum asperum. Processus habet acutos, exiguos, transversos [tab. 41. fig. 6. & 7. K.] obscuros & in cavitatem desinentes: at ascendentes primum [tab. 39. fig. 6. & 7. S.] os habet, quemadmodum tria superiora in lateribus sinus [tab. 41. fig. 7. M.] acceperunt, ut ipsis Ilium os articuletur. Spinis quoque donatur [tab. 41. fig. 7. dddd.] quae deorsum spectant, & in quinta & sexta in duas partes dividuntur, & foraminibus donantur [tab. 41. fig. 6. & 7. ch. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. foramina pro nervis, & pro medulla, fig. 7. e. f. g. h. i. k.] & anterius & posterius; illa majora sunt, cum majores nervi pertransire debuerint: at latera nullis, quia ad latus os ilium est.

Os coc-

Os coccygis [*tab. 40. fig. 1. & 2. d. tab. 41. fig. 8. & 9.*] huic^l subest, quod *ὀστέον*, à *fi-*
gura rostri cuculi simili dicitur: Galenus epiphysin appellavit, ut qui ossis coccygis
nomine, tria inferiora ossa, quæ sacro ossi debentur, intellexerit. Hoc tribus vel qua-
tuor ossibus, [*tab. 41. fig. 6. & 8. à G. ad K.*] duabusque cartilaginibus constat: una u-
bi ossi sacro [*tab. 41. fig. 6. & 7. a.*] sed nexu admodum laxo jungitur, ut retrorsum ce-
dere, quando majora excrementa excernuntur, & in fessione antrorsum, & etiam
sponte in suum situm redire possit: sed in viris intorsum magis, cum rectum intesti-
num ulterius productum sustinere debuerit: in mulieribus propter cervicem uteri,
extrorsum curvatur. Altera vero cartilago ad ipsius mueronem, [*tab. 41. f. 3. & fig. 7. c.*]
aliquando etiam inter primum & secundum ejus os posita est.

Ad latera^c utrinque os unum est, quibusdam^f innominatum dictum, aliis os
coxæ, *ἰγίς* vel ilium, quod ex tribus ossibus, per cartilagines junctis compositum
esse, in junioribus usque ad annum septimum conspicitur, ut etiam ex triplici linea,
quæ distinguuntur apparet: at in adultis ob cartilagines exsiccatas, utrinque quali u-
num apparet, quare alia sunt parte posteriore, eaque vel superiore, vel inferiore: alia
parte anteriore. Partes superiores & latiores, ossa *λαγύρον* ossalium [*tab. 40. f. 1. mm.*]
dicuntur, quæ cum osse sacro [*t. 41. f. 13. A. B. cc. DD.*] per liga-
mentum commune membraneum validissimum, præter cartilaginem interceden-
tem, committuntur. Horum circumferentia inæqualis & semicircularis spina ossis
[*tab. 40. f. 1. & 2. ut. 39. 13. H. L. M. N.*] illi dicitur, quæ inæqualis, ut inde muscoli
producantur, ut obliquus ascendens, thoracis quintus, & tibiam flectentium^h pri-
mus, & extendentiumⁱ primus: cujus pars interior cava & lata, costa dicitur: totius vero
ossis pars exterior, [*tab. 41. f. 14. ad X.*] dorsum illi, inæqualibus lineis propter femo-
ris tres musculos, qui nates efformant, donatum. At interior cava est & lata, ut mus-
culus iliacis [*t. 41. f. 13. K. K.*] internis^k aptam sedem præbeat, & superne propter
quadratum, seu^l primum dorsum musculum, & inferne propter decimum femoris
extuberat.

Inferiores & exteriores partes, ossa^m Coxendicis nominantur, [*tab. 40. f. 1. mm. 20.*]
quibus magnus sinus, quem acetabulum [*t. 40. f. 13. infra T. & f. usque ad R. & P.*]
quibusdamⁿ vocant, cæteras cavitates amplitudine & profundita-
te superans, inest, ut eis femoris caput validissimo nexu copuletur: cujus cavitatis cir-
cularis cartilagineus processus [*t. 41. f. 12. & 14. e.*] supercilium dicitur: & in ipsius
circumferentia sinus tres, tubera duo [*tab. 41. f. 12. 13. T. V.*] processus acutus [*tab. 41.*
f. 13. & 14. g.] & appendix [*tab. 41. f. 13. & 14. i.*] crassa notantur; quæ partim liga-
mentorum, siquidem cum osse sacro duplici ligamento connectatur, partim muscu-
lorum gratia facta sunt.

Anteriores denique partes^o pubis vel pectinis ossi nominantur, *tab. 40. f. 1.*
quæ in pube media cartilagine [*tab. 41. f. 13. & 14. quod est infra R. & P.*]
nectuntur, quare scalpello tenuissimo per mediam cartilaginem adacto,
facilime separantur: antè ac superius sinum [*tab. 41. f. 12. X.*] habent pro vasorum
cruralium descensu: & aspera sunt, propter musculorum rectorum, pyramidalium,
& secundi tibiam flectentis exortum: ut antè quoque, propter quintum, & po-
sterius^y

nosus, qui 6. Vesal. Columb. & Fallopio. k. Vesal. & Fallop. 7. Columbo, primus lumborum, Sylvio. m. *ἰγίς* Gal. de
ossibus 20. n. *ἰγίς*.

o Gal. de ossib.
20.

sterius propter decimum femoris muscolum extuberat. Verum tenuia sunt, & maximo totius corporis foramine [tab. 40. f. 1. & 2. qq. & 1. 41. f. 12. 13. & 14. q.] (levitatis gratia) perforata, quod extrinsecus externo & intrinsecus interno obturatore, seu femur circumagente musculo obturatur. Sub quo & processum [tab. 41. f. 12. 13. 14. f.] habet, unde penis corpora & aliqui muscoli exoriuntur. Ligamenta duo obtinuit, alterum circulariter ea ambiens: alterum membraneum foramen occupans. Hæc ossa cum sacro osse juncta, cavitatem eam, quam pelvim [tab. 40. f. 1. hoc ostendit.] vocant, efformant, quæ partem intestinorum, vesicæ & uteri continent, & quatenus femoribus imponitur, corpus sustinet.

p Inferiores & notha costa. forte etiam ad ventrem inferiorem referri possunt, quia Hipp. de artic. sect. 3. in fractu

ra notharum costarum egrum liberalius alit, quo ventriculus dissentius, costas extrorsum propellat: & s. epid. Mallien- sis, cui curru onustus costas intus deprefferat & fregerat, intra costas fractas puris collectio secuta est: hic in regione lie-

Differentia ventris infimi mulieris, à ventre infimo viri, quæ ratione ossium obvenit.

CAPIT. XLIX.

a Sacrum aliqui dici existimarunt, quod visus feminis dum pariunt dilaceratur, & sic sacrum ac magnam hanc operationem edat.

b Hipp. lib. de natu. pueri circa finem: mulieres quæ pariunt, gravissi-

ma torquentur doloribus: hæc vero maxime quæ non consueverunt, & adhuc incipiunt: sed dolores lumbos præcipue & illa occupant, tunc enim distenduntur & distrahuntur ab invicem & vicinæ lib. 3. fem. 21. tractat. 1. cap. 2. & quando separatur fœtus, aperitur matrix apertura tali, cuius similem effigiem non valet in aliâ horâ, & necessarium est ut

CVM mulieris venter infimus, à viri ventre infimo etiam ratione ossium differat, idque uteri & fœtus causa, in quo discrepent, hic ostendere convenit. Differunt primo ratione dorsi: siquidem in muliere dorsi pars supra lumbos magis retrorsum flectatur, ut si forte gravida sit, & anterior pars pondere molestetur, posteriore quoque parte moles sustentetur, quo corpus in æquilibrio sit: hinc gravida cum incidunt superiora corporis retrorsum inclinant. Dein os^a sacrum in foeminis magis ad exteriora curvatur, cuius connexum dum pariunt, mirabiliter in partu aperiri statunt, quo os sacrum foras longius excurrens, fœtui locum ampliorem det: quod ratione cartilaginis ligamentosæ, quæ parte inferna inter ultimam lumborum vertebra & os sacrum præsertim in mulieribus parvis posita est, fieri posse censent. Tum os Coccygis (non Galeni, sed recentiorum) [tab. 31. fig. 9.] per admodum laxum nexum inter se & cum osse sacro necitur, ut in mulieribus retrorsum & extrorsum curvetur, ut sic cavitas major sit, & partui minus obstat. Quarto illius ossa multo ampliora sunt, & ipsorum spina utrinque magis in latera educitur, quo gravida uterus hisce ossibus tanquam fulcris innitatur, & iis veluti ephippio infideat, idcirco etiam extrorsum magis excavantur: quæ cum vicinis ossibus maxime sacro osse

conne-

separentur quadam junctura, & sustententur ad auxilio Dei excelsi preparante vel disponente eas ad illud: deinde revertente eas in proximo ad continuationem naturalem, & est operatio illa de fortibus operationibus naturalibus.

connectuntur, & in partu non nihil quoque cedere videntur, quare de hac parte possimum mulieres conqueruntur, ac si ab osse sacro & vicinis quibus adhæret, divelleretur. Quinto, coxendicum ossium partes infimæ in mulieribus etiam longe magis distant. Sexto, ossium pubis processus inferiores & interiores extrorsum magis producantur, quo cavitas infimi ventris, ossibus illi, coxendicis, pubis & sacri circumscripta amplior sit: Siquidem cum intestino recto & vesica etiam uterum, & quando mulier gravida est, quoque fœtum continent: quare ne loci angustia fœtus exclusio impediatur, tota hæc cavitas pelvis dicta [tab. 30. fig. 1. eam ostendit.] latior esse debuit. Tandem ossium pubis connectio in mulieribus cartilagine duplo [tab. 31. fig. 16.] crassiore & laxiore, quam in viris (haud dubie magni alicujus usus gratia talem in mulieribus natura creavit) breviorque connectionis linea sit: quo ob nexum hunc laxum in partu ossa hæc fœtus impetui cedere, & in partu laxari (non dearticulari) possint. Unde cartilago hæc in illis quæ nunquam conceperunt tenuis, sicca & exigua respectu aliarum existit: sed in iis quæ sæpius enixæ sunt, etsi longa post tempora moriantur, cartilago crassa reperitur: at in his quæ semel aut bis tantum peperere, medio modo se habet: eo modo quo uterum se habere supra ostendimus. In his enim quæ nunquam utero gestarunt, uteri corpus tenue est, & parvum: in iis vero quæ pluries enixæ sunt, crassius ad extremum vitæ diem persistit: & in his quæ raro aut semel, mediocriter reperitur. Hoc in modo fœtis, in quibus hæc laxatio perquiranda est, secundo conspeximus. Primo quidem Luræ, in præsentia omnium Chirurgorum, & Laurentii Jouberti anno 1579. in muliere annos circiter viginti quatuor nata, quæ decima à partu die, ob interfectum fœtum laqueo vitam finivit. Quæstione enim mota an in partu ossa pubis & ilium, hæc scilicet ab osse sacro, & illa ab invicem distraherentur nec ne: Dubium hoc pacto solutum fuit, cadaveris alterum femur sublevatum fuit, cute adhuc integra, ibi os pubis ejusdem lateris, supra alterius lateris osse medii pollicis latitudine eminebat: & contra altero femore elato, illud quod prius eminebat, inferius conspiciebatur: quod oculis digitisque omnium verissimum esse, deprehensum fuit. Quam historiam Severinus Pinæus additis nominibus eorum qui sectioni adstiterunt, nostri quoque mentione facta fuisse refert. Idem observavimus hic Basileæ ante annos duodecim, cum nobilis matronæ Gallæ ventrem, quæ ob secundinas retentas interierat, pluribus astantibus aperiremus. Sed rationes & auctoritates quæ adferri possent in hujus rei confirmationem, prætermisimus, vis validissima

Y 2

vi & nixu, scilicet nec in cornibus cervorum quæ quotannis deciderint, & denuo renascuntur. Hæc Zoar, qui ante mille & quingentos annos vixisse fertur. d. Fernel. 6. morb. causas difficiles partus referens: uteri, ait, cervicisque mala conformatio, angustia & ossis pubis firmior compactio, compressio seu coarctatio ex vicinarum partium tumore. Sylvius in i. sagog. anat. cap. 2. in recens fœtis aut parturientibus, cartilago pubis ossa connectens, mollior est ac laxior, ut vi parva secando, facile separetur. Villichius 1. anat. 23. ossa pubis per Synchondrosin adnexa, quæ in parturientibus non nihil laxari solent. Platerus in ossibus mulier. in partu, ob nexum laxum, ossa hæc fœtus impetui non nihil cedere possunt, non autem dislocari. Idem testatur Rossetus de partu Cæsareo, Pinæus & alii. Contra vero Columbus lib. 1. cap. 28. ossa hæc in partu laxari, atque dehiscere, risu magis quam reprehensione dignum. Laurentius, ilium & pubis ossa in partu dearticulari posse non puto: ita enim uniuntur, ut nullo impetu divelli possint: quod si divulsionem passa fuerint, quo medio copulabun-

c Ex commentariis Zoar, Rabi. Simeonis Ben. id est, filii Joebai in primum cap. Exodi, verba: haud facile quicquid aliud magis mirandum in tota rerum natura reperias, quam distractionem illam ossis pubis, quæ fit in parturientibus, magno juvamento naturæ, seu potius providentiæ quadam Dei, cui natura ipsa ministrat. Et nim nulla fieri posset quantum vis validissima

pulabuntur? quo glutino inuenerit? nova enim synchondrosis fieri non potest. Quod si aliquantulum dehiscere velis cum Hippocrate, non repugnabo. Sed ossis sacri extremum cartilagineum, coccygem vocant, totum retrahi, & fatui impetu excurrenti ita cedere, ut amplius relinquatur spatium, existimo.

a lib. de partus
immortui ex-
tractione.

b Ajunt qui-
dam Coroni-
dem pragnan-
tem cum Ichia-
Elari filio con-
cubuisse: quod
graviter ferens
Diana, illam
interemit, quia
fratri factam
injuriam ferre
non posset. Illa
postea cum rogo
imposita fuisset,
Mercurius e
ventre mortuae
Æsculapium
extraxit, vel
ipsemet Apollo:
ut testatur
Ovid. 2. Meta-
morph. Natalis
Comes 4. My-
thol. 11.
c Solinus cap. 4.
Silius Italicus
l. 13. Plinius l. 7.
c. 9.
d Bruschius.

mus, cum Pinæus fusc hac de re in sui opusculi anatomici libro secundo egerit, cujus rationes nullus hactenus sufficienter refutavit, quemadmodum in nostro de formatione fœtus opusculo ostensuri sumus. Hæc autem cartilago ossibus pubis interjecta, non solum in muliere, sed etiam viro facillime separatur, si modo culti dorsum ejusdem aciei crassitie respondeat. At monere hic lubet, aliquando in parte interna ossium pubis, circa synchondroseos finem parte infera quandam apophysin oblongam præternaturalem reperiri, ut apud Pinæum Lutetiae vidimus, quæ partum impedire non posse, idcirco sectione hic opus erit: quare Hippocrates a quomodo prægnantes aliqua non rite pariant, sed intus perdant & quomodo partus immaturæ extrahendi sint, docuit: hacque ratione de partu cæsareo egit: in quo partu, vel matrem, vel fœtum, vel utrumque conservare animus est: mater enim duplici nomine mortuum, quem sæpe excludere nequit, cum & fœtus ad partum plurimum juvet, & cum in utroque & fœtu & matre vires non valeant, in angusto spes est, nisi sectione succurratur. Sic fœtus dupliciter laborare potest, vel dum in utero matris mortuæ tanquam in ergastulo conclusus hæret: vel dum in utero matris vivæ continetur, quæ eum eniti non potest, ubi similiter de utriusque & fœtus & matris salute dubitatur. Hac ratione Cæsareus partus triplex erit: quarum prima & antiquissima cæsura est, fœtus vivi ex matre mortua, si modo vera est historia de Æsculapio, b quem à parte Apolline exsectum hanc suavissimam lucem aspexisse volunt: quamvis veræ sint historias de P. Scipione c Africano priore, qui defuncta parente excisus utero in diem milititer Gebhardus, d Uthonis Comitis de Bregentz filius ex matris utero exsectus, Constantiensis Episcopus anno 1001. factus est. Sic & Burcardus e comes de Lintzgo, Buchorn & Monteforti anno 959. ex matris mortuæ alvo exsectus fuit, idcirco vulgo ingenitus dictus, qui postmodum Abbas Sangallensis designatus. Quæ sane cæsura perfacilis esset, si modo tam certum esset fœtum vivum ex mortua matre educi posse, cum in confesso sit, vitam & motum cordis in infante, à matris vita dependere, eique per arterias umbilicales communicari. Quare arteriarum motu in matre cessante, earundem etiam motum in fœtu è vestigio cessare necesse est: siquidem fieri non potest, ut fœtus suis membranis in utero involutus, mucoribus & humoribus circumfusus, spiritum per os attrahere possit: hæc enim sæpe solutos infantes, diutius tamen in angustis faucibus hærentes, suffocando enecant. Hinc sequitur talem exsectionem fortuito contingere, dum puerpera in agone est, aut in animi deliquio, uterive præfocatione, spiritibus vitalibus adhuc præsentibus. Verum in hac cæsura arte magna opus non est, sed solum manus agilitate, ut fœtus subito educatur.

Altera cæsura, quæ potius extractio dicenda, est fœtus mortui ex matre viva, quæ priore non minus antiqua videtur de qua breviter Hippocrates l. c. egit: ubi fœtus mortuus

mortuus frustulatim educendus, si modo matrem salvam cupimus: quæ tum demum instituenda, quando Medici potionibus, balneis, suffitibus, sternutatoriis, vomitoriis, licibus expellendo fœtui dicatis nihil profecerunt. Ante tamen sectionem, duo consideratione digna: Primo, fœtus an certo mortuus sit, ne in tenellum instrumentis chirurgicis, hamis, uncis & forcipibus læviamus: præcipua signa hæc erunt: Si nec Medici manus parturientis umbilico imposita, nec ipsa mater fœtum moveri percipiat: si aquæ effluerint: si secundina prodierit, fœtum in utero mortuum pronunciare licebit: & sane hoc postremum hujus rei certissimum signum est: licet fœtus secundina ipsius Chirurgi manu, post fœtum frustulatim eductum, extrahendum occurrat. Secundo vires parturientis æstimandæ: nam si vires ex pulsu parvo & debili, expiratione parva & rara adeoque frigida, ex facie plane à seipso mutata & cadaverosa, ex frigidis sudoribus, ex gelidis extremitatibus, dejectas esse suspicatus fueris, opere abstinere consultius erit, mortem imminuentem prædixisse contentus, ne si suavissima hæc aura privetur, causa in hanc fœtus mortui extractionem referatur. Si contra vires validæ adhuc subsint, confidenter matrem ex faucibus mortis eripiet, arte ea, eoque modo quo præter Hippocratem, Albucases^f docuit. Quæ in sectione Johannes Bauhinus Illustr. Ducis Wirtembergici Archiatros, frater meus p.m. felicissimus fuit, cujus operationis exemplum unum, cum instrumentorum ad hoc opus requisitorum figuris, Francisci Rosseti de partu Cæsareo libro addidimus.

Tertia casura est fœtus vivi ex matre viva, quæ aliter eniti non potuit, quam abdomine una cum utero per latus inciso: cujus sectionis fundamenta in Helvetia nostra jacta, quantum quidem ex historia antiquissima nobis cognita, colligere possumus, ejusque nomine hic adposuimus.

Cum circa annum salutis 1500. Elisabetha Alespachin, Jacobi Nuser *ὁ γυναικὶς* in pago Sigershusen (præfecturæ Gottliebenæ in Turgavia, parochiæ Altishuilenæ) uxor, primo utero gestaret, & jam doloribus partus per aliquot dies divexaretur, ad se Obstetrices tredecim, & aliquot lithotomos vocavit, à quibus frustra tamen opem sperabat, cum nec fœtus excludi nec etiam dolores mitigari possent. Quare jam desperata salute, maritus uxori consilium suum communicat: quod si cōsentiret, velle se quo speraret annuente Domino felicem successum, in ipsa suam experiri industriam. Annuente ergo ipsa ad Archipræsidentem Fravvenfeldensem abiit, rem uti se habebat exposuit licentiamq; sibi dari rogavit. Re intellecta Archipræsides primū quidem difficiliorē se exhibuit: dein vero fiduciæ mariti cōfidens annuit. Quare licentia impetrata, domū rediit, obstetrices alloquitur & hortatur, ut quæ cordatiores sint sibi & uxori in Hypocausto assistant: timidiore vero ex conclavi recedant: moliturum n. se aliquid, quo benedicente Domino salutē uxoris speraret. Obstetrices ergo consilio magna cum admiratione intellecto, ex iis undecim cōclavi recessere: duæ cordatiores cū Lithotomis mulierem parturienti adstiterunt. Quare maritus, implorato primū divino auxilio, & janna diligenter clausa, Uxorē mēstræ imponit, abdomini vulnus (nō secus quā porco) infligit. Verum primo ictu ita feliciter abdomen aperuit, ut subito infans absq; ulla læsione extractus fuerit, cum jã undecim obstetrices quæ præ forib. stabant, infantis vagitū audirēt, intrare sed frustra expetebāt: nō n. intromissæ fuerunt, antequā fœtus mūdatus, vulnusq; veterinario more confutū fuerit, quod postmodū absq; alio superveniente symptomate feliciter coaluit. Eadē n. post hancce *τομήν* secundo gemellos enixa est. quorum

e plurā vide apud Ætium ter. 4. ser. 4. c. 13. ubi de fœtus extractione & exsectione agit. Paruum lib. de hom. gener. c. 25.

f lib. 2. Chirurg. ubi instrumenta necessaria adpinguntur & Parvus l. c.

unus Johannes Nufer nomine, pagi Sigershausen Praefectus, annum jam agens sexagesimum, anno 83. adhuc in vivis fuit. Post hos gemellos quatuor alios liberos enixa est. Exfectus vero infans primum anno salutis 77. diem suum clausit. Hujus etiam mulieris liberi atque nepotes adhuc vivunt superstites.

Hæc profecto Cæsura duabus prædictis longe præferenda, cum & foetus vivus extrahatur, & mater salva conservetur, & concipiendi facultas non auferatur, quemadmodum Franciscus Rossetus in sua *Uteroparousia* docuit, adductis variis historiis, & inter cæteras unius, cui ter, alterius cui sexies ejusmodi foetus vivus extractus fuit, quæ cum septimo gravida esset, & chirurgus qui sectoris munus obierat, mortuus esset, nec quisquam sectionem tentare vellet, misellæ cum foetu moriendum fuit. Insuper & historiam alterius habet, quæ post talem cæsuram adhuc bis naturaliter enixa est. Quo vero modo, quæ ratione, cæsura hæc feliciter institui debeat & possit, fuse Rossetus nobis proposuit, cujus librum ante annos triginta quatuor latinum fecimus & variis historiis, cum quinto editus fuerit, illustravimus, quo Lectorem relegamus.

FINIS LIBRI I.

DE VEN-

i Gal. 13. us.
part. 6.

k Arist. 4. part.
10.
l Gal. 13. us.
part. 11.

m Gal. 7. us.
part. 21.

n Gal. de us.
respir.

o Hipp. 7. aph.
38. τὴν ἀνω
κρίαν ven-
trem superio-
rem vocat.

p Arist. 1. hist.
12. thorax parte
priori & poste-
riore constat.

q Sic commu-
niter Hipp.

ut de internis
affect. 2. de
morb. ac aquis

et locis πρὸς τὴν
σπῆν. in Coacis

aph. 272. et

274. Arist. 2. hist. 1.

l Pectus inter lacertos homini, ceteris inter crura priora, Arist. 4. part. 10.

l Hipp. de nat. off. Coacis aph. 272. dorsum post pectus est. Arist. 1. hist. 15. u Hipp. de inter. aff. & 2. de morb.

tibus: antequam quidem, ut iusta sit cordi i & pulmonibus pro voce & respiracione amplitudo, quo magna spirituum habeatur copia, cum in eo sanguis spirituosus ex sanguine & aere elaboretur, & vox ex aere formetur. Posterius, ut commodè in tegum decumbere possit: reliquis animalibus in alterum latus recumbentibus: sic thorax brutis, inter priores pedes carinatum est: in pedestribus quidem, propter expeditiorem progressum: at in volatilibus, propter alarum promptiorem in volatu agitationem: quod si contra factum fuisset, in hominibus manuum actiones impediret: & in brutis, quo minus artus anteriores recte thoraci affirmarentur, qui soli ambulationi subserviunt, obstaret.

Substantia ejus neque ossa tota, ut calvaria, alias motum penitus amisisset; neque carne tota; ut inferior venter, ne omnia concidant & misceantur, musculi enim pulmoni & cordi inciderent, nemine hos expellente, neque carnea moles suo pondere depressa, cor suffocet. Quare ut simul spatium intus esset, & simul totum instrumentum moveretur, musculi ossibus alternatim fuere interpositi: ita quidem ut à costis veluti à circulis vasis alicujus, æqualis amplitudo thoracis conservetur, & musculorum ope libere moveatur. Cum enim cor princeps viscus in thorace locandum esset, tutiori munimento indigebat, quare os circumjectum fuit: at cum cordis calor maximus, frigido aere opus habeat, quo tanquam flabello conservetur, thoracem mobilem esse oportuit, ut ex ejus dilatatione, aer in pulmones attractus, cor refocillet, contractione vero fuligines expellat: idcirco ex pluribus ossibus conformari debuit, & quo mutuo obedirent, cartilaginibus coarticulari debuerent. Quare thorax musculis movetur, & ossibus dearticulatur, recteque & ratione situs & ratione substantiæ, medius venter dicitur.

Dividitur p in partem anteriorem, quæ ὁ πρόσθεν καὶ στήθων: pectus dicitur: laterales, quæ ὁ πλευρὰ latera: & posteriorem, quæ ὁ ὀπίσθεν ἢ μετὰ στήθων seu dorsum nominatur: sed hæc plenius libr. 1. qui est de partibus externis, cap. 10. explicavimus.

Hujus partes aliæ sunt continentes, aliæ contentæ. Continentes, vel sunt communes, cuticula, cutis, pinguedo, panniculus carnosus, & musculorum membrana. Vel propriæ, hæque vel sunt molles, vel duræ. Molles, aut partes carnosæ, & quidem vel propriæ, ut musculi, vel improprie, ut corpora mammarum, quæ ratione sexus differunt, aut membranosæ, ut pleura & mediastinum. Duræ denique vel ossa, ut costæ, sternum, clavicula & posterius scapula cum vertebra; vel cartilaginee partim ossibus interjectæ, partim ea finientes, de quibus secundum sectionis methodum agemus.

De

274. Arist. 2. hist. 1. l Gal. 7. us. part. 22. humor si ἐς τὴν στήθιν, incidit, raucedo appellatur. Hipp. de flatibus. l Pectus inter lacertos homini, ceteris inter crura priora, Arist. 4. part. 10.

l Hipp. de nat. off. Coacis aph. 272. dorsum post pectus est. Arist. 1. hist. 15. u Hipp. de inter. aff. & 2. de morb.

De cute, pinguedine, panniculo carnosio & vasis cutaneis thoracis & colli.

CAPUT II.

CUM de continentibus communibus superiori dictum fuerit libro, hic solum in quo ratione partium differant, ostendemus. Cuticula & cutis thoracis ab infimi ventris cuticula & cute in eo differt, quod sub axillis pilosa sit, qui pili subalares & grandebalæ^a dicuntur, quorum usus, ne partes illæ, quæ citissime^b & maxime sudant (cum hic cordis sint emunctoria, hucque ejusdem excrementa secernantur) à frequentioribus & valentioribus, brachii motibus atterantur: sic in multis, pectoris anterior pars abdomine pilosior est. Quemadmodum in inferiore ventre umbilicus est, sic in thorace papillæ duæ in utroque sexu perforatæ, ut in mammis dicturi sumus, existunt.

Pinguedo non ita copiosa, ut in ventre (exceptis mammis) reperitur, ne thoracem pondere gravando respirationem impediat: quæ flavior quam in aliis partibus existit.

Panniculus carnosus prope claves & ad axillas progrediens, carnosior redditur in canibus & simiis; in anteriore vero colli parte, fibris suis musculo lato ita connascitur, ut ex eo nasci videatur, ejusque nomine rubet, & velut carnosus fit, & quorundam opinione musculus distinctus est, quem maxillam deorsum trahere volunt.

Vasa quoque inter hunc & cutim feruntur: venæ cutaneæ, quarum alia per colli latera & caput à duabus jugularibus externis distribuuntur, quæ suis surculis anteriorem colli partem perreptant: alia à parte posteriore à ramo, quem humeraria vena sursum mittit: alia per thoracis anteriora, duæ scilicet ab Axillaribus prodeantes, quarum altera Axillaris rami, altera humerariæ propago est, disseminantur: quemadmodum per dorsum ab iisdem ramis exiguæ tantum feruntur. Arteriæ, quæ eo mittuntur, exiguæ admodum sunt. Nervi denique à nervis subiectis ad musculos transmissis sursum in cutim disseminantur: duo tamen insignes circa papillas, earum adeo exquisitum sensum causantes, occurrunt.

De mammis virorum.

CAPUT III.

Mammæ, quas in viris mamillas, in mulieribus mammas in reliquis animalibus ubera appellare malunt, viris in pectoris medio, quod spatii^a laxitas permittat, & ea pars carnosæ sit, primo brachii musculo, qui pectoralis nominatur, insident: duæ sunt, quoniam^a partes duæ sunt, dextra & sinistra; quæ non^b attolluntur, ut in foeminis, cum glandulas vix habeant, cum lac, etiam Hippocrate^c monente procreare non debeant; humorem tamen lacti similem in iis generari non negamus (quem Aristoteles lac^d vocavit) sed ad alendum ineptum dicimus, qualem in duobus copiosiore succo refertis, observavimus.

Z

Com-

lac feri potest, quibus caro spissa, mulieribus fungosa & foraminulenta: testatur quoque Albertus & Avicenna. Car-

^a Hadriano Junio.
^b A^ψυγν causatur. Philo. & quod male oleant tres rationes, adfert, quia locus est in vasis, & dicitur & a^ψυγν. ¹⁰ lib. nostri de partib. externis.

^a Arist. 4. part. 10.
^b Gal. 7. 11. part. 22.
^c de gland. mulieris lac habent, viri minime.
^d In maribus 1. hist. 12. etiam danus

danus de subtilit. rerum asserit se vidisse virum 34. annorum, ex cuius mammis tantum lactis profluit, ut infantem fere alere potuisset. Arist. 3. hist. 20. scribit de capro quodam in Lemno, qui tantum lactis dederit, ut inde colostrum conficeretur. Marthiolus in diversis locis Bohemia, tres hircos repositos asserit, unde lac acceptum, quibus Epileptici curati. Narant, qui novum orbem lustrarunt, viros pene omnes maximam lactis copiam habere.

Componuntur ex cute, pinguedine & papillis, quare imperfectæ, quas cutis cum pinguedine, quæ circa papillas copiosior, quam alibi fere in pectore, in obelis prominentes & etiam sparsim dependentes efficiunt. Papillæ in harum medio extuberant, substantia nonnihil fungosæ, quæ etiam perforatæ, ut ex earum compressione humiditas aliquando exsudet. Venas ad nutritionem: arterias ad vitam & nervos ad sensum habent.

c Arist. 4. part.

10. Gal. 7. us.

part. 22. hoc ri-

diculum est,

quia molem &

aptitudinem

habent ex sub-

jecto musculo pectorali, qui absque illa figura externa mamma, ad nutriendum & tuendum cor in viris sufficiebat. Fal-

sum quoque est, papillam centrum esse, in quod venarum arteriarum & nervorum fines desinant, cum ad papillam in-

viris neque vena neque arteria pertingant, ne quidem in feminis, Rioli. velut centrum quidam in pectore in quod ve-

narum & nervorum huc pertinentium, fines desinant in eoque velut copulentur, Plat.

Ullus cor tueri, cum operiri sedem cordis conveniat: vel etiam ad decus data sunt, ne pectus informe videatur: quemadmodum Papillarum, ut sint centrum, in quod nervorum & venarum fines desinant, & in eo velut copulentur: ad titillationem quoque plurimum faciunt, ut propter consensum ex contactu papillarum in mulieribus, nonnihil quoque afficiantur.

De Mammis Fœminarum.

CAPUT IV.

Mammarum situm variū, & quomodo animalia mammarum ratione inter se differant, ostendit Aristot. 2. hist. 1. & 4. part. 10. Earum substantiam 1. hist. 1. an. 12. quibus animalibus denegata sint. 2. hist. 13. & cur aves careant 4. part. 11. exposuit. At Galen. de earum situ, causa situs, numero & partibus egit 7. us. part. 22. & ejusdem 14. cap. 4. deniq. de consensu mammarum cum utero 14. us. part. 8.

a de natura ho-

minis, de glan-

dulis, 6. epidem.

b 1. hist. 12. 2.

cjusd. 1. & 13.

4. par. 10. etiam

Galen.

c Polluci, vide

lib. 1. de parti-

buz externis.

d 7. us. part. 22.

Hipp. de mulierib. insignis mole mēdi:

e Arist. 2. hist. 13. piscium nulli mamma:

f Arist. 2. hist. 1. mamma alia in pectore aut juxta pectus bina, bina papilla in

domine: ac Elephantis sub armis dua tantum mari, quam fœmine exigua. Urse mamma quatuor. Alius mamma inter se-

tre, & quidem plures non tamen pares, ut suis, canibus, panthera, quatuor ventre medio: Camelus in ventre mammas

7. us. part. 22. g Gal. 7. us. part. 22.

Mammæ communiter Hippocrati^a μαστοί, Aristoteli^b μαστή, à μαστήω, c quæro, cum in illis infantes lac quærant, vel à μαστός sono sugentium: Galeno^d μαστα dicuntur. Hæ omnibus, quæ animal generare nequeunt, denegatæ sunt: in homine solo^f in anteriore thoracis sede, in pectoris medio locatæ sunt, quia locus omnium aptissimus est. Si enim lactis causa extiterunt, ea sede locari conveniebat, ubi facillime simul & citissime lactis copia propter cordis viciniam, cui calor infidet, perfecta elaboratio consistere potest, & quia eo loci copiosissimum benignum superfluum alimenti colligi potest. Verum hic situs ad commodiorem quoque lactationem

nem

nem facit: cum enim infans progredi nequeat, à nutrice manibus & ulnis comprehensus mammis necessario applicatur, & Creatoris nostri consilium haud dubie fuit, hoc mammarum situ homines à brutis discernere, cum bruta sobolem solum nutrant, postea negligent. Homines vero, in sobolem ex corde quasi *σπέρμιν* transfundant, dum matres ^h liberos & alunt, & amplectuntur, & osculantur, sicque memoria retinetur, mutuusque amor fit. At ne mammae ponderosae deorsum nimium propendant, cum foemina recta incedat, pectoris parti ossæ rota basi alligatae & connexae sunt. Binæ sunt, cum totum corpus pene in duas partes dividatur, ut utero, ⁱ qui quasi bipartitus est, instar boni cuiusdam servi subserviat: siquidem lac mammis tum accedat, quo tempore foetus jam plane absolutus est: utque gemini utero exclusi habeant, quo nutrantur: siquidem animalia, ^k quæ plures foetus edunt, plures etiam mammas habeant. Quod si unica fuisset, pectoris medio infixæ, cum ei pectoris os continuum foret subiectum, difficulter sanguis eo pervenisset, & non ita commode infans applicari potuisset: sic etiam ut una lacta, altera officium faciat.

Forma sunt subrotundæ, duriusculæ, ^l spatio interposito determinatæ, quæ in virginibus antequam concepti aptæ sint, imperfectæ, cum præter papillas vix quicquam appareat, at sensum, dum pubescere incipiunt, excreverunt (*μακρὸς* ^m tunc vocant) duræ fiunt, & malorum figura (unde *μῆλα* Aristophani) semiglobos referunt: & cum ad duos ⁿ digitos extolluntur, tunc menstrua fluere incipiunt. Mulieribus vero, quæ nondum ^o imprægnatae fuere, contraeæ permanent, utero gerentibus cum utero ^p augentur, dum foetus augetur: cum autem perfecti fuerint, & pariendi tempus institerit, simul cum utero, quantum satis est, intumescunt; siquidem inter utrumque ^q per vasa consensus sit, quod etiam apparet, cum foetus in utero vel laborat (si enim imbecillis sit, mammae ante tempus lacte implentur) vel intereat, Hippocrate ^r monente: nec mirum, cum uteri sit, semen recipere & foetum perficere; lacque distentas mammarum, quod jam natum est educare: & cum foetus ^s moveretur attolluntur, & papillæ turgescunt: & quæ major est, ^t ea parte foetus existit. Pinguibus autem magis turgent & quibusdam propter insignem molem dependent, ^u aliis à partu infantulos lactantibus vastissimæ redduntur, & tales permanent, donec infantem ab lactarint. In vetulis aliquando oblongæ redduntur, & flaccelcentes propendent, ita ut in extremo senio glandulis cum pinguedine absumptis, tantum cutis cum papillis remaneat: aliquando in iisdem, sursum astrictæ convolvuntur.

Partes mammae constituentes, aliæ externæ, aliæ internæ: extrinsecus enim, cuticula & cute investuntur, in medio papilla est, de qua postea. Internæ sunt membrana seu panniculus carnosus dictus, vasa, substantia ^u glandulosa & pinguedo

Z 2

Mem- ⁿ Arist. 1. gen. anim. 20. & 7. 14. us.

hist. an. 1. o Gal. 6. loc. affect. p Gal. 14. us. part. 4. q Quare mamma cum utero consensum habeant

part. 8. ostenditur. ^r Mulieri in utero habenti, si lac fluxerit ex mammis copiosum, foetus redditur imbecillus: 5. aph. 52. Mulieri in utero habenti, si mammae graciles sunt, repente abortiet. 5. aph. 37. Rationes vide apud Gal. 14. us. part. 3. Hipp. de nat. pueri. Hipp. de superfoet. mulier nosse debet, utra mammarum major sit, ea enim parte foetus existit. u Sic nominat Gal. 7. us. part. 22.

* in regno Senega foeminis circa annum decimum septimum à viris mammae vi distrahuntur, fune per medium injecto, ita ut ad ventrem usque procidant, Aloysio Cadamusto referente. In insula Arnabonis (referente du Reyrat in sua orientalis India historia) nutrices mammae adeo longas habent, ut eas in terga reflectere possint.

Membrana dura ac crassa substantiam ipsarum glandulosam ac pinguedinem succingit, & musculis substratis necit, fibris per ipsarum substantiam missis: inter quam & cutim, vasa glandulæ & pinguedo disseminantur.

Vasa [t. 27. lib. 1. a. 3.] venæ sunt duplices, externæ cutaneæ ab Axillari & Humerariæ ramo pronatæ, quæ sæpe lividæ apparent, potissimum in gravidis & lactantibus, quæ in cutem pectoris & mamillas distribuuntur. Internæ circa radicem ipsarum, quæ non à trunco cavæ ad diaphragma oriuntur, sed ubi cava prius sursum ad cor ascendit, & ad claviculas pertingit, duos ramos, comitibus duabus arteriis, infra per totum pectus deducit, & binæ venæ mamillis inseruntur, quæ idcirco longo itinere feruntur, quo in iis sanguis sit plurimum percoctus: dum enim sursum fertur, per coctam coctionem ipsi conferunt, & hæc mammaria venæ & arteriæ dicuntur.

Mammaria ergo descendens, communiter una utrinque [t. 6. EE. t. 7. LL.] à trunco Subclaviæ venæ [t. 7. II.] enata, sub offe pectoris penes costarum cartilagineas defertur, & thoracem egressa, sub ^x rectis musculis Abdominis circa umbilicum [t. 7. M.] cum epigastrica [t. 7. II.] vena (quæ originem habet ab eodem ramo, à quo & illæ, quæ ad uterum ejusque cervicem propagantur) quæ sub rectis musculis sursum fertur aliquot surculis *συμπαγόμενοι*: Verum in recenter enixis maxime evidens est, ita ut aliquando mammaria interna & epigastrica calami scriptorii crassitiem adæquet. At à mammaria inter quartam ^y & quintam costam, nunc altius, nunc declivius propagines exteriores, per spatia media cartilaginum, quæ costas sterni jungunt, emittuntur: in viris quidem, ad anteriores musculos nutriendos: in fœminis vero (in quibus aliquando etiam ipsum pectoris os, sternum dictum, perforant) [t. 2. f. 8.] & ad hos, & ad mammarum glandulas, ut lactis materiam in lactantibus deferant, & ut mamillas nutrant, cum per eas infiniti venarum plexus ferantur, quibus facultas lac generandi insita est. Per hæc ergo vasa, fit consensus utero ^z cum mammis (& quidem tanta sympathia, ut contrectatæ libidinem excitent) eum per hæc vasa conjungi necesse fuerit, ut quando fœtus in utero augetur, illi soli venæ communes ex utrisque alimentum effundant: & quando natus fuerit, cessante illa attractione sanguinis, quæ à fœtu in utero existente fiebat, mammas versus totus sanguis excedens affluit, & mammarum ^a tanquam cucurbitulæ, quasi ab altero attrahunt & revellunt. Nam & Hippoc. ^a docente, ab utero accedit ad mammas lac, quod post partum infanti cessurum est in alimentum, & ubi ^b peperit mulier, principio motus jam facto, si lactaverit, lac ad mammas fertur. Verum non solum sponte affluit, sed copiosior sanguis à mammis, quam earum nutritio requirat trahitur, quæ tractio causatur ab infantis suctione, à vasorum amplitudine, à motu mammarum, à fuga vacui, cum exhaustæ venæ à suctione, undique sanguinem trahant: hinc aliquando nimia puelli suctione sanguis per papillas exstillat (rarum est menstrua per papillas & non per uterum effluxisse:) hæc causa est cur non eodem tempore recte mulieri menstrua fluere, & simul lactare possit; quare etiam lac menstruo germanum esse Hippocrates dixit. Verum non tam ratione hujus consensus vasorum ad mammas sanguis fertur, quam quod cessante motu, sanguis à toto corpore ad uterum, corpus totum ad mammarum glandulas sese exonerat, quare earum substantia spongiarum instar rarissima est, ut copiosiores humorem capiant.

• Arte-

^x In nonnullis mulierib. Columbus. hanc anastomosis Vesalius irridet.

^y Inter tertiam & quartam, Varolus.

^z Gal. 14. us. part. 8.

^a de gland.

^b Hipp. de nat. pueri.

glandis penis substantia nonnihil affinis. Riol. reprehendit, quia penis substantia ligamenti duobus nervis constat: quia balanus glandosus est, atque sanguine refertus: itaque nihil aliud esse, quam duplicatam ac veluti coarctatam cutim. Et ejusdem cum cute natura, ut ipsa dissectio patefaciat.

Si mamma-
rum papilla, &
quod in iis ru-
bet, palleſcat,
morboſum eſt
de viſceris conce-
ptaculum. 6.
epid. ſect. 5.
p. Ariſt. 4. part.
10.
q. Gal. 14. uſ.
part. 4. in avi-
bus natura no-
vam pullos edu-
cendi rationem
excogitavit,
cum iis propter
corporis ſiccita-
tem humor ſu-
perſtans ſubmi-
niſtrari non po-
terat.
Gal. 7. uſ. par.
22.
ſ. Quartum u-
ſum agnovit
Hipp. libr. de
gland. ut excrementitium humorem excipiant. Quod ſi, ait Hipp. aliquis morbus, aut alius eventus mulieribus mam-
mas demat, vox ipſarum redditur aſperior, ſputa rices evadunt, & capitis dolore vexantur.

virginibus leviter prominet, & fragæ inſtar inæqualis rubet, in lactantibus, ex infan-
tis ſuſtione magis prominet & livet: in effæctis, oblonga nigricat. Huic circulus cir-
cumjicitur, qui Areola dicitur, φῶς Hippocrati, qui in virginibus palleſcit: in gravidis
& lactantibus, fulſeus: in vetulis, niger eſt, cutiſque magis rugoſa eſt, ex uteri vero af-
fectione croceus aut etiam niger fit. Et Hippocrates ° ex papillarum colore, uteri
ſignificat.

Uſus mammarum proprius, ut cibum p ſuis parvulis recondant: vel ut in iis tam-
diu lac generetur, quam diu infans ad ſui nutritionem eo opus habet: nam cum af-
ſuetus fuerit in utero ſanguine à matre per umbilicales venas tranſmiſſo nutriri, non
ita cito ad nutrimentum ſolidum tranſire potuit, non enim conficere potuiſſet, cum
recens q natus tener adhuc atque imbecillus ſit, & mutationes repentinæ periculoſæ
ſint: quare nutrimento illi opus fuit, quod à natura ſanguinis parum recederet, &
quo facile nutriretur, liquidum, dulce & amicum eſſet: tale autem lac eſt, quod in
mammis conficitur, quemadmodum etiam in adultis alimenta in ventriculo in cre-
mam pullos edu-
cendi rationem
excogitavit,
cum iis propter
corporis ſiccita-
tem humor ſu-
perſtans ſubmi-
niſtrari non po-
terat.
Gal. 7. uſ. par.
22.
ſ. Quartum u-
ſum agnovit
Hipp. libr. de
gland. ut excrementitium humorem excipiant. Quod ſi, ait Hipp. aliquis morbus, aut alius eventus mulieribus mam-
mas demat, vox ipſarum redditur aſperior, ſputa rices evadunt, & capitis dolore vexantur.

De muſculis medii ventris.

CAPIT V.

a Gal. 8. ad.
an. 5.

Muſculi medium ventrem occupantes, qui & thoracem parte anteriore & late-
ralibus, & parte posteriore dorſum integunt duplices ſunt, vel enim coſtis ac-
cumbunt, eiſque adnaſcuntur, vel iſſis intertexuntur: non tamen omnes a motus
ipſius gratia creati ſunt. Illi enim quamvis à thorace ortum ducant, attamen vel a
lias partes movent, ut brachium, ſcapulas, vel dorſum, hique ſub illis ſiti ſunt: vel tho-
racem movent, & proprii thoracis muſculi dicuntur, hique vel exterius, vel interius
locati

locati sunt; qui exterius, vel anteriori, vel posteriori parti insident. Parte anteriore utrinque tres sunt.

I. Pectoralis ^b seu primus brachii musculus, qui latus & amplus sub mammillis situs est.

II. Serratus major, ^c seu thoracis secundus, qui costis instratus, iisque digitatim insertus, potissimum latus occupat.

III. Serratus minor ^d vel scapulae primus, qui triangularis pectorali sub sternitur.

Parte posteriore utrinque decem sunt.

I. Cucullaris ^e seu scapulae musculi secundi pars major.

II. Latissimi ^f vel tertii brachii musculi pars, cum totam fere infimi ventris partem posteriorem occupet.

III. Rhomboides ^g vel scapulae tertius, sub cucullari situs.

IV. Serratus posticus superior, vel thoracis ^h quartus, Rhomboidi subiectus.

V. Serratus posticus inferior, vel thoracis ⁱ quintus, qui sub latissimo situs est.

VI. Sacrolumbus seu thoracis sextus: ^k

VII. Longissimus musculus, qui dorso ^l secundus est.

IX. Semispinatus, seu dorso ^m quartus musculus.

IX. Splenii seu primi ⁿ capitis, sub serrato postico superiori locati pars inferior.

X. Complexi seu secundi ^o capitis pars inferior. Interius unus est triangularis, qui thoracis ^p sextus est, & ipsi sterno parte inferiore subiectus, de quibus omnibus suo loco. Qui vero costis intertexti sunt, intercostales dicuntur, de quibus, colli partibus enarratis, dicturi sumus.

b Ves. Columb.

c Fal. primus.

c Ves. Col. &

Fall. thoracis

primus, at Syl.

scapulam an-

trorsum mo-

vet.

d Ves. & Fall.

scapulae primus:

at Col. secund.

e Ves. Fal. sca-

pula secundus.

Col. primus.

f Ves. Col. Fal.

brachii quar-

tus.

g Ves. Colum.

Fall. scapulae

quartus.

h Ves. Colum.

Fal. tertius.

i Ves. Fallop.

quintus, Col.

quartus.

k Ves. Fallop.

quartus, Col. quintus. l Vesal. C. Col. dorso 2. Sylu. lumborum 2. m Ves. 8. Col. 4. n Vesal. Col. Fal. primus. o Ves. Col. & Fal. secundus. p Ves. Col. & Fallop. 6.

De Colli partibus.

CAPUT VI.

Collum à colendo, quod hac pars ornari consueverit, nomen habet: αὐχὴν ^a A. a 1. hist. an. 12. 2. Aristoteli τεύχεος ^b ab ossium asperitate, Galeno ^c dicitur, Pars est inter thoracem & caput media, thoracis & pulmonum ^d gratia creata, oblonga, propter ^e vocis modulationem, cum nullum brutum collo catens vocem articulatam edere possit; rotunda, propter corpora, quae ibi sita sunt. Dividitur in partem anteriorem, posteriorem; quae cervix proprie, & laterales, ut plenius lib. 1. qui de partibus externis est, exposuimus. Possimus ejus partes dicere continentes & contentas: continentes communes, cuticulam, cutim, pinguedinem, panniculum carnosum, & membranas musculorum propriam, de quibus supra egimus. Proprias, musculos, & ossa. Musculi varii sunt collum seu cervicem occupantes, qui cervicem movent, laryngem, os hyoides, linguam, eique articulatam caput, maxillam inferiorem & scapulas.

Horum rent: contra, quibus pulmo

est, hic etiam collum adest 8. us. part. e. Muta sunt ea animalia, quibus collum adest 8. us. part. 1.

Horum alii parte posteriore, alii parte anteriore siti sunt, parte posteriore, sunt sequentes, quos, ut sibi invicem incumbunt, recensimus.

f Gal. qui in
duo divisit, &
Syl. Trapezius
Ves. Fallop. 2.
Columb. 1.
g Vesal. Col.
Fallop. 3.
h Primum par
musculorum
capitis, Vesal.
Col. Fal.
i Secundum
par, Ves. Col.
Fallop.

k Ves. Col. Fal.
l Quintum par
Ves. Fal. sex-
tum. Col.
m Sextum par
Vesal. & Fal-
lop. quintum,
Columbo.
n Vesal. Colum.
& Fallopio.
o Tertium par
cervicis Co-
lumb. tertium
dorsi, Vesal.

p Secundum cervicis, Columb. 2. dorsi, Vesal. thoracis 8. Fallopio. q Quartum cervicis, Col. dorsi moventium 7. Vesal. r Ves. Col. Fallopio. s Quartum par, Sylvio 1. Ves. Col. Fallop. t Secundum par Sylv. 4. Vesal. Col. & Fallop. u Ves. & Fal. 3. par & Columb. quintus musculus. x Primum par cervicis, Col. primum par dorsi, Vesal.

I. Cucullaris seu scapulae secundi f pars superior, ab occipitio descendens.

II. Levator seu scapulae g quartus, qui ad latera magis situs est.

III. Splenius seu capitis h primus.

IV. Complexus seu capitis i secundus.

V. Recti majores, seu capitis par k tertium.

VI. Obliqui superiores, seu capitis par l quintum.

VII. Obliqui inferiores, seu capitis par m sextum.

VIII. Recti minores seu capitis par n quartum, qui dorsi musculo secundo subjiciuntur.

IX. Transversalis, seu cervicis o tertius.

X. Scalenus, qui ad latus est, a prima costa ad cervicem, & cervicis p secundus est.

XI. Spinatus, seu cervicis q quartus.

Anterius vero, non enarratis iis, qui maxillae adnascuntur, & sub mento sunt.

I. Quadratus seu platysma myoides, primus buccis & labiis communis.

II. Mastoideus, seu capitis r septimus a jugulo ad capitis latera.

III. Sternohyoidei, hyoidis primum par, qui asperae arteriae s incumbunt.

IV. Coracohyoidei, hyoidis quartum t par ad latera situm.

V. Oesophagiae seu tertium par u communium laryngis.

VI. Longi duo seu cervicis x primi.

Ossa subjiciuntur, vertebrae scilicet cervicis, quae medullam continent.

Contentae sunt, venae jugulares externae & internae: Arteriae carotides. Nervi sexti paris & recurrentes, quae omnia utrinque ad latera locantur. Anterius vero, aspera arteria & oesophagus. Sed ad thoracem redeamus.

De musculis intercostalibus.

CAPUT VII.

De his egit Gal. lib. de dissect. muscul. 23. & 7. us. part. 20. 5. ad. an. 4. & 8. ejus. 3.

a Μουσουλ-
ων intercosta-
lia Gal. dissect.
muscul. 23. 5. ad.
an. 4. & 7. us.
par. 21.

b Gal. 5. an. 4.
8. ejusdem 2.

c Piccolhom. dicit Gal. de respir. usu 22. tradidisse, cum undecim sint spatia: alias 68. utrinque 34. statuere.

Musculi, qui costis intertexuntur, & ossibus alternatim interpositi, eorum intervalla a opplent, μεσσωδικοι b intercostales dicuntur, qui quadraginta c quatuor sunt, Cum n. costarum intervalla utrinque undecim sint, & in singulis spatiis musculi sint gemini, utrinque viginti duo erunt: quorum alii externi, [t. i. yy.] qui undecim sunt; alii interni, totidem numero. Hi carnei sunt, angusti, sed pro intervallorum ratione longi, quorum

quorum fibræ ab una costâ ad aliam oblique & contraria positione feruntur, ita ut exteriorum & interiorum fibræ, cum sibi invicem incumbant, mutuo in modum literæ X se intersecant. Horum externi sive superiores, à superiorum costarum partibus inferioribus, in costarum inferiorum partes superiores feruntur: hi nam que in parte posteriore à processu transverso vertebrarum quibus costæ adnectuntur, incipiunt, & fibris oblique antrorsum, per totum costarum ductum, ad cartilaginum initia feruntur, ubi costæ ossæ finiunt, & sterni junguntur, tendinibus ob loci angustiam carentibus, nec per cartilaginum intervalla produciuntur.

Interni musculi ab inferiorum costarum parte superiore, ad superiorum costarum partem inferiorem, contrario quam Exteriores ductu, feruntur: qui non à processu vertebrarum incipiunt, sed ab ea parte, in qua costæ curvantur, & fibris suis obliquis ascendentibus antrorsum feruntur, & costarum spatia tam ossæ quam cartilaginea replent, & eandem semper fibrarum seriem servantes, ad ipsa sterni ossa feruntur: Ita tamen ut in eo spatio, quod inter cartilagineas est, aliquantulum ad exteriorem illius spatii superficiem eleventur, & loca externorum musculorum, cum ii desint, occupant. Hæc causa est, cur in spatio, quod est inter cartilagineas fibræ diversæ appareant, ab iis, quæ sunt inter ossa costarum. Quod si & has fibras intercartilagineas adimas, sub his aliæ diverso quoque situ occurrunt, cum fibræ sint musculi sexti thoracis, qui Triangularis dicitur.

His fibris non recte distinctis & nonnulli intercostales musculos sexaginta octo fecerunt, cum revera quadraginta quatuor sint: alios dicentes musculos, qui costis inserti sint, quatenus sunt [tab. 3. fig. 1. CC.] ossæ: alios qui costis interponuntur, dum cartilagineæ [t. 3. fig. 1. DD.] sunt. Et cum costarum intervalla undecim sint, verarum costarum sex, quinque autem notharum: in verarum intervallis singulis, quatuor esse, duos quidem quatenus ossæ sunt, duos quatenus cartilagineæ, eosque vel internos vel externos: in quolibet autem notharum intervallo, duos tantum esse, externum unum, internum alterum. Verum & hoc notandum, quod, quanto exteriores ulterius ad vertebrae oriuntur, tanto citius in anterioribus finire: sic, quanto interiores tardius à flexura costæ incipiunt, tanto tardius ad os pectoris perungere. Cur autem oblique positi sint, & se intercussatim dissecant, eleganter Varolus ostendit, & ad pectoris dilatationem ac constrictionem necessario requiri asserit. Cum enim distantia, quæ est inter unam & alteram costam debitæ musculorum longitudini, quæ ad pectoris dilatationem ac constrictionem requirebatur, non sufficeret, ideo non rectis, (quod veteres monente Galeno non agnoverunt) sed obliquis fibris inter costas dispositi fuere: hoc dilatationi inservire illud probat, quod unum quodque longe magis secundum fibras obliquis, quam secundum rectas distrahitur. Ad constrictionem etiam conducere patet, cum musculus modo magis, modo minus pro sui magnitudine aut parvitate contrahatur. Quare si fibras rectas habuissent, ordinem & brevem

Aa

breves

priori contrarium fieri. Idem statuit & Vesal. sed in hoc ipsum errare ostendit Fallop. g. Hinc Avicen. 1. primi capit. de anat. muscul. thoracis, deceptus harum fibrarum mutatione dicit, in unoquoque spatio inter costas integras quatuor musculos contineri. Vesalius eos reprehendit statuens, tantum in sex verarum costarum intervallis, quatuor esse, in spuriis costis binos duntaxat numerari. Columbus idem voluit, qui respirationis musculos 89. dicit: proprios 81. & octo communes, qui abdominis sunt, qui thoraci quoque famulantur: verarum costarum sex esse intervalla, notharum autem quinque utrinque: in his duos esse in quolibet intervallo, in illa quatuor. Verum intercartilaginei commentitii sunt, cum intercostales interni, & costarum ossæ & cartilaginea spatia implerent.

d Gal. diff. musc. 23. veteres non novērunt fibras obliquum situm habere, nec quod bipartita sint 7. us. par. 20 fibra interna contrarium exteri situm habent. 5. ad. an. 4. & 8. ejusd. 3. e Gal. diff. musc. 23. exteriores fibræ à superioribus in inferiores procedunt, & 8. ad. an. 3. Vesal. Columb. Fall. & Piccolthom. exteriores ab inferioribus partibus costarum in superiores desunt: Laur. ex superiore parte costæ enati exteriores in inferiorem partem inseruntur. f Gal. diff. musc. 23. fibras dicit uniformes usque ad extremum inter costas nothas: ac inter integras, uniformes tantum usque ad cartilagineas, tum immutari ordinem & brevem fibrarum

breves fuissent & earum contractio exigua: nec pectus sufficienter constringere possent. Et cum omnis musculus secundum fibrarum ductum trahat, idcirco ne costae motu obliquo invicem jungerentur, musculi intercostales duplices (veteribus etiam ^h ignotum) facti, qui fibris contrariis se mutuo interfecent: cum duobus simul ad opposita oblique trahentibus, id quod trahitur, unico motu recto moveatur.

i Gal. de caus. respirat. at lib. de motu musc. externos inspirationi, internos expirationi praesse voluit: sic de diff. musc. 23. exteriores thoracem dilatare, qui in profundo sunt sit, cum contrahere asserit. Fallopius hanc posteriori sententiam Galeni erroneam dicit, licet nostro temporum Anatomici in dissectione vivorum ostendere conantur. Vesalius voluit interiores non secus ac exteriores genitos ut costas saltem constringant: quod Columbus reprehendit, Fallopius probat. Sic ait

Columbus: quando musculi vel interiores vel exteriores se junctim & soli agunt, dilatant, quando enim prima costa quam immobilem putavit Vesalius, attollitur à primo thoracis musculo, costas ordine trahit, intercostalibus exterioribus sursum versus extendentibus: contra deorsum interiorum adminiculo, quando ultima costa ab abdominis obliquo ascendente deorsum trahitur, dilatantur (non ut Vesalius voluit, constringunt:). At cum omnes una valide moventur, coarctant: exteriores sursum trahunt, interiores deorsum, & ita trahunt costas simul & valide constringunt: quibus constringendi valida esse debuit, eo quod foras expiramus & vociferamur. At Laur. extrem. costas deducentes in spm Fallopius & Plat. Fallopius & Arantii probat Rioli. negando costas ab his musculis ullo modo moveri posse: quia costas utroque extremo costis & sterno affixas, moveri non possunt, nisi per eam articulationem qua ad vertebrae est. At in eo motu inter se adduci vel abduci non posse, semperque spatium inter utramque costam aequale manere: dein quod musculi thoracem moventes, aliunde quam à thorace originem habeant: musculos vero intercostales, inter costarum spatia collocatos esse.

Usus horum musculorum, ut Anatomici plerique prodidere, thoracem ⁱ constringere & dilatare ⁱ exteriorum quidem, in expiratione costas adducere, & thoracem constringere: interiorum, ad inspirationem costas ab invicem abducere, & thoracis cavitatem ampliorem reddere. At cum Galenus ^k intercostales diaphragmati in subsidium venire dixerit, quatenus thoracem intro contrahere possunt, idcirco propter costarum motum quidem tributos concedendum est, sed qualis is motus? Vel enim costam costae ^l adducet, vel costam à costae abducet, vel costas attollit, vel easdem deprimit. At costam costae non adducit, neque costam à costae abducit, cum talis motus ⁱ non observetur; nec ullus horum per se, tanquam instrumentum voluntarium, potest locum in quo continetur dilatare, aut costam à costae se jungere. Nec costas attollere possunt, cum musculi costas attolentes, extra thoracem siti sint, aliunde exortum habeant, & proprii thoracis musculi dicantur. Ergo costas leviter depriment, quo aequalis sit thoracis depressio seu contractio, quemadmodum aequalis est ejusdem dilatatio. Sic ergo quod Galenus voluit, diaphragmati, adde & sexto thoracis musculo, qui sub sterno est, in subsidium veniant. Non tamen negamus ad dilatationem quoque facere: sed tantum ^m per accidens, quatenus musculi intercostales carnosa ligamenta sunt, ligamenti munere funguntur & costas inter se jungunt, tunc enim costis inferioribus à propriis thoracis musculis deorsum tractis & dilatatis: aut superioribus à propriis musculis elevatis, reliquae costae, quae mediae sunt, necessario majorum musculorum motum sequi debent: & sic spatia media ope intercostalium (sive dicas quatenus musculi, sive velis, quatenus ligamenta sunt) in violenta inspiratione dilatantur: quod tamen, si proprii musculi decissent, ne utquam prestare possent. Possunt quoque & hoc modo media spatia ab intercostalibus dilatari, si utrinque musculus thoracis primus, Subclavius dictus, qui inter primam costam & claviculam situs est, & similiter cum intercostalibus obliquas fibras obtinuit, costam attrahat; tunc enim consecutione & reliquae sequentes, aliquatenus dilatabuntur.

De

DE OSSIBVS ET CARTILAGINIBVS

medii ventris.

CAPUT XII.

De ossibus thoracis egit Gal. lib. de ossib. Cap. 13.

Ossa medii ventris sunt parte quidem anteriore sternon, ad cuius partem superiorem claviculae locata sunt: partibus lateralibus, costae: & parte posteriore, vertebrae habentur.

DE CLAVICULIS.

De his Galenus 13. usque partium 10. & 11. egit.

Claviculae^a quae καλῶδες^b ex eo quod universam thoracem^b claudant, dicuntur, quibus homo, simia, sciurus, mus & echinus donantur, duae sunt (utrinque una) sub imo collo in pectoris summo transversim sitae. Figurae sunt, non rectae, sed ad jugulum foris convexa [tab. 2. fig. 2. H.] intus vero cava: ad scapulam contra, extrinsecus leviter cava, intus vero convexa [tab. 2. fig. 1. 2. 3.] quare in homine, cum magis sint plana, quam in simiis, oblongum s. Latium referunt: cavae esse debuere, ubi jugulum spectant parte anteriore, quo vasa, quae sursum feruntur, ut sunt venae jugulares & arteriae carotides, non comprimantur, & imprimis propter nervorum propages, qui à dorsali medulla axillas petunt. Duplicem autem semicirculum obtinuerunt, roboris gratia: si enim semicirculares tantum fuissent, cum intus fistulosae & fungosae, & tenui ossa crusta tectae, facile fractae fuissent: hinc saepe quoque franguntur. Et licet longae sint, crassae & incurvae, magis tamen in viris incurvantur, quominus brachii motum impediatur: at in mulieribus [tab. 2. fig. 4. R.] minus incurvae sursum elevantur, quare minus agiles sunt, ut cum lapides projiciant videre est: quod in his pulchritudinis causa factum videtur, ne foveae, ut in viris, supra pectus conspiciantur.

Verum protuberant & lineis duabus [tab. 2. fig. 1. 3. E. fig. 2. 3. F. G.] donantur, ut inde Subclavius musculus, & pectoralis musculi pars oriri possit: tuberculo donatur, ut inde Subclavius musculus, & pectoralis musculi pars oriri possit: tuberculo donatur, & ligamentum [tab. 2. fig. 3. circa N. oritur.] ad interiorem scapulae processum educat. Exasperantur quoque utrinque [1. 2. fig. 1. K. fig. 3. P.] juxta extrema, ut inde ligamenta prodeant, & etiam Mastoideus musculus, qui capitis septimus est: at ubi clavicula lata est, Delroidei musculo principium, & scapulae secundo insertionem praebet. Haec utrinque scapulas^d cum sterno per diarthrosin, intercedente cartilagine [tab. 2. fig. 5. S. T.] copiosiore, unctuosoque humore perfusa, instar clavi firmat: unde forte rectius^f elaviculi dicerentur, & Celsus Jugula à jungendo, vel quod jugis bouum collo alligatis similes sint, nominavit; quae cartilago κατὰ τὴν αἰσιν^e dicitur^e clavicula, illique non adnascitur, sed tantum ligamenti articulum amplexantibus detinetur, in medio pectoris.

Aa 2

re juxta guttur, eaque parte articulis committuntur, partim vero ad humeros, ad scapulas reclinatos, quae humeris semper adherescunt. Hipp. de loc. in homine. c. Quibusdam ἀρθερώμενοι, Lamm. f. Piccolhom.

^a Gal. de oss. 13. 8. ad. an. 1. alius Ligula, vulgo os fureae, cum veluti fulcra quadam ab osse pectoris diducendo & sustinendo humero paratae sint, Columbo (cui & Jugula) & Piccolhom. alius furcula superior. ^b Arist. 3. hist. 17. ubi jugale vertit Gal. & lib. de spiritalibus. 7. καλῶδες Hipp. de nat. hom. & de nat. oss. & lib. de alim. ubi ostendit, claviculae fractae & costis ad alendum viginti dies dari. ^c Gal. 3. usque part. 11. ^d καλῶδες articulos habent partim quidem ^e netur, in medio pectoris.

netur, quo in brachii & scapulæ moribus aliquantulum cedat, mobilis est, ut moribus brachii & scapulæ facilius obsequatur. Et quemadmodum capitulo [t. 2. fig. 1. 2. 3. A.] cartilagine incrustato, dicta tamen cartilagine intercedente jungitur: sic altero oblongiusculo & lato [tab. 2. figur. 1. 2. 3. Q.] quasi capite, scapulæ processui superiori interveniente cartilagine [tab. 2. fig. 5. S.] peculiari (os parvum cartilaginofum securitatis gratia creatum dixit Galenus) articulatur. Inter se claviculæ robusti ligamenti interventu junctæ sunt.

Gal. 13. us.
part. 10.
Gal. 13. us.
part. 11.
Piccolhom.

Ufus est prohibere, ne scapulæ & cum humero in pectus cadant: sicque multi brachii motus impediuntur, quare stabilimento^b sunt. Et si ad Thoracis fabricam non pertineant, cum bruta thoracem habeant, & pene omnia claviculis cateant: hominibus tamen datae propter manus, quas, ut & brachium totum, propter varias actionibus plurimum flectere, ex uno latere in aliud movere oportebat: at ne in his flexionibus brachium in oppositum latus velut præcipitetur, & ne brachia, nisi summa cum difficultate in pristinum locum à musculis reduci sarsum, & retrorsum moveri possint, claviculæ flexionem inhihent: & ne, cum volumus aliquid ad posteriora propulsare, scapula ad anteriora prolatur: quod cum sit, quando humerus luxatus in costas procidit, vel scapula instar alæ ob effractam claviculam dependet.

De Sterno seu osse Pectoris.

CAPUT IX.

De sterne egit Galenus lib. de ossib. 13. 7. us. part. 21. quomodo autem diffecandum sit, ut pleura recte conspiciatur 7. adm. an. 2. docet.

STernum, στερον^a, quod in medio [tab. 2. fig. 9. g. h. i.] costarum^b sternatur, cum in hoc costæ copulentur: seu os pectoris, cum anteriorem thoracis partem constituat, & subjecta custodiat. Hoc nonnihil convexum, longum & latum, & quia pugionem veterum [tab. 2. fig. 6. & 7.] representat, (hominis, non canis sternon) idcirco ἐνφοειδές, ensiformæ dicitur. Hujus substantia non ut reliquorum ossium, solida est, sed fungosa, rubens, & ex ossibus & cartilaginibus componitur. Non autem ex uno osse nisi in senibus, sed pluribus, ut dicitur^d membranis patet, compactum, in modo natis totum cartilagineum est, primo osse excepto: mox octo observantur, quæ copiosa cartilagine intercedente distinguuntur quorum septem pro septem integrarum costarum cartilaginibus recipiendis facta sunt, quemadmodum os clavum, cum, quia ibi pro cartilagine ensiformi, ut ei tanquam fundamento adhæreat. Hæc autem septem, non exacto conjungi, paucioraque fieri incipiunt, & modo quatuor observantur re-
manente primo [t. 2. fig. 6. a.] quod latius est, secundo & ultimo, reliquis mediis in utramque coalitis. At in adultis tria sunt, linea transversa distincta, semperque primum & ultimum

^a Hipp. de loc. in hom. Gal. 7. us. part. 21. 7. ad. an. 2. 8. ejus. 10. s. Hipp. Arist. 3. hist. 7. verum ipsa potius regio^c dicitur appellari debet, Vesalio & Columbo momentibus. Sic dicitur, quia ibi fit^e si^f στερον^g τὸ στερον^h, id est, mentis firmitas, quando eo loci cor est, Laur.

^b Arist. 3. hist. 7. c. Gal. de oss. 13. Enos gladiale vocari ait Colum. d. Gal. 8. ad. an. 1. 7. us. part. 21. e. Pbst consistenteria annos unicum est, Fallop. f. Gal. 7. us. part. 21. ex ossibus septem componitur: quæ & Hipp. videtur mens fuisse, sternum sibi ipsi coharens discriminationes obliquas habet, quæ parte costæ annexæ sunt. Gal. 8. ad. an. 1. ex duodecim ossibus aut. y. Introd. ex septem: Vesalio ex tribus: Columb. & Piccolh. ex quatuor: Fallop. in obs. in pueritia ex octo, postea sex, dein quatuor, post tria, in virilitate duo, & post consistentia annos unicum tantum apparet. g. Gal. de oss. 13. & 8. ad. an. 1.

an. septem ossa dicis. Fallopio in canis & canibus septem: in simia vero non candidis ossa semper invenis, & os unum reliquis omnibus longius, in puerulo post septimum annum ex quatuor, in adultis ex tribus constat. Vesalius: in adultis tria confici. Columb. complurimum quatuor, minimum tria: in simia & canibus falsum non est quod Galenus dixit. Piccolhom. qui Galenum sequuntur, decipiuntur, cum quatuor duntaxat reperiantur. At Laur. dem Galenus septem ossa tribuit, non ad transversas divisiones respicit, sed ad eos sinus, in quos costarum fines cartilagines inseruntur. Valuerat Roma vidit in puella septenni, os hoc in sex ossa divisum, quorum postrema quinque ab imo ad summum per ossa longitudinem secta videbantur.

ultimum in pueris & adultis idem est, sed medium in plures partes distinguitur: Præterea frequentior contingit ossa sterni, quæ inter primum & ultimum sita sunt, aut certe aliqua eorum, secundum longitudinis medium linea evidentissima, modo recta, modo oblique protracta dividi, quo fit ut sterni partes aut decem, aut novem, aut octo, aut septem frequenter numerentur. Communiter pro ratione ætatis plura pauciorave existunt, quæ cartilaginibus interjectis ligamenti instar, per symphysin & synchondrosin connectuntur. Etsi enim ad thoracis motum ope costarum elevari & deprimi videatur, attamen nullo motu separatim movetur. At in canibus, ex septem ossibus per synarthrosin coarticulatis constat. Horum superius [tab. 2. fig. 6. a. b. c.] cæteris amplius & crassius est, pugionis nodum, vel pomum latum, planum tamen & inæquale, superiori sede lunatum [tab. 2. fig. 9. g.] foveam exhibens, quam nonnulli superiorem furculam, alii *Φαλύδα* & jugulum vocant: in medio roboris gratia, trianguli [tab. 2. fig. 6. a.] modo extuberat, ad quod prima costa [tab. 2. fig. 6. g.] mediante cartilagine jungitur, quemadmodum secunda, ubi os primum [tab. 2. fig. 6. b.] secundo necitur. Interius, in medio sinu exculptum [tab. 2. f. 7. d.] habet, dem motum quo asperæ arteriæ descendenti cedit, & utrinque sinus [tab. 2. f. 6. & 7. e. f.] ad clavicularum capita excipienda. Secundum, quod [tab. 2. f. 6. a. b. c.] respondet manubrio, seu illi parti quam tota manus complectitur & capula seu manubrium appellatur, multos sinus [tab. 2. fig. 6. k. l. m. n.] utrinque in lateribus habet, non tamen partibus intervallis distantes, ac si manubrium hoc digitos admitteret ad cartilagineas costarum tertiarum, quartarum, quintarum & sextarum suscipiendas, & reliquis duobus angustius est: quod quandoque in mulieribus ad finem foramine [tab. 2. figur. 8. u.] lato vasis transmittendis destinato, pervium est. Tertium minus est [tab. 2. fig. 6. & 7. f.] at secundo latius, una cum ipsa cartilagine, reliquæ parti pugionis assimilatur: quare Celsus os peboris utrinque lunatum dixit, in homine intelligas, non cane; & huic, ubi secundo ossi haeret, costæ septimæ cartilago jungitur: in nonnullis mediâ linea dividitur. Utrinque leve est, superne tamen exasperatur, ut inde Mastoides, seu septimus capitis musculus prodeat.

Cartilagineas habet (præter duas superiores, clavicularum cum sterno copulationem intercedentes) unam inter primum [tab. 2. fig. 6. 7. h.] & secundum os, quæ ligamenti vicem gerit: alteram in fine oblongam, mobilem, triangulam [tab. 2. fig. 6. & 7. e.] quæ communiter in mucronem gladii modo exacuitur, unde etiam *Ευφοειδής* coniformis & mucronata dicitur: quæ aliquando in fine lata, nonnunquam bifida, k Gal. de oss. 19.

Aa 3

unde 7. us. part. 21. 8.

ad an. 1. sic 6.

us part. 3. ossis peboris extrema *ἔνδοξος* *Ευφοειδής*: & 7. ad an. 2. Arabibus malum punicum seu granatum, quod fortasse a lunis balauisti apicis imaginem accedat, Vesal. Columbus hic addit clypealem & gladialem dici: quemadmodum & Piccolhom. at Laur. eniculatæ sicutiformis: A vicenna, Epiglot. talis ab imagine operculi laryngis, huic cartilaginem non autem aliam similem.

*Amato cent.
3. eur. 93. per-
russa est ad per-
spirationem, ut
stomachi teter
vapor per istud
foramen expi-
ret. Riol. hoc
ineptum est:
nam nisi carti-
lago bifida fue-
rit, perforata
est ad transi-
tum vena mam-
maria interna
in mulieribus
si foramen in
sterno nullum
ad sit in cartila-
gine hac repe-
rietur.*

in Baptista Co-

*dronechius lib. de morbis qui anno 1602. Imola vagati sunt, meminit morbi quem novum dicit, & prolapsum, prociden-
tiam, depressionem & flexionem mucronata cartilagine nuncupat, ejus causas, signa & curationem exhibet.
a & c. & c. & c. o Hinc quibusdam clypeus oris stomachi. Gal. 6. us. pars. 3. propter os ventriculi: & 7. ejusd. 21. cer-
tum etiam propugnaculum esse oris ventriculi, & partis septi, quæ illic est, jam autem & cordis. Vesal. subalarum par-
transversum munit, & negat tueri os ventriculi, cum ad juxta dorsum situm sit, sed septi, quod eo loci maxima nervo-
rum sum. Laurent. ridet aliqui hunc usum, quia longe ab ore ventriculi distet: at in viventibus non, quemadmodum in
mortuis distat. Piccilhom. ori ventriculi ad ejus tutelam preposita, vel ob tutelam diaphragmatis: ob motum ventri-
culi, qui cum alimentorum copia turgescit, jecur antrosum simulque sursum propellit.*

De Costis.

CAPUT X.

De Costis egit Gal. lib. de ossib. 13. 8. admin. an. 1. Arist. 1. hist. animalium. 15.

Costæ, quæ Græcis *σπλῆγες*, quod latera efformant, & *σπλῆγες*, quod remorum
a Naturaliser, in modum collocatæ sint: communiter ^a tam in viris quam in mulieribus ^b u-
trinque duodecim ^c sunt [t. 2. fig. 9. & 10. ch. à 1. ad 12.] plures sunt, quo facilius tho-
raci ^a rax ^a
*potius plures ob
seminis copiam: natura. n. potius voluit alimentum & semen abundare, quam deficere. b Melanchton lib. de an. exi-
stimandum in viro costas antea fuisse 13. & 13. jugum ex viro exemptum, ubi viri est cinctus, & inde fabricatâ Evam.
At Fallopius secutus Vesalium, in primo ait homine, in altero latere saltem erant undecim costæ, in altero vero duode-
cim quia ex deficiente fabricavit Evam. c Hipp. de nat. oss. Gal. 7. us. part. 21. de oss. 13. 8. ad. an. 1. At Arist. 1. hist. 15.
utrinque octona. (Hoc reprehendit Columbus: ex aliorum relatu hoc dicere, ait Vesal. At Fallop. Aristotelem de costis
perfe-*

perfectioribus & maioribus locutum esse credit, quasi imperfectas hoc nomine non sit dignatus) & in hominibus gentis Turdolorum septena dicuntur: ait Vesal. Ligures in veterum monumentis extra ad os fuisse appellatos. In serpentibus vero ex Arist. 2. hist. 17. totidem quot dies mensem integrum complent, singulis enim tricena.

rax à musculis moveatur: rarissime plures, d et si facinorosi cujusdam Anatome publica, utrinque tredecim, c primam eamque sinistram perfectam, dextram vero imperfectam observavimus: adhuc rarius f pauciores, & illud ob materiæ copiam, hoc vero ob ejusdem inopiam fit.

Dividuntur in 8 veras seu legitimas, & nothas h seu spurias: veræ septem sunt superiores [tab. 2. f. 9. a. ch. 1. ad 8.] sic dictæ, quod circum perficiant, quæ posterioribus vertebrae dorsi [t. 2. f. 10. S. T.] per diarthrosin i duplici nodo, quo validius inhaerent, altiore ad vertebrae corpus; humiliore vero, ad lateralem processum, validis ligamentis junguntur: anterior vero sterno [t. 2. f. 9. C.] in leves ipsius sinus, per synarthrosin cartilaginibus velut in capitulum desinentibus, articulantur; (at in canibus primæ cartilagini non articulat, sed prorsus adnascitur) harum duo superiores primæ cartilaginis, quasi retortæ: duæ sequentes æque solidæ: tres ultimæ, sequentes, pe-
ctorales Polluci dicuntur. Nothæ sunt quinque inferiores, quæ spuria & illegitimæ dicuntur, quia minores sunt, breviores, nec sternum attingunt: molliores sunt, cum pene k sint cartilaginæ, quo ab injuriis l tutiores sint tum ipse, tum per eas, corpora subiecta; (hinc partes ossium prominentiores ex tali esse substantia satius fuit, cum pertulæ cartilago minime comminuitur, aut frangatur) quare quasi mutile in exquisitam m cartilagine finitur, quæ sursum retortæ, inter se quasi [tab. 2. f. 9. FF.] conglutinatæ duodecima excepta, coherent & verarum cartilaginibus [tab. 2. fig. 9. ad 1.] committuntur: quæ etiam imperfectæ sunt, quia solis vertebrae nectuntur, octava quidem (quæ aliquando ad cartilaginis ensiformis radicem alligata reperitur) & nona duplici articulo, non tamen valde protuberantibus articulis (quemadmodum & veræ septem, cum iis majus robur à vertebrae, quam à sterno accedere debeat) undecima vero ac duodecima, saltem superiore articulo, quemadmodum saepe & prima: at decima, modo duobus, modo simplici articulo copulatur. Sternon non attingunt, quo inferior venter ratione ventriculi & uteri n dilatari possit. Undecima quandoque, quemadmodum & duodecima, cum diaphragmate alligatur. Duodecima quæ inter eas minima est, & à quibusdam costæ nomen non mereri creditur, cum aliquando Galenus o undecimam costam ultimam dixerit, & Hippocrati p q uis videretur, nulla ex parte undecimæ adhæret (quemadmodum & undecima, quandoque decimæ cartilagine non attingit) quo amplior relinquatur visceribus inferioris ventris locis: aliquando q obliquo abdominis musculo connascitur, nonnunquam circumscriptionem proprii musculi ipsam detrahentis habere conspicitur. Sunt undecim videtur. Fallopius numerum 11. invenit, sed bis ad summum unam superadditam reperit. g Dicuntur yvionay, genuina & perfecta. h Nā-
doi πολυδυναι, πολυδυναι, adolera & illegitima. Cels. potius appellari putat, & abdomini inhaerescere. i Gal. 8. ad. an. 1. per diarthrosin: at 7. duplicibus articulis cum unaquaque dorsi vertebra committuntur: verum non omnes duplici nodo junguntur, quare Vesalius Galenum reprehendit. Hipp. de locis in hom. costæ septem partim posterioribus ad vertebrae, partim anterioribus in pectore inter se committuntur. k Gal. 8. ad. an. notha appellantur, quæ ad sternum non per-
tingunt, totæ autem cartilaginæ admodum existunt. l Gal. 7. us. part. 21. m Gal. de off. 13. 8. ad. an. 1. n Arist. 2. par. 9. 4. ejus. 10. ex quo patet, cur venter osse careat. o Gal. 5. ad. an. Fallopio monente. p De resect. corp. ex costâ nothâ
lien initium sumitur & de off. nat. in renes juxta spuriam costam radicibus firmatur. q dissect. musc. 23.

tur. Sunt autem costæ non solum ossæ substantiæ fungosæ [tab. 2. f. ii. R.] sed singulæ etiam suas habent cartilagine, & parte posteriore, qua suis appendicibus vertebis articulantur; & antè, qua sternò [tab. 2. f. 9. A. B. costarum cum cartilaginibus conjunctio, C. D. cartilaginum cum sternò.] committuntur: hæ autem multo illis majores & crassiores sunt, cum anterior thoracis pars & distendatur, & contrahatur: sic notharum cartilagine, quam veram longiores sunt: in veris etiam duriores sunt, cum duriori substantiæ, sternò nimirum conjungendæ fuerint: in nothis molliores, (hinc forsitan privatim *χόνδρος*, id est, cartilagine, ipsas nothas costas vocarunt) renuiore & angustiores, ut quæ cum cartilaginibus copulentur: postremæ tamen cartilago, quemadmodum & primæ brevissima est, illius tamen angusta & acuta, hujus verò lata & ampla. At costæ inferiores, in viris ad extremam senectam cartilaginosa existunt: superiores vero, in valde senibus ossescere incipiunt (ut in simiis & canibus) ossæque cartilaginem habent: quemadmodum in virginibus post primam mammarum auctiorem, in ambitu ossescunt, quo mammarum ipsis incumbentium molem rectius sustineant, ne iis depressis thoraci sint obstaculo.

Figura semicirculares sunt arcum referentes, quo thoraci circulem figuram tribuant, ut is validior sit, & ad plura continenda accommodatior. Longitudo omnibus non eadem; superiores enim & inferiores breviores, mediæ longiores & latiores sunt, prima excepta, quæ omnium latissima & brevissima est: Superiores curvæ magis & arcuiores, inferiores minus gibbæ: omnes tamen in exortu angustiores & subrotundæ sunt, & quo magis pectus accedunt, tanto latiores fiunt, earumque latior pars ad axillam, palmula, angustior ad spinam *υποπτεριον* remulus dicitur: suntque parte superiore, quam inferiore crassiores, quo signo dextra & sinistra distingui possunt. Sunt quoque extrinsecus potissimum, qua vertebis alligantur, asperæ [tab. 2. f. ii. P.] & inæquales, ut inde ligamēta prodeant, quibus vertebis alligantur, ubi gemino donantur tuberculo; altero, quo [tab. 2. f. ii. L.] vertebræ sinui articuletur; altero, quo transverso processui [tab. 2. f. ii. M.] jungatur ipsæ superiores, potissimum cum inferiorum aliquæ simplici tuberculo jungantur: sic etiam exasperantur [tab. 2. f. ii. Q.] ad recipiendum sacrolumbum ^u musculum thoracis; musculorum item intercostalium exortum, vel insertionem. At internæ leves, ne pleura lædatur: in ima tamen cujusque parte [tab. 2. f. ii. K.] sinum canali similem secundum earum longitudinem ^a habent ut tria ^a organa venam, arteriam, & nervum, quæ proxima sunt, suscipiant: ea tamen parte qua vertebis proximæ, quemadmodum & in mediis costis, cum hic vasa majora sint, sinus magis conspicui sunt, quod propter Empyricorum sectionem observandum.

Et si *Εμπύριμα* Hippocrati ^a plerumque omnem suppurationem, & quamvis in pus transmutationem, in omni corporis parte, ab inflammatione ^b aliqua aut tuberculo, Gale-

ⁱ In minoribus animalibus cartilago, in majoribus si ossæam cartilaginem dixeris, nihil erit peccati, 8. ad. an. 1.
ⁱ Gal. de off. 13. 8 ad. an. 1.

ⁱ Leonis crassiores ac prorsus teretes & insignem cavitationem habent. Col. lumb. reprehendit Aristotelem quod leonis, ossis penitus solida dixerit, nec medullam intus contineri, ut sic incredibile hominum animarum robur probaret. Verum Arist. 3. hist. 7. & 2. part. 6. dixit admodum exiguum esse medullam, ut

carere videantur. ^u Vesal. & Fall. quartus. Col. quintus est thoracis. ^x Gal. 8. ad. an. 3. Vesalius, tribus superioribus costis sinus pro vasis denegat. ^y Arist. 2. part. 9. ^a 3. Epid. sect. 5. Aphor. 8. ^b quandoque nulla, febra succedente, seroso aut pituitoso humore, ex reliquo corpore eo delapso & putrefacto. Etio auctore toto 3. ser. 1. c. 65. ausi sunt acuto culle pleuram perforare: aliqui etiam ferro in profundum usque adacto quibus vel statim mortem induxerunt, vitalem spiritum acervatim, una cum pure evacuato aut fistulas incurabiles efficiunt.

c De virginum morbis: dicitur in coacis, a situ.
d Lib. de princip. 1. morbi.
Arist. 1. hist. 17. 3. part. 10.
e Hipp. de sacro morbo, phrenes temere ac fortuito nomen sortitum videtur, non revera nec a natura: non enim video quam vim ad prudentiam & intelligentiam habeat, &c.
Cor & septum sentiunt quidem, neutrum tamen prudentia vim habet.
f Arist. 3. part. 10. ubi propter vicinitatem at traxerit humorem calidum atque excrementitium, continuis mentem sensumque plane perturbat, quare *phēnes* appellantur, quasi particeps sit prudentia. *g* Hipp. 3. de morbi. & in Coac. aph. 55. Gal. 5. loc. aff. 4. de hoc egit. *h* Phrenes locus precipuus & ad insaniam opportunus. Hipp. de iis, quae ad virgines sanguis ait pra multitudine ad cor & diaphragma resilit, inde cor fatuum fit, ex fatuitate torpedit, ex torpedine delirium apprehendit.
** Hipp.* si in carnosae est facile percuratur, ut Galenus notavit & Hollerius confirmavit. † Homer. odys. 9. scribit, hunc locum vulnere lethali perfodisse.
i 3. part. an. 10. *diaphragma* ait, quod nonnulli *phēnes* vocant (illud *Gaza* septum transversum, hoc praecordia & cinctum vertit) & 1. hist. 17. 2. ejusd. 15. & 4. part. 1. Gal. 5. loc. aff. 4. ait, Aristoteli *κοιλία* succinctum dici: eidem & *κοιλία*.
k Gal. 5. us. part. 15. 13. ejusd. 5. 5. loc. aff. 4. 1. diff. musc. 23. 4. us. part. 14. 7. ejusd. 21. 13. ejusd. 9. m. Cels. n. Plinio, quasi *κοιλία* ob cordis viciniam, quod se ei praetendatur, Piccolbom. Disseptum, Macrob. o In omnibus sanguine praeclitus est, at in minutis praetenuitate non aequae spectatur, 2. hist. 15. 4. part. 1. p. Aliis qui intercartilagineos agnoscunt, 89. respiratione est musculus.
q Musculum esse oēs fatentur: at cum musculus motus voluntarii instrumentum sit Galeno, diaphragmatis aut motus ab arbitrio nostro non dependeat, cum respirationis conditione sequatur, quae tota naturalis est, saltem ea qua libera dicitur, quia & dormientibus non cessat, aliqui dubitant musculus ne sit secundum Galeni doctrinam: & si musculus, cur eir-
cularis sit. Piccolbom. diaphragmatis motus voluntarius est, sed necessitate aliqua cogente, ut in respiratione, dejectione & mictione: qui voluntarii motus sunt, quia musculorum ope perficiuntur, sed aliqua necessitate urgente. At diaphragma secundum definitionem musculi ab Hipp. propositi musculi nomen meretur, & quia constitutio ipsius peculiaris est, non mirum si motum peculiarem obtinuerit, nempe quodammodo naturalem. Gal. 13. us. part. 5. rotunda enim figura, solus obliquus. *r* Magnus & robustus 5. us. part. 15. *f* Ad spinam retro hepar, phrenes situm habent, Hipp. de resed. corp. *t* Per duo ligamenta valida imis vertebrae injectum, deorsum expanditur, quae circiter 22. vertebrae desinunt,

8. ad. an. 1. De huius exortu & insertione non convenit inter Anatomicos. I. Hipp. de off. nat. juxta vertebrae infra costas, prope renem exurgit & lib. de corp. resect. à spina retro hepar. Gal. 5. ad. an. 5. à spina vertebrae. II. alius à costarum notiarum cartilaginibus, Gal. 5. ad. an. 8. & Fern. caput in costarum extremis collocat: videtur Fallop. qui duas carneas portiones deorsum ductas supremis lumborum vertebrae ad latera inseri ait Plat. duas portiones longiuscula: Lau. dua membranae processus. III. alius à cartilagine ensiformi, Gal. 5. us. part. 15. 7. ejus. 21. & 8. ad. an. 11. IV. Alius caput in medio est, Gal. 13. us. par. 5. Vesal. Sylvio cui caput in medio, finis in costarum circuitu. V. alius finis in medio, Gal. 5. ad. an. 5. Col. Plat. Piccolb. Laur. VI. origo & à costarum cartilaginibus & à vertebrae, Piccolbom.
† An unus sit musculus. Gal. 1. ad. an. scribit motuum similitudinem notam esse sufficientem, qua fidem faciunt unicum musculum esse: at huius actio uniformis, qua ritu pulmonum indefinenter procedit, huius corporis unitatem ostendit. Contra Habicot chirurgus duplicem facit, quia totus in sua structura bifidus sit, duplici principio, duplici nervo, &c. u Arist. 3. par. an. 10.

gini, mucronata [t. 1. u.] quae ipsius x propugnaculum est, annectitur, & in validissimum tendinem membranofum, nervolumve [tab. 3. fig. 2. b. c. d.] ex nervis & membranis firmissimis conflatum, circa medium y definit. Nervosum autem z in medio esse debuit, partim ob securitatem, quo illa sus variis sustineat motus, ut cordis quod suo cono aliquando tangit, & ut hepar succutiens, sanguinem in venam cavam refundat, cujus ascensum in homine recto, promovere videtur: & doloribus a minus oportu sit: partim ne vena cava [t. 1. & t. 3. fig. 2. u.] & oesophagus [t. 1. & tab. 3. fig. 2. l.] quae per id transeunt, ab ejus perpetuo motu constriquantur, & sic ciborum & sanguinis transitus impediatur quod fieret, si totus carnosus fuisset: quare quomodocunque musculus hic agat, cum carnosae fibrae [tab. 3. fig. 2. f. g.] tantum contrahantur, nunquam nervosa pars circa eos ductus constriungitur, sed fibris contractis, nervosa pars, veluti à centro ad circumferentiam distrahitur, & foramina potius aperiantur. Verum, & abdominis musculus obliquo ascendenti & transverso unitur, & supra pericardio ita arte copulatur, ut citra lationem ab eo separari nequeat.
b Figura est propemodum [t. 3. fig. 2. ostendit] circulari, rotunda, c piscem Rhaia referens, vel reticulis, d quibus in pilae parvae ludo utimur, quam simillimus, praeter tim si circumferentia non segniter parietibus attusa fuerit, reticuli processibus manubrium exprimentibus.

Substantia ipsius partim [t. 3. fig. 2. f. g.] carnosae, partim nervosae [t. 3. fig. 2. a. b. c. d.] quasi ex duobus circulis latis componatur, sed una parte in acutum angulum [tab. 3. f. 2. d.] cessantibus, quorum carnosus e thoraci undique [vide tab. 1.] annexus, ipsum nervosum, qui in centro est, ambit: ad hunc tanquam ad centrum fibrae plurimae instar linearum à circumferentia & quasi musculi principio excurrunt, quas ut recte conspiciere possis, peritonaeum à septo separes, quod in porcis citra negotium, in homine vero & in cane, non ita facile fieri potest. Membranam f duplicem habet, alteram inferiorem à peritonaeo, alteram superiorem à pleura exortam, quibus ad robur succingitur, quamvis & propriam, eamque tenuem tunicam obtrineat, ut ab omnibus aliis partibus propria circumscriptione distinguatur.

Venas * recipit à venae cavae [tab. 1. m. r. 7. A.] trunco ascendente exortas, Phrenicas dictas (nonnunquam ab Adiposa quoque ramulos accipit, aliquando etiam ab Emulgente, qui cum ejus venis propriis coeunt) quas comitantur arteriae ab arteria magn

Bb 2

magn

medic. b Gal. 13. us. part. 5. c Gal. 5. us. part. 15. at Vesal. & Columbo, orbicularis. Piccolhom. rotunda seu circularis sed non globosa. d Vesal. & Plat. e Carnesiore parte costis annectitur, Arist. 3. par. 10. l. hist. 17. f quae per se habet, Gal. 7. us. part. 21. 5. ad. an. 8. * Arist. 1. hist. 17. venas per se per se habet.

magna descendente [t. i. e.] quæ phrenicæ [venæ t. i. n. t. 7. C. arteria t. i. o. t. r. 2. KK.] dicuntur, quarum illæ sanguinem pro nutritione, hæ spiritum vitalem cum vitali facultate devehunt, & suo motu ventilando calorem nativum custodiunt. Nervi [t. 3.

f. 1. PP.] duo à spinali medulla cervicis vertebrae inclusa, inter quartam & quintam vertebrae, prodeuntes ex tribus surculis utrinque conflatis, per thoracis cavum delati (quod ei peculiare, cum aliarum partium, quæ sub claviculis sunt, nullum à medulla, quæ in colli vertebrae est, recipiat) sublimes à Mediastino (ne lædantur) contenti & stabiliti ad ipsum feruntur quos à loco & sublimi manare erat necesse, ut in omnem partem ex æquo actionem extendant: quorum dexter supra, sinister infra cor & diaphragmati, prope ejus corpus nervosum inferuntur (quamvis etiam parte inferiore à costali & stomachico illuc transeuntibus, nervulos accipiat) per totam ipsius substantiam disseminantur, ut sensum & motum largiantur, unde multis sensus particeps, eoque læso communiter mors sequitur. Hos cum ramulis nervorum in maxillarum & labiorum musculos distributis permisceri volunt: unde ex diaphragmatis percussione risus * Sardonijs oborietur, quia musculi faciei & labiorum convellantur.

Foramina obtinuit h duo: alterum à dextris [tab. 1. & t. 3. f. 2. m.] in parte nervosa media, ad cavæ venæ ex gibbis hepatis ad cor ascensum: alterum à sinistris [tab. 1. & t. 3. fig. 2. l.] posterius nonnihil & majus, ut œsophagum, & duos nervos ad ventriculum transire permittat, quibus tamen proxime & firmissime membranæ conascuntur & circumhærent. Ad hujus exortum, inter ipsius productiones [tab. 1. & t. 3. fig. 2. h. i.] ad vertebrae divisio [t. 1. & t. 3. f. 2. k.] est semicirculum referens, pro Arteriæ magnæ & venæ k & 278 descensu & nervis sexti paris costis attentis, qui sub pleura feruntur, quæ vertebrae, cui Aorta instrata amplectitur.

Ufus primarius, qui à Galeno i inventus & ex ipsius situ maxime dependet, est, ut sit respirationis m involentæ seu liberæ placidæ vñ spirationis organum: quem admodum violentæ, in qua valida est spiratio, oragana sunt musculi sexaginta quatuor, qui circa thoracem sunt, eum exacte dilatantes & constringentes. Fibris namque æqualiter retractis, trahuntur omnes costæ mendoæ, versus thoracis centrum sicque extrema thoracis ad vertebrae trahunt, & partem inferiorem constringunt: quare attollitur, tenditur o & expirationi inservit: hinc in mortuo perpetuo contractum & tensum apparet, cum expiratione vita cesset, & si thorax inter costas aut diaphragma perforetur, statim flaccidum deorsum concidit, & jecur ac ventriculum, quæ prius sursum erant retracta, propendere sinit: quamvis etiam propter copulationem septi cum mediastino, hæc forte naturalis esse possit. At fibris laxatis, decumbit, mendoæ enim costæ laxantur, & infima thoracis, & consequenter pulmones, dilatantur & inspiratio fit: quare ipso impedito vel affecto, difficilis respiratio sequitur.

Hic motus secundum p aliquos ex naturali & voluntario mixtus est. Voluntarius qui-

finis & sexti paris nervus transeunt: 2. pro vena cava. 3. pro œsophago & nervis. Fallop. tria, 1. pro vena cava: 2. pro œsophago: 3. pro arteria, quod potius fissura. Columb. Hipp. & Galenum reprehendit; dum per idem, œsophagum & arteriam transire voluerunt: & Vesalium, qui tria posuit, duo tantum agnoscent, 1. pro vena ascendente. 2. pro œsophago & nervis. i Gal. 4. us. part. 14. k Gal. 5. ad. an. 8. l Primus, ac major 5. us. part. 15. 7. ejusd. 21. quare Gal. tanquam primo inventori gratias esse agendas, ait Averroes. m De causis respir. Respirationis est organum, & 4. us. part. 14. n Gal. 5. loc. aff. 4. o Gal. 4. loc. aff. 8. & 5. ejusd. 4. p Motus diaphragmatis qualis sit ambigitur: an fluxu & re-

fluxu moveatur, ut ventrem inferiorem flabelli instar eventillet: an sui dilatatione & contractione. Vesal. obscurum dicit: alii anatomici dilatando & contrahendo moveri volunt, & Gal. 1. mot. musc. declaravit, ut musculus animatum habet contractis crumenis similem, cui simile est septum transversum, nisi quod perforatum non est. Et Col. Piccol. Laur. statuunt in inspiratione tendi, in expiratione relaxari, at Gal. in hac re dubius & incertus fuit. Quarundam aliqui an hic motus septo insitus sit, an aliunde insit, scilicet à corde septi centrum percutiente, vel à pulmonum diastole, & sysole? Riol. putat motus illos septi à pulmonibus istam partem agitantibus pendere, dum in inspiratione dilatantur, deorsum pellunt septum relaxatum & expansum: at in expiratione, pulmonibus pugnā vacui contractis, ipsum septum superne convelli atque contrahi.

quidem est, sed non simpliciter: nam motus voluntarius duplex est, alter voluntarius simpliciter, ut progressio deambulatio: alter voluntarius necessitate urgente aut requirente, ut in respiratione necessitas refrigerationis urget, in dejectione & mictione excrementa sphincteres stimulant. Alter usus est, hypochondria ventilare, maxime hepar, cum convexa sui parte arteriis careat, & etiam vapores humidos in inferioris ventris capacitate contentos, ne quiescentes putrescant, cujus nomine Hippocrates inferioris ventris respiratorium vocavit. Tum, monente etiam Galeno excrementorum & fœtus exclusionem promovere, abdominis musculos, uti superiori libro ostensum fuit, adjuvando, ad quod suo situ obliquo confert: superiore enim parte tanquam manibus intestina premit, deorsum propellit, alias fœces æque, per superiora ac inferiora deturbantur. Tandem, ut secundum Platonem, irascibilem animam à concupiscibili scernat. Secundum Aristotelem, ut partes naturales à vitales, seu ignobiliores à nobilioribus separet, ne vapores ab inferioribus elati cor lædant. Plinius subtilitatem mentis tribuit, & hilaritatis sedem constituit, quod titillatio maxime ostendit: si enim cutis circa hypochondria blande tractetur, titillatio sequitur, & hanc celeriter risus: quia inquit Philosophus, motus celeriter ad eum locum pervenit, propter cutis tenuitatem, & partem calefacit, tamen aperit: & mentem præter voluntatem movet, quod autem solus homo titilletur, & cutis tectis sunt, & ejusmodi partis motum, quæ alam implet.

U. 3. part. an. 10. x. Columbus hanc opinionem Aristotelis falsam dicit: nam licet septum non adesset, vapores cor non offenderent, nam per œsophagum progrediuntur: dein volatiliū corda hoc cavere. At Piccolhom. objici ait: affatus uteri, intestinorum, communicari cordi, igitur septum cor non defendere à tetris expirationibus: Responderet Aristotelicus, communicari per venas & arterias. Contra Hipp. 5. aph. 59. mulierem fecundam dignosci docet ex suffitu per pudendum facto, & si odor ad os & nares perveniat, mulierem natura sua non esse infœcundam. Ad os autem pervenire non potest ex utero nisi septum penetret, Ergo cadit Aristotelis utilitas. Respondet Piccolhom. an septum impedit intestinarum expirationes, cum sint crassiores, non vero expirationes ex suffitu, quia tenuissimi existunt.

U. 3. par. 10. addit, ob hac in præliis gladiatorumque spectaculis, mortem cum risu trajecta præcordia attulisse.

De membrana Pleura.

CAPUT XII.

Consule Galenum 7. us. part. 21. 5. adm. an. 8. & 7. ejusdem 2. & 8. ejusd. 10. item loc. aff. 2.

Pleura $\mu\lambda\delta\epsilon\varsigma$, membrana est à costis, quas $\mu\lambda\delta\epsilon\varsigma$ vocant, denominata, eo quod iis subtendatur, quare Galeno $\iota\pi\epsilon\zeta\omega\chi\omega\varsigma$, quod $\mu\lambda\delta\epsilon\varsigma$ $\iota\pi\epsilon\zeta\omega\chi\epsilon\nu$, costas

Bb 3

(duo ejus. 2.)

b 7. ad. an. 2.

c Galenus par-
tium firmiores
adhesiones exor-
tus appellareconferuit, qua-
re cū vertebrisdorsi firmiter
nectitur, ab hisenasci probabi-
le est. Herodotoin Medico, hoc
ē peritonaeumā pericranio pro-
ducitur. The-
oph. Protospatario, quemadmo-
dum totum ho-minem cutis
succingit: itaintrinsecus mē-
brana quadamomnia membra
deducit, qua abimo ventre ad
caput continua-tur & commu-
ni nomine ipſavocat. q: qua pro
diversitate lo-corum, varia
nomina forti-tur, infra sep-
tum peritonaeū,

supra pleura di-

citur. A liga-

mentis verte-
brarum, lum-
borum prodit,
Ves. Plat. Tho-
racis, Fallopi.

d Gal. 5. ad an.

8. Bān vocat. e

Aranea modo pratenū

7. ad. an. 2. ut 5. ad. an. 8. dicit thoracem succingere membranas natura sim-
plices tela araneorum modo: vocari in costis & c. & c. ubi recte ad jugulum perferuntur diaφραγμα: ubi pulmo-
convincit. L. Gal. 5. loc. aff. 2. h Quia membranas intersepientes constituit, in hoc ā peritonaeo differens, quod unum
est 7. ad. an. 2. Vesalius Galenum reprehendendo, simplicem dicit, quem Colum. arguit: Laur. non simplex, ut veteres
voluerunt. i Vesal. sic appellasse Græcos existimat: tale quid Gal. de consit. art. indicare videtur, morbi lateralis spe-
cies subdi-videns: hanc membram circumossalem vocamus, quam costas orbiculatim ambire diximus: etsi Galenus ex-
terna tantum sedi adscribere videatur, eumque non unicuique costa peculiarem: hac ille k Idem & Vesal. pleuram
simplicem, & alteram periosium facit.

(duodecima excepta) succingat, dicitur & quæ non nisi digitis à costis avulsa conspi-
ci potest: & quidem membrana^b ab essentia, tunica ab usu nominatur.

Membrana est thoracis cavitatem universam succingens, quare figura & magnitu-
dine internæ cavitati, quæ semiovalis est, responder. Hæc ex filamentis spermaticis,
& sanguine materno parenchymatis forma affuso, tanquam principio ex quo, enas-
citur sive à meningibus cerebri, quæ spinalem medullam dorsi investiant, produci-
tur, quæ cum nervis in thoracem delatæ, utrinque eam constituunt: quare ibi cras-
sius est, dorsi vertebris firmissime hærens, unde nisi disrupta separari nequit, cum in-
de tanquam à principio ubi, vel à quo, prodeat. Connectitur posterius vertebris
dorsi, quare à ligamenti^c earum enasci dicitur: antè sternum, lateribus, membra-
nis musculorum intercostalium & costarum periositiis: superius claviculis: inferius
basi^d sua, diaphragmati, & in medio pulmonibus & pericardio.

Substantia peritonæo similis, sed robore & crassitie nonnihil id superans: siqui-
dem costarum ossium duritiem & pulmonum corpora mollissima intercedere de-
buerit, neque mollis nimium, neque dura esse debuit: dura, ut viscera vitalia validius
defendat: satis compacta & e^e densa: levis ne pondere thoracis motum impediat: va-
lida^f tamen & nervosa, & dividi contumax. Est ubique^h duplex, partim ob os-
sium duritiem, ne interna, quæ adeo sensibilis est, à continuo pulmonis motu læda-
tur, partim quo inter utramque Intercostalia vasa tutissime ferantur. Harum altera
crassior est potissimum circa dorsum, ubi à costis tota separari potest, & durior est ob
continuum pulmonis motum, cujus superficies interior levis & veluti humore obli-
ta: externa, inæqualis & aspera. Altera tenuior est, & quibusdam costisⁱ succingens
membrana dicitur. Inter has duas sæpe materia pleuritica colligitur (cum vasa inter
has ferantur) & non solum inter pleuram & musculos. Ab hac modo in uno, k mo-
do in altero latere, præsertim in sinistro, nervæ quædam fibræ prodeunt, quarum in-
terventu pulmo pleuræ admodum validæ in homine, secus quam in canibus, etiam
in fanis nectitur, hinc simul & semel pleuritis & peripneumonia exoriri possunt,
quæ affectio complicata, Pleuropneumonia vocari potest: & quemadmodum in pe-
ritonæo pinguedinis nonnihil conspicitur, sic huic^k licet raro, pinguedinis aliquid
juxta dorsi vertebras, ubi vasa majora sunt, adnascitur. Verum quemadmodum &
musculi intercostales, aliorum musculorum iustar propriam membranam obtinent:
periositio^l innumeris venulis consperso cinguntur.

Perforatur autem, ubi vasa intra vel extra thoracem mittit: supernæ, venas jugu-
lares & axillares, arterias carotides & axillares emittit: at œsophagum, asperam arte-
riam, & nervum sexti paris & septi transversi intramittit: inferne, ad diaphragma, pro
venæ

venæ cavæ ascensu, œsophagi descensu, quemadmodum superiore capite dictum fuit, ad latera, pro vasis intercostalibus.

Vasa quæ illi ne untur, dum ad vicinas partes abeunt ei ramulos largiuntur, quæ à vasis intercostalibus & mammariis frequentes promanant: hinc etiam frequens inflammatio, cum magna tensione & dolore punctorio contingit: quando vasorum oscula referuntur & humores elapsi putrescunt ac veram Pleuritidem causant, ut alibi plenius. Et Pleuriticis post mortem apertis non solum observatum fuit pleuram cum pulmonum tunica inflammata, sed etiam ipsam pleuram adeo intumefactam, ut solito decuplo crassior fuerit & propter hujus membranæ quasi mortificationem, costæ lividæ repertæ fuere: quod Hipp. voluit, dum pleuriticorum cadavera aperta dissecata fulgurita apparuisse scribit, sic nervos à vertebra thoracis accipit.

Uterque ipsius, peritonæi^m utilitati similis: quemadmodum enim peritonæum, m Gal. 7. ad. an. 2. omnibus infimi ventris visceribus & circumtenditur & membranam communem largitur: sic pleura, totiⁿ thoracis interno sinui subtenditur, omnibus^o spirationis instrumentis, quemadmodum & P diaphragmati, & musculis intercostalibus, & vasis communem tunicam tribuit: omnia contenta defendit & colligat. Vasis, vehiculum quoddam ac veluti stabilimentum largitur: & qua parte costis subtenditur, pulmonum propugnaculi vicem præbet, ne dum respirante animali se dilatat, nudis offibus incidat, eorumque duritie offendatur: & ne in motu, pulmo costarum spatii sese infinuet.

De Mediastino, seu intersepiente Membrana.

CAPIT. XIII.

De hoc egit Gal. 6. us. part. 3. 5. adm. an. 8. & 7. ejus. 2.

Mediastinum^a membrana duplex^b est, dextra altera [tab. 4. GG. dextra, HH. sinistra sedes] altera sinistra, quæ Galeno^c ὑπὲρ τῆς φρενὸς dicuntur, eo quod thoracis cavitatem, quam pleura succingit, in duas partes dividant (cum intra thoracem, cavitas una non sit laxa sibi que continua, sed à dictis membranis intercipiatur) quare in thoracis medio utrinque singulæ à pleura reduplicata exortæ, quæ secundum ipsius^e longitudinem superne deorsum ad diaphragma feruntur, & à sternum ad vertebrae pertingunt, ita ut thorax, quasi in duos circulos dividatur, vel si majoris triangulum quendam ex inæqualibus & obliquis lateribus constituunt, cum pro pectoris profunditate & longitudine, convenientem amplitudinem habeant.

Oriuntur autem hæ membranæ^f à pleura, quæ ubi ab exortu utrinque ad sterni latera conscendit, rursus versus spinam principium suum repit, ita ut à medio pectoris ad spinam præparet. Hæ pleura tenuiores sunt, & molliores, ut cordis motum facilius sequantur, extrinsecus quæ pulmones respiciunt, & quibus nonnunquam adnascuntur, læves: & sæpe circa vasa multo adipe refertæ videntur, ita ut omento affligi possint: Intrinsecus propter fibras, quibus membranæ junguntur, & etiam pericardio, asperæ, hisque in jugulo thymus, de quo postea, adnascitur. Hic secundum longitudinem vertebrarum dorsi, quibus mediante pleura committuntur, con-

m Gal. 7. ad. an. 2.
n 7. us. par. 21.
o Gal. 5. ad. an. 2.
8. de pleura ei
xtra in volu-
crum seu tuni-
cam largitur.
p Gal. 7. us. part. 21.

a Columbo, inter sepimentum
& dissepimentum.
b Gal. 5. ad. an. 8.

c 6. us. part. 3. 5. ad. an. 8. 7. ejus.
2. ubi sternum in duas partes secar. scalpello per medium os pectoris à cartilagine xyphoide ad clavos usque ducto, ut costis in contraria versis ac retor-

ris, Mediastini gemine membrana divelli & quæque in suum latus distrahi possit.
d Gal. 5. ad. an. 8.
e Gal. 6. us. part. 3.
f Gal. 7. ad. an. 2.

g Nisi quan-
tum ea parte
abscedunt &
distant, qua
cor situm est
ad an. 8.

h Voci efforman-
da cor ferre pu-
tant, ait Laur.

* hunc Parvus
reprehendit:

cum tamen Ga-
lenus in servo
Marulli Mi-
nographi ster-
num perfora-
rit, & pericar-
dium sterni ad-
harere depre-
hendit. An for-
te Hipp. lib. de
inter. aff. intel-
lexit quando in
pulmonum hy-
drope costam
trepano perfora-
vit.

i Vesal. dicit à
mammaris, ab
ἀμάρτυς & à ca-
va. Fall. à mā-
mariis. Gal.
diff. ven. 2. à
phrenicis: Ibi-
dem ait, consti-
tuta Azygo, alias araneorum filorum modo pratenues venulas ad mediastinum & thymum mitti. k Sic Ves. & Plat.

cateri non meminere. l Instar ligamentorum firmitudinem instrumentis conferunt. 6. us. pars. 3. m Prima & maxima utilitas 6. us. pars. 3.

tiguae sunt, & angustam cavitatem constituunt, sensimque diducuntur, & ad sternum (cui etiam à summo ad cartilagine mucronatam utrinque & coherent) à se invicem pro sterni latitudine distant: quod^h intervallum [tab. 4. LL.] variis filamentis fibrosis & membranis intexitur: omnium tamen maxime à se invicem distant ad septum transversum, cui committuntur [tab. 3. fig. 1. K.] & quidem tanta distantia quantae est nervosae partis latitudo, ita ut haec cavitas, quae laevis & madida est, antè pericardio involutum, & venam cavam ascendentem contineat: posterius vero, oesophagum cum nervis stomachicis. Verum spatium hoc inane factum volunt, ut sonus tanquam ex Echo vicino^h intensior esset: in cuius anteriore cavitate nonnunquam materia colligitur, & pleuritidem æmulatur, quam dextre perforato sterni, tuto extrahi posse, Columbus^{*} monet. In canibus cavitas haec capacior est, nullis tamen fibris intertexta.

Venasⁱ habent & arterias exiguas, à venis & arteriis mammaris [tab. 4. B. C. D. E.] quae à jugulo deorsum sub sterni feruntur, à quibus in transitu furculus, [tab. 3. fig. 1. OO. à nasis M.] quemadmodum & à vena ἀζύγω obtinent. Insuper in homine venam satis crassam à jugulo recipit, quae secundum utriusque membranae longitudinem, cum nervo [tab. 3. fig. 1. Q.] ad septum transversum descendit, externae earum parti adnata: nonnunquam etiam à phrenicis ramulos accipit. Intra eandem duplicaturam sed infra cor, juxta dorsum, nervi stomachici feruntur, qui sub vasis cordis plexum nervosum constituunt, quem ab intercostalibus nervis efformari, quidam volunt.

Ufus cor, quatenus pericardium iis jungitur, suspensum tenere, ne suo pondere propendens, pro vario corporis situ, vel in latera vel in pectus, vel in spinam, vel deorsum^l concidat. Deinde, ad vasorum securiorem ductum faciunt, eamque firmant. Tum, partes in thorace contentas complectuntur, ne pulmonibus in motu obfint. Et tandem thoracem & pulmones in duas^m partes seu cavitates dividunt, cujus beneficio parte una laesa, pars altera illaesa conservatur, ut magno vulnere in alterutram partem accepto, si ejus partis respiratio, propter pulmonem à motu cessantem, idque propter aerem per foramen ingredientem, altera pars incolumis dimidium saltem actionis retineat. Si enim utraque fuerit perfossa, vox & respiratio plane peribunt.

Partes in thorace contentae.

CAPUT XIV.

CUM in thorace vitalis facultas resideat, in eo etiam instrumenta huic inservientia, contineri necesse fuit: horum autem alia vitam & vitalis facultatis actionem, respirationem scilicet & pulsus perficiunt, Cor & arteriae: alia adjuvant, ut Pulmo & Diaphragma: alia sunt, sine quibus actio perfici nequit, ut pericardium, pleura, thorax:

thorax: quæ cum nutrirî debuerint & sentire, Venas & Nervos recipere. At cum dictum sit de partibus continentibus tam communibus quam propriis, nunc de contentis agendum erit.

Cotentæ partes duplices sunt, Viscera & Organa cõmunia cum duab. fistulis. Viscera sunt, Cor pericardio intectũ, & Pulmo. Organa cõmunia sunt venæ cavæ & arteriæ magnæ rami, in jugulo thymoglândoso corpore suffulti. Nervi duplices, vel à medulla, q̃ in vertebriis thoracis continetur, à qua intercostales nervi p̃deunt: vel à medulla cerebri in cranio contenta, à qua sextum par nervorum promanat, & ab hac costalis, stomachicus & recurrens tam dexter, quam sinister ortum ducunt. Fistulæ altera pulmonum, Aspera arteria: altera ventriculi, cesophagus.

De Thymo.

CAPUT XV.

Vide Galen. 6. usu partium 4. 7. adm. an. 6. & 9. de diff. ven. & arter. 2. & 9.

Thymus, Galeno θυμὸν^a corpus est glandulosum, mollè, spongiosum & album a 6. us. part. 4. (quare & τὸν ἀδέναν^b τὸν μέγαν, magnum glandium, imo maximum^c & mollissimum vocavit) quod in summa thoracis parte juxta jugulum sterni^c subjicitur & divisionibus vasorum ascendentium, venæ^d cavæ & arteriæ magnæ, & omnibus ipsorum ramis, qui hoc loco plurimi^e sunt, ad brachia nimirum & scapulas, qua prius emergunt, securitatis gratia pulvini vice, & ne vena cava ab ossis attractu lædatur, subternitur & superjicitur, cum sinu suo venam cavam comprehendat: à qua venulas prætenues recipit. Id enim naturæ perpetuum est, ut quoties vas sublime dividit, ibi mediam glandulam, divisionem ipsam oppleturam, interponat. Hæc ea pars est in vitulis, quæ in mensarum delitiis habetur, & à nostris, lactes à colore albo dicuntur.

Variat pro ratione ætatis, monet enim Galenus, in nuper natis, ob vasorum mollietatem & imbecillitatem prægrandem esse: at crescentibus exficcati atque decrescere, ita ut in juvenibus (potissimum adultis) parva quantitate remaneat.

Quis & spiritus ad eum locum clavis proximum supra & intra glandem illam venam, cavam tanquam in scatebra ebulliant ac effervescent: nam θυμός, animum iramque denotat, δαίμων θυμός ab agitatione: nam θυεῖν antiquis agitare, movere significat, Riol.

d Gal. diff. ven. & art. 2. & 9. c. diff. ven. 2. vult constituta à θυμῷ filorum modo tenues à cava missi.

De Pericardio, seu Cordis involucro.

CAPUT XVI.

De hoc Galen. 6. us. part. 16. 7. admin. an. 3. & 6. egit: Aristot. 3. histor. anim. 13. & 3. part. anim. 11.

Cc

Cordis

a Pericardium,
sive χρῶν, sive
ὑμὸν, sive οὐαῖα
6. us. par. 16.

χρῶν τίς καὶ
ὑμὸν 7. ad an. 9.

Latinis indu-
mentum, invo-
lucrum, mem-
brana, panni-
culus cordis:
camera cordis:
capsula, casula,
arcula.

b de corde, cui
χρῶν, ὑμὸν, οὐ-
αῖα.

c Gal. 6. us. par.
16.

d Gal. 7. ad.
an. 3.

e Sylvius asse-
rit in iis quibus

thorax, longior

est, sternum-

que septem ossi-

buis compactum

phrenas non

attingere. Ve-

sal. hoc homini

peculiare vult.

f de origine dif-

crepant, nam

Gal. 7. ad. an.

6. & Fallop.

pericardium

ex vasis cor-

subeuntibus

enascitur. Ve-

sal. & Laur. d.

tunica vaso-

rum communi:

Columbus à

mediastino de-

rivat: Piccol-

hom. ait, opina-

ri aliquos ex

cordis capite

enatum esse, ex

pleura forasse

constitutum, si ex mediastino ortum dicamus, forte non erit ita absurdum. Vide 6. us. par. 16. * Sylvius ex mente

Galeni vult cavere statuit. g Secus arbitratus Arist. cui membrana pinguis dicitur, forte intersepientibus membra-

nis de lusus, Vesal. non pericardium, sed propriam cordis membranam Aristoteles intellexit, Riol. h Gal. 7. ad. an. 3.

i Gal. 6. us. par. 16.

Cordis involucrium a Græcis περικαρδιον, quasi cordi circumjectum, & vulgo capsula cordis, & Hippocrati b καλεός, culeus dicitur: Membrana est ampla, totum cor cooperiens, cujus figuram [t. 5. fig. 1. D, E, F.] pyramidalem, vel potius pineæ nuci æmulam refert, & ex basi [t. 5. fig. 1. D, E.] latiore c in mucronem [tab. 5. fig. 1. F.] obtusum sensim definit. Hæc in medio thoracem intersepientium membranarum sita est, & ab iis d complexa, cum huic quasi orbiculatim plurimis fibris adnascantur. Connectitur quoque parte anteriore pleuræ, ubi sextæ & septimæ costæ sinistri lateris cartilagine, sterno dehiscuntibus intersepientibus membranis, junguntur: posterius, ad spinam dorsii: inferius, diaphragmatis [t. 5. fig. 1. ab F. ad G.] nervo e circulo, seu tendini suo mucrone [tab. 5. fig. 1. F.] in sinistra magis, & dextri lateris [t. 5. fig. 1. G.] portione ita pertinaciter adhæret (quod homini peculiare voluit, cum tamen sint qui in bobus observarint) ut sine disruptione separari nequeat (at in canibus & similibus multum à diaphragmate distat, eique non connectitur:) quæ connectio facta videtur, ut cordis motus ad diaphragmatis centrum dirigatur. Hujus [tab. 5. fig. 1. B. c Gal. 6. us. par. 16.] origo ad basin f ampla est, & ex tunica duplici pronascitur, siquidem aliarum membranarum instar duplex sit, altera exterior à mediastino, altera interior à tunica vasorum cordis producta. Siquidem vasa hæc, toto illo spatio, quod est inter basin cordis & pericardium, communi hac tunica à pleura destituuntur.

Substantiam crassitudine f ac robore exacte convenientem habet, & ut voluit Galenus, si durior, quam nunc est, facta fuisset, pulmone obfuisse, ipsum comprimentum: si mollior, ab ossibus dolore affici potuisset, nam ut positione inter duo contraria, ita corporis substantiam inter duo extrema, mediam est adepta; tanto enim osse mollior, quanto pulmone durior. At pericardium, pulmones non nisi mediastini interventu contingit, ne se mutuo in motu impendant: excipio partem anteriorem ad sternon, ubi membrana intersepientes à se invicem distant. Durum admodum est involucrium, ob continuum motum cordis; extrinsecus fibrosum, intrinsecus lubricum, & læve admodum ad faciliorem cordis motum quem à corde impellente & agitato accipit, utrinque tamen omni g adipe destitutum.

Hoc ad basin cordis, quæ est e regione quintæ vertebræ thoracis, vasis ex ea [tab. 5. fig. 1. B. fig. 2. A.] prodeuntibus (quæ suffulcit) connectitur; at cordis h corpori connexa non est, verum tantum ab eo tam ad basin & mucronem, quam latera [tab. 5. fig. 1. B. BB. pericardium in latera reflexum ostendit] distat, quantum ejus i dilatationi, & humori seroso contento, opus est: quare undiquaque æqualiter ab eo distat. Si enim intervallum fuisset majus, thoracis amplitudini, & per consequens, respirationi incommodasset: quare eam magnitudinem obtinet, quæ neque thoraci ipsi noceat, neque cor coarctet.

Continua omni sui parte præterquam in basi, ubi quinque foraminibus pervium est, propter venæ cavæ introitum [tab. 5. fig. 1. A. f. 2. F.] & egressum: Venæ item arteriosæ [tab. 5. fig. 2. G.] & arteriæ venosæ & arteriæ magnæ [tab. 5. fig. H.] exitum.

Venas parvas admodum [tab. 5. fig. 1. C.] & exiles recipit, partim ab iis, quæ ad mediastinum

midis ab humoribus cordis foras à perpetuo ejus motu & insigni calore effusis, & ad pericardii densitatem appulsis generari.

i Gal. nullibi quod sciam, meminit hujus humoris, sed à sero intra pericardium exudante palpitacionem causari scripsit. Thom. à Vega in Gal. 5. loc. aff. extim. à animali cōnasci scribit, causam ad cordis & vicinarum partium calorem, qui pingue colliquet & in aquam vertat, referens. k Curtius in Mundinum, & Vega, negat, quoniam tunica minor sit quam ut cor dilatacatum & aquam continere possit: dein cordis humectationem meliorem esse ex pinguedine corde circumfusa, quem tamen in mortuis conce-

Humor hic non tantum in ⁱ mortuis, sed etiam viventibus reperitur: at in mortuis copiosior est (hecticis exceptis, in quibus exiguus est & flavescens) cum spiritus plurimi, qui circa cor sunt, mortuo & refrigerato corpore, in aquam convertantur, eodem modo, quo vapores à terra elati, in media aeris regione ab ejus frigiditate in aquam commutantur: hunc aliqui in mulieribus copiosiores quam in viris notarunt: alii in senibus uberiores, quam in juvenibus observarunt. In viventibus etiam ^k ex necessitate dari asserimus, non autem in ægris tantum, qui palpitacione laborant, sed omnibus sanis; ita tamen ut in aliis copiosior, in aliis paucior reperiat, qui tamen secundum naturam pro cordis salute moderatus esse debet cum ex ejus absumptione; tabes; ^l & ex nimia ejus copia, palpitacio cordis, & inde propter impeditam dilatationem, suffocatio & mors sequatur. In vivis dari, testimonio Hippocratis ^m confirmari potest, dum humorem modicum urinæ similem adesse dicit: dein vivorum animalium sectione, quam singulis annis in ovibus prægnantibus vivæ sectione demonstrare assuevimus: tum usus & necessitas hujus humoris, hoc ipsum comprobatur.

Usus enim ejus, cor viscus calidissimum & perpetuo agitat, ne continuo motu torreatur, una cum suis vasibus (quare adipe opus non habuit) humectare; & refrigerando sanum & florens conservare, cujus etiam beneficio pericardium continuo madet, alias cordis ferventissimo calore, exsiccati potuisset: hinc quibus per febres ardentes, vel inedia & vigiliis & ingentes marcores exhausta est, tabi dipereunt. Cordis quoque motus facilius redditur, à quo mox attritus dissipatur, & per poros sensim resolvitur ac successive evanescit; ex quo si exeundo retardetur, volunt ⁿ in multis corporibus in medio pectoris è directo cordis, multos pilos produci: imo intra pericardium, si aqua hæc crassa & viscida fuerit, ejus crassamentum in pilos converti asserunt: unde quibusdam cor pilosum observatum fuerit, qua de re cap. 21. plura. Tandem utilis, ut ei cor ^o innatet, quo minus grave sit, quemadmodum foetus in utero sudori innatet, ne matri pondere nimium molestus sit, & nulli parti impingat: adde quod & adipis concretioni utilis est. Sed hac de re, in prælectionibus nostris in libellum Hippocratis de corde habitis, plenius egimus.

In Thoracis quoque concavitate communiter similis aqua cruore mista observatur,

dit, ut in ventriculis cerebri. At in viventibus etiam reperiri, Mund. Carp. Massa. Ander. Columb. Fallop. Plas. Piccolhom. Laur. asserunt: sic Jasinus, nonnulli censent in viventibus non reperiri, sed ejus loco cruorem seu spiritum existere, qui interitus tempore in aquam vertatur. Vesalius, an in omnibus secundum naturam se habentibus similis aqua habeatur, mihi non admodum perspectum est, nullum tamen omnino in vivis dari falsum est, quia membrana nullis partibus connata, perpetuo madida ac lubrica apparent, ac oculorum, palpebrarum interior superficies, &c. in omniibus tum quos secus paulo, seu multo ante perierint, reperi, majorem tamen copiam in mulieribus, nisi viri natura admodum humidi fuissent, aut aliis serosis succis abundassent: minus etiam in nuper mortuis: addit exemplum l 5. loc. aff. 2. exemplum adducit simia sua tabida reddita, ob tumorem in pericardio humorem in se continentem, reliquis paribus sanis. Melanchthon testatur Casimiro Marchioni Brandenburgico ob mæores & vigiliis humore hoc absumpto, cor dissectum pyrum rostum representasse. m De corde: addit Laur. idem voluisse Galenum de usu pars. addit exemplum Salvatoris ex cujus latere sanguis & aqua effluerint. n Varolus. o Piccolhom. & Laur.

tur, quo perpetuo madere partes thoracis, ad caloris refrigerationem, oblinantur, quæ per diapedesin roris modo è vasīs exudat.

De vena cava trunco ascendente.

CAPUT XIX.

De hujus ramis Gal. lib. de diff. ven. & art. 2. & 5. in lib. Hipp. de vict. rat. in acut. com. 2. tex. 10. & 6. de plac. Hippocrates vero de natura off. & 6. epidemiorum.

ET si vena cava instar canalīs per utrumque ventrem feratur, attamen doctrinæ cau- a Gal. diff. ven. 2. & 6. plac. 3. sa^a in truncum descendentem, qui per ventrem infimum distribuitur (de quo b 6. plac. 3. la- jam dictum fuit) & truncum ascendentem, de quo in præsens, divisimus. VENA rissima, qua in- ergo CAVA, posteaquam diaphragmatis partem nervosam à dextris proprio fo- fra hepar, mi- ramine pertransit, suo trunco [tab. 6. fig. 1. ab A. ad D. r. 7. à B. ad H.] indiviso ad jugu- nus lata qua- lum usque per thoracem ducitur, qui inferiore^b amplior est, cum ad plures partes per præcordia sanguinem deducere debuerit: & securitatis grati^a partibus vicinis, ut diaphragmati sursum tendit: (mediastino^c quoque in canibus & similibus) cordis auriculæ dextræ jungitur: & ne utrisque adhuc in jugulo ab ossis duritie lædatur, & tutius in ramos insignes dividatur, corpus glan- minor, qua cor di applicatur. dosum, Thyrium dictum ei subternitur; quemadmodum^d in canibus & similibus, c Laur. vult pulmonis lobus inter pericardium & diaphragma, cum thoracis longitudine homi- contingere me- nem superent, ipsi subjicitur. Prodeunt autem ab ipso trunco ante divisionem rami diafinum: At quatuor. Vesal. contra, addens, noluisse Galenum de

I. Phrenicæ [tab. 7. C.] seu diaphragmaticæ^e utrinque una, quæ per diaphragma diff. ven. 2. me- multis furculis diffeminatur, & ramulos ad^e pericardium & mediastinum mittit: diafinum largiri quarum dextra aliquando in thorace; sinistra vero sub diaphragmate ex cava vena carum ramos, prodit, cum qua & adiposa nonnunquam jungitur. anteaquam ad cor perveniat.

Mox cavæ truncus progrediens, & pericardium perforans modice sinistrorsum d Vesal. ait non in homine, ut Gal. 7. ad. an. voluerit. c diff. ven. 2. f 7. ad. an. 9. [tab. 7. supra B.] inclinans, è regione octavæ vertebræ thoracis, vel summitatis no- hunc sinum di- næ, interdum medio spatio, quod est inter septimam & octavam, latum sinum^f ante- cit dextrum, cor efformat, & mutata pene substantia ac rotunditate, in dextram cordis aurem non vero intel- [tab. 7. D.] degenerat (vel si mavis undique dextræ auriculæ adnectitur, quam super- ligat ventricu- lum dextrum. ficietenus complectitur) & in cordis^g ventriculū non admodum alte penetrans in- g Cava suum- figitur, ut in eum tanquam in cisternam sanguinem profundat. At anteriori & inte- quendam ra- riori cavæ parieti, membranam quandam vult appositam Eustachius, [tab. 8. append. mum cordi ap- f. i. c.] quæ ad medium foraminis in multiplices fibras desinat, quæ variæ compli- plicare videtur- cata reliquum semicirculū compleant, & toti foramini sine conjunctione obducā- 6. plac. 5. in no- tur; quo ab irrutente materia impelli & repelli possit; quæ tamen aliquando contex- bis & quadru- tu fibrarum destituatur, & quasi cornuæ Lunæ speciem, quemadmodum in Coro- pedibus omnibus, dextro ventriculo inserta est cava vena: in iis autem quæ ejusmodi ventriculū non habent, vena per totum animal sparsa, calorem à corde transsumunt per anastomosi per arterias 4. usque part. 6. Columbe non intro in ventriculū fertur.

Cc 3

II. Co-

h Gal. diff. ven.
2. $\mu\alpha\gamma\alpha\tau\eta$
per quam exi-
gua: Vesal. re-
vera insignis,
licet contra Ga-
lenus.

h Gal. diff. ven. II. Coronaria^h est cordis quæ non nisi dissecto pericardio conspicitur [tab. 6. f. 2. B. t. 7. E.] quæ cum venæ instar ejus basin cingat, ~~σεφαινωει~~ dicitur, multosque ramos per exteriorem cordis superficiem in totum ejus viscus à basi ad mucronem usque deorsum mittit, potissimum vero per partem ejus sinistram, cum ipsius substantia hic sit crassissima, ideoque copiosiore alimento indigeat; & quia crassiore nutrimento suæ substantiæ simili opus habuit, idcirco ab hac vena sanguinem obtinuit, antequam ventriculum ingrederetur; ubi sanguis tenuior redditus, in nutritionem pulmonum cedit. Ad hujus exortum Valvula [tab. 8. append. f. 1. D.] appositæ est, formæ dimidiatæ Lunæ referens, similis ei, quæ in fœtus corde primæ anastomosi præest; impediens ne sanguis cordis superficiem semel tributus, propter cordis continuum motum in cavam refluat. Hæc aliquando i gemina est, altera in posteriore, altera ab anteriore sede emanante.

1 Gal. 7. ad. an.
10. perpetuo ge-
mina: aliquan-
do Vesalio, ra-
rius Laur.
k de hoc gemi-
no cave trun-
co, 6. us. part. 4.
& 17. sic & 17.
ejusd. 10.

1 Majorem di-
cit 6. us. part.
4. in quibus-
dam exempla-

ribus rectius mi
dixit, sed locus h
trum cordis ven
tatem supra cor e
esse, à cava deriv
tex. 10. rat. vid. i

p Vesalius ait, d

Hac constituta, Pericardium denuo ^k perforat, & cava suam teretem speciem rursus assumit, & ^l gracilior multo reddita, vertebriis non amplius innixa (cum ipsis œsophagus & aspera arteria incumbant) per mediam pulmonum divisionem, qua pars dextra à sinistra se jungitur, sursum ad jugulum thymoi ^m investa deferitur. Quo vero ad vertebbras & spatia intercostalia rami distribuantur, truncum seu venam ⁿ insignem supra ⁿ cor, quasi in medio corporis constituit.

III. Vena *αζυγος*, 9 seu sine pari dicitur [*tab. 6. fig. 1. C. fig. 2. B. fig. 4. B.*] eo quod hæc communiter in homine una sit, quemadmodum & in cane, nec in altero latere conjugem habeat. Hæc supra P cor, inter quartam & quintam 9 thoracis vertebram

ribus rectius minor habetur. m Erasistrato sub/cubens ita appellat 5. loc. aff. 3. at in Com. hanc venam parvam esse dicit, sed locus hic varie depravatus est. n Sylvius dicit, Galenum semper observasse oriri à cava ubi primum dextrum cordis ventriculolum attingit in eis, quibus sternum septem ossibus consistat: at in nostris corporibus ob thoracis brevitatē supra cor & pericardium prodire: hoc fides Eustachius. Fernelius scribit, non in paucis sectionibus observatum esse, à cava derivatum antequam cor accedat: hoc pro Galeno excogitatum esse, scribit Eustachius. o Gal. com. 2. tex. 10. rat. vici. in acut. 2. Epid. sect. 4. p Vesalius ait, de oriū vena hujus Galenum varium fuisse: & lib. de ratio. vici. in acut. com. 2. tex. 10. ter meminisse, dicendo primo à cava proficisci antequam ad cor peringat: dein subungere, in quibusdam animalibus supra cor deprimi, in homine autem ex parte, qua dextram contingit aurem, tum aut infernas costas in homine enutriti à vena, qua sub corde à cava exit. Respondetur ad primum Gal. diff. ven. 2. afferre, octo interstitia costarum, & etiam plura hanc venam nutrire: & lib. de vici. rat. in acut. com. 2. tex. 10. eam utrinque costas octo usque ad diaphragma distribui. Jam vero cava è regione octava vertebræ cordi jungitur, non ergo potuit statuere hanc venam sub corde seu infra cor enasci. Sic 7. ad. an. 9. dicit venam hanc perpetuo quintam dorsi vertebram conscendere, jam vero auricula dextra circa octavam vertebram posita est. Quare non credidit infra cor oriri. Sic com. 2. tex. 10. de rat. vici. in acut. statuit, hanc venam per humiliorē basī cordis sedem delatam, ad ipsam spinam flexam perverte, quod non dixisset, si infra cor vortum ducere credidisset. Ad alterum resp. In emendatissimis exemplaribus haberi posse non in corpore, velut aliquando in hominibus. Et sanè aliam exortum non semel in homine, sed & simis, etiam Eustachius observavit. Ad tertium resp. Dixisse sub corde, non infra cor. Objicit & alium locum 7. ad. an. 9. qui habet: à dextro sinu vena quædam ad spinam protenditur quintam dorsi vertebram conscendens, præterea quod eadem vena ad hunc perpetuo locum in omnibus animalibus porrigitur, ut in animalibus, quibus exerceri voluit, non tamen in omnibus à dextra cordis auricula, sed in quibusdam, cum vena cava hanc permeans ad jugulum attollitur. Resp. 1. Gal. dicere in quibusdam animalibus in quibus exerceri voluit, quæ autem en sine 6. ad. an. 3. docet. Sic in equo, & capris oritur è regione mediæ basī cordis: in urso, è regione conjunctionis cavæ cum auriculæ dextræ: in suisuibus & ruminantibus ut capris, bobus, in his (in quibus gemina est) ab infima hujus sinus parte, ut Eust. notat, arguendo Vesal. quod asseruerit inter hominem & animalia interesse. Deim Gal. hoc loco primo de brutis loquitur, mox subjungens de homine, dicit hanc cum vena cavâ permeare, præterea, non dicit permeare. Fernel. paulo supra cordis aurem dextram quam tamen nonnullæ dissectiones ostendunt, à cava oriri antequam ad cor accedat. Sylvio supra cor & pericardium in nostris corporibus, observari & thoracis brevitas. q 7. ad. an. 9. perpetuo quintam dorsi vertebram conscendit.

ex vena cava posteriore [tab. 6. fig. 4. A.] & inferiore sede, dextrorsum magis, quam sinistrorsum, vertebrae respiciente, exoritur. Et non plane recta incedit (quod sculptor [tab. 7.] non satis observavit) ut in canibus, in quibus recta deorsum ad vertebrae latera procedit, sed super dextrum asperae arteriae truncum, parum dextrorsum & retrosum versus spinam reflexa, ubi vertebrae radices attingit extollitur, & ad medium earum progressa deorsum fertur; ita ut circa octavam vel nonam vertebrae thoracis, plane in medio sit (quemadmodum in simiis eminentiori vertebrae sedi incumbit) & sub arteria apposita deorsum usque ad finem thoracis, prius tamen divisa, fertur & cum Aorta diaphragma penetrat. Verum in plerisque animalibus, in quibus juvenes exerceri voluit Galenus, "a sinistro cavae latere originem ducit, & per sinistram thoracis cavitatem monente eodem, descendit, quod haecenas in ovibus semper observavimus; Arin rumisiantibus, in quibus gemina reperitur, in his dextra dextrilateris, sinistra sinistrilateris costarum radices occupat, quod in capris & suibus videre est. In homine rarissimum est, quod semel tantum observavimus, ubi ex Cavae trunco ad tertiam thoracis vertebrae utrinque ramus ejusdem magnitudinis producebatur, & supra exortum utrinque ad duarum superiorum costarum intervalla ramos mittebat: reliqui rami ad reliqua intervalla diffeminabantur & utriusque trunci fines, ad emulgentium venarum exortum observabatur: quemadmodum in appendice tabulae VII. fig. 2. expressimus. An forte in ambi dextris hoc detur?

Sic aliquando (ut a Fallopio edo et figura [tab. 8. i.] exhibemus) a sinistris alia vena [tab. 8. i.] in homine reperitur, quae azygos munere defungitur: & tum altera a dextris juxta radices costarum procedens medium vertebrae non conscendit. Haec vero sinistra a ramo Subclavio ortum ducit, & sparsi aliquot ramulos largitur, & nonnunquam, cum ramo, qui e regione sextae thoracis vertebrae a trunco azygos ad sinistram transversim [tab. 8. ee.] mittitur, a quo etiam ramulus sursum elevatur, ad quintam costam unitur. Nonnunquam non a Subclavio, sed e trunco cavae ante divisionem e regione tertiae vertebrae thoracis orta, ad duo prima spatia intercostalia ramulos sursum mittit, reliquos vero ad inferiora sui lateris, ad sextam usque vertebrae, quo cum pervenit, cum praedicto transverso ramo jungitur, a quo propagines in reliqua spatia sparguntur.

Nonnunquam vena a Cava in jugulo enata, statim in duos ramos dividitur, quorum interior ad tertiam thoracis vertebrae reflexus, juxta costarum radices usque ad nonam singulis furculos offert, quo ubi pervenit, cum ramis venae sine pari, octavum & nonum intervallum nutriendibus, conjungitur: quod, ut recte Eustachius, ab illis praesertim expendi debet, qui in sanguinis missione fibrarum rectitudinem magnificiunt. At exterior ramus, cum diaphragmatis nervo sinistro incedens, in media sterni & pericardium propagines distribuit & tribus bifidis furculis, in diaphragmatis carnosam partem inseritur. Aliquando a vena azygos ramus producitur, qui a sinistris juxta costarum radices sursum reflexus, tertium, quartum, quintum & sextum [r. 7. append. f. 2.] eorum intervallum nutrit, qui cum ramo ejus venae quae a cavam jugulo ortum ducit e regione quintae thoracis vertebrae conjungitur.

Communiter autem a vena azygos trunco [tab. 6. fig. 4. B. tab. 7. FF. tab. 8. d.] qui quasi in medio corporis situs est, ex posteriore regione ram a dextris, quam a sinistris

Ex dextro cavae latere Vesal. Hipp. 2. epid. sect. 4. ejusmodi venam veluti aliam jecorariam depressam atque humilem circa vertebrae corpora deorsum recurrere scribit. Ideo Gal. sub corde prodire aliquando dicitur, non quod secundum thoracis longitudinem infra cor posita sit. Pars sine conjuge posituram mediam requirit 15. u. par. 2. u. 6. ad. an. 3. Hipp. libr. de off. nat. & 2. epid. sec. 4. ad sinistras partes proficisci simpliciter scribit, non dicit in sinistro latere ori. Gal. diff. ven. 2. in plurimis animalibus ad sinistras partes, ac in simiis in dextris partibus. Vesal. semel in agno a sinistris notavit. Eustach. vult pro sinistris dextras legendum esse. Sylvius in Antonio Mafsa chirurgo observavit. ejusque locum obtinere infra cor gemina in intercostalem, utrim

que unam, Eustachius vero in duobus & azygon interdum deesse notavit.

2 Gal. 5. loc. aff. 3. vena & 2. omnes costas alere non potest. Sic de vici. rat. in acu. com. 2. tex. 10. quatuor superiores costa, ab alio iugo nutriuntur. 1. diff. ven. 2. in omnia intervalla prater quam in prima duo, nonnunquam tria. a Vesalio ad novem.

stris rami (rarius ad omnia² costarum interstitia) ad^a decem inferiorum costarum intervalla [tab. 6. fig. 4.] potissimum à dextris qui plerunque sinistris evidentiores sunt, distribuuntur, qui Intercostrales [tab. 7. GG.] dicuntur, & in verarum costarum interstitiis usque ad cartilagineas earum abeunt, in notharum vero intervallis usque ad abdominis musculos feruntur, ramulos etiam numerosos & exiles œsophago distribuit. Non raro etiam è regione, quartæ thoracis vertebræ, enata, ramum sursum mittit [t. 8. ad d. superius] à quo furculi ad quatuor superiores costas^b vago ductu mittuntur. Harum autem venarum intercostalium propaggines, etiam [tab. 8. xxx.] thorace excidunt, & utrinque cum furculis thoracicæ inferioris per anastomoses [tab. 8. yyy.] aliquibus locis hinc inde vel etiam ramulorum contactu uniuntur, quemadmodum videre est sub axillis, ubi musculus pectoralis & serratus minor, antequam lateris, sed ejusdem cubiti vena interna utiliter incidi possit. Verum propter hanc unionem & revulsio commodius & facilius fit.

Cum vero truncus & 2. ad octavam & nonam costam (nonnunquam & decimam^d Hippocrate docente,) quam forsitan ob causam in pleuritide inferiorum costarum fotum cæteris medicamentis præmisit, pervenit, supra spinam in duos ramos dextrum & sinistram [t. 6. C. O.] dividitur, qui ambo deorsum repentes sub diaphragmatis divisione transeunt. Et horum alter, qui quandoq; major est, ad sinistram in posteriorem cavæ sedem, juxta emulgentis principium, frequenter ramo uno (nunc supra, frequentius retro & infra) in emulgentis [t. 8. e. f.] medium, ubi Spermaticam procreat, desinit: quandoque in dorsi cavitate reflexa, cum ramulo ab emulgente pronato, unitur: nonnunquam etiam sinistram in duos ramos secatur, horumque alter [t. 6. f. 4. E. D.] sursum, alter deorsum secundum costarum radices, fertur & costarum interstitiis ramos tribuit. Dexter vero cavam accedens, aliquando supra emulgentem cavæ jungitur, rarius emulgenti, nonnunquam primæ lumbari, communiter^f in ultimam [t. 8. *] lumbarem implantatur; (nonnunquam ramulus per vertebra oblique ductus cavitatem earum penetrat) Quare in initio Pleuritidis vena poplitis vel saphænæ secari potest: sunt qui plenitudine evacuata, lumbis cucurbitulas cum scarificatione affixas prodesse velint. Verum & per urinas sæpe critice puris copiam mingentes expurgantur; hanc vero materiam in Empyicis, etiam per arteriam venosam pulmonis in sinistram cordis ventriculum & delatam, indeque in Arteriam magnam in renes defluxisse, & critice expurgatam fuisse, observatum fuit: quare hæc & 2. distributio & unio ostendit, quomodo thorax commode per urinas expurgari possit. Verum vertebra quoque, secundum quas deducitur, & mediatino, furculi offeruntur. Quod vero aliqui^h hujus venæ principio membranulas seu ostio-

semper dextris lateris venam secat, quia ignoravit conjunctionem vasorum intercostalium cum vasis Thoracis, quæ à Basilica, Axillaris propaggine prodit, qua de re vide ejus epistolam. IV. Verum in principio oppositi lateris revulsionis gratia materia adhuc fluente: post principium ejusdem lateris derivationis & evacuationis gratia, si dolor ad jugulum vergat. Si vero ad hypochondria, saphenam secamus. d Hipp. de off. nat. & 2. epid. sect. 4. adducit Gal. 6. de plac. ult. e Hoc primi notaverunt Fallop. & Eustachius. f Finitur ubi septum à vertebra nascitur, 5. loc. aff. 3. & inde exigua porriuncula exilit. g 6. loc. aff. 4. exemplum habet Hollerius, aliud Laur. h Amatus cent. 1. cur. 52. (& cum eo Hollerius) se hoc Ferraria in 12. cadaveribus humanis, totidem brutorum vidisse asserit, (& Riolanus in omnibus cadaveribus notavit) addit, si vena inferne fuerit inflata, intumescere cum suis ramis, n. n autem cavam. Fallopius nec in hominibus nec brutis videre potuit Eustachius non putat dari: Carcanus ridet: Laurentius non admittit & Hollerius observationem chimæricam fictitiamque non probat.

seu ostiola tribuant, cujusmodi in officiiis vasorum cordis reperiuntur, quæ ingressum sanguinis ex cava in venam ἀρτηρίαν, non autem egressum admittunt, talia nec in hominibus, nec in brutis hæcenus observare potuimus. Adde etiam: quod si Venæ sine pari inferne apertæ, sanguineque expresso, cannula indatur & infletur, non solum hæc vena, sed etiam cava intumescet. Quare cadit sententia statuentium si vena in cubito secetur, quamvis cava evacuetur, nil tamen sanguinis è vena ἀρτηρίαν educi, ostiolis regurgitantem sanguinem in cavam egredi impredientibus.

At Riolanus asserit se in omnibus cadaveribus demonstrasse: ne enim ex plenitudine vasorum partibus incommoda evenirent, naturam in partibus declivioribus & quæ continue moventur, vasorum officiiis membranulas tanquam repagula apposuisse, repentinum sanguinis affluxum sistentes. Quum igitur thorax ob respirationis necessitatem perpetuo moveatur, ne sanguis in venam azygon affatim irruens, pleuritidem inferret, tres Valvulas tanquam ostiola in caudice venæ azygos alternatim disposuisse: quarum primam esse in exortu venæ, duas alias directe oppositas in media caudice affixas esse, quæ sanguini affatim irruenti obsistunt, sed remeanti cedant: propterea non impedire, quo minus materia pleuritica ab azygon ramis in cavam refluat. Quod si unica tantum valvula adsit, ut semel videre contigit, ejusmodi corpora pleuriticis affectionibus sæpissime tentari.

IV. Intercostralis¹ superior [tab. 6. f. 1. F. t. 7. K.] utrinque una (in qua Valvulam aliqui notant) à ramo subclavio, juxta jugularium venarum [tab. 7. S. T.] initia ostenditur (nonnuquam tamen dextra à trunco, sinistra à ramo) & sub brachii arteria reflectitur, inque geminos ramos ut plurimum, præcipue in dextro latere dividitur, qui in duo superiorum costarum intervalla, aliquando & tria^k distribuuntur, qui cum ramis mammariis [tab. 7. LL.] qui per cartilagine repunt, junguntur. Hæc, tum quando ἀρτηρίαν ad omnia costarum interstitia ramos largita est, deest. Sic ab intercostalibus omnibus ramuli vertebrarum foramina (ubi nervi egrediuntur) pro earum & spinæ medullæ nutritione ingrediuntur.

Truncus dein [tab. 7. H.] sub pectoris osse, asperam arteriam ad jugulum, mediastino & thymo [t. 4. F.] suffultus, recta ascendit, & in duos^l insignes [tab. 7. II. tab. 8. c.] ramos dividitur, quorum alter dextram, alter sinistram partem petit, & quamdiu in Thorace est, Subclavius^m dicitur. Ex quolibet Subclavio, venæ aliæ à parte inferiore, aliæ à superiore prodeunt. Ab inferiore, antequam dividantur Subclavii, rami seu venæ quatuor emanant: aliquando tamen & alia, modo à subclavia, modo ex ipso cavæ trunco prodiens, observatur, quemadmodum in Venæ sine pari historia recensimus.

I. Mammariaⁿ descendens [t. 6. f. 1. EE. t. 7. LL. t. 3. L.] est cujus varius est exortus, aliquando enim ex anteriore & media bifurcationis sede; aliquando à Subclavii radice; aliquando sinistra à Subclavia, dextra à bifurcatione: quandoque è medio cavæ trunco ante divisionem unica enascitur, quæ ad sternon ubi pervenit, in dextrum & sinistram scinditur. Hæc antrosum ducta & sub osse pectoris [t. 4. B. C.] delata,

Dd

ne lib. 3. aliam habet figuram, in qua sinistram latus veram sententiam exhibet. m. Axillarem vocant Col. Fallop. n. Gal. de diff. ven. 5. diligenter egit, & 7. us. part. 2.2. o. Dextra è medio cava in jugulo, altera à sinistro cava medio, diff. ven. 5.

i Gal. rat. vie. acur. com. 2. tex. 10. & diff. ven. 2.

k Costa quatuor venas ab hac accipiunt. Gal. loc. citato non quatuor, nisi obscure, & inter musculos fiat sed duobus & ad summum tribus præcipue in dextro latere Eust.

l Non ut pingunt pleraque tabula Anat. mica utrinque in duos ramos, sed utrinque in unum ut recte pinxit Valerius, lectione Venæ admonitus, qui etiam in fine ad car.

ad cartilagineas mucronatas latera emergit & abdominis superiora ei furculos communicando perreptat, & in descensu ad singula costarum intervalla cartilaginea (osseis enim $\alpha\zeta\upsilon\gamma\omicron\varsigma$ mittit) ramulos largitur, qui cum intercostalium extremis junguntur. Hujus venae mammariae dictae pars extra thoracem (hac ratione duplex statui potest interna & externa) ad superstratos musculos emergit, tum in mammas, tum in reliquum pectus furculos ubi distribuit, deorsum fertur qui rectis abdominis musculis subnixa, suis extremis cum Epigastricae [tab. 6. II.] venae ramulis superiora petentibus, coeunt [tab. 7. M.] Sic & aliae sub cute ad hypochondria emergunt, quae tum ex P commixtione ramulorum Intercostalium, & venae mammariae factae sunt, tum ex iis, quae vicina intercostalia alunt, cum quibus aliae, quae ab inguinibus ad superiora tendunt, uniuntur.

p Thymica
Laur. qui &
capsularem ad-
dit, quae per cor-
dis involucrium
feratur, & phre-
gionis ascenden-
tibus occurrat,
ut eadem vasa
esse videantur.
Riol. adirem-
ptu vena carva
producentur
exiles vena,
thymica, capsu-
laris, & media-
stina quae ead-
em est cum
capsulari.

* Cervicalis po-
stica, Riol. quia
alia antica,
cervicis partes
anteriores irri-
gans.

q Vesal. voluit
reliquum Cer-
vicalis cum co-
inge arteria per-
turi, cuius portio altera inter carnem & cutem fertur. Postmodum Axillaris in duos
[tab. 6. H. I. t. 7. a. m. t. 9. q. r.] abit ramos, superiorem seu venam Cephalicam [tab. 7. d. t. 8. q.] & inferiorem seu [tab. 7. m. t. 3. r.] Basilicam: de utraque in brachii historia
dicetur. At à Basilica trunco venae duae exeunt.
I. Thoracica superior [tab. 7. PP. t. 8. f.] quae pectus accedit, & in cutem & mus-
culos pectus operientes distribuit: & in mulieribus frequentibus ramis mammas
accedit.
II. Thoracica inferior [tab. 7. RR. t. 8. tt.] totum thoracis latus perreptat, cuius
rami cum ramis venae $\alpha\zeta\upsilon\gamma\omicron\varsigma$ [tab. 8. xx.] extra thoracem prodeuntibus anastomosi-
bus [tab. 8. yy.] junguntur (quare ex Axillari ejusdem lateris in Pleuritide sanguis eli-
ci potest) & per musculus brachii latissimum distribuitur. Haec nonnunquam à Ba-
silica exoritur.

II. Mediastina [tab. 3. Q.] quae modo à trunco, modo à sinistro subclavio è re-
gione jugularis internae exoritur, modo vena una satis crassa supra concavum pulmo-
nis, & supra pericardium deorsum lata, per thymum P & mediastinum disseminata:
modo furculi duo, qui per mediastinum feruntur, horum alter venis diaphragmatis
ascendentibus jungitur, alter cum diaphragmatis nervo sinistro delatus, in ejus carno-
sam substantiam inferitur, quod in puerulis clarius, quam in adultis cernitur.

III. Cervicalis [tab. 6. OO. tab. 77. NN.] * non admodum magna, sursum oblique
posteriora adit, per laterales vertebrarum cervicis processus, & foramina illis inscul-
pta transit, & musculis vertebris proxime incumben-
tibus, soboles largitur, quemad-
modum & alios ad cervicis medullam per nervorum foramina transmittit, ibique
absumitur.

IV. Muscula inferior [tab. 7. O.] quae aliquando à jugulari externa prodit, per
musculos pectoris superiores, & colli inferiores distribuitur: & haec à subclavio ramo
antequam Thoracis cavitatem excidat, prodeunt. Mox subclavius [tab. 8. p.] Tho-
racis cavitatem egressus nomen mutat & Axillaris dicitur.

Ab Axillari antequam dividatur, duae propagantur venae.

I. Scapularis interna [tab. 7. Q.] per musculos internam scapulae partem obsiden-
tes & eis propinquos distribuitur: ubi & ramuli apparent, glandulas axillis subjectas
transmeantes.

II. Scapularis externa [tab. 7. d.] ad partem ejus gibbam & externam progressi-
tur, cuius portio altera inter carnem & cutem fertur. Postmodum Axillaris in duos
[tab. 6. H. I. t. 7. a. m. t. 9. q. r.] abit ramos, superiorem seu venam Cephalicam [tab. 7. d. t. 8. q.] & inferiorem seu [tab. 7. m. t. 3. r.] Basilicam: de utraque in brachii historia
dicetur. At à Basilica trunco venae duae exeunt.

I. Thoracica superior [tab. 7. PP. t. 8. f.] quae pectus accedit, & in cutem & mus-
culos pectus operientes distribuit: & in mulieribus frequentibus ramis mammas
accedit.

II. Thoracica inferior [tab. 7. RR. t. 8. tt.] totum thoracis latus perreptat, cuius
rami cum ramis venae $\alpha\zeta\upsilon\gamma\omicron\varsigma$ [tab. 8. xx.] extra thoracem prodeuntibus anastomosi-
bus [tab. 8. yy.] junguntur (quare ex Axillari ejusdem lateris in Pleuritide sanguis eli-
ci potest) & per musculus brachii latissimum distribuitur. Haec nonnunquam à Ba-
silica exoritur.

A par-

A parte superiore & subclavii utrinque venæ tres emergunt: Muscula superior, Jugulares seu *σφαγιτιδες* externæ & internæ, quæ ad colli & latera ascendunt, & ad quarum orificia valvulæ binæ sunt sanguinis relapsum impediētes, alias enim partes superiores alimento defraudarentur.

I. Muscula superior [tab. 8. O. tab. 7. bb.] juxta jugularem externam [tab. 8. n.] promittitur, & in cutem ac musculos colli partem posteriorem occupantes, numerosis ramulis dispergitur.

II. Jugularis externa [tab. 6. fig. 1. LL. t. 7. TT. t. 8. n.] communiter utrinque una, aliquando ab exortu gemina, nonnunquam in medio ductu gemina, sub cute sursum fertur, sub clavicula oblique repens furculos infra claviculam emittit, omnibus partibus externis colli, capitis & faciei sui lateris graciles furculos largiens, ut plurimum sub auris radice bipartito in ramum anteriorem & posteriorem dividitur, ut in facie dicetur, lib. 3. cap. 30. Ab hac, ad Cephalicam in quibusdam ramum ferri aliqui notantur, quare in affectibus capitis, Cephalicæ sectionem probant.

III. Jugularis interna* [tab. 6. f. 1. KK. t. 7. TT. t. 8. m.] (quæ in homine ob cerebri copiam & major est) à ramo subclavio juxta claviculam cum sterno commissuram enata ad asperæ arteriæ latus, cui quemadmodum & vicinis membranæ exiles furculos largitur, ad fauces conscendit, & circa medium in duos ramos scinditur, quorum alter exterior ad maxillæ angulos bipartitus, in fauces & partes maxillæ subjectas distribuitur: alter pone aures progrediens, in faciem usque ad tempora dispergitur. At ramus interior per foramen appendici styloidi proximum, cranium ingreditur & duræ matris sinus applicatus, sanguinem in eos effundit, de qua re plenius lib. 3. cap. 10. Et hæc etiam Apoplectica veteribus dicta, forte quod eam in apoplexia inciderint, quam digiti distantia infra maxillæ inferioris angulum, tuto & salutariter (cum in cerebrum citissime evacuare possit) incidi & posse & multis profuisse, se & vidisse & ab aliis accepisse Rossetus lib. de partu cæsar. testatur.

* Quia apoplectica & Arabibus *Guid. & occulta*. Andernacus, nunc in eodem latere duas res, quatuor & plures interiores jugulares asserit. y Interior gracilior: Exterior grandior. Vesulio: at Laur. interna insignior, externa minor in homine, contra in brutis.
z contra periculosa statui potest, quia Arist. 3. hist. an. 3. ait, jugularibus foris tantum apprehensis homines corrumpere, sensibus ereptis & palpebris compressis. A ver. 2. col. 29. percussis jugularibus mortem inferri scribit, unde rex quidam India ejus loci percussione interficeretur. Resp. Rioli. vera esse posse si alio in loco rudentur, propter arteria carotidis, vel nervi sexti paris viciniam.

De nervis per thoracem & collum disseminatis.

CAPUT XIX.

De his Galenus 7. us. part. 14. & 15. lib. de dissect. nervu. 7. 10. & sequentibus egit.

Nervi, qui per thoracem & collum disseminantur duplices sunt, qui omnes à cerebri medulla prodeunt, alii quidem, dum medulla adhuc in cranio est, alii dum cranio elapsa in vertebra continetur & spinalis dicitur, suæque duplici meninge investitur.

Dd 2

Ex

Ex medulla, dum adhuc in cranio est, sextum par [t. 9. f. 1. ee.] educitur, quod ad exortum ex pluribus ^a fibris componitur, quæ ita uniuntur, ut unum ^b nervum constituere videantur, cum duo sunt membrana eadem contexti, qui per foramen, quod inter occiput & os temporale situm est, egrediuntur. Hujus nervi ^c pars anterior & minor ^d recta descendens in musculos linguæ, & majori parte in os disseminatur, nonnunquam & furculum ad linguæ radicem mittit. Altera vero pars, quæ major est & posterior, extrorsum ramulos tribuit musculis [t. 9. fig. 1. f.] cervicem occupantibus, & musculo scapulam moventium secundo: introrsum vero magis tamen descendens, musculis Laryngis [t. 9. fig. 1. g.] cavitatem occupantibus radices largitur, & aliquot tenues hyoidis musculis: & cum varii nervorum furculi concurrant, rursusque à se invicem separentur, plexum constituere videntur, ^d quem aliqui chordulis conferunt, quas Cardinalium galeris appensas cernimus: in quibus contextibus nodi quidam, quos Fallopius ^f olivaris corporis imaginem referre voluit, qui glandulis vasorum distributioni præfectis conferri possunt, & similitudinem habent cum extuberantiis radicum Peoniæ aut Filipendulæ: quæ nervorum augmenta à Galeno ^f gangliis assimilantur. Mox cum septimo pari ^h colligatur, & inter venam jugularem, arteriamque Carotidem, (quæ simul eadem membrana investitur) ad arteriæ asperæ latus descendit, quo per utrumque ventrem disseminetur, & ad omnes tam thoracis quam ventris inferioris partes, omniaque viscera sensum & motum defert. At supra jugulum, antequam thoracem subeat, utrinque in duos [t. 9. f. 1. h.] dividitur ramos, exteriorem majorem, & interiorem minorem.

Recurrentem nervum ramus exterior utrinque constituit, quorum Galenus inventor est, qui *παλινδρομῶντες*, & vocales dicuntur, quia his læsis, animali vox deficit, cum per eas efformandæ vocis virtus deferatur: quorum usum vivi canis sectio perspicue docet: siquidem horum altero præfecto, semivocalis redditur, utroque vero discisso, vel laqueo ⁱ intercepto, prorsus vox perit: sed causam recursus explicare lubet cum ^k Galeno.

Cum in musculorum capita nervi inferi debuerint, sintque Laryngis aliquot musculi, qui sua capita seu principia non superne, sed interne habeant; ita ferre his nervi erant implantandi, qui ipsis sensum & motum suppeditarent, & quidem vel à cerebro, vel à medulla spinali promanantes. A cerebro eo mitti non poterant, cum enim illi recta deorsum ferantur ipsorum fini inserti fuissent: nec à spinali medulla, tales enim obliquum exortum habent. Quare cum neutrinque nervum accipere potuerint; idcirco natura per viam contrariam ad nervos ipsos misit. Sextum enim par, per totum collum deorsum fertur ad mediam usque thoracis partem, unde utrinque propago enata, rursus per eandem viam, qua prius descenderat, sursum redit, ceu cursum reciprocans per motum assumptivum usque ad laryngem, quo musculi hi deorsum trahant. Qui motus cum circumvolutione fieri debuerit, opus habuit corpore, quod velut metæ cujusdam & rotulæ usum præberet; & quidem forte ac leve esse debuit, quo sibi ipsi & nervo tutum supergressum præberet. Ejusmodi aut sunt vel ossa vel vasa. Ossa, ut claves, vel prima costa, quibus circumvolvi non debuit, sic enim nervus sub cute prominens facile à quavis injuria læderetur. Quare ad vasa reflecti debuit, non quidem ad ea, quæ rectam vel obliquam positionem haberent, (circa illa non poterat, circa hæc lubricam admodum & instabilem circumlationem habuisset) sed

a Trium nervorum habet principia, Gal. diff. nerv. 7.
b Unus nervus Vesalio: duos esse ostendit Fallopius.
c De hujus distributione vide diff. nerv. 10.
d Hanc portionem ceteris Anatomis ignotam dicit Fallopius.
e Præcipue in collo & lumbis in porcorum collo ad sexti paris egressum & calvaria manifestius quam in hominis collo spectantur, Vesal. in observat.
f Plexum sexti paris vocans.
g 16. us. part.
h Cohære dicit Vesal. non misceri, Fallopius.
i diff. nerv. 10.
k 7. us. part. 14.
l 15. ubi ait, seejus, qui fabricatus est animalia, sapientiam ac potentiam ne laudare quidem satis pro merito posse.

sed quæ transversam: sicque à sinistris, ad Arteriam magnam, quæ à corde emergens sese ad spinam inflectit (ubi positio est transversa, flexio levis & orbicularis; quare meta validissima ac tutissima) reducere voluit. Et si enim iter longum fuerit, ex itinere tamen longitudine non mediocriter robur adepti sunt, cum nervi à cerebro progredientes, duriores reddantur. A dextris vero circa Axillarem arteriam circumvertitur, quæ etsi non plane sit transversa, ligamentorum membranoso robore Sapiientissimus Op. sex corripit, arteriæ ac vicinis corporibus connectens, quo tuta fiat velut circa rotulæ orbem flexio. Sed ad nervi distributionem redeamus.

Dextri nervi ramus exterior, statim à divisione [tab. 9. fig. 1. b.] furculos utrinque mittit [t. 9. fig. 1. k. k.] ad musculos à sterno & claviculis pronatos: mox ubi ad Arteriam axillarem [t. 9. fig. 2. F.] pervenit, tanquam circa axem [t. 9. fig. 2. P.] ramulos tres (rarius & tantum unum) ab interiore [t. 9. fig. 1. l.] latere transmittit, qui versus caput reflexi & uniti, Recurrentem [t. 9. fig. 2. Q. Q. & f. 1. m.] dextrum constituunt, qui ascendens & Aspera arteriæ [t. 9. fig. 2. l.] lateri membranæ interventu adhærens, & glandulæ in incumbens [t. 9. fig. 2. N.] Laryngis cavitatem petit, eique cum sinistro interprimam & secundam cartilaginem inseritur [t. 9. fig. 1. n.] & in γλωττιδα, tanquam vocis formandæ organum, & Laryngis musculos, qui capita deorsum habent, ipsis mortuum tribuentes, exilibus, sed numerosis ramulis implantatur. Recurrente constituto ° ramus prædictus sub jugulo oblique descendens, postquam in transitu extrorsum pleuræ & [tab. 9. f. 1. q. q.] pulmonis p tunica; introrsum vero Pericardio [t. 9. f. 1. r.] & cordi 9 furculos largitur est.

Stomachicum (qui infra cor juxta vertebra, intra mediastini duplicaturam latitans perquirendus) [t. 9. fig. 1. t.] dextrum constituit, qui latus sinistrum, quemadmodum sinister dextrum petens, sub œsophago, cui laxè nequitur, & aliquot furculos communicat, cum sinistro jungitur, ac diaphragma penetrans, in orificium sinistrum, & proximas ventriculi sedes absumentur.

Interior vero dextri nervi ramus, costalis [t. 9. f. 1. iii.] dicitur, qui visceribus omnibus infimi ventris ramulos largitur: hic sub pleura vertebrae attensus, per costarum radices demittitur, & ramulos à quolibet nervo intercostali assumit: cum enim jam plures propagines de se miserit, & longe adhuc progredi debeat, ab intercostalibus vires assumit & quasi augetur. Dein, cum Arteria magna diaphragma penetrans, deorsum ad os sacrum usque deducitur, & in ramos tres distribuitur: quorum primus [t. 9. fig. 1. y.] inferiorem membranam omenti petit, & in ramulos tres secatur, horumque unus ad colon [t. 9. fig. 1. z.] intestinum, hinc post Colicam diuturnam rucedo sequitur alter [t. 9. fig. 1. α.] ad intestinorum principium, quialiquando ob exilitatem vix conspici potest, tertius, ventriculi fundo [t. 9. fig. 1. β.] parte dextra & superiori omenti membranæ furculos largitur: reliquum in Jecoris ° tunica [t. 9. f. 1. γ.] plexum nervi venum ibi contentum desinit.

D d 3.

& venum ibi contentum desinit.

na. p Fallopius vult non tantum ad membranam externam mitti, sed etiam ad ramos aspera arteriæ, multas fibras distribui, quæ dictis ramis quasi connata per totos pulmones distribuantur. Contradicit Vesalius in examine: & sane hoc si foret, utique pulmonum dolores insignes esse deberent, ac contrarium observatur. q Qui ei non solum sensum verum etiam motum attribuit, quemadmodum & diaphragmati: & quatenus membranas tangendi organa decurrit, eate nus sentiens est: motor vero, quatenus musculos organa movendi peragatur, hæc Piccolhom. t Vide 6. us. part. 6. f. diff. nerv. 10. t Distributionem inter peritonæi regionem explicavit diff. nerv. 10. u Ad jecur, lienem, renes, & ante hæc ad totum ventrem ac omnia viscera nervi à cerebro partim à tertia conjugatione, partim à sexto pari provenire conspiciuntur, diff. nerv. 10.

Reversum vocat Vesalius.

Et modo tres, modo duos, interdum unum esse: nervulum dicit Columb.

Quæ aliis glandulis neque colore, neque substantia responder.

Musculi quatuor secundam cartilaginariam neccentes: duo, tertiam cartilaginem primam jungentes.

Fallopius hic aliam producit propaginem, quæ conjuncta cum nervulo à plexu prodeunte, sub arteria ad cordis basin declinet, & in plexum nervi venum ibi contentum desinit.

x Fallopius ait,
 se nunquam po-
 tuisse conspice-
 re nervos à sex-
 to pari ad renes
 & uterum per-
 tingentes: at Ve-
 salius, etiam ad
 pinguem re-
 num tunicam
 ferri voluit.
 y Columbus ait
 Gal. in reddenda
 causa, cur
 sinister non con-
 vertatur ad
 arteriam axil-
 larem sinistra
 sibi non satisfac-
 cere, & licet ve-
 ram causam
 non attigerit,
 sua tamen dili-
 gentia primum
 nervos reversi-
 vos ostendisse.
 z 7. us. part. 15.
 a Adplexum
 quendam ner-
 vorum sub basi
 cordis conten-
 tum ferri, vo-
 luit Fallopius.
 b Columbus
 vult propter
 huius nervi
 tenuitatem, ne
 in perpetuis cor-
 dis motibus dis-
 rumpatur, ner-
 vum non sub
 axillari sinistra
 recurrere, sed
 sub arteria ma-
 gna.
 c Costalis ner-
 vus quem om-
 nes à sexto pari
 derivant & ad
 costarum radi-
 ces reperitur, à
 tribus ultimis colli vertebra nascitur & descendens in progressu suo circa thoracis supernas partes, duarum aut trium
 fibellarum accessione ad auctus, costarum extremam iuxta dorsum perreptat, atque diaphragmate penetrato, stomachicis
 nervis jungitur ad rete nervorum supra renes effingendum, Rioli. d Gal. diff. nerv. 11. & sequentibus.

& vesicam biliariam absumitur. Secundus & inferior [tab. 9. f. 1. d.] renem * dextrum accedit, hinc vomitus in Nephriticis causatur. Tertius & maximus [t. 9. f. 1. e.] mesenterium & intestina adit: reliquum recta ad vesicam [t. 9. f. 1. f.] descendit, ejusque dextrum latus implicat, in eoque dextrum latus implicat, in eoque absumitur.

Sinister sexti [t. 9. f. 1. e. fig. 2. o.] paris nervus, pari pacto quo & dexter progreditur, ramulos ad eosdem musculos, ad quos & dexter, mittens, & ubi ad jugulum pervenit, in anteriorem ramum dividitur.

Exterior, posteaquam in descensu extrorsum quidem pleura [t. 9. fig. 1. q.] pulmonisque tunica, ac introrsum pericardio & cordi ramulos distribuit, non ut dexter y ad arteriam [t. 9. f. 1. e.] axillarem, cum non transversim, sed oblique magis sursum contendat, circa quam obvolvi quidem utcumque potuisset, sed lubricum ^z id & instabile fuisset, sed ad arteriae magnae truncum descendente[m] [t. 9. fig. 1. c.] qua primum e corde emergit, & ad spinam sese inflectit, extra pericardium ramulos communiter tres, nonnunquam pauciores transmittit; qui reflexi [t. 9. fig. 1. r.] & uniti, nervum Recurrentem sinistram [t. 9. f. 1. ss.] constituunt, qui ad Asperae arteriae latus sinistram, cui adhæret, sursum mittitur, & cum dextro Laryngis cavitati inseritur. Recurrente constituto, adhuc alium in sinistro tantum latere paulo inferius surculum re-nuem producit, qui reflexus, ad corpus venae arteriosae pericardium permeans, ad basin cordis ^a fertur, & per cordis tunicam capillorum ^b modo distribuitur: rami reli-quum dextrorsum inclinans descendit.

Stomachicum sinistram [t. 9. fig. 1. uu.] constituit, qui paulo sub Recurrentis exor-tu sub oesophago, cui adhæret, cum stomachico dextro [tab. 9. f. 1. ad f.] jungitur & ad orificium uterque nervus in multas propaggines retis in morem dividitur, & orifi-cium amplexantur, eique exactissimum sensum tribuunt, ita ut eo affecto, cor ipsum dolere videatur: reliquum secundum elatiorem ventriculi regionem fertur, pylor-um adit, & in hepatis tunicam absumitur. [t. 9. fig. 1. x.]

Interior sinistri nervi ramus etiam per Thoracem progreditur, Costalem ^c fini-strum constituit, & ab intercostalibus ramulos assumit: dein sub diaphragmate in tres ramos dividitur: quorum primus & superior [tab. 9. f. 1. n.] ad omentum abit, a quo ramuli duo, unus ad t. 9. f. 1. l.] colon, & inferiorem omenti [t. 9. f. 1. i.] membra-nam; alter ventriculi fundum [tab. 9. f. 1. ll.] sinistram & superiorem omenti mem-branam petit: reliquum lieni [t. 9. fig. 1. z.] inseritur. Secundus [t. 9. f. 1. v. Gracum.] ad mesenterium sinistram, ejusque loci intestina excurrit: nonnunquam ab hoc fur-culi prodeunt, qui vasa seminaria ad testes usque comitantur. Tertius [tab. 9. f. 1. v.] renem sinistram accedit: reliquum totius rami in vesicae sinistram latus [t. 9. f. 1. e.] absumitur. Ab his interioribus ramis tam dextro quam sinistro, nonnunquam ad uterum soboles mittuntur: quamvis & uterus & vesica, à Medulla spinali ossis sacri suos nervos accipiant. Haecenus de nervis à sexto pari promanantibus.

Nervi vero qui à medulla Cerebri prodeunt, dum jam in vertebrae continetur, & propterea spinalis dicitur, duplices sunt, Cervicis alii, alii Thoracis.

Cervicis ^d paria sunt septem: à cujus infimis tribus nervis, utrinque nervus unus diaphrag-

diaphragmaticus vel phrenicus, ex tribus furculis confatus prodit, qui per diaphragma disperguntur: de quibus in diaphragmatis historia.

Thoracis paria ^e sunt duodecim, & nervi Intercostales dicuntur, eo quod ad quodlibet costarum interstitium, & quidem proxime ad ipsum os, nervus mittatur: in quo enim cujuscunque costarum secundum longitudinem ubi sinus est, arteria, vena, nervus ^e illac una repentes comperiuntur, quod propter sectionem Empyricorum diligenter notare convenit, ut si per musculorum Intercostalium incisionem pus ex-hauriendum fuerit, sectio ad supernam costarum partem administretur; observatis quoque internorum musculorum fibris, ne eorum plures dissecantur, & sic vera consolidatio impediatur. Sed de his Cervicis & Thoracis nervis in spinalis medullae historia dicitur.

De Corde.

CAPUT XX.

De Corde egit Hipp. libello peculiari, Galen. 6. us. part. 2. & 7. usq. ad. 20. & 7. ad an. 7. 8. 9. 10. & 11. 1. de plac. Hipp. & Platonis Administrationem vero in vivo animali 7. ad ana. 12. 14. & 15. proponit. Aristoteles 1. hist. 73. part. 4. & 7. item lib. de respir. 16.

Cor pars princeps ^a est, animae irascibilis ^b sedes, facultatis & spiritus vitalis, ^a fons, caloris nativi focus ^d & fomes, quo singularum partium calor nativus conservetur, ejusque influxu recreetur: arteriarum ^e radix, pulsumque auctor: respirandi instrumentum. ^e Dicitur cor ^f à currendo, siquidem propter perpetuos motus assidue currere videtur: Græcis καρδιά, quasi *negotia*, quod principatum ob-tineat, cum non secus atque cerebrum pars princeps sit; ita tamen, ut quemadmo-dum cerebri major est dignitas, ita cordis major sit necessitas, cum hujus solius visce-ris læsio ^h hominem statim interimat: quare Philosophus ⁱ corde carens nullum un-quam animal visum, cum propter ^k caloris originem sit necessarium, scribit.

Situm est ^l in medio Thoracis ^m sinu, nobiliori ⁿ loco tanquam princeps quidam, & illa-

^a Gal. in arr. med. non ta-men pars prin-ceps est, ut vo-luit Arist. qui actiones omnes in corde collo-cavit.
^b Hippocrati,
^c Platoni, Gale-no, Stoicis ac Peripateticis
& illa-omnibus: ve-rum Zeno.

Chrysippus, Possidonius ceterique Stoici & Arist. cum Theophr. non tantum irascibilis, sed etiam concupiscibilis sedem, quam Arist. altricem, alii naturalem appellant. Dein Stoici cum Peripateticis, rationis vim ac animae principatum in corde collocarunt: contra quos Galenus ex Hipp. & Plat. sententia disputat in libris placitorum. ^e Gal. de util. resp. cor vitale organum principalissimum 6. us. part. vitalium actionum princeps est: idem respirandi instrumentum appel-lat, quod etiam lib. de semin. ut vendi principium nuncupavit. Vitales spiritus perfectiores reddere, postquam in pulmo-nibus elaborati sunt, voluit Columb. ^d Cor quasi focus & arx corporis 3. part. an. 7. caloris nativi quo animal regitur quasi fons quidam ac domicilium, 6. us. part. 7. & 7. ad an. 8. ^e Hipp. de alimentis. ^f Piccolhom. ^g Chrysippo: aliis etiam *νεγδοῦς* ^h τὸ κεντρικόν, quod est vibrare, perenni enim motu cor cietur. At Piccolhom. ⁱ τὸ κεντρικόν, id est, ab arca panaria, in qua panis pinsetur, quod in corde sanguis veluti alimentarius pinsetur, & assiduis motibus exagite-tur, ut tenuior facilius commigret in spiritum vitalem. ^h Nunquam mors, inquit Gal. nisi ad immodicas cordis intem-peries. ⁱ 4. gen. an. k 3. part. 7. Cor & jecur omnibus animalibus necessarium, alterum propter caloris originem, alte-rum cibiconcoquendi gratia: & 3. part. 4. Cor omnibus sanguinels propter venas qua sanguinem continent, quarum cor principium est, & 2. hist. 15. ^l Situm eleganter explicavit Gal. 6. us. part. 2. & 7. Columbus ait, non in medio corpo-ris situm esse, ut placuerit Aristoteli, quia centrum corporis umbilicus occupet. Arist. 1. hist. 17. situm ceteris animalibus ^m situm esse, ut situm in medio pectoris est: homini tantum in partem sinistram (*ἐν τοῖς δεξιτέρις*) potius vergit: & 2. hist.

hifl. 17. Idem fcribit omnia animalia tam aquatilia quam terreftria & volatilia cor in thorace locatum habere. *Ælia-
nus* & *Athenæus* pifcem a fellum cor in imo ventre habere refertur. in *Gal. 6. uf. part. 2. & 7. ad. an. 7. & 2. plac.*
Hipp. de reſect. corp. ad medium aut teſtudinis cor ſitum eſt, rotundius ac oblongius quam in aliis animalibus.
in *Ariſt. 3. part. 4. cor in medio poſitum, natura enim rem nobilem in locis nobilioribus conſtituere ſolet, niſi quid majus
impediat.*

* *Ariſt. 3. part. an. unicū crea-
tum fuit Cor
in ſingulo ani-
mali: princi-
pium enim unū
eſſe oportet, ubi
fieri oportet:
Nam quod de
corde duplicato
dicitur & ex
Plinio à Calio
Rhodigino l. 4.
c. 16. refertur,
& Plinius l. 11.
c. 37. in Paphla-
gonia bina per-
dicibus corda
eſſe ſcribit, fa-
bulofum cenſe-
mus.*
o 6. uf. part. 2.
7. & 7. ad. an.
7.
p *Gal. 6. uf.
part. 7. ubi &
cauſam reddit.*
q Cor in medio
quoad omnes
diſpoſitiones 6.
uf. part. 2.
r *Gal. 7. ad. an.
7. quare Ariſto-
teles homini po-
tius in partem
ſiniſtram, cate-
teris in medio
pectoris l. hifl.
17.*
f Ut in ſalomo-
ne piſce. c. v. ex-
emptum reſta-
ſurſum in mare levatur, neque in latus declinat. t 3 part. an. 4. u 6. uf. part. 2. decepti, ait, eo quod pulſus ad mam-
mam ſiniſtram perſentiat. † *Cardanus* in arte curandi parva, trium meminit, quibus cor ſolum in dextro latere
pulſabat, quorum unus eadem die, alter poſt aliquot dies mortuus eſt: tertius erat infans, & ceciderat, à caſu graviſ-
ſime egrotavit, ſuper vixit tamen. x 7. ad. an. 9. & de plac. y 6. uf. part. 7 & cauſam cur talis ſit reſert. z De corde
Verum in homine potius depreſſum, in brutis pyramidale. Meletio de nat. hum. cor nativè caloris inſundibulum pyrami-
dali

& illarum partium modo, quæ cum unicæ* ſint, medium occupant, tum ob o ſecuri-
tatem, tum ut corpus in æquilibrio ſit: Ad quintam coſtam à pulmonis lobis p tan-
quam digitis in orbem [*tab. 4. N. O. P. Q. t. 5. f. 1. & 2. t. 10. f. 1. & 2.*] complexum, utæ-
qualiter o ex toto pulmone per arteriam venoſam ſpiritum attrahat; & per venam ar-
terioſam ſanguinem largiatur, & per arteriam magnam vitam caloremque æquali-
ter in omnia extrema diffundat, cum huius viſceris in corpore officium ſit, quod So-
lis in majore Mundo, capſulaque propria [*t. 5. f. 1. D. E. F. fig. 2. BB.*] cuſtoditur. Ita ta-
men ut baſis, q quoad dextram & ſiniſtram, anteriorem & poſteriorem, ſuperiorem
& inferiorem partem exacte medium obtineat. Ar mucro [*tab. 5. f. 2. E.*] ſiniſtror-
ſum magis, antrorſum tamen, infra lævam papillam exporrigitur, ita ut cartilagineſ
coſtæ ſextæ & ſeptimæ ſiniſtri lateris, ubi ſterno articulantur, in vivente quidem recta
f in priora reſpiciat, ut partem anteriorem, in quam movemur, calefaciat: & quidem
in latus inclinare debuit, quo diaphragmati cedat, ne ipſius motus (cum amborum
perennis motus ſit) impediatur, & ſibi invicem impedimento ſint: non autem dex-
trum, ſed ſiniſtrum, quia vena cava per medium Thoracem aſcendens hanc flexio-
nem Cordis in dextram impedit: forte etiam ut ſiniſtram, quam Ariſtoteles natu-
ra frigidiorem credidit, calefaciat; cum dextra ab Hepate, à vena cava, & à vena ſine
pari calidior reddatur, quo ſic ambæ u partes robore, calore & pondere æquales red-
datur. Quare cum motus à ſiniſtris u magis perſentiat, duplici de cauſa & propter ſi-
niſtrum ventriculum, qui ſpiritus vitalis conceptaculum eſt: & propter Arteriam ma-
gnam, à cujus potius quam cordis corpore motus ſit, (rariffimum enim eſt & lethale
† in dextro latere ſolum pulſare, quod haud dubie contingit, quando ob affectum
peſſimum in ſiniſtra parte obortum, cor naturali inſtinctu quod noxium eſt refugere
nititur) idcirco vulgus & idiotæ in ſiniſtro latere cor ſitum aſſerunt, cum in me-
dio tanquam in loco nobiliori, baſi ſua poſitum ſit, cono ſuo centrum diaphragmatis
pertingente: at in quadrupedibus, non ſolum baſis, verum & mucro, in medio con-
ſiſtit. Adde quod & in mortuis non nihil gravitate ſua & propter arteriæ magnæ,
quæ ei affigitur, pondus, ad ſiniſtrum retractum videtur. Connectitur beneficio pe-
ricardii, mediſtino & [*t. 5. f. 1. ab F. ad G.*] diaphragmati, & per vaſa aliis partibus ne-
ctitur, cum principia x inter ſe aliqua in re connecti & communicari debeant, alias
liberum, quo liberius moveatur. Ar in canibus & ſimiis Cor magno intervallo à
diaphragmate diſtat, in quibus ejus ſitus rectus eſt.

y Figura eſt [*exprimitur tab. 5. fig. 2.*] peculiari & nulli alteri membro communi, &
ut Hipp.

dali figura constructum fuit, ob calorem intra se conceptum, cuius figura proprie pyramidalis est: nam si conus superne vergeret plurimos vapores ad cerebrum mitteret, qui cerebri naturam temperiem destruerent.

ut Hipp. 2. voluit, pyramidalis: vel potius turbinata & nuci pineæ quodammodo respondens, cum brevi & lato Thorace sit homo: ab ampla ^a namque ac orbiculari, non tamen ^b omnino rotunda, superna [tab. 5. f. 2. C. D.] basi exortum, paulatim in [t. 5. f. 2. E.] conum ^c definit; talis enim figura suæ functioni accommoda erat, cum longitudo ad tractum, rotunditas ad amplitudinem & robur faciat, non tamen undique æqualiter crassum est: & in maximis dilatationibus sphericum, quo capacius sit, ad amplam materiam continendam: sicut ad præstantiorem coctionem angulosa figura, quia in angulis humor undique à carne complexus, exactius coquitur: in ipsius contractionibus oblongum & quasi pyramidale (præsertim ^c in brutis) cernitur: quæ figura etiam utilis est, quo fibræ perpetuo motæ, principium immobile habeant, motionem scilicet cui inter movendum inniterentur: præstat autem ut mucro quiescens, cui fibræ innituntur sit imus, quoniam sanguis & aeris receptio in parte superiore perficitur. Hujus superior pars, quæ βάσις, basis, κεφαλή, caput & radix dicitur [t. 5. f. C. D.] latior est propter vasa, quæ eo loci egredi & ingredi debent: forte etiam propter cordis motum, quo sinus majores in basi hac excavantur, quo in cordis contractione sanguis uterque locum habeat, quo confugiat, ne vehementer pulsus, locoque angusto inclusus, cordis substantiam continuam frangat. Inferior vero acuminata ^d γροφὴ, vertex, ^e πυρῶν, mucro, ^f conus, cuspis & apex: Hippocrati ^g ἐγὲν, extremum [t. 5. f. 2. E.] & cauda dicitur (quam cordis partem abjectissimam, ut illam dignissimam Galenus dixit.) At antèrui cor gibbosum est, posterius simum & in lateribus prominens. Superficies ipsius lævis & polita foret, nisi adeps & vasa coronaria sanguine tumentia eam inæqualem redderent.

Magnitudo ^{*} non est omnibus eadem: & in homine, quemadmodum Cerebrum & Hepar proportionem, quam in cæteris animalibus majus est: quod longitudo sex digitos transversos æquat: latitudine quatuor, quemadmodum & altitudine. At in timidis animalibus proportionem magnum est, propter calorem, qui in magno conceptaculo, Aristotele ^e docente exolevit, audacibus pusillum & medio-

cre. Cordis partes aliæ sunt externæ, internæ aliæ. Externæ, pericardium, de quo dictum fuit: tunica adeps, vasa quæ duplicia sunt, alia quæ cor cingunt, alia quæ orificiis in cordis ventriculos pertingunt, & Auriculæ. Internæ sunt substantia carnosa, Ventriculi & Valvulæ. Tunica tenuissima ^f cor ipsum, cui propria est, proxime vestit, eo modo, quo muscoli membrana peculiari investiantur & distinguuntur, quo ipsius substantiam firmiorem reddat, quæ ab ipsius substantia integre divelli nequit.

Adipis ^g non parva copia circa cor & quidem homini copiosior, quam in brutis, cum glutinum cumulat potissimum ad ipsius ^h basin, ubi vasa majora locantur, &

Ec

minora

virtuti aliqui tribuunt. ^e 3. pars. 4. cor magnum proportionem lepori, cervo, mure, hyane, asino, panthera, mustela, & reliquis animalibus, quæ aperte timida sunt, aut propter metum malefica. ^f Vesalius assimilat membrana musculos vestienti. ^g Pinguedinem vocat Columbus, & reprehendit Aristotelem & Galenum, quod dixerint: circa cor nullam pinguedinem nasci: Adeps, Piccolhom. ^h Quia ibi concoctio perficitur eorum, quæ in corde continentur, non autem in cono. Piccolhom. & alterum usum dicit, ut facilius sit cordis motus.

a 6. us. part. 7.
b In mucrone exit, parte extrema in acumine collecta
1. hist. 17.

c Cor simile non habens, quæ corde prædita sunt. 3. part. 17. 12.

d Gal. 7. ad. an. 7. Polluci, basis cordis, caput: mucro vero fundus dicitur.

e 6. us. part. 7. ^{*} Egyptii quibus mos est cadaverem condita servare, tradidere Cor in homine singulis annis ad binas drachmas augeri: & postmodum à quinto quagesimo anno tantundem detrabi: idcirco ultra centesimum annum, defectu cordis hominem non vivere, Plin. l.

II. c. 37. quod non molis sed

minora per cordis superficiem progrediuntur, qui durior est, quam in alia parte. Adipem vero voluit natura hoc loci necessario esse, non autem pinguedinem (siquidem nec circa cor, aliamve partem calidam pinguedo coalescit ex Philosophi & Galeni i decreto) quia facillime à cordis calore, & quidem magno incommodo, liquata fuisset. Cujus usus cor humectare, ne ex continuo motu calefactum penitus exsiccetur, cum adiposa humiditas difficiliter absumatur, ipsumque refocillare, & vasa circa cor, ne nimio calore urgente dissiliant, velut inungere. Dein cum cor fons sit caloris, qui perpetuo gliscit, tanquam pabulum sufficiens & necessarium quo foveatur, & in magnis inediis nutriatur ac sustineatur, tribuit, ne humidum radicale quod cordi infixum, citius absumatur. Quare Galenus ^k cum adipi ulum tribuit, ut in ingentibus caloribus, & inediis, & frequentibus exercitationibus deserviat. Sic Avicenna dixit, pinguedinis & adipis congelationem supra corpus minui & augeri, secundum minorationem caloris & ejus augmentum: itaque calor adipem & pinguedinem pabulatur. Sæpe in dissecis cordis ventriculis in ipsorum cavitate, ^{tab. 9. append. f. 1. & 2.} frustula quædam, ¹ si non adipis saltem adipi simillima observavimus; ita ut magis mirum sit, quomodo is ibi concreascit, quam is qui supra cor ipsum est. Conus vero ab humore in pericardio contento humectatur.

Vasa obtinet, quæ cor in ^m orbem [^{t. 5. f. 2. l. & rami ab his LL. t. 10. f. 2. D.}] completuntur: Venam Coronariam à ⁿ cava trunco [^{t. 7. E.}] antequam in dextrum ventriculum inferatur (raro geminam) ortam, quæ coronæ instar basin cordis cingit, cui Valvula, sive membrana cornutæ lunæ figuram referens, seu operculum ultra medium obducta, [^{tab. 8. append. fig. 8. D.}] ne sanguis in cavam resiliat, apposita: ab hac rami deorsum per ipsius superficiem sparguntur, qui à sinistris plures & majores sunt, cum dextra parte densior sit & solidior. Hac sanguinem ab hepate tantum elaboratum pro ipsius substantia solida & densa nutrienda devehit, ut sic alimentum rei alendæ proportionem respondeat: quale enim unumquodque est, tali alimento ipsum nutrirî necesse est: quare cordis corpus, crassum ac densum, cibo crassiori indigebat: dein ^{*} tali alimento eoque plurimo eguit, cum caloris nativi plurimum obtineat: quare sanguinem à Vena cava accipit priusquam in cor migret, eo enim cum pervenisset, calidus, tenuis ac vaporosus futurus futurus erat. Sic ergo cordis pars externa alimentum à vena coronaria accipit. At interna pars cum venis careat, etiam aliunde portionem sumit, Vena coronaria minore existente, quam ut alimenti satis parti calidissimæ & perpetuo motu dicatæ, suppediet: præsertim cum vasa illa extremam tantum superficiem perreptent, nec in ejus cavitatem propter ejus crassitiam penetrent. Quare pars interna ex sanguine à Vena cava suscepto & in dextrum ventriculum effuso alitur: Hac ratione ut sanguinis in sinum dextrum illapsi, crassior rem partem, præparatione tamen aliqua præmissa, Cor in alimentum sumat, quo pulmoni alimentum purius superfit: crassum enim illud alimentum, pulmoni ineptum foret, Cordi vero utile: & nisi in ejus alimentum abiret, ab hac parte crassiore, velut excremento remanente, Cor pateretur. Per hanc quoque anima naturalis, in spiritu naturali infideas, in cordis substantiam cum omnib. suis facultatib. perfertur. Antequam sinistram cordis cavitatem occupasse. Riol. intra ventriculum dextrum ad orificium vena cava in quibusdam repentina morte suffocatis, deprehendi frustula carneæ pugni magnitudine invicem conglobata & nuper in Episcopo Malteacensi. m. 6. us. part. 18. ubi potissimum de nervo agit & 7. ad an. 10. n. Gal. 6. us. part. 14. ^{*} 16. us. part. Vesal. hac in re Galenum immerito taxare, ait, Mercat.

1 Vesal. lib. 1.
cap. 5. notavit
in sinistro ven-
triculo, glandu-
losa, sed subni-
gricans carnis
libras propomo-
dum duas cor-
de contento &
homine ante
mortem melan-
cholico, pulsu
multis mensi-
bus mire ina-
quali, qui ex si-
nistri cruris
gangrena inte-
ruit, cum ante
annos aliquot
sclopeti ictu, ar-
teria, qua fibu-
lam petit, vitia-
ta foret. Hippol.
Boscus sect. 4. in
Ostuario Ducis
sa. Ferraricis
subitania mor-
te anno 1574.
extincto, inspe-
xit insignem
pinguedinem
ad magna can-
dela sebacæ for-
mam, sinistram cordis cavitatem occupasse.

Arterias nonnunquam ^o duas coronarias [t. 12. fig. 1. BB.] ab arteria magnæ trunco descendente prodeunt, accipit, quæ una cum vena per ipsius substantiam distribuuntur, quo ejus calorem innatum foveant, spiritumque vitalem largientes ejus vitam custodiant. Si enim viveret spiritus in sinistro ventriculo absoluto, & absque arteriis in ejus substantiam delato, tum etiam potuisset per cordis poros effecti & dissipari.

Nervos ^p exiles habet à sexta conjugatione [t. 10. fig. 1. K.] vel à nervulis ad pericardium missis, qui in cordis basin [t. 10. fig. 2. b.] secundum venam arteriosam, sed non admodum ^t perspicue, distribuuntur, & quidem nonnullis volentibus tristatium dant taxat sensus gratia, non autem motus, eo quod ejus motus naturalis sit, non animalis. At si, ait Piccolhominus, unum, non duo movendi principia in nobis sint constituenda, tum cerebrum quoque, quod animæ sentientis sedes est, omnium motuum principium erit (Aristotelis enim opinionem, qui omnes animæ vires & facultates uni Cordi tribuit, Galenus & posteriores refutarunt.) Sicque Nervus hic in cor non solum facultatem sensificam, sed etiam motivam deferet, & facultatem pulsificam, seu motum dilationis & constrictionis immittet. Et hic ^t nervus nonnunquam, tametsi raro, de repente obstruitur, unde repentina & inopinata mors sequitur, quam subitanæ vocant, præpeditis & vitali & pulsifica facultatibus in cor pervenire nequeuntibus. Verum cum Galeno ^u censemus vim pulsilem ex ipsius cordis corpore oriri, non autem à nervis: his enim Cor ad suam functionem obeundam nihil indiget: nam non tantum abscissa propagine, quæ à sexta nervorum conjugatione illi inferi volunt, verum etiam omnino à corpore avulsam, ut Galeno ^x placet, dilatatur & constringitur: Sic his præcis, cordis pulsus cessaret, cor thorace exemptum moveri non posset.

Ee 2

De
arterialis in Embryone, qui ve-

nam arterialem cum arteria magna conjungit, plexus quidam est aut complicatio nervea, à qua abundans copia nervosa materia totam cordis basin amplexatur, perque ipsam plures propagines nervorum parvorum inde diducta disperguntur, per totam ipsius substantiam. Hoc Anatomici ligamentum fortasse rati neglexerunt, hacque ratione non viderunt, quod nervi in cor ferantur. Nervus autem iste plexus, originem ducit à quinque nervorum propaginibus quavis aliquando quatuor tantum sint, quinque tamen ut plurimum reperiuntur: Hac illa. Laurent. dicit: nervos à sexta conjugatione exiles, quid enim cohorte nervorum Fallopii opus, cum ejus motus animalis non sit, sed naturalis. Rioli ex ramulis utriusque stomachici simul implexis, nervorum mirabilis plexus conflatur, quem in basi cordis Fallopius collocavit & inde pericardium produci voluit.

q Gal. diff. ner. 10. 6. u. par. 18. & 7. ad. an. 8. r Gal. 6. u. par. 18. f Manifeste in cor inferi in majoribus saltem animalibus cernuntur, quo tamen in ipsum dividantur modo, sensu perspicue dignosci non potest, quemadmodum in hepate, renibus ac liene, 6. u. part. 18.

t istum nervulum nunquam observare potui: nec arbitror tam exigui nervi obstructionem repentinam mortem inferre, ut tradit Piccolhominus & post eum Bauhinus, hac Rioli. At Archangeli Piccolhomini sententiam hic recenseat, non ex sua sententia loquitur Bauhinus: Mox subjungit ridiculum est nervulis cordis obstructis repentinam mortem accidere. u 7. ad. an. 8. y 7. ad. an. 9. & Avicenn. 11. tert. tr. 1. c. 1. quando ab animali auferitur, usque ad horam pulsare invenitur, quod ex virtute vitæ cordis est. Et Arist. motum cordis naturalem esse non animale ac voluntarium agnovit.

CAPUT XXI.

De substantia 6. usu part. 8. 7. adm. an. 8. De ventriculis 6. usu part. 9. & 16. 7. ad. an. 11. Arist. 17. ejusd. 3. & 3. part. an. 4. De auriculis 6. usu part. 15. 7. ad. an. 9. Galenus egit.

Substantia cordis est caro ^a crassa [t. 10. f. 3. hoc ostendit] rubra, cum ex crassiore sanguine ortum ducat, musculi carne minus rubra, magis tamen ^b dura, admodum densa ^c & solida, ne spiritus ^d calorque ^e innatus, quæ in Corde continentur & in omnibus corporis partibus effunduntur, exhalent, neve in validis & frequentissimis motibus ac continua dilatatione ac contractione frangatur; quod in mucrone quam in basi, ^e spissius & solidius est, cum hic fibræ rectæ ob earum concursum compactiores sint, quemadmodum in musculorum vel capitibus, vel tendinibus, id quoque observatur: hæc caro, sedes est facultatis vitalis, & primaria causa functionum cordis: quæ potissimum in sanguinis & spiritus vitalis confectione consistit. Omnis enim generis ^f fibras (hoc est rectas, obliquas & transversas) robustissimas & compactissimas invicemque commistas (idcirco non ut in musculo conspicuas) ad motus præstandos injuriasque ferendas obtinet. Quare ex Galeni ^g sententia (qui aliquando communi cum reliquorum viscerum carne ^h *παρὰ γὰρ ἑαυτῶν*, ⁱ nonnunquam carnosum viscus vocat) Musculus non est, cum omnis generis fibras habeat, musculi vero simplici villorum genere gaudeant: dein quod motu naturali, non motu voluntario moveatur, cum ipsius decreto Musculus sit motus voluntarii instrumentum: At motus Cordis, qui ex visceris ⁱ substantia dependet, non est voluntarius, sed naturalis, nec quoad animal vixerit, cessare potest; Musculorum vero actio, subinde ^j quiescit, ac rursus excitatur animalis arbitrio subserviens. Hippocrates tamen musculum ^k fortissimum appellavit, nec male, cum musculum definiri ^l carnem in orbem circumductam, qualis est cordis caro. Quare ambo suis definitionibus innixi recte dixerunt: idcirco pro Hippocrate dixit Piccolhominæus ^m in nobis alium esse motum naturalem, cujus musculus est Cor: alium esse motum voluntarium, cui omnes reliqui nostri corporis musculi inserviunt: quemadmodum plenius in commentario nostro in libel. Hipp. de corde ostendimus.

Motum perpetuum cor habere debuit, cum caloris innati fons & origo sit, quo corporis partes singulæ vivunt ac reficiuntur: nam calor qui indies crescit & ex paulo reficitur, exureretur profecto, dissipareturque ac temperiem propriam amitteret, nisi cum natura temperamento aliquo regeretur ac moderaretur. Quod aliunde quam à proprio & peculiari motu provenire non potuit, quo aerem vicinum pulmonibus per respirationem attractum, susciperet. Quare motu nunquam carere debuit, cum eo sibi calorem proprium gubernet & singulis partibus communem, ex aere

^a Caro dura a. gre patibilis ex villis multiformibus constans. 6. usu part. 8. b Gal. 7. ad. an. 8. c Arist. 3. part. 4. Cor spissum est ut principium caloris servare possit. d Ut eadem sit cordis ad consentium spirituum, quæ formationis ad ignem, comparatio. e Mucronis pars carnosæ & spissior. hist. 17. vide Gal. 6. usu part. 7. f 6. usu part. 8. g cordis substantiam à musculo differre, multis rationibus probat Gal. 7. ad. an. 8. de motu musc. 3. lib. de cibis boni & mali succi 6. usu part. 8. h ab actione, fibrarum textura, crassitie, mollietie, colore, sapore, cordis carnem à musculorum carne differre ostendit & Columb. nullo pacto inter musculos connumerari posse scribit. h 1. fac. nat. 6. i 7. ad. an. 8. k Lib. de corde: hanc sententiam Hippocrati, vel quovis alio viro docto indignam asserit Mercat. de puls. quia musculus motus voluntarii instrumentum sit. l Lib. de arte. m Musculum definit esse instrumentum carnosum motum edens in animali. n De motu cordis ratione fibrarum & ligamentorum 6. usu part. 8.

aere attracto & quidem ejus sinister ventriculus, qui Pulsus auctor præcipuus est. ^{n De motu cor-}
 Est autem motus ^{dis ratione fi-} cordis, qui ob perpetuam spirituum generationem perennis est, ^{brarum & li-}
 duplex, diastole & systole constans, qui à fibris perficitur: quamdiu enim animal vi- ^{gamentorum}
 vit, & dilatatur & contrahitur, & inter utrumque motum quies intercedit. Dilata- ^{6. us part. 8.}
 tur * enim quando mucro ad basin rectis fibris retrahitur, tumque breve quidem red- ^{* hac Galeni et}
 ditur, ° sed cordis latera ita distenduntur, ut quasi sphaericum appareat: cujus usus, ^{jam sententia}
 sanguinem per cavam venam in dextrum: aerem, per Arteriam venosam in sinistrum ^{est: viri ani-}
 ventriculum † trahere, valvulis demissis & ingressui cedentibus: & hæc cordis est, ^{malis scilicet cō-}
 diastole, dilatatio & amplificatio. Contrahitur vero quando mucro à basi discedit, & ^{probabit veri-}
 tum cor producitur quidem, sed angustius evadit, rectis fibris laxatis & transversis, ^{tatem: at Era-}
 quæ orbiculatim cor ambiunt, impense collectis & arctatis, valvulis cavæ & arteriæ ^{sistratus opina-}
 venosæ ex parte clausis, arteriæ vero magnæ & venæ arteriosæ reclusis, exitum præ- ^{tus est, diasto-}
 bentibus sanguini è dextro per Venam arteriosam in pulmones, è sinistro vitali spiri- ^{len fieri cordis}
 tui in Arteriam magnam, & portione sanguinis vitalis cum fuliginibus per Arteriam ^{parietibus di-}
 venosam: hic motus, Cordis systole seu contractio & depressio dicitur. Adjuvant ^{ductis & eleva-}
 P autem nō minimum, imo omnium maxime totam propemodum efficiunt contra- ^{tis, ut in folle:}
 ctionem, ligamenta [t. 10 f. 6. l. 2 f. 7. HH.] robustissima, quæ in intimis ipsius Cor- ^{Systole, iisdem}
 dis ventriculis tenduntur, ut quæ dum contracta confident, etiam Cordis tunicas in- ^{concurrentibus}
 tro simul contrahere possint: desinunt namque ligamenta ad medium septum, robo- ^{& mutuo op-}
 ris & alterius usus gratia. Intermediæ denique exiguæ quieti, obliquæ fibræ, quæ se- ^{pressis. Volchero}
 cundum Cordis longitudinem oblique feruntur, præ sunt, & quæ attracta sunt, earum ^{Cotter in obs-}
 ministerio in ventriculis tantisper retinentur, corde circaea, P quæ continet, undi- ^{basis corrugata}
 que astricto. At motus cordis, in sinistro ejus ventriculo originaliter residet: quare ^{constringitur}
 dexter ventilatione non indiget, nisi à sinistro communicata: argumento sunt ea va- ^{& deorsum ver-}
 sa, quæ à sinistro ventriculo oriuntur, quibus solum vis pulsfica communicatur. Mo- ^{sus conum ra-}
 tus vero qui in dextro apparet, (quem Galenus 6. plac. animadvertit) similis est ei, ^{pitur ac quod}
 qui in auriculis cordis apparet, qui potius fit quod pars vicina moveatur, aut ex san- ^{de latitudine}
 guinis agitatione, quam quod facultas illi assistat. Nam quando Auriculæ dilatan- ^{amittit, in ro-}
 tur, reliquæ corporis nostri arteriæ diversa ratione constringuntur. Quare si in viva se- ^{tunditate recu-}
 ctione alicujus animalis cordis motum studiose observes, quatuor motus, loco & tē- ^{perari: latera}
 pore distinctos aspicias, quorum duo sunt proprii auricularum, & duo ventriculorum. ^{cordis undique}
 Cavitates P sinuæve, quos Ventriculos, Hippocrates ^{que distendun-}
 cat, duos insignes ^{tur: conus sur-} habet, amplitudine & forma variantes: horum dexter [t. 10. fig. 3. ^{sum versus ba-}
 GG.] ^{sintrahitur: in} ^{hac actione}

Ee 3

GG.]

Riol. in diastole basis ad conum accedit, in systole recedit, quia conus solidissimus & duriss. in verti non potest ut adduca-
 tur & abducat: dein conus immobilis est, at basis mollissima ac facile mobilis: tum columna carnea à cono ad basin
 producta, hunc motum adjuvant. O Vesalius ostendit exemplo viminei circuli, cui orbiculatim plurimorum juncorum
 radices connectuntur, & mueronibus simul junctis velut pyramidem formant. † Columb. in diastole sanguinis & spi-
 ritus expulso fit, in systole horum libera exceptio est, non autem attractio, quia ad expulsionem robore opus est. Riol. au-
 ricularum cordis repletio & inanitio, Columbi opinionem falsam esse convincit. P Gal. 6. us part. 8. fibræ omnibus a-
 gentibus, & earum maxime obliquis, quies fit. q 6. us part. 9. & 16. 7. ad. an. 11. In corde duorum Polonorum fratrum
 anno 1602. Parisiis hac miracula visa fuere: alterius cor solidum erat sine ventriculis, sed ad basin cordis vasa erant
 admodum dilatata & anastomoses illa quæ sunt in fœtu, remanserant. Alterius cor in medio septo insignem glandulam
 habebat. Riol. 1 Gal. 6. us part. 11. de expulsi vocat, ubi alii lacunam, alii cisternam & lagenam vertunt. Polluct. 10.
 1 Aristotelis tres in majoribus animalibus (contra quod Galenus 6. us part. 9. eandem equum fabricam habere, qui ma-
 ximus

simus est, & minimum passerulum asserens, & 7. ad. an. 10.) duo in minoribus, & nullum est quod sine ventriculo constet, quia conceptaculum sanguinis. 3. par. 4. maximus in dextro latere, minimus in sinistro, medius magnitudine inter dextrum & sinistrum, omnes ad pulmonem foraminibus pervii, 1. hist. 17. & 3. hist. 3.

17. ad. an. 11. id-
que magis in
magnis anima-
libus, ut equis,
bobus, camelis:
multo magis in
elephanto: non-
quam vero in
minutis etiam:
nam gallum
quispiam sacri-
ficans, cor inve-
nit fastigiatum
duobus verti-
cibus: non erant
duo, sed dexter
vertex circum-
scriptionem pe-
culiarem habe-
bat.
u Vesalius vult
magis ad mu-
cronem, sinistro
descendere.
x 6. us. part. 7.
& 12.
y Gal. 6. us. par.
16.
z Quæ aerem
inspirant per
fauces, nares,
os, his quoque
pulmo & dex-
ter cordis ven-
triculus: aliis
omnibus neque
pulmo, nec dex-
ter ventriculus
6. us. part. 9.
& 11.
a 6. us. part. 10.
b Summum
verticem 7.
ad. an. 11.
c De varietate
substantie ven-
triculorum
egit 6. us. part. 16.

GG.] qui non exacte rotundus, propriam circumscriptionem¹ superficiei, & instar crescentis Lunæ semicircularem habet, (cum septum semiorbis instar in hunc sinum extuberet) qui ut inquit Hippocrates, caudam cordis ambit, & ad mucronis^u extremum non pervenit: latior est, & multo major altero, propter sanguinem, quem continet copiosum: quare Galeno & Ruffo, sinus sanguineus^x & φλεβώδης, id est, venosus dicitur: carne laxiore, molli^y & pariete tenuiore [tab. 10. f. 5. Q. R.] præditus, quo contenti gravitatem compenset. In hunc Cava venæ ascendens, dum cor dilatatur, sanguinem effundit, ut in ejus foveis à cordis calore excoquatur, attenuetur & expurgetur: à cujus crassiore parte interior Cordis substantia nutritur: reliquum & quidem major ejus portio Corde constrieto per Venam arteriosam in pulmones pro eorum nutritione effunditur: minor vero & tenuior pars in eadem contractione, per septum in sinistrum ventriculum, ad spiritus vitalis generationem, transsudat. Etenim pulmonum^z potissimum gratia hic ventriculus creatus, cum in iis animalibus tantum habeatur, quæ pulmones habent, in cæteris vero, quæ non respirant, sed tantum transpirant, ut in piscibus dexter sinus non est: Et sic cor ac pulmo, gratia sinistri ventriculi cordis, ut sic mutua fieret compensatio: nam dexter sinus pulmoni inservit, ei alimentum opportunum conficiendo: & pulmo^a ipsi sinistro sinui, ut qui in ipsius gratiam aerem attraxerit.

Sinister ventriculus in medio [tab. 10. fig. 3. HH.] cordis exacte exsculptus: si portionem, quæ dextrum constituit demas, conspicitur, & altero angustior est, cum minorem materie copiam contineat, & orbiculari cavitate donatus, ad^b mucronem usque vergit: carne seu pariete^c est triplo quam dexter [tab. 10. fig. 8. P. Q.] crassiore, tum quod minor cavitas illam crassitiem relinquat, tum quod calidum innatum custodire debeat, eaque durior & solidior, ne spiritus vitales exhalent, & quo corpus^e in æquilibrio sit, neve cor in alterutram partem propendeat. Cum enim in hoc spiritus & sanguis vitalis tenuissimus, in illo sanguis crassior contineatur, debuit ventriculi hujus³ crassities, contenti levitatem compensare. Quare Galeno & Ruffo, sinus spirituosus, d^d aliis spongiosus, aërius, arteriosus ventriculus dicitur, cum spirituum & caloris innati officina sit, & motus omnium arteriarum principium.

In hujus enim cavitate vitalis spiritus elaboratur, qui hinc per arterias in universum corpus cum sanguine arterioso distribuitur, quo innatum singularum partium calorem foveat, sopitum suscitet, & quasi absumptum refarciat. Cujus materia duplex est, aërea & sanguinea, Galeno^e tradente, simul mixta. Aer & per os & nares inspiratus, in pulmone præparatus, per Arteriam venosam, dum cor dilatatur, in sinistrum ventriculum fertur. Sanguis vero in dextro ventriculo attenuatus & concoctus, partim in pulmones pro eorum nutritione, per venam arteriosam distribuitur: partim per septum à ventriculo attrahitur, & infra proprietate retinetur, qui cum aere permixtus, vi cordis insita & innato spiritu ac calore & perenni motu absolvitur, vitalis

d 6. us. part. 7. & 11. e 7. de pae.

his spiritus formam induit, sanguis arteriosus & spiritus vitalis nutriuntur: qui spirituosus sanguis in cordis contractione, in Arteriam magnam pro totius corporis vita effunditur; cum vita omnis à corde sit & vitali spiritu. Utriusque autem ventriculi superficies interior inæqualis est & aspera & velut cuniculosa ne sanguis & spiritus cor ingressa, priusquam perfectionem adepti sint, inde excidant: ad quod & Valvula plurimum faciunt. Inæqualitas autem ista fit partim ob foveas plures, quæ in sinistro ventriculo insigniores sunt (quare ^f Hippocrates magis corrosum dixit ipso dextro, ^f Lib. de cordis quia inlitus à natura ignis in hoc continetur: hic divinus ille calor est, quem Prometheus à cælo furatum fingunt, ut hominem vita donaret: in hoc sinu propter insignem calorem, mentem insidere Hippocrates existimavit) partim propter carneas portiunculas [t. 10. fig. 5. OO. f. 6. L. f. 7. HH. f. 8. M. r. II. f. 2. ff.] quæ circa cordis macronem tenues ac graciles quandoque quinque vel sex in dextro, at in sinistro tantum binæ crassiores & solidiores occurrunt, quibus fibræ nervosæ [tab. 10. fig. 7. GG. f. 8. L.] Valvularum, à quibusdam & ligamenta cordis dictæ, aderescent, quare ventriculus hic calidissimus est secundum Galeni mentem (non vero dexter, ut Aristoteles ^{††} voluit) quod probat sectione animalis vivi, in qua, si sinistro cordis ventriculo digitus intrudatur, qualibet corporis parte calidior sentitur. Attamen rarissimum est tantum cordis calorem esse, ut ipsum hirsutum fiat & pilis refertum, ut Plinius ^{††} alique referunt, quod non tantum scelerati ingenii signum, sed quandoque etiam rara fortitudinis & etiam calliditatis, argumentum est.

Dividuntur ventriculi Septo, & quod interstitium [t. 10. fig. 3. II. fig. 6. HH. fig. 7. K. f. 8. R.] seu paries dicitur, ne contenta ^h commisceantur; quod à dextris gibbum & extuberans, à sinistris concavum, ejusdemque crassitie cum sinistro ventriculi latere sinistro, quasi cor sinistro ventriculi gratia creatum esset: cavernosum est & scrobiculis plenum (Aristotelis ^{*} forte medius ventriculus) quo sanguis subtilior reddatur, potissimum dextrorsum, quo sanguis ex dextro in sinistrum pro vitalis spiritus generatione permeare possit, quod Galenus ^k his verbis innuit: ex dextro

†† 3. part. 5. dexter plurimum sanguinis & calidissimus continet, quare pars dextra corporis calidior: sinister parum eumque frigidissimum: medius medium calorem, tum copiatum calorem, sed puriorem. At Gal. 2. temp. & lib. de ineq. intemp. 5. experientiam anna-

tomica adducit. ^{**} Hirsuto corde gigni quosdam homines proditur, neque alios fortiores esse industria, sicut Aristonem Messenium qui trecentos Lacedamonios occidit, cui tertio capto Lacedamonii pectus dissecuere, causa videndi, hirsutumque cor repertum est. Flin. l. 11. c. 37. hunc Pausan. in Mess. omnium Græcorum optimum Apollinis oraculo iudicatum scribit: vide Plutarch. in Romulo. Policenium l. 2. stratag. Clementem Alexandrinum in Protrep. Sic de Leonide Spartanorum rege cuius cadaver Xerxes aperiri voluit, refert Plutarch. paral. ex Aristide Milelio. In latronibus quibusdam insignibus hoc viderunt Benivenius, Murettus in var. lect. Idem scribit de Lyfandro & Alexandri cane, Rhodig. l. 4. c. 16. De Hermogene Rhetore. cor habuisse hirsutæ ac magnitudine extra mortaliū reliquorum rationem insigne refert Rhodiginus l. c. ex Suida & Philostrato. De saturo scribit Plato addipotodides ἔχον ἐν τῷ θυμῷ ὄφεις, id est habens in anima serpens pilos.

^g Gal. 6. us. part. 8. intra cordis ventriculos ligamenta robustissima constituit, quæ retracta systolen efficiant: & 1. de motu musculorum, hæc ligamenta tendinibus similia esse scribit. Nic. Massa parvi sunt muscoli. Piccolhom. ligamenta. Rioli. valvula sunt iricus spides cum columnis carneis, quæ portiuncula carneæ in cordis dilatatione, instar musculorum contrahuntur. h. Ut distinguat sanguinem alimentarium à vitali, Piccolhom.

^{*} 3. part. 4. 1. hist. 17. & 3. hist. 3. Savonar. in 6. c. 11. rub. 1. cor tres ventriculos habet: dextrum in quo sanguis arterialis: sinistrum in quo spiritus, medium qui est ut via & transitus ab uno ad alium: & hic non est una concavitas ut ceteri, sed plures & parvæ. Massa in sua Anat. Aristotelem defendit & meatum insignem in superiore parte septi cordis juxta basin, in grandiore hominum corde deprehendisse affirmat. Hippolytus Bosio lect. anat.

1. 6. us. part. 15. k 3. nat. fac. 15.

dextro sinu trahitur, quod tenuissimum est per foramina septi, quorum extremos fines vix cernere licet: tum quia in demortuis concidunt omnia. Ferri autem per eos ductus sanguinem, hinc patet, quod natura nil temere unquam & frustra molitur: at foveæ sunt in septo & profundi sinus quamplurimi, qui in argustum terminantur: hæc Galenus. Hæc spiracula anfractu ambigioso feruntur, ut non facile stilus penetrare queat & versus mucronem ubi septum tenuissimum est, etiam in mortuis, veluti pervius, apparet, quo sanguis facilius percoletur: fiunt autem maxime conspicua in Corde bubulo longa coctione optime elixato. At nonnulli negant hunc transitum, ¹ volentes per Venam arteriosam ferri sanguinem ex dextro ventriculo in pulmones, cujus altera portio in pulmonem nutritionem cadat, altera vero magis in pulmonibus alterata, cum aere attracto & commisto, per Arteriam venosam in sinistrum ventriculum, pro spiritus & sanguinis vitalis & nutritione & generatione deferatur; quæ sane opinio alias placuit. Sed philosophantibus hæc relinquimus, cum nobis propositum sit, veram partium structuram, earumque verum usum, quantum Deo concedente assequi possumus, persequi.

An vero ventriculi cordis in cono interdum intervallo quodam dividantur in homine, quod Galenus * in galli corde notavit, quod binos vertices habebat, dubium est.

Ad cordis basin seu caput, utrinque appendix [t. 5. f. 2. I. K. t. 10. f. 3. B. E.] una adnascitur, quæ non ab ¹ utilitate aut actione aliqua, sed à parva similitudine, quod utrinque cordi ipsi, ut animalis capiti aures adjaceant, ^m Auricula, ὠτίον ὡς τοῦ εἰδὸς dicitur, cum ex longa basi in mucronem obtusum desinant; quæ circa ventriculos ante ¹ orificia

I De sanguine ex quo fiat vitalis spiritus, opiniones plures.

I. Gal. Piccolom. Laur. ferri ex dextro sinu per septum in sinistrum quem transitum etiam A. verr. 1. coll.

agnovit Vesalius p. 746. fatetur se ignorare, quomodo per septum propter ipsius crassitiam ex dextro in sinistrum vel minimum quid sanguinis assumi possit.

II. Columbi & Plat. sanguinem in dextro attenuari, & per venam arteriosam magnitudine & crassitie Aorta aequalem, in pulmonem deferri, ut ibi preparatus per arteriam venosam purior in sinistrum ventriculum refundatur.

III. Botalli, ferri per ductum à se inventum, qui à dextra auricula in sinistram feratur, qui in vitulis & junioribus reperitur, in homine & provecioribus animalibus non ita patere. Rioli. est anastomosis altera vasorum factus, quæ tanquam necessaria ad ultimum vite spiritum manet: valvula enim hac semper hiulca, qua leviter sublata scalpello foramen exiguum apparet.

IV. Ulmi: Sanguinem arteriosum in liene percoqui, attenuari, preparari, deinde in Aorta truncum, & ab eo in sinistram Cordis ventriculum ferri, ubi cum aere in pulmonibus preparato misceatur: (an non valvula hoc impediunt, quas ille male trisulcas appellat.)

V. Varoli, qui ait, nullum unquam demonstrasse, quomodo hic fiat transitus, & nullam realem viam extare. Arterias dicit plurima copia intestina adire, ut portionem chyli purissimam ad sanguinem arterialem generandum idoneam exsugant, & ad cor deferant, qui sanguis cum in sinistro cordis ventriculo generetur, & nullus sit transitus à dextro in sinistrum cordis sinum, dicendum, materiam ad hunc desumi ab intestinis, & per arterias recta ad cor ferri.

VI. Marcati 1. puls. tr. 2. ex tenuissimo sanguine per arteriam venosam in cor deflexo, quem sanguinem suspicatur ex vena arteriali per resudationem in pulmonis substantiam transmissum esse, ibidemq; elaboratum, ea tenuitate quæ sufficiebat conversioni in spiritum substantiam in corde ipso, postquam simul cum aere in sinistro ventriculo receptus fuit: verum etiam ex eo sanguine, qui ex dextro ventriculo in sinistrum commigravit, licet crassior sit, facile tamen arteriosus & spirituosus sanguis fieri potest.

* 7. ad. an. 11. idcirco quidam in certis animantibus cor duplicatum reperiri scripserunt. Plin. 11. 6. 37. perdices in Paphlagonia duplici corde, vide Rhodiginum.

m Hipp. de Corde. Gal. 6. us. part. 15. 7. ad. an. 9. at 8. Cordis processus vocat: partes cordis Herophilus 7. ad. an. 11. At Hippocrates ex aliorum sententia aures vocat, nam lib. de sacro morbo ridet eos, qui aures appellant, cum non audiant, & Gal. 6. us. part. 15. temere sic nominatas dicit.

ficia vasorum, quæ materiam ⁿ Cordi invehunt, locata sunt: dextra [tab. 5. f. 2. I. ^{n Gal. 7. ad. an. 9. as non esse auricularum & cordis eundem motum volunt. Cor enim quia distenditur, impletur: at aures quia implentur distenduntur, quod facite indicasse Hipp. videtur, dum ait: Cor tota sua natura agitur, at aures privatim tum intumescunt, tum concidunt, sic & in vivorum sectione, auricula etiam deficiente cordis motu aliant, & moventur, Gal. 7. ad. an. 15. o 7. ad. an. 8. dicit Piccolhom. membranas appellari, videri samentendinosas: nam cum cor musculus sit, suum tendinem habere par fuit: vel certe sunt ligamenta. Hipp. uel. 2. de anat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191}

De Vasis consule 6. us. part. 10. & 11. 7. adm. an. 6. de Valvulis 6. us. part. 11. 14. 7. adm. an. 9.

a Gal. 7. ad. an.
 6. Varolus: in
 singulis qua-
 tuor vasis duo
 motus contra-
 rii sunt, quæ
 quatuor vasa
 maxima à basi
 cordis nascun-
 tur, & eorum
 primum prin-
 cipium cor est.
 b 6. us. part. 11.
 & 14.
 c Vesal. & Va-
 rolus.
 d De Cordo.
 e 6. us. part. 14.
 7. ad. an. 9.
 f Gal. 6. us.
 part. 8. & 19.

g Id ostenditur
 6. us. part. 15.
 & 20.
 h Piccolhom.
 & Laur.
 i eorum aut Gal.
 6. us. part. 11.
 & 15. ut ad un-
 guem simul ac
 celeriter os om-
 ne patefieret ac
 rursus clauderetur,
 membranas
 cuique tres
 effecit: ac Mer-
 cati non ut ni-
 hil prorsus in-
 cidat, sed ne
 melum, neve
 simul ac subito.

Vasa^a quatuor, totidemque^b orificia circa Cordis basin in eminentiore ventri-
 culorum sede observantur, quorum ortum à Corde pendere nonnulli^c volunt:
 Sunt autem in quolibet^b duo quæ Hippocrates^d humanæ naturæ fontes vocat:
 haud dubie ad imitationem magni mundi, cum universum terrarum orbem quatuor
 magna flumina, Nilus, Tages, Tygris & Euphrates irrigent. In dextro venæ duæ,
 vena cava [t. 5. f. 2. F. t. 10. f. 1. C. f. 2. NN.] & vena [t. 5. f. 2. G.] arteriosa: in sinistro Ar-
 teriæ duæ, Arteria [tab. 10. f. 2. G. H. non recte expressum] Venosa & Arteria [tab. 5. f. 2. H.
 t. 10. f. 1. H. f. 2. O. P.] magna. Hæc vero quatuor vasa eo modo disposita sunt, quo in
 toto corpore locantur, in quo non vena venæ jungitur, sed vena arteriam comitem
 habet: Sic & horum duo, licet ejusdem naturæ & officii & ab eodem ventriculo
 prodeant, proxima tamen non sunt, sed alternatim sita, ita ut venis arteria interjicia-
 tur: quare Venæ cavæ, Arteria magna adjacet, huic vena arteriosa & tandem Arte-
 ria venosa, quæ nisi cor dextrorsum invertas, non conspicietur. His intus Valvulæ
 seu ostiola, quæ Hippocrati^d pelliculæ cordis latitantes, Galeno^e *Operves* & mem-
 branarum epiphyses dicuntur, undecim numero, ex ipsis^e orificiis ortæ, adponun-
 tur, quarum aliæ tricuspidæ, aliæ semilunares: & harum aliæ^e ab exteriori intro in
 Cordis ventriculos feruntur, ad quos etiam Ligamentis^f fortibus ad septum, maxi-
 me versus mucronem, adnectuntur, quo in dilatatione cordis ligamenta tensa, tra-
 hant ad se & velut resupinent Valvulas, ad cordis corpus: aliæ ab interiore situ foras
 vergunt, cum primum utrumque vas è corde prodit, vasis quidem materiam intro-
 mittentibus fortiores & simul & majores iis, quæ ad educentia sunt, quanto major in
 dilatando quam contrahendo vis est: majori enim vi cor dilatatum attrahit, quam
 contractum expellit. Omnes vero in cordis dilatatione extenduntur, in qua trifidæ
 h veluti fissuras inter sua filamenta interjectas efficiunt, per quas fissuras materiæ in-
 vehuntur: Sigmoides vero, extrema suorum vasorum prorsus claudunt, & materias
 egressas remeare prohibent. At in contractione omnes contrahuntur, & tum trifidæ
 cæ spatia inania, quæ dilatatæ efficiebant, claudunt, & materiarum regressum impe-
 diunt. Sigmoides vero flaccescentes fissuris committuntur, quo libere sanguis &
 spiritus egrediantur: & harum primus Hippocrates meminit, & tanquam mirificum
 naturæ arcanum extollit. Omniumⁱ autem tale artificium est, ut si tensæ simul fue-
 rint, steterintque erectæ, totum orificium obstruunt. Communis vero omnium
 ipsarum usus est, ut materias remigrare retro prohibeant: at proprius, earum qui-
 dem quæ intus^k foras feruntur, & materias è corde educunt, ne amplius ad ipsum
 remeant: inducentium vero & quæ foris intro feruntur, ne amplius contra ex ipso
 effluant: idque ne cor vario labore fatigetur. Tres autem creatæ, quia alius nume-
 rus nullus, celeriter simul ac fortiter atque exacte orificia aperire ac claudere possent.
 Si namque membranarum sinus duo magni essent, neque ad amissum neque celeri-
 ter orificia ipsa claudi aut aperiri sinerent. Quod si tribus plures existissent, multo
 quidem

quidem celerius atque exactius ob sinuum parvitatem prædicta duo efficerentur: necessario autem ob hanc ipsam parvitatem everterentur facilius & imbecilliores redderentur. Quia ergo Arteria venosæ orificio intererat, ne ad amissim clauderetur, idcirco ejus orificio duæ tantum membranæ adnatæ sunt. Verum cum horum vasorum alia sit in corde fœtus in utero contenti, alia vero hominis jam utero exclusi constitutio, de his primo agamus.

Vena cava diaphragmate [*tab. 10. f. 1. D. f. 2. NN. transitus vene ostenditur.*] perforato & ad cor delata, ramo brevi à sinistris emisso, amplo patenteque orificio [*t. 10. f. 1. a C. ad B.*] & quidem aortæ orificio vel triplo majore, ab auricula dextra excipitur, moxque dextro ventriculo [*t. 10. f. 5. CC. orificium ostendit.*] inseritur, cui ita firmiter adhæret, ut ab eo separari non possit: (quare inde nonnulli cavam [*t. 10. f. 1. C.*] omnesque venas exoriri voluerunt) & propter robur Cordis ramus hic ligamentosus redditus est: cujus rami usus est, sanguinem ab Hepate sursum delatum, ad ventriculum dextrum deferre, quo in eum, dum Cor dilatatur, effundatur. Venui foramini venæ cavæ ab hepate ascendenti, quam primum hæc in dextram auriculam degenerat, Membrana artificii & admirationis plena, præfecta est quæ illius anteriorem & dimidiatam partem occupat, & deinceps reticulum efformat, quemadmodum Eustachius notavit [*vide in append. t. 8. f. 1.*] At ejusdem venæ cavæ orificio, in ipso Ventriculo, membranæ circulus [*tab. 10. f. 5. HH.*] Cordi robur præbens adnascitur, qui introsum procedit, & non procul à principio in tres valvulas seu membranulas [*tab. 10. f. 5. K. L. M.*] janitrices validas scinditur, quæ ex ampla basi in obusum mucronem desinunt, & cum clauduntur, invicemque connivent, cuspidum telorum eminentiis atque angulis (quos Græci *γλωχύνες* dicunt) triangularibus, vel quia spiculorum sulcis similitudine respondeant, *τρυγλῶνες* trifurcas & tricuspides P nominarunt, quæ pluribus filamentis [*t. 10. f. 1. NN.*] seu fibris (quas Aristoteles nervos vocavit) simul junctis carneis explantationibus [*tab. 10. f. 5. OO.*] accrescunt, ut ab iis tantum ligamenti in cordis compressionibus tendantur, quibus tensis orificium penitus clauditur: at circulus hic apertus cum suis fibris, coronam qualis Regibus antiquitus imponi consuetum erat, quodammodo refert. Hæc dextro ventriculo transversim inciso & sectione recta versus orificium venæ cavæ facta, trib. (aliquando pluribus) carneis productionibus infixæ conspiciuntur. Et hæc, ut & Arteriæ venosæ, fortis intro spectant, ne sanguis in Cordis contractione in cavam regurgitare possit: quomodo ergo statui potest, sanguinem pro totius corporis nutritione in corde laborari, cum ex ventriculo in cavam sanguis offundi non possit, sed in pulmones: quare necessum foret ex pulmonibus dari viam in Cavam, unde rami in totum corpus spargerentur.

Ff 2

Alte-

3. part. 4. his forte deceptus Arist. qui filamenta hæc nervos opinatus est, Columbus. p. Sagittarius & Sigmoeides dicit vult Piccolhom. q. Vesalio.
 1. Columbus dicit has ab interiore seu foras ferri, quemadmodum & Arteria venosa ut sanguinis emissioni serviant: quare à Piccolhom. reprehenditur.
 1. Per cavæ orificium sanguis ingreditur perficiendus, ad omnium partium corporis nutritionem: quare cum major sit copia ejus, quod introfertur, & minor copia egrediasur, quo facilius sit aditus, idcirco membrana ibi præfidentes introsum aperiantur.

Gal. 6. usque pars.
 4. altera pars
 cava in ipsum
 Cor ingreditur:
 altera vero &
 major recta sur-
 sum ad jugu-
 lum fertur.
 in Vesal. pag.
 735. hoc censuit
 at Gal. inseri
 voluit: Colum-
 bus hinc exori-
 ri negat, imo ne
 cor ingredi, sed
 orificio dextri
 ventriculi ad-
 hære. At Pic-
 colhom. cava
 de sinistro pa-
 riete rami
 emittit, quem
 in dextrum si-
 num inserit.
 in Gal. 6. usque par.
 14. 7. ad an. 9.
 telorum cuspi-
 dibus quo Tur-
 ca utuntur,
 Vesalio.
 o Nervulos
 suis in carvis
 continet 1. hist.
 17. nervorum
 copia in Corde
 Sigmoeides dicit

2 *Aliis vena*
arterialis. Gal. *Φλέψ δὲ τῆς αἰώδης*, seu vas arteriosum dicitur; vena quidem ab officio, ^b cum san-
 7. ad. an. 5. guinem venarum modo deferant: arteriosa, à substantia arteriæ ^b corpori simili.
quales arteria Etenim Venæ arteriosæ & Arteriæ venosæ substantia peculiaris est, quæ naturam &
 toto corpore, ta- substantiam aliarum venarum & arteriarum non imitatur: siquidem vena arteriæ, &
 le vas ex dextro arteria venæ substantiam habeat: quam in prima foetus conformatione obtinuerunt,
 cordis sinu pro- quia vena hæc ab arteria magna, ut in foetu munere arteriæ fungatur. Arteria vero
 cedens in totum venosa à cava, cum in foetu venæ officium præstare debuerit, producta cense-
 pulmonem dif- test: Sed foetu in lucem edito, hunc usum in alium commutant, servata substantia quæ
 funditur. à nomine adjuncto significatur, uti plenius cap. 24. explicabimus. Hæc orificio [tab.
 b Gal. 7. ad. an. 10. f. 6. C. D.] minore quam Cava [tab. 10. f. 5. CCC.] ventriculo affigitur, unde eam
 4. vena quia enasci volunt, cum potius aortæ propago ^d dici possit, si ad connexionem, quæ in
 non pulsar: ar- foetu magis conspicua est respiciamus; sed revera una cum aliis spermaticis partibus
 teriosa, quia ex semine ortum ducit. Tunica donatur, non simplici ut vena, sed duplici, [t. 13. f.
 duplici tunica prædicta Piccol. 3. B. C.] quemadmodum Arteria, idque in usum, vel foetus, vel utero exclusi. For-
 c Vesalio, Fallo- tus quidem, ne sanguis spiritusque vitalis maternus, quem in pulmones transvehit,
 pio, secuti Ga- cum in eo munere arteriæ fungatur, transpirat. At in utero exclusis (in quibus non
 lenum, qui 6. arteriæ, sed venæ officium præstat) crassiorem habuit duramque tunicam, partim
 us part. 11. ex quia in respirationibus facile comprimatur ac dilatari non debuit; quod duplici nomi-
 corde produci ne utile fuit, tum ut tota thoracis capacitas spiritus instrumentis pateat; tum ne san-
 air. & arte- guis ex eis violenter ad cor recurrat. Partim ^e cum pulmo (cujus corpus rati sunt ac leve)
 riam venosam sanguine alatur tenui, ac vaporoso, non crasso, neque turbido, tantum tenuissimum elaba-
 cordi infigi sic tur, cum unumquodque alimento simili nutriatur. Deinde ut in hoc moram trahens te-
 & de diff. ven. nuior adhuc efficiatur, & spumiosior sensimque in pulmones excludas cōmode in ipsorum
 2. Columbus nutritionem abeat. Addamus & causam ab Hippocrate expressam, ne dexter ven-
 non à corde, sed tricus, qui sinistro ^{*} minus calidus est, æque ac sinister refrigeretur. Cum enim as-
 à jecore: nam peræ arteriæ rami, qui aerem frigidiorē inspiratum hauriunt, inter Venæ arteriosæ
 dum in utero [t. 13. f. 1. B. C. D.] & Arteriæ venosæ ramos ferantur, quo aer attractus per cæca spir-
 (air) foetus acula communicetur: si venæ arteriosæ tunica ^g esset unica, tantum aeris exciperet,
 continetur, ca- quantum Arteria venosa, quæ unicam tunicam habet, sicque æque uterque refrige-
 ra cum vena raretur, unde dextri tandem calor extingui posset: quare aer solum ad reficiendum
 arteriosa con- dextri ventriculi spiritum intrat. Hæc insignis est, ut quantum ^h pulmonis iustæ
 tinua est (hoc nutritioni propter tunicarum crassitiem detrahitur, id ^h venarum magnitudine ex-
 falsum, nam pleatur: hæc Arteriæ magnæ innitens, & suo caudice sinistrosum inclinans in duos
 cavatum ar- [t. 10. f. 6. C. D. t. 13. f. 3. E. F.] truncos dividitur, qui ad dextrum & sinistrum pulmo-
 teria venosa nem feruntur: hique in varios & innumeros ramos per pulmones [t. 13. f. 3. G. G.]
 jungitur) igit- diff.
 tur quatenus
 vena ab Hepa-
 te, quatenus ar-
 teriosa ex
 corde oritur
 (ergo duplex
 ipsius ortus &
 ab hepate, & à corde: cur ergo dixit, à corde non oriri?) Varolus vena arterialis ex Aorta & arteria venalis ex vena
 magna primum nascuntur: sic & Laurentius. d Piccolhom. quia vena ex vena, & arteria ex arteria enasci debuit:
 proinde in ea conjunctione arteria venosa simplicem tunicam habens originem trahit à cava simplici tunica constante:
 & vena arteriosa ab arteria magna duplicem tunicam habente. Rioli vena in prima foetus conformatione nova produ-
 citur ab aorta: at arteria à cava propagatur.
 c Gal. 7. us part. 8. f. 6. us part. 10. * Arist. 3. part. 5. dexter calidior est. g Varolus ad robur expulsiōis talem tui-
 cam obtinere credit, quemadmodum arteria venosa tenuem, quæ ad attrahendum sua laxitate multum conducatur.
 h Gal. 6. us part. 10.

disseminantur. Hujus usus in Cordis contractione sanguinis majorem portionem ex ventriculo dextro (in quo tenuiorⁱ leviorque effectus, quo facilius impetu feratur) excipere inque pulmones deferre; quo in eorum alimentum cedat: mutuam enim^h gratiam Cor pulmoni referre videtur, cum ipsum sanguine nutrit, idque beneficium ipsi conferens pro spiritu, quem ex illo accipit. Jam vero, quamvis vena hæc crassa & dura facta fuerit, ut non dilatetur facile, nec contrahatur, non tamen adeo dura est, quin à thorace ejus soboles comprimantur & contrahantur, sicque in altera cordis dilatazione per eandem viam^k sanguis in cor relaberetur, nisi

Valvulæ ternæ [t. 10. f. 6. E. F. G.] ipsius candidis orificio, ubi non nihil extuberat ab ipsius venæ tunica^m enata adponerentur, quæ intus foras spectant, & singulæ semicirculum ex æte referunt, ad Gæcorumⁿ signa (unde *αγγμοειδές* dictæ) vel Latrinorum C. literæ similitudinem; hæc si omnes tensæ ac simul^o erectæ fuerint, speciem unius magnæ valvulæ orificium obturantis referunt, & dum tensæ sunt Lunam semiplenam, cum relaxantur, rugosæ fiunt, Lunam quartam tantum parte plenam referunt. Harum, ut & arteriæ magnæ exterior circumferentia, reliquo corpore solidior est, ubi enim in utroque orificio se spatio aliquo coniungunt, ita indurantur, ut interdum cartilagineam teretem & oblongam referant.

Arteria venosa^p quæ *ἀρτηρία φλεβώδης* & sinistra ventriculi [t. 10. f. 2. G. H. non expressum t. 13. f. 1. D.] vas est: Arteria dicitur ab officio, tum quod aerem contineat & devehat, tum quia pulset; pullare enim, q licet sensu nemo evidenter deprehendere possit, qui tamen sinistro ventriculo continuæ sunt, inde conjecturam aliquis fecerit: Vena^a à substantia, quod venarum corpori respondeat. Hæc ad basin cordis, ex sinistro ventriculo, patenti [t. 10. f. 7. C. C.] & orbiculari orificio (Arteriæ magnæ orificio majore)^t egressa, ex cujus ventriculi molliore sede principium ducere creditur, cum potius ex cava statui possit enata, si connexionem, quæ in foetu conspicitur, perpendamus. Tunica tenui^u & simplici constat: in adultis quidem, quo pulmo alatur^x sanguine defæcato, tenui ac vaporoso ab ipsa manante, qui à corde in pulmones fertur quo plurimo egent: & ratione motus perpetui, illum plurimum diffundantis: & ratione laxæ substantiæ: dein quo facile spiritus (seu copiosior aer) cordi trahenti obsequatur, facileque penetrare possit, qui ex asperæ arteriæ ramis per ejus cæcos meatus ad sinistri ventriculi æstum & calorem temperandum, spiritumque innarum alendam defertur; siquidem in adultis munus arteriæ, non ut in foetu, venæ subeat: & rursus fuligines facilius in asperæ arteriæ ramos propelli possint. In foetu vero, cum sanguis alimentarius à cava in fertur pro pulmonum nutritione, unica tunica satis habebat. Vas insigne est, quod statim ab egressu è corde in duos truncos [t. 13. f. 4. B. B. C. D.] dividitur, ita ut geminum quasi orificium constituere videatur: hoc dextrumque dexter sub cordis basi in dextrum pulmonem [tab. 13. f. 1. D.] sinister in sinistrumque dextrum venæ arteriosæ diffecatur per pulmones disseminantur & radicem^z imaginem [tab. 13. f. 4. E. E. E. E.] ostendunt; possit & venæ portæ^a assimilari: nam ut hæc

Ff 3;

suis

i Elaboratus
pro pulmone,
Vesal. in hoc sinu
attenuatus sit idoneum pabulum pulmo-
ni, Piccolhom.
k Non ita accu-
rate id præstat,
ut nihil prorsus
in primo retra-
ctionis impetu
rursus in corde
stuat, Vesalius.
l 6. us. part. 10.
m Fallopio, qui
duas tantum
tribuit.
n Gal. 6. us.
o 6. us. part. 11.
p Gal. diff. ven.
q ubi vena por-
ta assimilatur
7. ad. an. 4. arte-
ria venalis, Ve-
sal. Columb.
Varolo.
r 7. ad. an. 4.
s Galenum re-
prehendit Vesal.
quod 6. us. part.
contrarium vo-
luerit.
t Gal. 6. us. part.
u. vas quod tu-
nica simplici
constat, in cor
infigitur. Pic-
colhom. sinistro
ventriculo af-
fixa.
v Vesal. & Plas-
u diff. ven. 9.
x Piccolhom.
y 6. us. part. 10.

Y 7. us. part. 8. verum in 7. ad. an. 4. ostendit, Erasistrati sectatores vacuas sanguine, quemadmodum & reliquas arterias ita ex pulmone statuisse & in una quaque cordis elevatio per eas ex pulmone trahi asseruisse, & in hujus trans-
itu fieri pulsum, ei, qui per omnes arterias toto corpore editur, proportionalem. z diff. ven. & arter. 1.
a diff. ven. 9.

luis extremis ceu radicibus quibusdam cibum exsugit: Sic arteria venosa, propter usum commoditatemque spiritus attrahendi, in pulmones derivatur. Verum ad originem hujus & aortæ, occurrit utriusque vasis conjunctio, intercedente satis magna & crassa particula, quæ in fœtu perforata erat, & canalem constituēbat, ut postea dicitur. Hujus usus in cordis dilatatione ex pulmonibus ^b aerem attrahere pro spirituum generatione: in contractione vero, sanguinis vitalis portionem in pulmones pro eorum nutritione vitæque, una cum fuliginibus expellere. At ne totus aer in pulmones remeet, ad orificium hujus vasis, membranens [t. 10. f. 7. DD.] circulus ex cordis substantia enascitur, qui introrsum ducitur, & in Valvas duas [t. 10. f. 7. E. F. t. 11. f. 2. r.] foris intro ^c nutantes dividitur, quæ & magnitudine venæ cavæ valvas superant & in obtusorem cuspidem desinunt, sicut & robore quoque & filamentis [t. 10. f. 7. GG.] longioribus & plurimis carneis [tab. 10. f. 7. HH. t. 11. f. 2. ff.] explantationibus (quæ hic binæ tantum & crassiores ac solidiores quam in dextro existunt) accrescunt, quorum alter dextrum, alter sinistram latum respicit, quæ junctæ mitram Episcopalem ^d referunt.

^b Anatomici parum prudentes aerem alteratum ad pulmones ferre volunt, qui flammæ instar ventulum cordis faciat, idque refrigerat, non Cerebrum, ut Aristoteli visum est: existimant fieri in corde, quod in caminis assolet, quasi in corde viridia ligna existant, quæ dum cremantur, fumum edunt. Credo sanguinem cum aere a pulmonibus mixtum afferri ad sinistram ventriculi, siquidem in vivis & mortuis arteria hac sanguis.

ne referta invenitur, quod non foret, si ob aerem duntaxat & vapores constructa foret: hac Columbus. Vesalius aerem ex pulmone in sinistram ventriculi deferendo purissimum famulantur. Verum sanguine tenui & spirituosissimo repleta pulmone, & idoneum suppeditat sanguinem, supplet id quod rigida vena arterialis pulmone denegabat. Fallopio aerem a pulmonibus ad cor refrigerandum & fuligines tanquam per caminum cor in pulmones expellit. Varolo, ingreditur aer ad generandum spiritum totius corporis: egreditur sanguis ad indigentiam pulmonis, nec non fuligo quedam ritus portionem in pulmones diffundit.

c Gal. 7. ad. an. 11. at Columb. contrarium censuit. d Figuram nemo Anatomicorum cuius rei assimilare est ag- gressus, 6. us. part. 14. Vesalius mitra assimilatur, addens, quomodocumque connivere singas τεγλδρως cum Galeno c. tantum due sint: unde colligitur errorem esse in textu priori Galeni.

e Gal. 6. us. part. 14. & 15. & 3. nat. fac. 13. in fin. at Riol. bina. sapius terna apparent.

f Galen. 6. us. part. 14. & 15. idem voluit Vesalius, Fallopius, Piccolhom. Varolus & Laurentius: Columbus videt.

ostium ramus insignis supra pulmonem sinistram ferebatur, & reflexus secundum Arteriam magnam latus sinistram descendens, sub diaphragmate in emulgentem implantabatur. Quæ via diligenter notanda, per hanc enim pulmonis vomica per urinas evacuari censimus, pure ex pulmonibus, (non enim in cordis ventriculum delato & inde per magnam arteriam educto & ad renes evacuato, ut Galenus § vo-
luit) recta in arteriam venosam, & inde per ejus ramum in emulgentem deferri & per renes in vesicam transire. Vel etiam in Arteriam Mesentericam ferri, ^h in intesti-
na effundi & per alvum evacuari poterit. Hoc equidem non ita crebro & evenire
videtur, quia priusquam id fiat, pus magna ex parte prius in Arteriam asperam ramum
transmittitur. Alterum sinistri ventriculi vas Arteria est magna, de qua etiam in ge-
nere libro secundo universalis nostræ Anatomies, qui de partibus similaribus agit,
dictum fuerit, quo Lectorem relegamus, hic tamen pauca quædam ad propositum
requisita subiiciemus.

g 6. loc. aff. 4.
cum nonnulli
causam igno-
rent, neque id
unquam acci-
disse viderint,
quod à multis
visum est, ne-
gant fieri posse,
quod ab cessu in
pulmone orto.

per renes expurgari possit. Nos vero pulmonis vomica per urinas: thoracis autem per intestina & alvum ex-
purgari volumus: max. subiungit: latus arteria pulmonis, quantum puris erupta vomica suscipit, id in sinistram cor-
dis sinum deferre potest, quod inde in magnam ipsius arteriam incidens, per renes transit in vesicam.
h At 7. aph. 30. in com. Si quid à capite desit ad asperam pulmonis arteriam, ut nonnulli volunt, permeat ad inferiora:
primum ad ventriculos cordis ipsum pervenire oportebit: post hoc duorum alterum eveniet, aut primum per venam
cavam ad gibba hepatis, dein illinc ad cava & ita per portas ad intestinorum involucria. Aut primum quidem ad ma-
gnam arteriam, deinde sic ad illam quæ est in Mesenterio.

De Arteriis in genere.

CAPUT XXIII.

De Arteriis egit Galenus lib. de diff. ven. 9. 1. plac. 7. 6. ejusd. 9. de earum tunicis 7. adm. an. 5. 6.
us. part. 11. de off. 6. us. part. 19. 7. adm. an. 10. Arist. 3. part. 4.

Arteria, quæ ἀρτηρία ὁρᾷ τὸ πῦρ ἀεὶ ἐκ τοῦ αἵματος, quod aerem sive spiritum con-
ferret, dicitur. Hippocratis, ^b Platonis & Aristotelis ^c tempore sic nominaba-
tur fistula, quæ ex ore in pulmones descendit: & aerem per nares & os inspiratum
defert, & per quam denuo expiramus, quæ à Galeno & posterioribus Aspera arteria
vocatur. Nunc vero per Arteriam, vas, quod vitalem spiritum & sanguinem contri-
bet, intelligunt, de quo nobis sermo est. Hanc vetustissimi, ut Hippocrates ^d venam
quam micare ^e seu palpitare dixerunt. Aristoteles, modo ^f venam minorem, venam
Cavæ comparans: modo venam & Aortam: modo simpliciter ^h Aortam vocavit.
Postiores ut distinguerent, illam ἀρτηρίαν τελεχέαν, hanc ἀρτηρίαν κείαν, ⁱ arte-
riam leuem (quæ etiam Hippocrati ^k Arteria parva) nuncuparunt: nonnulli, quo à
venis sanguinem naturalem continentibus distinguerent, venas pulsatiles (quem-
admodum Arabes ^l Nervos pulsatiles) vocarunt. Quare ubi apud veteres, qui ante
Gale-

a Vel δὲ ἀδω-
duy, id est, salu-
re, quasi ἀδω-
ειαν dicas: vel
πᾶσι τὸ αἷμα
quod est attol-
lere.

b de corde, ubi
arteriam ma-
gnam vocat.

c de respirat.
11. 1. hist. 16. 2.

d ejusd. 15. 3. part.
3. 11. probl. 22.

e de carnib. lib.
de aere, aquis

f Ruff. 1. de parr.
Quemadmodum

Et loc. 2. epid. idem restatur Gal. 7. plac. 9. nonnulli Arabibus vena audaces, alii vena pulsatiles. c Ruff. 1. de parr.
3. 4. f 3 hist. an. 3. g 3 part. an. 7. h 1 hist. an. 17. & 3. ejusd. 3. i Gal. 7. adm. an. 4. k de corde. l Quemadmodum
Et 7. aph. 30. Arist. 3. hist. 4.

Galenum scripsere, Arteriæ vox simpliciter occurrit, de aspera arteria: quemadmodum si apud Galenum & qui eum secuti sunt, legatur, de levi Arteria intelligere oportet. Sunt autem ternæ ^m Arteriæ, quæ cæterarum omnium radices censentur: prima est Arteria aspera, de qua in pulmonum historia: altera est Arteria venosa, de qua superiore capite egimus: est & tertia, quæ Arteria magna nominatur (ad quam & Arteriæ umbilicales referri debent) de qua nunc agimus.

Est ergo Arteria, quatenus consideratur, ut pars Organica, instrumentum corporis nostri ⁿ commune, oblongum, ^o teres, fistulæque in modum cavatum, ex duabus peculiaribus tunicis fibris ^q intertextis compositum, sanguinem ^r spiritumque vitalem in sinistro ventriculo ex sanguinis aerisque permixtione elaboratum, excipiens, continens, & ad omnes corporis nostri partes, una cum calore vitæ gratia deferens. Substantia est ^q membranosa seu nervea, quo distendi comprimique possit, quod ipsis magis, quam venæ propter motum necesse fuit: duabus ^p peculiaribus tunicis donata: quarum exterior ^p tenuis est, rara [t. 12. f. 3. C.] ac mollis, qualis etiam est venæ tunica, ex multis rectis ^p fibris ac quibusdam obliquis, transversis nullis contexta. Interior altera [t. 12. f. 3. BB.] crassitie ^p fere quintupla, ^r densa ac ⁿ dura, (partim ^x ne sanguis arteriosus & spirituosus, cum tenuis sit, ^x purus ac vaporosus, spiritusque vitalis evanescat: partim ne ex continuo ^v motu diastole & systole, quam à corde, tanquam à principio dispensationis accipit, frangatur) in transversas ⁿ fibras dissoluta, quo per arteriarum actionem seu motum, citissime & sanguinem & spiritum vitalem in totum corpus distribuat: has enim ⁿ solas & quidem plures interior tunica obtinet. His duabus Galenus ^z aliam, quæ tunicam mentitur, addit, quæ in interna superficie telis aranearum [t. 12. f. 3. AAA.] per similes, & in magnis Arteriis circa originem maxime conspicua est. Quamvis ^z etiam in imo ventre, à peritonæo: contegit, aut firmat, aut vicinis partibus connectit, qua tamen arteriæ illæ, quæ per viscus aliquod feruntur, destituuntur.

Verum & sensu carent ^{aa} Arteriæ non secus ac venæ, sive illas frangere, sive urere, sive incidere, sive laqueis excipere velis. Quod forte factum à natura, ne aliquando motibus nimis defatigatæ laberentur, ac ex nimio mali incumbentis aut motus sensu subsiderent, sic ne venæ quovis pondere defatigentur.

Arteria magna, quæ aliquando ^a μεγάλη, aliquando simpliciter ^a μεγάλη magna quia amplissima existit: aliis παχέα ^a crassa ^a ὀρεή, Aorta ^b Aristoteli dicitur: quæ omnium reliquarum arteriarum mater est (aspera, venali & umbilicali excepta) & communis veluti ^a caudex existit, ejusque nomine maxima vocat^r. Hæc, antequam cor ^c formatum esset genita fuit, ^d & principium habet aliud ^d γενέσεως, originis semen ipsum, ex quo immediate fit, cum eodem tempore cum reliquis spermaticis genita sit: aliud δυνάσεως ^z πρῶσεως dispensationis & radicationis, ipsum ^e cor & quidem

seu cartilaginea dicitur. ⁿ Gal. 6. us. part. II. 7. ad. an. 5. ^x 6. us. part. 10. ^y 6. us. par. 17. ^z 7. ad. an. 5. hanc aliqui dicunt à Cordis tunica produci, si ad sit. Riol. si intra thoracem dissecas, in tres pelliculas crassas dividere poteris, quarum interna mollis ac membranosa, altera durior, tertia ^z externa crassissima est ac veluti cartilaginea. ^{aa} 16. us. part. ^a Gal. 7. ad. an. 1. & diff. ven. 9. ^b Ut Galenus diff. ven. 1. testatur. ^c Gal. de form. fœtus. ^d Gal. 1. sem. 5. & 11. vide caput 39. partis 2. libri nostri de partibus similaribus. ^e Hipp. de aliment. εἰς οὐκῆς venarum, hepar: arteriarum, cor. Ex corde prodeunt arteriæ Hipp. de cord. ac carnib. Plato. Arist. 3. hist. 4. Gal. 6. us. part. II. & 22. II. ejusd. 16. ejusd. 2. 6. plac. 6. diff. ven. 1. an. sanguis in ar. 2.

dem ipsius sinistrum ^f ventriculum; unde patente orificio prodit, quo ex eo, dum constringitur, sanguinem spiritumque vitalem in sinistro ventriculo elaborata, cum calore in totum corpus distribuendum recipiat. At ne in Cordis dilatatione in ventriculum remeant, ejus orificio [t. 10. f. 8. A.]

Valvula [tab. 10. f. S. B. C. D. 1. 2. 3.] tres ⁸ *συνπυκνωθεῖς*, intus foras vergentes, quemadmodum etiam in vena arteriosa adposita, quæ tamen majores & validiores, cum & Arteriæ magnæ corpus, ipsius venæ arteriosæ durius sit: hæ etiam impediunt, ne alimentum ^h ex intestinis ab arteriis mesaraicis attractum, chylum nimium, quem non principale alimentum Hippocrates ⁱ vocat, in cor feratur. Verum & ipsius orificio stabilimenti ^k causa, substantia dura, nonnunquam ^l cartilaginosa [t. 10. f. 8. SS.] in quibusdam animalibus, ut cervicibus, ^m exacte cartilago nonnunquam in majoribus animalibus & cartilago ossea adposita est: rarius n. ita indurescit, ut revera os sit, quale os in elephanto ⁿ dari Galenus asserit: at tale in homine non reperitur. Arteriæ autem magnæ rami in totum corpus distribuuntur, & venæ tam Porta [t. 14. lib. 1. docet.] quam Cavæ [t. 12. lib. 2. f. 1. id ostendit.] ramos comitantur, propaginibus tamen minus frequentibus, cum cavæ propagines Arteria non semper sequatur. Venas enim quæ ad cutim abeunt, Arteriæ nullæ comitantur, cum nullibi in cutim conspicuæ emittantur. Sic in substantiam musculorum, raro cum venis disseminantur, sed musculorum superficiei tantum attenduntur, cum & ipsorum sanguis tenuior, & spiritus ab arteriis elapsus, distantiore loca absque arteriæ adminiculo accedere possit.

Ufus arteriæ magnæ ejusque ramorum, dupliciter considerari potest, vel quatenus canales sunt, vel quatenus perpetuo pulsant & moventur. Quatenus sunt canales, triplici de causa partibus sunt tributæ: Primo ^o ut spirituosum vitalemque sanguinem contineant, & per totum corpus distribuant: partim ad perfectam singularum partium nutritionem (cum ex iis ^p partes vicinæ vaporosum sanguinem licet paucum, trahant) partim ad spiritus ^q animalis nutritionem & ^q generationem: nam & ipsius arteriis vis spiritus gignendi inest, sed facultate à corde transmissa, siquidem siquidem natura arterias ejusdem facultatis cum toto viscere participes effecerit, eundemque usum præstent ac ipsum cor, quatenus ^{*} ad spirituum generationem attinet. Dein ut spiritum vitalem devehant, quo hoc affloente, spiritus vitalis partibus insitus foveatur & sustineatur. Tum, ut cum eodem spiritu, calorem & facultatem vitalem in universum corpus assiduo transmittant, quo calor innatus singularum partium foveatur, vitales partium functiones moderetur, atque gubernet, earumque vitam tueatur. Quatenus vero pulsant, triplex quoque earum usus est: primus, innatum partium ^r calorem custodire, quatenus eum ventilant, ne inventilatus sensim languescens extingatur. Alter sanguinem, cum arteriæ venarum sint comites, suo motu commovere, & ne quiescens putrescat impedire, aquarum stagnantium more, quæ facile computrescunt, siquidem sanguis ex Hippocratis decreto, aqua fit. Tum sanguinem, ut è venis in partium substantiam excidat, sollicitare & cogere, quo promptior nutritio fiat. Hic autem arteriarum motus, ^r pulsus dicitur, cujus nominis

Gg

Hippo-

omne quod movetur, movetur super aliquo quiescente, cui innititur, dum movetur. At Aristotelis hæc sunt 3. part. 4. cor sine osse omnium, præterquam equi & cujusdam boum generis, quibus præ magnitudine quasi adminiculum subditum. ⁿ 7. ad. an. 10. quod viscere in minutas partes inciso, inquirere jubet. ^o 8. plac. 8. ^p Gal. 6. us. part. 10. ^q 6. us. part. 17. [†] 6. de plac. ^{*} lib. an. sanguis in art. 1. us. puls. 3. 4. 1. caus. puls. 4. 8. plac. 8. [†] Gal. 1. diff. puls. 7.

f Gal. 6. us. par. 2. 5. & 14. 16. ejusd. 10. 1 plac. 7. diff. ven. 9. at Arist. 3. hist. 3. ex medio cordis sinu.

g 6. us. part. 14. & 15. Fall. vult ob vas magnitudinem tres ei obtrigisse, quia arteriosa vena duas tantum tribuit.

h Varolus vult sanguinem arterialem imperfectum eo deferri per arterias mesaraicas ut ibi perficiatur: quemadmodum enim vena mesaraica

preparant chylum, ut in hepate perficiatur: sic arterias præparare, ut in sinistro ventriculo arteriosus sanguis fiat. i de Corde.

k Arist. 3. part. 4. Gal. 6. us. 1. 19.

l Gal. 6. us. part. 19. 7. ad. an. 10. idem quod p. 15. m Piccolhom.

ait in cervis, dama, ostan. quam basis: in corde boum os insigne, cor adharec, & innititur: quoniam Aristotele scribente,

mo-
por-
ima
a fu-
Ar-

po-
bus
que
xci-
de-
ffit-
bus
iam
ullis
ura,
sus,
nam
bras
piri-
rior
z in
cir-
co:
eam
per

ere,
ndo
nsu

gna
que
&
nam
se-
ge-
qui-
em

cor-
mol-
l. 7.
39.
orde
dis.

*Gal. 1. diff.
pul. 2.*

*u Hipp. Gal. 3.
presag. expul.*

*3. de us. part. 6.
2. rat. vict. 42.*

*1. causis puls. 4.
3. fac. nat. 14. 1.*

*us. part. 16.
x Erasistratus*

*primus hujus
opinionis fuit,*

*quem Avicen.
secutus est, cum*

*pluribus aliis:
at Gal. 4. diff.*

*puls. 6. hanc
opinionem dam-*

*nat. et Hero-
philo subscribit.*

*y de spiritu.
2. de puls. ad ty-*

*ron. 1. de us.
puls. et 7. ad.*

*an. 1. ait cordi
pulsandi modo*

*respondere.
2 Gal. 3. presag.*

*expul. 3.
b 6. us. part.*

*et 3. presag. ex
pul. 2. una est*

*contentio qua
distendit cor et*

*arterias: idem
introd. puls. et*

*1. us. puls.
†† 7. ad. an. 14.*

*c 8. plac. 8.
d Gal. 6. us. par.*

*21. in arteriarum
diastole à venis*

*aliquid attra-
hitur.*

*e 5. us. part. 2.
et 6. ejus. 10.*

*et 7. 3. fac. nat.
15.*

*f Gal. 18. us.
part. 14.*

*† 5. us. part. 2.
g lib. de us. puls.*

h 7. metab.

Hippocrates * primus auctor fuit, qui dilatatione * & contractione absolvitur, & ipsis arteriis insitus non est, sed à corde u in eas influit: quod ostendit pars arteriæ vinculo intercepta, ubi pars vinculo subjecta motum non habet, ablato vero vinculo motus redit: cordi enim & arteriis facultas vitalis non eodem modo inest: nam cordi ingenta est, arteriis nequaquam, sed à corde promanat, haud secus quam lux solis radiis inest. Verum hæ non contra, at cor, ut Erasistratus * voluit, moventur, sed simul cum corde dilantur ac constringuntur, ut recte Herophilus, Aristoteles y & Galenus z docuere. Eodem prorsus modo moveri debere, siquidem utriusque partis usus, calorem nativum moderari, spiritum vitalem producere & per universum corpus deducere. At in hoc differt quod Cordis motus a major, celerior & vehementior sit motu arteriarum: quod tali experimento b comprobatur, si applicetur manus dextra regioni, Cordis & sinistra manus carpo adponatur, tunc enim observare licebit, idemne sit, an contrarius motus. Nec est quod quis existimet, Cor & arterias se impedire trahendo & expellendo: nam licet cor in arterias expellat, has tamen ad recipiendum dilari necessum non est, neque contra: quia simul cum cor expellit, etiam arteriæ expellunt in suos ramos & in alia omnia membra & extra corpus. Verum & vivi animalis †† sectio veritatem docebit. Accedit quod arteriæ non vi propria dilantur, sed vi à corde distributa: sic facultates non operantur, nisi quatenus in actu sunt: jam vero vitalis facultas non potest simul in actu dilatationis & contractionis esse, id enim potentis naturaliter agentibus omnino repugnat: quare cor & arterias simul dilari & contrahi necesse est. Sed de hac re plenius d. Cum fuit in synopsi nostra, quam de pulsib. scripsimus, sic & lib. 2. de part. simil. par. 2. cap. 40. Dum aut contrahuntur, spiritum vitalem in omne corpus validius propellunt, & c. fuliginosa fumosaque excrementa ex humoribus enata, quæ calorem suffocare possent, exprimendo expellunt. Dum dilantur, spiritum à Corde tanquam novam materiam rapiunt, quem in contractione singulis partibus communicant, ut caloris sit vehiculum & sanguinem naturalem à vicinis venis ad sui nutritionem assumunt, d & id per oscula, quæ sunt inter venas & arterias, quas in toto corpore e convasa- pædru dixit Galenus: cujus etiam nomine simul f ducuntur ubiq; (nisi quid † ma- libro superiore dictum fuit) non tam tutelæ gratia, quam ut motu suo venas ad effundendum sanguinem cogant, & vas sit conspiratio quædam ac materierum commu- nio, quo illæ his spiritum & vitam, hæ illis per meatus angustissimos sanguinem sub- ministrant: partim etiam, ut membrana, quibus venas protegit, ac partibus vicinis alligat, protinus arteriis quoque sint usui: verum etiam per poros aerem, quo calor ventiletur, allicere volunt. Quare ut Galenus, g per hos transitus arteriæ dilatata ex venis trahunt, contractæ contra in eas rejiciunt, sicuti nimirum per ora, quæ in cutem finiuntur, quidquid halituosi fumidive excrementi habent, id excernunt, at ex aere nos ambiente non exiguum portionem in se recipiunt. Atque id est quod Hipp. dixit, totum corpus foras introque spirabile esse: quam sententiam confirmavit, docens ex larga sanguinis profusione post venam sectam, arteriarum etiam spiritus dissipari: & ex plurimis arteriis discissis etiam totum sanguinem effundi. Ex his quæ aliquot capitibus fuere proposita, satis cordis utilitas patet. In genere tamen usus cordis est, vivendi ministerio præesse: hinc Galeno h maxima est cordis officii dignitas, at-

ras, atque agrotantibus maxime omnium necessaria: quem usum ut præstet id peculiare obtinuit, ut spiritus generet ac facultatem quandam obtineat, quæ cor & arterias distendens & contrahens, facultati, cui munus prædictum incumbit, mini- i 2 de præf. præf. strer.

De vasorum Cordis in fetu unione, quæ in lucem editis aboletur.

CAPUT XXIV.

Structuram hanc expressit Galenus 6. us. part. 20. & 21. potissimum 15. us. part. 6.

CUM structura Cordis eorum, qui in lucem editi sunt, à structura foetuum in utero adhuc contentorum, ratione vasorum (tam in brutorum genere quam in humanis foetibus) differant, qualis ea in his sit dicendum venit, quam Galenus manifestissime & perfecte explicavit, a et si post Galenum plerique Anatomici b sicco pede transferant, quam ab annis triginta octo in nostris Anatomis publicis, maxime vero privatis singulis annis demonstrare consuevimus, & de his ante annos viginti octo scripsimus.

Quatuor esse Cordis vasa superius dictum fuit, duo quidem in dextro ventriculo, Vena nimirum cava [t. 11. f. 1. 2. 3. a. b.] & vena arteriosa [t. 11. f. 1. m.] duo vero in sinistro, Arteria scilicet magna [t. 11. f. 1. 2. & 3. d. f.] & arteria venosa: [t. 11. f. 1. 2. & 3. quæ in secunda figura aperta est.] quæ vasa in foetu ita ununtur, ut bina conjungantur; Vena cava dextri ventriculi vas, cum Arteria venosa sinistri ventriculi vase; & vas sinistri ventriculi Arteria magna, cum vase dextri ventriculi, Vena arteriosa. quæ in adultis à se invicem juncta sunt. Hæ autem uniones eodem modo non sunt: Illa enim partim propter viciniam, partim propter substantiarum similitudinem, anastomosi, id est, oculorum conjunctione perficitur: hæc vero propter intervallum, quod inter ipsa est, per canalem efficitur. Prima unio, quæ per Anastomosin c seu apertionem duorum vasorum invicem fit, est Venæ cavæ cum arteria venosa [t. 11. f. 1. & 2. a. g.] quæ sub dextra auricula cordis, priusquàm Cava in dextrum ventriculū se aperiat, [t. 11. f. 2. ad h. apparet.] & prope regionē eam, qua Vena coronalis oritur, observatur. Cum enim se mutuo contingant, ut facile unicum vas esse putes, foramen d utrique commune

Gg 2

caus enim sum quandam turbulentem & omnia quæ in domo erant dimoventem ac miscentem, cum aureos vestigaret, quos ipse chartula quadam involutos, altera manu tenebat, &c. b Vesal. in suo opere hac solum habet pag. 696. in sectione foetus: nisi visum sit hic una inquirere, num in foetu peculiaris aliquis processus à vena cava ad arteriam venalem, & ab arteria magna in venam arterialem pertineat. Columb. hac habet dum in utero matris latitat foetus si ejus cor introspicimus, comperiemus cavam venam cum vena arteriosa continuam esse. Fallopius, in obser. meminit canalis vel arterialis circa basin cordis ipsi aortæ jungitur: per quem totus sanguis vitalis feratur ad pulmones formandos & nutriendos, dum foetus in utero servatur, mestum arterialem in Embryone vocans. Vesalius à Fallopio in observ. admonitus in sua apologia utriusque meminit, sed utramque per anastomosin fieri dixit: Arantius in prima editione de foetu, utriusque unionis meminit, sed per canalem utramque fieri voluit: sed in altera & tertia editione Galenum secutus, alteram per anastomosin, alteram per canalem fieri dixit. Secutus Joh. Baptista Carcanus in plerisque vestigia Galeni. Sic & Piccolhom. qui acriter Vesalium reprehendit, de in quandam Neotericum Arantii intelligens primam editionem. De his quoque egit Laur. Petrus obiter Rossius & Pinus lib. de not. virg. qui anastomoses vocat: Botallus in calce lib. de Catarrho, meminit ejus quæ à dextra auricula in sinistram feratur, venam arteriarum nutriticæ, vocans. c Fallopius non meminit. d Gal. 5. us. par. 6. Avicenna, pulmo non nisi rubescit in tenello foetu, quia non respirat, & non albescit ipsum nisi aeris inspirati permixtio: sanguine itaq, nutritur rubeo: & ideo factum est à vase in vas foramen, quod ediso animali statim occluditur.

c Memoranda magnitudinis anastomosis, 6. us. part. 20. *f* Carcanus & Piccolhom. reprehendunt eos, qui somnando assingant his vasis membranas alias semilunares, alias sagittarias, alias aliter formatas: quos sen sus refellit. *g* Vesal. apologia sua hunc usum membrana tribuit, ut post nativitatem prompte in serviat foraminis obsegnatio. *h* Gal. 15. us. part. 6. *A* Carcanus & Piccolhom. volunt in foetibus unum, duos, tres, quatuorve menses natis, horum aptionem, ideo & membrana & canalis conspicua vestigia extare (hoc de f. a. d. ad m.) ad venam arteriosam, ubi hæc in duos truncos dividitur, ac si vena arteriosa in tres truncos scinderetur, quorum primus sinistrum, secundus dextrum pulmonem peteret, & tertius, (qui prædictis duobus paulo minor est) ipsam Arteriam magnam oblique adiret: qui à Cordis basi¹ in foetu duobus circiter transversis digitis, in adultis amplum^c & patens est, ovalique figura, natura pertudit, per quod sanguis à Cava in Arteriam venosam transit, & ad pulmones deferitur. At ne sanguis in Cavam refluat, hujus foraminis regioni, quæ Arteriæ venosæ cavitatē respicit, præfecta est operculi instar membrana [t. 11. f. 2. & 3. i.]^f tenuis dura, pellucida, foramine major, quæ ad solam & radicem firmatur, reliquo toto corpore in^d vasis cavitatē pendula; quo dum laxè in se concidit, facile ad pulmonis vas resupinetur, & sanguini à Cava impetu affluenti, cedat quidem; at ne rursus in Cavam refluat, impediatur. Quare Arteria venosa in foetu pulmoni officium Venæ, in adultis vero munere Arteriæ fungitur. In adultis enim, dum Cor dilatatur, sanguis ex Cava in dextrum ventriculum effunditur, unde dum Cor constringitur, in Venam arteriosam & pulmones propellitur. At in foetu cum cor non moveatur, pulmones tamen augeri & nutrirī oportuerit, viam prædictam natura fabricata est, qua sanguinem per Cavam sursum latum, nec ulla spirituum vitalium generatio fiat, sed recta in Arteriam venosam, indeque in pulmones. Hæc naturæ sunt opera admiranda, superat vero omnem admirationem prædicti foraminis haud ita multo post conglutinatio. Etenim quam primum animans in lucem est editum, cum jam respiret, & cor moveatur, hoc foramen amplius opus non habet, quare paulatim & membrana exsiccatur, coalescit, & occluditur, ita ut si aliquot septimanis post^h inspexeris, vel infantis vel vituli cor, neget locum hunc aliquando pertusum fuisse; verum in animantibus ficcioribus citius: in humidioribus, tardius exsiccatur ac coalescit: rarissimum^{*} enim est sive hanc, sive sequentem unionem, siue utramque in adultis remanere.

Altera unio, est Arteriæ magnæ cum Vena arteriosa [t. 11. f. 1. 2. & 3. f. g.] perⁱ canalem [t. 11. f. 1. l.] nam cum^k Arteria venosa pulmoni officium venæ præster, necessum fuit Venam arteriosam, in arteriæ usum transmutari, quare natura^k id quoque in magnam Arteriam pertudit. At cum duo hæc vasa aliquantulum inter se distarent [tab. 11. f. 1. d. m.] aliud vas^k tertium exiguum, quo conjungerentur effecit, ita ut non per anastomosis, sed per canalem jungantur. Canalis [t. 11. f. 1. l.] seu vas incipit, non à caudice magnæ Arteriæ, sed ab ea trunci deorsum [tab. 11. fig. 1. 2. & 3. f.] delati regione, ubi Nervus sinister sexti paris Recurrentem constituendo circumvolvitur. Progreditur autem non transversim, sed oblique ab Arteria magna [t. 11. f. a. d. ad m.] ad venam arteriosam, ubi hæc in duos truncos dividitur, ac si vena arteriosa in tres truncos scinderetur, quorum primus sinistrum, secundus dextrum pulmonem peteret, & tertius, (qui prædictis duobus paulo minor est) ipsam Arteriam magnam oblique adiret: qui à Cordis basi¹ in foetu duobus circiter transversis digitis, in adultis

Pinaus præf. libr. de notis virg. in quibusdam qui aetatem perfectam attigerunt, visa est ista quæ à Vena cava ad Arteriam venosam transit, foramen manifestum habens, sed angustum valde & obliquum, quod in duobus tantum animadvertisimus: & in tertio adeo parvum & obliquum erat, ut non nisi stylo tenui & curvo inter duas tunicas nondum penitus unitas propter earum duritiem perducto, apparebat.

i ut Gal. Fallop. Arant. Carcanus, Piccolhom. & Laur. at Vesal. in suo examine obser. Fallopii per anastomosis. Et Pinaus alteram anastomosis vocat, quæ arteria vicem gessit, quam vis ejus corpus medii transversis digiti longum sit à prima conformatione compositum, ita ut vas potius quam anastomosis videatur. * Poloni Lutetie anno 1602. mortui manserant, Rioli circa cordis basin, ut voluit Fallop. cujus nomine à Carcano reprehenditur.

in adultis vero quatuor distat; cuius tanta est longitudo, ut inter utrumque vas digi-
tum supponere liceat; in bobus vero, ubi adoleverint, duos vel plures. Huic canali
seu vasi, nulla ^m membrana adposita est, quæ sanguinis ex Arteria magna in Venam
arteriosam delati, regressum impediatur, cum id canalis & longitudo, & maxime obli-
quitas præpedire possint. Hic canalis, non quemadmodum cæteræ animalis partes,
augetur: sed quemadmodum ⁿ natura Venam umbilicalem & Arterias umbilicales,
quæ ad spinam sunt, tandem exsiccatur, & veluti funiculos quosdam tenues efficit: ad
eundem ⁿ modum prædictæ vasorum quæ ad Cor pertinent, conjunctiones in ani-
mali jam nato abolentur: & canalis hic sensim ^o attenuatur, ita ut tempore præceden-
te penitus tabescat & exsiccetur: & licet exsiccetur, tantam tamen crassitiem in se ha-
bet, ut sensum non effugiat: imo tantus est, ut quis existimare posset Venam arterio-
sam, ab Arteria magna potius, quam à cordis ventriculo dextro originem traxisse.
Sed in infantibus trium quatuorve annorum, propter tunicæ crassitiem reperitur
quidem adhuc, non autem amplius pertusus existit.

Uniones hæc pulmonum ⁿ gratia factæ, quo & efformari, & augeri, & nutriri vale-
ant, idcirco sanguis maternus purus, ex cava recta ad Arteriam venosam per anasto-
mosin ad pulmones, pro eorum generatione (cum eodem tempore, quo & cor, ge-
nerentur) fertur: generati autem, ex eadem materia nutriuntur, atque augentur,
quamdiu fœtus in utero continetur. Spiritus vero vitalis, cum sanguine arterioso
materno, ab Arteriis umbilicalibus, Arteriæ magnæ subministratur, & inde ad ve-
nam arteriosam per canalem in pulmones, pro ipsorum vita deferuntur. Quare con-
junctioni, usus est, ut dum sanguis tam naturalis, quam vitalis in pulmones transve-
hitur, in cordis ventriculos non excidat; ibi enim, cum cor non moveatur, remane-
ret, eoque pulmones frustrarentur: in lucem editis vero cum non amplius sanguine
materno utatur, sed proprio, idcirco eundem cursum tenere non potuit, sed in cor il-
labi, ibique (ut supra ostensum fuit) immutari debuit.

Sed lubet administrationem subungere: prima unio, quæ per anastomosin fit, ele-
ganter conspicitur, ubi Venæ cavæ truncus per thoracem latus à diaphragmate usque
ad cordis auriculam dextram medius dissecatur: occurrunt enim foramina duo, ma-
ius, quod Anastomosis est in Arteriam venosam: minus, quod est venæ coronariæ
cordis. Secunda vero unio quæ per canalem fit, demonstratur, si arteriæ magnæ trun-
cus descendens usque ad ipsum è cordis ventriculo sinistro egressum, per medium
dividatur, tunc enim introrsum foramen parvum ipsius canalisi, in Venam arterio-
sam occurrit.

Gg 3

m Vessel. per
anastomosin
iungitur huic-
que apertioni
orbiculatim
membrana præ-
est. Carcanus
negat, membra-
nam creatam,
quæ orbitula-
riter orificio
canalis istius
præsit, sed velu-
ri laxam appen-
sam membra-
nulam, quæ fa-
cile sanguini ab
aorta in ve-
nam arterio-
sam affluentem
cedat, & rur-
sus prohibere
possit regurgi-
tationem in
aortam, & præ-
poni ea ratione,
quæ canali bi-
lis in duodeno
& ureteribus
in vesica præpo-
nantur.

n 6. us. part. 21.
o Gal. 15. us.
part. 6. Pinaus.
et si non semper
deletum, ta-
men adeo atte-
nuatum & fo-
lidum intus,
De ut potius ner-
vi, quam arte-

ria, aut venæ effigiem præ se ferret. p Gal. lib. 15. us. part. solius pulmonis gratia ambas, anastomoses constructas putat.
At lib. 6. Cordis etiam ad vitæ facultatis munia obeunda aliquo modo inservire scribit. Petrus putat ambarum a-
nastomosean opus, ad cordis potius & totius corporis usum, quam ad pulmonis nutritionem & vitam referendum esse.
Rossetus credidit, soli aeri deducendo dicatas esse, quem ad pulmones dirigant antequam ad cor veniat, & cum utroque
sanguine venoso & arterioso jam in hepate & liene præparatū misceri.

a Galeno : at
Aristotelem à
medio sinu.

b Hippocrati,
Platoni, Ari-
stoteli, Galeno,
Cor. arteria-
rum fons & ori-
go: Pelopi, arte-
ria cum venis
& nervis à Ce-
rebro: aliqui
ab extremis cor-
poris partibus
oriri credide-
runt.

c Omnium ma-
ximum orifi-
cium 6. usq. part.

14. Vesalio in
ortu orbicula-
ris, durior &
cartilaginosa.

d Vesalio, duo
furculi: Co-
lumb. in non-
nullis non uni-
ca, sed dua.

Laur. raro sim-
plex, septius ge-
mina.

e 6. usq. part. 5.

f 6. usq. part. 5.

g Gal. 6. usq.
part. 14.

h idem Vesa-
lius velle vide-
tur.

i Vesalio arte-
ria ad latus

prima costa ten-
dens. Columbo, Axillaris. Laur. subclavius.

Arteria magna ad sinistrum Cordis ^a ventriculum (ubi radicitur) ^b amplissima est [t. 12. f. 1. A.] antequam pericardio excidat statim in exortu suo supra valvulas [t. 12. f. 3. char. 1. 2. 3.] Arteriam modo unam, ^d modo duas [tab. 12. f. 1. BB.] coronarias utrinque unam promit, quæ basin cordis coronæ instar cingunt, & per ejus longitudinem cum vena ramulos, & quidem sinistro lateri plures amplioresque transfundunt, ejus substantiam vividam reddentes & si unica adsit, ejus orificio valvula exigua adposita est. Mox aliquantulum sub venæ arteriosæ caudice sursum fertur, & pericardium permeans, in duas partes ^e imparibus portionibus dividitur, quarum altera sursum [t. 12. f. 1. E.] ad caput ascendit, & minor est; altera deorsum [tab. 12. f. 1. D.] fertur & multo major est, quod totius animalis partes, quæ cordi subjiciuntur, superioribus multo plures ac majores sint. Hic truncus caudici arboris proportionem respondet, ad quintam ^f Thoracis vertebrae detorquetur, & sinistrossum paululum deorsum declinans (ut Venæ Cavæ locum det) vertebraeque incumbens indivisus descendit, quem Aristoteles proprie Aortam, eo quod nervosam ejus partem, vel in mortuis conspici posse diceret, instar vaginæ fortassis Macedonibus *αορτῆς* nuncupata, *αορτή* appellavit. Praxagoras crassam appellare consuevit. Ab his rami disperguntur, qui & venæ portæ & venæ cavæ ramos in totum & corpus comitantur.

A trunco ergo majore [t. 12. f. 1. D.] qui in thorace amplissimus & crassissimus est, sequentes rami prodeunt.

Intercostrales arteriæ inferiores [tab. 12. f. 1. HHH.] quæ à posteriore ipsius sede ordine progressæ, utrinque ad octo inferiorum costarum intervalla usque ad cartilagineas mittuntur: & hæc rursus musculis dorso & thoraci adnatis, & dorsali medullæ per foramina nervorum gratia vertebrae insculpta, furculos eo modo, quo vena *αζγοῦ* ^g distribuit: rarum enim est venam *αζγοῦ* comitem habere arteriam ab Aorta prodeuntem, tumque intercostalis major dici meretur.

Phrenica utrinque una [tab. 12. f. 1. KK.] quæ per diaphragma disseminatur à quibus & ad pericardium, quæ id diaphragmati adnascitur, ramuli sparguntur: nonnullam à ^h trunco, sub diaphragmate oritur. Trunci reliquum diaphragmatis [t. 12. f. 1. *] fissuram pertransit, vertebrae corpori adherens, à quo multæ propagines per infimum ventrem distribuuntur, ut supra explicatum fuit.

A trunco minore & ascendente [t. 12. f. 1. E.] qui inter membranas intersepientes Cavæ subternitur & Asperæ arteriæ innuitur, omnibus partibus supra cor existentibus rami communicantur: hic primo utrinque insignem emittit ramum, qui ad sui lateris costam primam sub clavicula fertur, quare Subclavia ⁱ arteria [tab. 12. f. 1. F.G.] dicitur: dein totus truncus in duas Carotides abit.

Sub-

Subclavia * dextra [t. 12. f. 1. F. *cujus exortus a.*] ab Aorta, ubi in Carotides scinditur prodit, quæ elatior & multo amplior est, & transversim magis fertur ipsa sinistra, quæ multo hamilius ubi Aorta deorsum retorquetur, enascitur, & oblique magis brachium accedit.

A Subclavia qualibet, antequam thoracis cavitatem excidat, (ubi enim extra thoracem est, non amplius Subclavia, sed Axillaris [t. 12. f. 1. PP.] dici debet) simul ac primam costam attingit, non autem ante, propagines derivantur: ab ejus quidem parte inferiore, intercostalis superior [tab. 12. f. 1. II.] quæ costarum radicibus attensa tribus quatuorve superiorum costarum sui lateris interstitiis, (sed non eodem modo) singulos ramos communicat, à quibus furculi dorsi medullæ, musculique vicinis distribuuntur. A parte superiore prodeunt

Mammaria [t. 12. f. 1. LL.] quæ reflexa sub sternum cum vena comite descendit, ad mammas, & [tab. 12. f. 1. CCC.] musculos cartilagineum verarum costarum interstitia occupantes: in glandium membranasque intersepiens, quibus adhaeret, furculos spargit, & ad cartilaginis mucronatæ latus thoracem egressa, sub rectis infimi ventris musculis, ramulos in latera spargens defertur, & ad umbilicum in plures [t. 12. f. 1. dd.] furculos divisa Epigastricæ arteriæ sursum contendenti, jungitur [tabul. 12. figur. 1. ee.]

Cervicalis [t. 12. f. 1. MM.] retro magis versus corpora vertebrarum prodit (nonnunquam à Carotide) quæ sursum lata, ubi ad septimam cervicis vertebra pervenit, foramina transversorum processuum dictarum vertebrarum, cujus nomine Naturæ perforavit, permeat, musculis & cervicali medullæ, vertebraeque furculos largitur, qui foramina, per quæ nervi egrediuntur, ingrediuntur, quæ medullæ membranam perforans, inter primam vertebra & os occipitii [t. 12. f. 1. NN.] utrinque calvariam ingressa, cum socia opposita unitur, & sub cerebri basi fertur.

Muscula [t. 12. f. 1. OO.] quæ musculis cervicis incumbens ad occipitium usque aliquando etiam brachii, ramulos impertit.

Ab Axillari [t. 12. f. 1. PP.] (quod axillam pervadat sic dicta) antequam brachium accedat, prodeunt à parte inferiore.

Thoracica superior [t. 12. f. 1. QQ.] quæ ad musculos pectori instratos numerosis utrinque furculis fertur: huic proximi sunt ramuli exigui, glandioli sub ala sitis, tributi.

Thoracica inferior [t. 12. f. 1. RR.] quæ totum thoracis latus deorsum perrepat, potissimum in musculum latissimum excurrans.

Scapularis [t. 12. f. 1. S.] quæ ad musculos in cavæ scapulæ repositos disseminatur. A parte superiore

Humeralia [t. 12. f. 1. TT.] quæ humeri summum conscendit & in musculos, humerum & scapulæ gibbum occupantes distribuitur. Arteriæ axillaris quod superest [t. 12. f. 1. VV.] ad brachium Axillari vena comite abit.

Ascendentis trunci [t. 12. f. 1. E.] reliquum, Asperæ arteriæ incumbens juxta elatorem sterni partem Thymo suffultum, adhuc in thoracis cavitare, in duos ramos impa-

Vesal. & Laur. carotidem dextram subclaviæ dextri quintum ramum facit: contra Vesal. Carotidis dextra ramum facit ipsam subclaviam: sinistra vero carotidem non à subclaviâ, sed à trunco prodire, dicit Laur.

k Vesal. & Columbo hac quæ axillarem vocant, à carotide dextra in jugulari regione oriuntur.

l Columbo duæ arteriæ ramo ad superiora costarum intervalla & vertebrae mittuntur, quos Vesalius ignoravit. m Gal. diff. ven. 9.

n Nulla soboles ad eum nisi forte obcurisime in mam-mille corpus pertingant. Vesal. at Fallopius, ad mamillas admodum conspicuas esse dicit.

o in plerisque à soporosis, frequenter ab axillaribus originem ducit, Columbus.

p Vesal. cervicales arteriæ in sinus dura materis cum venis feruntur: quod Columbus reprehendit, & Laur.

hicque vult cervicalem citè carotidibus ple-xum choroidem constituere.

q nullibi eam subiens. Vesal. r Axillam pertens arteria,

impares finditur, quos Carotides [*tab. 12. f. 1. X. X.*] seu soporales vocant: quæ arteria sursum recta tendunt, ita ut dextra quemadmodum & sinistra, per partes colli laterales, usque ad Calvaria basin ferantur, asperæ arteriæ & venis jugularibus internis (externæ enim sine arteriis conspiciuntur) mediante membrana connexæ, prope maxillæ inferioris angulum, in duos ramos, ad jugularis internæ imitationem, externum & internam dividuntur, caput petunt: de quibus plenius in faciei historia.

De Pulmonibus.

CAPUT XXVI.

Horum historiam habet Gal. 6. us. part. 20. 7. eiusd. 10. de ipsorum vasis egit 7. us. part. 2. & 7. adm. an. 5. At quomodo spiritus à pulmone in thoracis capacitatem transeat, ostenditur 8. ad. an. 10. de ipsorum usu, 7. us. part. 8. Arist. 1. hist. an. 16. 2. ejusd. 15. 3. part. an. 6. 4. ejusd. 1. lib. de respir. cap. 1. 15. & 21.

Pulmones aeris per respirationem attracti ad cordis refrigerium officinæ, & proinde respirationis simul ^a ac vocis instrumenta sunt, Græcis πνεύμονες, ^b propter aerem attrahant, expirando reddant: hi omnibus respirantibus & collum habentibus & in aere versantibus, idcirco non piscibus ^d dati, & in thoracis ^e cavitate [*tab. 4. N. O. P.*] siti sunt, cum ab ore aliquantulum distare debuerint, ne aeris appellu statim refrigerentur: in viventibus, dum inspirant, universum ^f thoracis cavum (præter eam regionem, quam intersepientes membranas [*tab. 4. L.*] in se complecti, una cum corde pericardio intestum, diximus) implentes: dum vero expirant, subsident quidem, sed non, ut in mortuis flaccidi concidunt, eum aere & sanguine semper adhuc referti sint, & quamvis folle per asperam arteriam indito inflari possint, vix tamen tantum spatii, ut in vivis, opplent. Cum enim plurimum aeris continere debuerint, qui pluribus cordis motibus sufficeret, neve & loquendo, cantando & vociferando semper inspirare cogamur, eorum quantitas maxima esse debuit. Hi licet majore ex parte liberi sint, quo liberius moveri possint, attamen asperæ arteriæ intermedio, collo & dorso, ne decendant, suspensi tenentur, & mediastini interventu [*tab. 4. G. H. ad A.*] antè sterno, postè verèbris quasi connectuntur: quemadmodum in aliquibus partibus ad thoracis latera, fibrosis nexibus ab ipsorum membrana productis (quod in ^h homine peculiariter tanquam in sapientissimo animali observatur) pleuræ ⁱ adnascuntur, quo pulmones, qui ex sese motus omnis expertes sunt, thoracis mo-
lentes, illa promptè intermittentes. Arist. respirat. 10. & 21. simul & pulmonem & βρογχίον habere nullum unquam visum est: pulmo refrigerationis ejus gratia, quæ spiritu sit: branchia vero ob eam refrigerationem, quæ ab humore provenit jam omnibus una refrigeratio sufficit. ^c Eandem, quam cor obtinet sedem, Arist. 3. part. 3. & Gal. 13. us. part. 6. Hipp. de resect. corp. pulmo χλωρό implet. ^g Addit Laur. ac foetidos odores fugiamus, & dum natamus, aut aquis immergimur, spiritum cabibeamus. ^h Jam dextra jam sinistra, jam utraque pars thoracis lateribus fibrosarum nexuum interventu pertinacissime colligantur, quod hominibus quodammodo peculiare esse videtur. Vesal. in aliquibus partibus præsertim ad latera, Fallop. 1. Gal. 8. ad. an. 10. fatetur pulmonem in mortuis à costis sejunctum esse, sed in viventibus semper costis aliquatenus adharere. Rioli sapius observari pulmones nullibi subcostali tunica harentes, ne quidem diaphragmati affixos.

k de Motu pul-
monum opinio-
nes: 1. Arist. 3.
part. 6 qui vult
pulmonem sui
motus princi-
pium à corde
accipere.

II. Gal. libr. de
thor. motu, &
locis variis non
propria & infi-
ta vis sed acci-
dentaria, se-
quuntur thora-
cis motum, ad
fugam vacui.
Laur. non à cor-
de, quia illius
motus perpe-
tuus non est.

nec à cerebro,
quia non est vo-
luntarius: nec
vi propria, sed
à thorace ad
vacui fugam.
III. A verrois
propria vi mo-
veris, non au-
tem thoracis
morum sequi-
tur, quia dare-
tur aliquis mo-
tus violentus
perpetuus. Riol.
pulmonis
motus naturalis

Hh

ac c

ne aliunde pendet, sed utrius instar non follis modo distenditur & contrahitur: nam in libera respiratione immoto thorace, pulmo movetur, quia respiramus, respiratio autem perficitur dilatatione & contractione pulmonum. In violenta respiratione, pulmo motum thoracis sequitur & secundum ejus amplitudinem, fuga vasculi amplificatur.

Gal. 6. us. part. 7. 7. ejusd. 10. hinc Avicenna cordis culcitra.

Gal. 6. us. part. 2. & 10. Arist. 1. histor. 16. Serpentina simplex, fibrosa, praelongus, longe à corde repositus, 2. hist. 17. m.

pulmo omnium bipartitus esse expedit: at in iis, quæ animal generant, distinctio non a quæ apparet, minimeque in homine, est hominis pulmo simplicior, nec ita multipartitus 2. hist. 16. idem sere 3. part. 5.

Gal. 6. us. part. 4. at 7. ad. an. 11. pulmonis fibra in omnibus animantium due in dextris, due in sinistris, sed quinta quasi soboles Sic Hipp. dere[est] corp. pulmo 2. d. v. implet quinque & sex vagæque sunt, id est, summi ares habens, quas lobos vocant, quorum duo in sinistra, tres in dextra parte: at Hipp. in coacis, tres utrinque lobi, supernus, infimus & medius. o Hipp. 2. de morb. 2. opta, quibusdam per metaphoram ala. p Cur dividatur pulmo, vide 7. us. part. 10.

ac constringi possit (spiritu inspirato etiam in angustas ejus partes facile permeante) & cor firmitus complectantur, & ne dum dorsum flectimus, comprimantur: Nam si continuus fuisset, propter thoracis longitudinem, nec commode dilatari nec constringi potuisset. Et licet nonnunquam in tres, nonnunquam in nullos, nonnunquam in duos absque vera sectione distincti reperiantur, rarissime tamen in homine, cum breve pectus habeat, quintus & lobus invenitur, qui in simiis & canibus propter thoracis longitudinem, venæ cavæ caudici inter diaphragma & pericardium, & quidem concavus ipsius venæ rotunditati cedens, fulcris cujusdam vicem præstans subjicitur: & si adsit, tum in jugulo, tanquam stratum venæ cavæ subjicitur.

¶ De numero loborum agit 7. ad. an. 11. 7. us. par. 2. & 10. & 6. ejusd. 4. ubi dicit, dextrum pulmonem unitate separare in omnibus animalibus. Vesal. hominem quinto lobo destitui certo certius, etsi Gal. 7. ad. an. Hero-philum & Marinum reprehendens, dari voluerit. Columbus, natura uno lobo hominis pulmonem à brutis separari voluit, quia in brutis hepar plurimum à corde distat: in homine, quia inter aor. & hepar septum tantum interjacet, quinto lobo opus non fuit: & hinc edocere vult, Galenum nunquam hominis Anatomem exercuisse. Piccolhom. quintus lobus cum nonnunquam in aliquibus non sit deprehensus, nonnulli falso scripserunt, nemini mortalium esse concessum, Laur. brutis plures lobos, quia prona incedunt, quemadmodum & eorum hepar in lobos divisum, soli homini continuum. Rioli. sapius tres lobos observavimus. 1. Gal. 7. us. par. 2. & 10. 1. Parenchyma Erasistrato 7. ad. an. 5. omnium partium, quæ viscera appellantur sanguine repletus est. Arist. de respir. 15. 1. hist. quia illico sanguis universus effluit. 1. In junioribus densior in flore atate rarior & magis cavus est, Hipp. 2. de morb. 1. Pulmonum generatio apud Hippocratem libro de carnibus habetur. x. 15. us. par. 6. y Gal. 7. us. par. 8. 2. Varolus addit, ita ut portiones pulmonis mortui semel dissecta iterum glutinentur. * 6. us. par. 10. Sic Hipp. de alim. pulmona rior in adultis, quoniam aerem alimentum trahit, cetera membra simile sugunt. † Mirum profecto Hipp. lib. de Cord. describere pulmonem natura frigidum esse & in spirato aere magis refrigerari: & 1. 4. de morb. frigidus affectus semper pati.

Substantia eorum [t. 13. f. 2.] carnosa est (quare πρετέχματα & carnosum viscus dicitur) triplici vasorum genere [tab. 13. f. 2. B. C. D.] intertexta, membranaque tenui tecta, quæ pro ratione ætatis mollietis & colore & substantia variat. Cum enim pulmones, qui ex sanguine à cava ad Arteriam venalem per anastomosen delato, & sanguine spirituoso ab Aorta ad Venam arteriosam per canalem transmissio oriuntur, quo etiam augentur nutriunturque dum foetus in utero est) in foetu non moveantur, ut nec cor, densissimi & crassissimi sunt, substantia hepatis similes: rubei, ratione alimentis, quo nutriuntur. At foetu excluso, ubi cor moveri cœpit ab ejus calore & motu & aeris inspirati transitu, eorum caro cum & ipsi ad thoracis motum moveantur, sensim mollis levisque redditur, quo velocissime moveri possit, cum ad motum alterius moveri teneatur, ne motor pondere aut renitentia ipsius defatigetur & sic prompte obsequatur, vel vacuo, ne detur, vel thoraci cum movetur ad se allicienti. Contra quam cor, quod substantiæ robustæ & solidæ esse debuit, cum seipsum movere debuerit. Quare thoracis motum prompte sequitur facile atrolli & collabi potest & instar stæbes in vasorum divisionibus ponatur, quo omne id quod intercedit, repleat, sitque firmamentum ac propugnaculum ipsorum, ne quid ex assiduo motu rumpatur: & hæc ratio, cur Platoni sit ἀλμα μελανόν, ad quod substantia multo lentore & visciditate prædita plurimum facit. Substantia eorum, quoque ratione alimentis variat, cum in foetu Galeno docente, * pulmo sanguine venoso nutritur, qui à vena cava in arteriam venosam regurgitat: at in adultis licet venoso sanguine nutriatur, eum tamen non à venæ cavæ trunco, sed à dextro cordis ventriculo, in quo purior subtilior & quodammodo vitalis factus, per venam arteriosam suscipit: quare calidiore † & renuiore, quam ceteræ partes sanguine nutritur. Idcirco eorum substantia rara, laxa, spongiosa, & velut ex spuma sanguinis concreta, quo instar folliis aerem inspiratum recipiat, & affatim repleatur: colore ex pallido flavescente, sæpe cinericeo notis quibusdam subobscuris, fulcis

& nigri

pati. hydropi sine ullo hepatis & lienis vitio obnoxium esse. Laur. respondet. Hipp. comparat non absolute hoc dixisse. Riol. non satisfacit, quia tota natura sua frigidior esse dixit. 2 Hipp. de pris. medic. corpus spongiosum & rarum. Gal. 4. us part. 15. 7. ejusd. 8. fungosus & fistulosus. Arist. de respir. 15. 1. hist. 17. Sic Hipp. $\chi\alpha\phi\alpha\gamma\epsilon\sigma\iota$, id est, tenerum & molle dicitur lib. de inter. aff. & 3. de morb. b Gal. 7. us part. 2. & 10.

& nigricantibus compuncta; vel tanquam nubium lineamentis conspersa, & in iis, qui ex diuturno morbo interiere, intensius nigricat.

Membranam ^c habent à ^d pleura enatam, ubi enim vasa pulmonem [1. 13. f. 1. C. D.] ingrediuntur, ibi tunica eorum communis à pleura pronata ab ipsis recedit, ac pulmonum superficiei tenuissime expanditur, quo ipsorum substantia mollis, firmior reddatur, alias enim assiduis motionibus impulsæ, brevi divulsæ, dissiparetur: hæc tenuis est, ne pondere sit molesta, & mollis, quo facile cum pulmone & dilatetur, & concidat: porosa, ut si forte quid saniei in thorace colligere in Pleuritide & Peripneumonia, in eos, inquirunt, pateat aditus, ea per anacatharsin tussiendo rejiciatur. Hæc etiam eorum superficiem reddit lævem & veluti humore lento aspersam. Sed de tussi & materis expurgatione & via pauca aspergamus. Tussis quæ in omnibus fere thoracis affectibus, pleuritide, peripneumonia, asthma & phthisi molesta esse solet, motus est pulmonum & thoracis, & quidem partim animalis & voluntarius, partim naturalis: animalis, quia tussis est validissima efflatio, quæ musculorum beneficio fit: naturalis, quia tussis motus est convulsivus, qui solo naturæ conatu fit, volentis id quod molestum est excutere, & quidem plerumque; invitis hic motus accidit. Quatenus ergo musculorum ope perficitur, motus animalis est: quatenus vero causa impellens & movens adest, naturalis est. At ea, quæ sic rejiciuntur per pulmonum arteriam asperam, educi quidem novimus, sed cum ea vel in pulmonibus, vel thoracis capacitatem, vel intra pleuram & musculos intercostales hæreat, quomodo educatur videndum: de materia in pulmonibus collecta, dubium nullum est: Sic quomodo materia ex thoracis capacitatem per tunicam pulmonum, cum ea tenuis sit & porosa, rejiciatur: & hic non magno labore opus est. Sed quomodo materia purulenta per pleuram membranam, quam Galenus $\tau\acute{\iota}\gamma\upsilon\sigma\epsilon\nu\ \kappa\alpha\iota\ \nu\acute{\omicron}\lambda\epsilon\upsilon\sigma\epsilon\nu\ \eta\gamma\ \delta\upsilon\sigma\delta\iota\alpha\gamma\epsilon\tau\omega\nu$, ^{† Gal. negat ad versus Arist. & experientia tenuissimis foraminibus per-} id est, fortem, nervosam & quæ difficulter dividi queat, nominat in pulmonum bronchia penetrare possit, non sane dubio caret. Quare paucis per quot vias materia purulenta è thorace & latere expurgari possit, subjiciamus. Vomicam pulmonum ruptam, & pus in thorace collectum per vias quatuor expurgari, summus dictator noster Hippocrates docuit: per os, & per renes, & per alvum, & per abscessus in crura ^{† Gal. negat ad versus Arist. & experientia tenuissimis foraminibus per-} sed per quas vias? Per os materiam tussi rejici & quidem per asperam arteriam in confesso est: per renes, an non via hæc manifesta, dum pus in pulmonibus collectum, per arteriam venosam quæ per pulmones distribuitur ad ventriculi sinistri principium delatum, & inde per ejus ramum, peculiarem & insignem, supra cap. 22. explicatum, ad emulgentes, indeque ad renes defertur: quamvis alii velint per arteriam venosam, in ipsum sinistram ventriculum effundi, eoque contracto in arteriam magnam, indeque emulgentes deturbari: quod aliquando fieri non negaverimus, cum talis materia purulenta in sinistro ventriculo aliquando reperta fuerit, cujus nomine etiam ^{† Gal. negat ad versus Arist. & experientia tenuissimis foraminibus per-}

Hh 2

jam 71. epid. f. 2.

par. 41. & 3.

par. 66. & Gal. in com. par. post & 3. loc. aff. 3. d in Concio aph. 396. qui & Anginam in abscessus crurum terminari aph. 376. in conac. docuit.

jam mortuos esse credimus. Per alvum vero etiam evacuatio per hunc modo observatum ramum fieri potest, siue materia in arteriam magnam delata, in arteriæ magnæ ramum cæliacum qui ad ventriculum abit, in quem effundi potest, siue materia in arteriam magnam delata, in arteriæ magnæ ramum cæliacum qui ad ventriculum abit, in quem effundi potest, & ab hoc in intestina: siue feratur per arteriæ magnæ ramum alterum Mesentericum dictum, qui supra emulgentes ad mesenterium & intestina mittitur, & per hunc materia purulenta in intestina evacuari potest. Per abscessus, sic quoque per eundem ramum materia in aortam delata in ipsius ramum cruralem profundi potest.

Sic quoque pleuritidis materia tot modis expurgatur, & quidem per urinas, per alvum, per abscessum beneficio Venæ sine pari, quemadmodum cap. 18. exposuimus: sed quomodo pleuram tunicam & densam, pertranscat dubium: quamvis communis sententia sit & per pleuram & per pulmonum membranam in pulmones permeare: attemen quia animadvertimus eos qui ex vera pleuritide convalescunt, ad vitæ finem de difficili respiratione & levi ejus lateris dolore (quod in utraque uxore observavimus) conqueri: & in pleuriticis post mortem secutis, pulmonem tunicam pleuræ adnatam vidimus, hæc causa est cur credamus, in pleuritide vera non solum pleuram, sed etiam pulmonum membranam inflammari, sicque facilis materiæ transitus dabitur: sed de hac re si Deus volet, in Theatro nostro practico plenius verba faciemus.

In hanc Nervuli^d exigui, cum exiguo sensu egerint, à sexto^e pari disseminantur, à dextris quidem [t. 9. f. 1. r.] postquam recurrentem dextrum, à sinistris vero [t. 9. f. 1. qq.] ante recurrentis constitutionem, qui pulmonum^f carnem non attingunt, ne ex assiduo motu doleant, & lassentur: hinc omnia pulmonum ulcera absque dolore fiunt.

Vasa trium generum [t. 13. f. 1. B. C. D.] obtinuit, quod nulli alteri parti natura dedit: habet enim asperas arterias, venas à vena arteriosa, & arterias læves ab arteria venosa, quarum quælibet actioni peculiari inservit: ita quidem ut venis & arteriis asperæ arteriæ bronchia interjecta sint: & venæ & arteriæ cujusque lateris decussatim in lobos feruntur, quæ bifariam^h primum ut pulmones, mox in alias partes invicem & eadem serie dividuntur, ita ut in ramos capillares tandem ad extremam eorum superficiem abeant, quibus eorum substantia, quemadmodum venis, hepatis, caro circumfunditur. Horum unum pulmonibus proprium A^pera arteria [t. 13. f. 1. B. & t.

1. Opinio Erasistrati Galeni 5. loc. aff. 3. referente: sanguinem per arteriarum ramulos, qui ad partem laborantem pertingunt, pus autem per venarum ramulos ad arteriam magnam, & venam caviam & inde ad pulmones ferri.

11. Galeni l. c. humorum expurgandorum transsudationem per pleuram in thoracis spacium fieri: eo modo quo in fracturis ossium callo obducendis, sanguis per cutim, quæ ipsa pleura fortior & densior copiose penetrare & ligamenta irrigari observatur: ex thoracis vero spacio in aspera arteria ramos, qui in membranam pulmones cingentem terminantur, & ob cartilagineam substantiam aperti manent valida constrictione thoracis, quæ expirando & tussiendo fit, quodammodo inprimi. Experientiam addit, quæ constat per vulnera aut abscessus internam thoracis cavitatem subeuntes, si nulla ad sordes ulcerum eluendas infundatur, quod ea & tussi rejiciatur & gustu ac sapore dignoscatur: Sic Galenus, Verum hæc experientia ostendit quomodo ex capacitate thoracis in pulmones feratur, non vero quomodo pleuram crassissimam, quod in questione est, transeat.

d 7. ut part. 10. at cap. 2. portionem eorum nervorum, qui ad ventriculum feruntur. e diff. nerv. 10. f An pulmo sensum non habeat, opinio duplex. I. Gal. pulmo sensum non habet, quia nullus nervus per ipsius corpus dispersus est, 2. loc. aff. 3. per exiguum aut nullum sensum, 1. de diff. resp. & 3. prog. com. 30. per visceris profunditatem nervi non extenduntur. 4. loc. aff. 5. nulli aut perquam graciles, Vesal. nervuli tunicam attingunt non penetrant, Columb. & Piccolom.

hom. nullum habet sensum nisi ratione tunica, qua nervos parvulos habet, Fallop. in tunica tantum, unde & obtuse sentit, Plat. nulli in pulmonum substantiam, Laurent.

II. Hippocratis: qui 3. de morb. scripsit pulmonum inflammationes dolorificas esse, ipsumque dolorem lateri & dorso communicari, ob tunicas pulmonem succingentis & pleurae continuitatem, parilemque substantiam. Rioli. at pleura acutissimus est sensus, ergo tunica pulmonum pleura soboles sensus exquisitissimi particeps erit: quin etiam ipsa pulmonum substantia pluribus nervis instructa est, deductus ex implicatione & contextu nervorum stomachicorum, ex quibus plexus illa reticularis conformatur, quem Fallopius describens ad basin cordis collocat, cum tamen ab ea longe distet, & juxta dorsum vertebrae reperiatur.

g 6. us. part. 20. 7. ejusd. 2. 7. ad. an. 4. at de horum usu 7. us. part. 7. h 7. us. part. 2.

B. & t. 14.] dicitur, quæ ramis est majoribus in medio reliquorum disseminatis, hæc potentia animalis inservit ad respirationem efficiendam quæ potissimum à voluntate dependet, aerem per os natesque attractum in pulmonem devehendo, de quo sequenti capite. Duo vero à corde recipit, de quibus supra egimus: quorum alterum Vena arteriosa quæ naturali potentia ministrat, dum [tab. 13. fig. 1. C. fig. 3. tota vena arteriosa] ex dextro ventriculo sanguinem alimentarium in eo attenuatum pulmonibus pro earum nutritione subministrat, cum quo & spiritus naturalis, ad spiritus naturalis innati custodiam, & anima naturalis huic spiritui infidens cum suis vicibus pulmonibus communicatur. Alterum vero Arterea venosa [tab. 13. fig. 1. D. fig. 4. arteria venosa separata] quæ non solius spiritus instrumentum est, verum etiam purum, tenuem ac vaporosum sanguinem continet: & vitali potentia inservit, dum aerem per asperam arteriam attractum, in pulmonibus præparatum & ab asperis susceptum ad cor defert, dum thorax dilataris, adjuvante etiam cordis tractione, cum attrahit & compressus in cor expellit. Dein etiam ex sinistro ventriculo sanguinem vitalem cum spiritu & facultate vitali, ad pulmones effert: partim ut eo nutrantur, partim ad vitam, quo calor innatus foveatur (vita enim à spiritu vitali est, & arterioso sanguine, qui in sinistro ventriculo perficitur) per eam quoque fulgines à corde propelluntur. Sunt autem i duo hæc vasa longe majora, quam pulmonum magnitudo re- i Gal. 7. us. quiritere videatur (si proportio cum aliis partibus instituatur) quoniam pulmones parti. 8. motu suo perpetuo, celeriter humoris plurimum absumunt & dissipant: dein etiam quia non solum sanguinem naturalem & vitalem cum spiritu vitali deferunt, sed etiam suis extremitatibus ab asperæ arteriæ finibus aerem excipiunt, & in cordis ventriculos deducunt, & si horum parvus ramus^k ruptus fuerit, pulmones purulenti redduntur.*

Jam vero nutriendi ratio pulmonibus plane contraria est, ac cæteris partibus, quemadmodum & eorum substantia: nulla enim pars adeo rara, lævis ac spirituosissima, neque etiam ulla quæ sanguine adeo tenui puro ac vaporoso nutriatur. Quare pulmones^l vasa habuere contraria iis, quæ in aliis sunt partibus. In his enim venæ tun-

Hh 3

k Hipp. 1. de morb. ubi etiam habet, pulmonem calore ex toto corpore præsertim à capite pituitam, ad se trahere.

* Fernel. in pul-

monum affectibus, sinistri potius brachii quam dextri venam aperire suadet: pulmonum inquit, cordisque affectus revellit pariterque derivat, interior sinistri cubiti potius quam dextri vena secta, quandoquidem pulmonum vena ex dextro sinu cordis prodeunt: hic autem in sinistram parietem vena cava inseritur, qui per alam sinistram in cubitum excurrit: sicque servata fibrarum rectitudine, sanguinis vacuatio fiet.

l Gal. 6. us. part. 20 pulmo arterias habet venosas, venas autem arteriosas, quo convenienti alimento aleretur, & ut arteria quidem ipsius facile contraherentur, vena vero agrius.

nicam raram ac tenuem habent, quo affatim & celeriter crassus sanguis partibus circumfusus distribuatur: nutriuntur n. corpora sanguine, per ipsam vasorum tunicam attracto. Arteriæ vero rassæ ac densæ, quo paucum & subtilem spirituosumve sanguinem tantum vicinæ partes pro vita trahere possint, cum nulla etiam minima corporis particula absque vitali sanguine permanere possit. At in pulmonibus venarum tunica [tab. 13. fig. 3. B. C.] crassa ac densa existit, quo nihil nisi tenuissimum elabi sinant, cum unum quodque alimento sibi simili nutriatur: pulmonum vero corpus læve ac rarum sit, idcirco sanguine puro, vaporoso ac tenui indigent. At cum pulmones copiosiore alimento, quam cæteræ partes egeant, tum propter perpetuum motum, tum propter caliditatis copiam, quam partim ex cordis viciniâ, partim ex motionis assiduitate assequitur, idcirco arteriis venæ tunicam [tab. 13. fig. 4. F.] tribuit, quo hæc copiosissimum, tenuem, ac spirituosum sanguinem abunde tribuant: ut quod venæ n. propter sui crassitudinem ac densitatem, alimenti minus ipsi tribuere possunt, hoc omne arteriæ compensent, ut quæ præ raritate ac tenuitate ipsum continere nequeant.

m 7. us. part. 8.
n 6. us. part.
o Gal. 7. us.
part. 9. si mor-
tuo animali per
laryngem in-
sufflaveris, im-
plebis asperas
arterias, & pul-
monem disten-
di videbis.
Cum interim
arteria læves ac
vena molem si-
bi ipsis retine-
ant æquabilem.
† 7. ad. an. 4.
†† 6. us. part.
10. 7. us. part. 8.
¶ 9.

Sed quo motu arteriæ pulmonum moveantur queri potest, num more reliquarum arteriarum moveantur. Equidem aperta arteria motum pulmonis sequitur, cum pulmone dilatato etiam dilatetur: reliqua duo vasa, alii ad motum similiter pulmo- nis, alii ad motum cordis moveri volunt. Posterioris sententiæ Trusianus fuit, qui credit læves arterias eodem modo ac cor moveri, reliquas vero totius corporis, contra ac cor moveri. Sed si quis attente Galenum † legat & harum arteriarum usum expendat, eas eodem modo quo reliquæ, quæ ab arteria magna distribuuntur, move- ri inveniet, siquidem ex etiam è corde oriuntur. Sed si eodem modo quo cor moven- tur, quomodo pulmonum motibus obsequuntur, quod necesse si aerem à pulmone suscepturne sunt. Certum est Galeno †† docente instrumenta quæ attrahunt, con- secutione ad id quod evacuatur, prius id quod tenue est leve allicere, quam id quod grave & crassum: quo fit ut pulmo non prius per læves arterias ex sinistro cordis ven- tre aliquid, quam per asperas aerem trahat, neque prius sanguinem ex dextro, quam per læves arterias, quod ex sanguine & aere permixtum est: quo fit ut cum pulmo dilatatur & aere impletur, ex ejus plenitudine reliquæ arteriæ læves postea dilatatae ad cor trahant, quod pulmo inspiratione traxit. Ex quo sequitur necessum esse, pul- mones prius dilatari & impleri, ac mox arterias ex eo aere cordi præstare quod neces- sum est. Quare prædictæ arteriæ læves, cordis potius quam pulmonum motum se- qui debuerunt.

Utrum autem earum motus, à facultate vitali fiat, vel potius cordis motum, tan- quam partes ab eo dependentes sequantur ambigi potest. Sane videntur non mo- veri à facultate dilatativa & compressiva, sed potius sequi motum sinistri ventriculi, à facultate vitali causatum, tanquam res quæ ab ipso oritur & ipsi continua est: alioqui necessum foret, læves arterias tantum sanguinis arteriosi continere, quantum reli- quæ arteriæ pulsatiles obtinent, quod aeri subingredienti ingens impedimentum ef- fet, & animal citissime suffocaretur.

Vasa hæc si referentur, sive per anastomosis sive diapedesis, vel diæresin, sanguis cussi rejicitur, ut in Hæmoptoica passione: & si vasa majora erodantur, non solum sanguinis copia, aut arteriæ asperæ cartilaginosa substantia ejicitur, sed sæpe Phthisici sangui-

sanguine copiosiore effuso, inopinata morte extinguuntur.

Ufus pulmonum: ut sint p^{er} respirationis & vocis instrumenta (quæcunque enim pulmone carent, respirare non solent, nec etiam vocem edere queunt) siquidem dilatati instar follis, aerem p^{er} asperæ arteriæ ramos excipiunt, eumque cum spiritu^m s^{int} officinæ, Cordine eum impurum & confertim t^{er} & de repente icruentem assumat, sed paulatim t^{er} immutant præparant, quo innati spiritus pabulum conuasciens fiat (hinc aeris t^{er} qualitas alia quidem familiaris & amica spiritui innato, alia vero aliena & corruptrix; hinc videmus t^{er} illos, qui domos incolunt calce nuper illitas, maxime vero ex carbonum fumo & aliis ejusdem generis, extingui) quem p^{er} arteriæ venosæ ramos ex Asperæ arteriæ propaginibus, cum osculis coeant, in cordis dilatatione, cor sibi allicit pro^{pter} refrigerio: siquidem t^{er} calidum omne frigido moderato nutriatur, foveatur & conserveatur. Quemadmodum enim flamma t^{er} angusto loco coarctata, & aere non ventilata marcescit: ita natus noster calor frigido deficiente languet, (ut norunt ii, qui calidioribus sudatoris insident) contabescit & tandem extinguitur, cum is flammæ instar continuo moveatur: quare Philosophi cordis flabellum & ventilabrum vocarunt: & Plato à pulmonibus cor temperari voluit, quando ira exstiteret. Sic cum constringuntur, expiratione (in inspirando enim & expirando vitam consistere dixit^{ur} Philosophus) eadem via aerem residuum, ut non vo cedat, & voci, materiam præbeat, spiritum videlicet ad vocem edendam, expellunt: qui, dum ingreditur, frigidus est, dum egreditur calidus, propter caloris in corde contenti contactum: simul quoque spirituum excrementa fuliginosa, pulmonumque tam tenuia, quam crassa in asperæ ramis collecta, ex sufflatione validiore per rursim facta in asperæ arteriæ canalem propellunt, nonnunquam veluti per arundinem usque in os ejaculantur. Quare natura respirationem, arteriarum pulsus & totius corporis διαπνοήν, ob caloris nativi conservationem instituit, ut calor ventilaris & halitiosa excrementa diffili & dissipari possint: si illa transpiratio impeditur & calidum effluuium retineatur, nativum calorem suffocari necesse est.

p Gal. 7. us.
parr. 8.
q Arist. de resp.
1. & 15. causa
respirandi pul-
mo, & 3. parr.
6. pulmo respi-
randi officio de-
legatus est.
r Arist. de resp.
21. follis. qui in
officinis ferra-
riis habentur
assimilavit.
Pulmones sunt
veluti gemini
folles aerem at-
trahentes: &
aspera arteria
veluti canna
per quam fit ar-
tractio aeris.
Fall de ossib. 19.
l 6. us. part. 2.
r Gal. 7. us. par.
8. ejus spiritus,
qui animali
inest, fiat nu-
trimentum cu-
jus alterationis
De pulmonis caro
primum est in-

strumentum: quemadmodum hepatis caro cibi in sanguinem mutationis auctor est. v Arist. ea potissimum respirant, quæ pulmonem habent sanguineum, nam quod calidius, id uberiore refrigeratione indiget, de resp. 1. & 15. vide & 3. parr. 6 ubi Gaza male vocem διαπνοήν semper spirationem vertit: siquidem docente Galeno in com. de salub. diat. Διαπνοή perspiratio sit, cum per totum corpus aer trahitur & expiratur. Διαπνοή vero, cum spiritus per os & nares intro & extra feratur. Piccolhom. vult: Cor beneficio pulmonum perpetuo ad se trahere una cum aere calorem cælestem, & spiritum in aere existentem. x Hipp. de nat. pueri.

Gal. de us. respir. dictum Hippocratis explicat. Piccolhom. pulmonis sex usus proponit. 1. Aerem haustum præparare cordi, ut ventriculus chylum hepatis. 2. Cordis calorem & cælestem ingenitum & elementarium, tanquam flabellum ventilare & conservare. 3. Cordis calorem cælestem simili importato, nutriendo augere. 4. Cordis calorem elementarium, aere frigidiore hausto refrigerare. 5. Ut cor per pulmonem bibat. 6. Ut vocem edere possimus. Columbus voluit, aerem inspiratum per pulmones ferri, eos aerem cum illo sanguine, qui per venam arteriosam ex dextro ventriculo profectus est, miscere, hæc mixta per arteriam venalem recipi, & ad cor ferri, quo sanguis spiritusque vitalis in iis preparatus & pene generatus in corde magis perficiatur. Sed quaro, quomodo feratur hic sanguis in arteriam venosam, cum vena arteriosa & arteria venosa non jungantur, sed arteria aspera intercedat? Verum Piccolhom. hæc Columbi opinionem novam dicens, novem rationibus refutat. 2. de respirat. 21.

De hac epit Gal. 7. us. part. à cap. 3. usque ad 9. & 7. adm. an. 1. & 5. Aristoteles 1. hist. 16. 2. ejusd. 15. & 3. part. 3. & lib. de respir. 11.

Tertium vas pulmonibus proprium, quod Veteres a simpliciter Arteriam, eo quod aerem contineat, vocarunt; posteriores cum Galeno ἀρτηρίαν τελεαίαν, asperam arteriam, ab inæquali qua constat substantia, & quo ab arteriis levibus distinguere, nominarunt: vulgo canna pulmonis appellatur.

Est autem canalis [t. 14. f. 1. & 2.] seu fistula una^b eaque maxima omnibus animalibus, quæ^c pulmonem habent, data, quæ foramina^d narium in os patentia spectas, ante^d œsophagum [t. 13. f. 1. AA.] posita est: siquidem ex humiliore faucium sede œsophago incumbens, ab ore recta deorsum per collum, quod ipsius gratia constructum videtur, in pulmones semper hians fertur, & infima parte velut in multas fistulas ab Hippocrate Syringas^f & aortas^g nominatas, divisa, frequenti ramorum serie [t. 14. f. 1. bb. ccc.] pulmones adit: ejusque pars superior, ipsiusve caput^h Larynx [tab. 14. f. 1. & 2. g. h.] (de quo in oris historia dicitur) reliquum vero [t. 14. f. 1. aa.] βρόγχος, quod à potu irrigetur, nominatur, & in collo caudicisⁱ rationem obtinet.

Connectitur suo capite, faucibus mediante interiore tunica: dein tunica exterior, re, antèius quidem & ad latera, vicinis musculis & vasis: posterius vero fibrosis aliis, quot^k nexibus œsophago connascitur, quo tutius deorsum feratur.

Hujus substantia partim membranæa, [t. 14. f. 2. f.] partim cartilaginea [t. 14. f. 2. dd.] est, quæ tunicis duabus vestitur: altera^l exteriorè à pleura enata, quæ tenuis est, & cartilaginum membranis vinculis pertinacissime connascitur, & velut indumentum quoddam fistulæ existit, ejusque interventu vicinis partibus alligatur, & nervos recurrentes huic arteriæ proprios jungit, & tutissime deducit. Tunicarum altera interna est à tunica palatum succingente enata, quæ totam fistulam succingit, quo^m cartilaginee firmiter conjunguntur: densa est^m ac solida exteriorè multo crassior, (quo eam ab injuriis rerum acrium quæ vel à capite defluunt, vel sœreatu rejiciuntur, ut aliquando pituita falsa, putrida, aliquando biliosa, aliquando pus acre malignum, quod tussi ejicitur: vel rerum acrium illabentium, ut sunt fumi, vapores attracti, nonnunquam cibi & potus, acri qualitate præditi deglutiti) ita tamen, ut in ramis per pulmonem dispersis longe sit tenuior (ne aeris assumptionem & fuliginum expulsionem prohibeat) quam in larynge, in fistula vero medio modo se habet. Hæc fibris secundum longitudinem rectis intertexta, mollis & levis est, ac velut unctoso humore perfusa, ne arteria ab aere calidiore attracto, exeuntibusveⁿ fuliginibus acriori vi præditis, vel in magnis clamoribus ac motibus exsiccetur, quod voci & acci-

ris
τὸ βρόγχος τὸν ἀσπὴν per guttur & aortam, quæ pulmonem & guttur conjungunt. h Gal. 6. us. part. 2. 7. ejusd. 7. & 11. sic 7. ad. an. 1. & Larynx & recentioribus bronchi caput. i 7. ad. an. 5. k Arist. 1. hist. 16. l 7. us. part. 3. m Gal. 7. us. part. 7. n Idcirco satis pinguis interior tunica Fallopio.

ris transmissioni valde obesset: siquidem partibus ° ad fauces & asperam arteriam spectantibus vehementer exsiccatis, ut in febribus ardentibus fieri solet, voces fiunt, quas Hippocrates *κλαγγίδες*, id est, clangosas appellat: ex humoris vero superflui copia, ut in destillationibus ac gravedinibus vox rauca efflatur. Quamvis etiam ab humore, quem glandula [t. 14. f. 1. ii.] laryngis radici appositae & aliae accumbentes (raro enim in fistula exiguae glandulae observantur) continent, & a portione p. potus sensum per canalem [t. 14. f. 1. ii.] descendente, uti in laryngis historia dicitur, humectetur. Est etiam summe sensibilis, quo ea, quae molestant, quam citissime sentiat, & pulmones ad horum excretionem sollicitet. Inter duas hasce tunicas, cartilaginearumque proprie membranarum ligamentosae [t. 14. f. 1. 2. ee.] consistunt.

Cartilagine enim quamplurimae hanc constituunt, quae annuli figuram expriment, sed circulum [t. 14. f. 2. dd.] integrum non perficiunt, cum quarta pars, parte posteriore exsecta sit; & cum Graecorum *στυμα* seu Latinorum C referant, *στυμοειδής*; dicuntur, etiam *βεβογγα* h Medici Galeni 99 tempore appellatae. Haec toto ductu aequaliter a se invicem quidem distinctae, sed membranarum ligamentosae intertunt inter se junctae; hinc in Angina soffocante, omnibus remediis frustra adhibitis, laryngotomia infra laryngem administratur, cute dissecta & spatio inter duas cartilagineas membranoso aperto, & exigua fistula ad respirandum indita, & relicta donec respiratio per os libera sit. Harum superiores majores sunt, latitudineque crassitatem superant, praesertim in medio, cum ea pars anteriore sit loco, ne facile arteria a vi externa laedatur: haec quoque paulatim attenuantur ac velut in membranam abeunt, & cujusque cartilaginis propriae membranarum [t. 14. f. 1. ee.] seu pericostii interventu tanquam ligamento (in brutis quidem membranoso, in homine vero velut carnoso) connectuntur. An forte haec ligamenta [tab. 14. f. 1. ee.] musculos perexiguos dicemus, qui se instar musculorum intercostalium interfecent, & cartilaginum spatia oppleant?

Et cum cartilagine totum circulum non absolvant, parte posteriore mediantibus membranis processibus, ab extremis cartilaginum partibus eductis, ita junguntur, ut cartilagine cum hisce membranarum [t. 14. f. 2. f.] circulum perfectum, sed non exacte rotundum constituent. Tali autem substantia, non alia constitui fuit melius: si enim ex una tantum cartilagine solida, vel ex prorsus circularibus cartilaginibus constitisset, semper eodem modo aperta potuisset, quae inspirationi & expirationi difficultatem attulisset, siquidem cum pulmonibus attolli & concidere oportuerit. Non ex sola membrana confici debuit, alias membrana ob molliem concidens cavitatem non semper apertam servare potuisset: talis etiam aliave mollis substantia ad vocis generationem inepta fuisset, quo modo funes multo humore imbuti. Nam cum haec fistula non solum respirationis, sed etiam vocis sit instrumentum, ejus substantia y cartilaginosa esse debuit, & fistula modo rigida, duraque efformari, non solum ad liberiores aeris ingressum & egressum, sed etiam ad vocis necessitatem, cum sonus sine collisione durioris corporis cum spiritu exeunte fieri non possit: quod enim sonat leve ac solidum esse oportet: quo inter aerem & substantiam percussam symmetria sit & robur, quo aliquantisper aer resistat: quare soni nomine, ex sola carti-

Ii

lagi-

con-

junguntur.

Gal. 7. us. part. 4. 5. & 11. u 7. us. part. 6. x Non solum spirandi causa, sed etiam vocis, 3. part. an. 3.
y Gal. 7. us. part. 4. 5. & 11.

o Gal. 7. us.

part. 7. quare

siccitatem ob-

tinuit modera-

tam, ut vox ma-

gis esset sonora.

p. Potum ma-

reper arteriam

error est, ait A-

ristoteles, 3. par.

3. quem erro-

rem confutat,

quia nullus sit

meatus a pul-

mone ad ven-

trem, sicut ex

ore gulam ten-

dere cernimus.

Recte dicit A-

ristoteles, si de

omni poru lo-

quatur. Haec

fuit Platonis

opinio, qua de

re & Plutarch.

7. sympos. quast.

1.

q Gal. 7. us.

part. 3. at. 7.

adm. an. 5. de-

mencia ait reg-

χείρα ex χροῦ παρ

συμπεριλῶ

στυμοειδὲς τὸ

χῆμα: ita red-

dit interpret,

aspera arteria

ex cartilagini-

bus, qua litera

C imaginem

referunt, con-

structa.

qq 1. loc. aff. 1.

17. us. part. 7.

Ligamentis

membranosis

& fortibus con-

nectuntur 7.

us. part. 3. 1. loc.

aff. 1. membra-

nosis vinculis

conjunguntur.

lagine constare poterat. Sed cum vox absque inspiratione, & potissimum expiratione fieri non possit, & hæc dilatatione & contractione indigeant, necessario ex cartilaginibus & ligamentis membranosis (quo prædictos motus prompte obire possit) constare debuit. Quare dum inspiramus, ligamenta cartilaginea colligantia, tenduntur, & tantum à se cartilaginea diducuntur, quantum ipsa extenduntur: dum expiramus contra, laxantur ac duplicantur, & in seipsas concidunt, ita ut cartilaginee sese contingant, quod in mortuo si insuffletur, conspici potest. Idcirco & cartilaginee ipsæ vocis sunt instrumenta: ligamenta vero membranosa, quæ ipsas jungunt, respirationis: arteria enim ipsa, vocem laryngi præparat, cum larynx sit primum & principalissimum vocis instrumentum. Adde etiam si ex perfectis cartilaginibus annularibus constaret, non solum ab earum duritie a œsophagus, qui mollis est, laderetur, verum etiam ciborum deglutitioni impedimento fuisset, œsophagi sufficientem dilatationem impediendo, quare œsophagus quo amplius dilatari possit, intra cartilagineas asperæ arteriæ aliquo modo recipitur, potissimum in solidorum ciborum deglutitione, quod ii experiuntur, qui famelici nimium cibos minus probe manfos devorant: quare ne larynx qui totus est cartilagineus, a œsophago impedimento esset, hoc in deglutitione deorsum tracto, larynx b sursum ascendit.

27. us. pars. 5.
c. 6.

2 Gal. 7. us.
pars. 7.

27. us. pars. 5.
c. 7.

2 Gal. 7. us.

part. 3. nulla in

re dissidens aut

variant soboles

ejus omnes, sed

similiter omnes ant.

ejus cartilagi-

nes multa sig-

moides mem-

branosis liga-

mentis conten-

ta usque ad ex-

remos visceris

lobos confer-

vantur. Vesal.

perinde in pul-

monis substantia ac

caudice sese habent.

Rondeletius 3. de piscibus 11. hoc suum inventum ita explicat. Aspera arteria

dei figura sunt haud ab similes sic ordinata ut cum pos. Bo. deis, altera super alteram in medio sui steterit, utrinque in eo

quod hiat spacio sita sint, alia duæ suis angulis acutis aliarum duarum contactum attingentes: atque ita ubique & undi-

que semper inter sese disposita. & mirabiliter contexta, tenuibus membranarum revincta sunt, quemadmodum superioris

dio sui, procul a se recedentibus in pulmonum dilatactione, in eorum vero contractione angustiores, nimirum in unum se

ro ejusdem angulo duarum etiam super se stantium oppositarum contactum subeunte. Laurentius vult tantum semi-

aeris attractionem & expulsionem: & esse aliquando quadratus, in lobis tessularum more variis figuris constructa sunt:

quædam enim sunt rhomboides, alia quadrata, alia triangulares, Rioli. d. Hippocrates de loc. in hom. dum resicatur

Ubicanalis [tab. 14. f. 1. aa.] hic, in thoracis capacitatem ad quartam ejus vertebram pervenit, in duos truncos [t. 14. f. 1. c. 2. bb.] dividitur, quorum dexter dextrâ, sinister sinistram pulmonis partem accedit, qui pulmones ingressi, utrinque rursus in duos ramos ad quemlibet lobum dividuntur, hique in alios plures [tab. 14. f. 1. cccc.] quorum c cartilaginee nunc triangulares, nunc quadratae, nunc alio modo formatae per pulmones ad extremum disseminantur, quo pulmonis dilatationi & constrictioni melius se accommodent, ne obstruantur, liberaque sit inspiratio, & expiratione: & ut sreatui, tussi, d aut purulentæ aut sanguineæ rejectioni pateant. Hujus autem rami inter arteriæ venosæ, & venæ arteriosæ ramos [tab. 13. f. 1. B. C. D.] locantur, ita ut asperæ, cujus rami semper majores sunt, in medio e sint: ita tamen ut posteriore parte sit vena, anteriore vero, arteria, quæ mox à corde pulmones ingreditur, cum eam à corde longius produci propter tenuem tunicam tutum non fuerit. Utrique autem propinquam e esse oportuit, & osculis jungi: arteriæ quidem levi, ut ex aspera acri in leves liber sit ingressus ad sinistrum cordis ventriculum, & fuliginibus exitus pateat, non autem sanguini & cæteris humoribus, nisi impetu & per tussim: quare si forte à naturali e commodatione recesserint, & ali-

quo

monis substantia ac caudice sese habent. Rondeletius 3. de piscibus 11. hoc suum inventum ita explicat. Aspera arteria dei figura sunt haud ab similes sic ordinata ut cum pos. Bo. deis, altera super alteram in medio sui steterit, utrinque in eo quod hiat spacio sita sint, alia duæ suis angulis acutis aliarum duarum contactum attingentes: atque ita ubique & undique semper inter sese disposita. & mirabiliter contexta, tenuibus membranarum revincta sunt, quemadmodum superioris dio sui, procul a se recedentibus in pulmonum dilatactione, in eorum vero contractione angustiores, nimirum in unum se ro ejusdem angulo duarum etiam super se stantium oppositarum contactum subeunte. Laurentius vult tantum semi-aeris attractionem & expulsionem: & esse aliquando quadratus, in lobis tessularum more variis figuris constructa sunt: quædam enim sunt rhomboides, alia quadrata, alia triangulares, Rioli. d. Hippocrates de loc. in hom. dum resicatur quod

quod defluit in broncho concrefcens, cum non eluitur, fed fenfim influit, ac detinetur, tuffim inducit, & in Aortis deten-
sum quod influit, cum ha angufta foramina habeant, anguftiam fpiritus exhibent, eamque fpirandi difficultatem fa-
ciunt, ut ea velut deficiente femper refpirare defideret. c. 7. uf. part. 8.

quo tempore patula fuerint, ita ut vel fup aliqua, vel orificiorum apertio, vel f Gal. 7. uf.
vafis erasio in pulmone accidat, tum languinis portio aliqua ex levibus arteriis in af- part. 3. omnia
peras effunditur, qui fpiritus f facit negotium, ejus vias occupans, ficque repente vacua sangui-
tuffis confequitur, & languinis per os profufio: quod fi id, quod fenfim defluxit d in ne, quando fe-
branchii ramis, quæ angufta habent foramina, concrefcant, fpirandi difficultatem ta- cundam natu-
lem efficit, ut ea velut deficiente femper homo refpirare defideret. Venæ vero ar- ram fe habet
teriofæ, & Arteriæ afperæ rami, etiam per anafomofes junguntur, ut à vena & sangui- animal.
nem pro nutritione recipiat. Sic ergo arteriæ leves e arterias afperas cordi jungunt, g Arift. 3. par.
& venarum parvæ propagines afperis inferuntur, quo alantur, f cum sanguine om- 3 Gal. 7. uf.
nino careant: levibus autem e non inferuntur venæ, cum ipfæ sanguinem contineant. h Natura car-
Verum & vafa b exilia à vicinis vafis ipfa afpera obrinuit. tilaginis arte-
Glandulæ quoque huic canali infra laryngem fubfternuntur, quæ fape ita intu- ria conflat &
mefcunt ut liquidioribus viam intercludant, talibus enim glandium fubftantia fun- fanguinis per
gofa magis impletur, folidioribus comprimendo viam fibi parantibus. quam exigui
Ufus, i ut pulmones tanquam gemini folles, per eam tanquam per cannam feu nulis complexa
fiftulam, in refpiratione aerem per nares aut os attractum & infpiratum attrahant tenuibus, Arift
(dilatato enim pulmone fola k Afpera arteria dilatatur) cordique demandent, & per 1. hift. 16.
eandem constrictam, à pulmonibus rurfus aerem cordi inutilem, una cum fuligino- i Vocem & ha-
fis excrementis feu fumidis vaporibus, expirando expurgent, & per os aut nares litum trans-
reddant. Dein, ut vocis instrumentum fit, fi quidem ad vocis generationem, quæ in mittit. 1. hift.
larynge fit, aer, qui expiratur, & propria l vocis est materia, requiratur, quemadmo- 12. non folum
dum in fiftulis folium aere repletis fonum fieri advertimus: quare organum fpirabi- fpirandi causa
le & vocale m Hippocrates vocavit. Tum etiam ut tuffi vel fcreatu exufflatione ve- est, fed etiam
violenta, ea quæ vel à capite delapfa, vel in pulmonibus collecta funt, per eam rejici- vocis. 3. part.
antur: Si modo præ nimia crassitie vel vifciditate fieri poffit: ut in Asthmaticis, in qui- an. 3. vocis fi-
bus vel materia calculofa, vel inftar picis crassâ & vifcida colligitur, quæ dum in pul- mul ac refpi-
monum fubftantia hæret, paroxysmum fuffocativum, non caufat: at quamprimum rationis instru-
unam ex majoribus fiftulæ ramis obturat, fuffocationis periculum minitendo Asth- mentum est
maticum paroxysmum inducit, qui tam diu durat, donec materia vel tuffi rejiciatur, Gal. 7. uf. part.
vel in pulmonum fubftantiam remigret: quæ causa est, quod aliqui multis annis 5. & 6.
Asthmatici quidem funt, non tamen femper paroxysmum habent. k Gal. 7. uf. part. 9.
l 7. uf. part. 5.
m 4. de morb.

De Oefophago.

CAPUT XXIIIX.

Gal. de oefophago seu stomacho egit 6. uf. part. 5. & 6. de ipfius tunici & fibræ 4. uf. part. 8. Arift.
1. hift. 12. & 16. 3. ejusd. 17. & 3. part. anim. 3.

Oefophagus, qui Græcis a οισοφάγος ab οἷον καὶ φάγνμα, id est, cibum fero, no- a Arift. 1. hift.
men habet: & σφαγος b quali σενόμαχος, ἀπὸ τῆς μήνης καὶ τῆς σενόματος, à lon- 16. 2. ejusd. 7.
gitu- 3. part. 3. Gal.
6. uf. part. 5.

Hippocrates solum lib. de resect. corp. alibi vero stomachum appellat. b Hipp. de nat. off. de carn. de cord. Arist. 1. hist. 13. 3. ejusd. 17. ubi Gaza gulam vertit Gal. 6. us. part. 6. & 13. meth. 17. stomachus pleura significat, interdum superiorem œsophagi partem, que proprie gula dicitur, ut apud Homerum: interdum ipsius partem inferiorem, id est, orificium ventriculi sinistrum, ut apud Gal. 13. meth. 17. interdum ventriculum, ut cum ad Glauco. eruditates in stomacho fieri scribit. Hippocrates & os uteris vocavit. c Arist. 1. hist. 16. alii πνεύματι τῆς γαστρῆς, quod stomachus cibum inferiore orificio ad intestina transfundat: quidam δὲ τῆς γαστρῆς & τῆς χολῆς.

d Cicero de nat. deorum Celfo, Laetantio, cibaria fistula.

e Gal. 6. us. part. 5. sic Aristoteles qua cibum & potus deriva-

tur 3. part. 3. f Arist. 2. hist. 15. & qua colu-

lum habent. 2. part. 3. 4. hist. 3.

at pisces magna ex parte carent

stomacho, ut qui annexum

ori ventrem habent. 2. hist. 17.

g Celsus faucibus subesse scribit.

h Cicero 2. nat. deorum: at Hipp. de resect.

corporis, à lingua initium su-

mens in ventriculum defi-

nit.

i Gal. 13. meth. 17.

k 6. us. part. 5. & 6.

l 6. us. part. 6. m Cum Hipp.

voluit Galenus s. ad. an. eodem

cum Arteria magna forami-

ne uti Arist. hist. 16. per sepeum transversum in ventriculum finit.

n Aliqui angustiores putant qua ventriculo continuatur, quam in ceruice, existimantes ab atrabile à liene in ventriculi os eructata, colligi, quod falsum est, Vesal.

o Gal. 7. us. part. 7. p Carnis speciem refert, Arist. 1. hist. 16. ex carne & nervo. 3. part. 3. nervosa membranae, Ves.

membranae, nervosa & exanguis, Columbo: nervosa & membranosa, Varolo. q Aristot. 1. hist. 16. r Gal. 13. meth. 17.

rudine & angustia dicitur; Latinis d stomachus & gula: Arabibus Meri & Vescet nominatur.

Est ciborum & potuum ab ore e in ventriculum via communis, quem omnia f spirantia habent: hic in ima faucium & cavitate [tab. 39. lib. 1. f. 1. & 2. A. œsophagi à suis cibibus præfecti orificium.] ad h linguae radicem post laryngem, cui annectitur, principium sumit, & utraque ex parte tonsillas [t. 39. lib. 1. f. 1. EE.] attingit & collum, thoracemque pervadens inter asperam arteriam [t. 13. f. 1. & 2. A. œsophagum, B. arteriam notant.] & vertebrae cervicis ac thoracis, quibus i insidet (non enim per medium thoracis finem amplum elabi, sed in firma aliqua sede conquirere debuit, partim ne aliquod instrumentum spiritus offendatur, partim ut ab externa injuria tutissimus sit) reclinatae que tab. 39. lib. 1. f. 1. & 2. ab A. ad B.] delatus ad quintam k thoracis vertebrae non nihil se in latus dextrum [tab. 39. lib. 1. f. 1. à B. ad C.] inclinat, quo Arteria magnae trunco descendenti l cedat, cum ea ex sinistro k cordis ventriculo prodiens sinistrorsum necessario vergat: mox ad nonam vertebrae membranae beneficio l sublimis admodum elevatus, supra Arteriam magnam, ne in crassiorum l ciborum transitu eam comprimatur, sanguinisque & spiritus transitum prohibeat, rursus ad sinistram [tab. 39. lib. 1. f. 1. à C. ad D.] cum eo in loco os ventriculi superius dictum [ta. 39. lib. 1. f. 1. & 2. G.] sit constitutum, transit: & sub vena cava delatus, nervosam diaphragmatis partem per proprium m foramen, inferiorem ventrem subit & circa undecimam thoracis vertebrae ventriculi orificio sinistro (non dextro ne hepar perforare cogatur) una cum duobus nervis [t. 39. lib. 1. f. 1. & 2. T. V.] implantatur. n

Connectitur ex ortu suo faucibus per tunicam os succingentem, & ventriculo (ubi & diaphragmati connascitur) per corporis continuitatem: vertebrae vero corporibus, asperae arteriae & vicinis partibus, beneficio membranae ex dorsi ligamenti prodeuntium.

Figura [t. 39. lib. 1. f. 1. & 2.] rotundus est, & quo per locum o minorem materia plurima feratur, & quo ab injuriis tutior sit: oblongus, cum os à ventriculo procul distet, qui instar intestini cujusdam prae-rubri distenditur, capaxque redditur, ne cibi in eo subsistentes & asperae cavitatem non nihil occludentes respirationem impedi-

ant, suffocationisque periculum inducant. Substantia ipsius inter carnem p & nervum media est (quare & inflammari & convelli potest) nervosa quidem seu membranosa, ut extendi possit in q longum latumque, cum cibis ingeritur, rursusque concidere: carnosa, ut mollis sit & cibo descen-

descendenti cedit: ne autem ob ejus molliem in seipsum cibo superveniente concidat, extensus detineri debuit; quemadmodum saccus frumento replendus, nisi manibus sursum elatis extensus teneatur, transitum non admittit: quare œsophagus vertebrarum corporibus cohærens convenienter extensus remanet: & cum spinæ superjaceat, idcirco ipso affecto, cataplasmata supra spinam dorſi applicari debent.

Tunicis tribus donatur, una communi & duabus propriis: prima, à ligamentis vertebrarum enata, quæ duarum propriarum involucrum existit. Altera, quæ externa dicitur, carnosa & admodum crassaque ac si musculus esset perforatus, à secunda cartilagine laryngis, quæ cervicem spectat ortum ducit, & tantum transversis fibris donatur, ut his alimenta ab interioris tunicæ fibris attracta, promptius in ventriculum trudan- tur, quæ & ventriculo in vomitu quippiam, quod illum gravat, magna cum violentia expellente auxilio sunt: quæ duo diversa ratione fiunt. Si enim fibræ superius contrahi incipiant, degluti- tioni: si à ventriculi orificio, vomitui inserviunt. Tertia est interna & dissimilis substantiæ, cujus intimæ superficiæ veluti velum, quod laxe & labricum est subtenditur, fibris rectis & tenuissimis donatum, quo alimentum ab ore susceptum attrahant: reliqua vero substantia à qua velum illud instar cuticulæ à corio separari potest, nervosa est, & ac ipsa externa membranosa, durior & sensibilibior, quod esculentorum & potulentorum suavitas tactu sentiat: & hæc continua est ei, quæ palatum, os, labia, faucesque vestit & usque ad ventriculi orificium sinistrum fertur: fibris obliquis pene caret, ne ab his cibis diutius in œsophago retineatur, quod utriusque arteriæ impedimento foret. Quo vero hæc recte confici possint, aliquantisper, quo nimia humiditas absumatur, elixari debet.

Quomodo vero deglutitio fiat inter auctores non convenit, Galeni enim sententia fuit talis: cibum & potum ex ore in ventriculum deduci, initio sumpto à primo impulsu in eodem ore facto, partim à facultate tractrice tuni- cæ interioris tam ventriculi quam œsophagi, quæ per fibras rectas fit, partim beneficio fibrarum transversarum in œsophagi tunica exte- riore sitarum, dum eæ contrahuntur & constringuntur, quæ superius incipiens, cibum potumque depellunt: hanc autem facultatem tractricem ventriculi tanto evidentius apparere, quanto frequentius & edimus & bibimus: sicque totam actionem naturalem vult, quæ beneficio fibrarum absolvatur. Verum cum deglutitio ab arbitrio & voluntate nostra dependeat, idcirco animale- m dicimus, quia cibos cum volumus deglutimus: & si imaginatio aut facultas appeti- trix lædatur, vix deglutire possumus: sic rerum ingratarum, vel medicamentorum, vel etiam ciborum deglutitio difficilis est, licet in instrumentis vitium nullum sit.

II 3

Hanc

x Triplici fi-

brarum genere donata, Fallop. y Arist. 4. part. 11. z In ore & faucibus musculos degluti- tioni dicatos natura locavit, qui à Fallopio eleganter describuntur, quorum ante Avicenna meminerat.

23 nat. fac. 8. DEGLUTITIO qualis actio I. opinio Galeni est, esse naturalem quæ beneficio fibrarum absolvatur, uti in textu dictum: addunt, in vehementissima fame ventriculum sursum ferri & cibum rapere: quod in piscibus grandioribus voracibus dum prædam persequuntur observatur: idem Gal. l. c. & Arist. 2. hist. an. 17. & 8. ejusd. 2. & quia nullus musculus œsophagum amplexetur.

II. Erasiarati, à solo impulsu in ore facto in ventriculum, nullam enim vim attractricem in ventriculo videri. Gal. 1. nat. fac. 16. III. esse animale- m actionem, cum musculus perficiatur.

IV. Apum œsophagum musculum esse veteres affirmarunt. Gal. 1. mot. musc. 3 & Avicen. c. de gula affirmantibus, utentes exemplo piscium allato: at in hominem cum œsophagus sine firmiter per ligamenta adnectatur, motus hic fieri non

vide 4. us.
part. 8.

Externa car-
nosior trans-

versos villos
habens 4. us.

part. 8. crassior
mollior prope-

modum muscu-
lorum natura

carnosum visi-
tur. Vesal.

u Membrano-
sior villos re-

ctos superne
deorsum ten-

des habet,
siquidem ven-

tricularum tra-

hat oportet ad
seipsum per sto-

machum cibum
propellere tan-

quam manibus
rectis his villis,

propellit vero
transversis 4.

us. par. 8. ner-
vosior, durior,

pauloque te-
nuior, Vesalio:

nervosa Fal-
lop. crassior mul-

to externa, Co-
lumb. crassior

& nervosior,
Laur.

non potest. V. esse actionem ex naturali & animali mixtam: naturalem, quia expulsiōe & attritiōe fiat: expulsiō à fibriscircularibus in externa ejus tunica, quarum contractiō, si ab ore oriatur deglutiōi, si à ventriculo orificiō sursum, vomitiōi inservire: animale quia musculos habet.

a Gal. de diff. muscul. duos faucium musculos describit: mēminit & Orib. & Avicēn. à Fallopio eleganter describuntur.
b Vesal. Fallop. & Aquapen. communium tertium par. Columbus unicū esse vult, & pro tertio habet.

Hanc ob causam natura deglutionis musculos^a creavit, & quidem paria quatuor in faucibus (de quibus l. 3. c. 86.) collocavit: quamvis & œsophagæi (tertium par^b musculorum Laryngi communium) quatenus œsophagum circulariter ambiunt & in seiplos contrahuntur, motu voluntario etiam deglutioni inserviant. Nam quemadmodum intestini recti fini musculus circumjectus est, ne invitis fæces excident: sic in ore & faucibus musculos deglutioni inservientes locavit. Quando ergo aliquid deglutiendum est, omnes quidem faucium musculi adjuvant, sed imprimis musculus œsophagum ambiens, qui œsophagi sphincter dici potest, & communium laryngis tertium par censetur, cibos per masticationem & linguæ auxilio conglobatos, fibris suis contractis deprimit: hujus enim fibræ ab œsophago ad laryngem tendentes transversæ redduntur, quod cum fit, larynx attollitur & œsophagus deprimitur ejusque cavitas angustatur: huic quartus succurrit, qui se contrahens ex anterioribus illi veluti occurrit, & ne assumpta recedant, omni ex parte cohibet & in œsophagum transmittit, ut ita utroque musculo constricto fiat veluti circulus integer & sphincter perfectus.

Quod vero interdum liquida non ita facile ac solida deglutiantur, liquidis in nares repulsis, quod in iis qui colica diu laborarunt frequens est, causæ variæ sunt: ut est musculorum faucium in colica, musculorum ossis hyoidis resolutio vel etiam convulsio, in iis qui de nulla re alia conqueruntur: vel musculorum sive faucium, sive laryngis inflammatio in Angina: vel glandularum in faucibus tumor & inflammatio: in quibus affectibus solida pondere & gravitate musculis vim aliquam inferunt & comprimendo cavitatem efficiunt, non vero liquida: nonnunquam etiam carunculae fungosæ œsophago intrinsecus adnatæ, vel epiglottidis erosio id causare possunt.

Quo vero facilius fit deglutitio, cavitas ipsius semper humore à glandulis adpositis imbutur: in faucibus quidem, à glandulis [*t. 39. lib. 1. f. EE.*] œsophago & Laryngi communibus salivam continentibus, quas Tonillas vocant: dein à corpore glanduloso [*tab. 39. lib. 1. f. 1. & 2. FF.*] quod parte posteriore & ad latera ejus medio ductui adnascitur, & ut ejus cavitatem semper humectet, & ut à vertebrarum durtie tueatur, ne facile œsophagus in alterutrum latus moveatur.

Venas habet paucissimas à Cava & venæ portæ ramo [tab. 39. lib. 1. f. 1. & 2. dd.] coronario: Arterias ab Arteriâ magnâ trunco descendente, & à Cœliacâ [tab. 39. lib. 1. f. 1. & 2. dd.] ramo coronario, Nervos insignes à sexto pari [t. 9. f. 1. s. t. uu. & t. 39. lib. 1. f. 1. & 2. T. V.] qui oblique^d securitatis gratia deferuntur, (cum via obliqua multo tutior sit recta:) molles enim cum sint ac tenues, cum longo intervallo ducendi fuerint, & à ventriculi tum mole tum pondere extendantur, facile, si recti ducerentur, disrumperentur) & circa cœsophagum prius^d involuti, demum [tab. 39. lib. 1. f. 2. x. r.] ventriculo infiguntur.

Ufus ut per eum veluti per ^e infundibulum cibus ^f & potus nonnihil in ore con-
fecta,
e Hipp. de Cor-
de o 509, 745
ἐκ τοῦ στόματος ὅθεν ποτὶς ἐκπίπτει, ὅθεν καὶ οὐδὲν ἐκπίπτει. f Gal. 3, nat. fac. 13.

fecta, linguæ motibus retrorsum ad oesophagi initium detrusa suscipiat, & contractis faucibus, partibus infra cibum dilatatis, supernis vero contractis, deorsum pellantur, & in ventriculum detrudantur.

De Musculis & Nervis in Thoracis Cavitate sitis.

CAPUT XXIX.

Explicatis partibus in Thoracis cavitate contentis, iisdemque remotis, occurrunt adhuc Musculi, Nervi, & ossa. Musculi duo cervicis seu colli longi [t. 15. A.B.] dicti, qui sub oesophago siti vertebra affixi sunt. Qui vero ad latera & posterius, caput collumque extendentes siti sunt, supra cap. 6. recensuimus.

Nervi etiam duplices per thoracem feruntur, alii à sexto pari medullæ [tab. 9. f. 1. ostendit.] cerebri: alii à spinali medulla, quæ vel in cervicis, vel thoracis vertebra est, prodeuntes, de quibus supra cap. 19. dictum fuit.

De Ossibus Thoracis.

CAPUT XXX.

Ossa thoracem * constituentia sunt parte quidem anteriore, os pectoris ad cuius partem superiorem Claviculæ duæ adpositæ sunt; partibus lateralibus, Costæ viginti quatuor, de quibus dictum fuit cap. 8. 9. & 10. & parte posteriore sunt vertebra & scapularum ossa, de quibus nunc agemus.

De Vertebra seu spondylis dorsi vide Gal. lib. de oss. c. 9. & 13. usque partium 7. de earum productionibus 12. usque partium 16.

Thoracis seu dorsi vertebra^a in homine magna ex parte duodecim sunt [t. 18. f. 1. sunt. Rioli. At lumbi magis carnosius sunt quam dorsi sed diversa ab aliis duodecima vertebra articulationis, omnis motus qui supra eam perficitur causa est, quia superne excipitur ut in aliis vertebra rum articulationibus observatur.

Hæ corpora habent in medio protuberantia, rotunda, convexa [t. 16. f. 1.] sunt. præterea habent in medio protuberantia, rotunda, convexa [t. 16. f. 1.] sunt. præterea habent in medio protuberantia, rotunda, convexa [t. 16. f. 1.] sunt.

^a Vertebrae σπονδυλῶν, vocant. Arist. 3. hist. 7. & Galenus. b Gal. 8. ad. an. 1. c Gal. de ossib. 9. d An plures sint vide 12. usque part. 11. & 12. c De spina cartilaginib. & ligamentis agitur 12. usque part. 15. de ligamentis quoque 13. usque part. 8.

pra infraque [t.16.f.1.2.3.4.A.] plana & cervicis vertebris crassiora, minusque solida, foraminibus exiguis referta, pro vasorum nutrimentum deferentium transitu. Processus habent spinales [t.16.f.1. & 2.N.O.P.] longos, simplices & acutos, deorsumque spectantes: dein etiam transversos [tab.16.f.1.2.3.4.H.I.] qui ad firmiorem costarum articulationem crassi sunt, solidi, longi, in rotundum capitulum desinentes:

f Decima vertebra in cane & simia, est media vertebrae dorsi, sed in homine duodecima, quare Galenus decimam id tribuit, quod duodecimam tribuendum, ait Columbum.

tum ascendentes duos [t.16.f.1.T.V.] & duos descendentes [t.16.f.2.3.a.b.] f undecimæ tamen ac duodecimæ transversos [t.16.f.4.e.f.g.h.] processus à cæterarum processibus variant. Appendices quinque habent, duas ad ipsarum corpus supra [tab.16.f.3.Φ.] infraque duas ad transversos processus, & ad cujuslibet spinæ extremitatem unam. Harum autem foramina [t.16.f.2.3.4.G.] crassitudini medullæ quam continent, æqualia sunt; prout enim descendendo attenuatur, eo inferiorum vertebrarum foramina minuuntur.

Sed de his ut & cæteris ossibus plenius in commentariis nostris in libellum Galeni de ossibus egimus, quos suo tempore emaculatos publici juris facimus. At de thoracis ligamenti vide infra lib.4.c.10.

De Scapularum ossibus.

CAPUT XXXI.

De his vide Gal. lib. de off. cap. 14. & 13. usu part. 10. & 12.

Scapulæ ^a ὀμοπλάτη ^b Græcis [t.16.f.7.8.9.] utrinque unum est, quod posterius summis costis instar alicujus scuti, propugnaculi causa, ^c insidet & cum humero (cujus articulationis ^c gratia potissimum creatum, & ut ab eo plerique brachii musculi ortum ducant) & clavicula articulatur: & cum ^d costis, osse Hyoide & occipitio musculorum interventu, ^d jungitur. Figura, trianguli quodammodo imaginem exprimit; internæ [t.16.f.7.M.] concavum, externæ [t.16.f.8.VV.] prominens, quæ basis dicitur; hæcque & angulum [t.16.f.7.8.9. angulus superior] & costam habet superiorem & inferiorem, à qua & spina [t.16.f.8.9.G.H.] sursum producitur.

Processibus tribus donatur, quorum primus brevissimus, brevique ^e cervicis [tab.16.f.7.8.C.D.] in acetabulum seu caput [t.16.f.7.8.A.B.] sinuatum desinit, quo humeri caput excipiat, quod ^f cartilago [tab.16.f.8.ε. & K.] crassior cingit, sinumque auget, ne facile humeri caput excidat. Alter, qui spinæ extremum est, super humeri articulum prominens; quare ^g ἀκρόμιον [tab.16.f.7.8.9.K.] humeri mucro, & summus humerus dicitur, quo processu cum clavicula jungitur. Tertius, interior & minor [t.16.f.7.8.E.] qui à forma στυμοειδής & à similitudine cum altera anchoræ parte ^k ἀγκυροειδής, nonnullis ^h ἡγεγεειδής, quod instar rostri corniculæ incurvetur, dicitur: hicque humeri os in sua sede continet.

Appen-

tertium esse os aiunt, quod in ipsis tantummodo hominibus deprehendatur, quod ἡγεγεειδής & acromion vocent. Non ex sua sententia Galenus loquitur, ut voluit Columbus. ^e De off. 14. cervix scapula 13. usu part. 10. ^f Gal. de off. 14. os scapula majori ex parte cartilagine, sed uberius in imo contigetur. ^g Sic vocari Hipp. huius articuli superiorem partem, ait Columbus. & hoc fere omnia animalia cavere, quæ claviculis careant. Laurent. dixit Hipp. acromion etiam ipsam articulationem clavicula cum scapula appellare. ^h Gal. de off. 14.

Appendices quinque obtinet: quarum tres ad latus internum & ad basin [tab. 16. f. 7. 8. 9. X. r.] musculis nonnullis principium tribuentes: duæ vero, ex quibus ligamentaⁱ prodeunt, quæ humerum scapulæ capiti & claviculam ipsius acromio jun-ⁱ gunt, de quibus infra lib. 4. cap. 5. Cavitas duplex altera supra, altera infra spinam inter scapilium dicta.

Est quoque scapularum in tenuitate & crassitie inæqualitas, cum in medio sint tenuissimæ, in processibus vero crassæ, medullofæ & fungosæ: foramina quoque habent, quæ venas & arterias pro earum nutritione admittunt.

De colli, seu cervicis vertebriis.

CAPUT XXXII.

De his consule Gal. lib. de off. cap. 8. de vertebriis vero egit 12. usque part. ad finem usque & primis capitibus lib. 13.

Cervix, quæ creata est, ut & caput fulciat, & ad ejus motus conferat, ex pluribus ossibus quæ^a σφόνδυλοι seu vertebrae dicuntur, constat, quo per eas spinalis medulla à cerebro feratur, communiter septem^b sunt [t. 17. f. 2. 3. 4.] & inter se & à cæteris spinæ vertebriis differentes, quarum duæ primæ occipitio ligamentis^c junguntur, quo caput cum cervice firmissime cohaereat. Harum prima [t. 18. f. 2. 3. 4. t. 17. f. 2. 3. F. F.] Atlantis nomine insignis, cæteris est tenuiore sed densiore corpore, processu superiore, seu spina caret: ne duo parvi capitis musculi lædantur: sed processus^d ascendentes & descendentes, ut & cætera vertebrae, habet, qui in hac utrinque excavati [t. 18. f. 2. 3. E. F.] sunt: superne quidem, & occipitii processus [tab. 17. f. 1. B. C.] duos ad capitis motum^e excipiat: infernæ vero ipsius secundæ [tab. 18. f. 5. 6. M. N.] vertebrae habet quoque ad latera duos transversos processus [t. 17. f. 2. 3. l. t. 18. 2. 3. 4. G. G.] perforatos [t. 17. f. 2. K. t. 18. f. 2. H. foramen ostendit] pro venarum & arteriarum in cerebrum ascensu. Sinum quoque [t. 18. f. 2. 3. B.] obtinent, cartilagine [t. 18. f. 3. 4. C.] incrustatum, quo sequentis vertebrae dentem [t. 18. f. 7. O.] suscipiat, & ad processum, ubi vertebrae committuntur, sinus est utrinque in prima [t. 18. f. 4. Z.] quidem, & secundum sex nunc cunda [t. 18. f. 6. T.] rimæ formam habens; in reliquis orbiculari, in thoracis vero oblonga figura, per quos nervorum paria transeunt, venarum item & arteriarum rami, nutrimentum medullæ & ossibus subministrantes. Altera vero vertebra [t. 17. f. 2. 3. N. t. 18. f. 5. 6. 7.] præter corpus, processus laterales [tab. 18. f. 5. 6. 7. b.] breviores & obliquo foramine [t. 18. f. 7. 10.] donatos, processum posteriorem musculorum gratia^e bifidum [t. 18. f. 5. 6. 7. A.] & processus ascendentes leviter extuberantes ac descendentes [t. 17. f. 2. R. t. 18. f. 6. 7. d.] leviter sinuatos, è medio ipsius corpore appendicem (vulgo processum dicunt) rotundam ac longam [t. 17. f. 2. 3. 4. O. t. 18. f. 6. Q.] emittit, quæ cum caninum hominis dentem referat, ὀδοντοειδὴς & ὀδὸς, dicimur, (at Hippocrates^f totam vertebrae dentem appellavit ex cujus luxatione Angina sæpe insanabilis fiat) aliis ὀντοειδὴς & à vertendo, quod circa eum caput^h circumclinari, e Cum in similia integra sint, ignoravit Galenus, nisi Columba. f 2. Epid. g Laur. hoc nomen prima etiam tribuit. h Columbus Galenum etiam in hoc reprehendit.

K k

cum

caput modo inclinari, modo

cumducatur: quæ superficie nonnihil est aspera, ut inde ligamentum prodeat [t.17.f. 5.E.] quo occipiti alligetur; cui & ligamentum teres [tab.17.f.5.K.] ac solidum circumjicitur, ne medulla comprimatur: jungitur etiam cum prima ligamento [t.18.f. 5.F.] latissimo orbiculariter circumjecto. Tertia vero [t.17.f.2.3.S.S.t.18.fig.8.& 9.] quæ αζων nominatur (& cum reliquis quatuor anterioribus nexu firmissimo constricta coalescit) cum tribus sequentibus, processus laterales bifidos [t.17.f.2.VV.f.4.β.] habent, propter musculorum implantationem, at septima [t.17.f.2.3.4.char.7.] cum thoracis vertebris convenit, ejusque posterior processus non semper bifidus [t.17.f.2.4.X.] est, sed etiam integer, corpus vero inferne planum est, quo sequenti æqualiter jungatur. Omnes vero, prima excepta, appendicibus donantur, quas cartilagineas crassas ac molles, quo facilius moveantur, intercedunt.

De Ligamenti vertebrarum, infra lib.4. cap.10. agetur.

FINIS LIBRI II.

De

DE CAPITE, SEU VENTRE TERTIO ET SUPREMO.

LIBER III.



ABSOLUTA Historia partium Naturalium, quæ in infimo ventre continentur, & vitalium, quæ in Thorace seu medio ventre sedem habent, nunc Caput seu supremum ventrem, qui partes animales complectitur, tanquam arcem corporis nostri, unde cæteræ partes reguntur, perlustremus.

De Capitis nomine, situ, forma & partibus.

CAPUT I.

Cur creatum sit Caput, ostendit Galenus 8. us. part. 2. 4. & 5. ac de situ & forma egit Aristoteles, 1. hist. animal. 15.

Tertius venter Caput dicitur, quod ab eo sensus initium^a capiant; Græcis κεφαλή, à καὶ τὸ κενοφώδην, à cavitare; est autem proprie torum id, quod collo superimpositum prima vertebra terminatur. In sublimi situm est, secundum Platonios quidem, quia intellectum, tanquam reginam facultatum in sublimi attolli debuit, à quo & irascibilis & concupiscibilis regerentur: Est enim in homine Caput, quod in mundo Cæum: quam ob causam Egyptii, Serapidis * simulacro, alias humana specie, pro capite cælum imposuere, cuius imagine, capitis divinitatem representare voluerunt: quare cum divinißimum corporis membrum existat, Jovem, quemadmodum cæteris singulis membris, minores Deos præfecerunt: secundum Galenum vero, Oculorum^d causa; non tam ut ipsi securi sint ab omnibus injuriis, quam ut suo munere tuto fungantur; cum eorum actio editum locum postulet, si quidem speculatorum loco sint, qui muros, montes, altas turres & navium mala conscendant; motus contemplatione oculorum cancrorum, scarabeorum, locustarum, & testaceam cutim habentium, & quorundam animalium, quæ capite destituntur;

a Varroni ad Cic. vide lib.

nost. de partib. exter.

b μὲν τὸ κενοφώδην, quod est inarescere, Appiani interp.

cum ossa plurimum sit inarescere.

d Apollo doro ἀργυρῶν, quod est operio, cum cerebri sit tegumentum.

eius, quod ibi κεφαλή τὸν φῶν,

Kk 2

*id est, sedeant lumina. c' Caput cavum & rotundum suprema parte positum est, Hipp. de gland. * Eustachio apud Homer. d 8. us. part. omnes fere auctores Galeno subscribunt. A verroes vult Galenum statuisse, caput propter oculos supremum locum occupasse. At Columb. cerebri potius gratia, quam oculorum: potuisset, ut caput in duos prominentes processus duntaxat diduci, quibus oculi insiderent. Laur. solius cerebri gratia caput creatum: & Gal. l. c. propter cerebri factum caput, plurimis visum, atque ob causam sensus omnes in se continere, tanquam servos quosdam & magni regis stipatores.*

2. n. f. part. 5.

f Cerebri gra-
tia caput non
factum est, 8.
n. f. part. 4. so-
luis cerebri gra-
tia factum.
Laur.

g Orbiculari:

figura torna-

tum est, Laur.

h Arist. 1. hist.

an. 16.

i Arist. 2. par.

an. 10.

k Cerebrum est

principium ner-

vorum & sen-

sus omnis mo-

tusque volun-

tarii, 8. n. f. part.

4. & de placit.

l Hippocrates:

naturalis for-

ma causam in-

obstetricis re-

fecisse videtur

lib. de aere, a-

quis & locis.

asserens aliquos

existimasse ob-

longa capita es-

se pulchra, ideo

in puerulis ea

compressisse, &c.

m Homini quā

ceteris anima-

libus multo

maius, Laur.

n Phyllognomi parvum caput, praecipue & temerarium ingenium arguere affirmant, ob spirituum paucitatem, qui au-

gusto loco inclusi, sine modo incallescunt, nec libere exspantur, Laur. o. Hinc Hipp. 6. Epid. ex capitis magnitudine,

naturam ossium aestimare jubet: non quod oriantur ossa à capite, sed quia ossa omnia proportionem ossibus quibus articu-

latur, respondeant. At Arist. in problem. hominem dixit animal prudentissimum, quia parvum & breve caput ha-

bet: sed per parvitatem, externam ossium & carnis tenuitatem, intelligit, non internam cavitatem, Laur. p. Arist. 1.

hist. 7. calva pars anterior, sinciput: posterior, occiput: media vertex & Polluci.

untur; quibus cum nullum sit caput, in quo oculi locentur, quo longius prospiciant, processus quosdam prælongos. Natura largita est, qui capitis loco essent, & qui tunica testacea, & durissima ab earum cute prognata obducantur: ita tamen, ut si rei alijus occursum metuant, aut actione earum non indigeant, oculis in pectus receptis, tuto quiescant: at hominis^f oculos molles, ob corporis substantiam & membranam circumnata[m] mollem, prælongis cervicibus imponere periculosum erat. Quamvis etiam hic situs, & auditui & olfactui utilis sit; siquidem & soni, & odores, in sublime ferantur; quare dum quid vel videre, vel audire cupimus, si quid obster, locum altiore[m] iis sensibus maxime idoneum, tanquam à natura edocti, conscendere solemus. Imo cerebri gratia, ne ratio in ipso ab irrationali, quæ in corde est, conturbetur: & cum oculi propter visum, nervos molles & breves requirant, Cerebrum ab iis separari non debuit, ne nervi molles ulterius producti frangantur, aut ob viæ longitudinem plus æquo indurentur. Quare^e Cerebrum, propter oculos in capite locari debuit, reliqua vero sensoria, cum etiam mollia sint, propter Cerebrum in capite locantur; quamvis & ea altissimam sedem, uti dictum, opportune sortiantur.

Rotundum⁸ est (non ad amissim circularē) instar sphaeræ compressum, & ali- quatenus oblongum; rotundum quidem, quia homo ad universi^h orbis habitum institutus est; idcirco etiam partem istam parti sublimi universi^h respondentem habet; solus enim homoⁱ animalium erectus incedit: & quia, ut voluere Platonici, animæ domicilium est, & anima ex cælo rotundo nobis infusa est. Dein, quia mem- bro nobilissimo figura debetur nobilissima; cum enim animæ & rationis sensus^k & motus voluntarii sedes sit, & in quo spiritus animalis, ex vitali per arterias carotides elato, ad sensum & motum per nervos in totum corpus deferendum, generetur, merito membrum nobilissimum censetur. Tum, ut sit capacious ad cerebri mole[m] insignem, quæ in homine est, continendam. Quirto, ut cum inter omnes partes primum sit, quod periculis subijcitur, injuriis minus sit obnoxium; cum hæc figura sit capacissima & validissima. Et tandem, ut facilius & celerius in omnes partes circumverti possit.

Compressum^l vero est ad latera, sed magis antrorsum; & oblongum, quoniam à cerebro, ejusque medulla in calvaria contentis, plures nervi ordine prodeunt, idcirco longitudo hæc requirebatur. Quare cerebri potissimum gratia, caput creatum, talem magnitudinem & figuram accepit; siquidem pro calvaria figuræ diversitate, cerebri constitutionem Phisici dijudicent. Magnitudo non omnibus eadem est, hominique satis^m magnum, propter ampliore[m] cerebri mole[m]; parvum veroⁿ semper vituperatum, & materia inopiam, formatricisque imbecillitatem arguit. Magnum vero caput, proportionem ad totum corpus habita, semper^o laudatur.

Dividitur caput in duas partes, alteram capillatam, glabram alteram: capillata, quas *τρυχώδης*, clava, dicitur: glabra vero, *οἰσσωπύ*, facies nominatur. Calva, quæ sua *φύσις*, p. à cavitatem & rotunditate dicitur, est tota superior, anterior usque ad frontem, tem,

tionem & conservationem, quatuor requiruntur. Materia ex qua generantur, calor tanquam causa efficiens, locus conveniens, in quo generantur, & alimentum conveniens, quod ipsis adponitur.

^e Humiditas ipsa, Hipp. de natu. pue. & Hipp. de glan. in prin.

Materia alia remota est, alia proxima; remota est superflua ^e humiditas, quam glandulae, ^d quæ partibus multa humiditate præditis adpositæ sunt, ebibere & absorbere non potuerunt, quæ ad superficiem cutis pilorum generandorum gratia protruditur; quare ubi glandula, ibi etiam pilus; nam & glandulas & pilos ejusdem utilitatis gratia creatos esse, Hippocrates ^d docuit: illos quidem, ut quod influit, excipiant: pilos vero, ut ex glandulis opportunitatem nacti producantur & augeantur, quodque in extremas partes redundat & expellitur colligunt: sic ad utramque aurium partem glandulae, pili quoque ibidem: sub alis & glandulae & pili sunt: inguina & pubes non secus ut alæ, glandulas & pilos habent. Quod vero in aliquibus partibus glandulae sint, non autem pili, humoris copia ^d in causa est: nam in ^d humidis terræ locis semen non nascitur, neque sursum emergit. Proxima materia dicitur ^e fuliginosus, crassus, & terreus vapor, qui in tertii alimenti coctione, dum in partium alimentum convertitur propter actionem caloris elevatur, & poros cutis pertransit.

^e Gal. 2. temp. 3. aculei, pili & reliqua generis ejusdem excremento nascuntur, 5. gen. an. 3. ungues, pili, cornua, rostra avium & calcaria & si quid ejusmodi aliud est, ex cibo gignuntur adventitio & auctivo, quem tum a foemina, tum de foris sibi acquirunt, 2. gen. an. 6.

^f Hipp. de carnib. Varolio sic ut fuligines in camino conerescent in illam nigredinem, sic sumi in corpore conerescent in pilos.

^g Gal. 2. temp. 5.

^h Quæ molli sunt cute, ut homo, quanto

ficior calidiorque cutis fuerit, tanto magis pilos gignere potest: exemplo terra declarat: & hac terra assimilanda, qualis est ab æthere vere, vel insunt astate. 2. temp. 5.

Causa efficiens calor est nativus moderatus, qui humorem hunc, seu fuliginosum hosce crassosque vapores exsiccat, & foras in cutis spiracula pellit. Subinde enim contingit, hunc vaporem fuliginosum crassumque in angustis spiraculis impactum hære, quare hunc alius rursus è profundo subiens prorsum impellit; nunc rursus alter, atque illum alius, sicque multi vapores fuliginosi alius super alium impacti, tempore complicantur & conjunguntur, ut unum ejusmodi corpus efficiant, ^e quale est, quod in caminis cernitur, & fuligo dicitur; nisi, quod hic vapor fuliginosus crassusque, quantum spissatus est, tantum etiam per transitum angustiam stipatus, in angustam prorsus formam redactus est. Ubi vero tale corpus totum meatum obstruxerit, deinceps à sui similibus excrementis quibus exitus non est, violenter idem totum propellitur, ut jam lori formæ adeptum cutim ex gere cogatur. Quare humorem hunc, seu fuliginosum excrementum glutinosum esse ^f oportuit, in quo tamen nihil ^f pinguis inesset; quare ubicunque in corpore glutinosum existit, ibi pili à ^f calore gignuntur; idcirco in axillis & pube & reliquo corpore, pili multi succrescunt: sane id ^e quod in meatibus seu poris cutis impactum est, radici alicujus herbæ in terra hærentis ad similitudinem potest; quod vero ex cute extat, velut ipsi herbæ.

Locus quoque conveniens requiritur, cutis nimirum, quæ & maxime omnium ad eorum generationem idonea est; quæ non nimium sicca, nec humida nimium esse debet; ut enim in palustri & uliginoso loco nihil generatur, nec item in squalidior solo; ita in humidior & siccior eute pili non erumpunt. Et licet sicca & dicatur, tamen in homine humoris expertus non est; quemadmodum in iis, quæ filicea testa integuntur, vel crustata, ut in ostreis, locustis, cancris: vel quæ in cavernis delitescunt, ut serpentibus: vel quæ squammata sunt, ut in piscibus, in quibus pili ^h oriri non possunt, quia horum cutes vere & in totum siccæ sunt. Non debet esse humida & plane

plane mollis, qualis modo concrefcens cafeus; in tale enim id, quod per cutim diffluatur, à calido per poros, pori tamen hi non remanent, quia partes rursus inter fe uniuntur. Quare requiritur cutis ^h moderate ficca, ne pilus excidat & calida, moderateque dura, non abfimilis cafeo & jam coacto, talis enim impetu exeuntium perforatur; & cum per ficcitatē uniri rursus nequeat, pori seu meatus immutati remanent, qui ab iis, quæ pertranfeunt, perpetuo magis fistulantur. Sed debet quoque effe laxa & rara; idcirco cum tota cutis porofa fit, & per totam cutim & femper aliquid à calido diffletur, quod fecum etiam interni humoris non parum aufert, idcirco in omnibus corporis nostri partibus pili prorumpere poffunt; quare cuilibet poro pilus infixus est, quo femper hæcce fpiracula ad haliuum evacuationem pateant. Excipere tamen oportet cutin in vola manus, & planta pedis, cujus caufam ⁱ in latum ⁱ Gal. 2. temp. tendinem, qui cuti fubjicitur, eo quod ficciffimus & deniffimus fit, referunt, ^k cum ^{5. & 2. uf. par. 6.} tamen & lepus latum tendinem habeat, hæcque partes minime depiles. Quare depiles dicimus, tum ob ufum, ut magis fit ^l fenfibilis, tum ob motum. Raritatē autem cutis requiri, oftenditur cicatricum exemplo: fi enim fumma cute ^m inulta pufulam excitaveris, eamque perfanaveris, ubi fumma cutis denfior evaserit, nullus excicatrice pilus, quia poris ⁿ deftituitur, exurger.

Duplices vero funt pili; alii ^o *onyx* congeniti, cujufmodi funt capitis, fuperciliorum & palpebrarum; qui in utero materno exiftentibus innafcuntur, cum ^p iis generatio fit, non qualis herbis, fed qualis ftrpibus prima ratione à natura conditis, non temperamentum ex neceffitate fequentibus. Alii funt ^q *stegomyia*, poftgeniti, qui poftquam fumma cutis ^r rara evafit, nafcuntur: talis autem evadit, fimul ac genitale femen oritur in puero. Et menfibus ^s in virgine via patet: pubis ^t primum, mox alarum, poftremo menti (totidem namque loca ^u congenitis, quot poftgenitis deputata funt) hique in iis, qui ante pubertatem ^v castrati funt, non exeunt, quia nondum via genitura facta; & poftmodum via ^w genitura intercipitur, idcirco fumma cutis non rarefcit; & poft pubertatem ^x excifis testibus, foli decidunt, præterquam ^y pubis. Sic in mulieribus poftgeniti parcius proveniunt, in ipforumque mento ^z non prodeunt, quod ipsis ^{aa} in actu venereo, non perinde ac in viris agitur humor fummam cutim rarefacere queat, nifi interdum ^{bb} pauci, cum menftruus curfus fubfiterit, menfes enim materiam barbæ abfumunt: fieri tamen potest, ut ^{cc} tam mas, quam fœmina pilis poftgenitis careat, ob vitium nature ab ortu contrarium.

Forma pilorum per accidentia quædam designari folet: Variant enim crassitudine ^{dd} tenuitate: duritie, & mollitie; longitudine, brevitate, rectitudine, crispitudine; multitudine, paucitate, fic etiam pro cutis qualitate, & pro conditione ^{ee} partium, quibus adhærent: adhæc coloribus, ut albedine, nigredine eorumque mediis: fic & pro ratione ^{ff} ætatis, videl. cum minores aut majores nati funt.

Crassitudinis tenuitatisque præcipua ^{gg} caufa cutis est, quæ aliis crassa, aliis tenuis, aliis rara, aliis denfa est: fic humoris ^{hh} differentia cuti fubjecta, aliis enim glutinosus, aliis aquofus fubest, quo evaporante atque exhalante, pili non ex carne, fed ex ⁱⁱ pube nafcuntur, cute ^{jj} fimulque moderatum, neque ^{kk} pauciores quo alatur humorem, habet. Hipp. de nat. pueri. 1. Arist. 3. hift. 11. 1. Arist. 5. gen. 3. 3. hift. 11. 1. Hipp. de nat. pue. mulieres mento & toto corpore glabra funt, quod ipsis in actu venereo non perinde agitur humor ac viris epidermidarum efficere queat. u Arist. 3. hift. 11. x Arist. 3. hift. 10. y Arist. 5. gen. an. 3.

ⁱ Gal. 2. temp.
^k cum 5. & 2. uf. par. 6.
^l Columb. non concedit quin planta & vola leporis pilis reformata est, licet latum tendinem habeat levitatis autem gratia lepori naturam dediffe, quod animali adeo timido ob fanguinem neceffarium fit.
^m 12. uf. par. 6.
ⁿ 11. of. 15.
^o Hipp. de nat. puer. imdiqua dicitur.
^p Arist. 10.
^q Arist. 3. hift. an. 11.
^r Gal. 2. temp. 5.
^s Simul ac menfibus & genitura via patet, tum puero ac virgini epidermide rarefcit pilus in pube nafcitur, cute fimulque moderatum, neque

cute oriuntur, quare ex crassa & duriores & crassiores, ex tenui tenues producuntur. Et si cutis sit rarior & crassior, crassius gignuntur, propter copiam portionis terrenæ & meatuum laxitatem: si spissior sit, licet crassior cutis existat, tenuiores exeunt propter meatuum angustiam. Si si vapor aquosus fuerit, cum brevi resiccat, pili magnitudinem non acquirunt, at si glutinosus fuerit, cum non facile exsiccat, contra evenit. Quam ob causam etiam longiores brevioresque fiunt, prout humor, qui evaporatur, facile difficulterque exsiccat, hoc vero fit vel ob quantitatem, vel qualitatem humoris. Si enim humor aut multus, aut glutinosus est, non facile exsiccat, sic plures & longiores humidioribus & cavatioribus locis.

Quare & Capitis pili longissimi sunt, quia cerebrum largam humoris copiam præbet, & quia multum glutinosi inest: & quia majus est cerebrum, quam reliquæ glandulæ, crassissimi, quia cutis capitis crassissima, rara tamen, & plurimum humoris contineat, qui in nutritione cerebri à calore moderato elevati, & persuturas plurimosque poros angustissimos in calvaria conspicuos transeuntes, cutim capitis perforant, in quo transitu cum evaporatio hæc ab ossis duritie remoretur, condensetur, & in capillos longissimos degenerat. Siquidem maximi & plurimi nascuntur, ubi summa cutis rarissima est, & ubi plus moderatum humorem, quo nunturatur, habet.

Dicuntur autem capitis pili, Latinis capilli, quasi capitis pili, Græcis ἄγειον à κείρω, incido, etsi veteres κείρας ἐν τῇ κεφαλῇ, pilos in capite nominare consueverint, hi in viris ἄγειον, cæsaries, à frequenti cæsione, in fœminis κείρας à κείρω, curo, Latinis coma, à curiosiore cultu, qui in ipsis linea dividuntur, quam separationem, λίσσιμα, discrimen & æquamentum vocant. Sed de his in libro de partibus externis plenius, quemadmodum & de pilorum, qui aliis partibus innascuntur, diversis nominibus egimus.

Rectus autem simplexve, vel crispus seu obliquus, fit & pro ratione exhalationis, & pro natura meatuum. Ratione exhalationis, quæ si fumosa est, præ sua caliditate & siccitate, crispum pilum efficit, cum enim duplici delatione feratur, inflectitur, siquidem terrenum deorsum, calidum sursum feratur, & cum præ sua imbecillitate facile inflecti possit, intorquetur, quoniam parum humoris multum autem portionis terrenæ inest, sicque pili resiccati ab ambiente aere contrahuntur, inflectitur enim quod rectum est si evaporaretur: & contrahitur pilus, quemadmodum cum igni aduritur, siquidem crispitudo, convulsio est ob humoris inopiam, ab aeris continentis calore: vel dicas fieri ob siccitatem temperamentis, atque ita omnes Æthiopes crispi sunt. Ratione meatuum, in quibus radicanur, cum enim exhalatio imbecillior est, quam ut rectam viam sibi moliri possit, pro modo, quo inflectitur, etiam meatum suum figurat. Si vero exhalatio satis valens sit, sed ob cutis duritiem venire ab eo videlicet glutinoso, quod circumcirca existit, in quo pinguis nihil inest, si quid enim pinguis inesset à calido exustum esset: hæc Hipp. e Hipp. de gland. f. πρὸς τὸν κ. πρὸς τὸν κ. 5. gen. an. 3. g. Gal. 9. us. part. 1. in cranio conspicuas & sensiles vias natura vaporosis ac fuliginosis excrementis secuit, nam cum caput omnibus partibus velut rectum quoddam calida domus superpositum, hinc omnia fuliginosa ac vaporosa excrementa quæ à partibus subiectis sursum feruntur fuliginosa ac vaporosa excrementa caput excipiat, largiore egeat vacatione. h. Hipp. de nat. puer. i. Polluci & Æschylo. k. Hipp. Arist. Gal. l. Homer. Iliad π. & Ἰεγεῖς, odyf. π. ab Ἰεγεῖς. m. Arremitod. vel dñ. π. & Ἰεγεῖς ob ornando, ut vult Eustachius. n. Arist. 5. o. Arist. 5. gen. an. 3.

ritiem rectam ferri prohibeatur, tum in latus flectitur; quomodo videmus fumum & etiam flammam, cum sursum agi prohibetur, divisum in obliquum agi; quare & ob p Gal. 2. temp. p exhalationis imbecillitate, & cutis duritiem obliquitas pilorum radicibus contin- 3. git: quales p autem in radice finguntur, tales perpetuo fore rationabile est; cum nul- lum corpus durum siccumve in rectum extendi possit, nisi prius molliatur.

Simplici vero seu recto sunt o pilo, qui humore abundant, & ubi per meatus re- ctos evaporat; & molles sunt, q qui promissi sunt, & crispi, duriores sunt rectis. q Arist. 3. hist. an. 10.

Sic pro cutis qualitate & conditione partium, quibus adherent, & prout singula- rum ratio postulat, plus minusve crescunt, maxime in capite, ubi multi magnique ex- surgunt: mox in barba, quia moderate sicca & calida est, & precipue, quibus pili te- nuiores sunt. At superciliorum & palpebrarum pili exigui sunt, r & nullius pene in- crementi, & ut plurimum æqualem semper magnitudinem servant, stabilesque per- manent, cum his durum corpus instar r cartilaginis cuiusdam subjiatur, aliis vero r cutis dura cartilaginea per supercilia connectatur: quare palpebrarum ac su- erci- liorum pili, cum fortiter radicibus fixi sint, non defluunt, nisi in magnis r partis affe- ctibus: ut in luce venerea, elephantiasi. Etenim pili, qui r ex moderate humidis ac mollibus partibus emergunt plurimi sunt incrementi; cuiusmodi sunt in capite r & barba: qui vero ex duris atque aridis, exiles sunt, & nullius fere incrementi: quare dpulicem esse originem pilorum, dixit Galenus, r aliam à conditoris providentia aliam vero à loci natura, quem tamen locum sic à conditore dispositum esse dici- mus. Nonnulli tamen supercilia per senectutem adeo hirsuta u redduntur, ut ton- denda sint. Sic in mento nascuntur pili ubi summa cutis rarefcit (delata in eam a ca- lite humiditate, ut Hippocrates r voluit) qui barbam constituunt, quæ non omni- bus pari modo r effunditur, sed aliis circa labia & meatum pilorum copia contingit, aliis vero r hæc quidem pilis carent, genæ vero pilosæ cernuntur. Quamvis etiam in quibusdam r morbis pili crescant, præcipue in tabificis, ut refert philosophus, r ad- densentur in senectute & defunctis angeri, sed non nasci. z

Colore r similiter variant, & quidè ratione humoris prædominantis, regionis, aeris l Addit Gal. in ambientis, ætatis &c. Humori prædominanti similes sunt, qualem enim humorem axillis quoque b caro attraxerit, talem etiam colorem pilus induit. Galenus e nigros fieri statuit, cum vaporosum excrementum vi caloris deustum, in exactam fuliginem mutatur. c p uadendis. Subrufus vero, quoniam id, quod in meatibus est impactum, nondum totum est ni- grum. Flavos autem, cum vapor minus torretur, quippe, quod tum impactum est quia symphysi- excrementum, fæculentum est, non nigra, sed flava bilis. Albos ex pituita nasci, & excrementum, fæculentum est, non nigra, sed flava bilis. Albos ex pituita nasci, & sicut inter colores album & flavum medius datur, sic eorum generationem ex pitui- ta biliosa que fœcis media quadam natura provenire. plus humoris

Sic ratione regionis, d aerisve ambientis variant, cum ii, qui calidam & siccam re- gionem L1 gionem palpebrarum nunquam plus iusto excrecunt. 3. hist. 11. x Hipp. de nat. pue. y Arist. 3. hist. 11. z Imo & duriores reddi, quod ungui- bus quoque eveniat, idem vide plenius 2. gen. an. 6. a Causa colorum in animalibus cutis est, at in homine caris nulla causa est: qui enim albi sunt admodum, nigros habent capillos: causa est, quod homo omnium tenuissimam cutim habeat proportionem magnitudinis. 5. gen. an. 3. & 3. hist. 11. Arist. 2. gen. an. 6. unguis, pili, cornua & similia ex cute nascuntur, quo se ut ipsa colorem pariter cum cute immutent: alba enim & nigra, & vario modo diversa pro colore cutis reddun- tur. b Hipp. de nat. pue. c 2. temp. 5. d Scythia incolæ, Ponti & Thraces pilo sunt promisso & simplici, quia humidi sunt,

sunt, & aer ambiens humidus: Æthiopes contra, qui loca incolunt calida, crispis sunt pilo: siccum enim est cerebrum ipsorum & coelum ambiens. Arist. 5. gen. an. 3.

e Gal. 2. temp. 5.

gionem incolunt, non solum duros, sed & nigros, exigui incrementi, siccos, crispis & fragiles pilos habent, ut Ægyptii, Arabes & Indi: contra, & qui humidam frigidamque regionem inhabitant, non solum molles, sed etiam modice auctiles & graciles, & rectos & rufos obtinent, ut Illyrii, Germani, Sarmatae, & omnis Scythica plaga, inquit Galenus: & qui vero inter hos & temperatum tractum colunt, hi pilos plurimi incrementi, & robustissimos & modice nigros, si mediocriter crassos tamen nec prorsus crispis, nec omnino rectos edunt.

f. Arist. 5. gen. an. 3.

g de nat. puer.

* Nemo antequam coire incipiat caluescit sed à venero coitu potius id evenit, Arist. 5. gen. an. 3. qui varices habent caluescunt. 3. hist. 11.

h Nec pueri, nec mulieres.

5. gen. an. 3.

* Arist. 5. gen. an. 4. vide & 3. hist. 11.

† Gal. 3. nat. fac. 11.

i Cur homines canescant, vide 5. gen. an. 4. & 5. sic 3. hist. 11. tempora hominum & partes primores quam posteriores citius can-

tem sentiunt: pubes novissime canescit. Arist. 11. prob. 62. quare cur unus omnium animalium homo canescat (videmus tamen & alia animalia in primis canes canescere.) An quod pars animalium maxima pilum quotannis deciduum gerit, ut equus bos: nonnulla deciduum non gerunt, tempus autem vivunt breve. At homo non deciduum gerit pilum & longam aetatem degit, itaque brevi tempore senescit & inueteratur. At 3. hist. 11. mutatur color pilorum in senectute candidique pilis efficiuntur in hominibus, quod etiam ceteris animalibus accidit, sed non satis aperte, praterquam in equo. Veteres putarunt à siccitate fieri. quemadmodum arborum folia ex siccitate albescent: refutat Arist. 3. hist. 11. nam qui recto capite incedunt, citius canescunt, nec tamen ita exsiccantur, quam qui nudum caput aeri exponunt: dein quidam ab ore statim canescunt, quod non à siccitate fit.

k Arist. 3. hist. an. 11. 5. gen. 4. 1 de nat. pue.

ad contingunt, quod longo tempore permeante humido, id quod candidissimum est, fecernitur, & in summam cutim illabitur, ita ut attracta candidiore humiditate, pilus, quam antea, candidior evadat, ipsaque summa cutis, eo præsertim loco, ubi cani sunt, quam quovis alio loco candidior est. Quique à prima origine canos habent in capite, illis summa cutis, ubi cani sunt, quavis alia candidior existit, quod illic albissima humiditas insit. At Galenus ^m vult, quando cutis capitis ad summam siccitatem non pervenit, imbecillos, albosque pilos, quos canos appellant, fieri, imbecillos quidem, convenientis alimenti penuria, albos vero, propterea quod alimentum, quo aluntur, velut sitis sit piritæ, quæ spatio computruit. Canescunt vero primo ^k tempora, quia humidiora ^m sunt, quod in his muscoli magni sub cute habeantur, omnis autem ^m 2. temp. 5. musculus carnosus sit, caro tum ossæ, tum cute humidior. Adde quod temporum ossa admodum sunt tenuia, quare calor extraneus facile pervadere potest. Dein pars ^k prior capitis, pubes ⁿ novissime, & omnium lentissimæ ⁿ palpebræ, at nemo ^o Arist. 3. hist. 14. vel temporibus, ^o vel occipite ^o calvefcit. Fiunt autem candidi à parte ⁿ extrema, quia in ultima ^p ac tenuissima parte, calor minimus habetur.

Nutrientur pili humore; unde Hippocrates ^p plurimos nasci vult, ubi moderatum humorem, quo nutriantur, habuerint, quem ad radices lentum habere dixit Aristoteles: ^q si enim recta evellantur, eundem secum trahit, ^q pilusque in radice crassior existit. Ab hisce humoribus ^r halitus efferuntur, & ex crassioribus, ac glutinosioribus ejus excrementis, natura ad pilorum alimentum utitur, quare boni incrementi ^r & modice crassi sunt, quando recte aluntur, hinc præcisi non ab incisura ^r aut ^r eventit ut parte ^r gentur, sed ad radicem, unde exeunt, & ita longiores evadunt: nam adposito ad eorum radicem alimento, eo modo, quo dentes & augentur & nutriuntur, & quidem non vitiosorum humorum excrementis, sed tertiæ coctionis, alias in elephantiacis, & lue venerea laborantibus, in quibus excrementa humorum præter naturam abundant, non diffluerent, sed auferentur.

Ufus pilorum in genere quadruplex est. ut sint subiectis partibus & tegumenti, & propugnaculi & ornamenti loco, & ad crassiorum fuliginosorum excrementorum absorptionem. Sic pili capitis, qui frequentissimi sunt (cum inter omnia animalia, homo maxime omnium ^x piloso sit capite) cerebrum ^y operiunt, defendunt à nimio frigore & calore. Cum enim cerebrum hominis proportionem ^x maximum & humidissimum sit, maximam etiam tutelam desiderat, res namque humidissima & reservescere & refrigerare maxime idonea est. Et cum cerebrum à fonte caloris ^{diffi.} ^p Arist. 5. gen. an. 5.

Ll 2

^q 3. hist. 11. quo loci mira est Gaze verso. Columb. voluit pilos à pinguedine alimentum trahere. Varolius, cibus in ventriculo contentis & superimposito jecore, pinguedo feculenta per descensum remouetur & à glandulis in omento sitis exsugitur, indeque tum in pilos convertitur, tum halitu insensibili expellitur. Quare recentiorum aliqui ajunt, pilorum radici pinguedinem affixam deprehendi, si leviter & recta evellantur, exceptis in scroto. ^r Gal. 11. part. 14. ^r Gal. 2. temp. 5. ^r Arist. 3. hist. 11. qui 8 prob. 8. cur in cute pili inhorrescant, ostendit. An ubi cutem contraxerunt, merito eriguntur, contrahunt autem & rigore (vad pignis) & ob alios affectus. ^u Arist. 10. prob. 61. causam quarit cur hominum caput pilosius, quam reliquum corpus: ceterorum autem contra. An cetera vel in dentes exuperant, præ nimia alimenti copia: vel in cornua: vel etiam in setam. Gal. 11. us part. 14. quo partim adfluentis humiditatis quidpiam ebibant, ne ea partibus subiectis sit perniciofa: partim & caput ipsum nonnihil operiant. Operimentum ac ornamentum circa pudenda præbet, ut nates ano, præputium pudendo. Idem. ^x Aristot. 2. part. 14. & 10. pub. 61. ^y Gal. 11. us part. 14.

diffitum, & ossibus finitimum sit, & sub his nulla pinguedine munitum, hi ipsum & muniunt & calefaciunt. Hi etiam y crassiora excrementa consumunt. Et cum non y per omnes ætates, nec anni tempora, nec regiones, aut corporis constitutiones eodem operimento indigeamus, idcirco temporari servientes, capillos alias longos relinquimus, alias breviores facere satius est. Verum si penitus amputentur, defluxionibus occasio præbetur. At pili barbam constituentes, non modo, ut maxillas mentumque operiant (quod mulieres peplis faciunt) sed etiam decus ac y ornamentum afferunt, venerabundus enim magis mas apparet: idque potissimum si ætatis progressu pili undique & pulchre circumfundantur, idcirco superiorem genarum partem & nasum natura pilorum expertia y reliquit, alias facies tota sylvestris ac fera fuisset, animali mansueti ac politico minime conveniens. In mulieribus faciei glabrities ornamento est, nec ei forma veneranda opus erat, natura enim y animæ moribus corporis formam convenientem fecit. Verum pro ratione partium, quibus pili tributi sunt, eorum utilitas variat: Superciliorum enim usus, humorem à capite defluentem suscipere, Palpebrarum, visui dirigendo inservire, & sic de cæteris, ut suo loco ostendimus, & plenius libro tertio, ubi de similiaribus sanguineis & partibus dubiis sermo erit.

De Cuticula, Cute, Pinguedine & membrana carnosâ Capitis.

CAPUT III.

ET si Cutis hominis, comparatione facta ad cutim aliorum animalium, tenuissima sit, attamen quæ in capite est, si cum cute thoracis, & infimi ventris conferatur, non secus quam Cuticula, crassissima est, quemadmodum ea quæ in collo est, crassa, & tanto^b reliqua totius corporis cute est sicciore, quanto etiam est durior: porro^a rosa & rara^c pro fuliginosorum excrementorum ad capillorum generationem transitu. Vasa recipit cutanea, quæ inter cutim & panniculum carnosum disseminantur: quarum aliæ & quidem insigniores à Jugularium externarum ramo exteriori, quæ antrosum utrinque in frontis medio uniuntur, & in capitis gravissimis doloribus inciduntur: retrorsum vero post aures à Jugulari externa, quæ supra ossa temporum feruntur & inter se osculis junguntur; & hæc sanguinem pro alimento suppeditant: & hæc sunt illa vasa, in quibus Fernellius^{*} humorem serosum, Arthritidis futuræ materiam coacervari voluit. Arterias, à Carotidum ramo externo juxta auris radicem & tempora, quæ vitalem spiritum à corde sursum vehunt. Nervorum[†] fines à prima & secunda

^a Columb. reprehendit Arist. quod cutim capitis tenuissimam esse dixerit. Resp. ipsum 3. hist. 11. dixisse cutim hominis proportionem magnitudinis de ætate tenuissimam esse: non dixisse capitis cutim tenuissimam esse probatur ex 5. gen. an. 3. ubi cutim capitis aut maxillæ crassissimam esse licet 5. gen. an. 5. hominem omnium maxime tenuem cutem habere dixerit. ^b Gal. 2. temp. 5. ^c Arist. 5. gen. an. 5. ^{*} 6. Path. 18. capitis partes externa & extra calviam posita, origo sunt Arthritidis: à quibus supervacaneus humor per summa corporis sub cute deorsum decurrit: vena enim multa ab externis jugularibus deducta, coexcrementa sua tenuia atque serosa deponunt: quumque capitis crassa densaque sit cutis, à qua capilli succrescunt, non quemadmodum à reliqua corporis cute illinc facile humor expiratur: tempore igitur cumulatæ copiosior, &c. Plat. qui magna vasa hic collocantes, excrementorum podagram generantium proventum, in hoc loco fieri scripserunt. Non quemadmodum in singulos musculos nervus provenit, ita & cuti proprius & definitus est nervus: sed ex partibus subjectis, fibra quædam ad ipsam perveniunt, quæ simul ipsam cum subjectis partibus connectunt, simul etiam summum ei suppeditant 16. us par. 2. paucissima nervorum fibra, Vesal.

secunda^e colli conjugatione sursum reflexos, recipit, quo sensu illustretur: qui non ita exquisitus, ut in thorace & imo ventre, quia hic membrana musculosæ adhæret; in aliis vero partibus nervosæ. Hujus usus calvam circumdare, ejusque tegumen-

tum esse. Pinguedo & sub cute circa occipitium observatur pauca, eaque durissima non autem in fronte, cum enim in fronte cutis pro arbitrio nostroⁱ moveatur, ipsius motui impedimento fuisset, quæ hoc loco^k cutis substantiæ musculosæ unita est.

Panniculus seu membrana carnosæ cuti subtenfa, et circa frontem cum nulla pinguedo intercedat, adhæret, ibique crassissima existit, hæc quandoque instarⁱ tendinis^h à musculis frontis ad musculos occipitii & aurium percurrit, quare hæc portio pro pericranio sumi non debet, ut nec pericranium pro perioftio.

Piccolhom vult ipsum veram cutim considerasse, sed ut est pars similis à nervo distincta: sic enim solos nervos sentire. g. ^g Omni adipe destituitur, quia exigua vasa sub pilosa cute satis tuto collocata: dein in foetu cum caput magnum si adfuisset pinguedo a lauda moles exitum impedi visset. Plat. At Vesal. l. 7. c. 18. cutim cum adipe & carne membrana solis manibus facile à calva divellit. & Columb. cum à pene, serotone discesseris, in reliquis partibus pinguedo inveniri potest. h. In fronte, pene & seroto nullus adeps. Vesal. p. 640. i. Laur. vult in toto capite. k. Gal. 11. us. par. 15. Fallop. in obs.

e. A secundo dor si pari. Plat. f. Arist. 3. hist. 11. cutis sensu caret, maxime in capite, quia ibi nulla interposita carne ossi adhæret. At Gal. 16. us. par. 2. cutim sentire ostendit. Resp. Arist. cuticulam intellexit.

De Pericranio, Perioftio & Musculis circa Caput.

CAPUT IV.

De Pericranio egit Galenus 8. us. partium 9.

Membrana panniculo carnosæ subjacens ^{αὐτὴν ἐξ ἑνὸς} dicitur, eo quod totum a Arabib. Al-
mocat & Al-
mocatin: Gin-
gia mater, Ar-
culano: com-
muniter peri-
ostium dici
vult Laur. &
Fallop. in instir.
& de off. c. 19.
membranam
vult omnibus
ossibus commu-
nem, quæ circa
cranium Peri-
cranium, com-
muni nomine
Perioftium di-
catur.

Cranium extrinsecus ambiat, quæ inter panniculum & perioftium, cum quibus utrinque fibris quibusdam nequitur, sita est: mollis^b & tenuis^c acuto sensu prædita; quæ à duræ meningis processibus, tanquam tenuibus^d membranæ, seu potius^d ligamentis (cum ligamentorum munere defuncti sint) suturas cranii transeuntibus, e-

nascentur, singula enim ligamenta versus cranii^d partem sibi directam, unde enata sunt, extenduntur, inde progressa sibi mutuo occurrunt, & exacte^d uniantur, & ex ipsis omnibus communem membrana fit. Et hæc non solum cranium circum-

dat, sed etiam musculos temporales, non quidem ad eorum insertionem usque, sed usque ad ossa jugula ob majorem eorum custodiam, cum hic valde crassa sit & dura, vestit, ita ut propria musculorum tunica dici vix possit, maxime cum eos totos non vestiat, & ab iisdem prope os jugale recedat, ubi inter membranam & musculum utrinque pinguedo aliqua reperitur. Hoc ad nares & infra oculorum orbitas supra frontem revoluta excurrit, oculorum quoque ligamentum, quod pro oculorum adnata tunica censetur, constituit. Hujus usus est, ut cranium tuto^d undique ab illo (extrinsecus tantum) tanquam vinculis constringatur & involvatur, & duram me-

Ll 3

nin-

b. αὐτὴν ἐξ ἑνὸς
c. Densa & solida Laur. d. Gal. 3. us. part. 9. e. Unde originem sumere creditur, Plat. f. Pars est pericranii, licet a-

atomici tunicam temporalium musculorum vocent. Fallop. in obs. univ. sum cranium obvelat, nisi qua pars musculus temporalis ossibus incubat, quem pericranios membrana super tenfa firmius colligat, Riol.

ningem^d cum cranio connectat, sicque cerebrum, ne facile concidat, suspendat. Hæc cutim capitis sibi firmiter connectit: idcirco sola cutis capis vulnerata, cum labia parum dehiscant, suturis minime indigent.

h Fallop. in obs. pericranium in aliquibus partibus, difficile tamen in duas partes separari potest: in alteram qua cuti, & alteram, qua ossi connascitur, attamen unum tantum corpus est, quare pericranium à perioftio non est distinguendum: & Lauren. conset pericranei crassitiem fortassis eos decepisse. At Ves. p. 808. cultelli mucrone jubet pericranium à perioftio dividere. i Arist. 3. hist. 13. ambit singula ossa membrana. k Hujus membrana ignoratione, multi ossa sentire existimarunt, Columb. l Varol. tantum dentes excipit.

Perioftium subjacet, membrana nervea, firmissima, tenuissima, extrinsecus quemadmodum aliis quoque ossibusⁱ validissime adhærens, quo cum ipsa ossa ob insignem duritiem ab objectis mutari non possit, ut qualitates tangibiles cognoscant, hac vestiuntur: hujus beneficio ossa omnia,^k cum sensus exquisitissimi sit, sentiunt, cum omnia ossa extrinsecus ambiat, unde Græcis *περίοστεον*, quasi circumossalis dicitur, exceptis^l dentibus, interna calvaria, sic nec in ossium articulationibus reperitur, ne in illorum motu dolores caufentur.

Musculi circa caput, qui cum ossibus ipsum constituunt, varii sunt, alii enim ab humiliore calvaria sede originem ducunt, quorum in collo meminimus, alii cuti frontis substrati, illam oculorum causa moventes, quare cutis frontis rugosa est, lineas & transversas & rectas obtinens: nonnunquam & cuti pilosæ subjacent, quibus in nonnullis & capilli & aves moveri possunt auriumque musculi existunt: alii denique maxillæ sunt, de quibus suo loco.

De Capitis figuris, suturis, & cranii substantia.

CAPUT V.

De Figuris Capitis egit Hippocrates de Vulneribus capitis, quemadmodum & de suturis, Gal. lib. de ossib. 1. 9. us. part. 17. de suturis 8. us. part. 9. 9. ejusdem 1. 7. 17. & 18. 19. & 20. Arist. 3. hist. 7. & 2. part. animal. 7.

CRanii ossa & futuras explicaturi, totius figuram præmittere convenit, cum figura cranii mutata, futuras quoque & situ & numero mutari Galenus^a cum Hippocrate voluerit. Quare capitis figura duplex est, alia^b Naturalis & optima, alia Depravata. Naturalis [tab. 1. fig. 1.] quæ ad^c oblongæ sphaeræ similitudinem structa est, & paulatim utrinque juxta tempora comprimitur, arciorque fit, priorem^d ac posteriorem partem prominentiorem habet, ita tamen, ut posterior capacior sit, quo veluti in æquilibrio collo infideat, nam cum anterior pars, licet angustior sit, ob ossa maxillæ superioris gravior sit, debuit posterior pars sua capacitate æque ponderosa reddi. Depravata dicitur, quæ à dicta variat, quam *φοξὸν* Galenus^e nominavit,

*a lib. de ossib. de us. part. ad. an. ex Hipp. de vuln. cap. quod & Vesalius voluit, negant Columb. Fallop. Eustachius & Gal. Hipp. & Vesal. at Columb. omnes dicit naturales, nam licet à prioris forma variant, non tamen adeo differre, ut illam naturalem, has vero non naturales appellare oporteat. Verum & Piccolhom. figuras præter naturam appellat. c Gal. 9. us. part. 17. vide & art. med. 11. Figuras quatuor Hipp. lib. de vulnerib. cap. proposuit. sic & libr. de loc. in hom. & de aere, ag. & locis Quid de his sentiendum, Arist. in Physiognom. 6. ostendit. d de ossib. 1. e Gal. *φοξὸν* caput deformatum, non vero acutum significat, nam & caput penitus sphaericum & rotundum, inter species *φοξῶν* recenset 9. us. part. 17. male ergo Siculus de ossib. 1. apud Gal. & Regius 9. us. part. 17. acutum reddidit.*

vit, & triplex ^f existit. Prima [tab. i. fig. 2.] in qua anterior eminentia, à frontis clatiore sede producta abest, posteriore quæ in occipitio est, reservata: & tales homines insulsi & amentes putantur, idque ob cerebri inopiam, quod anteriore parte copiosius esse debeat. Altera huic contraria, in qua [tab. i. fig. 3.] posteriore eminentia occipitis, & anteriore remanente, abest. Tertia [tab. i. fig. 4.] in qua ambæ capitis eminentiæ periæ, & figura rotunda sit. Quarta addi potest imaginaria, [tab. i. fig. 5.] in qua caput ad utramque autem, magis quam antèrius vel posterius prominet, quam excogitari, non autem in rerum natura consistere posse, Galenus tamen ab Hippocrate affirmat, quia cerebri fabrica penitus everteretur, imò jam monstrum ^h esset, nec vivere posset. Posset & quinta addi ex Hippocrate, quæ figura est acuminata, ubi optima figura aliquantum permutata est, primum arte, capite ab obstetricibus in acutum compresso, & fascia apposita & conservata, donec in acutum procedat, quam apud quasdam gentes æstimationis & generositatis locum obtinuisse Hippocrates ⁱ monet, & tan tem Natura artem imitata, talia capita à parentibus in liberos transfert. Sic videmus in pleiisque Gallis & Belgis, capita oblonga ob decubitus in tempora, cum Germani caput rotundius habeant ob decubitus supinum.

Dicitur autem Calvaria sive ^{κ. ε. γ. ν. ο. ν.} κ. ε. γ. ν. ο. ν., quod totum cerebrum ambit, & est veluti quædam ^l galea sive ^{κ. ε. γ. ν. ο. ν.} κ. ε. γ. ν. ο. ν. imponitur, quod necessario totum osseum tantum tutissimum domicilium efformatum, nam cum in eo adeo nobiles & necessariæ partes contineantur, septo ^m forti munire necesse erat. Est autem Calvaria rotunda, ut à periculis sit tutior: magna, propter cerebri, cerebelli & medullæ molem: non ex uno ^o osse composita, ne ex uno vulnere ^o calvaria undique frangatur, sed ex ^o multis beneficio Sutarum [t. i.] ^p quæ vel duarum ferarum [tab. 5. f. 13.] compagem, vel vestimentorum ex pluribus pannis laceris confutorum compositionem imitantur, securitatis ^q causa & ad patiendi ^q difficultatem (ne quando mota ^m vehementer deducantur ac dissiliant) commissis: ad imitationem fabri lignarii ^q qui instrumenta quædam crebris claviculis compingit, sic illorum compagem soluta difficiliorem efficiens. Raro enim caput ^r sine suturis reperitur, licet interdum coronalis sit oblitterata; aliquando una ex reliquis: interdum etiam in senibus, ^r diuturnitate & siccitate omnes appendicum more coalescunt & abolentur, & ita connascuntur, ut vix vestigia appareant, quæ in junioribus maxime sunt conspicuæ, omnium autem postremæ: Temporales pereunt, quæ tamen non fuerunt ^r observatæ abolitæ, absque aliarum deletionē. Quod vero Hippocrates ^u eumque secutus Galenus, voluerit

ⁿ Extas os capitis continuum, quod calva dicitur, aliis, osse continuo perficitur, ut canis (hoc recte Columbus reprehendit) alius compacto, ut homini, Arist. 3. 7.

^o Gal. 9. us. part. 17. ^p Sutarum triplex est conjunctio Gal. de off. in procem. & 9. us. part. 1. ^q Gal. 11. us. part. 18. ^r Viri caput sine sutura visum, Arist. 1. hist. 7. 3. ejusd. 7. & Pollux lib. 2. & Herodot. libr. 9. testatur ejusmodi capita in Perside reperiri. Aratus & Arrianus in vita Alexandri Magni, Æthiopum & Ægyptiorum capita nullis suturis prædita esse scripsere. Et Paræus asserit, Æthiopes, Mauros & Greos qui calidas regiones versus meridiem & æquinoctialem incolunt, Cranium durius habere, nullis aut paucis suturis discretum. Rioli falsum dicit, quia Æthiopia caput distulerit, ejus cranium nostris prorsus consimile fuerit. Sic in Germania Helmstadi & in monasterio Heilbrunnensi tale ostenditur. ^l Columb. Piccolhom. at Fallop. tantum in senibus. ^r Fallop. de ossibus. ^u de vuln. cap. Gal. de off. 1. Col. reprehendit Galenum, dicendo, se sexcenta millia capita manibus traxisse, nullum tamen occurrisse figuræ non naturalis, aut cui sutura coronalis, aut lambdoidea deesset. Hoc & Fallopius non concedit, & Eustachius negat.

^f de offib. 1. &
9. us. part. 17.
^g Hoc non per-
petuum est,
Piccolhom.

^h us. part. 17.
ubi rationem
addit: Vesal.

tamen ab Hip-
pocrate proponi
asserit. & tali
figura visum
esse Venetis
puerum aman-
tem. At Fal-
lop. negat Hippo-
cratem meminisse &
lib. de vuln.

cap. tres tan-
tum figuras de-
pravatas re-
censuisse. De
puero Veneto.

ⁿ gant Fallop.
& Eustach. ta-
li figura fuisse.

Meminisse Ve-
sal. quoque mē-
dici Bononien-
sis capite qua-
drato, sed paulo

latiore, quam
longo.

ⁱ De aer. ag. &
loc. rex. 35. Gal.
& epid. com. 3.

^k Gal. de offib.
1. 9. us. part. 1.

^l 8. us. part. 9.

^m 9. us. part. 1.

ⁿ 9. us. part. 1.

^o Gal. de offib.
1. 9. us. part. 1.

^p 9. us. part. 1.

^q Gal. 11. us. part. 18.

^r Fallop. de ossibus.

^s Fallop. de ossibus.

^t Fallop. de ossibus.

^u Fallop. de ossibus.

suturas pro capitis figura & situ & numero mutare; ita ut in uis, in quibus prominentia anterior desit, desit & coronalis sutura; ubi posterior in occipitio, desit & lambdoidea sutura, semper tamen ^a sagittali sutura remanente, & cum suturarum remanentium figuram T referre: utrisque vero prominentiis deletis, duas ^a lineas instat X ^x calvariam interfecare. Hoc probare non possumus, cum saepe reperiuntur capita, in quibus vel anterior, vel posterior prominentia deest, suturae tamen omnes adsunt, sic quaedam sine coronali, fronte tamen prominente, quaedam sine lambdoide, occipite prominente; quaedam absque sagittali; quaedam sine omni sutura, nulla prominentia deficiente, inveniuntur: non quod hae à primo ortu deficient, sed quia frequenter coalescunt, idcirco abolentur; siue capitis eminentiae deperditae sint, siue naturalem constitutionem retineant. Si enim prominentiae causae forent suturarum, tum deficientibus prominentiis & suturae deficerent; at in lateribus ad aures suturae sunt, licet nulla adsit prominentia.

Suturae vero seu $\rho\alpha\phi\alpha\iota$ y capitis ossa connectentes quae tam in mare quam ^z foemina numero & situ communiter pares, duplices sunt: aliae ^z propriae ipsi cranio cum maxilla superiore communes. Propriae iterum ^a sunt duplices, vel verae, tres, vel mendosae, sex. Communes autem quinque sunt. Verae sic dictae, quod tales forma iudicentur, quibus Aegyptii Medici propria nomina indidere; quarum duae ^b transversae, tertia per capitis longitudinem fertur, ita ut tres hae suturae figuram talem exprimant.



Prima seu ^c anterior vel transversa [t. 2. A. B. t. 4. f. 11. m.] $\pi\epsilon\phi\alpha\nu\alpha\iota$ ^d coronalis dicitur, quod veteres coronas in ea ^e parte potissimum collocarint non quales ^f regum sunt, sed proprie ubi mulieres crinium strophia ad forendas partes internas semper gerunt. Haec circuli transversae speciem refert, cum per transversum supra frontem usque ad squamosas agglutinationes feratur; haecque frontis os [tab. 2. L. ab I. K.] à syncipitis ossibus separat, vel ea simul ne-
cit.

Secunda ^g seu posterior [tab. 2. C. D. t. 4. PP.] in occipitio est, & ab ipsius basi ad processum mammillarum radices ad utramque aurem oblique ascendens, ad sagittalis medium terminatur, quae cum literam A referat, $\Lambda\alpha\mu\beta\delta\omicron\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$, ^h à nonnullis à litera v figura $\psi\iota\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ dicitur; & haec occipitis os [t. 2. M. ab I. K.] à syncipitis & temporum [t. 2. N.] ossibus separat. At in quibus Calvaria postica parte amplissima est, multiformes ^k suturas obtinet; interdum vel transversa sutura dividitur, ali-

quando

una anteriore, altera posteriore capitis parte. Hipp. de loc. in homine. At Aristot. 3. hist. 7. Calva osse compacto homini, ejusque femina circularis est, mari tres in verticem ascendentes, quae in trianguli figuram coeunt, & 1. hist. 7. mulieri una in orbem, viro tres magna ex parte in unam coeunt. Haec omnium Peripateticorum sententia est, quam Columbrides: sic 2. part. 7. suturas plurimas homo in capite habet, & mas plures quam foemina. a Gal. de off. 1. quinque periculiaves capitis suturae. Col. legitima, propria ac vera, tres sunt: spuria, quinque. Piccolhom septem, tres verae, coronalis sagittaria, lambdoidea: quatuor notae, squammata utrinque cunealis posterior & anterior. b In capitis figura naturali tres sunt H litera similes, Gal. de off. 1. haec tres sunt ex Hipp. de vuln. cap. idem Gal. 9. us part. 17. una per medium capitis recta & duae transversae, sitque trium suturarum figura H Graeca litera similis. c Anterior Gal. de off. 1. altera, Col. prima, Plat. d Gal. 9. us part. 7. & 17. Adore derezi Avicen. alius arcualis, puppis. e Gal. de off. 1. f Fallop. de off. Quare in Herruria, ubi suturam hanc mulieres laxam habent, chyrothecam imponunt, ut partem illam ab aere teneantur. g Posterior Galeno 1. Col. 3. Plattero. h Gal. de off. 1. 9. us part. 7. & 17. Avicen. Adore lauda, alius lambdoidea, lauda, labdoidea, Col. alius proa sutura. i Plat. secunda. k Eustachius: meminit Eoes. in Hipp. de vuln. cap. crania

acc-

x Et quidem ad angulos re-
ctos, curamen X
litera angulos
internos rectos,
externos obtu-
sos habeat: ra-
les, reperi om-
nes negat. Qua-
re aut X aliter
scriptum fuit,
aut & litera si-
militudinem
potius refert,
Eoes. in Hipp.
de vuln. cap.
y Hipp. Arist.
Gal. At Gaza
aliquando jun-
cturas vertit,
ut 2. part. 7.
Celso sutura,
Plinio compa-
ges, quibusdam
commisura.
z Capita alia
suturas tres,
alia quatuor
habent, quae
tres ad aures
utrinque & an-
terius tertia,
posterior nulla,
quae quatuor
juxta aures u-
traque parte,
una anteriore, altera posteriore capitis parte.

acuminati, in quo pro lambdoides multa erant sutura, in sine occipitis & in toto cranio una sutura per medium ab aures una ad alteram delata.

quando sutura gemina circumscribitur, ac si triangulus major minorem, interdum triplici, quasi triangulus major, duos minores comprehenderet, & ossicula hæc eo modo circumscripta, Triangularia quibusdam dicuntur.

Tertia inter illas media est [t. 2. f. 1. E. t. 7. f. 2. 00.] & communiter (ut in adultis videre est) à sutura lambdoidis medio, per mediam capitis longitudinem ad mediam coronariam ducitur: aliquando per medium coronalis & frontis medium usque ad nasum summum, quod in infantibus semper conspicitur, & in aliquibus ad septimum usque annum talis reperitur: in mulieribus rarius; in viris rarissime, & presertim in iis, qui compressam faciem habent: hæc ὁρθοειδὴς recta & ὁρθοειδὴς, quod virgæ, septennium, in aut sagittæ instar recta feratur, & sagittalis dicitur. Hæc duo syncipitis ossa [t. 2. f. 6. aliquot infra, I. K.] nonnunquam & frontis dividit & etiam conjungit, in aliquibus etiam occipitis ossis partem secant.

Mendosæ seu nothæ sequuntur, sic dictæ, quod prioribus minus sint evidentes: sed rectius, quod potius commixturæ quædam sint, & ad harmoniam magis, quam ad suturam referendæ videantur. Sunt autem aliis quatuor, aliis quinque. nos sex recensebimus. Prima, ad latera & ad temporum cavitates supra aures p. dua sunt, utrinque una [tab. 2. F. G. H.] quæ à radice processus mammillaris sursum circulari quodam ductu fertur, & deorsum ad basin progreditur [tab. 2. f. 6. a. G. F. H. ad Ω.] Hæc cum non per conjunctionem, sed potius per suprapositionem ossium duorum inter se coherentium fiant, ita ut syncipitis os paulatim instar squammæ attenuetur, & per caput ossis temporum jungatur; idcirco non simpliciter suturas, sed ὁρθοειδὴς παρὰς, sive ὁρθοειδὴς παρὰς, squammosas agglutinationes, alii squamiformes appellant. Quod autem Natura ad similitudinem squammæ junxerit syncipitis & temporum ossa, factum idcirco, quod in partibus lateralibus ossium temporum, ossicula auditus collocare voluit; quare osse cavo opus fuit. Quod si utrumque os crassum fuisset, cavitas ab fuisset, & caput nimis grave fuisset. Quare ex magno osse temporum attenuato, cavitas pro ossiculis auditus continendis efformata; & alterum os syncipitis attenuatum, ut temporum ossi apte jungeretur: idcirco, cum partes utriusque ossis substantia non convenirent; non sutura, sed squammarum modo conjungi potuerit, & cum os aliud ascendat, foris elatior, quam interna sede apparet. Hæc anterior ossa temporum, cum osse sphenoides [tab. 2. f. 6. N. cum Ω.] posterius vero & superius, cum syncipitis ossibus jungunt.

Suturarum quinta vel mendosarum altera [tab. 2. f. 6. b.] ad latera quoque à summitate squammosæ agglutinationis oblique deorsum ducitur [tab. 2. fig. 1. ab H. ad g.] & hæc Cuneiformis dici potest; siquidem parte superiore os hoc cum syncipitis ossibus, parte inferiore cum frontis osse jungat.

M m

Sexta re in priorem partem supra

aures feruntur. Plat. sutura 4. & circularis. q. de ossib. 1. & 9. us. part. 18. causam addit. x. Sic evidentioris doctrina gratia se appellare, asserit Gal. de oss. 1. & 9. us. part. 18. asserit, nullum ex antiquis suturas appellasse, sed agglutinationes & Hipp. ut mihi videtur, cum coronalis partes esse arbitraretur, earum separatim non meminisse. Vesalius idem

idem testatur, Hipp. citando. At Fallop. ostendit Hippocratem de locis in homine, suturas appellasse. Aliis x^o & q^uir^a temporales: Aric. Corticales: sutura: Bol squamosa sutura.

¶ Dux tantum
Gal. de off. 1.

Sexta [tab. 3. fig. 9. mm. t. 4. f. 10. f.] est ad basin capitis utrinque, obliqua admodum & lambdoidi suturæ continua, quæ ab extremitate suturæ lambdoidis juxta processus mammillaris radicem per lapidosorum ossium medium oblique versus interiora ad basin capitis ubi primæ vertebræ jungitur, usque ad lineam transversam ducitur, quæ cum ita exactam futuram exprimat, ut simplex linea videatur, idcirco aliis lambdoides harmonialis, aliis lambdoides inferior; Galeno ^t lambdoidis suturæ additamentum dicitur; & hæc communis est occipitii additamento cum temporum ossis parte inferiore, auditusque organo. Hæc in pueris manifesta est, in adultioribus sensim deletur, ita ut copulatio hæc in senibus non appareat.

Septima [tab. 3. f. 9. mm. t. 4. f. 10. t.] linea est in media basi, quæ utrinque transversim brevi ductu fertur, donec in rimam desinat communem sphænoidei cum temporum osse. Hæc communis est occipitii additamento cum sphænoide osse & lambdoidis extrema committit.

¶ A Galeno prætermissa: Ves.
6. capiti propria
quia os spongoides capitis os
dixit: Columb.
7. propria capiti:
Fallopio ter-
tia communis
capiti & maxilla:
Piccolli.

Octava [tab. 4. f. 10. uu.] in interna calvariæ ^t parte magis conspicua, in anteriore calvariæ sede utrinque transversa ducitur, ad ossis spongoidis angulos inferiores, nariumque cavitatem pertingit; hæc communis est ossi frontis cum sphænoidei ossis sede anteriore, verum & os spongoides ab osse frontis omni ex parte separat, quæ potius per harmoniam seu lineam, quam per suturam conjuncta esse videntur.

¶ Nona [t. 4. f. 10. ab u. versus K. I. ad x. in sinistro latere.] foris sub narium ossibus fungosis fere in medio quadrata apparet, & obliquo ductu ad sphænoidei ossis foramen ducitur, ita ut communis sit ossi spongoidi quatenus ad calvariam referitur, parte quidem posteriore cum sphænoide, antè vero & in lateribus cum frontis osse.
qui unam communem dixerat & quidem dimidiatum illius per quam os sphænoidei superne fronti committitur, inferne maxillæ superiori: & hanc communem subjungit. u. Piccolli. calvaria propriam dicit: duplicem gur. 9. à d. ad ee.] & communis est sphænoidei cum maxillæ superioris osse quarto & posteriorem & anteriorem nominando: Col. sexta est.

Nona [t. 4. f. 10. ab u. versus K. I. ad x. in sinistro latere.] foris sub narium ossibus fungosis fere in medio quadrata apparet, & obliquo ductu ad sphænoidei ossis foramen ducitur, ita ut communis sit ossi spongoidi quatenus ad calvariam referitur, parte quidem posteriore cum sphænoide, antè vero & in lateribus cum frontis osse.

Suturæ calvariæ cum maxillæ superioris ossibus communes, quibus eminentiæ & processus ossium calvariæ parte anteriore connectuntur, quinque sunt. Prima in supercilii sede externa [tab. 2. f. 6. 7. g. g. tab. 3. f. 8. R. fig. 9. g.] à fine suturæ quintæ & secundæ communis extrorsum ducitur, veramque suturam exprimit, estque frontis ossi & maxillæ superioris ossi primo, communis.

Secunda, ^u in oculi sede laterali & externa, quasi gemina foramine communium oblongo distincta, apparet, superius quidem, in oculi sede externa & cavis temporum ad foramen prædictum deorsum ducitur [tab. 3. fig. 8. ab S. ad Q. & fig. 9. ad d. tab. 2. fig. 7. ad d.] & communis sit sphænoidei cum maxillæ superioris osse primo, externum angulum formante: inferius vero ad latera palati & narium amplitudinem, recta à foramine dicto deorsum usque ad dentium radices ducitur, [tabul. 3. si-
facit, cunealem sexto.

x Ter-

* Tertia in interna & laterali oculi sede & narium cavitare sita est, & oblique ab oculi radice usque ad nasi summum extrorsum ducitur, [t. 3. f. 8. R. S. T. V. X. T. Z.] & communis est inferius quidem brevi ductu sphenoidis protuberantiæ cum maxillæ superioris ossæ tertio; dein reliquo ductu ossis frontis laminam externam, cum ossibus maxillæ superioris secundo, tertio, quarto, & quinto jungit.

Quarta, ossis jugalis est, quæ per hujus ossis medium oblique ducitur [tab. 2. f. 6. T. tab. 3. f. 9. T. f. 8. P.] & temporalis ossis primi maxillæ superioris committit.

Quinta, inferius in narium amplitudine, inter processus pterygoidei ex posterioribus antrosum ducitur [t. 3. f. 9. sub E.] & sphenoidi cum septo narium communis est. Verum omnes ossium capitis conjunctiones, quæ externe saturæ sunt, ut plurimum interne, potius per harmoniam seu lineam, quam per futuram copuncta esse videntur. Contra in simia & calvaria, ubique adeo obscuræ sunt, ut magna ex parte futuræ nomē vix mereantur. Sunt etiam in aliquibus hominibus grandiores & laxiores; in aliquibus exiles & magis compactæ; & illis minus doloribus & capitis ab internis causis divexantur: hi vero ob fuliginosa excrementa retenta, quæ iua acrimonia meninges vellicant, suaque copia distendant, assiduis & maximis doloribus obnoxii sunt.

Ufus^a futurarum; primo ut sint cerebri spiracula, quo crassiora fuliginosa excrementa^b exhalare possint: hæ enim Galeno^c referente in viventibus facile interdum hiant, ejusque nomine etiam dolorem capitis causare possunt: hanc causam Hippocrates, illos sanioris capitis esse pronuntiavit, qui plurimas futuras habent & contra, qui capita absque futuris habent, Cephalæa infestantur. Sed non hujus solius nomine, alias tenuibus foraminibus, & quasi cavernulis quibusdam pertundi potuisset; quare cum cavernæ sine^c tegumento non fuerint relinquendæ, necesse fuit (quæ secunda est utilitas) duram cerebri membranam egredi & calvæ alligari; ne durior membrana cerebrum comprimat, vel quo suspensa ventriculorum & subjectarum partium compressionem impediatur, & trajecis suis^c filamentis ex crassiore parte pericranium, & tenuiore periostrum constituat. Tum ut vasa (quæ venæ puppis vocantur) alia intro, alia foras excidant, ad tutam illarum partium nutritionem ac vitam. Quarto, ut si quando caput siquæ fractum fuerit, fractura non per totum progrediat, sed inhibeatur, ut illic subsistat, ubi & os laucium cessat; alias in anteriore parte percussum & fractum, fissura per ossis continuationem ad partem posteriorem tenderet, nisi per futuras distingueretur. Tandem^b cum Natura ossa capitis æqualibus partibus non formarit, cum opus fuerit alias crassiores, alias tenuiores esse, alias varia

Mm 2

for

varia vix futurarum vestigia apparebant: meminit & mulieris, quæ post multum dolorem phrenesi interiiit.
^a Gal. usus septem agnovit, quinque 9. us. part. 17. recensuit: quartii fusi meminit 8. us. part. 9. habet & sex. 9. us. part. 7. & septim. 13. Meth. 22. ^b Gal. 9. us. part. 1. & 17. 11. ejusd. 18. Columb. 1. est. * com. 3. in officin. Hipp. ^c Gal. 9. us. part. 1. d. Gal. 9. us. part. 7. & pro quarta utilitate recenset, ut & Fallop. (Piccolho. non meminit) qui exempla adducit eorum, qui aulea suspendunt, & clavis carentes rimam quarunt, cui lignum pro clavo imponant. ^e Gal. 5. utilitas, de qua 8. us. part. 9. 9. ejusd. 17. & 11. ejusd. 18. & Fallop. qui hanc precipuam facit. Piccolho. 4. utilitas: at Arist. 2. part. 7. ut calva capitis sit amplior. ^f Gal. 9. us. part. 1. & 17. 11. us. part. 18. & 3. utilitas: & Fallop. qui venas has venas puppis appellat. ^g Gal. 9. us. part. 17. Col. 2. Fall. 6. Piccol. 5. utilitas, patiendi quadam difficultas ac securitas omnibus his adest, quæ ex multis constantur. 11. us. part. 18. ^h Fallop. 8. us. exprima primi Avicenna. ⁱ Gal. 13. Meth. 22. at Fallop. 7. us.

forma, ne unum os tantam varietatem haberet, potius diversa partes fecit, quas per futuras conjunxit. Addi potest & hæc, ut medicamenta ⁱ exterius adposita interiora subeant.

k & Plat. vide
Arist. 2. gen.
an. 6.

1 Gal. 9. us. par.
2. & ejusd. 18.
ejus substan-
tiam explicat.
m Gal. 9. us.
part. 2.
n Vide 9. us.
part. 18. dura

& densa, Pic-
colhom. dura
& solida, Plat.
crassa & rara,
Fallop. at Arist.
1. hist. 7. calva-
rot a os rarum,
rotundum, cu-
re à cæca ob-
ductum.
o Utrique in-
tervenit ac den-
sissima squam-
mam desinit 9.
us. part. 1. &
Col. qui & pa-
rietes & cru-
stas: Fall. qui
extremam su-
perficiem supe-
riorem & in-
feriorem vocat.
p Columb. Fal-
lop. Piccolhom.
q alius dicitur
dicitur ossis cal-
varie duplica-
ta lamina &
ejus pars inte-
rior & laxa,

cavernosa & mollissima: alius medullium vocatur & secunda lamina. Sic Hipp. de vuln. cap. est autem diploe maxi-
me cava & mollissima, plurimumque pervia: & rursum succrescit ex ossis diploe & ab eo quod sanum est, si superior
tantum ossis pars sphacelosa fuerit. Celsus dicitur interiorem partem, qua ossa inter se connectuntur, vocat, alius
medium calvarie discrimen. In hoc medullium carunculas quasdam esse voluit Fallop. com. in Hipp. de vuln. cap.
& Piccolhom. & Beniven. de abdit. 18. Palmar. de lue Venerea, 4.

Calvarie substantia pro ^k ratione ætatis variat: etenim in nuper natis mollis ad-
huc, hinc inde cartilaginosa & membranea existit, præsertim in commissuris [tab. 3.
sceleti a. tab. 4. f. 1. inter a. & b. præsertim tab. 4. f. 2. inter aa.] & elatiore mediaque capitis
parte, ita ut in aliquibus ad annos aliquot compressioni cedat: quod ⁱ tum ad par-
tum faciliorem, tum capitis in infantibus augmentum necessarium fuit. In adultis
vero ossea ⁱ est, roboris causa, non tamen densa ^m simul ac tenuis, sic enim partes
subjectæ securæ non essent à vulneribus facile intro penetrantibus: si vero crassa si-
mul ac densa, oneri fuisset, ac si quis capiti ^m suo onus aliquod imponat, idque per-
petuo gesser: quare neque tenuis, neque densa, sed crassa: rara ⁿ tamen & caverno-
sa [t. 4. f. 11. 12. L. tab. 5. f. 14. e.] esse debuit, crassa ob securitatem & fortitudinem, ra-
ra ne oneri sit, cavernosa, ^m ob vaporum transpirationem.

Duplici squamma [tab. 5. f. 14. a. b.] donatur ^o quas alii tabulata, alii laminas vo-
cant: quæ in viris crassiores in mulieribus tenuiores existunt: & harum superior,
inferiore crassior, durior, magisque æqualis est: inferior vero sulcis leviter exaspera-
ta, quo vasa crassam meningem perreptantia tutius ferantur, & inter geminas lami-
nas juxta aures, ad medullam irrigandam distribuuntur. Inter utramque enim la-
minam [tab. 5. f. 14. a. & o. c.] substantia est inter media ^p (Hippocrates ^q διπλοειδὲς ap-
pellasse videtur) quam alii pumici persimilem dixere, alii fungosam, fistulosam, laxā
& cavernosam, quamque aliqui medullium vocarunt: quæ ad horum ossium nu-
tritionem succum ^m medullarem eumque rubicundum continet, cum in eam ^r venæ
& arteriæ sanguinem cum spiritu, pro calvarie nutritione & vita effundunt: & hic
est ille sanguis, qui cum viventis hominis cranium terebra perforatur, emanare so-
let. Sic aliquando inter utrumque hoc tabulatum, humor transcolatione colligi-
tur, qui diutius retentus & corruptus, dolores acerbissimos causat: hinc sæpius in-
lue venerea inveterata, dolores hi, dum cranium exostosi quadam protuberat, indu-
cuntur. Quæ duplex lamina facta est, non tam ut leviora ^p forent, quam ut inter ea
medulla pro earum nutritione contineretur: & maxime ne in omnibus capitis per-
cussionibus, ictus totum os penetraret: hinc aliquando lamina una læditur, altera illæ-
sa: & tunc terebro elevari consuevit: Sic nonnunquam lue venerea laminam exte-
riorem exedit, rarius utramque, ægro tamen diu ^r superstite manente. Præterea
quibusdam locis longius à se recedunt, ita ut cavitates inter eas insignes conspician-
tur, ut in osse frontis, maxime ad superciliorum sedem, osse temporum & cunei for-
mi: aliis proximius junguntur. Aliis partibus crassiora sunt, ut parte superiore ubi
cranium ex carne est, parte inferiore in basi, præsertim circa foramina & sinus quo fir-
miora

miora sint. In reliquis vero partibus licet tenuis sit, dura tamen & solida est: ut circa tempora ubi admodum tenuis est: Sic circa latera magni foraminis in occipitio, per quod medulla transit, simplex est, tenue & pellucidum: quod à Chirurgis notandum, ne existiment ubique primæ laminæ abstractione tamdiu secandum & pungendum esse, donec sanguis exeat: ob hujus ossis tenuitatem contingit aliquando ex casu in nucham, hominem statim mori, licet forinsecus nihil conspiciatur: quod in puero Lugduni observavimus, qui ad gradus templi S. Johannis ab altero propulsus, ob casum in hanc partem, subito interiit: sed causa non in ossis læsionem, verum medullæ ob ossis tenuitatem læsæ.

Superficies calvariæ externa fere tota parte superiore æqualis & lævis est, ne per-
 riostium, quo circumdatur, lædat: attamen in ossis frontis marginibus, & supra ocu-
 lorum cavitatem ad robur extuberat, quemadmodum ad latera temporum ossa, mu-
 sculorum temporalium causa compressa sunt, & in occipitio tuberculis ad musculo-
 rum insertiones exasperatur. Inferiori vero sede, seu in ipsius basi, admodum inæ-
 qualis & aspera est, propter processus & sinus varios, extuberantiasque varias ossium,
 quas in ossium cujuslibet historia explicaturi sumus. Interna quoque cavitas etiam
 fere tota lævis est, ne dura membrana, qua succingitur, lædatur: superne, qua galeam
 refert, sinus habet læves in frontis & syncipitis ossibus, quib. dura membrana innas-
 citur, & inscriptiones pro venarum ductibus. Inferne vero varias productiones, ex-
 tuberantias & sinus, cerebri, cerebelli & instrumentorum sensuum gratia, obtri-
 net.

Foraminibus quoque crebris, exiguis, nulloque ordine dispositis, (quæ aliquan-
 do desunt) iisque transversis vel obliquis, utrumque tabulatum perforatum est, per
 quæ venulæ & arteriolæ ad interiorum ossium cavitatem, & ad membranam duram
 pertranseunt. Verum & cavernositates utriusque tabulati, etiam ad tenuium su-
 lignum transpirationem facere videntur: quibus retentis vertigines, aliique morbi
 oriuntur: siquidem corporis partibus omnibus caput velut tectum quoddam cali-
 da deo nui superpositum sit. Præter hæc habent & pleraque capitis ossa sua forami-
 na, cavitates, sinus & processus, de quibus in cujuslibet ossis historia sermo e-
 rit.

De Capite, seu cranii ossibus propriis.

CAPUT VI.

De his Galenus 9. usu part. 18. ubi de ossium temporum cum syncipitis conjunctione, agit 11. us.
 part. 18. 19. & 20. Hipp. de ossium natura. Arist. 1. animal. 7. & 3. ejusdem 7.

Capitis a ossa duplicia sunt, alia ipsius cranii, alia maxillæ; & quidem vel supe-
 rioris, vel inferioris Cranii b ossa in adultis communiter quatuordecim sunt; part. 9. capitis
 Mm 3 alia ossa 16. præter
 maxilla infe-
 rioris: ad 11. us. part. 18. capitis 7. maxilla superioris 9. inferioris. 2. b Gal. de ossibus 1. Capitis ossa vocat & sex facit.
 præter cuius forme. Hipp. octo sunt ossa capitis & oculorum, lib. de nat. oss. Arist. 3. hist. 7. caput non quatuor sed sex ossib.
 constat

constat, quorum duo exigua reliquorum comparatione circa aures posita sunt. Plat. partes vel ossa calvarie, 7. propria 2. occipitis & syncipitis communia cum maxilla super frontis, temporum duo & cuneiforme.

alia propria, alia communia. Propria itidem duplicia sunt, alia cranium, seu calvarie cavitatem scutellamve constituentia, quæ vulgo sex recensentur, frontis unum, syncipitis duo, occipitis unum, temporum duo: alia auditui inservientia. sex quoque, in quolibet temporum ossa tria, incus, malleus, stapes. Communia vero capiti cum maxilla superiore, duo sunt, cuneiforme & spongiosum. Verum in recens natis viginti duo sunt, frontis duo, syncipitis duo, occipitis quatuor, temporum duo, labyrinthi duo, auditus sex, cuneiforme unum, spongiosum unum, & nomine carentia duo.

Frontis os, quod ὀστὴ κατὰ μέτωπον dicitur [t. 2. f. 6. 7. L. tab. 3. f. 8. I. I.] primum est, in anteriore sede situm, cum anteriorem calvarie cavitatem supra infraque constituat, quemadmodum & frontem totam, & orbitæ oculorum elatiorem partem. Connectitur superius ossibus syncipitis [t. 2. f. 6. I. K.] beneficio futuræ^d coronalis [t. 2. f. 6. 7. A. B.] inferius partim calvarie ossibus, utpote cuneiformi, & quidem extrinsecus ad ossa temporum per squammosam futuram [t. 2. f. 6. & 7. A. g.] intrinsecus vero, futura octava [t. 4. f. 10. T. M.] item spongioso ossi, quod quasi complectitur, futura nona [tab. 4. f. 10. ab u. versus K. I.] partim cum maxillæ superioris ossibus aliquot committitur, cum primo quidem in oculi angulo exteriore, futura communis prima [t. 3. f. 8. R. t. 2. f. 6. & 7. g.] dein in oculi cavo cum secundo, tertio quarto osse [t. 3. f. 8. S. T. V. X.] & cum quinto in nasi summo [t. 3. f. 8. T. Z.] & quidem per futuram communem tertiam. Hoc in adultis unum est, rarissime geminum, [tab. 3. off. c. t. ab. 4. off. f. 2. a. a.] quale in nuper natis^e futura sagittali distinctum semper reperitur; aliquando etiam usque ad septimum annum, quæ postea coalescentibus ossibus obliteratur: quare in recens natis duplex est.

Figura est quodammodo^f circulari: perfectius, ubi futura coronali circumscribitur: imperfectius juxta oculorum sedem. Substantia est inter ossa syncipitis & occipitis media: in infantibus ea parte, quæ cum syncipitis ossibus committitur, ^h & futuræ sagittali occurrit, tenue est: cum in nuper natis [tab. 4. f. 11. T.] pars illa membrana^{ne} sit, in adultis vero, tenuius, & infirmius in oculorum cavitate, & ubi cum octavo osse committitur; quibusdam etiam locis duabus squammis pellucidis donatur. Crassius juxta futuras, ut melius connectatur, & nasi summum, & supra supercilia, ubi veluti in duas partes pro sinus & foveæ constitutione, diducitur.

Sinusⁱ enim satis ampli inter utrumque tabularum, supra nasum, in supercilio- rum regione, ut plurimum gemini [t. 4. f. 10. & 11. ad L.] alter à dextris, à sinistris alter occurrunt, fibris ossis squammulisque interstincti, interdum membrana^k viridi succincti & separati, quæ corpus molliusculum & medullosum ac veluti oleosum continet. His sunt foramina & in narium amplitudinem desinentia, & unum [t. 4. f. 10. fig. 10.]

^g Gal. de ossib. 1. Fallop. h. Col. cum Ca. pivaccio. i. A. Galeno, Theophilo, Oribasio prætermisissos scribit Fallop. at Vesal. geminos facit. Columb. nunc binos, nunc ternos. Plat. cavitates, seu antrum. Piccolhom. cavitates duæ. k. Columb. Fallop. Plat. 1. Plat. & Piccolhom. aliquando mucos, Columb.

c Gal. de ossib. 1. alio coronale, in verecundum os puppis.

d Gal. de ossib. 1. describitur futura coronali & communi, quæ à maxilla separatur. At Fallop. & Piccol. futuris tribus, Columb. quatuor describunt.

e Sic & Fallop. Plat. Piccolhom.

f Rotunda qualis sphaera compressa portio, Columb. inaequali ac varia, nec circulari est, nec plana propter cavitates quas habet.

Fallop. semiorbiculari, Plat. circulari, Piccolhom.

g Gal. de ossib. 1. Fallop.

h. Col. cum Ca. pivaccio.

i. A. Galeno, Theophilo, Oribasio prætermisissos scribit Fallop. at Vesal. geminos facit.

Plat. cavitates, seu antrum. Piccolhom. cavitates duæ.

k. Columb. Fallop. Plat. 1. Plat. & Piccolhom. aliquando mucos, Columb.

f. 10. *supra x.*] quod in calvariam definit, statim supra seprum [*tab. 4. f. 10. x. t. 5. f. 12. B.*] ossis spongoidis quo olfactus organa distinguuntur. At hi sinus in pueris ^m etiam supra annum non reperiuntur, ut nec in iis, qui ^m facie sunt depressa & lima, & in quibus frons ^m divisa est. Eacti autem sunt ob vocem ⁿ quo magis corona sit; si quidē in simis, & qui male loquuntur, non reperiuntur, dein ad aerem, ^o qui per nares attrahitur continendum: quo is alteratus ad hos sinus primum deferatur, & inde sensim ad olfactus organa, & ad cerebrum transeat, illudque alteret: & cerebrum quoque si affectum sit, ad statum naturalem reducat (ut si cerebro nimis humido, pomum ambræ olfaciamus, musco & ambra aer calefactus naribus attrahatur, ad sinus hos deferretur.) Quare sepe odor naribus attractus in his sinibus permanens, per integrum diem in natam suam imitate perlentitur. Sunt ^p qui velint, à materia contenta, quæ veluti oleosa est, foramen, quod in oculi angulo majore est, transeunte oculum humectari, & lubricum reddi, quo ocyssime moveatur.

Fovea in super ex duplici squama componitur: quæ tamquam marum exterioriorem orbitæ oculi partem constituit [*tab. 3. f. 8. supra E.*] & plana est: interior vero utrinque supra oculos cavitatem efficit [*t. 4. f. 10. ZZ.*] quæ plana non est, sed incriptionibus cerebri anfractibus, cujus portiones extuberantes suscipit, correspondet.

Sinus quoque, per medium hujus ossis intrinsecus usque ad os spongiosum fertur, qui propter sinum tertium crasse membranæ cerebri creatus est, ut ei cedat, ne ab osse frontis prematur.

Foramina aliquando habet in superciliarum sede modo bina, modo terna; at perculiaria tria obtinuit; alterum interius in commissura ossis spongiosi cum osse frontis in sinus transeunte, de quo dictum. Duo vero exterius ad superciliarum medium, utrinque unum [*tab. 3. f. 8. AA.*] modo orbiculare, modo oblongum in oculi orbitam deficiens, per quod ramus nervi tertiæ conjugationis, ex oculi sede ad frontis musculam cutim (forte etiam ad palpebrarum musculos) transmittitur, unde sæpe ex frictione frontis, sternutatio movetur.

Processus tandem duos emittit, alterum ad minorem, alterum ad majorem oculi angulum, ipsius orbitæ superiorem marginem constituentes.

Sincipitis seu verticis ossa [*t. 2. f. 6. I. K.*] *βέρυπτος* & *ὀφί* dicta, quia sub ipsis cerebri humidissimum & molliissimum situm sit: duo sunt in superiore sede locata, quæ in media capitis longitudine futura ipsi communi sagittali dicta [*t. 2. f. 6. E.*] simul juncta, superiorem calvariæ partem una cum lateribus usque ad aures majori ex parte constituunt. Vicinis quoque ossibus committuntur, antè quidem cum osse frontis & coronali futura [*tab. 2. f. 6. A. B.*] posterius occipitio lambdoidea futura [*tab. 2. f. 6. D. C.*] utrinque ad latera ossibus temporum, per squamiformes suturas [*tab. 2. f. 6. G. E. H.*] & tandem cuneiformi, portione suturæ quintæ seu cuneali superiore [*tab. 2. f. 6. & 7. H. A.*]

Figura

caput, quæ anterior capitis pars. Piccolth. & Gal. de oss. l. 1. c. 11. usque part. 20. *βέρυπτος* Hipp. 5. Epidem. 27. ubi suum fatetur errorem de vulnere ad suturas lapido inflicto. Quod etiam Celsus lib. 8. cap. 4. monet elegantem sententiam à docto notanda. Arist. 2. part. 7. *βέρυπτος* calvariam Gaza vertit: & 1. hist. 7. calva pars prior *βέρυπτος*, sinciput Gaza reddit. Latine nervalia parietalia, ossa rationis, seu cogitationis, Volcher. & Gal. de ossib. l. 1. tenuissimum infirmumq; omnium ossium capitis, Arist. quod *βέρυπτος* appellatur (Gaza occiput vertit) Arist. 1. hist. an. 16. & Suturis quatuor circumscribi, vult Galenus 6. Epid. 3. & de ossib. l. 1. vide 11. usque part. 20.

m Fallop. in observ.
n Fall. ostendit exemplo: in theatris antiquis ad infimæ partibus suere meatus, in quorum sine vasa collocabantur aenea, quorum ratione vocis strepitus ad vasa aenea ascendente fieret, echo & vox auferetur.
o Odoratus conferre vult Fallop. aerem attractum continere, quo in antea ossis spongoidis delabatur, voluit Colymb. ex quo forte materia ad animales spiritus gignendos cerebro subministratur. Hoc ridet Fallop. quia in pueris etiam spiritus animales creantur, in quibus tamen etiam ultra annum tales sinus non sunt: Plat. levitatis ossis frontis gratia creatos dicit, & forte odoratus conferre.
p Piccolthom. quod ante, &

u *Quadrilate-*

ra Galeno de

offib. i. sed non

aquilatera;

Fallop. quadra-

za, Plat. tetra-

gonia seu qua-

drata, Piccol-

hom.

x *Et Columb.*

lib. i. c. 1.

y *Arist. 2. part.*

7. & 7. hist. 10.

2. gen. an. 5.

z *Arist. 1. hist.*

7. & 2. gen. an.

6.

a *Arist. 7. hist.*

10. & Plinius

11. hist. 37. non

corroborantur

ante primum

sermonis exor-

dium.

b *Arabibus*

Zeudech, Fal-

lop. barbaris a

madore & pul-

su, fons pulsati-

lis. Germano-

rum aliquibus,

foliolum, Vol-

cher.

** hanc capitis*

ustionem ut pe-

riculosum,

Matt. de Grad.

Vesal. Mont.

Cass. 16. Ze-

chius in consi-

lio improba-

runt: forte quia

in infantibus

pars illa membranosa est: quam partem in adultis adhuc moveri & palpitare Gal. 13. meth. 22. conspexit.

c *Rhasis in 9. ad Almanforem. d* *De off. 1. quintum capitis os. Arist. 1. hist. 7. iuv. occipus ex os, id est, os, & caput, qua-*

si post caput, Piccolli os basilare quibusdam. Arabum interpretibus os prore, os memoria, os pyxidis. e *Semper unum*

est. Plat. f *Ejusmodi cranium habemus, meminit & Eustachius. Erasmus par. 4. cont. Paracel. Cum Paracelsus ani-*

mad vertisset inaniter offerri cranii pulverem, ut superstitionem confirmaret & augetet, c *ssiculum quoddam parvum,*

angulare magnitudine unguis, in capitis vertice inveniri mentitus est, quod epotum ab Epilepsia liberaret: sed non in

omnium capitibus, verum quorundam solum reperiri &c.

g *ex quatuor, quinque & septem in pueris, Columb. ut plurimum ex quatuor Fallop. qui ternarium, quinarium &*

septenarium numerum ridet: quatuor plerumque, Plat. occipitis ossa quinque, Piccolhom. ex tribus tantum Ca-

pivac.

Figura sunt pene ^u quadrilatera, & fere æqualiter crassa; at ubi ossibus temporum junguntur, attenuantur.

Substantia sunt in adultis dura & solida, aliorum tamen ossium respectu ratissima ^x quia caput hac parte plurima evaporatione indiguit, & infirmissima: hæc forte ratio, cui vulnera in syncipite ^x lethalia esse consueverint: in infantibus vero generis ^y humani, non autem aliorum animalium, horum pars anterior, ubi sagittalis cum coronali jungitur [*tab. 2. f. 6. B. K.*] ubi futuras laxiores esse volunt: membranosa est, & paulatim induratur; hæcque omnium ossium capitis ^z ultimo concrescunt & indurantur: ita ut censuerint pueros ^a non prius vocem articulatam edere posse, quam universa calvaria in os concreverit. Et propter hanc molliem cum ossa nondum ita creverint, ut totum cerebrum regerere possint, circa verticem veluti hiatus ^b seu fovea [*l. 4. f. 11. T. tab. 4. ossium fetus f. 2. inter aa.*] observatur, quam aliqui Fontanellam & fontem pulsatilem vocant: quo loci etiamnum hodie cauteria in desperatis cathar- ^ris inuri, ^{*} & a veteribus sartago ^c candens applicari consuevit; quem locum in vivis, medius digitus radici palmæ ad interciliū positus, designat. Hanc fontanellæ par- tem in uxore mea prima pie defuncta, etiam circa ætatis annum 26. nondū duruerat: & in si quando capite doleret (dolebat autem frequenter) locus hic dilatabatur & ve- luti foveam constituēbat.

Cavitates superficiales, seu exiguos sinus, habent intrinsecus, quibus dura mem- brana innascitur, quemadmodum & inscriptiones [*tab. 4. f. 10. & 11. SS.*] pro valis quæ a jugularibus internis, per crassam cerebri membranam feruntur. Foramina quoque nonnulla exigua reperiuntur, potissimum extrinsecus ad futuræ sagittalis latera, quæ hæc duo ossa a latere ad latus perforant, nutritionis gratia venulas trans- mittentia.

Occipitis os [*tab. 2. f. 6. & 7. M. f. 9. MM.*] quod *ὀστέον κατὰ ἰνίον* Galeno ^d dicitur, posterius situm est, & calvariæ partem posteriorem & inferiorem in basi mediam constituit. Vnum est ^e communiter in adultis, aliquando ex tribus ^f ossibus com- positum, quæ Triangularia quibusdam dicuntur & in Epilepsia commendantur: in pueris ^g ut plurimum ex quatuor ossibus usque ad finem constat: quorum unum su- perius, quod majorem capacitatem constituit, & in quibusdam etiam per medium sagittali futura secatur: alterum inferius sub magno foramine, quod illius additamen- tum vocant; duo ad latera illius foraminis, quæ tenuissima sunt, quæ per synchon- drosin uniuntur; siquidem lineis cartilagine oppletis dividuntur, ac cartilagine post- modum duriore reddita, in os convertitur.

Conne-

Connectitur ^h superius ossibus syncipitis [t. 2. f. 6. I. K.] sutura lambdoidea [t. 2. f. 6. C. D.] ad latera ossibus temporum lambdoideis additamentis, sive sutura sexta [t. 3. f. 9. in C.] & in medio cuneiformi [t. 3. f. 9. O. O.] linea seu sutura transversa, vel septima ipsi & cuneiformi communi [t. 3. f. 9. nn.]

Figura rotunda ⁱ fere vel potius diangula, ex duabus lineis circularibus in acutum desinentibus, constans.

Substantia durissimum simul ac ^k densissimum, & crassissimum ad basin cranei, ubi ex carne est, & ubi crassa membrana sinus duo [tab. 4. f. 10. sub f. g. h.] junguntur; osse enim frontis, cum parte sit posteriore, firmitus esse debuit, ad magni vero foraminis [tab. 3. fig. 9. A. t. 4. f. 10. d.] latera ^l tenuissimum & cavernulis destitutum; & ne ob tenuitatem imbecillius foret, in ejus medio roboris gratia, & quo minus ex supino casu laderetur, prominentia [tab. 4. f. 10. ad h.] ^m oblonga exurgit.

Sinus ⁿ novem habet, interius septem, quorum duo partim obliqui, partim transversi sunt, utrinque unus, qui per ossi temporum oblique in posteriora conscendit [t. 4. f. 10. a. b. versus q.] moxq; per transversum fertur [t. 4. f. 10. & 11. circa h.] & in medio occipitii conveniunt: facti, ut duos sinus crassa membrana excipiant, ne a calvaria ossibus comprimantur. Tertius rectus est, qui ex praedictorum congressu recta sursum abit, & sub sagittali sutura ossisque frontis medio ad os spongiosum fertur [t. 4. f. 9. ad h.] qui propter tertium sinum crassae membranae exsculptus est. Duo alii supra transversos sui, linea recta distincti, ut cerebrum, quod geminum est, rectius excipiant. Duo adhuc, itque maximi [tab. 4. f. 10. f. g.] in basi infra transversos, ^o cerebelli protuberantias excipientes. Exterius quoque duo sunt semicirculares ad duos processus anteriores exsculpti [tab. 3. f. 9. ll.]

Foramina habet ^p quinque: primum ^q [tab. 3. f. 9. H. tab. 4. f. 10. d.] in media occipitis basi prope primam vertebrae quod simplex est, & unum, omnium internorum capituli ^r foraminum maximum, rotundum & nonnihil oblongum; per quod medulla cerebri in spinam labitur. Duo alia ^s habet [tab. 3. f. 9. E. t. B. f. 10. b.] cum temporis osse communia, inter occipitis capitulum [tab. 3. f. 9. inter l. & i.] & appendicem styloideam, utrinque unum, insignis, oblongum, ac quasi geminum, per quod venae jugularis internae ramus major & arteriae carotidis ramus minor, parte inferiore & exteriori; parte vero superiore & interiore; sextum par nervorum transit. Duo alia ^t [tab. 3. f. 9. & tab. 4. f. 10. c.] propria, primoque proxima oblique ad interiora delata, quae orbicularia sunt, nonnunquam etiam oblonga, pro septimi paris nervorum, quod sexto mox jungitur, transitu. Aliquando tamen venam quoque & arteriam transmittit. Aliquando ^u in externa sede capituli hujus ossis, invenitur adhuc unum utrinque [tab. 3. f. 9. B.] non valde amplum, quod longo ductu in internam calvariam fertur; per quod venam & arteriam, quae vertebrae processus transversos conscendit ferri volunt. Saepem tamen in uno, aliquando in utroque latere deest, & cum vasa haec per duo proxime enarrata foramina transeunt. Extrinsecus ad basin a-

Nn

sperum

num omnium ossium dixit, quod Col. reprehendit. m. Col. Fall. ut Plat. extuberantia crucis instar eminens. n. sex Fallop. Interni tres, externi duo Plat. o. Quare Columb. reprehendit Aristotelem, quod occiput inane esse voluerit. p. Es Fallop. ut Plat. duplicia tria, & simplex unum. q. Quartum Plat. r. De ossib. i. l. Primum & commune Plat. t. Secundum & proprium Plat. u. Tertium & proprium Plat.

^h Gal. de offe. 1. lambdoidea sutura cum suis additamentis, & linea, quae hac ipsa additamenta junguntur, terminatur. Fallop. voluit secundum Galenum tantum a duabus futuris describi: Columb. reprehendit Galen. quod voluerit tribus tantum lateribus donatum esse: Vesalius Galenum explicans, quinque lateribus constare ostendit. ⁱ Gal. figuram non expressit: Fallop. diangulam dixit, quam figuram Euclidis & Campanus laudant: rombi figuram quoque tribuit Fallop. duo triangula ex parte latiore conjuncta Piccol. quibusdam triangula sphaerica. ^k Gal. 8. ut par. 2. ut de off. 1. densissimum firmissimumque: Col. substantia diversa est: Fallop. inaequaliter crassum. ^l Duo Arist. respexit, dum 1. hist. tenuissi-

sperum & inæquale est, ad musculorum & ligamentorum tam exortum, quam insertionem.

Processus (seu capita tandem duos * habet ad basin [t. 3. f. 6. ll.] antèrius latos y in infantibus appendice donatos, cartilagine tectos, interius magis, quam exterius protuberantes, qui in sinus primæ vertebræ inseruntur, quo capitis articulationi & motui inserviant. At posterius processus z parvus assurgit, ut à prima vertebra excipiatur. At in canibus a & taxis ab occipitis ossè aliud os triangulare sinuatum proccedit, quod cerebrum & cerebellum intercedit forte cerebrum suffulciens, ne cerebellum prematur.

Temporum ossa b five ὀστᾶ κροτάφου [t. 2. f. 6. & 7. N. tab. 3. f. 9. TT.] quæ præcipua sui portione circa latera ad aures sunt, & parte aliqua in basi, in adultis duo sunt, & parte aliqua in basi, in adultis duo sunt, utrinque unum: at in pueris quodlibet cartilagine interposita, per meatum auditorium dirimitur, cujus divisionis vestigia adhuc in adultis, ibi ubi meatus est principium, occurrunt.

Coniunguntur c superius quidem, cum ossibus syncipitis sutura propria squamiformi [t. 2. f. 6. & 7. G. F. H.] nonnunquam etiam cum ossè frontis: inferius & inferius, cum ossis occipitis additamento sutura sexta [t. 3. f. 9. m. n.] sic cum ossè cuneiformi antèrius quidem ad latera, sutura per quam os lapidosum cum cuneiformi committitur [tab. 2. f. 6. ab Ω. ad H.] in basi vero exterius ubi rimæ est, invicem divelluntur [t. 3. f. 9. ab n. ad o.] committuntur denique sutura communi quarta, processu suo jugali dicto, cum ossè primo maxillæ superioris [t. 2. f. 6. T.]

Figura sunt superius quidem ampla & rotunda d semicirculari; inferius vero nulla, cum rupes & asperas inæqualitates referant.

Substantia sunt e multiplici, ad basin crassa & aspera rupium instar, unde e ληθῶσα, petrosa dicuntur; quæ ascendendo paulatim f attenuantur, ita ut supra tenuissima sint & transparentia, præsertim ubi temporalibus musculis cedunt, & instar squamarum (hinc ossa squammiformia nominantur) syncipitis ossibus quæ descendendo attenuantur, junguntur; deorsum enim cum raro, & aut laxum cum duro, amicam societatem habere nequit: dura tamen sunt & densa, respectu subjectorum, cum horum sint veluti f propugnaculum, & sine vitæ periculo vix frang i^h possint: adde, quod suo pondere nimis gravarent, nisi superiora attenuarentur. Extrinsecus sunt solida, lævia & plana; intrinsecus vero propter cerebri anfractus variis inscriptionibus extuberantia: sic in basi appendicem unam, processus tres, foramina octo & sinu duos, obtinere.

Appendix i acuta est, oblonga, gracilis, parumque uti calcar galli incurvata [t. 2. f. 6. & 7. i. tab. 3. f. 9. ii.] quæ στυλοειδής, à columnæ figura & rectitudine, & βελονοειδής, quia acui similis est, nominatur: hæc in pueris cartilaginea est, in adultis solida, & dura:

circulus à mammillari processu turbaretur. Piccol. parte superiore & anteriore semicirculum, parte posteriore & inferiore nullam figuram habent. e Multifariam se habent, Gal. de ossib. 1. quare ex pluribus partibus constare dixit. f Gal. 9. us. part. 18. causam addit in fine capitis propter ligamenta à meninge, quæ cavernas ingredi debuerent. g Gal. 11. us. part. 18. h Columb. duo refert exempla puerorum curatorum, Patavii & Romæ. i Fallop. appendicem & recte nominavit Vesal & Laur. processum.

k Styloides, beloides graphioides à similitudine styli scriptorii: ὀδὼν ἄρον, quia similis est calcari galli, Gal. de ossib. 1. dicunt

dicunt Galenum in hoc processum meatum auditus constituisse. At Galenus intelligendus non de hac appendice, sed de eodem osse, & quidem in ea parte ossis temporum, quam à petra similitudine lithoides nominari dicit.

dura: at cum admodum promineat, levi occasione abruptitur, quare in calvariis e terra effossis raro occurrit, & etiam inter elixandum facile amittitur: ab hac, musculi ad os hyoides, linguam & inferiorem maxillam qui hæc deorsum trahunt; & ipsi, os hyoides ligamenti intermedio adnascitur.

Processus tres obtinet: primus est externus obtusus, deorsum tendens, utrinque nimirum unus, à papillæ uberis vaccini similitudine *μασχοειδής*, ¹ mammillaris dicitur [*tab. 2. f. 6. & 7. K. tab. 5. f. 8. M. f. 9. K.*] hic crassus & brevis est, intus cavernosus & nonnihil cavus [*tab. 3. f. 2. FFFF.*] forte quo levior sit, hicque musculorum caput flexitum insertioni inservit; quare asper est, rupisque similitudinem refert. Alter processus ^m ab auris meatu antrosum fertur, ad processum ossis primi maxillæ superioris, ad os jugale dictum constituendum, cum hi duo processus per futuram obliquam jungantur, & pontis quasi formam constituent [*t. 2. f. 6. & 7. V. X. t. 3. f. 8. ad P.*] Tertius processus ⁿ est internus [*t. 4. f. 10. aa.*] ac petrosus in longum protuberans, in quo triplex cavitas, tympanum, labyrinthus & cochlea; ubi & tria auditus officula sunt, quæ cum auditus gratia creata sint, de his in historia auris sermo erit: hic processus in infantibus os ^o labyrinthi nominatur, quod squamosis subjicitur, & arctissime agglutinatur, ut tandem coeant, & lapidosorum ossium processus interior appellatur.

Foramina habet ^p duplicia, externa sex; interna duo, quæ vel aliquid intromittunt, vel emittunt, vel præstant utrunque. Primum ^q externum [*tab. 3. f. 9. y.*] inter mammillarem processum & os jugale amplum est, quod aerem sonosque intromittit, & meatus auditorius dicitur. Secundum ^r in posteriori sede juxta & retro processum mammillarem [*t. 3. f. 9. x.*] ad futuræ lambdoidis latus transversum, & rotundum calvariæ cavitatem subintrat; quod modo in uno, modo in utroque latere deest, per quod venæ jugularis externæ ramus transit. Tertium ^s ad processum est petrosum [*tab. 3. f. 9. X.*] sub appendice styloide, quod magnum est, inæquale & obliquum ex posterioribus introsum in priora defertur; per quod arteriæ carotidis major ramus, oblique ad ossis cuneiformis foramen quintum fertur (& inde ventriculos cerebri subit) & tertii paris nervorum portio permeat. Obliquum autem fuit, quotius à posterioribus antrosum ^t feratur. Quartum ^u obliquum est, geminum & breve [*tab. 3. f. 9. V.*] venam jugularem intromittit, & nervi auditorii ramulum nunquam transmittit. Quintum ^x inter mammillarem processum & appendicem styloidem [*tab. 3. f. 9. d.*] rotundum est, & in canalem oblongum definit. Arteriam carotidem intromittit, nervumque emittit. Sextum ^y inter occipitis & temporis os, magnum est & inæquale, pro nervorum sexti paris transitu & venæ jugularis inter-

Nn 2

na cessus i. Plat.

ⁿ Quidam hæc

Galeni testimonio *βαλινωειδής* nuncupari asserit male Columb. Tertius, in quo labyrinthus, Columb. & Piccolhom. quem nomine cavere dicit. Plat. processus. 4. quem os petrosus vel lapidem vocant. Laur. cavitatem internam meatum audiendi constituentem. o Sic & Piccol. p Col. quinque Fallop. & Laur. duo Plat. 7. quorum quinque auditus organum petunt. q Temporum 3. & auditus i. Plat. r Temporum i. Plat. s Col. & Laur. i. Plat. temporum 2. t Alii causam obliquitatis voluerunt propter sanguinis spirituosi moram. u Temporum 4. & auditus 2. Plat. x Col. 4. Fallop. i. qui meminisse & tertii parvi, & voluti caci, quod in hominibus vix pateat, sed in canibus & lupis. Plat. temporum 5. & auditus 3. y Columb. 5.

Gal. II. 11. 11. f. part. 20. & de off. i. rupis similitudinem refert, Col. vaccini uberis, Piccolhom. In hoc voluit Vesal. & Columb. cavitatem esse pro auditus organo, & veluti diversis speluncis excavatum. Reprehendit Fallop. cum in pueris hic processus fere nullus, nec cavernas habeat: habent autem infantes auditus organa & tres cavitates. Laur. cum ad levitatem, tū ad audiendi commoditatem.

m Ossis jugalis epiphysis, Gal. de off. i. processus 3. Vesal. & Laur. at Columb. & Piccolhom. 4. processus i. Plat.

z Col. 3. Fall. na ad cerebrum ingressu. Septimum^z in calvaria est, in processus latere poste-
 & Laur. 2. riore [tab. 4. f. 10. a.] quod oblongum ac veluti ovale, sensim dilatatur, & cæcodu-
 Plat. 8. temp. 4. cu (unde cæcum dicitur) in labyrinthum fertur, in quod nervus auditorius, seu
 auditus. quintum par fertur. Octavum^a in processus latere anteriore [tab. 4. f. 10. e regione a
 a Plat. 7. temp. esse deberet.] est angustum & instar rimulæ asperum, quod ab auditus organo arterio-
 5. auditus. c Cavitas alte- lam in calvaria amplitudinem emittit.
 ra externa, cui Sinum quoque^c duplicem habet, exteriorem [t. 3. f. 9. b.] inter meatum^b audi-
 caput maxilla torium & processum ossis jugalis, qui oblongus, transversus & cartilagine incrusta-
 inferitur, alte- tus est, in quem maxillæ inferioris processus longior seu caput, inferitur & articu-
 ra interna, qua meatum audi- latur. Alter sinus est interior, ad ipsum processum sede posteriore, qui oblongus
 torium consti- & obliquus & ossi occipitii communis est. [tab. 4. f. 10. a. b. versus i.]
 tuit Laur.

b Col. statuit Galenum lib. de ossib. hunc sinum non recte descripsisse.

De ossibus capiti & maxilla superiori communibus, cuneiformi & spongioso.

CAPUT VII.

De his Galenus egit, & quidem de osse cuneiformi, lib. de ossib. i. & ii. us. par. 19. & 20. at de
 spongioso 8. us. part. 6. 7. & 9. ejusdem 3.

a Gal. de ossib. i. PRIMUM os capiti & maxillæ commune cuneiforme^a seu σφειοειδές dicitur; vel
 capitis os septi- quod figura cuneum, superius acutum, inferius crassum, imitetur; vel potius δον-
 mum, quod non τὸ σφινδός, quod instar cunei^b ossibus jam explicatis & maxillæ superioris interpo-
 nulli inter ca- natur. In media enim basi capitis situm est; ita tamen, ut omnia fere capitis & maxil-
 pitis, alii inter læ superioris ossa tangat: nam committitur, antèrè quidem ossi frontis futura trans-
 maxilla supe- versa octava [tab. 4. f. 10. a. T. ad u.] & ossi spongioso; interius quidem, futuræ nonæ
 rioris ossa con- numerarens eum inter utrâ que medium
 sum inter utrâ sit. At 9. us.
 part. 1. palatii os ad A.] & frontis ossibus futura eadem [ab A. ad g.] sic & ossibus maxillæ superioris
 dicitur, & de suis eminentiis jungitur, ut in latere interno in oculi camera, cum osse tertio maxillæ,
 ossib. 4. inter futura communi tertia: in latere externo, cum osse primo, quarto & sexto, idque per
 maxilla supe- futuram communem secundam [tab. 3. fig. 8. ab S. ad Q. & tab. 3. f. 9. ad d. & e.] jungi-
 rioris ossa re- tur.
 censuit: sic II. Hoc in adultis ex osse uno constat, licet ex quatuor^c ossibus interposita cartila-
 us. part. 19. & gine primo componatur, quæ postmodum uniuntur. Primum est basis in capitis
 20. palatii. pene medio, transversa linea ab extremo additamento ossis lambdoidis separatum,
 Vesal. & Col. quod
 7. est os capitis. Piccolhom. pro-
 prium capiti, & commune dici potest quatenus calviam constituit videtur proprium quatenus suis processibus alatis pa-
 latii partem posteriorem constituit, & palatum ad maxillam superiorem pertinet eatenus videtur commune cum ma-
 xilla superiore. Arab. interpet. os paxillare, os colatorii, os basilare, (quod non secus ac basis cerebro subternatur) &
 cavilla. b Maxilla super. & capitis ossib. instar cunei incumbit. II. us. part. 19. & 20. c Fallop. de ossib. ex tribus
 partibus, ac in obs. ex quatuor, quæ septimo mensæ vix distincta apparent. Plat. pueri duplex in medio, duosque obtinet
 latera. Laur. puerulus nunc triplex, nunc quadruplex.

quod glandulam pituitariam continet, [t. 4. f. 10. E.] Alterum nomine caret, & nervis opticis unitis destinatum est [tab. 4. f. 10. D.] quod cum primo copiosa cartilagine copulatur, cui versus palatum clavus osseus inest, & os longum latumque in ortu cartilagineum affigitur, quod cultro in aratro vomeri præeunti simile; tertium & quartum sunt utrinque processus alarum similes [t. 3. f. 9. char. 1. 2. 3. 4.] Quare cum multis processibus tum intus tum extra exasperetur, figura varium admodum est & ab antiquis ^d πολυμορφον, multiforme nominatur.

Substantia ^e ejus in basi quidem densa, partim cum huic veluti basi caput nitatur (hinc basilare barbaris) partim ne ab excrementis defluentibus lædatur: in junioribus solidum; in adultis vero in medio cavum: ex solida enim materia distenta antitrum constituitur, quod amplum est, squamma dura ac densa, nec ullis foraminibus pervia rectum: & quoad internam partem, substantia est nonnihil spongiosa. Quemadmodum is qui ex pauca materia vitri magnam phialam conficit: ita natura ut hoc os extenderet, cum nullam aliam materiam adungere vellet, ex hoc osse in pueris denso dilatato fecit os cavum.

Processus ^g habet plures, alios internos, externos alios. Interius utrinque duo, quos ^{κλεινοειδεις} vocant, eo quod utramque inferiorem lecticæ mensæve partem ex-primant [t. 4. f. 10. αα.] horumque duo anteriores insigniores & crassii ex basi lata in acutum mucronem desinunt: duo posteriores, cum in aliquibus non extuberent, sed parietem referant, pro uno à quibusdam habetur: ephippii vel sellæ turcicæ referunt, & sella sphæroidis dicitur: quorum usus, ut crassa meninx validius adnectatur. Exteriores duplices sunt: anterius quidem utrinque unus, juxta septum ossium ^α narium & palatum, parte qua cum maxilla superiore cohæret, qui cum vesperilionum alis affimilentur, ^{ωπερ κλεινοειδεις} & aliformes dicuntur: siquidem crassii in acutiem & tenuitatem insignem desinant [t. 3. f. 9. ch. 1. 2. 3. 4. & t. 5. f. 12. HH.] Hi sedem ^h atque operimentum musculis in ore latitantibus exhibent: quare in medio ipsorum sinus profundus, oblongus, ut musculus ortum inde ducat, tutoque muniatur. Posterius autem dicti processus utrinque; duobus apicibus versus styloidem processum protruberat: quorum anterior obtusus, qui faucium musculo primo ortum præbet; posterior asper & acutus: unde quintum par musculi maxillæ inferioris prodit. Alius denique ab extrema & media parte prodiens, palatum bipartito dividit.

Sinus quoque huic ossi insculpti, extrinsecus quidem in processibus aliformibus, uti dictum. Intrinsecus vero, anterior & superior transversus & oblongus [t. 4. f. 10. ad C.] nervorum opticorum conjunctioni sedem præbet. Posterior vero & inferior fere quadratus, latus, lævis quo infundibuli collum pertingit, & glandula pituitaria suscipiens locata est [t. 4. f. 10. E.] unde postea in palatum ac nares defluit. Ab hoc enim sinu, ad latera utrinque canales gemini superficietenus solum cavi prode-unt, quorum superiores [t. 4. f. 10. F.] antrosum ad secundum ipsius foramen perveniunt, per quod lachrymæ in oculos stillant & pituita quæ hinc per quartum foramen, quod in oculi sede est, vel ad nares, vel ad fauces fertur: per inferiores [t. 4. f. 10. O.] vero pituita ^k in rimam [t. 3. f. 9. N.] quæ inter ossa petrosa lyncipitis & cuneiformis sita, & inde in palatum destillare creditur.

Nn 3

Cavi-
asperum, vel
foraminulis ple-
rius.

num occurrit, ut aliqui contra voluerint, ut pituita expurganda viam excogitarent, quare quibusdam male os colato-

d Vesal. Col.
Fallop. Plat.
Laur.
e Gal. 9. u. par.
3. & 11. ejusd.
19 substantia
densa ac dura.
Vesal. reprehendit
et visum patere, non esse
densum, sed
duas habere ca-
vitates amplas,
que facile di-
gitum admit-
tunt. Idem di-
cit, in basi om-
nium capituli
ossium crassissi-
mum spectari,
quamvis non
simul densissi-
mum & auris-
simum.
g De his Gal.
11. u. part. 19.
qui productiones
alio similes
vocant: & lib.
de ossib. 1. cavi-
tatem ipsis tri-
buit.
h Gal. 11. u. f.
part. 19. maxil-
lam moven-
tium tertius
Vesal.
i Aliqui spon-
giosum volunt,
alii negant.
Hinc Vesal.
nunquam in-
tegrum calvarii
Cavi-
asperum, vel
foraminulis ple-

rii. Idem Plat. k Sinus oblongi Vesal. sinus obscuriores quatuor, Plat. sub glandula duae capacitates latitant, in quibus vere mirabile Galeni continetur, & ab his canales gemini emergunt, qui in rimas desinunt, Laur.

Cavitates habet: duas quidem ad latera praedictorum sinuum cum ossibus temporum & syncipitis communes, intrinsecus concavas, extrinsecus vero convexas [t. 4. f. 10. SS.] Unam vero satis insignem * in huius ossis basi [t. 4. f. 10. sub E.] inter superficiem, quae cerebrum & eam quae oris cavitationem respicit, obtinet, quae in pueris ¹ non reperitur, licet pars haec annum integrum spongiosa sit; in adultis vero cava & squamosa, interdum non distincta, ^m sed spongiosa & squammis variis composita; interdum in duas ⁿ cavitates [t. 5. f. 12. C. D.] distinctas [t. 5. f. 12. E.] quae pro ossium incremento magna est aut parva: quae tenuissima quoque membrana vestitur, eo modo quo cavitates geminae frontis & quae in malis sunt; & haec vel vacuae sunt (quare vocis ⁿ & ossium levitatis gratia creatae nonnullis videntur) vel in iis viscida pituita ^o continetur. His tertia exigua p. cavitas septo rursus bipartita subijcitur [f. 12. G.] & ab illa insigni cavitate foramina duo ad nares abeunt [f. 12. F.] forte ut aerem p. admittant: alias undique squamma continua obducitur, nec usquam pervia, quam in narium amplitudinem, quae tamen squamma ^q tenuis est, & stylo quovis in adultis mox penetrabilis: si vero ^r in quibusdam sinus hi non occurrunt, tum intus cavernosum ad compactioris pumicis formam effingitur, & ejus superficiei continuae squammae obducuntur.

Foramina habet decem, ^f quorum alia in oculi orbita, alia in basi calvariae occurrunt: in oculi orbita, propria tria & communia duo cum maxilla superiori. Horum primum, juxta processum sellam constituentes, quod circulare est [t. 4. f. 10. B. t. 3. f. 8. EE.] pro nervorum opticorum transitu & superne in externo latere veluti angulum minutissimum habet [tab. 4. f. 10. C.] quo una vena minima ad oculum transire possit. Secundum superiore parte effractum, rotundum non est, sed ^u veluti sinum semicircularem, seu rimam, vel longam amplamque cavitationem in acutum angulum desinentem, refert [t. 3. f. 8. G. t. 4. f. 10. G.] (an Galenus * dum dixit, os sphaenoidis cribri modo perforatum esse, hanc rimam intellexit? quasi voluerit, rimam hanc esse instar cribri per quam pituita stillet) parte vero humiliore nonnihil oblongum & orbiculare; per hoc secundum nervorum parad oculorum musculos, qui ibi exoriuntur,

num ampliss.

facit. p. Nihil praeter aerem continet cum molli medulla, magnitudine tamen cavitati non respondente, Vesal. medullosum quid continet, Plat. in omnibus fere amplum & vacuum, in aliquibus spongiosa alicujus substantia plenum, Col.

q. Exiguum antrum, Vesal. Plat. i. Crassissimum recentiorum plures volunt.

i. Vesal. t. Laur. quatuor Plat. novem. u. Et Fallop. & Col. hic vero superioris anguli non meminit.

z. Gal. priorius minus dicit, quod in homine falsum esse, Fallop. scribit: Columb. asserit, aliquando orbem efficere. Vesal. & Col. arguunt Galenum, quod hoc os cribri aut spongiae modo perforatum statuerit, per quod pituita percoleatur. Fallop. vult, Galenum de hac rima intelligendum esse, & Laur. qui aliquando exigua foramina in ressecatis notavit, vult per illa, aut per ossis internam substantiam porosam, spongiosamque sensim excrementa cerebri in sinus patentes transcolari, quam excidere, alias continuo expuere cogeremur, & os apertum tenere. Sylvius etiam sua experimenta adducit. Dicimus Galenum recte scripsisse, densum esse & durum, ne ab excrementis ledatur, qui statuit continere foramina meatuum expurgantium, intelligens duos canales in palatum, ut explicat 8. usq. part. 6. & 9. ejusdem II. addit praeterea, hac duo foramina amplatenuibus foraminibus quasi cavernulis donari, quod non de superficie intelligendum, sed de substantia interna, qua nonnihil spongiosa est.

untur, permeat; dein & tertium par, seu portio minor tertii paris ad cutim frontis, musculos malarum & narium, quæ partim per foramen ossis frontis supra internum oculi angulum, partim per foramen quartum transit; tum arteriæ carotidis ramus insignis; quarto, etiam ramus à vena temporum majore cavitatem capitis subintrans: quinto, & humiditates aquosæ cerebri in glandula collectæ, unde lacrymæ fiunt, ad oculi cavitatem pertranseunt; & inde per foramen quartum ad quintum, indeque in narium amplitudinem profluit. Tertium sub eadem statim rima parvum est, & ad amissim rotundum, per quod quinti paris nervorum ramus minor, ad musculos temporales & in ore latitantes, transmittitur: nonnunquam & tertii paris graciliorem radicem, quæ cum secundo pariali quando excidit [t. 3. f. 8. H. t. 4. f. 10. H.] Quartum, ex cavitatis oculi latere externo versus nasum, insitit rimæ oblongum & maximum quod sphænoidei cum osse quarto maxillæ superioris commune est, quod oculi orbita emittit nervulos tertii & quinti paris minores radices in musculos, simul & pituitam, quæ omnia per secundum foramen erant ingressa. [t. 3. f. 8. & 9. D.] Quintum, in oculi radice latitat, ad prædicti foraminis finem, quod insigne amplum & oblongum est, quo pituita quæ ex calvaria per foramen secundum delapsa est, & dein oculi sedem per foramen quartum, & inde per quintum, hoc in narium amplitudinem labatur [t. 2. f. 7. P.]

In basi quoque calvariæ quinque occurrunt. Primum in sede interiore, ad latus sinus, ubi glandula locatur, foramen orbiculare amplum & breve, quod arteriæ carotidis ramum majorem, à secundo temporum foramine, in calvariam intromittit [t. 4. f. 10. X.] secundum, in sede exteriori oblongum nonnihil & amplum, quod tertii & quarti paris vulgo dicti nervorum radices crassiores emittit. [t. 3. f. 9. Q. t. 4. f. 10. Q.] Tertium, prædicto extrinsecus proximum, sed multo minus & orbiculare, pro venæ jugularis internæ ramo, qui calvariam & duræ meningis substantiam subit, [t. 3. f. 4. R. t. 4. f. 10. R.] interdum ad sexti foraminis latus exiguum occurrit, pro dictæ venæ ramo paratum. [t. 4. f. 10. M.] Quartum est ad nares, meatus oblongus, recta antrosum delatus, per quod ab arteriæ carotidis ramo majore, ramus ad narium amplitudinem fertur. [t. 4. f. 10. V.] Quintum ad extremitatem processus alati in palato satis magnum, pene ovale, quo per id nervorum par tertium ad linguam ejusque tunicam, dentes & labia pro sensu, & par quartum ad palati tunicam constituendam, permeare possint. [t. 3. f. 9. µ. v.] Similiter ad hujus processus radicem, foramen cartilagine cinctum apparet, quod est meatus ab aure ad palatum producti extremitas, cujus beneficio muti, ore aperto, si quis eis in os loquatur, audiunt, de quo infra cap. 49. plenius.

DE OSSE SPONGIOSO.

Secundum os^a capiti & maxillæ commune, quod capitis octavum os aliqui^a Sic & Fal.
b faciunt, cum admodum sit^c foraminulentum & cavernosum ἡδρυσενδῆ, à cribri lop. Piccolhom.
simili- Laur. Gal. in
lib. de ossib. hu-

jus non meminit: Sed 8. us. part. 6. 7. & 9. us. part. 3. b Vesal. & Columb. quod suis partibus mutilatum recensuerunt:
alii ad ossa maxillæ, ut Plat. alii ad ossa nasi retulere: Gal. 9. us. part. 3. ossa narium appellat. c Gal. 8. us. par. 7. & 9.
ejusd. 3. σπρυσενδῆς & ἡδρυσενδῆς: Nazianzeno dicitur ἡδρυσενδῆ pars meningis, Polluci ἡδρυσενδῆ pars nasi superior, ab
ἡδρυσενδῆ colo.

d Gal. 8. us.
part. 6. & 7. 9.
ejusdem 3. La-
tinis, spongio-
sum, spongio-
me: cribrifor-
me vel cribro-
sum.

c Attestante
Galeno 8. us.
part. 7.

f Gal. 8. us.
part. 6.

g Columb. se-
cundum & ter-
tium dicit.

l Sic & Piccol-
hom.

i Vesalio & Pic-
colhom. quare
Laurent. Vesalium
hoc loco erra-
re dicit.

k 8. us. part. 7.

l Gal. 8. us. par-
6.

m Fallop. in
observ.

n Gal. 8. us.
part. 6. addit

usum alium,
ut si usus inci-

derit, repente ac confertim excrementorum copia vacuetur. Laurent. secundarius usus. At Plat. negat posse fieri
nisi præter naturam eo fiat.

similitudine vocarunt: at cum foramina hæc non sint recta (licet nonnulla ^d ejus-
modi sint) ut in cribro, sed ^d tortuosa & anfractuosa ut in spongia, rectius ^d *σπογιοειδές* cum Hippocrate ^e dicitur. Situm est in anteriore calvariae sede ante ^f menin-
ges, & fere totam narium cavitatem opplet, & frontis basis medio veluti committi-
tur [t. 4. f. 10. K.] & à sphænoide sede posteriore sutura capitis nona, seu potius har-
monia distinguitur [t. 4. f. 10. supra u.] exterius vero ad secundum os maxillæ & su-
terioris terminatur.

Figura simile est ei ^h quadrato, quod altera parte longius, & altera parte latius de-
pingitur: at hujus vera imago ^f in puello unius anni considerari debet, cum in adul-
tis à reliquis ossibus sine ruptura avelli nequeat; & quomodo os maxillæ tertium
ⁱ creditum, quod orbitæ oculi partem tenuem, sed solidam & planam constituit, &
spongiosum os in naribus, quod in lue venerea sæpe exeditur, & cribriforme os, unius
ossis partes sint, patebit. Sunt enim hujus ossis partes quatuor: prima, processus est
superior in hujus ossis medio oblongus, triangularis in apicem acutum definens, &
forma cristæ galli referens, aliquando tenuis & latus, aliquando crassus, qui totum
os septi instar dividit, & cerebri processus mammillares distinguit, cui etiam tertius
duræ meningis sinus, qui cerebrum dividit, valide connascitur [t. 4. f. 10. x. t. 5. f. 12. B.]
Altera est utrinque ad processum, ubi calvariae cavitatem explet, undique cribri mo-
do frequentibus & exiguis (in canibus, amplioribus) non rectis, sed tortuosis & an-
fractuosius foraminibus perforatur [t. 4. f. 10. K. l. t. 5. f. 12. AA.] quæ membrana tenuissi-
mè perforata tegitur, unde ^d *σπογιοειδές*, totum os appellatum fuit aliqui colato-
rium nominarunt. Tertia, processus inferior, superiori oppositus, qui narium supe-
riorem partem distinguit. Quarta, spongiæ aut pumici similis & cavernulis prædita,
unde *σπογιοειδές* totum os nominarunt, ubi carunculæ plures & exiles cellulæ discre-
tæ conspiciuntur, quibus tumefactis, polypus generatur: hoc in superiore parte na-
rium consistit: hujus alia pars plana, tenuis, solida & lævis oculorum orbitæ commit-
titur, & orbitæ partem interiorem perficit. Spongiosum & obliquis foraminibus
donatum est, ne aer frigidus inspiratus, vel etiam impurus viribus integris recta in ce-
rebrum se insinuet, & immodice refrigeret (& hic recte Galenus ^k sapientiam opifi-
cis commendat) sed ut aliquantum retentus alteretur & immutetur. Quare mul-
tiplex hoc os est, cribriforme, ad caput; spongiosum, ad narium cavitatem; planum ac
latum, ad oculorum sedem existit: hinc ossis hujus substantia patet, quod sit majore
ex parte, tenuissima, & quod crebra, exigua, & obliqua foramina obtineat: exigua
quidem, ne corpus aliquod crassum in cerebrum feratur. Usus foraminum, ut per
ea aer ad animalis ^l spiritus generationem inspiretur: dein, ut cum aere odores in
cerebrum ascendant; quare mammillares processus seu olfactus organa ad hæc fora-
mina feruntur: hinc qui coryza laborant, ob foramina hæc pituita obstructa, odorem
sentire nequeunt: sic horum usus in cerebro affecto, ^m ut aer mendicamentis altera-
tus, diutius in his cavernulis retentus, magis in cerebrum agat. Secundarius usus est
cerebri expurgatio, ut si usus inciderit, Galeno ⁿ monente, quando scilicet ventricu-
li copiosa pituita repleti fuerint, pituita in os cribriforme & nares stillat: qui tamen
fluxus

fluxus præternaturalis est. Est etiam in posteriori hujus ossis sede utrinque o rima o Sic & Plat. quædam semicircularis, ac si unguibus impressa foret, quæ duram meningem illi ad- & Laur. nexam, & multis foraminibus petvium firmat [t. 4. f. 10. infra K.]

De Meningibus Cerebri.

CAPUT VIII.

De his tractavit Galenus 8. us. part. 7. 8. & 9. 9. adm. an. 1. 2. de Reduplicatione vero crasse meningis, & venis & arteriis cerebri agit 9. us. part. 5. 6. & 7. item 9. adm. an. 2.

Quemadmodum infimum ventrem, ejusque partes Peritonæum, ac medium ventrem Pleura succingit; ita & calvaria cavitati membrana duæ subrenduntur; quas Galenus, eumque sequuti proprie ^a *μυωγες*; Erasistratus, *ἐπιεργιδες*, Pollux, *ἐλαγιδες*; Arabes & vulgò, Matres vocant, quasi ab his omnes membranae propagarentur. Macrobius vero Omenta dixit; involucria, membranae, pelliculae nominari possunt: harum altera exterior crassa sive dura, altera interior tenuis sive pia nominatur.

Crassa Meninx, Hippocrati ^b *πυχτήρη*, Galeno *σκληρῇ*, ^c sive *πυκτα*, sive *δεξ. ματώδης μυωγῇ*, id est, crassa, dura & cuticularis, sive dura mater vulgo dicta, eo quod membranis reliquis totius corporis sit crassior, durior & robustior; & quod ad tenuem relata, talis sit. Hæc figura è magnitudine ossibus cranei respondet, cum omnes ejus sinus & cavitates succingat. Major tamen est tenui meninge, ne vasa illius comprimantur, quæ distenta & nimio sanguine turgida, capitis dolorem causat, imò sæpe apoplexiam: unde videmus plurimos apoplecticos morientes, aliquando etiam post mortem, sanguinem per nares & os effundere.

Connectitur basi cranei ejusque processibus acutioribus, & foraminum orbibus [t. 9. f. 7. ZZ.] quam firmissime (quare hinc oriri nonnulli censuere, cum hujus, ut aliarum membranarum, principium ex quo semen sit) p æterquam cuneiformis ossis sinui [t. 4. fig. 10. E.] ubi glandula pituitaria sita est [t. 11. f. 15. A.] & ad illius latera, ubi sinus sunt, arteriarum carotidum propaginibus cedentes; & calvaria faciem internam totam succingit. A calvaria, quemadmodum & à cerebro tantum distat, quantum pericardium à corde, ne ipsius elevatio & depressio, sive diastole & sistole, quæ ipsi, perpetua est (ut in capitis vulneribus videri potest) impediatur: cranio tamen tenuibus membraneisque fibris (quæ ligamenta Galeno ^e dicuntur) ab ea evatis validissime connectitur, quæ per capitis suturas, præsertim circa futuram lambdoideam, foras excidunt, & singula ^e versus cranei partem sibi directam, unde exortuntur, extenduntur, indeque progressi sibi mutuo occurrunt, exacte uniuntur, & ex seipsis communem membranam, quam Pericranium appellant, procreant, sub qua

Oo

tamen

^d Galenum primum hoc statuisse, se vero nunquam assequi potuisse, asserit Fall. in obs. & in instit. ait, exterior meninx cerebrum omni ex parte ambit, atque in ipsius sublationibus, continuo enim movetur, ossi occurrens, ejus duritiam innoxie patitur. Plat. sinus tertius arteria alicujus instar pulsat, quod cum in tenuis calvaria, antequam penitus coalescant in vertice tactu deprehendatur, ut cerebrum moveri multi falso crederent, occasionem præbuit: Columb. & Piccolhom. perpetuo moveri, exemplo vulneratorum probant: vide infra cap. 15. in margine plura ^e 8. us. part. 9.

^a *Μυωγες* Hipp. lib. de carn. generalius sumit, nam *venis*, *stomacho*, *fascibus ventri*, *intestinis* & partibus cavus tribuit.

^b De loc. in homine: Cerebri meninges duæ sunt, *superna* quidem *πυχτήρη*, altera quæ cerebrum contingit, *λεπτῇ*, quæ ubi vulnerata fuerit non coalescit. At Arist. 3. hist. 13. maxime *ἰμύρον* duæ sunt circa cerebrum quarum altera circa os firmior & crassior, altera quæ cerebrum ambit.

^c Indiscriminatim utitur 7. us. part. 6. & 9. ad an. 1.

tamen alia tenuis^c membrana consistit, quæ Periostrum dicitur; à quibus membrana reliquæ totius corporis ortum ducunt. Nec solum cranii suturis alligatur, verum etiam tota sua superficie mediis ossibus, Galeno monente, adnectitur. Quare Hippocrates, os modiolò excisum vi auferre prohibet, ne membrana quæ ossi adhæret laceretur, sed supurationem expectare jubet. Tenui autem membranae & cerebro, vasorum beneficio cohæret [t. 6. f. 2. DD. GG. t. 9. fig. XX.]

f Omnes ante me simplicem dixerunt, cum dua sint membrana dura meninx, quarum una interior, altera exterior. Col. lib. 7. c. 1. duplex quidam est, sed non idcirco dua dura meninges, quæ admodum cornea in quatuor & quinque tunicas distrahi potest, nemota men quinque corneas dixit.

Laur. quod duplex quasi sit, majore ex parte ignorant Anatomici, Fallop. obser. crassameninx gemina, Piccolhom. * Riol. idcirco apud Aristoph. in ranis, Dio-

nysius comminatur se capiti lethale vulnus inflaturum διὰ λέγου ἐκ κεφαλῆς ἰπλοῦ δύο. Scholiast. notat ὁ ἐκ κεφαλῆς τὸν αὐτὸν πῦρ ἐκείνους τοὺς τοῖς τῆς οὐκ ὄντος φωνῆς: quia etiam Aristarchus medicus, eam compactionem approbavit, ut ibidem Scholiast. refert. g Vesal. ac Fallop. ait, pericranium in duas partes separari posse, alteram quæ cuti hæret, esse pericranium à periostrio. b Quemadmodum pericranium, crenio exterius pro periostrio adest, ita interna calvaria superficiei pro periostrio subest membrana cerebri durior, aut saltem exterior ejus pars, Fallop. observ. i Gal. 9. ul. part. 7. Gal. 9. ad an 1 juxta mediam longitudinem multo se ipsa crassior potissimum ea parte qua suturarum media tenuis ingredientem, conspicies. Sylvius vult isthac discrimina non fieri à geminata membrana, sed simplicem duntaxat intercedere: hoc Riol. verum dicit in ea parte quæ falcem representat, sed inter cerebrum & cerebellum in utroque latere duplicem existere.

l Sic Ves. Col. Laur. cui falx dicitur. Verum Vesalii hac sunt: processus falcem referens non duplicatur, etsi Galenus secus docuerit, sed simplex est, quemadmodum & ipsa membra: licet enim sinus tertius per longitudinem dissectus primo intuitu membrana processum, qui inter cerebrum intercedit geminum esse, ac veluti duplicata membrana constare ostendit, id tamen sinus duntaxat occasione visitur. Et Plat. lata sunt membra & simplices, nisi quatenus sinus amplius illas pervadit: contra Col. Laur. volunt hanc reduplicationem falcis corpus constituere.

Duplex^f est, quemadmodum & cæteræ corporis membranæ, cujus superficies, seu pars exterior, quasi tendo quidam latus alteri expansus ac connatus videtur; durior est & aspera, partim propter fibras, quæ (calvaria parte abstracta) lineæ simplicis instar extuberant [t. 6. f. 1. GGG. HH. II.] partim & quod in vertice, ubi sutura sagittalis cum coronali jungitur, tubercula subinde reperiuntur, quæ in calvaria sinus obtinent, quibus valide innascuntur [tab. 6. f. 1. K.] & propter venas huc & illuc discurrentes, sicut folia exprimere volunt. Interior vero superficies splendida, lavis, lubrica, multoque candidior, omni adipe destituta, & aqueo humore magis, quam exterior perfusa [t. 6. f. 2. HH.] At qua parte cerebrum spectat, magno sensu pollet: quæ vero cranium, & minori sensu prædita est, cum ossis duritiem attingere debuerit. Foraminibus multis pervia est, primum ut venisⁱ quamplurimis transitum largiatur: dein nervorum conjugationibus: tum in medio, uno foramine eoque orbiculato, pro infundibuli transitu, pertunditur [t. 10. f. 11. F.] sic ad hujus latera pro arte iæ carotidis ingressu [t. 10. f. 11. C. & D.] & maximum quoque foramen habet, quo spinalis medulla descendat [t. 10. f. 9. H.] Tandem ubi ossi spongioso imponitur, instar cribri^k perforatur [t. 12. f. 18. ad F. & fig. 9. ad FF.]

Reduplicatur in capitis vertice & cerebrum in dextrum & sinistrum ad cerebri medietatem, sive corpus callosum separat [t. 8. f. 3. à D. ad B.] quæ reduplicatio duræ membranæ tertio sinui continua, subjicitur, & cum sinu per ipsius capitis longitudinem antrorsum ad summam nares fertur, & septo instrumentorum ossæctus connascitur [t. 7. f. 3. N.] quemadmodum posterius in medio cum processu posteriore. Hæc reduplicatio crassæ meningis, processus superior dicitur, falcemque^l messoriam refert: siquidem parte posteriore, qua duræ membranæ portioni cerebellum integrenti continua est, latior est, falcisque basi correspondet [tab. 7. f. 3. ad D.] juxta mediam in ipsius

in ipso longitudinem, multo seipsa crassior, dorsoque assimilari potest, quemadmodum anterioris falcis mucroni; sensim enim falcis ritu arcatur: quare hujus processus pars cerebrum respiciens intro obliquatur [t. 7. f. 3. ab F. G. ad H.] Alter vero processus posterior qui brevior est, cerebellum à cerebro magna ex parte distinguit [t. 9. f. 7. 0000.] imo & cerebellum integrit, ⁿ quadruplicatur, vel, si mavis, triplo, quam in reliqua sede crassior duriorque; [t. 9. f. 7. inter 00. & XX.] In hac membrana canalium duplex genus reperitur: unum, per quod vasa veluti arteriæ feruntur, quæ per membranam disseminantur: alterum, in quod venæ desinunt, quod canalium genus loco venarum est; hos posteriores sinus nominarunt, de quibus nunc.

Sinus ^o quatuor hic occurrunt, quos Galenus ^p modo meningis ^{Διαφύσεις} sanguinem deducentes, modo crassæ membranæ ^q ventriculos vocat, quia ex membranæ reduplicatione oriuntur, & instar rivorum ^r sanguinem & spiritum vehentium existunt. Quorum duo primi sede posteriore in occipiti basi inter cerebrum & cerebellum, utrinque unus [t. 11. f. 13. M. N.] dexter & sinister dictus, ad latus foraminis spinalis medullæ principium habent, juxta futura lambdoidis latera, ubi venæ & arteriæ se exonerant, qui cranio attenti, & ad futura lambdoidis prope medium & cerebelli apicem delati simul coeunt in communem cavitatem desinunt, quem locum [t. 11. f. 13. O.] Herophilus ^{Ληρόν}, torcular nominare solebat; quod inde velut ab arce quadam rivi hinc inde mittantur: alii quidem ex medio loco in totum cerebellum derivari: alii ex parte anteriore feruntur: unde tanquam ex torculari sanguis è venis & arteriis effusus, in universum cerebrum exprimitur. Ab his utrinque ^u ad latera, ramuli venarum instar excurrunt, nonnulli ^v admodum graciles & solum pilum exprimentes; quidam vero ampliores [t. 11. f. 13. SS.] qui in vicinas membranas, crassam [t. 9. f. 7. 0000.] & tenuem [t. 10. f. 9. B. D.] quæ universum cerebellum operiunt, excurrunt. Ex horum concursu [t. 11. f. 13. O.] duo alii sinus prodeunt, longitudine & cavitatis forma variantes, quorum alter elatior, qui tertius sinus dicitur [t. 13. f. 13. PP.] humilior alter, sive quartus [t. 11. f. 13. R.]

Tertius sinus, qui veluti ^x rivus sanguinis existit, & à Galeno ^y interdum vena nominatur (alii ^u Herophili ^{Ληρόν} censetur) recta secundum ^y capitis longitudinem [t. 6. f. 1. & 2. CCC.] inter dextram & sinistram cerebri partem, sub elatissima futura lambdoidis parte & sagittali futura delatus, in anteriora excurrens, sub frontis ossis medio in summis naribus, olfactus instrumentorum osseo septo [tab. 11. f. 13. Q.] committitur; hic triangulum ^z referret, nisi parte superiore semicirculum imitaretur; hujus enim, quemadmodum & duorum priorum cavitas duas costas introrsum, tertiam vero extrorsum curvas habent. Ab hoc sinu ^a per totam ^b longitudinem

Oo 2

ab utra-

^r Hinc fortasse deceptus Pelops, qui vasa omnia à capite ortum ducere existimavit. ^t Gal. 9. us. part. 6. 9. ad. an. 1. ^u Gal. 7. adm. an. 2. ^v Gal. 9. ad. an. 1. ^w Gal. 9. ad. an. 1. ^x Gal. 9. us. part. 6. & 7. ^y Quid aliud quam venam appella veris ejusmodi vas, in quo sanguis continetur? 9. ad. an. 1. ^z Col. triangularis, Plat. sinuum cavitates ad trianguli formam accedunt, Vesal. a. Velpotius à venis in sinu positis, inquit Columb. qui per hos sinus venas jugulares internas excurrere credidit. Et Piccolth per duos priores sinus venas jug-

m Gal. 9. ad.

an.

n Vide 9. ad. an.

x. quadruplica-

tur, Col. Piccol.

Laur. triplo fe-

re crassior, Ve-

sal.

o Sinus decem

agnoscit Fall.

in obs. utrinque

quatuor, dein

nonnum, qui ab

anatomicis pro

tertio & deci-

mum qui pro

quarto ab aliis

habetur. At in

inst. sex sta-

tuit, quorum

quatuor etiam

alii sint acti,

duo alii nulli.

An forte Gale-

nus horum si-

num sub no-

mine ^{πλεγμα-}

τος διαφύσεις

meminit: de ha-

jus enim ampli-

tudine loquens

[t. 9. us. part. 4. πλε-

μα, inquit, ὁλί-

γοῦ δὲ ἡ τῶν κα-

φάλε βάλαι

κατατεταγμέναι

εἰσι τὸ το

πλεγμα.

p 9. us. part. 6.

at 9. ad. an. 1.

διωδὲν δεικνύ-

ται.

q Τῆς παχέως

μύτης ὁ

λαί. 9. ad. an. 1.

na jugulares interna & arteria jugulares interna feruntur, & in tertium sinum se insinuant, & a l. naves excurrunt, imo & per quartum. b Gal. 9. ad. an. 2.

e Gal. 9. us. par.
6. di. & h. u. r. e
negvis vocat.

ab utraque cerebri parte, utrinque à sinu lateribus ductus, quos & xerēs etiam Gale-
nus vocat, frequentes veluti à vena aliqua majori oriuntur, quorum aliqui b exigui
(venas reptitias vocant) existunt; & horum surculi alii parte superiore [tab. 11. f. 13.
XXX.] prodeunt, & sursum c ad cranei duplicationem & pericranium feruntur, cum
illis commissi, qui ex verticis cute per exigua foramina, ipsorum causa insculpta, cal-
variam ingrediuntur. Alii parte inferiore graciles [tab. 7. f. 3. EE. HH. t. 11. f. 13. VVV.]
qui deorsum c in eam crassā membranā partem distribuuntur, quā Fa'x dicitur. Alii
ex sinu latere [tab. 11. f. 13. TTT. t. 6. f. 2. DD. FF.] numerosa serie in tenuem membra-
nam diffunduntur, & cerebri anfractibus cum tenui membrana inferuntur, & ubi te-
nuem membranā prætergressi sunt, ipsam cerebri substantiam ingrediuntur. His
aliquando dehiscen- tibus, tantum sanguinis è naribus profluvium excitatur, ut vigin-
ti quatuor libras effluxisse observatum fuerit, in quali profluvio non fronti, sed parte
posteriore revulsionis causa remedia †† adhiberi debent.

†† Quare Hip-
in Metone cui
substillum san-
guinis è nari-
bus supervenit,
occiput aqua
tepidā fovet,
ut sanguis libe-
ralius fluat.
d Dissectionum
professores ta-
cuisset scribit
Vesal.
e Sic & Co-
lumb.

* in venam ma-
gnam degene-
rat, Gal. 3. us.
par. 18. hac in
myriades ve-
nas capillares
fratitatur, ex
quibus Plexus
choroides con-
texitur, Riol.

f Gal. 9. ad. an.
2. à sinu qui per
totam longitu-
dinem fertur,
vena frequen-
tes & exigua
distribuuntur,

præterquam dua: una quidem secundum torcular in anteriora secundum totius capitis longitudinem procedens: alte-
ra vero in medio totius cerebri, inter posteriorem & anteriorem partem, quæ in altum descendit, ut multifariam præ-
pagatur. vide & cap. 3.

Quartus sinus d (qui nusquam ut cæteri calvariae vicinus) brevis est, in cerebri
humiliore sede, qui inter cerebrum & cerebellum ad nates & glandulam pinealem
recta fertur [t. 9. f. 7. T. t. 11. f. 13. R.] ipsiusque cavitas, triangulo trium æqualium co-
starum introrsum curvarum, correspondet & ex concursu duorum priorum cum
tertio junctorum enascitur: cujus principium quod latum est, vel potius omnium
quatuor concursum [t. 11. f. 13. O.] nonnulli Torculari * vocant; & hinc venæ e quæ
per cerebri substantiam feruntur, ut eam alant prodeunt. Ab hoc quoque in pro-
gressu exiguæ propagines promanant, quarum aliæ sursum in crassā membranā se-
dem supra cerebellum, & etiam ad falcem aliquoulsque excurrunt [t. 11. f. 13. TT.] aliæ
deorsum [t. 11. f. 13. aa.] feruntur, quæ etiam in crassā membranā, qua cerebello
incumbit, ac in tenuem tam cerebri, quam cerebelli membranā diffunduntur. Mox
in ductus alios dividitur, duos quidem, qui à superiore ipsius parte, unum qui ab in-
feriore prodit; qui à superiore, duplex est, major & minor: f major [t. 11. f. 13. b.] cras-
sæ membranæ humiliora, qua cerebrum per totam ipsius longitudinem dividit, per-
reptat; à quo & surculi [t. 11. f. 13. ccc.] sursum ad hujus membranæ processum excur-
runt. Minor vero, qui vel dexter vel sinister [t. 11. f. 13. d. e. t. 3. II. F. GG.] & venarum
modo, tenui membrana suffultus, secundum cerebri longitudinem supra corpus cal-
losum utrinque ducitur, ut tenui membranæ ramulos aliquot largiatur, & utrinque
in s cerebrum distribuat.

Inferior vero ductus [t. 11. f. 13. f.] unus est, in tenuem membranā cerebellum
investientem propagatus. Hicque dividitur in duos ramos, quorum alter antror-
sum [tab. 11. f. 13. g.] per cerebri anfractus, in ventriculi humiliorem sedem definit, ac
cum ascendente arteria [t. 11. f. 13. y.] jungitur, ut plexum choroidem, ajunt, consti-
tuant. Alter ramus retrorsum ad cerebellum reflectitur [t. 11. f. 13. h.] ac in tenuem
ejus

ejus membranam multifariam spargitur. Tandem quartus sinus in vas & insigne, te-
nui membrana involutum [1.9.f.7. V.1.11.f.13.i.] definit, quod juxta testes varie divi-
sum & varicosum, ad glandulam pinealem fertur, & sub fornice cerebri, usque ad ve-
triculi tertii sedem interiorem excurrit & bipartitur, ramo dextro [tab. 11.f.13.l.] ad
dextrum ventriculum, sinistro [m] ad sinistrum exporrecto: & arteriæ primæ &
quartæ ramis, pro plexus choroidis efformatione commisceri volunt.

Hi autem sinus vel concavitates^h venæ tunicam non habent, sed utraque corpo-
ra similis substantiæ existunt, nam ubi primum^h vena calvariam attingit, crassa inē-
brana ibi duplicatur, nec non internar. gio fistulæ modo sinuatur, & cum hisce sinu-
bus tanquam si venæ essent, ipsi venæ junguntur. Horumque usus, & venæ & arte-
riæⁱ officium præstare, quare & sinus hi arteriarum instar pulsant; venas & arterias
^k excipere, ipsarum materiam quam continent, in se recipere (sanguine enim refer-
re existunt, & venoso crassiore & arterioso cum vitali spiritu, quem continent, &
qualem^h acceperunt, conservant, in mortuis vero^h gruum continent) & de se pro-
pagines venis similes producere, quæ ad meninges & cerebrum ferantur. Cum enim
cerebrum amplum sit & numerosa sanguinis copia semper indigeat & venarum ac-
arteriarum majores trunci per cerebrum ferri non possint, Natura hos rivos & sinus
(quilocos venarum & arteriarum sunt, & velut aquæductus totum cerebrum perva-
dunt, & irrigant) fabricata est, in quos sanguis copiosissimus semper effunditur, quæ
commixtum & alteratum per alios canales in cerebri anfractus, ejusque substantiam
postmodum derivat, & pro cerebri nutritione, & pro spiritus animalis in ejusdem
substantiam procreatione, nam cū cōtinuo in sensus & motus instrumenta diffunda-
tur, motuque absumatur, copioso sanguine tam venoso, quam arterioso in hisce sinu-
bus permixto, opus habuit. Et hos canales per superiora natura duxit, quia tutum
non erat, venas per mediam & mollem cerebri substantiam ferri, ne venis cerebri
pondere compressis, sanguinis commearus interciperetur.

Usus crassæ meningis, cerebri universam substantiam cingere, & cum suis partibus
integere (siquidem medullæ spinali, quemadmodum & nervis transeuntibus ve-
lut involutum quoddam obducitur) & veluti^l propugnaculum quoddam cranii
impressionibus opponi. Dein prohibere, quo minus^m arteriæ cerebrum circum-
dantes, in sua diastole, ab ossis duritiæ lædantur. Tum cerebrum à cerebello, & ce-
rebri in partemⁿ dextram & sinistram dividere. Tandem ligamenta per suturas
ad pericranii constitutionem producere & calvariæ firmare, quo minus cerebri pon-
dere detracta, deorsum labatur, neve cerebrum deorsum concidens, ventriculos
comprimat.

Oo 3

De

ipsorumque materiam suscipere: Fall. in obstantum venas & nullas arterias ad sinus pervenire voluit. Laur. vero
venas jugulares internas ingredi, & sanguinem effundere: Plat. tertium sinum sanguinem venarum & arteriarum
vehere & per alia vasa cerebro distribueri, arteriaque instar pulsare scribit. At Piccol. crassiores & insigniores venas
& arterias. 1 Gal. 8. us. part. 9. in Sic & Varesius. n Gal. 9. us. part. 7.

g Gal. 9. ad. an.
3. et si Colum-
bus suum in-
ventum dicat.
h Gal. 9. ad.
an. 1.

i A Galeno &
ceteris disse-
rib. haud ani-
madversum,
qui venarum
tantum mune-
re fungi credi-
dere, Vesal.

k Venas jugu-
lares ingredi,
& ad extre-

mum usque pro-
gredi voluit

Columb. & Ve-
salium repre-
hendit, quod

non agnovit.

idcirco sangui-
nem non esse ex-
tra vasa, quod

si esset, addit,
quod Vesal. sen-
tit, dura mater

venarum prin-
cipium dicere-
tur. Respond.

cum Galeno 9.
ad. an. 1. Quid

aliud quam ve-
nam appellare

ris vas quod

sanguinem re-
cipit & conser-
vat? Vesal.

vult, venas &
arterias omnes

præter duos ra-
mos excipere.

De Tenui Meninge.

CAPUT IX.

De hac egit Galenus 8. usu partium 8. & 9. item 9. ad. an. 2.

Crassa membrana detracta, Pia mater occurrit [ut ostendit tab. 6. f. 2. & t. 7. f. 3. PP. crassam, 00. tenuem notat] quæ ob tenuitatem, & per se, & comparatione cum aliis membranis considerata, λεπτή^a μίλιγγ, tenuis meninx & χοροειδής, ^b id est, secundina, siquidem χορῶς foetus similis sit, cum cerebrum venas & arterias contineat, ne in motibus suo situ dimoveantur, cum sedem seu basin ^b infirmam habeant.

^a Hipp. de sacro morbo, cerebri medium μίλιγγ λέπιδι διείδιδι: Gal. 9. ad. an. 2. λέπιδι ὑμῶν ἢ μίλιγγ. ^b Μίλιγγ χοροειδής 8. us. part. 9. siquidem similis sit χορῶς foetus, atque animalis mesenterio, 8. us. part. 8.

^c Cabrolus & Laur.

^d Λεπτή ἢ μίλιγγ, ὑμῶν ποδῶν π. 9. ad. an. 1.

^e 2.

^f Gal. 8. us. part.

^g 9.

^h Gal. 9. adm.

ⁱ an. 2.

^j Gal. 8. us.

^k part. 9. idcirco

^l piam materem

^m dicam putat

ⁿ Platerus.

^o h Gal. 8. us.

^p part. 8.

^q A supernis

^r partibus vul-

^s gus existimat.

^t Laur.

^u k Galen. 9. adm. anat. 2.

^v 1

^w Offa hac quoque cingi videntur, qua nunc mutato nomine periostrum vocatur. Archan.

Membrana est, potissimum intra calvam sita, proxime arctissimo complexu cerebrum ambiens, & cerebri figuram æmulans; magnitudine cerebro ejusque partibus correspondens, in corpulentia vero summe tenuis, licet duplicem eam aliqui ^c faciunt. Tenuis est, quo anfractus cerebri ingrediatur & pondere suo cerebro non sit molesta, & vasa per universum cerebrum deducat, [t. 6. f. 2. EEE. t. 7. f. 3. 00.] Mollis est ^d & exquisiti sensus, cum sensum tactus, cerebro & nervis communicare debuerit, & ut Piccolhomini voluit, tactus ipsius instrumentum: quam Natura ^e cerebro & crassæ meningi interposuit, ne cerebrum ab ejus vicinia & contactu ^e doleat. Quemadmodum enim, inquit Plato, inter terram & ignem, quod natura multum inter se dissimilia essent, Deus aquam & aerem interposuit; ita & Galenus ^e affirmat, Naturam in medio cerebri & cranii, quia substantiis multum discrepant, utraque meningem posuisse. Nam si tenuem ^e solam Natura fecisset, non potuisset citra noxam cum cranio consuescere; sin vero crassam, cerebrum ipsum pateretur. Ut igitur ^e neque cerebrum, neque ejus operimentum quicquam paterentur, prior quidem tenuis meninx, post ipsam autem, crassa posita est, quæ quanto osse est mollior, tanto tenui cerebrum est mollius. Quomodo autem ^f crassa plurimum à tenui distet, & quanto intervallo, scire voles, foramine parvo in crassam facto, tubæ cujusdam exiguæ initium inde & infla, & regionem ei subditam aere haud modico impleri conspicias.

Hæc non modo cerebrum, cui tenacissime adhæret, immediate tanquam naturalis ^g ejus operimentum tegit, continet ac constringit, ne ipsius substantia, quæ mollis & humida est, in perpetuis motibus divellatur (partes enim nudatas extrorsum diffluere videmus,) verum etiam in profundum ejus ^h se insinuat, & ad ventriculorum ^h cavitatem internam eos undique succingendo, se extendit, dum ab inferiori parte, qua infundibulum est, & arteriolæ ex carotidibus per latera cuneiformis ossis ⁱ ingrediuntur, ascendit, ita ut etiam in profundo ^k sit conjuncta; extra cranium vero infundibulum seu pelvim efformet, & glandulam pituitariam parte elatiore investiat, infra dicitur.

Ufus

^k Galen. 9. adm. anat. 2. 1 Offa hac quoque cingi videntur, qua nunc mutato nomine periostrum vocatur. Archan.

Ufus ergo cerebrum, cerebellum, spinalem medullam & nervos tegere, ^h stabilire ^h & vasa omnia per eam excurrentia, quo tutius & commodius per cerebri corpus, ejusque omnes partes distribuuntur, ^h colligare, & ut aliqui ^m volunt, ut sit sensus tactus exquisitum instrumentum.

*m Piccolhom.
lib. 5. sua Ana.
lect. 1.*

De vasis per cerebrum disseminatis.

CAPUT X.

De his vide Galenum 9. us. part. 6. & quomodo venæ & arteriæ diversimode quam in aliis partibus per cerebrum ferantur, 9. us. part. 4. & 5. de venarum in cerebrum ingressu, 9. adm. an. 2.

Vasa, quæ per cerebrum ^a disseminantur, duplicia sunt, Venæ & Arteriæ. Arteriæ, vel venarum jugularium tam internarum, quam externarum calvariam subeuntium, rami sunt: vel Sinuum quatuor duræ matris, propagines existunt. Arteriæ vero, arteriarum carotidum & cervicalis soboles existunt: at non solum per utramque meningem vasa hæferuntur, sed etiam ad cerebrum, cerebellum, spinalemque medullam: plurimas enim venulas & arterias capillares, per candidissimam cerebri substantiam disseminari, à Galeno edocti, hæcenus ostendimus.

Vena ^b enim jugularis interior, ubi ad calvariæ basin parte posteriore pervenit [t. 1. f. 13. ad A.] in duos ramos dividitur, quorum alter amplior retrorsum, alter gracilior antrorsum fertur.

^c Prima [C inferior] secundum calvariæ basin cum arteriæ carotidis ramo minore ducitur, & ubi musculis sub œsophago latitantibus furculos largita est, per occipitis ossis foramen primum [t. 4. f. 10. b.] quod sexto nervorum pari paratum est, calvariam & crassæ meningis sinum subit.

^d Altera [F. tab 6. f. 1. DD.] quæ carotide arteria relicta antrorsum fertur, postquam furculum [n] auditus organo per temporum ossis foramen quartum transmissit, calvariam per cuneiformis ossis foramen septimum [t. 4. f. 10. R.] ingrediens, crassæ membranæ basin & latera, cum à sinu tertio procul distent, alimentum deferens, pervadit; à quibus tamen etiam tenuem membranam perreptantes furculi produnt [oo. pp.]

^e Tertia [E] venæ jugularis externæ propago est; hæc enim sub auris regione in duos ramos dividitur, exteriorem, de quo in faciei historia: & interiorem. Interior, ramos tres in cranium mittit, & posteaquam partibus oris, quæ ad fauces sunt, ramos distribuit, calvariam accedens per temporis ossis foramen juxta mammillarem processum [t. 4. f. 10. e.] crassæ membranæ sinum subit.

^f Quarta [G. t. 12. f. 19. HH.] jugularis externæ ramus interior est, quæ antè ex oculi sede per cuneiformis ossis foramen secundum [t. 4. f. 10. G.] quod pro nervo-

a Nulla vena aut arteria cerebri substantia intexitur, quemadmodum aliis visceribus, & ple-risque musculis, sed à cerebri membranis continentur, & cerebro accumbunt, & vix ullibi ipsius substantia adnascuntur, Vesal. substantiam illius non penetrant, aut per illam disseminantur, sed duntaxat membranas ipsius perreptant, Plat. vena ac arteria cerebri substantiam ingrediuntur, quod nemini hucusque cognitum, Columb. cui obijci-mus Gal. 9. ad an. 3. verba:

διὰ τοῦτο οἱ παρὰ τὴν κεφαλὴν φασὶν ὅτι τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας διὰ τὴν ἐν τῇ κεφαλῇ οὐσίαν διὰ τὴν ἐν τῇ κεφαλῇ οὐσίαν: vide & 8. us. part. Fallop. etiam statuit, Venulas & arteriolas per substantiam cerebri ferri in suis observ. b Vena sex, & arteria tres utrinque, Vesal. Vena sex & arteria quatuor, Plat. Arteria tres, Fallop. c Vena cerebri secunda, Vesal. & Plat. d Vena tertia, Vesal. & Plat. e Vena quarta, Vesal. & Plat. f Vena quinta, Vesal. & Plat.

rum pari secundo exsculptum est, transiens, per crassam membranam versus superiora disseminatur.

3 Vena sexta, Vesal. & Plat.

8 Quinta [H. t. 12. f. 10. I.] ab eodem ramo, unde & quarta prodit, & antèrius ex narium amplitudine per cribrosi ossis foramen [t. 4. f. 10.] in crassam quoque membranam distribuitur. Harum duarum usus, anteriorem hanc partem enutrire, cum ad eam sinus tertius non pertingat, sed juxta processum mammillarium septum desinat. Hæque cum parvæ sint, sine comite arteria feruntur; quamvis etiam ab arteria prima furculus huc mittatur.

h Vesal. & Plat. at Fall. in obs. cranium ingrediti negat. Laur. in cerebrum emicare dicit.

Præter has quinque venas, sunt ^h qui & aliam (quam pro prima cerebri vena recensent) dari velint, quæ cervicalis venæ sit terminus: nam cum cervicalis ad summam cerebri vicem venerit, ipsius residuum una cum conjuge Arteria per occipitii ossis foramen tertium privatim illi paratum, vel eo absente per secundum, quod pro nervorum septimo pari factum, pertransire, & utrinque in sinum crassæ membranæ desinere. Quod hæcenus, fateor, reperire non potuimus, quo vero & aliis non desit inquirendi occasio, eam tamen figuræ addidimus [t. 11. f. 13. *litera D. notatam*] Cervicalem enim venam partim in foraminibus vertebrarum cervicis absumi, ita tamen, ut ne primam quidem vertebra attingat; partim in cervicis posteriora, ramis etiam ex adverso ad musculos cervicis posteriores transmissis, disseminari, à Fallopio edocti notavimus. Quæ venæ invicem ac simul cum quibusdam aliis colligantur, quæ ex sinibus crassæ membranæ, per foramen in calvaria amplissimum extra mittuntur: multæ enim sunt venæ, quæ à dura membrana & per suturas ac per foramina propria ad exteriora capitis propagantur, quæ cum exterioribus aliquot jungitur: quod forte huic opinionioni ansam præbuit, ut recte Fallopius monuit, ita, ut existimarint, venas exteriores esse, quæ per illa foramina ad crassæ membranæ sinus ingrediuntur, & cum externis copulantur. Hæc de Venis cerebri, nunc de Arteriis.

i Arteria jugularis interna & externa, Piccol.

i Arteria carotidis utrinque secundum asperæ arteriæ latus cum vena jugulari interna ad fauces ascendit, ibique in ramos duos dividitur; alterum externum, de quo in Faciei historia sermo erit: alterum internam ampliorem, qui in fauces deferitur, & posteaquam & linguæ & laryngi furculos largitus est, ad calvariæ basin [B] in duos ramos impares dividitur.

k Arteria tertia Vesalio, quam in duos graciles, & duos crassos ramos dividit. Arteria 3. Fall. at Plat. 4. ac Columb. vult arterias carotides illud foramen ingredi, quod jugulares venas internas suscipit, non autem ut Vesal.

ius voluit cum his venis assurgere, & in duræ matris sinum ingredi, neque duas arterias parere, ut Vesalius cogitatione potius, quam visu deprehenderit.

Arteria ^k prima [t. 11. f. 13. L. f. 15. CC. t. 12. f. 19. P.] quæ paulo minor est ipso trunco, ascendens & integra manens, ubi ad foramen proprium in osse temporis exsculpro pervenit, & per ipsum in calvariæ cavitatē ad ossis cuneiformis sellam pervenit, sub dura adhuc membrana latitans, primum utrinque in crassæ membranæ latus ramum dispergit [t. 11. f. 15. D.] dein in brutis animalibus infinitas propagines de se mittens, Rete mirabile efformat, de quo Galenus egit, quod ad mentem Galeni se effinxisse Vesalius dicit [f. 14. t. 11.] at ejusdem tabulæ figura 16. prout in brutis, maxime bobus, vitulis & ovibus reperitur, ostendit. In hominibus vero hoc Rete etsi revera decur, insignetamen non est, sed respectu brutorum potius umbra quædam est; & tamen arteria in has propagines non absumitur, sed semper integra remanet [t. 11. f. 16. B. C.] mox duram meningem perforat, & modo simplex, modo gemina, [t. 11. f. 15. F.] ita tamen, ut statim rursus coeat, fertur: & ubi ramum minorem [X] per cuneiformis ossis

offis foramen secundum, extra calvariam ad oculum [tab. 11. f. 13. H.] ut vitam ipsi & musculis præbeat, cum nervo optico repens & musculus temporalem transmissit, grandiore ramum sursum mittit, qui ad latus glandulæ pituitariæ statim in duos ramos secatur, quorum interior cum oppositi lateris arteria interiore unitur, sicque unitæ in arteriolas plurimas absumentur, quæ ad initium nervorum opticorum, per tenuem membranam [t. 11. f. 13. e. & t. 12. f. 19. R.] & ipsius cerebri substantiam disseminantur. Alter reflexus [tab. 11. f. 13. ad A. superius. f. 15. G. & t. 12. f. 19. Q.] tenui membrana involutas, in ventriculum priorem cerebri fertur, in varios ramulos divisus, quorum aliquot cum arteriis illis, quæ a cervicali per basin capitis sub cerebro ad eandem hanc sedem pervenire, uniuntur: aliquot vero per tenuem meningem, & per cerebri substantiam disuncti feruntur, qui cum aliis furculis plexum choroidem dictum constituunt, ita ut ex quatuor arteriis hic plexus componatur.

Arteria secunda [tab. 11. f. 13. g.] prædictæ ramus est, qui oblique fertur, & ubi per temporis foramen secundum calvariam subiit, in ramos duos dividitur, quorum alter extrorsum, alter introrsum fertur: exterior ^l [t. 11. f. 13. f.] per cuneiformis offis foramen octavum, in narium cavitatem [t. 11. f. 15. E.] ubi pulsus per sentitur, desinit, & unum nasi extremo [t. 11. f. 13. t.] offert. At interior ^m bipartitur [t. 11. f. 13. uu.] primo: dein à parte exteriori, adhuc gracilem [t. 11. f. 13. r.] ramum de se mittit, ⁿ qui cum vena secunda [F] in crassam membranam eodem modo, & in eundem usum distribuitur.

Arteria tertia ^o [t. 11. f. 13. i.] quæ minor est prima, cum venæ jugularis internæ ramo [t. 11. f. 13. C.] ad calvariæ posteriora defertur, & ubi musculis cervicis interiora obsidentibus furculum largita est, [Φ] occipitis foramen primum [tab. 4. f. 10. b.] & crassæ membranæ ^p sinum subiit.

Arteria ^q quarta propago est axillaris intra thoracem adhuc existentis, quæ cervicalis dicitur; hæc sursum delata [in tab. Arteriarum F.] per foramina processuum transversorum cervicis, postquam musculis ejus loci furculos tribuit, inter caput & primam cervicis vertebra crassam membranam, quæ spinalem medullam vestit, in latere perforat, cui postquam propagines tribuit, calvariæ cavitatem per amplissimum ^r ipsius foramen ingreditur: mox sub medulla cum sua conjuge oppositi lateris jungitur; sicque unitæ sub cerebri media basi progrediuntur, donec ad cuneiformis offis sellam, in qua glandula pituitaria continetur, pervenit, cum in ramos duos iterum dividitur, quorum dexter ad sellæ dextrum latus, sic & sinister in suo latere usque ad nervorum secundum par repit, ubi utrinque in furculos infinitos divisus, inter nervorum primum & secundum par disseminatur, & tenui meningi complicatur, qui plexum choroidem postmodum constituunt. Verum in cerebro & ^s ejus membranis venarum & arteriarum dissimilis est distributio, quam in cæteris corporis partibus ubi vena arteriam perpetuo habet comitem; at in cerebro venarum orificia deorsum spectant, arteriarum sursum, quia venæ irrigant cerebrum laudabili succo, arteriæ spiritum continent, qui ob tenuitatem facile ascendit: ut autem venæ orificia haberent deorsum, debuerunt prius ascendere, non per externam cutim, non per ossa, non per cerebri medullam: ergo per duræ meningis duplicatio-

^l Arteria tertia ramus gracilis secundus, Vesalio.

^m Arteria tertia duo grandes rami, Vesalio.

ⁿ Arteria tertia ramus gracilis primus, Vesalio.

^o Arteria tertia, Plat.

^p Sic Vesalio.

^q Arteria prima, Vesalio. Fallopius negat arteriam aliquam subire.

^r Per occipitis offis foramen tertium, vel secundum, cum vena cervicalis in sinum duræ matris, in quæ jugulares tendunt, ferri voluit Vesalio.

^s Plat. hoc Fallopius negat.

^t Laur. ex Galeno 9. us. part.

^u Plat. hoc Fallopius negat.

^v Plat. hoc Fallopius negat.

^w Plat. hoc Fallopius negat.

^x Plat. hoc Fallopius negat.

Pp

Præter 4. & 9. ad. an. 3.

Præter venas autem & arterias, cerebrum privatum vas habet, sinum crassæ membranæ [t. II. f. 13. PP.] qui Sanguiductus dicitur, & arteriæ instar, vi ab arteriis accepta, pulsat, in quem venæ tres [t. II. f. 13. C.D.E.] & Arteriæ duæ [I.K.] materiam effundunt. Hicque sinus pro vario ipsius incessu, in quatuor sinus dividitur, qui venis calvariam petentibus capaciores & neutiquam venarum modo teretes sunt, cum horum cavitas trianguli speciem exprimat, qui tribus costis longitudine paribus & instar quartæ partis circuli incurvati constat. A quibus rami seu ductus venis similes pululant, & sanguinem tam vitalem, quam naturalem in cerebri substantiam, quemadmodum supra ostensum fuit, distribuunt.

Venarum & Arteriarum usum nunc subjiciamus. Venarum in utramque cerebri partem, ejusque medullam innumerabilibus propaginibus varie disseminatarum (et si ex iis non paucae adeo exiles sint, ut non nisi acute videntibus sint conspicuæ, non paucae vero omnibus conspicuæ) usus triplex est; primus ut sanguinem cerebro alimentum & quidem copiosum, cum moles ipsius ampla sit (quare copiosiss. in cerebro sanguis, quod cerebrum si impense calefactum, ac si inflammatum sit, ostendit) subministret. Alter, ut per eas spiritus naturalis ab hepate transmittatur, ad spiritus naturalis cerebro insiti nutrimentum. Tertius, ut cum spiritu naturali, anima naturalis vegetativa dicta in cerebrum feratur: nam cum in cerebro facultas sit alimentum attrahendi, retinendi, coquendi, expellendi, &c. necesse est, animam naturalem inesse aut per se, aut aliunde derivatam. At cum animæ naturalis sedem hepar esse in confesso sit, ea per venas in cerebrum defertur. Quartum usum adhuc addit Piccolhomini, ut tam per venas quam arterias, semen fecundum fiat; cum Hippocrates scripserit, quibus secundum aures venæ sectæ sunt, steriles & infecundos esse (at Hippoc. tam venas quam arterias, venas appellasse, ii qui in lectione ipsius versati sunt, norunt) quia voluit plurimam genituræ partem, à capite juxta aures in spinalem medullam procedere: ipsum autem transitum, cicatrice sectioni inducta consolidari, sed hac de re plenius in libro nostro de partibus similaribus egimus.

Sic Arteriarum Carotidum innumerabiles surculi atque propagines, per totam cerebri substantiam sparguntur, quorum usus consideratur, vel quatenus tanquam canales per cerebrum feruntur, vel quatenus perpetuo moventur: si priori modo, sic à corde vitalis sanguis in cerebrum mittitur, & spiritus vitalis influit, ad spiritus vitalis cerebro insiti sustentationem, una cum facultate vitali, suis viribus instructa. Quatenus vero perpetuo pulsan, earum usus est, calorem cerebri innatum assiduo ventilare, qui alias extabescens brevi extingueretur; dein, ut sanguinem in venis exagirent, ne immotus aquarum stagnantium more facile computrescat. Tum, ut sanguinem alimentarium, qui crassior est, è venis per cava spiracula in cerebri substantiam (à qua partim etiam attrahitur) ad illius nutritionem excidere sollicitent.

De

tione superfluit, natura enim alimentum abundare potius, quam deficere voluit. Hoc ergo à partibus mutatum, & ab assimilatione relictum, partium vires sortitur. Quare alimentum quod superfluit, cerebro ex nutritione & assimilatione, materia proxima est, ex qua generabitur ea seminis fecundæ portio, ex qua ipsius fetus cerebrum procreabitur. Jam cum alimentum cerebro superfluum ob illarum venarum amputationem in testes devolvi nequeat, ii sunt infecundi. Eodem modo infecundi efficiuntur homines, si amputetur vena, quæ à corde vel hepate in testes dirigitur, cum trium horum præcipue viscerum alimentum superfluum, seminalisve materia seminis fecundi futuri causa sit.

*grande propter cerebrum, oculos vero grandes propter humorem in ipsis contentum, vide Arist. 2. gen.
c Hipp. Arist. & Gal.
d Gal. 8. us. part. 4. adde Romanis xpi, Sedorici, quo nomine ipsa rei substantia significetur. e Varolius.*

* An omnium facultatum animalium sedes una sit, ambigitur: Alii in toto corpore, alii in capite, & vel toto, vel diversis partibus: alii in thora, race, locarunt. I. Moschion in toto corpore locavit: Heraclitus in extrinseca agitatione. II. Hippocrates, Plato, Galenus & Medici omnes, cerebrum omnium animalium facultatum sedem faciunt, eo quod cerebro quovis modo laeso, animalium functionum laeso persentiat, & quod cerebro non cordi ad mota remedia profint. At corde laeso facultates principes non laeduntur. Vide Gal. 3. plac. & 3. loc. aff. 4. Adde Philonis argumentum: ubicunque satellitium regium est, ibi rex à satellitio stipatus, sedem habet: sed totum anima satellitium, sensuum videlicet organa, in capite sita sunt: ibi ergo anima sedes principia. Quod si sentiens facultas in cerebro locatur, ergo & Intelligens, quia intelligentem, ut docet Philosophus, oportet phantasmata speculari.

III. Sunt quidem in parte aliqua capitis locarunt: I. Herophilus circa basin cerebri locavit. 2. Xenocrates, in capitis vertice. 3. Erasistratus in membranis cerebri: 4. Herodotus in auribus: 5. Blemor Arabicus & Syenensis medicus Cyprinus, in oculis, quod animi indices sint: 6. Strato Physicus, in superciliis, cum ex eorum pilis animi indicia sumantur.

IV. Peripatetici & Stoici, sentiendi & intelligendi vim in corde statuunt, eo quod cor omnis motus sit principium, à circo & sensus: quia etiam Hipp. lib. de corde, animam hominis in sinistro cordis ventriculo collocavit. Sed Hipp. vel ex more vulgi loquitur, vel per animam, princeps anima, instrumentum, calidum scilicet intelligit: quare de re in nostris in lib. Hipp. de Corde.

f. 2. Problem. g Principem dicit Galenus. h Principatum deberi, nemini dubium esse debet, quicquid dicat Aristoteles & philosophi, qui cor ad hanc utilitatem adscribunt. Addit autem quintam rationem ex generatione desumptam, fecur, aut, medio & ope vena umbilicalis gigni, cor vero medio umbilicalis arteria, hacque à vas uteri, at nervos, qui sensus motusque instrumenta sunt, à fœtus cerebro oriri, Columb. Cerebrum subtilissimum viscus, Plat. i Gal. 1. de mot. muse. k Gal. 8. u. part. 4. at si (subjungit) medulla esset, additamento indigeret, quia quadam spinalis medulla est, & in singulis ossibus alia, quae tamen non sunt sensus omnis ac motus principia, quare multi μὲν ἐγκεφαλὶς λέγουσιν, id est, cerebralem, quemadmodum & ῥαχιδῆν, spinalem: alii μὲν ἐγκεφαλὶς nominant. Hipp. cerebrum glandem vocat, ab usu potius, quam similitudine substantiae. Arist. 2. par. medulla non est, cum medulla natura sua calida sit: at cere-

at cerebrum partium omnium frigidissimum. Galeno cerebri substantia medullosa, qualis nulla in toto corpore similis reperitur: nonnunquam parenchyma: Piccolhominus, novam partem similem facit. I. Apollodorus opinatur nemini veterum admissum cerebri nomen in libris proinde Sophoclem in Trachiniis λονγε μυαλα dicere maluisse.

collocari debuit: partim propter oculos & aures, iis enim cerebrum proxime propter nervos ipsorum molles, quos breves esse conveniebat, accumbere debuit, nam cum his speculatorum & vigilum munere defungantur, altissimum locum in corpore tanquam speculam postulabant.

Figura calvæ ^m formam refert, non quod ab ea conformetur, ⁿ alias calvam prius conformari oportuisset: superius quidem, cavitatis calvariae formam exprimit, & in recte formato, rotundum & globosum in oblongum leuiter protensum, propter ventriculos in eo exsculptos: anteriùs angustius, posterius vero latius, & utrinque ad latera leviter depressum [tab. 6. fig. 2. hoc ostendit] in fatuis haud dubie alias formas obtinebit. At in basi, cum cranium varios sinus maxime ad os sphenoides [r. 12. f. 19. inter A. & B. posterius.] posterius & ossis temporum processum interiorum [tab. 13. f. 20. inter H. N.] obtineat, inæquale est, & varium; potissimum vero anteriùs ad ossa-ctus instrumenta extuberat, & veluti tubera duo [r. 12. f. 19. CC.] nonnullis ^o mammillares processus vocata, producit. At quaparte Cerebello infidet, planum est; margisque æquale [r. 12. f. 18. AA. BB.]

Magnitudo. Homo cæterorum animalium ^p comparatione, cerebri plurimum habet, ita, ut unius hominis cerebrum duorum bouum quantitatem superet; primo ob animalium functionem cæteris animantibus denegatam; nam cum rationis instrumentum esse debuerit, ut magnam spirituum copiam & elaboraret, & caperet, necesse fuit: at multus spiritus non nisi à copioso sanguine generari potest; copiosus autem sanguis in parvo corpore contineri non potest. Dein, ne spiritus animales ob insignem tenuitatem evanescant, sed per proprios ductus in omne corpus ducantur, magna, humida densa ac veluti glutinosa cerebri moles requirebatur. Verum illius magnitudo ^q in longitudine, latitudine & altitudine tanta est, quanta est calvæ capacitas; ita ut in longitudine ^q palmum æquet, in latitudine vero & altitudine minor existit. Ipsam vero scutellam seu cavitatem ^t ante, retro, in occipitio & à lateribus cum suis membranis, glandula pituitaria & vasis ascendentibus implet [tab. 6. f. 1. & 2. t. 7. f. 3. & 4.] spatio ad ipsius naturalem motum, diastolon scilicet & systolen tantum relicto. Tantæ molis est, ut aliquando in publica Anatome ponderanti, fibras quatuor & ^t aliquando quinque æquare apparuerit; majorum nam hominum cerebrum grandius & ponderosius est, quamvis & pueri præ pondere cerebri, quod in ipsis humidissimum est, longo tempore ^t caput sustinere nequeant, quibus etiam caput prægrande est.

Pp 3

Conne-gen. an. 6. Lycus, Elephantia

cerebro majus: Russo duobus bouum cerebris grandius. ^q Archang. r. Occiput inane esse dixit Arist. r. hist. 7. pars posterior capitis inanis & cava omnibus est, l. hist. 16. quare Columbus Aristotelem reprehendit, cum ibi & cerebrum & cerebellum sit. Piccolhom. excusat Aristotelem, inquit, ipsum divisisse in cerebrum & cerebellum, statuisse cerebellum occupare occiput: quod si ita sit, tum posteriorem partem carere cerebro, cum duo corpora in eodem loco eodem tempore esse nequeant. Quare non esse absurdum, dicere, partem posteriorem capitis esse plenam cerebello, & eandem carere cerebro. Et Hipp. 2. de morb. tex. 8. cerebrum ad anteriorem capitis partem magis situm. f. Libras quinque, quandoque quinque & semissem pendebat, Piccolhom. quatuor libras medicas, Rioli. t. Arist. 2. gen. an. 6.

Connectitur connexioni communi, venarum & arteriarum & nervorum cum aliis partibus, quamvis & spinali medullæ & nervis, cum hæc ab eo producantur, copuletur; quare minima corporis parte dolente, cerebrum per nervos ejus condolebit; reliquis vero partibus connecti opus non habuit, cum calua undique cinctum & obvallatum sit.

Substantia ipsius ex gemino principio ^u ex quo exsurgit, altero spermatico, altero sanguineo materno, ex quibus peculiare carnis genus generatur, cui in universo corpore similis non reperitur, ita ut recte philosophus ^x sui generis esse dixerit: talis enim est, & qualis ad ingenitas cerebri functiones edendas requirebatur, substantia mirum cum sua essentiali forma peculiaris & propria; hac enim, principes animæ sentientis facultates, nempe discernendi, imaginandi, ratiocinandi, memorandi tanquam proprio instrumento, utuntur, & ab hoc reliquorum sensuum instrumenta dependent. Alba est, mollis, & insigni humiditate perfusa. Alba ratione materiæ spermaticæ, cum ex purissima seminis & spirituum portione maiori fabricata sit; & ratione finis, ut spiritus animalis sint limpidissimi; non tamen tota ipsius substantia alba est: ^x quicquid enim anfractibus proximum [tab. 7. fig. 4. tab. 8. fig. 5. E. F.] subcineritium est; & tali colore tinctum credunt, quod innumerabiles venæ per eam disseminantur. Reliquum vero in intima substantia candidum prorsus existit [tab. 7. fig. 4. G. H. tab. 8. fig. 5. G. H. tab. 9. fig. 7. & 8. EE.] At exterius tam cerebrum, quam cerebellum & tenui meninge obuolutum, subcinericeum potius quam candidum est. Mollis ^a est (in puerulis, quibus ratio adhuc imperfecta est, fere fluida) cum sensus omnes ^a recipiat, omnesque imaginationes & intellectus complectatur; nisi enim & ab hoc & ad hoc ^a alteratio, quæ in vnoquoque fit sensorio, pervenerit, nihil amplius animal sentiet, ut Apoplecticorum exempla docent; quare cum sentire sit pati, talis substantia requiratur, quæ alienis impressionibus foret idonea; non tamen ea mollitie præditum esse debebat, quæ statim id, quod impressum est, aboleretur, quemadmodum in aqua & aliis fluidis corporibus contingit, sed quæ cum mollitie aliquam consistentiam haberet; quare ita cerebri mixtionem intimam sequitur, ut actione ignis minime fundatur, sicut seuum, cera, & alia quæ calore liquefunt. Nervis ^a quorum principium ipsius Medulla erat futura, simillimum est cerebrum, sed mollius. Glandulæ Hippoc. a similit, ^b quia non secus glandulæ album sit & friabile, sed etiam iisdem commodis, quibus glandulæ sunt præditæ caput ^b afficiat, humiditatem ad extremitates per fluxiones foras emittendo, capiti enim cucurbitulæ instar insidet, & partium inferiorum exhalationes haurit, quæ per craniæ suturas evaporant.

Temperamentum ^c ipsius frigidum & humidum ex ipsius substantia molli & humida cognoscitur, quare sedem frigidi & glutinosi Hippocrates ^d dixit: tale autem requirebatur, ne spiritus animales omnium tenuissimi cito evanescant, neve pars Rationi dicata accendatur, quemadmodum Phreneticorum motus, ob calidissimum cerebrum furibundos videmus, nec etiam somnus, qui animalium facultatum quies est, placidus foret.

^u Principium à quo, cerebri nullum habet, Piccolhom. Praxagoras & Philotimus existimant, cerebrum superabundantiam quandam seu spinalis medullæ propagationem esse, ideoque longis flexibus atque involucris constare, Gal. 8. us. part. 12. ^x 2. part. an. 7. ^y Cineritium seu in albo li- vescent, Piccol. ut Apoplecticorum exempla docent; quare cum sentire sit pati, talis substantia requiratur, quæ alienis impressionibus foret idonea; non tamen ea mollitie præditum esse debebat, quæ statim id, quod impressum est, aboleretur, quemadmodum in aqua & aliis fluidis corporibus contingit, sed quæ cum mollitie aliquam consistentiam haberet; quare ita cerebri mixtionem intimam sequitur, ut actione ignis minime fundatur, sicut seuum, cera, & alia quæ calore liquefunt. Nervis ^a quorum principium ipsius Medulla erat futura, simillimum est cerebrum, sed mollius. Glandulæ Hippoc. a similit, ^b quia non secus glandulæ album sit & friabile, sed etiam iisdem commodis, quibus glandulæ sunt præditæ caput ^b afficiat, humiditatem ad extremitates per fluxiones foras emittendo, capiti enim cucurbitulæ instar insidet, & partium inferiorum exhalationes haurit, quæ per craniæ suturas evaporant.

^b Insealon adveni

^c Cerebrum omnium partium corporis frigidissimum, Arist. 2. par. 7. Motus perpetuus solus potest cerebrum calefacere, &c. us. interim omitam multitudinem ac magnitudinem venarum & arteriarum, quæ in ipso sunt, &c. 8. us. part. 2. ^d Ce carnisbus υπερόπλι τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ κοινὸν.

De

De Cerebri substantia eiusque partibus.

CAPUT XII.

Q Vemadmodum Cerebrum facultatum animalium principium est, sic etiam varias & diversas partes, varioq; modo efformatas obtinuit, quas Methodo Anatomica perlustrabimus. At Cerebri nomine intelligimus, quicquid in calvariae cavitate utraque meninge circumdatum continetur.

Diuiditur autem in tres partes, primum quidem à crassa meninge quadruplicata, in partem anteriorem^a & posteriorem. Anterior cum maior sit & præcipua, siquidem in ea animales spiritus præcipue elaborantur, totius nomen retinuit^b & proprie cerebrum ἐγκεφαλον^c dicitur: at posterior, quæ minor est, cerebellum πτερυγφαλὶς nominatur. Dein Cerebrum^c mediante crassa meninge duplicata, quæ falcem messoriam refert, in latiore ejus parte per totam longitudinem in partes duas^d æquales, dextram & sinistram [tab. 6. fig. 2. ab A. ad A. tab. 7. fig. 3. ab N. ad K.] usque ad humiliorem sedem ipsum callosum corpus [tab. 7. fig. 3. ad LL.] instar alicujus septi diuiditur, ideo non^e semper eadem capitis pars dolet sed sigillatim, interdum vero totum. Non autem penitus^f diuisum est, ita ut non aliqua parte sibi continuum sit: siquidem partes duæ cerebri, beneficio corporis callosi, cerebellum vero, licet cerebro non veniatur, spinalis medullæ tamen initio duobus locis continuatur, ipsaque medulla totidem principis cerebro iungitur, licet in varias partes, situ, magnitudine, figura, substantia, usu inter se differentes, dividatur. Divisionis usus est, quo sinus crassæ meningis, unde vasa exigua prodeunt, quæ per anfractus perreptant, tuto ferantur, quo alimentum in cerebri substantiam dispergatur. Cum enim cerebri quantitas magna sit, per quam venæ capillorum modo prætenues ad sui nutritionem disseminari oportebat, si venæ exiles à parte dextra in sinistram, vel contra deduci debuissent, exiles illæ venæ & arteriæ in molli substantia, ob viæ longitudinem, ruptionis periculo expositæ fuissent: ne vero periclitentur, cerebrum in tres partes diuisum fuit, inter quas diuisiones crassæ meningis sinus quatuor feruntur, in quos, venæ iugulares internæ & arteriæ carotides, à basi occipitis ascendentes sanguinem effundunt, & utrinque à sinibus, rami in cerebellum & cerebrum emittuntur, potissimum à sinu tertio in dextram sinistramque partem distribuuntur. Dein etiam cum corpora mollia, ubi magna sunt, facile in se ipsa concidunt, idcirco cerebrum in duas partes diuisum, quo melius consistat, & instrumenta illi supponenda non complicantur.

Exterior ejus superficies uniuersa, quæ subcineritia potius, quam candida, varios & complures^h anfractus seu circumuolutiones orbiculares, sulcosve circulares leuiter excavatos habet, qui tenuium intestinorumⁱ anfractus, omento ablato, æmulantur [r. 6. f. 2. tab. 7. f. 3. CCC.] horumque alii profundiores magis sunt, alij minus cerebri^e Hipp. de sacro morbo.

^f Quidam somniarunt à summo ad imum diuisum esse. Laur. ^g In duas partes dissectum potiss. nutritionis cerebri gratia, quo tenuis membrana cum vasis se insinuet: sine hac enim dissectione & profundissimis inuolutionibus, enutriti non potuissent. Vesal. Piccolhom. ad faciliorem motum, leuitatem & nutritionem interioris medullæ factum, Laurent. ^h Variam compositionem appellat Gal. 8. us. part. 13. inuolutiones, sinuosi implexus ac gyri, qui nubibus quas rudis pictorum discipuli delineare solent, etiam conferri possunt, Vesal. spiræ, reuolutiones seu circuli, qui in se ipsos non recurrunt,

^a Bipartitum omnium cerebri est, postremumque iungitur quod πτερυγφαλὶς appellatur. Arist. 1. hist. 16.

^b Herophilus anteriorem totius nomine

propter magnitudinem, posteriorem parentis cephalida appellare consuevit.

^c 8. us. part. 11. ἐγκεφαλον διὰ τοῦ πτερυγφαλὸς, antærius cerebri,

^d 9. ad. an. 2. c capitis priorem situm obtinet, non modo in homine verum etiam in ceteris animalibus, quibus ea pars data est, Arist. 1. hist. 16.

^e cerebrum syn-cipiti subditum 1. hist. 7.

^f 9. ad. an. 2.

^g Hipp. de sacro morbo.

Quare, * Medulla corpus est medium ac candidum, cuius duæ sunt partes, una ^u Cerebrum quæ in calvaria excidit, & oblongata, per occipitiū magnum foramen in spinam dorsalem definit. Possunt quoque hæc duo corpora, cortex & medulla actu separari, si detur caput hominis sani repente interfecti & dextre & mox dissectur; alias humiditate summa utraque perfunduntur, summeque mollescent, sicuti processibus mammillaribus contingit, qui in recentioribus capitibus facile ad medullam cerebri ^u secerantur, in vetustis vero minime. Jam vero si circa ipsius medium cerebrum disseces, vasæ exigua, * & jam ad ventriculos descendentes deferri conspicias, & si substantia medullaris comprimatur, sanguinis guttæ copiosæ apparebunt: non enim stigmata hæc sunt sanguinis qui roris modo per cerebri substantiam dispergitur, ut ii volunt, qui venas per cerebri medullam * ferri inficiantur.

Cerebro utrinque mutuo connexu leviter y digitis diviso, usque ad venam * in longum y inibi porrectam quæ notanda y magnitudinis est, & à qua utrinque rami in cerebri medio locatum [t. 7. f. 3. L. M.] quod nonnihil a gibbosum [tab. 7. f. 3. L.] & ventriculis b instratum, longum, arcum, læve & æquale, quod superiore candidius est, cum ex cerebri medulla live interiore substantia constituatur, quæ durior est, callosum, πλωδες y σῶμα, aut πλωειδες appellatur; estque pars communis cum cerebro; quare ad ejus latera utrinque secundum ipsius longitudinem, singuli d h. nus [t. 7. f. 3. ad M.] in cerebri medulla lineæ profundioris instar & veluti canales insculpti, qui ad pituitæ ex cerebri partibus superioribus defluxum facere creduntur, e quam excipientes, per callosi corporis superficiem gibbosam in anteriora profluere sinunt. At callosi corporis usus, & parte elatiore cerebrum illi insidens sustinere, ut hujus interventu utraque h pars cerebri conjungatur & septum [t. 8. f. 5. RR. subleuat RR. XX. & Y. attollunt S. T. V. ne AAA. in fig. 6. premat H. I. 6. figura aut H. tab. 9. f. 7. & 8.] duorum ventriculorum producat: quod etiam subleuat, & fornicem attollit, ne dilabens ventriculum tertium comprimat. Hic tumorem scirrhosum in illustri Barone Bonacurtio observavimus, cuius caput, postquam longo tempore attonitus fuisset, post mortem aperuimus & id anno 1582. 11. Augusti.

Qq

Cere-
tinnus est nu-
merandum, sed

sui generis est, & quidem ratione optima naturam ejusmodi sortitum est, Arist. 2. part. an. 7. x Vena multa ac tenues ex universo corpore ad ipsum feruntur: duæ vero crassæ, una à jecore, altera à liene, &c. Hipp. de sacro morbo, ut cerebrum modico potitur calore. Vena ad membranam cerebri deveniunt, ex utraque vena, majore, dico, & ea, quæ aorta vocatur, & ne color nimis offendat, non pauca, sed frequentes ac tenues vena ambiunt, nec sanguis copiosus, ac crassus, sed tenuis & sincerus, quæ eodem subit, Arist. 2. part. an. 7. cerebrum omnibus privatum sanguine est, nec venam intra se nullam continet, sed circa ipsum meninx est venosa, Arist. 1. hist. 16. cerebri cerebellique substantia nunquam venis implicata invenitur, etiamsi interdum rubra & veluti sanguinea puncta in illorum qui phrenetide obierunt, vel suspendio perierunt, cerebri substantia observaturus sis: verum ejusmodi puncta nullam vena imaginem exprimunt, Vesal. cerebrum ex nullo vase alimentum sumit, quam quod tenui membrana suffulta ipsi circumdantur. Idem. * Arist. 1. hist. 16. venam intra se nullam continet. y Gal. 9. ad. an. 3. z 9. ad. an. 2. a & Vesal. in medio fere, Laurent. b Supra tertium ventriculum, Columb. in corpore calloso duo priores perfoffi Piccolhom. callosum corpus geminis ventriculis dextro & sinistro excavatum apparet, Laur. c Nonnulli parum recte intelligentes, quod sepro superpositum est ψαμμοειδης appellari putant, 9. ad. an. 4. idem monet Vesal. lib. 7. cap. 5. d Vesal. & Plat. e Vesal. humor à cerebri anfractibus undique defluens ad anteriora versus pituita meatum derivatur, Plas. f Vasis & arterioles nullis, quæ sensu dignosci queant, ut nec membrana tenui attexta, Laur. g Qui & fornicis, ne cerebri moles ventriculum tertium obruat, Columb. h Vesal. & Laur.

Cerebri substantia usque ad corpus callosum utrinque auxilio novacula ablata, antequam corpus callosum sublevetur, septum ventriculorum priorum considerandum venit.

i Vesal.

k Gal. 9. ad.

an. 3.

l Gal. l. c. mo-

dum admini-

strandi docet.

m Splendor

ipsius pelluci-

dus & similiter

lapidibus spe-

cularibus quos

in tenuia secan-

tes fenestris im-

ponunt, 9. ad.

an. 3. splendet

tantum per

vitrum aut

specularem la-

pidem, at madi-

da hostia, quam

Missæ adhibere

solent commo-

dus, quam di-

vis lapidibus

comparari po-

test, Vesal. n

Col. corpus speculare, & speculum, Piccolhom. septum lucidum, speculum lucidum, lapis specularis.

Laur. o 9. ad. an. 1. 3. & 4. p Gal. 9. ad. an. 3. Vesal. at Columb. & Piccolhom. nil aliud, quam tenuis meninx hoc

loco duplex: Verum Laur. tenuissima cerebri portiuncula. q Habet in medio ut plurimum in omnibus κεφάλιν τι μν

κεφόν, cavum quoddam exiguum, Arist. 1. hist. 16.

Septum [t. 8. f. 5. ad RRR. in posteriora reflexum.] hoc parte superna calloso corpori connascitur & unitur, quare interiorum & inferiorum callosi superficiem alii i vocant: inferne vero, fornicis regioni, sicque inter callosum corpus & fornicem, medium quod priusquam extendatur k laxum est & rugosum, & nec relucere, nec continuitatem k suam ostendere potest, & eatenus attractum k ut tantum sit extensum, cum tenue sit, si in clara luce sectionem l administres, aut in altero i tantum latere candelam admoveas, splendor ipsius i tanquam per vitrum, aut specularem m lapidem in medio ipsius pellucebit; quare speculum n quibusdam, aliis septum lucidum dicitur: at à Galeno o ab usu κεφαλήν των περιόρων κεφαλήν, septum anteriorum ventriculorum nominatur, cum huius ope ventriculi lateribus interioribus distinguantur; quare non nisi utroque ventriculo aperto occurrit; quod facile si k vehementius extendatur, cum extreme tenerum sit & subtile, abrumpitur, attamen nisi sublevetur, manifesto videre non licet. Hoc ejusdem est p cum cerebro substantiæ, tenuiore tamen, & quoad subtilitatem, veluti membranea cerebri portiuncula, ita ut aliqui nihil aliud, quam tenuem meningem hoc loco duplicem esse dixerint: & licet tenuis sit, simplex i tamen non est, & in medio tuberculum i quoddam instar lineæ [tab. 8. fig. 5. T.] obtinet, quod deorsum prominens sensim extenuatur, & ventriculorum septum efficitur [tab. 8. f. 5. inferior septi pars XX. superior T. notatur.] His sublati ad substantiæ plus minus medietatem, extuberantiæ quatuor occurrunt; duæ quidem parte anteriore, circa quas i ventriculi siti sunt, duæ parte posteriore, Fornicem constituentes.

De Ventriculis cerebri, Fornice, Plexu choroide.

CAPUT XIII.

De Ventriculis egit Galen. 8. us. part. 10. 11. 12. & 9. adm. anat. 4. libel. de diff. Nervorum. 2. At de Fornice 8. us. part. 11. 9. adm. anat. 4. sic de Plexu choroide 9. adm. anat. 3.

ET si cavitas, quæ in cerebro habetur, continua sit, quia tamen pro ratione formæ cerebri & usu varie formata sit, ita, ut alia pars magis sit dilatata & ampla, alia magis angustata, idcirco in certa loca Anatomici divisere, & ampliora ventriculos, angustiora vero meatus appellarunt.

a Galenus.

b Piccolhom.

Plas. Laur. at

Arantio sex:

Vero duo, ratione communis ductus, qui tenui meninge separantur, duo esse videntur: ratione magnitudinis, figura & situs

Et situs videntur quatuor, ratione duarum cavitationum qua sub prioribus sunt. sex statui possunt. Piccolhom. ut Val-
verda tres solum priores agnoscit, quantum ventriculorum esse negat.

tres, duos anteriores dextrum & sinistram, tertium in medio, quartum vero cerebel-
lo & spinali medullæ communem fecere.

Horum duo primi, qui ab aliis superiores, quod aliis supereminere credantur: a-
liis anteriora^d dicuntur: in cerebri medulla^c exsculpti omnium amplissimi^f existunt, rum origo su-
vtrunque vnus, quorum dexter in dextra, sinister in sinistra parte, situ, forma, magnitu-
dine, usuque pares, secundum cerebri medullæ longitudinem in ipsius medio [tab. 7.
fig. 4. tab. 8. fig. 5. L. fig. 6. D. dexter: at sinister tab. 7. fig. 4. tab. 8. fig. 5. M. fig. 6. E.] siue anterio-
rem, posterioremve partem, siue basin verticemque spectes, locantur & anteriore
posterioreque sede magis se junguntur, minus vero in medio, ubi septo tenui [tab. 8. priores & supe-
rioribus dicun-
tur. Sic &
Laur. qui non
recte anterio-
res dici, asserit.
d Gal. 8. us. par.
10. 11. & 12. 9.
ad. an. 1. & 4.
Non in cere-
bro, sed medul-
la, cum in cal-
loso corpore sint
perforati, Piccol.
in calloso corpo-
re excavati,
Laur. at cate-
ris cerebri ven-
triculi dicun-
tur.
f Quod spiri-
tum crassum
contineant.

Fig. 5. XX. rr.] de quo diximus, solum dividuntur: qui obliqui [tab. 7. fig. 4. ab L. ad M.
& ab M. ad M. ostendit.] seu semicirculares: à temporibus enim, ubi medulla incipit
principio sumpto, paulatim versus medullæ centrum curvantur, & iterum ad aurium
regiones flectuntur, sicque duos semicirculos conficere videntur: oblongi, anfra-
ctuosi, i fatisque ampli. Horum anterior pars obtusa^k & rotunda est [tab. 7. fig. 4. &
tab. 8. fig. 5. L. & M. inferius.] & interno latere declives ad tertium ventriculorum perti-
gunt [tab. 8. fig. 5. sub S. T. V. & fig. 6. ubi H. & L. tab. 9. fig. 7. H.] posterius quoque obtusi
& rotundi [tab. 7. fig. 4. superius L. & M.] qui deorsum sensim in cerebri^k substantiam ver-
sus priora cornu modo angustata, ad processum mammillarium & nervorū optico-
rum [tab. 9. fig. 7. & 8. F. G.] & arteriarum carotidum ingressum descendunt. Superfi-
cies ipsorum aqueo humore oblitur, & eo oppleri sæpe reperiuntur: horum supe-
rior pars [tab. 7. fig. 4. ab L. ad L. & N. ad N.] secundum cerebri longitudinem æqualis
est: inferior vero inæqualis [tab. 8. fig. 6. R. aut S.] ob sinum ad pituitæ defluxum para-
tum, quia ex posteriori ventriculorum sede antrosum ad ventriculorum cavitationem
communem oblique perreptat: hique duo ventriculi in communem cavitationem, ut
mox dicemus, desinunt. Hi tenui membrana succinguntur, l quod non nisi diligenti
Q9 2 admittuntur.

Laur. imo pituitam copiosam. g Quare non recte anteriores dicuntur, Laur. h Figura semicirculari, Piccolhom.
secti circuli aut Luna falcata figuram referunt, ego malim auriculæ humanæ assimilare, Laur. i Quare nonnulli
qui horum anfractuoso ductum non sunt persecuti existimarunt præter hos duos, binos alios ventriculos in anteriore
parte reliquos esse, cum sint primorum portio, idcirco sex ventriculos dixerunt, Columb. cum sub prioribus dua alia
cavitates insignes insideant, in quas animalis spiritus decurrit, quas si quis ventriculos appellare velit, tunc ventricu-
li senario numero constituendi erunt, Piccolhom. sub his duos sinus statuit Arantius, quos hypocampi seu bombicini
vermis effigiem referre vult. Ego portiones existimo esse superiorum, majores enim sunt, quam vulgo demonstrari sole-
ant, Laur. Videtur Hipp. meminisse describendo $\epsilon\pi\tau\epsilon\phi\epsilon\rho\nu\ \tau\eta\ \nu\alpha$, eis $\tau\omega\ \omega\delta\alpha\gamma\iota\omega\ \pi\epsilon\pi\iota\sigma\tau\omega\ \beta\epsilon\pi\chi\omega$, $\omega\delta\epsilon\ \tau\epsilon\ \tau\omega\ \gamma\iota\gamma\iota\alpha\ \kappa\epsilon\ \tau\eta\ \nu\alpha$
 $\beta\epsilon\lambda\omega\iota$. Et Gal. 8. us. par. 11. vocando $\delta\iota\sigma\phi\omega\epsilon\iota\varsigma$, eis $\tau\omega\ \omega\delta\alpha\gamma\iota\alpha\ \tau\epsilon\ \delta\iota\sigma\phi\omega\epsilon\iota\varsigma\ \kappa\epsilon\ \gamma\epsilon\gamma\epsilon\tau\omega\ \phi\epsilon\gamma\epsilon\mu\iota\upsilon\alpha\varsigma$. k Et si secus omnes scribere vi-
deantur, versus olfactus organa aut opticos in acutum vergere volentibus, Vesal.
l Galenus & veteres, qui post illum scripsere, trium priorum superficiem tenui membrana, ut cerebrum obduci volue-
re, non vero quartum: Contra Vesalius negat. tres ventriculos priores sua superficie tenui membrana cingi, verum
quartum addit, se putare Galenum, Herophilum, Andream aut Marini, aut alterius scripta legisse, in tres ventriculos te-
nuis meningis partes porrigi, non item in quartum ventriculorum qua oratione, non indicabant, membrana veluti pe-
ritoneo, aut pleura succingi, sed tenuis membrana partes vasa in ventriculos deducentes, à quibus plexus choroides
efformantur. Addit, si succingerentur ventriculi, obstaculo essent membrana, quo minus cerebri substantia, inter-
stitio præpedita, materiam suis ventriculis oblata in animales spiritus emutaret, Ves. lib. 7. cap. 6. Tenui membra-
na in-

na induti, licet Vesal. hoc neget, ubi sensus adversatur, & miror, Vesalium qui pelvum norat esse tenuem membranam, ignoravit tamen hanc ascendente ventriculos cerebri investire, Columb. ventriculos tenuis meninx succingit, qua utrinque sursum scandens, in summa eorum parte facto concursu, & deorsum delapsa facta gemina, eos medios dirimit, Piccolhom.

administratione adspicitur, ejusq; nomine inter se Anatomici certant; ipsis vero ple-
 m Vena in ven-
 triculum de-
 scendunt. 9. ad.
 an. 2. propagata
 ab ea qua ad
 cerebrum de-
 clivis pervenit.
 9. ad. an. 3. vide
 9. us. part. 5.
 Et Vesalius hic
 venulas conce-
 dit, sed impense
 graciles, quia
 harum substan-
 tia durior &
 callosior in su-
 perficie: &
 Plat. venula
 anteriora sede
 affiguntur. At
 Piccolhom. te-
 nuum menin-
 gem qua ven-
 triculorum me-
 diastrinum est,
 eximii dicit
 sensus, qua ob
 multas venas
 in eam excur-
 rentes, inflammationem perpeti potest, unde dolores in profundo cerebri persentiuntur. n Gal. 8. us. part. 10. Vesal. eum
 reprehendit, quod dixerit, cerebrum geminum esse, ut quemadmodum uno oculo vitiat, aut uno teste excedo, alterum
 servamus, ita dextro ventriculo laeso, sinister suo munere fungatur: quod inquit, in ventriculorum copia recensenda lo-
 cum habet, non in enarranda cerebri divisione, cum id supra ventriculos tantum divisum sit. o In ventriculis an-
 terioribus spiritus animalis conficitur. 8. us. part. 10. & 11. inspirationem & expirationem efflationemque ex cerebro
 efficiunt lib. 8. cap. 19. At Vesal. in his attractus per inspirationem aer vitalisque spiritus à corde transmissus, privata
 cerebri materiei formaque ut in animale spiritum mutatur, qui postmodum per nervos ad sensus motus organa distri-
 buantur, Laur. 1. ad spirituum animalium preparationem, quare animalis spiritus inchoati legas & dicuntur. 2.
 ad inspirationem & expirationem cerebri 3. ad odores suscipiendos, at Piccolhom. errant, qui spiritum animale in
 ventriculis fieri voluit, cum ab iis nulla vis pendeat. p Hic primus est usus Piccolhom. cui 2. ut aer per naves & os
 ethmoides attractus in ventriculos in eis elaboretur, conficiatur, preparatur ad spiritus animalis nutritionem & reser-
 vationem, sicut aer in pulmonibus, ad spiritus vitalis & refrigerium & recreationem preparatur. 3. ut plexum choro-
 idem contineant, quo commodius in eos spiritus animales effundantur. 4. & secundarius, ut cerebri excrementa expur-
 gentur. Quomodo autem hi ventriculi & spiritus animales continere & excrementis expurgandis servire simul pos-
 sint, inquit Piccolhom. nemini mirum videri debere, quandoquidem naves Natura quoque creavit, primario ad odo-
 randum, secundo ad muoum evocandum.
 q Spiritum animale hic gigni & colligi credunt, cum nobilior sit sedes in cerebri substantia purissima, quam in hac
 excrementorum sentina, Plat.

zus choroides incumbere in confesso est, à quibus vasa gracilia^m [r. 7. fig. 4. PP. tab. 8. fig. 5. PP. fig. 6. OO.] deducuntur, quæ ipsorum substantiæ parte anteriore connascuntur, similia ijs, quæ oculi tunicam adnatam percutunt.

Duos esse præstitit, cum cerebrum, & sensorium omne sit geminum, quamvis prima & maxime communis geminorum omnium instrumentorum causa sit, ut si alterum laesum fuerit, alterum subserviat; quod Galenusⁿ docet exemplo adolescentis qui Smyrnæ in Jonia vulnus in alterum ventriculorum accepit, superstes tamen mansit, qui ne temporis quidem momento vivere potuisset (ut Galenus credit) si vulnus utrumque simul violasset.

Usus horum, aliis, ut ex inspirato aere & per olfactus organa in cerebrum delato, vitalique spiritu à corde per arterias carotidas sursum lato, spiritus animalis in plexu choroide præparatus^o conficiatur; alijs vero p, ut sint tanquã promptuaria spiritus animalis, qui è plexibus choroidibus in hoc effunduntur ut hic præsto sint ad animæ sentientis in omne corpus transversionem, illiusque facultatum omnium actiones edendas. Nobis vero videntur q excrementa, quæ in cerebri nutritione segregantur, seu piritam in cerebro genitam colligere, & per meatum ad infundibulum mittere, quo tandem ad fauces descendat.

Foramen hic notat Piccolhominus, quod sub processibus mammillaribus mediū sit, & bivium, cujus pars una in dictos ventriculos exporrigatur, altera in palatum id eoque in pulmones: quod plerisque incognitum sit, nec conspicuum fieri, nisi in cerebris sanis, inopinato vita privatis & mox dissectis; partes enim cerebri huic foramini circumjectas, tempore adeo concidere atque connivere, ut penitus obstruatur ac delecta-

deleatur; idcirco Galenum¹ dixisse aerem inspiratum influere in cor, sed ejus partem in priores ventriculos ingredi, ut ibi præparatus, fiat spiritus animalis pabulum.

Fornix² huic ventriculo tertio superstratus καμάρωσις, ψαλμοειδής³ dicitur, quod καμάρωσις seu ψαλμοειδής, testudines & fornices, nominibus per translationem imposi-

tis, & forma & usu referat: Hoc unicum est, & in cerebri pene medio parte posteriore corpori calloso⁴ subjectum, & utrisque cerebri partibus commune, eminens occur-

rit, & ex ventriculorum duorum posteriori sede [tab. 7. f. 4. L. M. superiora tab. 8. f. 5. S. T. f. 6. B. C.] ubi hæc in priora reflectuntur, enascitur, & ubi cerebro continuatur, lon-

gum æque ac callosum corpus, sede posteriore tamen latum existit, quod statim, ubi versus anteriora procedit, in acutum [tab. 8. f. 5. S. T. ad V. f. 6. B. C. ad supremum

4.] definit, & anteriùs [tab. 8. f. 6. ad P.] acuto angulo cerebri substantiæ rursus jungi-

tur, quemadmodum & calloso corpori; at in medio, reliquæ latitudine liberum est [r. 8. f. 5. XX.] Figura est triangula, inæqualibus lateribus constante: primum enim à

posteriore sede unius ventriculi ad alterius sedem fertur & brevis est [tab. 8. f. 5. ab S. ad T. & f. 6. à B. ad D.] duo vero alia æqualia à posteriore parte ad anteriorem producun-

tur [r. 8. f. 5. ab S. ad V. à T. ad V. & f. 6. à B. ad superius A. & à C. ad superius A.] quod duobus quasi arcibus parte posteriore, anteriore vero uno donatur & tripodis instar cerebro

innititur. Substantia est⁵ ventriculorum simili, à candidiore, & callosi corporis instar cuius pars existit, durior, tenui membrana nullibi⁶ obducta, quod in humiliori sede,

ubi fornicis instar ventriculo obtenditur, à connexu liberum est [r. 8. f. 6. AAA.] & in lateribus ubi ventriculos respicit [tab. 8. f. 5. ad L. M.] parte posteriore fulcra duo (tribus

enim columnis donatur) obtinet, quæ posterius deorsum reflexa velut novæ cavita-

tes constituere videntur, quas ventriculos hippocampi⁷ ab animalis forma, posteri-
ores denominare solent: tertium fulcrum anterioribus ventriculis interjectum,

cum quorum sepro continuatur, tertio secundum ipsius longitudinem (subi in medio lineæ latioris instar [r. 8. f. 5. XX.] extuberat) incumbens, versus frontem ad os ethmoi-

des terminatur. Hoc foris ad exortum utrinque [tab. 8. f. 5. S. T.] gibbum & convexum & fere orbiculare est, superficie lævi & aquao humore perfusa: convexum autem est

propter usum quem præstare debet: nam ad similitudinem fornicum in ædificiis cere-
bri molem incumbentem sine⁸ dolore ac citra molestiam sustineat, quo meatus ille

communis vel ventriculus tertius⁹ cui instratus est, amplius seruetur & non com-
primatur, cum sub ipso duorum priorum ventriculorum communio fiat: intus vero

cauum [tab. 8. f. 6. AA.] & pro spiritu libero transitu, & quo vas [tab. 8. f. 6. H. I. t. 9. f. 7. V. à T. natum.] à crassæ meningis sinu quarto pronatum & in duos ventriculos priores

bipartitum, sub ipso feratur, & à cerebri substantia incumbente non prematur.

Tertius ventriculus sequitur, qui nihil aliud est, quam duorum concursus in poste-
rioras exporrectus: duo enim dicti ventriculi partibus infernis sub fornice [r. 8. f. 5. T.

V. f. 6. AAA.] in unum¹⁰ locum coeunt, & terminantur, qui inferius vallem oblongam

exprimunt, & acutum angulum efformant, ut meatum (seu cavitatem) constituent,

qui longiusculus in posteriorem ventriculum desinat. Hic vero à Galeno & meatus &

communis cavitas seu communis¹¹ anteriorum locus dicitur [r. 8. f. 6. sub H. I. tab. 9. f. 7.

r. 8. u. f. par. 10.
f. Col. suum dicitur
circa inventum:
quare à Piccol.
reprehenditur.

f. Fornix ψαλμοειδής, & Camerarum, Columnæ corpus cameratum, camera modo extructum, & tribus quasi columnis suffultum, fornix & refudo Laur.

g. & ψαλμοειδής, & 9. ad an. 4. cum parte posteriori impense orbiculare sit, nonnullis imposuit, ut cerebrinares à veteribus appellatas existimaverint, Vesal.

h. Superioris ventriculi pars calloso corpori insculpta, Piccolhom.

i. Gal. 8. u. f. par. 11. triangula, inæqualibus lateribus. Vesal. & Laur. semicirculari figuræ vel pontis potius, qui posterioribus duobus cruribus, anterioribus vero uno innititur, Col. & Piccol.

triangulum efficit, Plac. & Et Vesal.

* pedes hippocampi nomi-

Qq 3

natur ab Arantio in observ. & ventriculi hippocampi, Riol. 1. 8. u. f. par. 11. m. Vesal. Col. Piccol. Laur. t. Gal. 8. u. f. par. 11. u. 8. u. f. par. 12.

x 9. ad. an. 4.
at Laur. quod
centrum fere
occupet cerebri,
cum tantum ab
occipite; quan-
tum à fronte
distet.

y Sic Gal. 8. us.
part. 11. Vesal.
Piccolh. Laur.
at Columb.
breviorem fa-
cit & ad mea-
sum postero-
rem ad glandu-
lam pinealem
desinere. Piccol.
non admodum
magnus & fi-
gura incerta.

z Utriusque
meminit 9. ad.
an. 4. alterum
vocat foramen
sublime, cen-
quoddam in-
fundibulum,
alterum mea-
sum maximū
tertium ventricu-
li.

a Priore am-
plior. Laur.

b 9. ad. an. 5.

c Vesal. & Plat.
& hunc à Ga-
leno 9. ad an.

pratermissum, vult Vesalius. d Nates & testes forream oblongam inter illas interjectam committunt, quæ cum vul-
va imaginem referant, Anatomici (scil. Columb.) vulvam nominavere, Piccolhom. e Piccolhom. qui fornicem, te-
stes, nates, anum, vulvam & penem ad tertium ventriculum refert.

n Per omnes ventriculos vasa minutissima deducuntur, quæ plexum constituunt, Fallop. insit. o Plexus coriformes
quos reticulares appellavimus, Col. plexus choroides, reticulari, Plat. plexus siue contextus choroides, Piccol. plexus cho-
roides, mirabile appellari possit, Laur. l Gal. 9. ad. an. 3. ex venis & arteriis. Piccolh. Ex arteriis ab admirabili con-
textu in sella ossis sphenoidis insidente sursum per cerebri interiora in ventriculos irrumpentibus, quibus nonnulla et-
jam vena sunt intexta, Laur. sunt venularum & arteriolarum textus labyrinthi per tenui membrana sursum ascen-
dentis portiunculas excurrentes: Vesal. & Plat. ex arteria quarta ramo & vasis à sinu quarto prodeuntibus tenuique
membrana & carne quadam fusca contextitur. Fallop. insit. ex arteriis tantum nulla interveniente vena efformantur,
partim à soporaria, quæ rete quoque mirabile efformat: partim ab arteriis quæ per transversos cervicis processus ascen-
dunt, & calvariam per foramen illud per quod medulla exit, ingrediuntur, sub cerebri basi feruntur, & in venarum si-
miles ductus degenerant, & simul in unum ramum uniti, anteriori regionem illam, ubi rete mirabile ab illis arteriis
effor-

& 8. H.] ab aliis vero, qui tertium ventriculum ^t negant, perforatio duorum ventricu-
lorum; alij tertium quendam ventriculum, & ventriculum medium, ^{*} cum in medio
cerebri, imo in centro medullæ cerebri sit, inter duos priores & quartum. Hic primo
longam rimam refert, seu cavitatem longiusculam [tab. 9. f. 7. & 8. H.] dein versus po-
steriora amplior est & partim Fornice versus posteriora sublata, partim testibus & na-
tibus per medium divisus conspicitur, qui recta à prioribus ventriculis ^y sub fornice,
natibus & testibus [tab. 10. f. 10. ab l. ad K.] ad posteriorem tendit [tab. 10. f. 10. K. finem
ostendit.] figura incerta, alijs censetur propter varias eminentis in eo existentes.

Meatus seu ductus ^z duos obtinet, alterum [t. 9. f. 7. & 8. I.] amplitudine satis infi-
gni ex media ipsius sede prodeuntem, qui in cerebri substantia exsculptus, recta de-
orsum versus pelvim pituitam excipientem ad cerebri basin fertur, per quem duo-
rum priorum ventriculorum pituita descendit. Alterum [t. 9. fig. 7. & 8. K.] qui poste-
rior est, & ^a cujus initium orbiculare non est, etsi ventriculi tertij non minima pars
sit, qui tunica peculiari ^b meningis essentia tectus creditur, & sub natibus [tab. 9. f. 7.
M. N. f. 8. N. O. P. Q. tab. 10. f. 10. D. E. F. G.] & testibus ^b in quartum ventriculum supra
dorsalis medullæ initium, permeat, quo spiritus animales transire possint. Ex hujus
meatus angulo inferiore & anteriore, quamprimum Testes subit, nonnunquam mea-
tus alius ^c [tab. 9. f. 8. iuxta K.] longe arctior educitur, qui sensim in anteriora per cere-
bri substantiam latus, deorsum fertur, & in primi meatus finem [tab. 9. f. 8. I.] termina-
tur, & ex ambobus orificium [t. 13. f. 20. D.] exsurgit, quod in pelvim desinit & pitui-
tam ex tertio ventriculo educit. Et cum ad foramen secundum rima quædam conspi-
ciatur, eam Columb. mulieris pubi seu vulvæ assimilavit ^d Ullus tertij ventriculi sta-
tuitur ^e, ut spiritus animalis quoque sit receptaculum, qui insuper tanto artificio con-
structus, ut illum in quartum propellere possit, statuatur.

Plexus choroides in ventriculis prioribus ⁿ inter ipsos & fornicem sedem habent
[t. 11. f. 13. d.] qui χορροειδὴς ὁ πλέγματι, quod χρωεῖω, id est, secundinæ, seu membra-
næ, quæ fœtum ambit, similes sint; siue ut Herophili sectatoribus χορροειδὴς συσπέρµατι-
τι, convolutiones secundinarum modo efformatæ dicuntur, qui fornice sublevata,
rectius conspiciuntur, cum per cerebri amplitudinem diffundantur. Sunt vasorum
minutissimorum in cerebri ventriculis complicationes tenui membrana involutæ [t.
7. f. 00. tab. 8. f. 5. 00. f. 6. M. N.] Contextuntur P enim ex vasis, quæ huc mittuntur, par-
tim

efformatur, addeunt, & cum his unita plexum choroidem efformant, qui per omnes ventriculos fertur, & per tertium ventriculum delatus, cum ad quartum sinum dura matris pervenit, illi per ramos aliquos parvos & exiles conjungitur. Rioli. efformatur ex Veno illa magna à Galeno descripta, qua quarti canalis extremo affixa est, à nulla alia vena propagatur: unde cognoscitur sanguinem qui in plexu choroidae continetur, non esse arteriosum, sed potius venosum, cum nulla arteria cerebri canales sinuosos extimos subeant.

tim ex vasis à sinu quarto crassæ meningis, partim ex vasis à sinu quarto crassæ meningis, partim ab arteriis: à sinus enim quarti [tab. 11. f. 13. R.] extremo, vas venosum [tab. 11. fig. 13. i.] constituitur, quod medium ventriculum perreptas in priores ventriculos fertur [t. 11. fig. 13. l. m.] sic etiam à sinus quarti ramo, qui interne & antrosum ad priores ventriculos cerebri abit [t. 11. f. 13. g.] sic ab Arteriæ quartæ cerebri ramo ventriculos subeunte [t. 11. f. 13. A.] Hæc autem vasa, tenuis meningis portio comitatur atque complicat interveniente subrubra carne glandulose substantia, quæ huic plexui intertextitur. Fertur hic plexus à ventriculi parte humiliore, sursum ad posteriorem ventriculorum sedem, & eousque progreditur, donec illi vas venosum [tab. 11. f. 13. i. ab R.] à quarto sinu per ventriculorum tertium antrosum deductum jungatur, ubi etiam ramulos per ventriculorum substantiam distribuit [tab. 8. fig. 6. ab F. ad G. ad M. N. dein K. L. postea I. ad H. tab. 11. f. 13. ab A. ad S. l. i.] In his plexibus spiritus animales excoqui, attenuari & præparari; alij in rete mirabili inchoari, in his absolvi & perfici volunt, vi perficiendi à cerebro ejusque medulla accepta, unde in priores ventriculos tanquam promptuaria effundantur & in ijs conserventur.

q In his animalibus spiritus generantur, quod meum inventum est, Colymb. at ipsius

inventum negat Piccolhom. & Galenum citat. & Laur. & Piccolh. negat. Plat. & usum dicit, ut interior hæc cerebri substantia, qua nullus anfractus constiat, proinde nec vasa alia possideat, spiritu vitali cum exigua portione sanguinis huc deducti quoque fruatur, & sic cerebro alias undique spiritum & sanguine abundante etiam hic prospiciatur.

De Glandula Pineali, natibus, testibus, & ventriculo quarto.

CAPUT XIV.

De conario seu glandula pineali agitur 9. adm. an. 3. & 8. us. part. 14. de natibus & testibus 8. us. part. 14. & 9. admin. ana. 5. at de ventriculo quarto 8. us. part. 11. & 12. 9. admin. anat. 5.

Glandula [tab. 9. f. 7. L. f. 8. M. tab. 10. f. 10. H.] ad foraminis [tab. 9. fig. 7. K.] in posteriorem ventriculorum introitum adponitur, & testium cerebri parti anteriori innititur [tab. 9. f. 7. M. N. t. 10. f. 10. F. D.] vasi quoque^a venoso [tab. 8. f. 6. H. I. tab. 9. f. 7. V. t. 10. fig. 10. I.] ex quarto sinu prodeunte subponitur, cum quo in resectione facile avellitur in hominibus, cum cerebro vix adhæreat; at in ove ac vitulo, cerebri substantiæ quarto sinu prodeunte reponitur, Vesal. adponitur, Plat. torculari affigitur, Col. b Gal. 8. us. nulli part. 14. c 9. ad an. 3.

d Nucipinea aut turbinata similis, Vesal. Laur. fructibus seminibusve pini similis Piccolhom. penis brevis instar, Plat. cono si ve nucipinea similis, qua aeri exposita, tepescit ac veluti colliguatur, Rioli.

Colomb. & Piccolho qui-
bus etiam glan-
dula pinealis
& coxarium.
f Vesal.

g Particula est
cerebri alius si-
milis. 9. ad. an.
3. Cerebri sub-
stantia durior.
& magis ad
glandis, quam
ad cerebri na-
turam acce-
dens. Vesal.

h 9. ad. an. 3.
i Col. & Pic-
colhom.

k 8. us. part. 14.
l Vesal. Co-
lumb. at Pic-
col. glandula
non est data ut
sit stratum ve-
narum illic per-
reptantium.

m Gal. Vesal.
Laur.eminen-
tis illis, qua te-
stes dicuntur
imposita pro fir-
mamento ple-
xus choroidis
esse creditur,
vel tanquam
valvula cana-
lis principio im-
posita est, ut ca-
nalem ad quar-
tum ventricu-
lum claudat &
aperiat, Riol.
n Vesal. Plat.
o Laur.

p Negant Gal. 9. us. part. 12. & Vesal. hunc meatum praesse, & meatum hunc claudere & aperire: sic Columb. spiritus
quarti ventriculi claudere non est verisimile. At Piccolhom ut claudat foramen in diastole cerebri, ne spiritus ani-
malis e tertio in quartum ingressus, iterum in tertium regredi possit. At Gal. 8. us. part. 14. ait, opinionem esse hominum
vermiformis epiphyseos actionem ignorantium. p. Tenuis ac praelonge cerebri eminentia, Gal. 8. us. part. 14. q. 9. ad.
an. 5. r Substantia subflava ibi substantia cerebri correspondens, qua proxime tenui membrana accedit. Vesal.
f 8. us. part. 14. & 9. ad. an. 5. t Gal. l. c. Vesal. testes & gemelli, Col. Plat. Piccolhom. testes: Laur. nates. Nam & Gra-
eci videntur temporis successu confudisse modo γλαττα modo διδυμοι: appellasse, Vesal. u Vesal. natulas & clunes vocat:
Colum. & Piccolho, qui eminentiores dicit testibus clunes: Plat. Nates: Laur. testes. x Col. Plat. & Piccol. anus.

nulli penis figuram perbelle exprimere volunt, quibus cerebri penis^e dicitur. Oblon-
ga est, mucrone^f suo sursum spectante at basi cerebri substantiae incumbit. Substantia
ipsius duriuscula, membrana^g tenui, cujus interventu^h absconditur, obteeta, colore
subluteo à cerebro ejusq; medulla diuersoⁱ. Hæc cum vasi [t. 8. f. 6. H.] quod ventri-
culū tertium accedit, à quo^k oēs fere plexus, qui in ventriculis sunt, incumbat, cum
usum habet, quem & reliquæ glandulæ^k venis adpositæ, ut eorum divisiones^k fir-
ment: ubi enim vas hoc tertium ventriculum ingressum est, statim in frequentes ra-
mos, tenui membrana contextos dividitur, quare glandula firmamentum^l ipsis &
eorum ramis fit: dein ne hoc vas in ingressu suo, hujus ventriculi meatum obstruat^m
& sic animalis spiritus in quartum ventriculum transitum prohibeat. Nonnulli, cum
ad principium medij ventriculi sita sit, & ex hoc ventriculo in cerebelli ventriculum
spiritus transmittat, hujus eundem usum putant, qui est pylori ventriculi (ait Galenus)
& custodem quendam esse volunt, & velut æconomum quantum spiritus mitti o-
porteat; quare spirituumⁿ transiui præesse autumant: sed hoc glandulæ^k tribui non
potest, cum non sit cerebri particula, imo neque internis cerebri ventriculi partibus,
sed extrinsecus ipsi adhæreat: imo ne meatum^o ita contingat, ut ante ipsius orificium
connivere possit. Nam si ipsius pars esset (ait Galenus)^k liceret ipsi una cum cerebro,
dilatationibus ac compressionibus ex suo situ dimoto, meatum vicissim aperire ac
claudere, at cum ipsa ex sese moveri nequeat, id ei tribui non potest.

Glandulæ pineali à tergo, ex utraque ventriculi tertij parte, & quidem sub fornice,
corpuscula quatuor^p eminentia, rotunda ac duriuscula contigua sunt [t. 9. f. 7. M. N. f.
8. N. O. P. Q. t. 10. f. E. D. F. G.] quæ cum totius cerebri^q particulæ sint, eandem cum iplo
substantiam^r sortiuntur: hæc inferiore parte à cerebro enascuntur, superius vero & à
lateribus nulli parti continuantur, sed tenui meninge solum obducuntur; quæ cum in-
ter anteriorem cerebelli regionem & tertij ventriculi posteriorem sedem locata sint,
rectius cerebello remoto conspiciuntur. Et quia effigiem quandam duarum natium
commissarum referunt^s γλαττα, id est, parvas nates vocarunt; quarum concursum
(si cum spinali medulla perpendas) hominum^t femoribus^t inter sese conjunctis
rectissime comparaveris; alii^t διδυμοις, testiculis ea assimilantes, malunt διδυμοις,
quam γλαττα vocare. Nonnulli vero (cum hæc corpuscula linea [tab. 10. f. 10. inter
E. D. & F. G.] per transversum lata tantum, non vero in plures partes distinguantur)
ea corpora, quæ glandulæ pineali [tab. 10. fig. 10. N.] propinqua & superiora sunt,
vocant^t διδυμοις, testes; quæ vero his sunt proxima & inferiora γλαττα^u nates, seu
clunes appellarunt, quia inferiore & posteriore in horum parte [t. 10. f. 10. sub F. & G.]
meatus ex tertio ventriculo quartum petens (cerebello remoto) conspicitur [t. 9.
f. 8. K. tab. 10. f. 10. supra K.] qui foraminis ani^x speciem referre videtur. Harum usus

7 cere-

Y cerebri molem sustinere, ne ventriculus tertius, seu meatus [t. 9. f. 7. 8. K. t. 10. f. 10. I. K. ex tertio quartum accedens comprimatur, sicque spiritus animalis transitus prohibeatur, aliis² volentibus, has particulas glandulam pinealem ad foramen ventriculi occludendum propellere. His enim eminentiis, stylo per foramen posterius indito, per medium divisis, altera tertii ventriculi pars sub testibus sita [tertius ventriculus totus tab. 10. f. 10. I. ad K.] in posteriorem ventriculum desinens conspicitur.

Ventriculus posterior, a quem quartum Anatomici vocant [t. 10. f. 9. I. f. 10. L. M. N. O. cum tab. 13. f. H.] inter cerebellum medullamque spinalem, b quibus communis est, situs, omnium minimus & subtilissimus est, figuram rotundam eamque ovalem habet. Hic primum amplior est, sensim angustatur donec in acumen desinat: nam ventriculi huius cavitas inferior & d potior in spinali medulla est [t. 10. f. 10. a K. a Cerebelli ventriculus, Gal. 8. us. part. 12. & 14. posteriorem nominat, 9. ad an. 4. sinus quartus, Laur. ventriculum esse negat Valverda: quartus ventriculus totus in cerebello latet, Rioli. b Ex dorsalis medulla & cerebelli sinus componitur, non secus quam si utraque manu cavitate fingeres, Vesal. iunt in cerebri posteriore parte, in-

Rr

iunt

ter ipsum ad cerebellum situs, quia spinalis medulla a cerebro initium producit, in quo fere totus insculptus, Fall. insit. c Sic Vesal. Plat. at Columb. spinalis medulla cavitationem vocat: & Piccolhom. idem vult addens hanc cavitationem quarto ventriculo subjectam esse ac continuatam & calami scriptorium nominat.

d Gal. 8. us. part. 11. e Imo non licuerit, addit Gal. l. c. f Commemorabilem magnitudinem, Gal. l. c. g In anterioribus confectum, Gal. l. c. h Gal. 8. us. part. 11. Verum sic Vesalius, Galenus in lib. de us. part. hunc principalissimum dicit, at in 3. de plac. medium. Sic vero Gal. 8. us. f. 11. qui quartum ventriculum hunc faciunt (intelligit autem eum, qui sub fornice est, quod etiam ex sequenti capite colligitur) omnium ventriculorum cerebri principalissimum esse affirmant. Herophilus vero non hunc ventriculum, sed eum, qui posteriore cerebro inest, existimare videtur principalissimum esse. i Gal. 8. us. part. 12. non est admodum capax, Columb.

k An facultates principes imaginatio, ratiocinatio & memoria sedibus distinguantur? I. Galeni 7. plac. & cum eo Gracorum, qui volunt in toto cerebro fieri, unica sede firmari, eodem instrumento uti: efficiendi tamen rationem diversam esse, cum pro varietate temperamenti & medii operentur. II. Arabum, qui singulis facultatibus, singulas sedes in cerebro assignant: ut Avicenna sen. 1. primi doct. 6. cap. 5. Averroes in Cantico, lib. de memor. & in Colliget, qui imaginationem in ventriculo anterioribus, rationem in medio, memoriam in postremo locarunt: hos sequuntur Albertus Magnus, Thomas, Scotus, illiusque classis Theologi. l Sic & Vesal. m Benivenius refert se observasse in quodam fure cerebellum defuisse, idcirco & spiritus in furto deprehensum & admonitum, precedentis facinoris non meminisse. At Rioli. in iis qui continuo dolore capitis in occipitio laborarunt, cerebellum mollius ipso cerebro, in aliis aridum & friabile deprehendisse.

runt volunt enim in uno sensum communem habitare, in altero vim imaginandi, in tertio vim ratiocinandi, cum tamen nec animæ sentientis, nec facultatum illius cavitas aliqua corporis sedes sit, sed solida partium substantia.

Hic ventriculus, quemadmodum & alii, inter dissecandum aqueum humorem continere conspiciuntur: at duo priores, præter hunc humorem, plexum choroidem [t. 7. f. 4. 00. t. 8. f. 5. 00. f. 6. M. N.] quoque suscipiunt, & tertius vas venosum [tab. 8. f. 6. H. 1. tab. 9. f. 7. V. eductum à T.] quod à crassâ meningis sinu quarto propagatur & plexum complicatum, uti supra ostendimus, constituit. Plerique tamen, hos quatuor ventriculos spiritus animales in plexibus choroidibus elaboratos, continere volunt.

De infundibulo, glandula pituitaria, rete mirabili & cerebri usu.

CAPUT XV.

De infundibulo egit Galen. 9. us. part. 3. & 9. adm. anat. 1. & 4. de glandula, 9. usu partium 3. de rete mirabili, 9. us. part. 4. & 8. de cerebr. us. part. 2. & 3. quemadmodum de ipsius sensu & motu, 8. us. part. 2.

AD ventriculi tertii foramen, quod parte anteriore est & primum seu ejus orificii latera [tab. 9. f. 7. & 8.] cavitas^a profundior occurrit cerebro sub corpore calloso coniuncta, ex tenui^b meninge, cerebri basin succingente, facta. Ab hac enim meninge protensa processus orbicularis educitur [t. 13. f. 20. CC.] initio quidem amplo [t. 10. f. 11. E. fig. 12. B.] sed in canalem angustato, donec in angustam & oblongam fistulam finiat (gracilibus, sed frequentibus venis intertexta) & per foramen [t. 10. f. 11. F.] peculiare in crassâ meninge excisum descendens ad glandulam pinealem definit. Hoc nonnullis^b à figura *πυελος*^d pelvis (quod nomen rectius ipsius principio quod amplum est tribuitur) aliis ab utilitate seu similitudine^b *χοάνη*, infundibulum^c dicitur, quod superne quasi lacunæ cuiusdam utilitatem habet, inferne autem infundibulum imitatur, quo velut meatus crassa excrementa cerebri in ventriculis^f coacervata excipiat, & ad glandulam pituitariam transmittat.

Glandula^g pituitaria sequitur, quam *αδλω*, id est, glandulam simpliciter Galenus^h vocat: hæc sub ipsis^h meningibus ad finem infundibuli in sphænoïdis^h ossis sella posita

solutus est circulus, inde semper magis artatus descendens in subiectum adenem mittitur ampla sphaera similem, manifestamque cavitatem habentem, 9. us. part. 3. ^d *το πρὸς τὸν ἑαυτοῦ τοῦ πύελου πύελος* *τοῦ πύελου* *τοῦ πύελου* *τοῦ πύελου*. Interpret sic habet: ad hoc qua circa scyphonem, *πύελος* aut ab infundibuli similitudine *χοάνη* Græci vocant habentur, atque id genus alia, 9. ad. an. 3. ^e *εἰς* quoddam infundibulum *χοάνη* *πύελος*, et si nullum in se fumum cerebrum habeat, quem sublimi foramine respirare desideret, 9. ad. an. 4. ^f *Α* scyphi seu in qua in balneis la^a *concha* forma, quam superior pars exprimit, *πύελος* appellatur: aliis humilior pars infundibuli fistula non absimilis, *χοάνη* dicta videtur reliqua pars superior *πύελος*: aliis totum hoc corpus *πύελος*, glans autem in qua pituita distillat, *χοάνη*, quasi forma quæpiam esset, in quam aliquid infunditur, Vesal. pelvis & infundibulum, Columb. Piccolhom. & Laur. infundibulum membranosa concavitas, Varolo. ^f Ex prioribus ventriculis superfluitates recipit, Gal. 9. ad. an. 4. & Columb. At Laur. cerebri pituitum delapsa, in pelvim recipiatur, à qua in glandulam delabatur.

^g Nisi veteres qui pueros suos docebant, Anatomen hanc glandulam *χοάνη* appellarint, eam sine nomine reliquere, Vesal. ^h 9. us. part. 3. aden extra crassam meningem est.

posita est; qui sinus in glandula huius gratiam exsculptus est; cuius etiam formam quodammodo exprimit. Est enim depressa, superne concava, inferne gibbosa & pene quadrata; substantia glandulosa, sed cæterarum glandularum duriore ac compactiore: quare ^k crassissima est, ex tenui meninge omni ex parte obducitur, ^l forte à portione ea, quæ infundibulum constituit, huiusque membranæ beneficio ossi firmatur, & duabus arteriarum carotidum propaginibus ad ipsius latera prorepentibus adhæret [t. 10. f. 12. C. D. E. F.] Hæc carne sua bibula, excrementa ^m spongiæ modo suscipit ^o & transcolando ⁿ à lateribus non solum in palatum dejicit, sed etiam per foramina in calvariæ basi exsculpta defluere finit. Ad huius enim glandulæ latera, canales duo in osse utrinque cavati descendunt: unus antè in foramen per quod secundum par nervorum deducitur, desinit: alter, in posteriora magis descendit & per asperam rimam ducitur ad latera foraminis ramum carotidis insigniorem in calvariæ transmittentis, de quibus in ossium historia dictum fuit: & hæc pituita è cerebro evacuandæ subserviunt. Nam cum cerebrum magnum sit & amplum, alimento multo indiguit; & cum plurimum sit humidum, nec admodum calidum, ex multo alimento, multa excrementa colliguntur; quæ cum duplicia sint, alia tenuia, ea per suturas evaporant; alia vero crassa, quæ partim per nares, partim per palatum evacuantur. Quæ enim supra ventriculos & in cerebri divisione cumulantur, per foramen antè & nares expurgantur, mucusque nominatur. Quæ vero in ventriculis colliguntur, per suum foramen ad infundibulum deferuntur, per palatum, vel simplici exspuitione, vel excretionem, ejiciuntur: nunquam enim cerebrum adeo sanum, quin in ventriculis humida excrementa colligantur: tenuiora quidem, in palatum stillare solent, hæc enim via à natura ad expurgandum constituta est: crassiora vero in ventriculis collecta, sensim in pelvim & infundibulum dilabuntur, inde per canales ad os sphæroides in palatum pedetentim & ad nares ferentur, forasque deturbantur.

Rete p mirabile διττωειδές πλέγμα, Galeno ^q dictum, [t. 11. f. 14. proponitur.] id est,

Rr 2

plexus fluxiones sunt per aures, per

oculos, per nares: alia per palatum in fauces, in gulam, alia per venas in spinalem medullam, in sanguinem, omnes numero septem, Hipp. de gland. sic lib. de locis in Hom. fluxiones ex capite septem sunt, quædam in carnes, quædam in aures, quædam in oculos deambis, &c. de capitis fluxionibus vide Arist. 3. part. anim. 7. ^v Adenis infundibulum excipientis usus excrementa transcolare, quod commodum Anatomicis ignotum est. 9. us. p. 3. aliis huius glandula usus est infundibulum claudere, ne spiritus animales egrediantur.

^o Hoc quidem substantia familiaritate defluxus impetum sustinet, & os forsitan ab injuria vindicans, pituitam admittit, & sensim citra stillicidium à lateribus suis defluere finit, non enim cum Galeno fateri queo, basin capitis cavernosam, & pumicis modo extructam, ut per illam veluti per spongiam pituita transcolatur, Vesal at Laurent. dicit, per cunei foramina in palatum pedetentim ex glandula instillare. Item Vesal. ostendit nullam pituitam per octavum capitis os expurgari: contra Archang. in ventriculorum primorum historia. Glandula usus ut excrementa suscipiens, partim depascatur, partim in palatum eructet, ut illa expuantur, Archang. ut pituitam cerebro superfluum excipiat, Varolus.

^p Beatus & mirabilis plexus reticularis, Vesal. plexus seu contextus admirabilis, & admirationis plenissimus, Piccolh. An sinus Fallopiæ, de quibus supra, huius vetis partes existunt?

^r RETE hoc an detur? In hominibus dari negarunt, Vesal. Fuchsius, Valverda & alii. Vesal. ait, nullum reticulum sub cerebro existere qualem Galenus descripserit, bonum cerebri dissectione delusum, non hominis cerebrum, nec ipsius vasa, sed bovis idque etiam parum exacte recensuisse. Valverda de admirabili plexu, nihil in medium adferam, quod in homine is neutiquam occurrat, at in bobus tale quidpiam vetis genus conspicitur. Dari asserunt Mundinus, Carpus, Fallop. Ingrassius Volcher. Piccolhom. Riol. Sic Carpus: plus quam centies capita humana anatomizari quasi

quasi solum propter hoc rete & adhuc in eo sum confusus: est bene verum quod ad latera glandulae qua est sub lacuna, d. dextris & sinistris versus posteriora, sub dura matre sepe vidi & tetigi aliquod hiereticū & simul intricatum, quod potest comprehendere, quod sit illud Rete mirabile. Fallop. umbram imaginemque retis, ob maximam fereque invisibilitatem, non rete mirabile nuncupavit. Varolius sub ipsa membrana ad infundibuli foramen, vasorum seminario intercurrentium plexus apparet, quem si cui arderet vocare Rete mirabile, nihil curo. Ingrassius: retiformem plexum mirabilem, quicquid alii recentiores dixerint, non semel publice privatimque in homine ostendimus: sed in homine, nisi cum maxima diligentia acutissimaque falce dissectueris, una cum crassiore sibi supposita membrana cerebri, propter tenuitatem dissipari solet. Piccolhom. contextus choroides conficitur ex arteriis ab admirabili contextu in sella ossis sphenoidis insidente: Laur. ad latera apophyseon dinoidon plexus apparet, quem tunc iugo d. vocat; Galenus vocat: Riol. de hypoxi reos mirabilis non est dubitandum, quāvis Carpus & Ingrassius nullum in homine reperiri censent. Sylv. in humano capite extare asserit, ejusque investigandi rationem docet, si carotidem in collo inflaveris, id re te cum flatu subsultare conspicias & sanguinem ex iis arteriis si vulnerata sine eodem flatu in cunei capacitatem expus quod si feris falcatis ossa temporum deinde lapidosa perire secueris, arteriam carotidem totam cum suis ramis à cranio eximies & spectandum exhibebis. Sed his verbis videtur intelligere illud quod intra dure membrana sinus continetur. Columb. plexus reticulares dari asserit, plexum coriformem nominans, intelligens eum qui per ventriculos fertur, non vero hoc rete. Fallop. in instit. agnovit. Laur. malim cum neotericis choroidem plexum qui in ventericulis est, rete mirabile appellare.

¶ Maximo omnium qua illic sunt admirabile, toti propemodum cerebri basi plenus hic subjicitur, Galen. 9. 25. part. 3.

x Unde componatur hoc rete? Mundino, ex ramis arteriarum apoplecticarum ascendentium. Vesal. negat ex arteriis carotidibus componi, nec arterias has illud foramen calvaria quod Gale. n. tradit, ingredi, nec totas in unum plexum absumi. Fallop. instit. ab arteriis sphenoidalibus ad basin cerebri efformatur. Curtio, ab arteriis. Piccol. contextus admirabilis ex ar

plexus retiformis, ab artificiosa operis figura nomen habet: conflatum enim ex arteriis carotidibus [t. II. f. 14. A. B.] quae à corde sursum per thoracem ac collum ad caput feruntur, & ad basin cerebri iuxta nervorum opticorum exortum efformant. Hoc, glandulae [t. II. f. 14. E.] quam in ambitu complectitur, à lateribus sella ossis sphenoidis circumponitur: quod non simplex rete est, sed ejusmodi, ut si vulgaria piscatorum retia plura, alia aliis cumalata superjicias, cui hoc inest extremum, quod alterius replicationes, alterius replicationibus sint connexae, ita ut exipsis se junctim nihil omnino capere queas, cum omnia serie continua inter se sint connexa.

In his ex Galeni sententia, spiritus animalis diutissime moratur, qui materiam propriam habent spiritum vitalem per arterias sursum delatum, & in his conficitur, confectus statim cerebri ventriculis incidit. Ubi enim Natura materiam ex aere conficere vult, diuturnam ei moram in coctionis instrumentis comparat. An in arteriis his spiritus vitales exquisitius præparantur & cum aere ad cerebrum transmissi pro spiritus animales generatione permutantur? Alii vero volunt in his spiritus animales inchoari, in plexu choroidae perfectionem acquirere, vi à cerebro & ejus medulla accepta, unde in ventriculos effunduntur, ut in iis conserventur. Nec vero credendum iis, qui in brutorum tantum capitibus reperiri volunt, nam in omnium hominum capitibus haecenus demonstravimus; non tamen negamus in vitulorum & boum capitibus multo & majus & manifestius conspici. Quod vero difficulter in homine demonstrare

terias sphenoidalibus jugularibusve. Volcherus è nervis tertia conjugationis contextum statuit. Riol. rete mirabile versus basim cranii collocatum propago est plexus choroidae qui ex vena magna quarri canal. extremo affixa propagatur. Piccol. in admirabili contextu spiritus animalis inchoatur, in contextibus choroidibus cerebrum ejusque medulla perficitur, quem ventriculi tanquam promptuaria recipiunt & conservant.

¶ 9. u. part. 4. hoc ostendit exemplo flexus varici formis ad testes, in quo sanguis & spiritus pro seminis generatione. Curtio in eis spiritus vitalis & aer ad cerebrum transmissus permutatur pro spiritus animalis generatione: Ingrassius, ut in hoc spiritus vitalis cerebro exquisitius præparetur. t. Ingrassius, quod si qualis in brutis est talis in homine inveniretur, non adeo mirabile esset, cum evidentiissimum sit, vel in capitibus nondum natorum hedorum, ne dum boum aliorumque perfectiorum brutorum: quod propter spiritus contingit, &c.

monstraret ipsius tenuitas in causa est: huius vero quoniam longe tenuioribus spiritibus homo quam bruta, indigebat: quibus post mortem dissipatis, arteriæ hæ minutissimæ ac vere invisibiles evadunt. Et tres hæ particulae, infundibulum, glandula pituitaria & rete mirabile, non nisi cerebelli medulla ablata, duæ vero posteriores non nisi crassa meninge dissecta, demonstrari possunt: denique antequam hæc tria ostendantur, processus mammillares & nervorum paria spectatorum oculis subicere oportet.

Cerebri usus: Aristoteles y quandoque scribit, cerebrum datum esse ad salutem totius naturæ; communiter tamen, ut calorem fervoremque cordis moderetur, eique temperiem afferat; quam opinionem tanquam satis à Galeno z refutatam missam faciunt præsertim cum cor à perpetua respiratione a refrigerari possit. Quare cerebri usum statuiamus, ut sit animæ domicilium, ad functiones animales sensificas, motrices & principes edenda. Dein, ut in ejus substantia spiritus animales elaborentur, & in eo b contineantur (animalis enim spiritus, cerebrum fontem esse, Galenus c pronunciat) indeque ad omnia sensuum & motuum organa ferantur. Tum ut nervi d & spinalis medulla ab eo prodeant. Nervi enim à cerebro e tanquam principio à quo & dispensationis f principio virtutem animalem & animam sentientem, ejus medullæ insidentem accipiunt, & facultatem sentiendi & movendi in instrumenta sensus & motus, tanquam carnales spiritu animali vectore, distribuunt. Idem autem est spiritus animalis & specie unicus, qui totam animam sentientem & omnes ejus facultates, in quamlibet corporis partem per nervos devehit; licet varias functiones edat, idque pro instrumentorum varietate, in quæ à cerebro effusus, incurrit; quare si ad oculos feratur, qui instrumenta visus sunt, visus fit: si ad aures, auditus, &c. quod Aristoteles eleganter demonstravit exemplo mallei: sic se habet (ait) spiritus in rebus à Natura institutis, ut malleus in arte fabrilis, unum scilicet instrumentum, quod ad plures actiones utile est: & Actuarius radorum solarium exemplo declarat: hi licet uniusmodi sint, dissimiles tamen & variegati pro colorum varietate redduntur.

Substantia cerebri licet sensus h & motus animalis (non tamen naturalis) sit expers;

Rr 3

utrius-

y 2. part. an. 7. cum omnia momentum requirant contrariis; quo mediocritatem ac medium assequantur, idcirco adversus cordis sedem & calorem cerebrum natura molita est: datum hoc animalibus ad naturæ totius salutem, idem. Averroes excusando Aristotelem, vult cerebrum ea ratione refrigerare, quod vitales spiritus calidissimos temperet: quam sententiam Alex. Benedictus l. 4. c. 2. videtur

secutus Albertus magnus lib. 12. animal. vult cerebrum frigiditate sua non minus calorem cordis temperare, quam siccas cordis cerebri humiditatem temperat. z 8. us. part. 2. addens: non enim cerebrum tam longe à corde Natura locasset, sed vel omnino cordi circumdedit, quemadmodum & pulmonem, aut in thorace saltem posuisset: simile est, inquit, hoc dogma, ac si quis dicat, calcaneum cordis censu extitisse: Piccolhom quoque & Lauren. argumenta Aristotelis refutat. a Gal. 8. us. part. 3. sic ait, & Aristoteles ad calorem cordis refrigerandum, respirationem paratam esse voluit. b In toto cerebri corpore, non in solis ejus ventriculis spiritus animalis multus continetur, 8. us. part. 13. & 9. us. part. 14. c 12. Meth. med. 5. at 3. loc. aff. 7. epilepsia, inquit, fit in cerebro, impediens humorem animalem spiritum, qui in ventriculis ejus continetur, quo minus exire possit. d De dissect. nervor. l. 1. us. par. 16. 8. ejus d. 13. e 1. us. part. 16. f De form. fetus 4. 7. plac. 3. vide cap. 32. part. 2. libri nostri de partibus similaribus. g 5. gen. an. ult. h Cerebrum an sentias? I. Hipp. lib. de vuln. cap. cerebrum & citissime & maxime juxta synciput sentit mala (id est ab illis afficitur & alteratur) quæ & in carne & osse fiunt, sub tenuissimo enim osse, ac modica carne cerebrum est hac parce, & plurimum cerebrum sub syncipite jacet. Et lib. de sacro morbo causam reddit, etenim cerebrum propterea primum sentit, quia etiam morbi in ipsum irruant acutissimi & maximi ac præcipue lethales, & qui difficilem judicacionem habent apud inexpertos: Gal. lib. de pleuritide, cerebrum & spinalis medulla inter ea censentur, quæ sensum obtinent: quod si in phrenitide dolor non sentiatur, id fit quia mens agrotat: & lib. de inst. of. fact. cerebro manifestum sensum tribuit: quod experientia & sensu confirmatur, eodem lib. c. 4. quidam cum nigellam tenuissime tritam, veterique oleo permixtam ore & naribus jussus exceperisset, gravem in cerebro morsum per se sensit. Quod argumento est nigellam modicum

medicum ad cerebri ventriculos pervenisse, quod aut membrana tenui, aut ipsi cerebro inharens, dolorem excitavit. Ratio id quoque suadet, cum cerebrum sensus omnis fons sit & origo, ipsum sentire debet, propter quod cetera omnia sentiunt: axioma enim est logicum, Propter quod unum quodque tale est, & illud magis tale. Et si non sentiret, non exurgeret ad expellendum id quod molestum est, ut in Epilepsia & sternutatione contingit.

II. Arist. 3. hist. 17. & par. an. 7. cerebrum & medullam sensu tactus privavit. Gal. 1. caus. sympt. 8. Cerebrum ait, non ut sentiat, sed ut sensuum instrumentis vim sentiendi præstet à natura institutum est: Sic 3. caus. sympt. cerebrum instrumentum non sentiens appellat. Sic cerebrum vulneratum licet pungatur, aut portio aliqua adimatur, ager non sentit. Præterea omne instrumentum secundum Philosophos debet alienæ qualitatis esse expers: sic in cristallino color nullus, in auribus sonus nullus, &c. Quare cum de omni sensu dijudicare debuerit & sensus communis sedes sit, sensus omnis expers esse debuit. Hoc voluit Galenus, cerebrum non sentire, sed tantum sensibilibus omnium differentias distinguere. Hoc est cerebrum conditum non est, ut sit particulare sentiendi instrumentum, ut sentiat solos colores, ut oculi: solos saporos, ut lingua, &c. sed cerebrum sentiens instrumentum à Natura conditum est, ut sentiat ea quæ sentit, quasi commune sentiendi instrumentum, ut sentiat & colores & saporos & odores, & sonos, & tangibiles qualitates: sive ut sentiat & percipiat omnia objecta sensibilia. Quare cerebrum univèrse sentit, non vero aliqua sentit, aliqua non sentit.

III. Piccolomini: Cerebrum sentire, sed obscure & exiliter, præsertim sensu tactus, quia ei non inest instrumentum tactionis. Tactus enim instrumentum membrana est, quare ex incisione dolorem nullum percipit. Ergo sentit obscure, quia ejus substantia facultas tangendi, non autem instrumentum tactionis inest.

IV. Fern. motus omnis à cerebri medulla, sensus vero omnis à meningibus manat, quia cerebri corpus motu agitur assiduo, nullo tangendi sensu præditum: contra, quæ ipsum ambiunt membrana immobiles per se sunt, præsertim crassa: Tactu aut valent exquisitissimo. Sic in delirio & lethargo, qui affectus sunt cerebri nullus dolor: at si humor acris aut vapor in meninges effertur, gravis dolor excruciat. Atque spina & nervi omnes medullam habent, à cerebro, eamque meningibus vestitam, quæ singula talem vim & naturam habent, qualem ab ortu acceperunt. Ergo prior cerebri pars sensus, posterior motus principium est: meninges autem tactus sunt origo. Qui nervi multa medulla conferti sunt, motus instrumenta sunt. Tangendi autem ii, quos majore ex parte meninges protulerunt. Hanc Fernellii opinionem Laur. refutat lib. 10. quæst. 10. Et Galenus 7. plac. 3. movendi & sentiendi facultatem in cerebri tantum medulla contineri scribit: membranas vero ad vestiendam medullam tantum construi. Quare cerebri medulla motus sensusque omnis animalis expers, motus tamen sensusque omnis animalis principium. Sensus quidem, quia sensibilibus omnium impressionem percipit: motus vero, quia imperium omne ad noxii fugam aut utilis persecutionem largitur: quare cerebro labor ante partes inferiores nec moventur, nec sentiunt.

i 8. us. part. 4. m
& 3 plac.
k 8. us. part. 6.

utriusque tamen & i sensus motusque voluntari principium & origo est, quod ex Apoplexiæ consideratione intelligere possumus: Apoplectici namque et si sensuum^k instrumenta omnia illa se habeant, nihil tamen à cerebro ad sensibilem dignotionem assequuntur. Medullæ enim spinalis principio penitus obstructo, omnes partes subiectæ motum sensumque amittunt: sic obstructo penitus nervo alicujus partis, ea pars sensu motuque privatur: hinc sequitur, cerebrum animæ sentientis sedem esse, & sensus motusque fontem: sensus quidem, quia sensibilibus omnium impressionem percipit: motus vero, quia imperium omne ad noxii fugam, aut utilis persecutionem largitur.

Equidem cerebrum neque sentire eo modo quo partes aliæ, neque statim aliquo motu moveri concedimus: cum multæ corporis partes motu arbitrario destituantur, quæ tamen ob id non carent motu, quo noxia à se depellant. Sic hepar, lien, venæ, arteriæ, humores noxios quotidie deponunt, licet motu illo quo muscoli partes alias movent, præditæ non sint. Sic in febribus continuis, Venæ crisi tempore & per diarrhoeas aliasque vteri fluxiones, humores putridos in ventriculorum & intestina profundunt, licet musculis careant, non tamen absque motu id faciunt: eadem & aliarum partium ratio est. Quin imo ipsi quoque muscoli, dum molesta à se depellant, id motu naturali non vero voluntario id facere videntur, quo pars quælibet ut natura edocta

docta est, sibi molesta alio propellit. Exemplum sit in singultu, in quo oris ventriculi motus manifestus est, quo humorem & molestum & mordicantem excutere conatur, licet musculi motu minime moveatur. Quid ergo prohibet cerebrum quoque irritatum instar aliarum partium vapores inimicos repellere? ut in sternutatione, catarchis, concussione corporis per somni principium & aliis fieri videmus. Sic & sensus quidam naturalis (ut sic dicam) tam utilium quam inutilium, partibus omnibus inest, etiam illis, quæ sensus animalis nunquam participes fuere. Nam viscera, ut cor, hepar, lien, renes noxia sentiunt & à se removere conantur, quamvis nervos nullos à cerebro alios obtinuerint, quam qui in membranas ipsorum distributi conspiciuntur: ita videmus crebras syncopes, anxietates fieri, ob vapores & humores pravy, cordis substantiam afficientes: ita fit in sternutationibus nocturnis concussionibus, coryza & aliis cerebrum molestantibus, quæ ipsum persentit.

Quamvis autem corpus cerebri, quod membranis nudatum est, nihil sentire Galenus probaverit, ex eo inferendum non est, ipsos Ventriculos sensus omnis expertes esse, cum eorum superficies interior, membrana tenuissima à tenui meninge producta investitur, quod sapissime & clare demonstravimus: quare, si aliquantulum eos sentire quis dixerit, non absurde facere videtur. Imo & Galenus non inficiatur cum lib. de instrum. olfac. historias referat quorundam, qui medicamenti acris per nares violentius attracti morsum in profundo, id est, in cerebro persenserint.

Motu tamen naturali moveri statuimus & reliquis partibus motum voluntarium præbere: qui motus ipsi proprius & peculiaris ad animalis spiritus generationem, nutritionem & expurgationem. Et Galenus motus cerebri usum geminum indicavit: alterum ut aere in cerebrum attracto, spiritus animalis augeatur & ventiletur: alterum

An moveatur cerebrum, varia opiniones. Galenus motum perpetuum tribuit, 8. us. part. 2. At Ves-

salius reprehendens Galenum & recentiores Anatomicos, rationem contrarium dicere asserit, Galeni argumenta de instrument. odoratus, de util. respirat. & 12. us. part. allata non esse tanti momenti, ut persuadeant motum in hoc viscere esse. Ob stare enim totam ipsius substantiam, nec sensu assequi potuisse, neque in vivorum brutorum anatome, neque in maximis capitis vulneribus. Fallop. in observat. ait: adesse audacter non negarem, sed aut ob ipsius parvitatem, aut aliam ob causam nunquam assequi potui. At in instir. continuo moveri dicit. Coiter, capita agnorum, badorum & canum viventium aperui, quo certo num cerebrum moveretur deprehenderem: at nullum in eis cernere quivi motum: quod in cerebri magnis vulneribus cerebrum agitari videtur, arteriis adscribendum. Plat. vero sic sinus tertius, arterie alicuius instar pulsant: quod cum in tenellis calvariis, antequam penitus coalescant, in vertice tactu deprehendatur ut cerebrum moveri multi falso crederent, occasionem præbuit: Columb. Piccol. & Laur. perpetuo moveri, probant exemplo vulnerum capitis: addit Laur. Neminem, nisi amentem aut in re Anatomica omnino imperitum, negaturum. Rioli. Infantibus palpitatio verticis accidit ex cerebri motu, quod moveri sua depressione & elatione vidi in quodam, cui dimidia pars frontalis ossis carioli usque ad suturam coronalem evulsa fuerat: ideo falsa Ruffi opinio, dum ex meningibus solum externam pulsationis motu cieri scripsit: & Fallop. falso opinatus ratione quatuor canalium solam banc meningem immoto cerebro micare.

m. Movetur non animali & voluntario motu, non violento, sed naturali, eo quod proprio & peculiari, tum alieno, arteriarum quippe, Laur. At in quæst. 9. lib. 10. cerebri corpus propria vi & insito motu respirare existimat. Piccol. cerebrum sponte & ingenita vi movetur, non vero motu arteriarum assiduo, quia hæc exiles nimium & parva quæ superne feruntur: quæ vero intro subeunt, longe adhuc exiliores & minores, per tenuem meningem decurrentes: quare illa quia exiles, & cerebri substantiam non attingunt: hæc vero ob parvitatem, cerebrum una secum movere nequeunt, & subjungit, omnium motuum in homine fontem esse cerebrum, & cor à cerebro moveri ostendit.

ram, ut odoratus fiat. Cum enim hujus instrumentum intra calvariam situm sit (processus cerebri ad os cribrosum terminati) & vapores odorati citra inspirationem ad ipsum pertingere nequeant, cerebrum contrahi oportuit, quo aer per nares conscenderet atque intro penetraret. Quod autem aer sine inspiratione, calvariae interiora ex naribus subire nequeat, sic probat Galenus: Si calamus odoribus plenum in nares alicujus indideris & quanta potes vi insufflaveris, eoque modo vaporem odoratum sursum pollere tentaveris, frustra laborabis, si is interim non inspiraverit. Quippe aer in narium concavitate cedere non potest, non cedente eo qui intra calvariam cerebrum ambit: & hic cedere nequit, nisi cerebro in se coeunte. Ergo cum contrahitur aer ambiens, ne vacuum detur, necessario consequitur: in hujus locum is deinde, qui in naribus continebatur, succedit. Dilatur enim & constringitur, quod vulnera capitis, ubi insignis calvariae portio, ut & meningum ablata est, sensui patefaciunt: & in recens natis in synipite cerebrum tam conspicue palpitare conspicitur, ut etiam ossa, quae eo tempore mollissima sunt, moveantur. Dum dilaturⁿ ex sinibus (alii ex plexu arteriarum carotidum) spiritum vitalem & e naribus aerem attrahit, ad spiritus animalis restitutionem & custodiam: dum vero se contrahit, ⁿanimalem spiritum in cerebri substantia elaboratum per nervos tanquam canales in sensuum & motuum organa propellit; vel ut aliquiⁿ volunt à superioribus ventriculis coarctatis; in tertium & quartum, & tandem in sensuum & motuum organa protrudit: qui cum in partes pervenit, spiritum animale partem infixam nutrit. Nam spiritus animalis per nervos in omnes partes influit, non solum ut sit vector animae sentientis & motricis, verum etiam, ut spiritui animali partibus infixis nutrimenta præbeat: hicque spiritus medium est, per quod anima sentiens, ejusque facultates omnes, cum incorporeae sint, cum corpore junguntur; exteriores quidem, cum instrumenta longius remota habeant, nervis tanquam canalibus indigere, per quos spiritu vitali vectore in ea ducuntur. Interiores vero, cum instrumentum proximum habeant, nervis non indigere, sed per cæca spiracula eodem spiritu duce in illud feruntur.

Spiritus animalis materiam^o censemus sanguinem arteriosum spiritu vitali perfusum

n Piccolho, & Laur. verum addit Piccolho. dilatationis tempore viam ex tertio ventriculo in quartum connivere & à glandula inter glutia prolapsa intercludi, ut nihil spiritus possit ex quarto interitum remigrare: contra in contractione

glandulam sub

latam, ipsi quoque glutia diductis viam patere, qua spiritus ex sinu tertio in quartum influat, quod igitur cordi valvula ad cerebroglandulam & glutia conducere. o De generatione spirituum animalium diversa sunt opiniones.

I. Galeni fuit, ex spiritu vitali per arterias carotidas delato & aere inspirato fieri: Verum quo ad locum generationis, nunc in plexu, nunc in ventriculis generari scribit, nunc in cerebri substantia & corpore contineri.

II. Vesalii ex spiritu vitali à corde transmissio, & aeri per inspirationem attracto, in cerebri dextro sinistroque ventriculo ex ipsorum communi seu tertio, vi à cerebro accepta, elaborari.

III. Columbi ex aere attracto in frontis & cunealis ossis cavitate alterato, per foramina ethmoidis effusis ad superiores ventriculos delato, & vitali spiritu à corde per arterias carotides sursum delato & in plexu coriformi qui in ventriculo est, effuso, & ob assiduum cerebri & hujus plexus motum commistis, animale spiritum generari, in plexu coriformi, qui in ventriculo est, suumque inventum esse dicit.

IV. Argenterius unicum spiritum influentem statuit, cujus argumenta sufficienter sunt à Laurentio refutata.

V. Varolius voluit in cerebri substantia elaborari. & spiritus, per quas cerebri operationes optima perficiuntur, in cerebri substantia molli residere, nec cavitatibus indigere: ostendit hoc exemplo: dum unum oculum claudimus, spiritus animalis statim ad alterum refuit, ita ut ejus pupillam magis dilaret: tamen inter unum & alterum oculum nullus ductus reperiatur, præter poros insensibiles in omni nervo & cerebro existentes. Plat. communis opinio, animale spiritum in plexu choroidae gigni & contineri: at cum hac vasa adeo exigua sint, torque cerebri excrementa per ventriculos defluant, approbare non possumus: acin etiam quia spiritus animalis cum cerebri substantia colligatur, ut nullibi

nullibi illa sine spiritu, neque spiritus animalis sine cerebri substantia in parte incolume consistere possit. Quare in substantia cerebri etiam elaborari voluit, eo modo, quo in textu monuimus.

VI. Piccolhom sententia: spiritus animalis ex spiritu vitali multis alterationibus & exagitationibus ab arteriis, quæ & contextum admirabilem & contextum choroidem componunt, immutatum, in cerebro & à cerebri substantia summum perfectionis characterem acquirere, ita, ut fiat convenientissimum animæ sentientis vehiculum: hoc modo, ut inchoatio sit in admirabili contextu, at in plexibus choroidibus omnimoda perfectio, ut tamen à cerebri medulla, cum vitantem in ista sit, accepta: hos ab absortos in ventriculos (qui nil ad ipsius generationem conferant) quare in eis generari negat, tanquam promptuaria effundi, conservari & in omne corpus distribui.

VII. Laurentio, spiritus animalis ex spiritu vitali & aere inspirato generantur, quorum preparatio est in plexibus arteriarum labyrinthis, & in superioribus ventriculis; elaboratio major in tertio, perfectio vero in posteriore ventriculo fit, tandem & in nervos, & in totam cerebri corpus diffunditur. Eareprehendit eos, qui asserunt, spiritum hunc in plexibus propriam formam & speciem consequi.

IX. Bart. spiritus animalis preparatio in rete mirabili & magis in plexu fit, sed elaboratur in medulla oblongata cavitate, sive in quarto ventriculo, unde in omnes nervos effundi possit: non generari in cerebri substantia, quia tam subtilis spiritus generatio cavitationem aliquam requirebat: non fieri in ventriculis anterioribus, quia sint excrementorum receptacula, ut ex subjecta glandula pituitaria appareat, & quod sæpe pituita repleti reperiantur. At elaboratos in cerebri substantia tanquam promptuaria asseruari, cum eadem sit substantia, quæ & nervorum medullaris interna, quæ spiritum animale etiam continet: ita tamen ut in cerebri cortice spiritus animalis pro sensu: in medulla vera tota, spiritus pro motu reservetur. Ad sensum plus conferre cerebrum vel corticem, ad motum vero plus medullam, probat ex piscium anatome, qui cerebrum admodum exiguum habent, medullam vero insignis magnitudinis: hinc piscis, quoad sensum stupidus satis esse, in motu vero satis agiles: quare corpus durius ad motum, mollius ad sensum facere.

sum & aerem per nates inspiratum: cujus generationem dicimus cum Varolio talem esse: Spirituosus tenuiorque sanguis per arterias carotides à corde sursum ad cerebrum deferretur, in cujus crassæ meningis sinus, dum dilatantur (quemadmodum è venis sanguis) infunditur: huic aer, qui inspiratione per nates attractus, & per ossis spongoidis foramina cerebrum subit, permiscetur, hæc permixta in ipsis valis, dum per cerebri anfractus feruntur, alterantur & præparantur, ab excrementis pituitosis repurgantur, & dum cerebrum alit, subtiliorem portionem ipsius substantiæ infundit, quod in cerebri substantia medullari in spiritum animale subtilissimum elaboratur, & spinali medullæ ac nervis totius corporis communicatur.

Verum licet cerebrum motu naturali moveri credamus, is tamen cordis & arteriarum motibus non correspondet: nam si cerebri motum attente consideres, in nuper natorum scynipite, imposita manu & altera ad manus carpum, motus motibus non correspondere percipies, sed plures pulsationes in Arteriis fieri quam in cerebro: quare ipsi motus à corde non communicabitur. Et in hoc quoque Cerebri & cordis motus differunt, quod Cor & Arteriæ dilatatione trahunt, secundum Galenum de Usu pulsum, contractione autem expellunt: contra vere Cerebrum, contractione trahit, dilatatione expellit: secundum Galenum de Instr. odor. cum in se, ait, colligitur, tunc extrinsecus aer continui ratione sequitur, idemque repulsus efflatur, cum cerebrum diffunditur. Hoc est, tunc dilatatur cerebrum, quando ejus substantia magis distenta, cavitates ipsius angustiores reddit: constringitur, quando ejus substantia corrugata & minor facta cavitates ampliores efficit.

Ss

De

bere prominens; antèrùs vèrò vèrsus cerebri nates, in acutum quasi fertur, & figuram loci causâ habet.

Tribus ^d ex partibus (néquaquam tamen divisís, sed continuis) efformari videtur, d. *Sic & Vesal.*
dextra sinistra & media, propter occipitis ossis tuber, de quo capite de ossibus dixi. *& Plat. cerebellum ex multis & his admodum parvis corporibus non tamen simili, quo cerebrum modo conflatum est, 8. usq. part. 13.*
mus: dextra & sinistra, duos globos invicem adpositos quodammodo refert [t. 10. f. 9. B.D.] in quorum medio, ubi globi se non contingunt, tertia pars teres, quæ à prioribus in posteriora veluti in orbem ducitur, quæ vermiformes processus constituit, reponitur; & ratione harum partium impressiones quodammodo triplices sunt, aliæ transversæ & ordine per ipsum ductæ, aliæ deorsum protensæ, utrinque quasi in centrum & ad cerebelli sedem colliguntur. Nam oblongas lineas, paulo minus, quam superficiarias, frequentibus tamen & continua serie deductis, & tenui meninge interceptis obtinet: superficiariæ quidem sunt, quod facile à profundioribus anfractibus cerebellum ad ventriculum usque perforarent; frequentes autem ut levam illam penetrationem copia suppleant. Longis vero flexibus & anfractibus, quibus cerebrum donatur destitutum est.

Substantia pene eadem est cum cerebri substantia, si cerebellum tenui meninge cerebello eadem denudatum perpendamus, excepta cerebri basi unde spinalis medulla prodit, quæ *spira, eadem substantia, &c. Piccolh.* omnibus cæteris partibus, & iam ipso cerebello durior existit: ita & spinalis medulla *f magis pallet, Plat.* sensim durior evadit, & nec colore, nec duritie cerebello correspondet: cum cerebellum magis flavum, cinericumve sit, & solum in sinus superficie albicans, ipsa vero spinalis medulla albissima, quemadmodum & cerebri basis, quæ ei principium tribuit. At copia longe ipsi cerebro cedit & aliis quaduplo, aliis decuplo minus censentibus. *g Decuplo aut undeplo minus, Fallop. in observat.*

Sinum (quem cisternam* aliqui nominant) habet in medio latum, non autem profundum qui quartum ventriculi elatiorem sedem efficit, cum reliquam sedem tenuis ** Arantius: quam Herophilius 8. usq. part. 11. τὴν ἐν τῇ παρεγκεφαλίδι καλεῖται nomine videtur.* meninx obducit [tab. 13. fig. 21. H.] Intrinsicus vero nullas cavitates, uti cerebrum ob-

tenet, cum tot excrementis non abundet, & quæ colligit, facile extrinsecus deponat. *Et Erasistratus dicit esse ἐν τῇ ἐνδομυελῇ καλεῖται.*
Processus ^h duos obtinet [tab. 13. fig. 21. C.D.] qui cum figura *σκωληκί, id est, i vermi* in ligno ^k carioso sint similes, *σκωληκοειδὲς ὀπφύσεις, i vermiformes* ex crescentiæ seu processus dicuntur, quorum alter anteriorem, alter posteriorem sedem ventriculi, *Et Erasistratus dicit esse ἐν τῇ ἐνδομυελῇ καλεῖται.* qui cerebello & spinali medullæ communis est, respicit. Hi multipliciter ⁱ orbiculati sunt, cum ex multis particulis, non obliquis, aut rectis, sed transversis tenui ⁱ membrana ^l copulatis, constant, quorum extremitas ⁱ seu apex convexa ac tenuis est (quod corpusculum ^m ciceris magnitudine dicitur) & cavitatem cisternam dictam, imo ^h Processus quatuor in ambitu sinus prodeuntes, duo latera occupant, medulla continuata: duo vermiformes processus dicuntur, *Plat. duplex ipsius extremum, alterum in* priorè parte conario porrectum: alterum vero retro nec dum apparens, Gal. 9. ad. an. 5. i 8. usq. part. 14. ^k Ligni cæsi *ve vermem referunt, Vesal. 1 Vermis corpusculum oblongum membranosum est, quod Galenus cerebri particulam esse voluit, quod non est, nec de cerebri substantia, quando quidem cerebrum medullosum est, vermis vero membranosus: nihil enim aliud est, quam tenuis meninx, corrugata atque plicata, quam in cerebri dilatatione necesse est extendi: in eius vero contractione, plicari ac corrugari. Quoniam enim cerebra eorum, qui de vivis migrarunt, contrahuntur, conivent & in sese concidunt, hinc fit, ut in defunctis pia mater corrugetur ea parte, crassiorque appareat pra humiditate in ea declivi parte collecta, qua plurima ibi tenuis meninx imbuitur. Itaque vermis ut vermis est, nullius usus est, nec datus, ut foramen intercludat) nisi is qui est ipsius tenuis meningis, Piccolh.*

Ss 2

tibus

n Totum mea-
tum conregit,
Gal. 9. ad. an. 5.
Non scio, cur
Galenus hunc
processum infe-
riorem, mea-
tus ex tertio
ventriculo in
quartum per-
tinentis orificio
perfectum ve-
lit, ac velut al-
terius tantum
processus apicis
ve minus ex-
plicaverit: &
hanc scio an-
teriolem an po-
steriorem judi-
carit. Vesal.
o. curd. 1. 1. 1.
qua Anatomi-
ci teriores vo-
cant; ita vo-
cant, qui magis
in Anatome
versati sunt,
3. us. part. 14.
et 9. ad. an. 5.
p. 8. us. part. 14.
q. 8. us. part. 11.
12. et 14.
et Vesal. nullam
morum aut of-
ficium aliud
tribuit, quam
reliqua cerebel-
li substantia.
Columb. utri-
usque usus ne
quartus ven-
triculus à cerebello pressus, illius substantiam obruat. Plat. processum quatuor usus, ne quartus ventriculus compri-
matur. Gal. 8. us. part. 6. negant Vesal. et Columb. et Plat. Piccolhom. a Postquam in toto cerebri corpore, non in
ipsum contineri, ut quod omnium qui in totum corpus distribuuntur nervorum futurum erat principium, medisque
illa intervalla, qua partes ejus connectunt, spiritus esse vias, 8. us. part. 13. x Varolius.

tibus adiacens, censetur à Galeno tertii ⁿ dicti ventriculi meatum in quartum aper-
tum retinere: & voluit hunc processum, cum secundum totum meatum extendatur,
ipsum totum obstruere: retro autem in orbes (cujus nomine ex particulis transversis,
non vero oblongis, aut rectis, non enim retro transversis flexibus revolueretur, com-
ponitur) reflexa, convexis suis particulis membranam connatam retrorsum cesserit:
dum enim reflectitur, & in sphaerae modum rotunda fit, & in seipsum confidet, quan-
tum longitudo minuitur, tantum latitudo augetur. Quare Galeno ⁱ hi processus nec
crassiores nec tenuiores esse debuerunt: à crassitie enim meatus claudi exacte nequif-
set, eo quod partibus suis tenuissimis ad meatus angustias non pervenissent: à tenuio-
re autem nec exacte claudi, nec probe aperiri potuisset. Ne vero in meatus penitus di-
labantur vel vagentur, Natura utrinque natibus tenuibus corporibus, quæ ab Anato-
micis ⁿ tendines dicuntur, illigavit, & coniunxit, quæ à tenui membrana, non tamen
imbecilla qua rectæ sunt, prodeunt, quæ sane membrana ad posteriorem ventricu-
lum exporrecta, hujus processus finis est. Hæc Galenica, quia considerationem me-
rentur, præsertim si consueto modo cerebri sectio instituitur, hic recensere volui-
mus.

Alter processus [tab. 13. fig. 21. F. D.] qui posterior est & antrorsum ex posterioribus
vergit non ut anterior prominet, sed suo mucrone in cerebelli sinus substantiam ma-
gis absumitur. Vsum prioris volunt, spirituum ^p transitui præesse: dum enim in limi-
ne cavitatis situs, quatenus extensus sit ingressum occludere, at contractam viam pa-
refacere: alterius, ne quarti ventriculi ductus (quem cerebelli ventriculum Galenus
^q vocat) à cerebello pressus, obstruatur. Verum hunc usum utrique communem
censemus, siquidem hic meatus nunquam occludi debeat, sed perpetuo patere, quo
animalis spiritus in spinalem medullam perpetuo influat.

Ad latera duæ adhuc occurrunt portiones, quæ spinali medullæ continuantur [f.
13. f. 21. G. G.]

Vsus cerebelli alius ^f videtur, ut inde duriores nervi prodeant: aliis ejusdem ^t cum
cerebro naturæ, cum quo eandem facultatem possideant: alii ⁿ in hoc non minus, quam
in toto cerebri corpore spiritum animaleam contineri volunt alii, ^x qui cerebrum
præcipue in gratiam visibilium constructum existimant, cerebellum in gratiam spe-
cierum resonantium factum statuunt: Quid si dicamus propter quartum dictum ven-
triculum creatum esse, cum totus in cerebello latet, ita ut non immerito cerebelli,
non cerebri ventriculus dicatur.

De

arculus à cerebello pressus, illius substantiam obruat. Plat. processum quatuor usus, ne quartus ventriculus compri-
matur. Gal. 8. us. part. 6. negant Vesal. et Columb. et Plat. Piccolhom. a Postquam in toto cerebri corpore, non in
ipsum contineri, ut quod omnium qui in totum corpus distribuuntur nervorum futurum erat principium, medisque
illa intervalla, qua partes ejus connectunt, spiritus esse vias, 8. us. part. 13. x Varolius.

De hac egit Galenus 12. us. part. 11. & 15. sic 13. us. part. 8.

Medullæ nomen proprie quidem de ea substantia dicitur, quæ simplex, humida, pinguis, alba sensus expers, in cavis ossium contenta, quæ ex sanguine in ipsas cavitates per venas illabente ortum ducit: candida autem, & veluti spermatica evadit, eiusmodi mutatione ab ossibus accepta: quod intra cavitates ossium reponitur, ut ossium proprium sit nutrimentum, & ossa motibus aut aliis de causis violentis incalescentia & arefacta, reficiat; sed de hac proprie dicta sermo nobis non est. Improprie vero dicitur & de cerebro, & de ejus spinæque medulla. Nam & cerebrum, ἐγκεφαλος, μυελος ἐγκεφαλικῆς medulla cerebri, dictum est, quod ejus substantia, ut ait Plato, medullæ quædam species sit; à qua tamen plurimum differt, quod nec liquefieri, neque absumi, ut illa, possit, & duplici meninge investitur: Alii vero non ἐγκεφαλικήν, sed μυελὸν ἐγκεφαλῶν malverunt appellare. Dicitur quoque de spinali medulla, quæ propriæ substantiæ nomine, ut ait Galenus, sic dicta est: quamvis proprie dicta medulla, à spinali medulla differat plurimum. Substantia, cum ossium medulla impense sit humida & prope fluxilis & adipi similis: colore, cum non ita alba sit, ut spinalis: involucris, cum in ossium solum cavitatibus seu porositatibus contineatur. Spinalis vero tria obtineat involucra, & ob id solum, quod intra vertebrae tanquam intra ossa contineatur, & ob aliqualem substantiæ similitudinem, medulla dicitur: usque denique, cum in ossium cavernis nutriendi gratia contineatur. Quare ad differentiam alterius, ab aliis ραχίτης, ^a spinalis; ab aliis νωτιαίη, ^b dorsalis, aliis δεσυχενίη, ^c aliis φοιτῆς dicitur, cum per cervicem, dorsum lumbosque descendat, & totam spinam impleat. Iam vero & spinalis medullæ acceptatio duplex est: nā latiore significato, tota cerebri medullam oblongatam significat, cujus pars altera adhuc in cranio continetur [tab. 15. f. 1. à D. ad E.] altera vero prior tamen continua, occipitii foramen magnum egrediens, ad spinæ extremum descendit [t. 16. f. 1. ab A. ad H.] strictiore vero magisque propria, eam medullæ partem, quæ extra cranium in spinæ totius vertebrae continetur, notat [tab. 16. fig. 1. expresse exhibet.] Quare, ut omni ambiguitate careat, rem explicemus.

Cerebrum vulgo appellatum, seu substantiam illam cranio inclusam, divisimus in corticem & medullam, siquidem colore & consistentia discrepent: illa quæ medullam undique cingit, cinerea est: medulla vero alba est solidior, firmior & compactior substantia; quæ duæ partes in recentibus capitibus, lineis quibusdam obliquis variis distinguuntur, ita ut scalpello separari possint, si summa dexteritas adhibeatur, sed non sine divulsione utriusque substantiæ: nam alba ^c demersa est in cineritia, quemadmodum cristallinus in humore vitreo, & quemadmodum vitreus, cristallini alimentum creditur, ita cineritia substantia, albæ pabulum ^d membranas habeat, quas alia medulla non habet. ^e Piccolhom. dividit in cerebrum & medullam: cerebrum vocat partem cineritiam alba circumfusam, medullam vero cerebri partem mediam albam, &c.

lum judicari possit: cum cineritia idcirco talis appareat, quod innumerabiles venæ per eam disseminentur.

Medulla vero ipsa duplex constitui potest, altera globosa, altera oblonga. Globosa, quæ cranii figuram æmulatur, magna mole constat, in qua ventriculi excavati sunt, & ab hac altera, continua tamen, propendit, de qua parte, ex communi Anatomicorum sententia iam dictum fuit. Medulla vero cerebro oblongata, caudicis vel baculi instar, ratione situs diuidi potest, in eam partem, quæ oblongata intra cranium conclusa continetur: & in eam, quæ cranio iam excidit, & proprie spinalis medulla dicitur, quamvis nonnulli totam cerebri medullam oblongatam, spinalem seu dorsalem medullam vocitent: de hac sermo est.

à 8. usq. part. 10.
Opiniones de
origine spinalis
medulle.

I. Hipp. de carnibus à cerebro:

II. Galeno ex posteriori cerebri ventriculo.

III. Vesal. à cerebri basi.

IV. Piccolhom. à cerebri medulla globosa, parte media inter cerebrum & cerebellum: qui enim duplex principium dicunt, nihil dicunt.

V. Plat. à cerebri basi, veluti novum cerebrum oblongum & à cerebello novis viribus adaugetur.

VI. Columb. nihil aliud, quam cerebrum oblongum, duplex habens principium, majus à cerebro emanans, à cerebello minus, quod à cerebro est, unicum est; quod à cerebello bifidum, & sic in dextrum & sinistrum dividitur, major ab anteriore cerebri parte, à nervorum opticorum regione parum distans, quare fateri cogor. 3. 4. 5. 6.

7. & 8. par non à cerebro, sed à spinali medulla exoriri.

VII. Varolio, exeunt à cerebro & cerebello quatuor radices truncum insignem constituentes, quem spinalem medullam vocant, ex qua prodeunt nervi ad singulas corporis partes. Laur. è cerebri & cerebelli substantia tanquam à radice caudex profunditur. e Medulla cerebri oblongata, Piccolhom. in Ecclesiæ suntis argenteus nominatur: illius autem conceptaculum, fistulam sacram dicunt. f 8. usq. part. 12. g Mediocris oris gallinacei latitudinem & altitudinem aequat, Piccolb. h Varolius, Plat. Piccolb. Laur. Dominicus Leonus. i 13. usq. part. 3. k 12. usq. part. 15. l Spinalis medulla membranas Gal. de dissect. nervor. & art. 9. meningas vocavit. m Triplici Galeno, cui hac tertia est, Vesal. Col. Piccolb. duplici membrana obvoluitur, Plat. & Laur. Theophilus quartam adjecit, colore flavo materia inter nervum & cartilaginem media, quæ omnes vertebrae communi quodam vinculo contineat. n de arte & Gal. de dissect. ven. & art. 9. o Validum membraneumque involucrum, sed unde oriatur, non dicit, Vesal. ab osse occipitis, ubi spondylus

Spinalis ergo medulla in lata significatione, originem sumit ex Galeni sententia^d ex posteriore cerebri ventriculo, nihil enim aliud, quam cerebrum oblongatum censuit (hinc aliis^e oblongatum cerebrum appellare placuit) & solis cerebri^f partibus, quæ ad basin pertinent, continuam fecit: at vulgus, falso cerebelli processum credit, qui per totius spinæ vertebrae feratur; sed revera tam cerebri, quam cerebelli productio existit; ex quibus tanquam ex radice, caudex procedit, ut infra movebimus.

Hæc calvaria sinum, supra magnum occipitii foramen, cerebello (cui continuatur) subiaccens, occupat; & principio suo, seu parte vna in cranio hæret [tab. 15. f. 1. D. ad E.] quod longitudine quatuor transversos digitos æquat latitudinis & altitudinis & circularis & mediocris, à qua Nervi cerebri^h dicti cum olfactus organis, in quinque sensuum organa propagati producantur.

Medulla vero spinalis proprie dicta, sive altera pars illi tamen continua [t. 16. fig. 1.] extra cranium consistit: nam ubi ad magnum occipitii foramen medulla cerebri oblongata pervenit [tab. 11. fig. 7. H.] egreditur & per vertebrae spinæ foramina, usque ad extremum ossis sacri defertur. Per ossa, inquam, ne cum mollis sit & alterius cerebri instar (ut Galenusⁱ loquitur) ab incidentibusⁱ violetur, sed ipsi via^k sit & firmum præsidium: ideo Græci hanc spinæ partem perforatam, *ιεράν σπινάν*, sacram fistulam appellarunt: sacram, qui principem partem continet; fistulam, quia est veluti fistulas, per quam huiusmodi substantia ducitur, à qua ceteri nervi omnes propa-

gantur. Membranis^l tribus, m quas *ἐλντρεα* Hippocratesⁿ vocavit, investitur: quarum prima ex Galeni decreto oritur^o à ligamento valido exacte anteriores vertebrae partes

urina prodit : moritur autem postea non multo tempore interposito. Historiam brevem subjiciamus : virgo quædam apud nos annorum septendecim, fortuito sclopeto ad latus spinæ circa primam lumborum vertebra[m] tacta, statim partium inferiorum & motus & sensus periiit, ita ut cum chirurgus motu proprio fomentis & semicupis calidissimis conaretur sensum & motum reducere, pene gangrenam induxit : & vocatus, re cognita, frustra hæc tentari monuimus, & spasmus securum prædiximus : quare 14. à decubitu die spasmus correpta, expiravit : post mortem locus affectus inspectus, globulus in vertebrae corpore subsistens & compressus (parvus enim erat) repertus fuit. Propria ut ^f (ajunt) cum cerebrum & pulset & moveatur, etsi osse immobili contineatur, ipsa vero medulla, licet à vertebribus mobilibus contineatur, tamen non movetur. At si motus ille vi ingenta cerebri substantiæ inest, & medulla spinæ eandem naturam & substantiam sit adepta quæ cerebrum, rationi consonum, ut etiam medulla motu assiduo, quo cerebrum moveatur, quanquam sensui non sit conspicuum, Piccolhominus [†] medullam iisdem quibus cerebrum motibus cieri censuit, nimirum diastole & systole, cum ipsius cerebri apophysis sive continuatio sit, partis enim & totius motum eundem esse & parte continui motu moveri & totum : cum igitur dilatatur, spiritum animale[m] à quarto ventriculo excipere : quando vero constringitur, illum in nervos à se prodeuntes effundere.

[†] Fallitur Piccolh. nam spinalis medulla non est apophysis sed epiphysis sive ipsius cerebri additamentum in ossa vertebrata spina prolongata, Riol. & Gal. & Vesal. in hoc decipiuntur, existimantes spinalis medulla substantiam nervi gignendis absumi, Col. non sensim gracilescit, Fallop. in obs. Plat. u Hæc cavitas quarto ventriculo subiecta est, ac continua est, inquam à quarto ventriculo spiritus infuset animalis, ab hoc fit distributio spiritus animalis, in quinque fere organa sensuum, Piccolh. x Vide 9. ad an. 5. ex altera parte calami scriptorii caput bubulum spectatur, cui nomen imposuit Posthius in notis ad Columb. y Cocta in duas partes citra dilacerationem dividi potest, & cum in media aliquod spatium appareat, multi illi cavitationem assignare voluerunt, cum inferius nullam cavitationem obtineat, Plat. ex cavatam dicimus, quæ cavitas, cum satis insignis sit, non pauci decepti eam bifidam esse credidere, Piccolh.

Figura oblonga est, crassa & ad exortum amplior [t. 15. f. 1. à D. ad E. t. 16. f. 2. ab A. ad B.] quæ collecta, etiam si paulo fiat angustior, non tamen, ut creditur, sensum ac sensum usque ad extremum ossis sacri semper attenuatur : imo ad lumborum usque vertebra[m] [t. 16. f. 1. B. C.] æqualem fere crassitiem ^t servet. Nam in illis partibus, à quibus magni nervi prodeunt, crassior ac plenior est, ut in cervice, unde magnorum illorum nervorum, qui per brachia feruntur [t. 16. f. 1. ad I. & K.] & lumborum maximis nervi, qui ad crura descendunt [t. 16. f. 1. ad B. C.] plenior & crassior medulla reperitur : ipsius tamen substantia medullaris paulatim imminuitur, ubi ad os sacrum accedit.

Cavitas ^u seu sinus mox ab exortu, huic medullæ in ipso adhuc cranio existenti, insculptus, qui calamo scriptorio similis, hinc calamus scriptorius dicitur, [t. 10. f. 10. K. L. N. O.] siquidem in cuspidem exacuatur, & calamus scriptorius, prout in Alexandria adoptantur, refert, ^x & minor sensim reddatur, propterea quod, inquit, nulla excrementa amplius hic redundant : Hic quarti ventriculi cerebri mediam partem constituit, alterius enim pars à cerebello efformatur [t. 13. f. 21. H.] quo loci cerebellum huic medullæ committitur [tab. 13. f. 21. G. G. committitur ipsi B. C. in tab. 10. fig. 10.]

Et quamvis unica sit ^y & nullam cavitationem manifestam habere videatur, media tamen sede ipsa medulla à tenui meninge in duas partes usque ad lumborum vertebra[m] dividitur, ita ut utrinque cavitas aliqua appareat, quod sane non solum in leviter cocta bovis medulla demonstrari potest, sed etiam paralyfis, ubi modo unum, modo alterum latus solum occupat, declarat : & ex his nervi prodeunt.

Verum

organa sensuum, Piccolh. x Vide 9. ad an. 5. ex altera parte calami scriptorii caput bubulum spectatur, cui nomen imposuit Posthius in notis ad Columb. y Cocta in duas partes citra dilacerationem dividi potest, & cum in media aliquod spatium appareat, multi illi cavitationem assignare voluerunt, cum inferius nullam cavitationem obtineat, Plat. ex cavatam dicimus, quæ cavitas, cum satis insignis sit, non pauci decepti eam bifidam esse credidere, Piccolh.

Verum ipsa medulla in hominibus ² simplex ac indivisa deorsum per totam cervicem & thoracem usque ad lumbos ^a & infra [t. 16. f. 1. ab A. ad C.] fertur, & nervos geniculatim à se diffundit; dein non simplex amplius, sed in multos funiculos & filamenta instar caudæ equinæ divisa, recta deorsum ad ossis sacri finem (quemadmodum enim cum spina cœpit, ^b ita cum ea finit) descendit, aliquando simplex, ^c aliquid quando divisa, in tres breves sarculos diffunditur. Debit enim medulla ea parte, qua maxime spina antrosum & retrorsum flectitur & curvatur in funiculos absumi, ne à vertebriis prematur, & utruptionis periculum evitet. Hinc quoque patet, cur læsio in inferiore parte spinalis medullæ sit major, quia hoc loco nervea magis sit, cum aliis partibus medullæ sit similior.

Jam vero licet ab hac spinali medulla prodeuntes nervi pene infiniti sint, tamen pro ratione foraminum vertebrarum, per quæ egrediuntur, tot conjugationes esse, quot sint vertebrarum, foramina Anatomici voverunt. Prodeunt autem spinalis medullæ nervi ab ipsa medulla ex pluribus filamentis, [ut fig. 1. tab. 16. ostendit] quæ à tenui meninge comprehensa, unum nervum constituunt, & quo crassior est, eo in plura filamenta diffinditur, quod membrana divulsa apparet: filamenta hæc eo altius oriuntur, quo magis spinæ medulla descendit. At quo nervi securiores essent, ipsi per vertebrarum foramina egressuri, substantiam sive nodum crasso ganglio similem circumjecit, quo fibræ ex quibus nervus componitur firmiternectantur, ne à se invicem divellantur: qui tamen post egressum facile separantur. Et quo nervus licet tenui meninge vestitus rupturæ minus obijciatur per foramen non oppositum, sed per inferius transire voluit (ut Hipp. ^{*} innuit) quod ubi præterlapsus est & quidem in thorace, proximam costam non adit, sed ad inferiorem descendit, quo cum pervenit in duos ramos scinditur, quorum major antrosum fertur, minor vero spinam versus retorquetur, præterea utrinque eadem serie egrediuntur. Nam omnis nervus pluribus quasi funiculis ^a seu fibris ex medullari substantia exortis, sensimque descenditibus, beneficio membranarum ad foramina vertebrarum junguntur, & nodum efficientes vertebram egrediuntur, ita ut unus nervus ex una propagine constitutus videatur [t. 16. f. 1. ad LL. hoc ostendit] quod non solum cum iis nervis, qui integra medulla prodeunt, sed etiam qui ^c infra divisionem ad partes inferiores mirantur [t. 16. f. MM.] usu venit,

T t

Ulus
vorum propage
prona fertur.

^a Nervi omnes, quod à nullo ante nos observatum fuit, ab ipso cerebri principio vel in ipsa spinali medulla divisi sunt: quare non tam à spinali medulla, quam à capitibus nervorum paralytis causa proveniet: ideo Galen. passim paralytici accidere ait, quando nervorum capita vel obstructa vel resoluta sunt, Rondel. cap. de paralyti. Nervorum spinalis medulla exortum & propagationem ignorarunt Anat. mici omnes volentes à cervicali medulla cervicales tantum nervos, à dorsali dorsales, à lumbari lumbares tantum enasci, sed quam misere hallucinantur, observatio nostra nova & hæcenus inaudita convincit: si medullam à suis vertebriis integram detraxeris, & eam utraque tunica spoliaveris mox in aquam coniectam aliquantulum agitareris videbis à suprema ad imam partem, totam medullam innumeris surculis ac filamentis, caudæ equinæ instar miro artificio textam, & extremos ossis sacri nervos ab eodem principio à quo cervicis nervi omnes scaturiunt, propagari. Nova hæc & admiratione digna observatio obscuriss. problematis naturam patefaciet, cur læsa cervicis medulla pereat interdum femoris motus illa so brachiorum & thoracis motus. Laur. lib. 4. cap. 12. edition. prima. Quanto magis spinalis medulla descendit, tanto altius fibræ illæ nervorum ortus sui principia ducunt, ut & dorsales & lumbares quidam nervi, si attentius inspexeris à cervicali medulla oriantur, Laur. lib. 4. & lib. 10. & A lumborum principio ad ossis sacri extremum, & plures & crassiores sunt surculi, Laur.

f. 12. u. f. part.

Ufus spinalis medullæ proprie dictæ est, ut ab ea velut altero cerebro (ait Galenus) nervi tanquam rivuli geniculatim prodeant, qui animalem facultatem, sensum & motum, spiritumque animale, quæ continuatione à cerebro suscipit (unde quibusdam cerebri appendix & vicaria dicitur, quamvis cerebri maior sit dignitas) & ad partes capiti subjectas deferunt; excipe eas, ad quas à sexto pari [t. 15. f. 1. & 2. e.] cerebri medullæ propagines mittuntur, & per medium infimumque ventrem disseminantur. Nam cum à cerebri medulla in cranio (vel ut Galenus à cerebro) ad singulas partes ob viæ intervallum diduci non fuerit tutum, & partes capiti subjectas motu voluntario destitui & tristantium sensu privari, non erat consultum: homo enim motu carens, statua potius, quam animali similis foret: & hæcenus de usu spinalis medullæ proprie sumptæ. Si vero latiore sumas significato, tum usus ipsius erit, ut ab ea, quatenus in cranio inclusa est, utrinque nervorum conjugationes septem (ex communi sententia) imo octo, quæ cerebri vulgo dicuntur [t. 13. f. 2. o. B. G. H. I. K. M. N. O.] una cum olfactus organo [t. 12. f. 19. D. E.] initium ducant, quatenus vero extra cranium in spina consistit, cæteri nervi omnes, quorum paria triginta numerantur [t. 16. f. 1.] producantur.

De Nervis in genere.

CAPUT XIX.

Vide Galenum 16. de usu partium, & libro de Dissectione nervorum, & 7. de Placitis.

Cum Nervorum naturam & varias de eorum materia, ortu & differentiis quaestiones, libro nostro secundo, qui de similaribus agit, sufficienter & dilucide pertractaverimus, nunc solum ea, quæ ad præsens institutum necessaria proponemus: quod si Lector plura requirat, locum prædictum consulat.

a Gal. 1. de mot. musc. 1. 1. pro. æm. lib. de ossib. triplicia facit nervorum genera, quorum alii ex ossibus alii ex musc. alii ex cerebro & spinali medulla derivantur: quomodo autem differant, ostendit 1. plac. 9. &

Et si Nervus^a dicatur & de Ligamento, quod σύνδεσμος Græci, qua voce plerique post Hippocratem usi sunt, eo quod ligamentum^c similiter ac nervus corpus sit album, ex lingue & cavitatis manifestæ expers; & de Tendine, parte in quam musculus definit (τένον Galeno) ob similitudinem, cum nervosa^e sint corpora, tamen hic solum de Nervo proprie dicto agemus, quem Hippocrates & Galenus νεῦρον, ὁποῦ τῶ νεύειν, à nutando seu flectendo, & τένον, ὁποῦ τῶ τεύειν, id est, tendendo ab ipsis operationibus vocarunt; siquidem Musculi nervorum potissimum ope, & nutare seu flectere, & tendere partem aliquam valeant.

Est autem Nervus, quatenus consideratur ut pars organica, instrumentum corporis commune, chordam referens, albam rotundam, simulque oblongam, nulla cavitate, quæ sensu cognosci possit (nisi forte optici) sed porositate donatam; in quibusdam.

15. u. f. part. 1. nervorum corporum tria genera, nervi, ligamenta, tendines. b Gal. 1. plac. 9. ex procem. de ossib.

c Gal. 1. u. f. part. 17. d Gal. procem. de ossib. e Gal. 3. facult. alim. 4. & 1. u. f. part. 17. f 1. de mot. musc. 1. g Putat Erotianus totius dici apud Hipp. de venis, arteriis & nervis. h Controvertitur hæc de re, aliis omnibus, ut Piccolh. aliis nullis, aliis tantum optici, meatum tribuentibus. Optici tribuit Galen. 7. plac. 4. & 5. de dissect. nerv. 2. Vesal. Col. Eustach. & Volcherus opticos, quemadmodum & reliquos perforatos negant, contra Corn. Gemma lib. 2. Arius Cylonomit. cum Galeno statuit, reliquos Galenus porosos statuit, causam tradens 7. plac. 4. sic com. 1. in 6. epid. nervos cavirati.

vitatibus destitutos esse scribit, imitatus Hipp. lib. de locis in homine, qui dicit de oculis, sine ventre: sed qui vult consulat cap. 30. libr. nostri de partibus similaribus. i. An nervi sint excavati, an eorum substantia sit porosa, membranis tenuissimis simul ac densissimis conveſcita nihil interest, nam porositates canalium vicem gerunt, cum per eos ita constitutos spiritus animalis in partes omnes influat, Piccol.

dam unitum, in crassioribus vero nervis ex multis funiculis conflatum, quod velut canalis sensum & motum animali spiritu vectore à cerebro eiusque medulla ad partes sensus motusque capaces, defert.

Substantia^k donatur alba, medullari, medullæ cerebri à qua initium ducunt, simili (cum dorſi^l medulla & nervorum, eadem sit cum cerebri substantia medullari) sed compactiore & magis densata (cerebrum enim mollius esse conveniebat, cum sensilium species omnes recipere debuerit) ita, ut quanto longius à cerebro recesserint, tanto duriores reddantur, quo iniuriis magis resistant.

Investiuntur membrana duplici à cerebri meningibus producta, quarum exterior crassior à crassa meninge producit, cujus est nervi medullam tueri, & si ex pluribus funiculis constet, eos simul conjungere, quæ ubi nervos crassiores obvoluit, venulas à vicinis venis accipit. Interior vero^m, tenuior medullæ proxima à tenui meninge, sensuqueⁿ tactus prædita; non secus enim acⁿ cerebrum his integebatur, ita & nervi his obvolvuntur, & involuti per corpus feruntur. Verum triplex hæc nervorum substantia; ratione^o potius quam sensu distinguitur, neque alicujus nervi, opticis exceptis, durius molliusque indumentum per anatomen indicari potest.

Iam vero per substantiam, quæ in centro est, tanquam præcipuam nervi partem, actio perficitur, cum per ipsius^p medullamⁿ non per tunicas facultas sensifica & motrix à cerebro ad partes deferatur; hinc Galenus, si nervi medullam præscindas, statim pars, in quam nervus inseritur, motu sensuque privatur; membranæ vero idem officium nervis exhibent, quod & cerebro. Nervi enim proprie non sunt instrumenta sentiendi & movendi (motus enim organum immediatum musculus est) sed sunt instar canalium, per quos tota anima sentiens ejusque facultates & movendi & sentiendi (quare à Medicis sensus motusque organa dicuntur) animali spiritu vectore à cerebro^q ad partes corporis deducantur vel ad sensum^r vel ad motum aliquem prout indigerint; & quidem vel solum sensum^r, vel solum motum, vel utrumque membris, quibus inseritur, communicando, cum nulla pars sensum seu motum voluntarium sine nervo habeat. Nervo. n. compresso, vel intercepto, vel præciso^r, vel penitus corrupto, ejus partis, cujus nervus est, sensus motusque subito perit. Quare nulla pars, monente Aristotele^u quoque, stupore, paralyſi, & convulsione tentatur, quæ nervo careat, stupor sensus est diminutio, paralyſis, sensus motusque privatio; convulso, involuntarius motus.

Non tamen alios sentientes, * alios motorios nervos statuere debemus, eo quod Galenus^y motus voluntarii causa genitos, duos; contra qui sensus gratia, molles dixerit; & molles ad sensum, duos ad motum voluntarium conferre pronunciavit: z

T t 2

imo distinguit per arterias ferri

asserit. Rondeletius, per vasa tunicularum implicata ferri spiritum sensus motusque auctorem statuit, at medulla usum, ut comenti instar exilia vasa fulciat. q Spiritum animale cum propria substantia à cerebro plerisque corporibus partibus ad sensum & motum conferunt, Plat. i Gal. dissect. nerv. i. 7. plac. 3. 7. us. part. 14. 16. ejusd. 3. f. 1. plac. 9. t 7. plac. 8. de diss. nerv. i. at in quas partes nervi non ferantur, vide 16. us. part. 2. u 3. hist. an. x Sic & Piccolhom. & Laur. y 16. us. part. 3. & 5. vide cap. 36. lib. 2. nostri de partib. similaribus. z 7. ad. an. 8. & 16. us. part. 3.

k Nervi triplex substantia medulla & intima arborum medulla similis, externa duplex prima à tenui, altera à crassa meninge, Gal. 7. plac. 3. idem & Vesal. vide cap. 34. libri nostri de similaribus.

l Gal. de form.

fact. 5.

m Tenuis meningis partibus quibus nervus inseritur, sensum communiceat, ex Fernellii sententia.

n Gal. 7. plac. 3. o Sic & Fallop. in obs.

p Aliqui voluerunt animalem spiritum per arteriolas nervorum adherentes ferri, ut Praxagoras, Argenterius, qui animalem

à vitali non

distinguit per arterias ferri

21 plac. 9. &
3. us. pars. 14.

imo molliorēs^a ad sensum tantummodo idoneos esse, ineptos^a vero ad motum, scriptum reliquerit. Nam licet mollities & durities, primo ratione substantiæ à qua prodeunt, obveniat, vnde molliores primi, qui à cerebro orti dicuntur; duriores, qui à spinali medulla; durissimi, qui à medulla in vertebrae lumborum & ossis sacri exsistunt, oriuntur. Dein ratione productionis, cum ii, qui brevissima via ducuntur, ut qui in cranio sunt, molles sint; qui vero longius ducuntur, ut fere omnes qui ad musculos feruntur, duriores redduntur, quam ad exortum fuerint; quemadmodum & ii, qui anfractuose ducuntur, ut tertii paris cerebri ramus; sic etiam qui per durum corpus transeunt, ut quinti paris nervorum surculus, qui temporis ossis foramen cæcum antiquis dictum, perrepat, à contactu ossis durior redditur, quam ipsius principium fuerit. Quod vero alii molliores, alii duriores sint, inquit Galenus, à Natura ob eam causam factum, quod instrumentum sensus nervo molli indigeat; nervo quidem, ut is tanquam canalis animale spiritum sensificum deferat: molli vero, quoniam ab extrinsecus occurrente sensibili affici, & aliquid pati debeat. At cum ad patiendum molle aptius sit, ad agendum vero durum, ideo ad sensus instrumenta mollis; ad partes vero, quæ moveri voluntarie debere, duriores nervos communicari necessum fuisse (hinc apparet nervos præter usum, actionem quoque animale habere, cum afficiantur ab obiecto, ideo molles ad sensum, duri ad motum aptiores sunt.) Probat ex eo, quod ad ea instrumenta sensus, quæ non solum sentiunt, sed etiam moventur, duplex nervorum genus mittatur, alterum ad sensum, alterum ad motum; quod videmus in oculo, ad quem primum par pro sensu, secundum par pro motu amandatur, & in lingua, quæ tertiam & quartam (ut communiter Anatomici distinguunt) conjugationem gustus gratia, septimam vero ad ipsius motum accepit: ut ut se res habeat, censemus, Nervos ex natura sua ad utrumque indifferenter se habere ita, ut vel sentientes, vel motores dicantur ab instrumentis & partibus ad quæ feruntur, & in quæ disseminantur. Si enim instrumentis motus, ipsis scilicet Musculis inferantur, dicuntur Motorii; si in instrumenta sensus, vocantur sensorii. Imo videmus, unum & eundem nervum & motum & sensum deferre, pro ratione diversorum instrumentorum: exemplo sit, sextum par nervorum cerebri dictum, hoc viscerum membranarum, quæ in medio & infimo ventre habentur, sensum tactus largitur: ab hoc tamen utrinque reflexo, nervus recurrens constituitur, qui in singulos laryngis musculos ad motum surculos distribuit. Quod si iidem occurrerent instrumenta videndi, audiendi, gustandi, iidem sentientes & motores, fierent quoque visorii, auditorii, gustatorii nervi. Sic videmus eos, qui ad musculos mittuntur, motus voluntarii gratia, nihilominus tamen simul quoque sensum tactus tribuere musculorum membranarum, in quas fibræ suis desinunt. Et sic cerebrum nervorum interventu in qualibet corporis parte reperitur, dum facultatem animale^e soli cerebro innatam, in nervos influere permittit.

^b Ratio quia
omnes tenuis
ninge in vest
antur, Plat.
et mot. musc. 1.
d Hipp. de nat.
ossium nervi
corpori flexio
nem contractio
nem distensio
nemque præ
stant.
e 5. us. pars. 9.
et ex eo Vesal.
lib. 4. c. 1.

Vsus^d ex dictis etsi facile colligatur, lubet tamen hoc aspergere, triplicem Galenum^e fecisse: primum, ut ad sensoria instrumenta sensum deferant, ut oculis, linguæ, auribus; & præter ea partibus manuum internis, atque adeo ipsius ventriculi orificio superiori, cum hæc etiam quodammodo sensoria sint: siquidem per manus ex tactu dignotio est certissima: sic orificium ventriculi, sensum habet alimenti deficientis, quæ famæ dicitur.

Alterum, ^e ut motorii partibus motum largiatur: sic ad musculos motus voluntarii in-

rii instrumenta, nervi feruntur; qui quatenus ad membra corporis movenda constituti sunt, maximos nervos recipiunt; quatenus vero, ait Galenus, e nervis omnibus sensus necessario inest, facultatem discernendorum tangibilibus causa adepti sunt: nam per nervos etiam sentiunt.

f 7. r. f. part. 14.

Tertium, e omnibus aliis partibus dati sunt, ut quæ sibi dolorem adferunt, dignoscere (hic tamen usus ad priorem referendus videtur) adeo enim, ut loquitur Hippocr. Natura (imo Deus ter Opt. terque Max.) sagax, iusta, artificiosa, animaliumque provida est, ut omnibus quidem partibus nervos, non autem eadem mensura, sed aliis quidem liberalius, aliis vero parcius distribuatur. Siquidem quæ instrumenta eiusdem inter se sunt generis, ut sensoria cum sensoriis, & musculi cum muscularibus; horum quidem pro corporum mole, actionum dignitate, motuum intentione ac remissione: tum autem usus assiduitate ac intermissione (æstimata ad unguem cuiusque dignitate) alteri parti maiorem, alteri vero minorem nervum impertivit: unicuique vero tantum tribuit, quantum tribui erat æquissimum.

Magnitudine enim impares sunt, crassissimi, qui ad loca remota & in plures partes distribuuntur, ut sunt, qui ad artus mittuntur; qui cum spirituum majorum copia egerint, pluribus principiis ex spinali medulla (quæ in cervicis & lumborum vertebra constitit) prodeuntibus donantur, quo ex medulla hac veluti multis radicibus spiritum accipiant: quæ tamen simul collecta, unum nervum, eumque crassum constituunt; & rursus, verum sensum, in minores ramos distribuuntur. Mediocres vero sunt, qui ad sensoria in capite posita mittuntur: nam cum cerebro vicini & etiam admodum molles sint, nimis parvi esse nequiverunt. Graciles sunt, qui in proximas partes, ut faciei musculos, distribuuntur. Nunc de origine Nervorum paucis agamus.

Nervorum origo ex corde non est, ut Aristoteles voluit, s cum inter dissecan- g 3. hist. an. 5. &
dum nullus nervus ab eo productus occurrat, & admodum exiles^b sint, qui à sexto 3. part. an. 4.
pari cerebri ad cor feruntur. Nec ex crassaⁱ cerebri meninge, quemadmodum ipso^h Unus impen-
rum substantia jam explicata declarat. Sed ut Hippocrates, Erasistratus, Herophi- se gracilis à si-
lus, Galenus & plerique Anatomici voluerunt, à cerebro, à quo etiam spinalis me- nistro sexipa-
dulla originem ducit. A cerebro, inquam, quod non solum sensus, dum sectio cere- rus nervo, vix
bri proponitur, declarat, dum nervorum rivulos plures in cerebro videmus, in cor- summo studio &
de unum, & eosdem cum cerebro magis, quam cum corde continuatos esse: sed me inventus,
ipsum quoque similis cerebri & nervorum substantia medullosa, quæ duabus mem- Vesal. lib. 4. c. 1.
bris donatur, comprobatur, imo & affectus capitis, sensum omnem & motum à ce- i Hac fuit Era-
rebro manare edocent, ut in apoplexia, quæ obstructis cerebri meatibus causatur, a- strati opinio
nimalis facultas statim, illaeso tamen corde, intercipitur, quod corde vulnerato non in juveniura.
accidit: sic in epilepsia, ob cerebri medullam, unde nervi prodeunt, affectam totum
corpus convellitur; cum cor de laeso, corpus non convellatur.

k Gal de form.
fæt. 4. 7. plac. 3.

At principium^k duplex esse diximus, aliud γενέσεως generationis, aliud διοικήσεως dispensationis. Ratione generationis, ipsorum principium semen est, ex quo tanquam materia immediate fiunt; qualis vero pars seminis requiratur, fusc ex placitis veterum cap. 32. libri nostri secundi, qui de similaribus inscribitur, docuimus. Ratione vero dispensationis, est ipsum Cerebrum, l ex vulgo loquuntur (imo & cerebel- l Chrysippus li-
Tt 3 lum) cet cerebrum
nervorum

principium esse concederet, non tamen id sensus motusque voluntarii principium statuit.

lum) quod principium est à quo, cum ab eo tanquam canales sensum & motum suscipientes in corpus distribuunt, prout hæc pars sensu tantum, illa motu voluntario, altera utroque eguit.

Hoc rursus duplices constituunt, alios, qui à cerebro, alios, qui à spinali medulla ab utrisque tanquam principio *ἡνέκωτος* radicationis prodeunt. Et hos rursus vel à spinali medullæ principio, hoc est, quatenus adhuc in cranio continetur; vel à spinali medulla, quæ in vertebriis dorso existit: horum rursus alios cervicis, alios thoracis, alios lumborum * alios deniq; ossis sacri faciunt: quib. & artuum nervos adiungunt: ex his dextri dextrorsum, sinistri sinistrorsum, & neutiquam se * interfecantes, feriuntur, quæ tamen nervorum constitutione in sexta nervorum conjugatione observari Galenus voluit.

Nobis vero Nervi omnes à medulla cerebri oblongata prodeunt: alii quidem dum hæc medulla cranio adhuc inclusa est, & horum communiter septem ex Marini & Gale-

latere, & vicissim sinister à dextro oriatur, in exoritur in modum chyasuse interfecantes.

† 9. us. part. ex illa nervorum decussatione fieri putant, ut dextra parte percussa capitis sinistra convellatur: & vicissim parte sinistra læsa, dextra convulsionem patiatur. Oppositam partem convelli Hipp. libr. de vuln. cap. primus docuit: si os fuerit purulentum, pustula in lingua assurgunt, percussus cum delirio moritur & convulsio plerisque in altera parte corporis corripit: siquidem capitis dextra parte sauciata, corporis sinistram partem convulsio occupat & contra. Hoc ipsum historiis comprobatur: Epid. & 7. ex quibus historiis colligitur convulsionem subsequi, cum ingens inflammatio est, vel dum suppuratio sit aut facta est: dein non omnes læsi sed plerisque convulsione corripit: si lubet vide Francisc. Dalechampium in sua Chirurg. & Paracum, Laurent. in suis anat. & Horstium de natur. hum. qua de re aliquando plenius.

n De origine Nervorum opiniones variae sunt. I. Hipp. de ossium natu. in principio, nervorum exortus ab occipitio est, usque ad spinam, coxendicem, pubem, femora, brachia, humeros, pedes, tibias.

II. Arist. à corde 3. hist. an. 5. lib. de somn. & vigil. lib. de Respiratione, quia in corde sit nervorum copia, & quia hinc motus oriuntur, qui intendendo retinendoque efficiuntur, itaq; ministerio tali & robore opus esse; part. an. 4. cuius sententia etiam sunt Alexander libr. de Anima: Aricen. 3. de animal. & omnes Peripatetici: A. de reb. 2. coll. cor. nervorum principium mediante cerebro. Aponensi à corde tanquam radice & formali principio oriuntur, sed cum medio à cerebro. Aliquæ sic Aristotelem interpretantur, plures quidem in cerebro apparere, sed eorum omnium fontem cor esse, ex cuius basi nervulus exilis ascendat, ad cerebrum, qui ibi multipliciter, ut cerebri maxima sit fecunditas, ut se præpari pandat, ita ut nervorum radix in corde sit, propagatio in cerebro. Contra hoc disputat Galenus 1. de plac. 8. & 10.

III. Praxagora, nervos nihil aliud esse, quam arterias exiliores factas: eos enim arteriis continuos esse, quem Galenus 1. plac. 7. refutat. Casalp. lib. 2. Quæst. medic. quæst. 10. inquit, arteriolas multas veluti fibras in egressu ex cerebro, vel spinali medulla in unum velut funiculum coeuntes nervum constituere, imo arterias dextri lateris, nervos sinistri lateris constituere & e converso.

IV. Casalp. lib. 1. quæst. Peripat. 1. quæst. 5. & Reusneri, nervos nihil aliud esse quam venas, quæ dum ad cerebrum pervenere, in nervi naturam degenerent.

V. Erasistratus ex dura cerebri meninge prodire, ut docet Galenus 7. plac. 3. quia duntaxat exteriorem nervi partem è dura meninge enatam conspexit, quam opinione in senectute Galeno 7. plac. 8. referente, mutavit.

VI. Galeni, qui à cerebro nervos & dorsalem medullam prodire statuit, de dissect. nerv. 1. & 7. plac. 8. quem secutus est Avicenna seu 1. primi. Idem Gal. voluit & à cerebro, & à dorsali medulla prodire, de dissect. nerv. 1. & 1. plac. 9. 1. mor. muse. 17. us. par. 2. & 3. ejusdem 14. imo lib. 8. cap. 3. Nervorum originem scribit esse à cerebri basi prope certum ventriculum, ex quibus dextri dextrorsum, sinistri sinistrorsum feruntur. Idem Gal. alios à cerebro, qui molliores & sentientes, alios à cerebello, qui duriores & motores ortum ducere refert. Voluit enim 8. us. part. 13. omnes nervos spinali medulla attributos, à cerebello nasci. (hanc sententiam Galeni secundum quid veram esse, aliorum vero simpliciter falsam asserit Varolius.

VII. Vesalii, alios nervos ex calvaria prodire, alios ex spina vertebriis, illos aut ab ipsa anterioris cerebri basi enasci aut à dorsali medulla principio, prius, quam vertebrarum sinus ingreditur, non autem à cerebello: hos vero ex medulla dorsali in vertebriis existente.

IX. Fallopio in obser. alii à cerebro vel medulla intra calvariam, quos nervos molles appellat, alii à spinali medulla.

IX. Columbo à cerebri basi prope tertium ventriculum, & nulli à cerebello, quidquid Galenus opinetur: addit, fieri cogor tertium, quartum, quintum, sextum, septimum & octavum par, non à cerebro, sed à spinali medulla exoriri. & Rioli omnes à posteriori cerebro & cerebello, ubi spiritus animalis officina.

X. Varolio, à spinali medulla, quæ à cerebro & cerebello ortum ducit, nervi omnes prodeunt: sic & Platterus ait, oriri à cerebri parte oblonga, quam dorsalem medullam vocitant, toto ductu à cerebri basi usque ad sacrum os: alios in capite sive intra calvariam, alios in dorso seu extra calvariam. Et Piccolhom. Nulli à cerebro, nulli à cerebello, sed omnes proxime à cerebri medulla, & alii ab ea cerebri medulla oblongata, quæ intra calvariam continetur: alii à medulla spina: quæ & Laurentii lib. 10. cap. 12. sententia est.

& Galeni sententia recensentur; nonnulli vero novem conjugationes faciunt, cerebrique nervi dicuntur, qui hoc disticho exprimuntur:

Optica prima, oculos movet altera, tertia gustat,

Quartaque quinta audit, vaga sexta est, septima lingua.

quibus & olfactus organa addere oportet. Alii vero postquam medulla magnum occipitii foramen elapsa, & per foramina vertebrarum spinæ defertur & proprie medulla spinalis nominatur, & sunt paria¹ aliis vigintiocto, aliis vigintrinovem, aliis triginta, nempe cervicis septem, thoracis seu dorso undecim, aliis duodecim: lumborum quinque, & ossis sacri sex, quibusdam quatuor: à quibus & artuum nervi oriuntur; in manum quidem ex quinta, sexta & septima colli, prima & secunda thoracis conjugatione, propagines modo quinque, modo sex feruntur: in pedem vero, ex tribus inferioribus lumborum, & quatuor, nonnunquam quinque superioribus ossis sacri nervi quatuor distribuuntur, & spinalis medullæ dicuntur. Prodeunt autem utrinque eadem serie, siquidem nullus nervus sine conjuge producat (quare Græcis συζυγία, Latinis nervorum paria seu conjugia dicuntur.) Et hi semper eadem serie alter à dextris, alter à sinistris, & eodem prorsus modo dextri & sinistri nervi suis sarculis distribuuntur, excepto solum sexto pari cerebri, cujus dexter nervus, non eo, quo sinister, modo, dissectatur; quemadmodum supra in historia Thoracis libro 2. cap. 19. ostendimus. Horum origo & distinctio medico cognita esse debet, ut sciat quibus spinæ paribus topica applicanda sint, quando vel motus, vel sensus, vel utrumque in hac vel illa parte læditur, ad imitationem non illius Medici, qui a gri digitis ob sensum ablatum medicamenta adhibuit, sed Galenum secuti, qui spinæ parti ei unde nervus ad manum exoritur, applicavit.

o Gal. de dissect. nerv. vor. 1.

Laur.

p Vesal. (ut &

Laur.) septem

paria: addit,

quod pro tertio

pari ab aliis re-

centur, ve-

rius duplex,

quam unicum:

dein juxta

quinti paria ra-

dicem aliud

par omnibus

incognitum.

At Col. novem

facit paria, se-

prem commu-

niter recensita,

quibus duo ad-

huc addit, ex

quibus alte-

rum Vesalium

olfecerit, alte-

rius nemo me-

mineri. Fallo-

pio octo paria.

De septem vete-

rum & octa-

um quod Vesalius pro minore propagine tertii paris enumeravit. Piccolhom. octo dicit, addens septem vulgo recensitis nervos odoratorios, quorum ceteri nullam fecerint mentionem (intelligit processuum mammillarium principia) Platero, utrinque septem, vel potius decem.

q Alii spinali medulla, (inquit Gal. præter septem paria) qui partibus sub capite murruntur 16. usque part. 2.

r In nervos octo & quinquaginta spinalis medulla divisa, 12. usque part. 15. triginta, 7. plac. 8. f. 9. usque part. 9. 1. dissect. nerv. 1. & seqq.

t 1. loc. aff. ubi ostendit sensum sine motu & contra tolli posse.

CAPUT XIX.

De Processibus mammillaribus egit Galenus lib. de Instrumentis odoratus; at de Nervis cerebri, lib. de dissectione nervorum à cap. 2. 11. 8. us. part. 6. & 11. 9. us. part. à cap. 8. ad 15. 16. us. part. 3.

Cum sensus externi quinque, Visus, Olfactus, Auditus, Gustus & Tactus recenscantur, qui ab ipso cerebro (seu potius ipsius medulla) per nervos tanquam canales, alii quidem sensificam solum facultatem, alii vero sensificam & motivam simul recipiant, cum ab eo tanquam principio dispensationis & radicationis orti dicantur, unde sensuum instrumentis animæ facultatem sentientem & moventem devehunt; de his sermo erit, à processibus olfactoriis initio facto.

Et si nasus olentium^a rerum sit semita, non tamen odorandi instrumentum est: nec ejus^b tunica interior, sed interius in cranio processus sunt olfactui subservientes, quos Anatomici vltima eorum parte duntaxat spectata, processus^c mammillares, alii olfactuendi organa^d vocant. Sunt autem duo, nervis quodammodo similes, sub cerebri basi siti, albi, nervis molliores ac latiores, oblongi, tenues: qui in hominibus quidem^e valde tenues ac parvi, in brutis vero, ut bobus, capris, ovibus, imo in canibus & animalibus olfactu exquisito præditis, multo majores sunt; unde homo in hoc sensu reliquis animalibus inferior est. Hic ex cerebri^f substantia medullari in basi ipsius [r. 15. fig. 1. & 2. F. tab. 12. fig. 19. D. E.] iuxta nervos opticos [tab. 15. fig. 1. & 2. G.] pronati inter cerebrum, cui tenuis membranæ beneficio connectuntur. os sphænoïdes & os frontis feruntur ad ossis spongiosi sinus [tab. 12. fig. 19. FF.] qui crassa meningē variis foraminibus donata succinguntur, & his processibus excipiendis creati sunt. Ad horum processuum quemlibet, è ventriculo foramen manifestum, Fallopio volente, pertingit & à quo foramine meatus ad os ethmoides seu spongiosum abit, qui in humano angustissimus est, ita ut non nisi in recentissimo cerebro conspici possit: in bovino vero magnus; per hos^h processus ac meatus aer & vapores per nares respiratione attracti, tanquam per canales ad cerebrum, feruntur, quo de odoribus iudicium ferat.

Hiner-

^a odoratorii, & primum nervorum par. aliquibus mammillares & papillares, Piccolhom. Processus mammillares odoratus organa non minus dicuntur, Laur. d. Gal. de instr. odor. 1. Vesal. Columb. Plat. Laur. at Piccolhom. dicis organa odorandi non esse, sed nervos & canales, organo odoratus deservientes. ^c Meminit quoque Vesal. & Fallop. f. ex cerebri substantia. Gal. cerebri basis medio, Vesal. ex cerebri substantia in anteriore cerebro, Columb. ab extremis ventriculis anterioribus Fall. observ. è cerebri substantia profunde admodum, ab anteriore dorsalis medulla initio è media se-
^d de, ubi ventriculi cerebri in angustum terminum desinunt, olfactus organa & prima conjugatio educuntur, licet profundius adhuc ipsorum initia à cerebri substantia adhuc separata, inchoare, Varolius primus observavit, Plat. ex posteriore medulla parte, cui quartus ventriculus assistit, Piccolhom. processus mammillares sunt propagines pedum posteriorum fornici, per magnas cerebri eminentias revolutorum usque ad basin cerebri, Riol.

^e Certo scio ab instrumentis olfactus nullum esse aditum ad ventriculos ipsos, & opinionem eorum, qui credunt aerem per nares attractum ingredi ventriculorum cavitates, esse potius probabilem, quam anatomicam, Varolius.

^h Ad cerebri ventriculos feruntur, Fallop. observ. Nervi odoratorii sunt canales per quos victore spiritu animali, hausto à quarto ventriculo tota anima sentiens in duas illas crassiusculas portiones vehitur, in quibus cum duotantum ostendat organa, scilicet odorandi, quod proprio caruit nomine & tangendi, quales sunt membrana; hanc ob causam duas solum in eis edit actiones, nimirum odorationem & tactationem, Piccolhom.

Hi nervis quidem dū su, colore, & usu respondent, & idcirco Nervi dici mere-
rentur, verum cum crassam meningem & calvaria cavitatem non^k excedant, nec
nervorum instar^k productiones habeant, idcirco nec Herophilus, nec Marinus, nec
Galenus, nec plerique recentiores Nervorum nomine donarunt. At Piccolhomius
horum processuum partes duas facit: eorum principium Nervos odoratorios vocans
a posteriore medulla cerebri parte, ubi quartus ventriculus excavatus est ortos, qui
anteriorius progressi inter cerebrum & os sphæroides excurrentes, in Processus mam-
millares intruduntur, ut per hos nervos ad processum illos odorandi facultas cum spi-
ritu animali è quarto ventriculo evehatur. Alteram vero horum processuum partem,
Processus mammillares vocat, qui oblongi sint, nervis holosericeæ magnitudine, in
anteriori cerebri parte siti, utrinque ad os ethmoides vergentes, & hos esse principale
odorandi instrumentum, asserit. Nunc de nervis oculorum.

[†] I. nonnulli
nervorum pri-
mum par re-
construunt,
Vesal. Nicolaus
Massa in sua
anat. nervos
esse probat:
quod iterum de
monstrat lib. 1.
epist. 6. ad ver-
sus Vesalium.
et docet ex

Gal. 15. us. par. nervos esse ad naves descendentes. k. 9. us. part. 9.

De Nervis oculorum, seu de prima & secunda coniugatione.

CAPUT XX.

De his vide Galenum de dissect. nervor. 2. 3. & 9. us. part. 8. & 13. 16. eiusd. 3. & 7. de placit. 4. & 4.
loc. aff. 2.

Nervorum cerebri coniugatio prima est Opticorum [tab. 15. fig. 1. & 2. G.] qui om-
nium cerebri (seu ex cerebri medulla prodeuntium) conjugationum, imo cete-
rorum omnium, qui ex variis filamentis non componuntur, maximi, crassissimi:
crassiores, quia ut habet Galenus^b meatus sensibiles habent, & omnibus aliis nervis
^c molliores sunt: hi sub cerebri^d basis^d medio, ubi medulla prolongari incipit, exori-
untur, & introrsum ac antrosum oblique deduci & paululum progressi, in media fe-
re via supra ossis sphæroidis sellam uniuntur [tab. 15. fig. 1. H. tab. 12. fig. 19. O.] non per
solam^e intersectionem, aut simplicem contactum, * sed per medullæ confusionem,
(ut minus in longiori via ob mollitiem fallantur) & sic corpus commune constitu-
unt, ita tamen ut alterum ab altero separari non possit. Mox rursus separari (ubi in-
V u fundi-
qui naribus
proximus est:

maximi vero æque distant, nec coire possunt: mediocres vero coeunt & cerebro proximiores sunt, quam magni, minimi
plurimum inter se distant & nunquam coeunt. b Gal. 16. us. part. 3. c Corporis nervorum facile mollissimi, Vesal.
crassi mollesque, Columb. omnium mollissimum & amplissimum, Laur. d Ab utraque parte anteriorum ventricu-
lorum: quorum finibus sunt conjuncti, de dissect. nervor. 2. à primis & maioribus eminentiis derivat: quas emin-
tias Galenus^e vocat, in gratiam nervorum opticorum constructos, quos admirabile Anatomicis incognitum 16. us.
part. 3. & 16. us. part. 3. ex cerebri basis medio, Vesal. & Fallop. ab anteriori cerebri parte exortus nonnihil distat, Col.
exortu profundo è cerebri substantia introrsum deduci, Plat. à suprema parte medullæ posterioris, ubi quartus ventricu-
lus excavatus est, Piccolhom. à posteriore cerebro, qua parte sacra medulla ortum ducit, e Dextro nervo sinistro
sum, sinistro dextrorsum protenso, Vesal. sed non in crucis morem, quemadmodum multi opinati sunt, qui quod in a-
vibus forte viderunt hos nervos in cruciari, in hominibus quoque reperiri existimarunt, Columb. intersecant se crucis
modo, quod & in ceteris nervis fieri probavimus; quamvis obtenuitatem non appareant, Casalp. l. 5. prax. c. 42. non per
medullæ confusionem, sed per simplicem contactum, Riol. * Arius huius connexionis divulsionem repentinam cecita-
tem inferre notavit: Vesalius vidit hos nervos naturaliter separatos sine ulla visus latione: & Casalp. notavit alte-
rum ex nervis visoris attenuatum alterum plenum: & oculi ad quem ille ferebatur, visio imbecillus erat: habuerit
autem circa eandem partem vulnus in capite.

f Gal. dissect.
nerv. 2.

g Non accurre
te in centrum
sed nervus dex
trum accedens,
ad dextrum
magis latus po
sterioris sedis
implantatur,
quemadmodum
sinister ad si
nistrum, Vesal.
oculi externo
lateri non cen
tro, Plat. in ocu
li centrum,
Laur.

h dissect. nerv.
2. in porcis sub
inde non conti
nuos, sed è mul
tis funiculis, ut
in cruribus con
flatos spectavit
Vesal.

i Et Vesal. paulo
plus quam me
dium oculi,
Plat.
k Sic & Co
lumb.

* 7. plac. 4.
l Cur coeant in
media via, opti
miores varia, i. ut unus aspectus fiat, ne una res aspectabilis dua videantur, quod Galenus voluit: negant Vesal. &

Piccol. hicque addit quod & auditorius & odoratorius & reliquorum sensuum nervi in medio itinere coire debuissent, ne res una audibilis, vel odorabilis dua existimerentur. 2. Uno oculo excacato, altero sano & in violato cernere posset anterior feratur spiritus visorius, ut aspectus fiat acutior: Verum in uno nervo tantum & plus spiritus, quantum in am
cernunt quidem rectius & per angustius foramen. 4. Ut cum per angustum foramen cernere cogimur, aut per eandem
lineam rectam, per quam ambo oculi cernere nequeunt: in tali casu ex ambobus unum fieri, quo fere tam acriter cer
nant, quam duo: sed nec hoc ex prima intentione Natura esse, reor. 5. Ut minus aut nihil, in medio via tractu passian
tur: qua opinio probabilissima, nam qua parte coeunt, maxime periclitantur, tum propter cavitatem insigniorem in
feriorem; talem autem cavitatem & molliem efflagitabat cernendi facultas. Hac Piccolhom.

m Ne res simplices gemina esse videantur, secundum Galenum, ait Vesal. qui hoc negat exemplis adductis. 1. A doles
centis, cui anno ante suspensionem, oculus dexter à carnifice erutus fuit. 2. Mulieris suspensa, cui etiam dexter oculus
à juvenitute emarcuerat, hinc dexter nervus sinistro tenuior in exortu & congressu durior & rubicundior; in illo qui
nec crassitie nec mollietie sinistro admodum cedebat. 3. Cuiusdam cui nervi visorii in congressu se non contingebant,
sed

fundibuli collum transit) [tab. 12. fig. 19. M. N. l. 15. f. 1. supra H.] utrinque extrorsum obli
que per foramen proprium ipsorum causa exsculptum, quod sphœnoidis primum est
[tab. 4. fig. 10. B.] extra calvariam, alter ad ^e dextri, alter ad sinistri oculi (quasi ejus fo
ret ^f radix) centrum & parte posteriore feruntur [tab. 22. fig. 8. a. aut simul cum membrana
fig. 2. a. b. c.] in brutis vero non in centrum, sed longe inferius, cum ad latera prospici
ant, implantantur: qui non ut ceteri omnes in fibras ^h dissolvuntur, sed quilibet in
tra oculum expanditur [tab. 22. fig. 8. e.] Constat autem substantia duplici, medullosa
& membranosa: interior enim pars mollis est; nam si nervum suis membranis involu
tum comprimam, cerebri substantiam mollem, quam continet, exprimi videbis: ex
qua in oculi orbita late expansa ἀμφιβληστροειδής, id est, retina tunica, à retis quadam
immagine dicta [tab. 22. fig. 8. e. tab. 15. fig. 1. & 2. l.] constituitur; quæ tamen revera nihil
minus, quam tunica est, cum à cerebri substantia nihil ^h differat; hæcque vitreum humo
rem sphæræ in modum circuit, mediamque oculi ⁱ sedem ambit, quo spiritus visivi
per oculi cavitatem diffundantur. Membranas duas habet à crassa & tenui meninge:
verum ab ortu usque ad foramen in oculi orbita situm, per quod transeunt tenui so
lum ^k meninge investuntur, ac inde ad oculum usque & tenui & crassa meninge ob
volvuntur; quarum crassa in corneam, tenuis in vucam oculi tunicam absumitur, &
sic per nervi hujus continuationem spiritus animalis ad pupillam, quæ vuæ foramen
est, momento fertur: quare oculo uno clauso, alterius pupillam subito dilatari con
spicitur ob spirituum affluxum, (quo exemplo Galenus ^{*} spiritum in corpore & qui
dem animale dari, ad sensum docuit) & id ad visus perfectionem; oculorum enim
altero clauso, rectius & certius videmus: facit enim hic ^l concursus proprie ad robur,
ne propter molliem longa via deducti flaccescant: dein etiam ut eandem planitiem
in pupilla observent, alias ^m ut Galenus censuit, simplex objectum duplex judicaretur,
quod sane concedi posset, si & reliquorum sensoriorum nervi in medio coirent, quod
tamen non fit; nam ne res una duplex aestimetur, nervi omnes coeunt, non in medio
viæ cursu, sed in cerebri medulla, unde omnes nervos prodire diximus, ubi quoque
omnium sensibilium objecta uniuntur; & tandem, ut commodè per foramen, calva
ria excidant, & ad oculos recta ferantur. Dicuntur autem hi nervi ὁπνὰ νεύρα, visio
rii,

se dexter sinistrorsum, sinister dextrorsum reflectebatur, quasi non coalescent occasione nervi congregarentur, sed ut commode per suum foramen à calvaria prociderent: hic tamen de visu nihil conquestus, nec de visus duplicatione.
Vesal.

rii seu visivi ab actione cum virtutem visivam seu videndi sensum oculo communi-
cent; nominantur quoque ab Herophilo *ἰσῆς ὀπτικοί*, meatus visorii, quia hos
solos inter reliquos corporis nervos, sensibilem meatum habere censuit; quod &
Galenus approbavit, qui utrinque manifeste perforatos esse pronuntiavit, & ple-
rosque dissectionis artifices foramen quod in inferiore parte est, ubi oculos attrin-
gunt, perspectum habuisse. Tria autem observanda sunt (Galenomnente) ei, qui
alterum foramen, quod circa principium eorum est conspiciere velit: primum, ut ma-
gnum habeatur animal: secundum, ut statim post mortem dissectetur: tertium, ut
aer circumfusus clarus ac lucidus sit. Hos autem præter meatus foramine opus habu-
isse tradit, quia his tantum nervis competat facultatem animalem per spiritus ani-
males, seu spiritalem substantiam per foramen internum deferre: reliquos vero poro-
sos esse, nec foramine opus habere, cum facultatem non per spiritus animales, sed so-
lum per radios deferant. Verum posteriores Anatomici fere omnes, foramen con-
spicuum habere negant, imo cum substantiam raram & mollem habeant, facile spiri-
tus ad oculos meate posse asserunt: etenim omnes nervi licet meatus visibiles nullos
habeant, spiritibus tamen pleni sunt: siquidem compressione, sive obstructione sen-
sus impediatur: sic si nervus vinculo interceptus sit, sensus aufertur, separatis enim
spiritibus superioris partis ab inferiori, nulla inter ipsos fit communicatio, at ablato
vinculo sensus redit. Sic si optici obstruantur, videndi actio perit, quod in Arabum
gutta serena accidere solet. Vtrum vero, perinde, ut in cerebro spiritus continetur,
quo evacuato totum animal stupidum redditur, & idcirco ad sensum & motum mem-
brorum utilis est, ita quoque in singulis nervis spiritum quandam esse, existimandum
sit; & utrum spiritus is innatus intusque maneat, & illo tanquam nuncio pulsatus
excitetur; an intus minime sit, sed illo tempore quo membrum aliquod movere vo-
lumus de cerebro denuo influat, dicimus cum Galeno ita absolute pronuntiare non
posse. Concludentes hos nervos non solum crassos raræque texturæ esse, & ab utraq;
cerebri meninge involui, & per ipsos spiritibus transitum patere, sed & porosos esse,
quod in elixis maxime patet, cum Galeno credimus, quia de re plenius egimus in par-
te secunda libri nostri, qui de partibus similibus inscribitur. Hos quoque motorii
principales censemus, cum in his visionis præcipua pars consistat: Et hos in cal-
varia utrinque rami arteriarum carotidum tangunt. Usus opticorum, ut per eos vel-
uti canales anima sentiens, spiritusque visivi ex cerebri medulla in oculos deferantur:
De diff. nerv. 2. 16. us. part. 3.
cavum intus, quo spiritum re-
cipiant: quare
sursum usque
ad cerebri ven-
triculum per-
tingunt.
Optici peni-
tus perfora-
ti, 7. plac. 5. in-
sensibilis
meatus, diff.
nerv. 2. utrin-
que manifeste
perforati, 7.
plac. 4.
p. 7. plac. 4. &
lib. de oculis.
Nunquam
mibi occurrit,
quamvis ca-
num adhuc vi-
ventium, &
aliorum gran-
dium anima-
lium hac sola
occasione secue-
rim, & homini
decollati vix
quarta hora par-
te post, ac calere
aqua sedulo fo-
verim, Vesal.
Non sunt mani-
festo canale per-
forati, Fallop.
in observ. nul-
lus in illis po-
rus manifesto

Vu 2

& quo

cernitur, nec in bove, aut quovis grandiore animali, Columb. conspicuam cavitatem nunquam observavimus, Laur.
Nervus opticus minime ex solido corpore, eoque perforato constat, sed ex multis nervosis fibris sibi mutuo membrana-
rum beneficio connatis, conflatur. Volcher. nervos opticos transversim dissectos, perforatos vidi, & ante coitionem fora-
men apparet, Riol. 1. 7. plac. 3. & 7. plac. 4. c. In coitione nervorum cavitates communisque transitus ex altero in al-
terum est insculpta, Piccolhom. Sed de usu opticorum Anatomici cum Galeno sentiunt: at Casalp. l. 5. c. 42. sua prax. sic
expressit: nervi visorii omnium crassissimi in grandioribus animalibus meatus pervii, non ad spiritus transmittendos,
ut putavit Galenus, sed ad humores ex medulla Cerebri pro nutrimento humorum in oculo existentium. u. 9. us.
part. 8.

& quo pereorum substantiam spiritus deventus subtilior evadat, & ne affatim ad oculos affluens cito dissipetur, in ipsa conjunctione solidiores existunt.

Secunda conjugatio^x est nervorum oculos mouentium [tab. 15. fig. 1. & 2. K. tab. 13. fig. 20. G.] quæ ab illa tantum^y osse tenuissimo distinguitur, & ex medullæ^z cerebri basi [t. 19. f. r. e.] principium ducit, gracilis & tenuis est, primæ conjugationi crassius, plurimum cedens, durior^y quoque cum musculis inferi debuerit: hæc sub cerebri basi ad oculi cavitatem antrosum fertur, & longius utrinque nervus excurrent, per proprium foramen [tab. 4. fig. 10. G.] quod sphænoïdis secundum est (& non ut optico- rum foramen rotundum, sed oblongum, cum tres nervi^a transire debuerint, hic nimirum & tertia conjugatio, sive tertii paris vulgo dicti ramus alter, & octava conjugatio, seu quinti paris radix minor^a in oculi^b cavitare, calvaria excidit: hic osse perforato & visorio attentus in ramos satis^c magnos secatur, qui ad musculos^d mittuntur: primus quidem visorium conscendens, in musculum qui palpebram & eum qui oculum attollit, diffeminatur: alter sub visorio valde conspicuus, pluribus furculis in muscu- lum, qui oculum ad anteriorem angulum adducit, dispergitur: tertius bifidus, pluri- mis fibellis in musculum, oculum recta deorsum trahentem inferitur: quartus in sex- tum musculum, qui oculum ad anteriorem angulum circumagat, ducitur. Sunt & fi- bræ tenues, & quæ visorium comitantes in oculi membranas externas diffeminantur. In quibusdam licet rarius, ramuli ad musculum^f temporalem mittuntur, unde saepe laeso temporali musculo, oculus quoque læditur, & vice versa. Horum usus ad muscu- los facultatem motricem, quemadmodum eorum membranas facultatem tactilem tribuere. Quod vero uno oculo in latus^g moto, alter illius motum necessario sequa- tur, hoc nervis ipsis, qui in suo exortu continui sunt, adscribendum est.

^x dissect. nerv. 3. 9. us part. 13. ^y dissect. nerv. 3. 7. Ex cerebri ba- sis lateribus paulo posterius, quam priores. Vesal. primo proximum, Col. prope ori- ginem primi, Fallop. a dorsa- lis medullæ par- te media ubi lata existit, pro- funde magis, quam prima, utrinque à la- teribus, Plat. proxime sub odoratoriis, Piccolth. à poste- riori cerebro, Laur.

^a 9. us part. 8. ^b Et per fissu- ram orbitæ, Columb. & Piccolth. ^c 9. us part. 13. quia molliores, ait, quam motorii conveniunt. ^d Ad septem oculi musculos, Vesal. & Plat. ad quinque musculos oculi & duos palpebræ, Columb. & Piccolth. ad quatuor tantum oculi musculos & eum qui palpebram attollit, Fallop. & Laur. ^e Fallop. & Laur. ^f Col. & Piccolth. ^g Laur. negant. ^g Varol. & Laur.

De tertia & quarta conjugatione Nervorum cerebri.

CAPUT XXI.

De his Galenus 9. us part. 8. 9. 13. dissect. nervor. 4. & 5. 3. loc. aff. 10. & 4. eiusd. 2.

Tertia conjugatio^a [tab. 15. fig. 1. & 2. L. tab. 13. fig. 20. H.] ad faciei musculos mittitur, quæ communiter tertii paris gracilior radix^b dicitur: at cum nusquam cum se- quenti conjugatione [tab. 13. fig. 20. L. tab. 15. fig. 1. & 2. L. cum M.] nec in principio, nec in progressu cōjugatur, imo nihil commune habeat, & cum extra ordinem aliarum om- nium enascatur, peculiaris conjugatio dici meretur. Hæc ex basis^c cerebri latere, ubi spinalis medulla à cerebro principium sumit [tab. 15. fig. 1. D.] oriri dicitur; sed rectius ex infima & posteriore sede medullæ cerebri, nervulo exiguo prodit, & recta sub ce- rebri^d vix minor & musculorum faciei anterior conjugatio, à veteribus non observata. Columbo, tertii paris ramus: Fallop. octavum par. ^c Ab infima & posteriore sede, vel basilorum cerebri processum, qui unius dicitur, Fallop. observa- retro magis versus lateralem partem, Columbo: à latere dorsalis initii emergit, Plat.

^a Gal. 9. us part. 8. ramo- rum tertia con- jugationis alter qui ad maxil- lam superiorem fertur. ^b Vesalio: at Plat. tertia con- jugationis ner- vix minor & musculorum faciei anterior conjugatio, à veteribus non observata. Columbo, tertii paris ramus: Fallop. octavum par. ^c Ab infima & posteriore sede, vel basilorum cerebri processum, qui unius dicitur, Fallop. observa- retro magis versus lateralem partem, Columbo: à latere dorsalis initii emergit, Plat.

rebrī basi ad latus antrois in defertur & crassam meningem solus utrinque perforat, & secundo parī [tab. 15. fig. 1. K.] attensus cum ipso per commune foramen [tab. 3. fig. 8. G.] oculi orbitam subit (si enim aliud foramen effectum fuisset, tum os inter foramina tenuius redditum lationi magis obnoxium foret) & in quatuor^d ramos secatur, quorum primus [tab. 15. fig. 2. N.] sursum per oculorum adipem fertur, & musculo quinto^e in angulo interiore locato, qui eum ad trochleam circumagat, ramulum largitur: mox per foramen peculiare ossis frontis [tab. 3. fig. 3. A.] elapsus ad cutim frontis, ut ei & palpebras superiori motum largiatur. Alter humilior^f [tab. 15. fig. 2. O.] deorsum latus, foramen proprium, quod in quarto maxillæ ossis exsculptum, transiens [tab. 3. fig. 8. B.] ad maxillæ superioris anteriorem partem in plures propagines scinditur & in musculos superius labrum, & nasi alam extrorsum moventes, in ipsum labrum & gingivas dentium incisoriorum digeritur. Tertius ramus [tab. 15. fig. 2. P.] per foramen maxillæ superioris secundum [t. 3. f. 8. C.] post carunculam in oculi angulo sitam, narium cavitatem adit, in ipsius tunicam absumitur [tab. 15. fig. 2. P. in series.] & ramulum, ipsius nasi musculo membraneo alam contrahenti, tribuit. Quartus ramus [tab. 15. fig. 2. Q.] per fissuram, quæ est inter maxillæ superioris os & os sphænoideum [t. 3. f. 8. D.] delatus, in musculi temporalis partem internam absumitur.

Quarta & conjugatio linguæ^h sensuicorum *νεύρον γευστικόν* seu gustatoriorum quia per hos gustandi sensus fit [tab. 15. fig. 1. & 2. M. tab. 13. fig. 20. I.] prædictæ quidem in progressu non vero in^k exortu adjacet & ab his, qui duplici^l radice (tertium par^m ab ipsis vocatum) ptincipium sumere statuunt, tertiæ conjugationi crassiorⁿ radix dicitur, quæ, ut Galenus censuit, non ex^o posterioribus cerebri partibus quia eæ duræ sunt: non ex lateribus, quia via tuta non fuisset, sed ex basi^o cerebri, ubi pars anterior cum posteriori connectitur (imo ex cerebri medulla) [t. 19. f. 1. num. 3.] tum propter securitatem, tum propter linguæ situm prodit, & recta deorsum per foramen sphænoidei ossis sextum [tab. 3. fig. 9. Q.] quod huic & sequenti conjugationi [tab. 15. fig. 2. Z.] commune est, fertur, & ab hac, ita imà transitu, propago vitis capreoli instar aliquoties contorta [tab. 15. fig. 2. R.] prodit, quo sic secundum aliquos, paulatim durior redditur; vel potius, quo spiritalis animæ non nihil subsistat, & cum 9 Auditorio nervo duobus ramulis [t. 15. f. 1. & 2. b. c.] unitur & musculis faciei, temporali, manforio buccarum & cuti faciei furculos porrigit. Propagine hac capreolari constituta, deorsum magis descendens, aliam propaginem de se mittit [t. 15. f. 2. S.] quæ antrosum gingivis

Vu 3.

den-

gingivas, dentes, labrum superius ac cutim faciei. g. De hac Gal. 9. us part. 8 & 13 diff. nerv. 4. & 5. h. 9. us part. 8. diff. nerv. 4. tertiam conjugationem faciens. i. diff. nerv. 5. k. diff. nerv. 4. l. Gal. diff. nerv. 4. hos molles vocat, & in radice quamplures & tenues videntur, qui conjuncti, ubi crassam meningem (9. us part. 9.) transierit, in duos (diff. nerv. 5.) primum scinduntur, mox utrinque in multas particulas dividitur. Vesalius reprehendit Galenum, quod diff. nerv. 4. tertium par secundo mollius tradat; deinetiam, quod 9. us part. 9. tertium par in duos truncos tum primum distribuatur, cum duram membranam perforavit, ac si utriusque unicum esset principium. m. Tertia conjugatio. Gal. Vesal. Columb. Fallop. Piccolthom. Plat. Laur. n. Vesalio; at Plat. dividit in ramum elationem, medium & infimum. o. 9. us part. 8. p. 9. us part. 9. Vesalio, à latere basis cerebri, antèius tamen & penitius, ubi d. r. salis medulla ab ipsa initium sumit; Columbo, ab anteriore cerebri basi retro magis quam secundum par, versus lateralem partem duplici principio: Fallop. obs. à mediâ fere ipsius cerebri basi: qui longe aliter ipsius & sequentis paris distributionem, quam ceteri proponit: Plat. à medio dorsalis longitudinis à lateribus: Piccolb. à posteriore medulle parte, ubi cavitas calamo similis insculpta existit: Laur. à posteriore cerebro, unde sacra medulla ortum ducit. q. Diff. nerv. 5.

d. Vasa. Colum.
Plat. at Fallop.
hos ramos dicit
bus subsequen-
tibus conjuga-
tionibus, quas
pro una conjuga-
tione recen-
suimus, tri-
buit.

e. Totam hanc
conjugationem
hunc muscu-
lum solum di-
stergi, voluit
Fallop. observ.

f. Gal. 9. us part.
8. ramum ter-
tis conjugatio-
nis alterum, ad
maxillam su-
periolem per so-
ramen secundæ
paris transmitti
voluit ad
musculos tem-
porales; & dis-
sect. nerv. 5.
manforios &
omnes à maxil-
la superiori ex-
ortos pro motu
quid duriores ex-
via (9. us part.
13.) longitudi-
ne effecti: item
diff. nerv. 5. ad

*x An ad radi-
ces dentium fe-
rantur nervi,
dubitant ali-
qui, Gal. diff.
nerv. s. denti-
bus à tertio pa-
ri furculos mit-
ti vult, & 16.
us. part. 3. mol-
les nervi ad na-
sum, dentes &
palatum, nam
hac sensu exa-
giore indige-
bant: Vesal. tra-
dit ab hoc ramo
ipsis dentibus
soboles seriatim
2. Z. tab. 13. f. 20. K. non videtur distinguenda, nō quidem ejus nomine, quod prædictæ
distribui: Col.
à tertio pari,
ramum alium
ad superiorum
dentium radi-
ces, alium ad
inferiorum den-
tium distribui
asserit: Fallop.
etiam tradit
radices den-
tium petere ner-
vos, & Laur.
verum Piccol.
non meminit.
At Plat. gingi-
vis & alveolis
ipsorum den-
tium, non au-
tem in ipsorum
substantiam in-
seri, asserit.*

dentium molarium, ipsisque ^r dentibus seriatim furculos largitur. Tum & tertia pro-
pago ^f posteriori ex parte [tab. 15. f. 2. T.] pullulat, quæ musculo in ore latitante inseritur
maxillæ inferioris foramen interius [tab. 25. fig. 2. F.] transiens, radicibus dentium in-
feriorum sui lateris furculos offert [tab. 15. f. XX.] horum enim beneficio dentes, cum
cætera ossa non sentiant, tristantium occursum sentiunt: mox reliqua ipsius pars [tab.
15. f. 2. V.] iuxta mentum, foramen in anteriore maxillæ sede [tab. 26. fig. 1. G.] elapsum,
inferiori labro, ejusque cuti ramulos complures largitur. Verum ab hac quoque an-
tequam maxillam ingreditur, nervulus oriri solet validus, longus, ac gracilis, qui sub
maxilla fertur, donec ad musculum, qui os aperit, pervenerit, & ad eos, qui sub men-
to positi sunt, & partim ossi hyoidis, partim linguæ inseritur. Denique truncus ^t ipse
[tab. 15. f. 2. T.] per musculos in ore latentes transiens, cum alterius lateris trunco ad
linguæ latus fertur, & in linguæ tunicam ^u absumitur, quo conveniens gustus, ^x sapo-
rumve dignoscendorum organum fiat; à quo furculi exigui linguæ substantiæ infi-
gantur.

Ab hac ^y conjugatione, ea quæ communiter pro quarta ^z recensetur [tab. 15. f. 1. &
2. Z. tab. 13. f. 20. K.] non videtur distinguenda, nō quidem ejus nomine, quod prædictæ
proxima sit, sed quod uno ex loco [tab. 13. f. 20. I. K.] furculis plurimis originem ducat,
& uno tantum in loco crassam meningem perforet: nam & ea paria, quæ sexto & se-
ptimo loco communiter enumerantur, etsi ex pluribus propaginibus oriantur, ta-
men, quia furculi simul uniuntur, ^a uniti unico foramine crassæ meningis ^a elabuntur,
non pro geminis aut multiplicibus partibus recensentur: in nervorum enim paribus
distinguendis, foramina calvariæ non esse considerata, cum Fallopio statuimus.
Nam si observandum esset, cum & secundum par & tertium (vel Anatomicorum
plerorumque tertii paris ramus) & octavum (siue Anatomicorum quinti paris radix
minor) per unum & idem foramen transeat, pro uno pari recenseri deberent, quod
tamen hætenus à nemine factum est. Hujus origo minor ^b est, (quod sculptor non
observavit) illique proxima & paulo ^a durior; quare Galenus ^b magis à basi ea, ^c tan-
quam à paulo duriori cerebri parte posteriore emergere dixit, quæ statim post exor-
tum ^a antrorsum modice tensa cum tertia miscetur, & cum illa commune ^a foramen
[tab. 3. f. 9. Q.] perreptans ad palatum ^a in ramulos divisa, toti palati tunicæ [tab. 15. f. 2.
inferius Z.] infigitur, sensumque gustus tribuit. Duriozem paulo dixit Galenus, ^a eo
quod tunica ^a os succingens durior sit lingua & aliis oris partibus, idcirco hujus res-
ctu sen-

*f Quartus nervus tertia propaginis, Fallop. observ. t Quintus nervus tertii paris, Fallop. observ. u Plurima pars in
lingua tunicam dissipatur, dissect. nerv. 5. Lingua tunicam efformat, Vesal. in lingua tunicam dilatatur, Plat. An tuni-
ca vel crusta ipsius lingua exterior ab his nervis fiat, adhuc cognoscere non potui, Fallop. obs. per superiorem tunicam di-
stribui (subsequenti paris) quarti paris duos ramulos, Columb. x Col. reprehendit Galenum & Vesalium, quod quar-
ti conjugii munus tertio adscripserit. Verum cum hæc dua conjugationes ex uno loco prodeant, & uno loco crassam me-
ningem perforent, facile excusari possunt. y Gal. 9. us. part. 9. & diff. nerv. 5. hanc inquit à tertia re vera sejunctam, &
ad palatum pervenientem invenisse Marinum.*

*z Gal. Vesal. Columb. Plat. & Laur. At Fallop. ab Anatomicis tertia conjugationis crassiorem radicem dictam, qui eo-
rundem quartum par pro tertio pari recenset: Piccolhom. nervos gustatorios quarto loco & lingua motores sexto loco
enumerat.*

*a dissect. nerv. 5. b Sic & Gal. 9. us. part. 4. c A dorsalis medulla principio, Vesal. tertio pari ita proximum,
ut tertii portio esse videatur, Columb. à medio dorsalis longitudo utrinque è lateribus, Plat.*

Et sensu hebetiore est: quandoque duo ramuli iuxta tonsillas, & appendicem styloideam ad linguæ radicem descendentes, per illius^d tunicam distribuuntur.

^d Quare Columbo quarti paris usus, ut gustus organum sit:

Laur. portionem quandam in palatum, quandam in tunicam linguæ subjectam decurrit, & gustui inservit, tertia conjugatio: Vesal. & Plat. in tunicam palati dilatare voluerunt: Galeno in tunicam os succingentem: Andernacius refert, aliis quartum par neque ad palatum, neque ad linguam propagines detulisse, sed ad occipitium reflexisse.

De Nervo auditorio, seu de quinta conjugatione.

CAPUT XXII.

De hac conjugatione egit Galenus 9. usq. part. 10. & lib. de dissect. nervor. 6.

Quinta conjugatio [tab. 15. fig. 1. & 2. a. tab. 13. fig. 20. M.] ad cerebri basis latera Galeno^a, imo ex cerebri medulla oblongata, ubi cerebelli portio jungitur [tab. 19. de dissect. nerv. fig. 1. i.] ex furculis seu nervis^a duobus, altero molliore (quo nullus visorio excepto mollior est & auditui proprius est) altero duriore enascitur, qui simul membranam egrediuntur & ad os petrosum feruntur, quos plerique jungi voluerunt, & pro uno nervo recensuere, ut qui quintum par ex parte molli & b parte dura constare dixerunt, cum tamen revera (quod etiam Galenus^c & Fallopius norarunt) distincti sint [t. 15. f. 2. sub a. apparet.] Hic ergo nervus per foramen satis insigne & tortuosum, quod in osse petroso^d est, ipsique proprium & ossis temporum foramen quintum est, in ipsam cav. tatem, quæ cuniculi formam refert, & auditus organo præparata est, ducitur. Mox portio durior per canalem proprium versus anteriora fertur (arteriam comitem habens quæ ab ea quæ per crassam meningem disseminatur, ortum ducit) & per idem os ad posteriora oblique recurrit, & in cav. tatem tympani dictam labitur, ita tamen, ut suo proprio canali osse o semper incumbat: inde magis reflexus, duos furculos, alterum superne, alterum inferne educit, qui singuli per proprium foramen transeunt: superior quidem [tab. 15. f. 1. & 2. b.] transversim fertur, per quod foramen [t. 3. f. 9. V.] etiam venula ad auditus organum pertransit: hicque quarti pars (seu tertii vulgo^e dicti) ramo instar capreoli vitis [tab. 15. f. 2. R.] commiscetur. Inferior vero [tab. 15. fig. 2. c.] foramen impen. se angustum & tortuosum [tab. 3. f. 9. ad d.] egreditur, qui transversim supra musculum masseterem delatus, in fauces delabitur, furculis aliquot in nares transmissis, hinc magnæ hæmorrhagiæ arcta & vehementi aurium occlusionem fieri Galenus^a asserit, mox etiam tertii paris ramo capreolum imitante, sive propagini nervi, qui ad linguam fertur, commiscetur, & à lingua ad dentium radices buccarum musculos^f & ad cutim circa auriculæ radicem defertur, forte non minus ad gustum, quam ad auditum conferent, quæ forte causa, quod surdi & etiam muti fere nascantur

a 9. usq. part. 10.

6. ex media pro-

pemodum dor-

salis medulla

sede in cranio

existentis. Ve-

sal ad basin ce-

rebri. & à la-

terali parte cir-

ca medietatem

exoritur, Co-

lumb. ab ea sede

qua Anatomici

explicata est.

Fallop. observ.

à dorsalis me-

dulla parte me-

dia profundius

à processu quo-

dam cerebri,

Plat. à postero-

re medulla par-

te cui calamus

assitit, paulum

progressi in au-

diendi orga-

num pertinent.

sic descripsit

Archangelus.

hinc b Vide 16. usq.

part. 3. c Quinta conjugatio licet manifeste duplex existat, una tamen propter Marinum esse concedatur de dissect. nerv. 6. d Alter in lapidei ossis foramen, quod veteres Anatomi cæcum vocarunt, propterea quod anfractum illum per quem nervus foras post aures excidit, haud possint perfecte perforare, de dissect. nerv. 6. e Non quod ille ad huc perveniat, sed quod hunc ipsum, dum ad seipsum adventat, expectet: dissect. nerv. 6. * 3. cõpon. f. loc. f Totum fere in latu musculum (quem & myodes platysma id est musculosam dilationem appellamus) cingitur, qui eunt sub nasæ & præter movet dissect. nerv. 6. g & Plat. at Laur. qui à prima conformatione surdi sunt, obstructo, exoluta, & refrigerato nervo quinti paris, hi pariter obmutescunt, & si acuto stylo auris membranam attrices, statim sicca infusis excitabitur.

hinc etiam surdastis vox rauca redditur, hinc à sono aëro citra contactum dentes offenduntur. Nonnunquam foramen cæcum egressus, deorsum fertur, ac si sextam conjugationem [t. 15. f. 1. & 2. e.] comitatus esset, & ramulos ad laryngis musculos proprios mittit, unde ex consensu aurium, linguæ & laryngis, quando aures profundius expurgamus, sicca tussicula excitatur. Sic etiam peripneumonici aures madent & parotides supervenientes salutes sunt & aliquando dentium dolore gravi sedato, materia translata, auris † suppuratur. Aliquando etiam ramulos cum quarto, quinto & sexto nervo brachii, in totum brachium mittit: imo etiam sape spinalem medullam comitatur, & ramulos suos una cum nervis medullæ etiam in totum pedem transmittit. At mollis hujus nervi portio [tab. 15. f. 2. a.] qui *νεῦρος ἀκροεὶς*, nervus auditorius revera est, cum dura portione fertur, & ubi ad extremum cavitatis ^h supra dictæ pervenit, membranæ modo dilatatus [tab. 15. f. 1. & 2. φ.] auditus instrumentum ^k præcipuum fit, & in ea sede remanet, eadem forte ratione, quæ & olfactus organum expansum diximus.

† Hipp. 4. epid. par. 26. historiam Athenæda pueri refert. h Fallop. voluit, ubi ad cavitationis extremum pervenit, quibusdam angustissimis foraminibus mediis, in cavitates geminas labyrinthi & cochleam distribui, & illas quodam modo sublinire, neque ulterius procedere, nullumve nervum à se ad exteriora dimittere: Alii per foramen ossis temporum quartum rursus alibi, & linguae nervi propagini quoque commisceri, scribunt. i Auditorius una cum dura meninge, inde exoriente, in auditus f. r. v. incidit, cum qua in latitudinem sese explicans meatum leviter deducit, dissect. nerv. 6.

k Auditus organi non infimam partem constituit, Vesal. nervus auditorius, Fallop. observ. auditus organum, Plat. Nervus auditorii dicti, quod in audiendi organum dirigantur: audiendi enim organum est aer ingenuus membrana la conclusus, Piccolhom.

De Nervorum coniugationibus sexta, septima & octava.

CAPUT XXIII.

De his Galenus de diff. nervor. 8. 10. 8. 11. part. 11. & 12. & 16. ejusdem 4. 5. & 6. de lingua mot. 4. loc. aff. 2.

Sexta conjugatio [t. 15. f. 1. & 2. e. tab. 13. fig. 20. N.] paulo infra ^a quinti paris seu nervi auditorii exortum, aliquot fibris ^b initium sumit, quæ statim mutuo unitæ nervum maximum constituere creduntur; at non ita iniuntur, quin revera semper nervi duo aliquo usque permaneant, qui una membrana continentur (quare unus censetur) & idem foramen, quod occipitii secundum est, [tab. 4. f. 10. b.] per quod venæ jugularis internæ major ramus ascendit, egrediuntur; quorum alter anterior, ac minor; alter posterior ac major existit. Minor cum ^c extra calvariam est recta ad linguæ musculos, cuius radici ramulum largitur, & eos, qui fauces occupant, descendit, & majori ex parte in os absuntur. Major vero nervus non procul ab egressu, ramum retrorsum mittit [t. 15. f. 2. f.] qui in musculos cervicem occupantes, præcipue in musculum cucullarem, qui ^d scapulæ secundum est, multis furculis distribuitur. Ipse vero truncus descendens septimæ conjugationi [tab. 15. f. 2. H.] arteriæ carotidi, & venæ jugulari internæ, membranæ interventu connectitur, & ad laryngis latera à septima conjugatione per ramum [t. 15. f. 2. i.] adaugetur: cum quo non ^e miscetur, sed colligatur. Mox ad laryngis muscu-

a Sic & Vesal. ad posteriora basiscerebri retro magis quàm quintum, Columb. à posteriore medulle parte, ubi calamus assistit, Piccolhom. à posteriore dorsali medulla parte jam angustata, Plat. b Trium nervorum principia habet, Gal.

c Et Fallop. observ. qui asserit, aliis Anatomicis hanc portionem ignotam esse. d Vide 16. us part. 6. e V. nervus insignis nervus constituitur, qui deorsum fertur, Plat.

musculos, potissimum, qui internam cavitatem occupant, surculos transversim mittit [tab. 15. f. 2. g.] ramulos item aliquot tenues à dicto distinctos, musculos faucium largitur. Inde ad thoracem descendit, & per ipsius quemadmodum & infimi ventris capacitatem fertur; & ramos plurimos ad utriusque ventris viscera distribuit, quos in historia secundi ventris cap. 19. explicavimus, & quia per omnia fere viscera excurrit conjugatio vaga dicitur. Admonet Fallopius, membranam, qua nervus hic sextus vestitur, dum per foramen labitur, aliquando manifeste aliquot fibrellas huius nervi absumere, aliquando immanifeste, & cum extra calvariam est corpus quoddam oblongum olivaris figuræ producere, aliquando simplex, aliquando geminum in utroque latere, quod colore carneum videatur, etsi substantia nerveum & admodum durum sit, quod corpus olivare in fibram quandam nerveam desinat, quæ per cervicem declinans nervorum quibusdam propaginibus, qui à cervicis primo & secundo pari & quarto, & quinto, & sexto, vel à primo, secundo, quinto, sexto & septimo copulatis, veluti reticulum quoddam efformat, quod per totam cervicem in unoquoque latere anteriori descendit, & in ista complicatione nova alia corpora olivaria aliquando concrescere, numero tamen incerto, quæ nulla alia substantia, quam nervea & quasi in calum concrecente, consent. Quam copulam, sexti paris plexum appellat, à quo plexu plures nervi ad cordis basin ferri asserit, & ab hoc eodem, sæpe sæpius, nervum, qui ad septum transversum descendit in utroque latere ortum ducere, quanquam incrementum majus à quinto & quarto pari nervorum cervicis accipiat. Ab hoc etiam plexu prodire nervum, qui per thoracem descendens iuxta costarum radices ad mesenterii originem feratur. Hactenus Fallopius. Quod autem ad viscera ab hoc sexto pari nervi mittantur, non autem à medulla, quæ in vertebris est, causa est, quia cum motum voluntarium non habeant, nervis durioribus, qui à spinali medulla proprie dicta prodeunt, non eguere, sed ne sensus expertia forent, solum sensificis, qui molliores sunt, & à cerebri medulla, dum adhuc in cranio est, prodeunt, præsertim cum viscerum substantia etiam mollis sit, opus habuere. At cum hi longo itinere ducendi essent, ne lacerarentur, membranis fortibus obvelari debuerunt, quare & corporibus propinquis con-

nexi feruntur. Septima^k conjugatio [tab. 15. f. 1. h. f. 2. H.] linguam movet, & est omnium in cranio prodeuntium durissima, cum ex duriore principio ortum ducat, in postremo occipitio, ubi cerebri medulla cranio elapsura est [tab. 15. f. 1. & 2. E.] & spinalis medullæ proprie dictæ initium est, unde aliquot invicem distantibus radicibus enascitur; quibus simul coeuntibus per obliquum & proprium foramen [tab. 15. f. 10. c.] in occipitio calvariam egreditur, & cum sexto pari, securitatis^m causa membranis fortibus jungitur, non veroⁿ commiscetur, & ipsi portionem sui communicat [tab. 15. f. 2. i.] quæ aliteri Anatomici, at Piccolh. octavam faciunt, quia organa olfactus pro se-

Xx

pus

cunda conjugatione recensuit. 1 Ubi cerebrum desinit 9. usque part. 12. à dorsali medulla ubi modo calvariam est egressura, Vesal. versus occiput magis originem habet, sed à cerebro, non à cerebello, ut Galenus voluit, Columb. à posteriore parte medullæ, ubi cavitas calami scriptorio assimilis insculpta est, Piccolhom. addit, tres primas conjugationes ab alioiore medulla parte natas spiritum animale à quarto ventriculo haurire, reliquas quinque ab inferiore, & spiritum animale à calamo scriptorio accipere. Laur. fere ab occipitio & spinali medulla, quibus (subjungit) duo paria recentiores addunt, (sed non describit.) m Gal. 9. usque part. 11. n Sic & Fallop. in observ.

pus servat, ac filo rotundo ac integro ad linguam deorsum fertur, & ubi ad linguæ radicem pervenit majore ° sui parte [t. 15. f. 2. m.] in multas fibras p solita, omnibus linguæ musculis furculos ad motum imperit: minori vero portione, ad aliquot hyoidis & laryngis m musculos, etiam ad motum ramulos mittit; sic & furculos aliquot [t. 15. f. 2. l.] ad musculos, qui ab appendice styloide principium ducunt, tribuit. Fibra etiam majoris rami, cum quinti nervi fibris commisceri videntur.

o Maxima sui parte in lingua musculos distribuitur, dissect. nerv. 8.

p 9. us. part. 13.

¶ Quartum

par nervorum

à media peni-

tus basi cerebri

& quasi ab in-

cipiente origi-

ne spinalis me-

dulla, Fallop.

observ. hanc ra-

dicem cum sua

conjugere licet

peculiaris con-

jugii loco recen-

sere, ne vero

Anatomico-

rum ordinem,

qui eas radices

prorsus ignora-

runt, perturbem,

ipso quinto pari adscribam,

& minorem quinti paris radicem vocabo, Vesal. octavum par nervorum

cerebri, Columb. faciei musculorum altera & posterior conjunctio à veteribus non observata, seu quinti paris nervus

minor, Plat.

¶ Sic & Fallop. perforamen proprium in sphenoidale locatum in temporalem, & in ore latitantem fertur, Vesal. Columb.

Plat. ¶ Columb. nonum par, quod invenerit, addit, nervorum exilium, à binis cerebri processibus, qui nates dicuntur

penes testes oriuntur, tenues satis & exiles, faciem versus accedunt, & apud tertium & secundum par transeunt, & in

aerium palpebra musculum inferuntur; ramulus tamen ad oculi musculum quintum etiam deferretur. Hæc ille.

Octava 9 conjugatio [t. 15. f. 1. & 2. d. t. 13. f. 20. L.] (quam alii quinto pari adscribunt) supra auditorium nervum ex cerebri medulla prodir, auditorio nervo multo gracilior & durior, inter secundam & tertiam conjugationem; quæ sub cerebri basi sursum & anteriùs, versus latera fertur, & crassa meninge inter secundam & tertiam conjugationem perforata, per foramen 1 secundæ conjugationis oculi orbitam ingreditur, & pene tota in oculi musculum abducentem, qui eum ad anteriorem angulum trahit, absumitur. Cæteri tamen volunt in musculum temporalem, & eum, qui in ore latitat, distribui, quod manifeste demonstrari nequit. Hæc sane conjugatio ratione exortus sui ante quintam & sequentes recensenda erat, sed metuentes, ne in immutando Anatomicorum numero, confusionem pareremus, ultimo loco enumerare maluimus. f

Horum nervorum substantia eadem non est; nam opticorum solidiuscula est, veluti medulla compacta, cum reliqui, motorii tamen oculi exceptis ex pluribus filamentis componantur, quæ ab exortu distincta sunt, mox in unum coalescunt, quos membrana firmissima complectitur quemadmodum ea remota conspicitur.

De Nervis à spinali medulla proprie dicta profluentibus, & primo Cervicis.

CAPUT XXIV.

De his consule Galenum de dissect. nervorum à cap. 11. ad finem libelli, secundum textum Latinum; in codicib. enim Græcis impressis capita septem posteriora desiderantur. 13. us. part. à cap. 4. ad octavum; item 16. us. part. 6. & 7. de plac. 8. item 3. loc. aff. 10.

Explicatis Nervorum conjugationibus, quæ cerebri productiones, & cerebri nervi dicuntur, cum tamen ab ipsius cerebri medulla oblongata, quæ adhuc intra calvæ conclusa continetur, prodeant; nunc de Nervis, quæ ab eadem medulla, quatenus in vertebris spinæ continetur, ortum ducunt, & idcirco spinalis medullæ (dorsalem medullam Galenus a vocare solet) nervi nominantur, sermo erit. Nam cum cerebrum omnib. partibus nervos commode largiri nequivisset, partim propter distantiam,

a dissect. nerv. de ossib. & ali.

distantiam, partim propter partium multitudinē: quare à spinali medulla, quæ à cerebri & cerebelli medulla tanquam ē radice producitur & per spinæ vertebrae descendit, partibus vicinis nervos secure distribuit. Ab hac enim medulla omnibus ^b partibus, quæ sub facie sunt, præterquam visceribus vocisque instrumentis, nervi suggeruntur; partim, quod horum nonnulla cum cerebro conjuncta esse oporteret, ut cor & hepar; siquidem omnia principia facultatum animalium regentium, conjuncta esse oportuit: partim, quod prope cerebrum sint sita, soloque sensu indigeant.

Nervorum spinalis medullæ ^c conjugationes triginta ^d ex distinctis partibus & ^e *De his Gal. dissect. nerv. ab 11. ad 15.* sedibus prodeuntes enumerantur; & quidem ex medulla, veldum in cervicis, vel thoracis, vel lumborum, vel ossis sacri vertebrae continetur, & per foramina vertebrae excidunt, idque vel duplici exortu per duo foramina parte anteriore & posteriore, ut in duabus primis cervicis & quinque ossis sacri conjugis videre est; vel simplici exortu, per unum foramen in utroque vertebrae latere, quod cum reliquis omnibus fit.

Cervicis ^c conjugationes alii septem, ^f alii octo ^g recensent, in totum caput exteri-
us, ejusque musculos dispersas. Prima & secunda ^h conjugatio præ reliquis omnibus hoc peculiare habent quod non aliorum nervorum modo exoriuntur, ita ut per vertebrae latera egrediantur, & unus à dextra, altera sinistra parte prodeat: sed alter ab anteriore, altera posteriore parte per foramina procidit, quod propter diversam primæ & secundæ vertebrae articulationem fit, quæ propter motus securitatem talis est.

Prima conjugatio ⁱ inter occipitium & primam vertebrae exit, quod ut facilius fiat, in occipitis osse primaque vertebrae cavitas quædam parva (licet in canibus, in quibus grandior est vertebra, tantum in ipsa vertebra sinus sit exsculptus) existit, & priusquam exeat supra spinalem medullam reflectitur: mox in duos ^k ramos parvos dividitur: alterum anteriorem graciliorem [tab. 16. H.] qui musculis ^l collo insidentibus & œsophago substratis cervicem flectentibus inferitur: alterum posteriorem [tab. 17. F.] surculo gemino, altero gracili qui in capitis musculos parvos in occipitio sitos disseminantur; & quidem dexter ramus in dextri lateris musculos, sinister in sinistri absumitur; quod etiam de reliquis sequentibus nervis intelligere oportet: alter [tab. 17. G.] in principium musculi scapulam sursum trahentis, abit: nam cum parvi sint extra musculos non procurrunt.

Secunda ^m binis principiis prodit: anteriore ⁿ ramo [tab. 16. N.] admodum gracili, inter primam & secundam vertebrae ad latera dentis elabatur, qui in musculos collo insidentes, quemadmodum & primæ conjugationis ramus, cum quo implicatur, distribuitur, & in cutim faciei fere totam absumitur: Posteriore vero & majore [tab. 17. I.] per latus posterioris processus secundæ vertebrae ducto, statim in duos ramos impares scinditur, quorum crassior [tab. 17. K.] per transversum versus spinæ medium tendit, ubi musculi cervicem occupantes congregiuntur, & tertiæ conjugationis

Xx 2

bra parva sunt, velut in homine, magna vero, in quibus magna velut in serratos dentes habentibus & cornigeris, & in simiis, quæ homini in pluribus particulis, tum in collo simillima sunt, hac conjugatio tantum in musculos, qui circa capitis dearticulationem sunt, distribuuntur. ^k Vesal. (qui anteriorem non semper conspici dicit) Plat. & Laur. at Columb. anterioris non meminit. ^l Dorsum moventium primum par, Vesal. & Plat. sive cervicem flectentium primus seu longus, Bauhino. ^m diff. nerv. 12. ⁿ Ad quintum musculum, laryngi & œsophago communem, Columb.

o Quemadmo-
dum à cerebro
multis parti-
bus, quæ sunt
sub facie nervi
pars distributa
est, propter usus
memoratos: sic
ad caput ex spi-
nali medulla
colli nervos sur-
sum ducere non
pignit, magnus
in quibus tem-
poralis muscu-
lus maximus
est, & aurium
substantia ma-
gna est, facile-
que ac multum
movetur, om-
nino enim exi-
guos iis anima-
libus quibus
horum nihil in-
est, ut homini
& simia. 16. us-
part. 6.
p. De hac Gal.
diff. nerv. 13.
q. 13. us. part. 5.
i. Dorsum mo-
ventium pri-
mum par, Ves-
sal. & Plat. cer-
vicis primum
par, Columb.
& Bauhino.
i. Dorsum mo-

ventium 7. Vesalio, tertius, Col. & Bauhino: tertius lumborum, Sylvio. i. Dorsum moventium octavus, Vesal. quar-
tus, Columb. & Bauhino, ad musculos maxillarum & caput retro flectentium tertium par facit, Piccolb.
u. De hac & conseqq. de diff. nerv. 14. & 15. Tertia & quarta conjugatio nervos suppediat musculis colli & capiti com-
munibus musculis genarum & paribus quæ sunt post aures 13. us. part. 5. i. In multis furculos, quorum aliqui a seor-
dunt descenduntque, alii parte posteriore reflectuntur, Columb. y. Primum par dorsi, Vesal. & Plat. primum par cer-
vicis, Columb. & Bauhino. a. Secundum dorsi, Vesal. 2. cervicis, Columb. & Bauhino 8. Thorac. Fallop. b. 2. scapula
Vesal. Plat. & Fallop. 1. Columbo: trapezius, Sylvio. c. A quarta cum quinta & sexta mixta, Gal. 13. us. part. 5. & 9.
vido diff. nerv. 15. duntaxat à cervicis vertebra, Vesal. à ramo quarti & quinti par, & in quibusdam etiam à subse-
quentibus constituitur, in nonnullis à quarto pari: sed hoc rarius; sapius vero à quinto: at carnea portio ipsius ab in-
finitis thoracis nervis, & prima lumborum tribuit; Columb. non solum à cervicis paribus sed etiam à sexto cerebri pari
deferri voluit Piccolhom. cum tamen Gal. dissect. nerv. 10. admiratione dignum dixerit, cum ne minimam omnino por-
tionem ex hac sexta conjugatione suscipiant: à quarto, quinto, sexto & septimo pari nervi quatuor ad diaphragma
feruntur, Laur. à cervicis omnibus tribus paribus, præcipua parte à quinto pari profecto, Plat. d. Easdem partes, quas
quarta motu & sensu illustrat, Piccolhom. e. Minore ramo in posticos cervicis musculos, majore in diaphragma, bra-
chium & scapula musculos derivatur, Laur.

tionis [tab. 16. S.] furculo [t. 17. L.] adaugetur, & ex posterioribus sursum ad ° capitis
anteriora tendit, inque universam capitis cutim ad verticis usque summum, imo & ad
aures, propagines [t. 16. & 17. MM.] dispergit: minor vero ramus [t. 17. super B.] in prin-
cipia musculorum tertii & sexti paris capitis distribuitur.

Tertia^p [tab. 16. charact. 3.] ex communi foramine, quod 9 secundam & tertiam
vertebram intercedit, erumpit, & in duos ramos secatur, quorum anterior [tab. 16. P.]
in quatuor furculos dividitur; horumque primus [tab. 16. Q.] cervicem & flectentium
par primum accedit: alter [tab. 16. & 17. R. conascitur cum T.] deorsum fertur, & cum
furculo quarti paris 9 commixtus in musculos œsophago substratos distribuitur: ter-
tius [tab. 16. S. tab. 17. K. ad L.] sursum fertur, & cum secundi paris ramo 9 congregitur,
& in verticis cutim absumitur; quartus [tab. 16. & 17. T.] in musculos cervicem in la-
tera agentes, & eum, qui scapulam attollit, & in illum quadrangularem à carnea mem-
brana profectum, qui labrum oblique deorsum trahit, dispergitur. Posterior [tab. 16.
& 17. O.] in musculos capiti & collo communes ipsum erigentes, seu^f sacrum & semi-
spinatum^t disseminatur.

Quarta^u [t. 15. char. 4.] ex communi foramine tertiæ & quartæ vertebrae elabitur,
& in duos^x ramos secatur, in anteriorem & majorem [tab. 16. & 17. X.] qui in tres so-
boles dividuntur; quarum prima [tab. 16. Y.] cum tertio paris ramo [tab. 16. R.] mixta,
ad musculos, œsophago y substratos, qui cervicem flectentium primum par constitu-
unt, abit: altera [tab. 16. a.] in musculos cervicem^a in latera flectentes, seu secundum
par & scapulæ^b musculum secundum seu cucullarem: tertia [tab. 16. b.] gracilior, cum
quinti paris ramo [tab. 16. c.] & quinti cum sexti propagine [tab. 16. m.] unia iuxta me-
diastinum (ramulum utrinque unum tribuens) & supra pericardium descendit, ut ex
his^c tribus principiis diaphragmatis nervus [t. 16. & 17. n.] constituatur, qui in ipsius
nervosum tendinem, quem caput alii vocant, inseritur: nonnunquam hæc quarti paris
soboles deficit, & tunc à septimo pari furculus accedit; præcipua tamen pars à quinto
pari proficiscitur. Posterior vero & minor ramus [tab. 16. & 17. V.] ad tertiæ vertebrae
spinam, musculis cervicis, ei vertebrae incumbenibus furculos largitur, indeque in
membraneum buccarum musculum absumitur.

Quinta^d [tab. 16. charact. 5.] sub quarta vertebra ex cædens^e in duos ramos scinditur,
anterior-

anteriorē & posteriorem. Anterioris [tab. 16. & 17. d.] primus furculus [tab. 16. a. d. ad charact. 6.] musculos cervicem flectentes petit: alter [tab. 16. e.] cum quarti plerumque & sextiⁱ paris propaginibus secundum latas œsophagi per vertebrarum colli anteriores descendens [t. 16. ex b. e. m.] nervum diaphragmaticum constituit: tertius [tab. 16. & 17. f.] ad musculum deltoidem, qui brachii secundus est, fertur, à quo ramuli [t. 17. TT.] musculis scapulam attollentibus & cucullari & levatori^h porriguntur. Ab eodem alius nervus [tab. 16. & 17. g.] emergit, qui multis furculis, cuti deltoidem integenti implicatur, alius vero in profundo latitans ad scapulæⁱ cervicem in duos ramos scinditur, quorum anterior [tab. 16. & 17. h.] & gracilior deltoidi, ubi à clavicula originem ducit soboles tribuit; nonnunquam & cuti, aliquando venam humerariam comitando: Posterior vero crassior [tab. 16. & 17. i.] primum furculum in secundum par musculorum^k ossis hyoidis sive coracohyoides; dein vena & arteria comitatus, hunc musculum super scapulari superiori, tum in deltoidem qua à scapulæ spina enascitur, & tandem furculos [tab. 16. & 17. n.] ad cutim brachii sede externa mittit. At posterior [tab. 17. c.] ad spinarum apices reflexus, eodem modo quo posterior quarti paris ramus distribuitur.

Sexta^m [tab. 16. charact. 6.] sub quinta vertebra ubi excidit, in ramumⁿ anteriorem & posteriorem dividitur. Anterior [t. 16. l.] & major, postquam propaginem [tab. 16. m.] quintæ conjugationis^o ramo ad diaphragmaticum constituendum junxit, cum septima & thoracis prima conjugatione unitur, [t. 16. & 17. q.] rursusque varie dividitur, & cum sequentibus, Nervos ad brachium mittendos efformat: at peculiarem furculum [t. 17. p.] ad scapulæ^o cavum in musculos eam attolentes mittit. Posterior vero & minor ramus [t. 17. k.] in musculos posticos, caput & cervicem moventes, eadem serie cum cæteris dispergitur; item in capita musculorum^q respirationi inservientium, qui à cervice thoracem adeunt, qui etiam à septima conjugatione & prima thoracis nervos accipiunt.

Septima^m [t. 16. ch. 7.] sub sexta cervicis vertebra prodit, & cum sexta cervicis & thoracis prima [t. 16. f.] securitatis gratia conjungitur, cujus ramus major^r in brachium fertur: à quinto n. sexto & septimo cervicis, & primo ac secundo thoracis conjugatis, brachii nervi producuntur: interdum ab hac conjugatione, & ad diaphragmaticæ nervum constituendum ramulus procedit. Quare cum à cervicis^t medulla non paucissimi nervi ad diaphragmaticum concurrant, mirum non est in Apoplexia^p diaphragmatis motum aliquantisper servari; nam licet propter ventriculorum cerebri obstructionem, ut vulgo censetur, spiritus animalis ad diaphragma deferri nequeat, attamen cum spinalis medullæ cavitas etiam spiritus animales nonnihil contineat, qui per nervos hosce ad diaphragma perferri possunt, & parvum quendam motum tribuere, unde respiratio, licet admodum parva, sensumque effugiens, remanet, à qua vita tantisper servatur, quam diu spiritus animalis in cavitate medullæ spinalis fuerit & si obstructio ventriculorum tollatur, Apoplecticus ad se redit; sin minus, diem suum claudit. At posterior ramus [tab. 17. r.] minor, qui semper adest, ad musculos & cervici instratos, & musculo^t buccarum quadrato soboles largitur; in quem &

Xx 3

à quin-

vici conjugationibus, & cur non ex tribus primis, sed quarta portione araneis simili, ex quinta vero memorabilem, ex sexta aliam hac minorem, at majorem prima, diaphragmati nervos tribuerit, &c. 13. us. part. 9. t. De hac re vide 16. us. part. 5.

à quinto pari cerebri, & à septem cervicis, primo solum excepto, secundum fibrum ductum exporrecti & etiam ad cutim furculi mittuntur; non mirum ergo, si Spasmus cynicus gravis sit, cum hic musculus in hoc spasmo primo convellatur.^a

^a Oflavum ad mus cynicus gravis sit, cum hic musculus in hoc spasmo primo convellatur.^a
dit Galenus

13. us. part. 5. & Piccolhom. inter septimam & oclavam vertebra, cuius distributio potissimum in cubitum & ulnam fiat, nec ultra pergat.

De Nervis Thoracis.

CAPUT XXV.

De his Galenus de diff. nervor. 16. 13. us. part. 5. & 6. 16. us. partium 7. pauca.

Nervi per Thoracem disseminati, non secus, quam per collum duplices sunt: alii enim à cerebro, seu rectius, ipsius medulla in cranio contenta, alii ab ipsius medulla dorsi vertebrae transeunte originem ducunt. A cerebri quidem medulla sexta cerebri coniugatio per ipsum fertur, de qua libro secundo verba fecimus. A medulla vero spinali, quatenus dorsi vertebrae continetur, conjugationes aliis quidem^a duodecim: revera tamen undecim profluunt: nam licet vertebrae duodecim sint, attamen foramina undecim tantum habent & totidem solum costarum intervalla sunt: quæ omnes post egressum in duos ramos dividuntur, quorum alter maior antrosum, alter minor versus posteriora reflexus ad musculos dorsales fertur.

^a Thoracis nervi undecim sunt, non 12. ut Vesalio placuit, Columb. undecim tantum
Riol. duodecim paria ex medulla dorsali colliguntur, & nona spina dorsi prima est, Piccolh. Thoracis 12. paria primum & secundum anteriore ramo in brachium, posteriore in thoracis musculos fertur: reliqua decem, anteriore parte ad singularem, posteriore ad musculos thoracis, & spinatos in vertebra latitantes subjectos, hac

Prima^b conjugatio [tab. 16. charact. 8.] inter septimam cervicis & primam thoracis vertebra ab utroque latere egressa in duos ramos scinditur: horum anterior maior, ubi à septima conjugatione, interdum etiam à secunda Thoracis, portionem [t. 16. & 17. x.] suscepit, vicinisque conjugationibus varie commixtus est, & aliam accedit, ex posteriore regione propagines, [tab. 17. aa.] in cavam scapulae regionem distribuit, & in brachium fertur, de cuius distributione in brachii historia sermo erit. Præter hanc ad brachium propaginem, aliam habet [tab. 16. y.] quæ antrosum secundum primam costam ad pectoris ossis summum delata, furculos primo thoracis musculo subclavio dicto, ubi largita est, in musculos, qui à pectoris ossis summo originem ducunt, ut sunt mastoidei seu capitis septimus, sternohyoidei^d & œsophagei^e assumitur. Posterior vero ramus [tab. 17. u.] qui gracilior est, sub musculus, qui vertebrae adnati sunt, reflectitur, & in transitu musculo cervicis secundo, & iis, qui cervicis & capitis motibus in posteriora præfunt, soboles impertit: ubi vero septimæ vertebrae spinam attingit, ab ea discedens, transversim ad humiliorem sedem musculi cucullaris^g & rhomboidis^h & ferratumⁱ passicum superiorem furculos offert.

Secunda conjugatio [t. 17. char. 9.] inter primam & secundam thoracis vertebra egressa, quemadmodum & præcedens, ramum [tab. 17. β.] in posteriora & mittit, & distribuit: dein portione non minima cum præcedentis ramo jungitur [t. 17. δ.] & in brachium
Laur. b Primum thoracis par, seu dorsali medulla oclavum par, Vesalio. c Anteriore ramo in brachium, posteriore in thoracis musculos fertur, Laur. d Primum par hyoidis, Vesal. Col. Fallop. Arant. 4 per Sylv. 3. par. Bauhino. e Tertium par commune laryngis, Vesal. Fallop. Bauhino. 5. Muscul. Columb. f Et Col. at Vesal. 2. par dorsi. g Scapula 2. Vesal. Fallop. Bauhino 1. Columb. h Scapula 4. Vesal. Col. Fallop. at Bauhino 3. i Thoracis 3. Vesal. Col. Fallop. 4. Bauhino.

brachium fertur; reliquum secundum costæ primæ ductum ad pectus abit, & intercostalem nervum constituit, à quo soboles in musculos thoraci incumbentes distribuuntur.

Tertia vero, & reliquæ octo conjugationes [t. 16. char. 10. vsque ad 20.] thoracis, eodem modo distribuuntur; ubi enim è vertebrarum lateribus prodire, in ramos duos scinduntur. Anteriores rami, qui intercostales dicuntur [tab. 16. 111.] ipsi costali nervo, qui sexti paris cerebri ramus dicitur, & sub pleura ad costarum radices fertur, sureculum^k in transitu offerunt, totoque ipsius incessu illum ramulo adaugent; nam rami^k ipsi recta secundum costarum ductum, per costarum^l intervalla ramo venæ sine pari & arteriæ magnæ ramo comite proprio sinu, qui costæ cuilibet interiore & inferiore sede, ad horum trium vasorum transitum insculptus est, in anteriora sub pleura prope musculos intercostales feruntur, ita quidem, ut intercostales verarum costarum ad os pectoris pettingant; spuriarum vero etiam in abdominis anteriora supra peritonæum ferantur. Ab his varii rami [tab. 16. 111. & charact. lateris sinistri] in musculos intercostales tam internos, quam externos & thoraci incumbentes [t. 16. 111. 11. 111.] ut ferratum majorem^m & minorem, ⁿ pectoralem, ^o latissimum^p [tab. 16. 111.] & in abdominis musculum obliquum descendente, ipsorum musculorum fibras imitantes disseminantur, thoracisque cuti sparsim surculi offeruntur; & cum non solum hi, sed & reliqui musculorum capitib. recta inferi debuerint, mirabiliter ad venas arterias & ligamenta illius loci reflectuntur. Tandè ab intercostali quartum fere intervallum perreptante, propagines [t. 16. 111.] in musculum pectoralem disseminantur: à quib. surculi papillas mammarum petunt, qui ipsis sensum exactum tribuant. Posteriores rami seu minores, retrorsum ad vertebrarum spinas flectuntur, inter musculos vertebra adnatos, qui dorfi & thoracis motibus præsumt, & latitant, in quos toti non absumentur; nam ubi spinarum apices attigere, inter musculorum utriusque lateris congressum excidunt, & in musculos, qui ab hisce apicibus oriuntur, ut sunt splenius, ^q rhomboides, ^r cucullaris, ^s latissimus^t, ferratus posticus inferior^u & aliquot in dorfi cutim distribuuntur. Verorum nervorum in cutim distributio non omnibus eadem est; quare nec certo numero recenseri possunt; siquidem trunci nunc in plures, nunc in pauciores ramos per cutim dissecuntur.

Galenus^{**} observavit nervis intercostalibus affectis vocem adimi, quod historia memorabili cujusdam ex alto in terram prolapsi docet, cui ex eo casu dorfi initium læsum fuerat.

Duæ denique ^x postremæ Thoracis conjugationes, surculos [t. 16. ad latus charact. 18. 19.] capiti lumbaris musculi, seu femoris sexti offerunt. Et hæc quemadmodum & ex, quæ ex notharum costarum vertebra emanant, superioribus majores sunt, quia abdominis musculis surculos communicant [t. 16. 111.] & sæpe visceribus infimi ventris ramulos largiuntur: hique nervi frequenter circa mediam costam in duos ramos secantur, quorum alter interior costam perreptat, alter exterior foras educitur. Hi & lumbares cum nervis costalibus coeunt & commiscuntur, hinc partes peritonæo inclusæ

^k dissec. nerv. 10. & 1. c. 111. part. 5. 1 dissec. nerv. 16.

^m Thoracis secundus, Vesal. Col. Fall. Bauhino.

ⁿ Scapula primus, Vesal. Fallop. Bauhino, secundus Col. lumb.

^o Brachii primus Anatomici.

^p Brachii 4. Vesal. Col. Fall.

^{at} Bauhino 3.

^q Capitis musculorum primus par Anatomici.

^r Scapula 4. Vesal. Col. Fall.

^{at} Bauhino 3.

^s Scapula 2. Vesal. Col. Bauhino, 1. Columb.

^t Brachii 4. Vesal. Col. Fall.

^u Thoracis 5. Vesal. Fallop.

^v Bauhino, 4. Columb.

^{**} hoc 3. ad an. fusius probat. ^x A postremis thoracis nervis alii decidunt, quibus septi transversa pars carnea glandet, Columb. [†] 16. 111. par. 5.

clusæ ex spinali medulla robur, à cerebro sensum acutum (quia costalis sexti paris cerebri ramus existit) accipiunt.

De Nervis Lumborum.

CAPUT XXVI.

De his Galenus lib. de diff. nervor. 17.

a Lumborum
conjugia quin-
que sunt, licet
in quinque lum-
borum verte-
bris quatuor
tantum fora-
mina sint, quia
inter extre-
mam thoracis
vertebram, &
primam lum-
borum, primum
par incedit,
quare inter
lumborum po-
tius quam tho-
racis adnume-
rari debet, pra-
sertim cum
ventri inferio-
ri non thoraci
deserviat, Co-
lumb. Ex lum-
borum verte-
bris quinque
efferuntur, par-
tim in exter-
nos & postero-
res musculos,
partim in inter-
nos iis nervis
implicati, qui

A Medulla spinali in lumborum vertebra contenta, nervorum conjugationes quin-
que ^a ortum ducere communis sententia est, quæ ipsis thoracis conjugationibus
maiores sunt, & ex foraminibus vertebrarum lumborum profluentes, in eo cum ner-
vis thoracis conveniunt, quod quælibet conjugatio in ramum anteriorem & poste-
riorem dividitur, & quod à posterioribus ramis [*tab. 17. char. 52. 53.*] propagines in
musculos vertebra lumborum adnatos distribuuntur: ipsis vero commune, ^b quod in
spinales musculos & abdomen & lumborum carnes disseminantur.

Prima conjugatio ^c [*tab. 16. char. 20.*] quemadmodum & ceteræ conjugationes,
sub peritonæo, vertebrarum foramen egressa, in ramos duos finditur, anteriorem ma-
jorem, à quo furculi in diaphragmatis carneas portiones mittuntur, alii vero ad caput
musculi lumbalis, ^d alii ad musculos abdominis. Posterior minor est & reflexus, in
musculos lumborum vertebra incumbentes, quemadmodum & sequentium conju-
gationum absumitur, ut sunt muscoli, sacrolumbus, ^e musculus longissimus, ^f sacer,
^g ubi vero ab ipsis spinarum apicibus prodeunt, ad latera excurrunt, & in cutem &
brachij musculum latissimum disseminantur.

Secunda conjugatio [*tab. 16. char. 21.*] sub sexto femoris musculo, seu lumbali, cui
ramulos impertit, fertur: mox assurgens ad ossis ilij summum, ipsius propago poste-
rior, abdomen transiens, primis femoris musculis seu natiu auctoribus & tibiae ex-
tendentium primo ^h seu membranofo, sensum motumque tribuit. At ramus anterior,
ad musculum femoris ⁱ iliacum internum, & tibiam flectentium primum, ^k & ad cu-
tim femoris distribuitur. Ab hac quoque conjugatione ^l exiguus & oblongus nervus
[*tab. 16. char. 49.*] prodit, qui cum vasis spermaticis suilateralis ad testem mittitur, ve-
rum etiam à sexti paris cerebri ramo costali, furculi testibus offeruntur.

Tertia conjugatio [*tab. 16. char. 22.*] etiam sub lumbali musculo prodit; cujus ramus
anterior, prope ilium os transit, in duas propagines dividitur, quarum altera ad genu
ipsiusque cutim abit: altera venam saphænam comitatur. At posterior ramus reflec-
titur, & in musculos lumbis incumbentes & cutim disseminatur. Sic à tribus ^m priorum
conju-

^e Septima conjugatione cervicis eodem derivantur, Piccolhom. Lumborum conjugationes quinque, quarum postero-
res rami in rachitis musculos, anteriores in abdominis, femoris internos musculos ac testes feruntur, Laur.

^b Diff. nerv. 17. ^c Per foramen commune quod est inter 12. thoracis & 1. lumborum vertebra, Columb. ^d Femor-
is 6. Vesal. Fallop. Bauhino, 5. Columb. ^e Thoracis 4. Vesal. & Fallop. 5. Columb. 6. Bauhino. ^f Dorsij par 6. Vesal. 2.
Columb. Bauhino. 2. par lumborum, Sylvio. ^g Dorsij 7. par. Vesal. 3. Columb. Bauhino 3. lumborum, Sylvio.
^h Tibia sextus Vesal. Col. & Fallop. ⁱ Femoris septimus. Vesal. Fallop. Bauhino 6. Columb. ^k Tibia primus Anato-
micis. ^l Sic Vesal. Plat. Laur. ^m Vesal. & Plat. à 10. thoracis, & 2. lumborum.

conjugationum ramis anterioribus, soboles [tab. 16. ad latera char. 20. 21. 22.] ad costalem nervum accedunt, eique junguntur.

Quarta conjugatio [tab. 16. char. 23.] quæ lumbalium maxima est, sub lumbali musculo & pubis osse delata, venam & arteriam in inguen comitatur, & propagines aliquas in scrotum & cutim penis dispergi^a alii observant; verum ab ossis sacri^o medulla eo mitti notavimus. Alios vero P ad anteriores femoris & tibiæ musculos distribuit, à quibus furculi nonnulli etiam ad genu usque quandoque descendunt.

Quinta [tab. 16. char. 24.] aliarum instar bipartitur, & ramus anterior ac major, foramen inter os coxendicis, pubis, atque ilii transit, & propagines alias utrique musculo femur circumagenti, alias ad femur flexentium septimum & octavum; alias ad penis^o musculos (communiter ab ossis sacri medulla) distribuit: item rami ad vesicæ & uteri collum, & à lumborum & ab ossis sacri medulla; at posterior ramus reflexus, in musculos lumborum vertebrae insidentes & cutim ejus loci absumentur. Denique à tribus inferioribus conjugationibus non pauci rami crus accedunt, quemadmodum eo loci dicturi sumus. Præterea hæ conjugationes inter se connectuntur, prima cum secunda, secunda cum tertia, tertia cum quarta, & quarta cum quinta [tab. 16. f. 1. ostendit.] eodem penitus modo, & quidem sicuti brachii nervi implicuntur.

leni sententia à medulla ossis sacri. f. Col. ad vesicam, vesicæ & uteri collum: alii vesicæ à 6. pari cerebri & ossis sacri medulla.

De Nervis Ossis Sacri.

CAPUT XXVII.

Hos attrigit Galenus de diff. nervor. 17. 16. usque part. 9. libell. de ossibus cap. 11. & 12.

EX medulla, ossis sacri vertebrae inclusa conjugationes^a sex^b prodeunt. Prima a Gal. lib. de quidem [tab. 16. char. 25.] inter ultimam lumborum vertebrae & ossis sacri primam, eo modo, quo lumborum conjugationes producuntur, egreditur, & in ramum anteriorem & posteriorem dividitur. Anterior ramus et si maiore parte nervis, qui ad crus mittuntur, permisceatur, propaginem [tab. 16. char. 53.] tamen secundum ossis ilium internam sedem mittit, à qua furculi abdominis musculis & femoris septimo seu iliaco interno offeruntur. Posterior ramus cæterarum conjugationum modo fertur.

Yy

vertebrarum compages, sicuti per spinam totam profiliunt, non tamen ab utroque latere, sed intrinsecus & non extrinsecus: hique omnes tria constituunt paria, quia tres sunt sacri ossis partes: at cap. seq. tria coccygis subjungit, intelligens per sacrum & coccygis os, quod recentiores ossis sacri nomine expressere: Gal. de ossib. 12. coccygis os ex tribus partibus constat, juxta earundem compages, nervi ex parte posteriore prodeunt: homini priores ex ea parte oriuntur, quæ coccyx latum os attingit: insequens qua inde ortum habet, ubi prima hujus ossis pars cum secunda committitur: duo alii inde egrediuntur, quæ secunda pars cum tertia jungitur & lib. de diff. nerv. 17. nervi à dorsali medulla in os coccygis terminantur: sic vero Columb. de illis conjugationibus sub coccyge, quas Galenus somniavit, cum in homine non reperiantur, nil attinet dicere (Galenus aliud per os coccygis intelligit, quam Vesal. & Columb. vide supra lib. 1. ca. 48.) sic Vesalius ab hominis coccyge ne unus nervus exit.

b Vesal. Plat. Laur. sex: at quinque Piccolhom. (qui cervicis octo dixerat) quia in ossis sacri vertebrae quinque tantum foramina sunt excavata, qui omnes in crus iter habent; at Columb. cum pedis nervis miscet: paria quatuor, Rioli.

tur, & propago [tab. 17. char. 54.] in musculos ab ilium osse productos, potissimum in primum femur moventium spargitur, unde furculi in cutim natum absumuntur.

Quinque^b conjugationes subsequentes [tab. 16. char. 26. ad 30.] alia ratione producantur, antequam enim egrediantur, utrinque geminae sunt; & utrinque nervus unus in anteriora, & utrinque unus in posteriora excidit. Anteriorum tres superiores, quemadmodum & primae conjugationis ad crus feruntur: duo humiliores^c propagine in^d ani & vesicae musculos, forte & pudenda; in nonnullis^e ad cervicem uteri, vesicae & penem frequentibus furculis distribuitur; alii denique ad perinaeum & scrotum deferuntur. At posteriores rami [tab. 17. char. 54. 55.] in musculos, qui ossis ilium & sacri posteriorem sedem occupant, distribuuntur, in musculum dorsum moventium^f longissimum, & sacrum^g in initium membraneum musculi latissimi^h brachii, & thoracis sextum sacrolumbumⁱ dictum; quatuor femur extendentes & cutim natum. At medullae spinalis finis [t. 16. & 17. char. 56.] ex osse sacro procedens unam propaginem utrinque^k diffundit: nonnunquam in furculos complures dextros & sinistros distribuitur, qui per femoris musculum quartum & per cutim, quae inter nates & ad anum usque procedit, disseminatur: etsi nervi ritu^l distribui aliqui velint, & nervum conjugem carentem vocant. Sic in homine se habet, at in simiis & canibus tres sunt conjugationes, quarum duae tantum inferiores, antierius & posterius educuntur: reliquae vero conjugationes ab ossis coccygis lateribus, quemadmodum ex Thoracis & lumborum vertebrae egrediuntur.

Ex hac nervorum spinalis medullae historia colligere est, vigintinovem esse nervorum conjugationes, septem medullae cervicalis, undecim medullae dorsalis, quinque medullae lumborum: sex medullae ossis sacri; quod scire Medico necessarium est, ut sciat, quibus spinarum partibus unguenta & cataplasmata applicanda sint, cum vel occiput, vel facies, vel collum, vel manus, vel thoracis partes, vel musculi abdominis, vel uterus, vel vesica, vel podex vel penis, vel crura, aut motu aut sensu, aut utroque^m privantur.

^c Sexti & septimi paris propagine, Vesal.
^d Gal. diff. ner.
^e 7. sedis, penis & vesicae musculus ipsi etiam pudendo ex ossis sacri foraminibus nervorum exortus à dorsali medulla implantantur, & 16. usque part.
^f 9. Musculi qui ad anum, vesicam & testiculum: ad hac membrana quae illic sunt & vesicae & matris & peritoneum nervos accipiunt: idem & Piccolh.
^g e Columb. addit, in nonnullis ad vesicam

musculos; in collum uteri, sphincterem ani, vesicae & penem, Laur. ad vesicam & uteri fundum plerumque ramuli à sexti paris cerebri ramo costali exporriguntur, Vesal. f. 6. par. dors. Vesal. 2. Columb. & Bauh. 2. par. lumborum, Sylvio. g. 7. Dors. Vesal. 3. Columb. & Bauh. 3. par. lumborum, Syl. h. 4. Brachii Vesal. Col. Fallop. 3. Bauh. i. 4. Thoracis, Vesal. Fallop. 5. Columb. 6. Bauh. 6. In homine cum os sacrum ex quinque tantum ossibus efformetur, à dorsali termino furculus utrinque unus diffunditur, qui sexti paris sacri ossis vires supplet. Vesal.

l Juxta tertiam coccygis extremitatem quod reliquum est ex dorsali medulla, simplex ac nulli associatum profertur, de oss. 12. Gal. & alii de nervo quodam loquuntur, quem inconjugatum vocant, si verum esset in extremo spinalis medullae reperiretur, hunc celeberrimum nervum hoc loci nunquam comperi, Columbus: & Vesal. sibi non visum asserit, Galenum os sacrum & coccygis hominis non descripsisse voluit Vesal. & Columbus, sed parcant Galeno, & videantur ea quae de ossibus hic libro primo dicta sunt.

m Aliquando sensus & motus deperditur: aliquando sensus amittitur, motu incolumi, Gal. 4. loc. aff. 4.

Cerebri altera Sectio.

CAPUT XXVIII.

Corpus nostrum tanta rerum varietate præditum est, ut non immerito Galenus Naturæ solertiam tantam esse dixerat, ut licet eam tanti viri tam diu inquisiverint, omnem tamen nec dum invenerint; sic nos quoque dicimus, mirum non esse, si priores Anatomici, viri sane oculatissimi, & nunquam satis laudati, non omnia prorsus cognoverint, nec non aliquid inveniendum aliis reliquerint: quin imo existimamus, hanc cognitionem eo nunquam perventuram, quin non aliquid inveniendi locus posteris remaneat, dies enim, ut dici consuevit, diem docet. Hinc factum, quod Constantinus Varolius cerebri sectionem novam anno 1570. inuentam, postmodum aliquot epistolis pposuerit. Qualis autem illa sit, partim ex ipsius epistolis, anno 1573. primum editis, partim ex sectionibus nostris, subiiciemus, cum singulis annis & quidem nunc ab annis quadraginta in theatro nostro Anatomico hanc cum priore auditoribus exhibere assueverimus: quæ sane & Medullæ spinalis & Nervorum omnium inde prodeuntium verum exortum, ventriculorum quæ structuram ad notitiam & explicationem causarum affectuum capitis adeo necessariam docebit, quæ pleraque ex Hippocratis & Galeni scriptis comprobari possunt.

Differentia autem inter utramque administrationem est; quod in priori, remotis à superioribus partibus cranei ossibus & meningibus, partes contentæ exhibentur: in hac vero, quæ laboriosissima & difficilissima, ossa capitis undique remouentur, & partes in cranio contentæ, utraque meninge obvolutæ, una cum oculis appensis, nervorum paribus & spinali medulla proponuntur; & cerebro in verso ab ipsius basi sectionis principium fit: dura membrana à basi cerebri removetur, relictis portionibus, quæ circa nervos sunt, ne nervi disrumpantur: hinc membranam, quæ Spinalem medullam cerebro in parte anteriore alligat, hamulo apprehenditur & forcipibus leviter incisa à subiectis partibus removetur; tunc spinalis medulla ad anteriora reflexa suum principium ostendit & in medio concavitas formata quæ infundibulum dicitur, cuius foramen in medio dictæ membranæ existit: ubi etiam vasorum mutuo se intersecantium plexus, quem Rete mirabile vocant, conspicitur: quibus vasis remotis, medullæ spinalis progressus ad superiora magis apparet. Et si membrana hæc à subiecta medulla versus posteriora removeatur, processus cerebelli ex fibris transversis (Pons Cerebelli) ex quo nervus auditorius prodit detegitur. Hinc tenuis membrana circa commune nervorum opticorum exortum removetur ea dexteritate, ut nervus non lædatur, tunc apparet cerebrum tantum contiguum esse: quæ divisio versus capitis medium circa spinalem medullam prosequenda & cerebrum medullæ adhærens leviter ad exteriora distrahendum, & Opticorum versus posteriora exortus inquirendus, & simul spinalis medullæ primus ortus observandus. Inde secundi paris exortus inquirendus & olfactus organa superiori cerebri parti adhærentia & ad cerebri latera extrema progredientia. His demonstratis, oculis remotis & opticorum conjunctione divisa & in suum latus distracta, pons cerebelli & spinalis medulla juxta capitis longitudinem in duas partes incidenda, cerebellum, processibus tamen ejus spinalem medullam

constituentibus observatis, removendum. Hoc facto altera spinalis medulla pars ad suum latus leviter trahendum, tunc in intima parte rima aliquantisper curva, secundum capitis longitudinem producta conspicitur, cujus internam partem cerebri basis media constituit, exteriorem autem efficit interior pars spinalis medullæ in suo ortu: quibus rimis perceptis, ex altera extremitate, cerebrum in anteriora ferme usque ad extremam illius incidendum sic & in posteriora, tuncque ventriculorum magnitudo insignis & figura apparet, ut & spinalis medullæ radix ad eorum medium & circa illam in ventriculis plexus retiformis dictus repositus est, & tunc optici origo ex ea sede spinalis medullæ quæ internam ventriculi cavitatem respicit, commode videri potest. Verum pro hac sectione caput recens, minime flaccidum requiritur, alias frustra sectionem hanc tentaveris; quare caput humanum, quam primum à trunco remotum fuerit, vel etiam vituli caput recentissimum (cum in huiusmodi non minus, quam humano, omnia recte conspici possint) assumendum.

DE SPINALI MEDULLA.

Primo à Spinali Medulla initium fieri debet, quam ex infima cerebri basi ad magnum occipitii foramen oriri voluerunt [t. 19. fig. 1. D. ad E.] Hæc intra calvariam in sede propria meningibus vestita firmatur; quare crassa meninge remota, altera tenuis auferenda, quæ lucida est & robusta, mediante qua medullæ anterior pars cerebro, & posterior cerebello annectitur: verum & spinalem medullam, ne retro flectatur, detinet: quæ forte causa, cur Anatomici verum ipsius exortum non agnoverint: ea enim hamulo apprehensa, & leviter forcipe à subjectis partibus sectione remota, spinalisque medulla versus anteriora reflexa [tab. 19. f. 2. a. b.] ipsius exortus se offert, qui non in occipitio, vel ubi prius alligata erat, sed sursum magis ascendens in anteriore cerebri parte existit. Constat autem ex quatuor velut radicibus, quarum duæ maiores [tab. 19. f. 2. b. c. truncus reflexus: 4. 1. truncus in sua sede.] ex duabus cerebri partibus sede ea, in qua ventriculi ab anteriore cerebri prominentia ad medium reflectuntur [t. 19. fig. 2. f. g.] circa quam nervus opticus [tab. 19. f. 2. e. d.] extra ventriculum fertur: ex quibus duobus truncis nondum ad cerebellum perventis, duo prima nervorum paria quæ ad oculos mittuntur, nascuntur. Dein ex duobus brevibus truncis cerebelli [tab. 19. fig. 2. char. 6.] ex inferiore ejus parte utrinque enatis, qui cerebri majoribus processibus (ubi aliquantulum in posteriora progressi sunt) junguntur [t. 19. fig. 2. inter char. 2. & 3.] & ex quatuor duo fiunt, [tab. 19. fig. 1. E.] qui postmodum spinalem medullam integram constituunt, à qua omnes totius corporis nostri nervi^b ortum ducunt, quemadmodum diligens inspectio sufficienter probat. Verum hoc necessarium & utile fuit, siquidem omnium rerum principia firma esse debeant: quod vero magis unum est, procul dubio firmitus atque solidius est: quare Nervorum omnium principium

^b Gal. 8. us. par.
13. & alibi as-
s. it. omnes ner-
vos spinali me-
dulla attribui-
tos, à cerebello
nasci: ita ut

secundum ipsum spinalis medulla à cerebello pendeat. Alii (ut Columb.) à cerebello nullum nasci nervum, Galenum increpantes, affirmant. At Vārolius asserit, Galeni sententiam secundum quid veram esse, aliorum Galeno repugnantium simpliciter falsum esse: quia spinalis medulla ex duabus radicibus cerebri, unde duo nervorum paria procedunt, & ex duabus cerebelli, qua prædictis junguntur, & simul spinalem medullam constituunt, & sic omnes nervi spinalis medulla ex cerebello oriuntur.

pium unum esse decebat. Nam si arteriæ & venæ omnes ad unum principium, illæ ad eor, hæc ad hepar, reducuntur; pari pacto & nervi ab uno principio prodire debuerunt, cum hæc tria sint corporis organa communia, per quæ facultas animalis, vitalis, naturalis, ope spirituum cum sanguine vitali & naturali deferuntur. Quod & Hippocrates & Plato agnovisse videntur. Hippocrates quidem, qui nervorum exortum ab occipitio esse scripsit. Plato vero in Timæo, de omnibus nervis verba faciens, scripsit, Deum nervos extremæ capitis parti circumposuisse nervum spinæ dorsi similitudine quadam circumplicasse. Debit autem spinalis medullæ origo ex media cerebri parte esse [tab. 19. fig. 2. b. c. & char. 4. hoc ostendit.] nam per ipsam, tanquam per communem aquæ ductum, in alios rivulos & ab iis in uniuersum corpus spiritus, qui in medio cerebri perficiuntur, derivandi erant, debuit sane illorum principium in cerebri centro & prope spirituum officinam, ut inde abunde hauriant, collocari: quemadmodum arterias ex cordis, venas ex jecoris fere medio prodire, Anatome docet.

Obiiciunt, truncum hunc, quem spinalem medullam hic vocamus, non esse ita nominandum, nisi quando spinæ vertebrae ingressus est; quare non recte dici opticos nervos à spinalis medullæ principio oriri. Respondemus, capite de spinali medulla hac de re actum esse; addimus tamen per instantiam, an non nervi visorii, auditorii & reliquorum sensuum, nomina obtineant ab organis, ad quæ mittuntur, antequam ipsa contangant, & quidem in cranio adhuc existentes, ita & hæc medulla, spinalis medulla nominari potest, antequam spinam ingrediatur; si quidem intra calvariam à cerebro divisa propriis fibris prædita observetur.

DE CEREBELLO.

Secundo ad Cerebellum faccendum [tab. 19. f. 1. BB. fig. 2. char. 8. 9. 10. quod à meningibus denudatum est, & præter duos processus vermiformes, qui partes cerebelli sunt, & duas partes laterales, quæ duos globos invicem appositos referunt (de quibus in prior sectione dictum fuit) adhuc processus quidam ipsius explicandus occurrunt. Processus hic insignis est [tab. 19. fig. 1. k.] qui utrinque ex cerebello prope truncos spinalem medullam constituentes oritur, qui per transversum in anteriora & inferiora fertur, quo mediante cerebellum spinalem medullam in anteriore parte amplectitur; eodem quo, musculi laryngis transversales, tertium par communium constituentes œsophagi principium (hinc œsophagei dicti) posterius complectuntur; & hic, serie fibrarum transversalium cum eminentia, à fibris rectis spinalis medullæ distinguitur. Hic processus sedem habet intra calvariam prope foramen spinalis medullæ in anteriore parte, ubi quædam notabilis depressio transversalis, quæ huic processui locum dedit, conspicitur. Hunc processum Varolius pontem cerebelli vocat, à similitudine quam representare videtur, quia sub hoc processu transversali spinalis

Yy 3

me- vos opticos at- que alios mul-

lam differentiam agnovit, quam quod ii fistulæ & cerebrati sint, ceteri vero solidi: varia ipsius originis perinde ac rei non existentis, nullam omnino mentionem fecit, Mercur. ad Varol. e Hi legant Vesalium qui lib. 4. aperte docet quartum, quintum, sextum ac septimum par nervorum cerebro a scriptorum ducere suam originem ex principio spinali medulla, & tamen oriuntur ex magno illo trunco antequam spinam ingrediatur. Arist. 4. hist. an. 16. vult cerebellum & tractu & specie à cerebro formam diversam habere. Meletius scribit, cerebellum cum cerebro eundem ortum & colorem gerere.

c in princip.
lib. de off. nat.
text. 16. nervo-
rum exortus ab
occipitio usque
ad spinam, ad
coxendicem, in
puenda, in fe-
mora, pedes, ti-
bias, in manus.
Sic 2. epid. sect.
4. duo inquit,
sunt crassi ner-
vi à cerebro
sub os magni
verriculi su-
perne & magis
ad gulam ab-
utraq. arte-
ria parte uter-
que progressi-
ens inter se com-
mittuntur, ut
uni similes exi-
stant; deinde
verricula, ac
septum trans-
versum, hic
sunt, ubi desi-
nunt: & qui-
dam dubii ad
hepar & sple-
nem ab hac so-
cietate rendere
runt: hac ille.
d Et Meletius
lib. de nat. hom.
oculorum fa-
bricam expo-
nens, inter ner-
vos opticos at-

medulla feratur, eo modo quo canaliculus quidam fluens sub aliquo ponte ferrur. Ex hoc processu (nullo modo à cerebro) nervus auditorius pender & nascitur [tab. 19. f. 1. ii.] ita ut pronuntiare liceat, cerebelli usum quoque esse, ut sensus auditus

g Arist. 11. pro-
bl. 1. querit cur
sensum audi-
tus maxime ab
ortu natura of-
fendi possit? An
quod auditus
est vox ab eo-
dem principio
proficisci vide-
antur: atqui lo-
cutio facile de-
pravari posse
videtur, qua
votis species
est, eademque

primum principium sit. Et hic nervi auditorii exortus, causam & docet, cur à nativitate plures auditu capiantur, quam nullo alio sensu: nam cum à cerebello prodeant, nec longe producantur, facile mucosis excrementis opplentur. Hinc fit, quod semper à nativitate ambæ aures afficiantur, ut Cassius^h docuit, cum ex morbo plerumque unam autem solum affici contingat. Quatenus ergo spinalis medullæ fere dimidium, & processus pons dictus, à quo nervus auditorius nascitur, à cerebello prodeant, Galenusⁱ perperam à recentiorib. reprehenditur, dum nullum nervum à cerebello originem ducere contra Galeni sententiam astruunt. Quare nervi quidam nascuntur à cerebro tantum, & non à cerebello, quales sunt optici: quidam à cerebello tantum, non à cerebro, quales sunt auditorii; quidam ab utroque simul, sicut sunt nervi spinæ: nullus autem immediate ex aliquo duorum principiorum, sed omnes ex suis principiis nascuntur, vel mediante medulla spinali, vel mediante processu transversali dicto.

perfici difficilime potest: Indicium huius est, quod postquam nati sumus, diu obmutescimus, dein balbutire incipimus. Cum itaque facile locutio perverti possit, idemque audiendi & loquendi initium sit, sequitur ut quasi per accidens, non per se, omnium sensuum auditus facillime interimi possit. Argumentum autem facile omnino loquendi principium destrui posse, vel ex cæteris animantibus erui licet: nullum enim loqui ex cæteris potest: sed homini tantum facultas hæc data est, & tamen hic sero loqui incipit.

h Problem. 17. i 15. us. part. 13. & alibi asserit, omnes nervos spinali medulla attributos, à cerebello nasci: ita ut secundum ipsum spinalis medulla à cerebello pendeat. Varolius, secundum quid Galeni sententia vera est.

DE NERVIS OCULORVM.

f Piccolhorn.

lect. de Nervis
inquit, omnes
nervos proxi-
me à medulla
cerebri nasci,
ad quod pro-
bandum nulla
ratio, nulla
ratiocinatio lo-
cum habet:
huius itaque
rei sensus ipse
iudex erit, qui,
quod scribo, fa-
cillime agnos-
cet, si nervo-
rum Anatome,
de origine eo-
rum exercea-

f Nervi oculorum nunc explicandi; & cum duo paria ad oculos mittantur, optici & motorii, de illis primo. Nervis opticis ex basi cerebri, sed parte anteriore [tab. 19. f. 1. i.] ortum tribuunt: cum tamen secundum magnam eorum partem ulterius progrediantur [tab. 19. fig. 1. p. ad b.] & latentes in spatio quodam formato inter cerebrum & spinalis medullæ principium versus occiput feruntur, ubi ex principio truncorum priorum spinalis medullæ [tab. 19. f. 2. b. c.] qua ventriculorum cerebri cavitatem [tab. 19. fig. 2. g.] respiciunt, exoriuntur [tab. 19. fig. 2. * origo ipsorum.] & in posteriore ejus parte versus medium reflectuntur [tab. 19. fig. 2. d. e.] Quare cum horum nervorum in occipitio pene origo sit, hinc cauteria occipiti infixa, oculis & visioni magnum usum adferre, quotidie experimur; haud dubie ex eo, quod opticorum principio depurato, atque confirmato, visorij spiritibus liberior excursus conceditur. Hos si demonstrare velis, est ut tenuem meningem eo loci, ubi optici communiter oriri dicuntur, sine tamen nervi latione removeas, tunc videbis cerebrum ibi tantum contiguum esse, mox cerebrum leviter à medulla ad exteriora distrahe, donec opticos ibi latitantes inve-

itur, capite inverso, hoc est, cerebri basi sursum spectante, sic aperte videbis, quos nervos sensus ex naturali cerebri situ deceptus iudices, oriri ex cerebro, palam interno sciet nasci à medulla cerebri. Meminit etiam Dominicus Leonus originis nervorum ex Varolij sententia, in sua praxeos lib. 1. in reliquis cerebri partibus, antiquorum opinioni insistenti, & Plat. Profundius in cerebro ipsorum initia à cerebri substantia adhuc separata inchoare, Varolius primum observavit.

invenias, & si specillum inter ipsos & partes, quibus inhaerent, intrōmiseris sine violentia à subjectis partibus elevabis usque ad eorum exortum, & simul spinalis medullae ex cerebro origo se offert.

Nervos motorios [tab. 19. fig. 1. char. 2.] prope opticos aliquantisper exterius principium suum habere statuunt; at si cerebri protinacula quaedam versus medium incidatur, à cerebro distinctos, ad mediam capitis sedem accedere, & infra opticos interculsione facta [tab. 19. fig. 1. d.] progredi conspiciuntur, & ad principii spinalis medullae intimam partem enascuntur [tab. 19. fig. 1. e.] & in ortu sic uniuntur, ut in angulo se mutuo contingant; quae forte causa, quod ambo oculi simul ad easdem partes moveantur, & alterum sinistrorsum, alterum dextrorsum, alterum sursum, alterum deorsum, simul nunquam distrahare possimus * quia unicum principium motus habent ortum, scilicet nervorum motoriorum.

Reliqua vero nervorum paria cerebri dicta, à spinali medulla prodire, etiam Vesalius tertio tantum excepto, & Columbus etiam tertium cum ceteris subsequenteribus produci tradiderunt: verum & duo priora paria, hinc oriri, ex praedictis patet.

sum sinistrorsumque, nunquam autem utrumque seorsum, alterum sinistrorsum, alterum dextrorsum simul distrahare possimus. An propterea quod ex eadem origine, a quo modo nexus, aptusque dependeat: ubi enim alterum extremum movetur, reliquum eodem consequatur necesse est, &c. Idem sentit Avicenna. Verum Laur. hanc coitus causam non valde probat, quia Vesalius observavit Opticos nulla parte coeunt, qui tamen toto vita tempore de visionis depravatione nunquam conqueustus fuit, &c. hanc Arist. optionem refutans: verum Aristoteles nil de optiorum coitu hoc loco scribit: nec motus oculi ab opticiis fit.

Arist. 31. prob. 7. quare quam ob causam utrumque oculum simul movere dextrorsum

DE OLFACTVS INSTRUMENTIS

Olfactus s instrumenta five cerebri processus anteriores, qui inter nervos opticos ad rimas ossis spongiosi in naribus locati progrediuntur, ex cerebri basi [t. 19. fig. 1. F.] prope nervorum opticorum conjunctionem [tab. 19. fig. 1. e.] nasci asserunt. Verum g horum instrumentorum solum dimidium haecenus ostenderunt, siquidem praeter id quod ostendunt [tab. 19. fig. 1. ab m. ad anteriora.] tantundem etiam progrediuntur [tab. 19. fig. 1. ab m. ad l.] inter anteriorem & mediam cerebri prominentiam latentia: eorum enim progressus est ad posteriora, & quanto magis progrediuntur, tanto invicem recedunt, magisque attenuantur, usque dum ad cerebri latera extrema [tab. 19. fig. 1. ad n.] in regione, quae supra foramina auditus est, in mucronem acutissimum, inde principium sumentes, finiunt. h Hinc forte fit, quod olfactula so, simul & auditus non nihil affici-

Processus mammillares naribus imminentes non sunt olfactus instrumenta, sed tantum opercula, ne aer in cerebrum cumulatim irruat.

obsero. in Columb. Processus mammillares vulgo vocati, aut dua illa crassiuscula partes, his processibus appensa, principalis odorandi instrumentum sunt, in anteriore cerebri parte sita, ad ejus basim divergentes, ethmoidis eminentiori parti utrinque unus assidens, figura oblongi sunt, non penitus globosi sed paulo latiores: magnitudine parvam vermem olfericum aequant, quae tenuis meningis interventu cerebro astringuntur: principium à quo prodeunt videntur agnovisse nervos odoratorios, qui in hos duos processus degenerare videntur. At Nervi odoratorii proxime subjecti sunt nervis visoribus, & oriuntur à posteriore medulla cerebri parte, ubi quartus ventriculus excavatus est, & in partem anteriorem progressi, excurrunt inter cerebrum & os sphenoides, quoad intraduntur in processus mammillares: dati sunt, ut sint canales, per quos odorandi facultas in spiritu animali, hausto à quarto ventriculo, insidens evehatur in processus mammillares, sicuti per nervos opticos videndi vis in oculos fertur. Hi in cerebro recenti accurate exploranti maxime perspicui sunt, Piccolhom.

h An ex hac sympathia solvi possint problemata ab Aristotele 11. problem. 4. & 33. prob. 14. nec non à Cassio probl. 23. proposita, cur scilicet surdastri ex naribus loquantur.

afficiatur. Sic videmus saepe, ubi nares & olfactus præ gravedine læduntur, simul & auditum nonnihil offendi: sic inter sternutandum, inter emungendum, in retinendo spiritu naribus oclusis, illico auditum & aures compati, re ipsa sentimus: sic qui olfactum amittunt, citissime surdastri fiunt.

DE VENTRICVLIS CEREBRI.

His demonstratis, oculis nervisque opticis in suum latus distractis, pons cerebelli, spinalisque medulla per longitudinem in duas partes secanda, dein cerebellum penitus removendum & spinalis medullæ altera portio in suum latus trahenda; & cerebrum ex altera unius extremitate tam antè, quam postè incidendum, ad ventriculorum cerebri magnitudinem & figuram demonstrandam, cum in situ, magnitudine, forma, numero & usu ipsorum, hæc administratio ab aliorum demonstratio-
ne magnam varietatem ostendat.

*i Arantio in
observ. anat.
exp. 1. At Va-
rolius, inquit,
quanto magis
numerus au-
geatur, tanto
majorem fieri a
veritate reces-
sionem: nam
duos tantum
sunt, quibus
ventriculi no-
men competit,
nisi improprie
loquendo: ut si
eui arideat
spatio, qua in-
ter intestino-
rum circumvo-
lutiones extra
intestina for-
mantur, ven-
triculos appel-
lare. Addimus
eos qui sex
agnoscunt, in
eo decipi,*

Ventriculos quatuor esse, communis est sententia, licet quidam sex esse velint: & hi quatuor antiquorum ventriculos admittunt, & sub his duos alios constituunt, quos à forma Hippocampis similes denominant; sed revera tantum duo sunt. Cum enim cerebrum & hominis & aliorum animalium duplex sit, ut primus Hippocrates & post ipsum Aristoteles docuit, videtur æquum fuisse, ut unaquæque pars ventriculorum haberet. Nam duo, quos in cerebri anteriore parte reponunt, eadem ratione tam in media & posteriore, quam anteriore cerebri parte siti sunt, quemadmodum enim cerebrum in anteriore parte excavatum est, ita etiam est in omnibus aliis partibus secundum eandem cavitatem: longe enim majores sunt, quam communiter demonstrantur, cum eorum vix quarta pars hæcenus ostensa fuit: nam magnitudo ipsorum proportionem totius cerebri magnitudini ejusque prominentiis, quoad formam, correspondent: nec dubium cavitates in viventibus longe majores esse, siquidem in mortuo cerebrum, quod spiritibus extensum erat, iis privatum in se confidet, & sic cavitates minuantur. Figura eorum cerebri figuram insequitur: est autem cerebrum utrinque oblongum, & qua dextra & sinistra parte se mutuo respiciunt, planum & depressum, in aliis partibus prominentias sphaericas habet, ossium concavitatibus respondentem. Sunt autem tres cerebri prominentiæ: anterior, media & posterior. Anterior prominentia cavitatem ab osse frontis & parte ossis spongiosi & ossis syncipitis, & osse sphænoideis efformatam, replet: media & inferior cavitatem utrinque excavatam ab ossis sphænoideis parte posteriore & anteriore ossis petrosi, nec non ab osse temporali implet; posterior cerebri eminentia cavitatem à superiore parte occipitii, postre-

quod totos ventriculos non perpenderint: sunt enim quintus & sextus cum primo & secundo continui, de his sic Piccolhom præter quatuor ventriculos cum sub prioribus & superioribus alia duo cavitates satis insignes insideant, in quos à superioribus decurrit spiritus animalis, quasi qui ventriculos appellare velis, profecto ventriculi in medulla cerebri excavati senario numero constituendi erunt: attamen hæc cavitates, cum prioribus sine continuata priorum superiorumque ventriculorum anfractus quidam & reverte productiones existimantur. Sic Laur. Arantius duos addit sub prioribus, quos ab Hippocampi figura denominat; sed existimo, hæc partes esse superiorum, qui ita ampli sunt ut vix tertiam eorum pars in sectionibus publicis ostendatur. k Libro de sacro morbo. l 4. hist. an. 6. m Arist. 1. hist. an. 16. ait cerebrum plurimorum exiguum in ipso cavitatem habere; an hoc de ventriculis intelligendum?

postrema ossis sphænoidis & ossis petrosi produciam opplet. His prominentiis ventriculorum cavitas responderet: etenim ab anteriore prominentia sinus insignis fertur usque ad postremam, qui sinus à cerebri superficie, tantum in posteriore parte, quantum in anteriore, distat. Verum ubi ad angulum in superiore parte ossis petrosi per- venit, ad cerebri prominentiam mediam & inferiorem reflectitur, eademque ratione ei prominentia; qua in anteriore & posteriore, insculpitur, estque tota unica cavitas: ita ut universum cerebrum, quod in ambitu ventriculorum crassissimum est (si vulgo in reliquis partibus sit) corticis ° instar cavitates has geminas ambit; & sane una cavitatis dici posset, nisi beneficio Sephi quod corpori calloso subjacet [tab. 19. fig. 2. m. n. o.] distingueretur. Et hi tantum sunt ventriculi cerebri: quibus proprie ventriculi nomen competit; quid autem sit tertius & quartus ventriculus dictus, nunc ostendamus.

Totum cerebrum, in duas partes dividitur, solumque in media inferioreque parte beneficio corporis callofi [tab. 19. fig. 2. m. n. o.] jungitur, quod nihil aliud est nisi cerebrum, ea in parte conjunctum. Vbi enim cerebri partes dextra & sinistra jungendæ sunt, aliquantulum extrorsum se distantur: dein albicantes ad medium reflectuntur & simul uniuntur, quæ unio convexitatem quandam habet cerebri convexitati in superiori parte proportionatam, quod sua longitudine futura sagittalis longitudinem æquat, & quod cæteris partibus durius esse volunt, cum tamen cerebrum mollior æquet, & quemadmodum ventriculorum partes internæ, albicat; hujus copulæ pars inferior, Fornix appellari consuevit.

Sic & spinalis medullæ ortus duplex est, utraque enim cerebri pars suum truncum producit ex ea sede in qua ventriculi ab anteriore cerebri prominentia ad medium reflectuntur: qui trunci duo ubi primum teretes & rotundi sunt formati, se mutuo contingentes, aliquantisper in anteriora feruntur, dein in posteriora versus foramen occipitii revertuntur: in primo illorum contactu cum corpora rotunda sint, levem quandam cavitatem angularem inter se faciunt, cui cerebri basis unita superjacet. Unde ex corporum prædictorum contactu, spatium id, quod tertium ventriculum vocant, formatur, quod extra cerebrum est, & ex necessitate, propter horum corporum conjunctionem, formatum est. In hujus autem superiore parte ad latera, rimæ duæ oblongæ sunt, quæ fere per truncorum spinalis medullæ mediam circumferentiam feruntur, & ventriculos cerebri ingrediuntur, eorumque beneficio ventriculi, ad tertium dictum ventriculum, exitum habent. Et quia prædicti trunci usque ad sellam sphænoidis, ubi infundibulum est, pertingunt, idcirco tertii ventriculi meatum anteriorem ad eam partem pervenire statuunt.

Quartus vero dictus ventriculus, sinus est inter inferiorem cerebelli partem & superiores truncos spinalis medullæ, ubi spinalis medulla instar calami scriptorii excavata conspicitur: propterea quod trunci sunt à cerebello nascentes, qui antequam ex toto uniantur, cum aliis à cerebro natis per aliquod spacium supra eos progrediuntur, aliquantulum invicem distantes: unde necessario illa cavitas sit, quæ tamen in spinali medulla exculpta non est, nec per se à natura intenta. Hic vero sinus, à truncis duobus à cerebello ad spinalis constitutionem enatis, formatur, & ex distantia utriusque propaginis cerebelli, producitur. Antequam enim cum duobus majoribus

Cur ita figuravit? cur spherica figura neglecta sit ipsum in se re- duxit? Resp. Mercurialis, an sicut in locis ubi aqua movenda est aliqui anguli ex obliquo interponuntur, quibus illius impetus, fractio recto cursu, retardetur: sic ad spirituum motum, ne cerebri parietibus efficeret, ejusmodi angulos intro reductos sagax machinata est Natura? o Piccolli. id quod cerebrum communiter vocatur, divi dit in cerebrum & medullam cerebri; cerebrumque vocat id, quod ventriculos circumgit, medullam vero cui ventriculi insunt, ejus callosum corpus portio est.

Zz

truncis

truncis è cerebro natis uniantur, supra hos invicem aliquantum distantes progrediuntur, ita ut cavitas illa necessario fiat, & non secus quam tertius dictus ventriculus, extra cerebrum cerebellumque situs est.

Foramen autem tertii ventriculi posterius, quod aliqui ano simile faciunt, quartumque ventriculum ingrediasserunt, nihil aliud est, quam spatium ex contactu quatuor truncorum spinalis medullæ efformatum, ubi trunci à cerebello orti primum deorsum fleuntur & truncis majoribus è cerebro natis, adhærent.

Nates & testes, seu quatuor orbiculares prominentiæ hic occurrunt, quas in cerebro esse dicunt; cum tamen revera extra cerebrum sint, & spinalis medullæ principia existunt; & quidem Nates nil aliud sunt, quam portiones radicum spinalis medullæ à cerebello prodeuntium, quemadmodum Testes exiguae portiones radicum à cerebro productorum.

p 8. us. part. 7.

cap. 9.

q 8. us. part. 10.

Quoad ventriculorum usum communis est sententia, eos esse spiritus animalis conceptaculum; quemadmodum sinister cordis ventriculus spiritus vitalis locus est: etsi non negemus uni parti diversas utilitates præ assignari posse; cujus nomine Galenus 1 ventriculos superiores & præparationi spirituum & supervacuorum expurgationi inservire dixit: attamen hos ventriculos humoris pituitosi in cerebro geniti receptacula esse censemus, qui per infundibulum ad pituitam defertur & expurgatur. Ad solum enim infundibulum, nec ad alium locum, ventriculi exitum habent. Spiritus vero animales per totius cerebri cerebellique substantiam disseminatos existimamus. Illud ostendimus primo Hippocratis testimonio, qui ubi tradidisset hominem ex quatuor humoribus constare, cuilibet proprium locum tribuendo, sanguinis & spiritus locum in corde esse dixit, flavæ bilis in jecore, atræ bilis in liene, & pituitæ in cerebro. Quod si in cerebro locus sit pituitæ, necessarium erit, cavitationem aliquam adesse, quæ eam continere possit, quemadmodum in corde ventriculus, ad hepar vesica biliaria & spongiosa porositates lienis: at præter duos hos ventriculos cavitas alia in cerebro non est. Secundo probatur glandularum usu universalis, qui est humiditatem superfluum absorbere: jam cum in ventriculis his glandulæ in plexu reperiuntur, sequitur in ipsis pituitam colligi, quæ à plexu in ventriculos destillat & colligitur (tantam enim copiam absorbere non possunt) alias frustra vel glandulæ essent adpositæ, vel utilitas ab Hippocrate posita vana esset. Tum, omnibus notum, pituitam à cerebro per infundibulum ad palatum stillare: at infundibuli principium est in ventriculo, & ad infundibulum ex nulla cerebri parte meatus est, quam ex dictis ventriculis, quare eam primum in ventriculis coacervari nemo negabit. Quarto ex necessitate probatur, excrementum hoc pituitosum cavitatibus magnis indiguit; nisi enim in aliquo spatio secundum quandam quantitatem colligeretur, continuo expuere oporteret (eo modo quo illi, in quibus nulla sit urinae collectio, ut in Diabete, qui continenter mingunt) sicque locutio aliæque actiones nobiles impedirentur. Quare cum natura cuilibet excremento proprium locum destinaverit, in quem convenienti quadam quantitate recipiatur, unde postea certo temporis spacio expelli possit: idem in hoc pituitoso excremento quotidie experimur: quandoquidem dormientes per septem aut octo horas plerumque nihil expuimus, at quamprimum expergefacti sumus, brevi tempore magnam quantitatem expuimus: quæ sane quantitas cum in cavernis narium colligi tota non possit, opus habuit cavitatem aliquam

aliqua in cerebro, in qua colligeretur. Videmus quoque ad sensum, quod si quicquam voluntarie expuens, superiores palati partes veluti sugat & emungat, in oris cavitate excrementi copiam colligit, eam expellit: quod si statim iterum expuere velit, minorem copiam sputi ejiciet, & si subito denuo hoc tentet, adhuc minus expuit, ita ut brevi eo perveniat, ut quamvis maxima cum violentia palatum sugat, nil omnino ad expuendum colligere possit. Ubi vero aliquot tempus interposuerit, iterum facile excrementum in cavitatem oris descendet. Quod signum est evidentissimum, hanc materiam prius in aliqua quantitate colligi antequam expellatur, quemadmodum in urina & fecibus videmus. Concludentes dicimus has cavitates excrementa illa recipere, quia ipsos plexus ingrediuntur, humidum importantes, & quia solum ab ipsis ductus humidum exportantes egrediuntur. Objicit Mercurialis, quomodo fieri possit, ut in eo loco, ubi corpora purissima & subtilissima, nimirum spiritus quasi in fornace excoquantur atque perficiuntur, ibidem humor crassus, frigidus, obscurus & spiritibus adversissimus colligatur? imo quando fiat apoplexia, epilepsia, incubus, ab omnibus medicinarum scriptoribus causas has assignari, quod vel pituita, vel melancholia, vel crassior flatus in ventriculis conservetur, quæ aut ex toto, aut magna ex parte eos opplentes, spiritus veluti strangulentur, quod & ænigmate nobis secundum Galenum * significavit Hippocrates, † quando scripsit, fieri melancholiam, * 3. loc. aff. 7. † 6. epidem. in fine sect. 8. cum humor in mentis sedem; epilepsiam, cum in corpus cerebri labitur. Hippocratem etiam imitatus Plato in Timæo, non aliter sentit, scribens, sacrum fieri morbum, quando pituita melancholiæ permixta divinißimos cerebri meatus ingreditur. Respondet Varolius, ad causam apoplexiæ, epilepsiæ, incubi, quamvis aliquando legerim apud Hippocratem † Apoplexiam ob cerebri corrosionem fieri, & † Epilepsiam fieri ex sanguine perturbato & conspurcato in omnibus venis: pariter in lib. de morbo sacro † prodire ex venarum obstructione; viderimque Galenum * dubium, † Lib. de flat. an in epilepsia obstructio fiat in ventriculis cerebri, an in spinali medulla; quare lib. 19. cap. 20. ut ex. 7. & 8. benter concedam tales horum morborum causas assignari. Quibus suppositis, forte non inconvenit ventriculos (licet in ipsis non contineantur spiritus animales) huiusmodi quodam viscido, aut flatu crassiore, quandoque ita repleti, ut prima spinalis medullæ radix ex abundantia illa ubi ob infundibulum obstructum, is non expurgatur) comprimatur, unde transitus spirituum à cerebro ad ipsum cohibeatur, tollaturque sensus & motus in universo corpore; ea ratione, qua vesica in suppressionibus urinæ præter modum extensa, comprimendo intestina facibus effluxionem prohibet. Quod si hoc non ardeat, Galenum l.c. imitatus, dicam, epilepsiam & reliquas similes affectiones, provenire à spirituum obstructione, quæ ab humoribus principium spinalis medullæ præter naturam irrigantibus causatur. Cui sententiæ favent dissectiones eorum, qui Apoplectici moriuntur, in quorum ventriculis cerebri non reperitur major excrementorum copia, quam communiter in omnibus aliis reperiri soleat. Dein objiciunt, in epilepsia, apoplexia & incubo spiritus animales in ventriculis cerebri existentes strangulari, vel à transitu impediri. Respondet, hos morbos minime fieri, à quolibet humore aut flatu ad ventriculos quomodolibet accedente; sed ob multam copiam, insignem crassitiem & subitum ingressum. Quare quemadmodum excrementa per palatum & nares descendunt, nullam noxam gustui aut olfactui inferunt, si moderate & secundum naturam organa illa permeant;

ent; eorumque operationes vel imminuunt, vel ex toto auferunt, si in quanto, aut quali modum naturæ excedant: ita de excremento ad ventriculos cerebri accedente, ab eisdemque recedente, asserendum esse existimo. Posterius vero de spiritibus per substantiam dispersis, probamus Galeni testimonio, dicentis, spiritum animale in toto cerebri corpore multa copia contineri, similiter in corpore cerebelli, cui principium nervorum totius corporis tribuit: & ex hoc inferit, necessarium esse, ut quam plurimis spiritibus sit refertum. Quod si ergo cerebellum omni cavitae destitutum, sua substantia spirituum copiam continet, quæ à cerebello ad tot, & tam longe ab ipso distantes nervos fluit, cur non eodem modo magis è cerebro, sine cavitatibus ad pauciores & longe proximiores nervos fluet? Cum igitur spiritus animalis absque omni ductu sensibili possit fluere & refluere, cur non possumus cerebri substantiæ illud tribuere, quod quidam ventriculis non recte observatis tribuunt?

DE PLEXU CHOROIDE.

Plexus tandem, quem choroidem seu retiformem vocant, in cerebri ventriculis existens [tab. 19. fig. 2. i. k.] ex toto glandulosus videtur, ita ut & substantia & colore glandulæ pinealis assimiletur: diligenter tamen, si tractentur, nil nisi membranas latiusculas & oblongas ex tenui membrana pronatas esse pronunciare licebit: ex quarum parte altera, secundum totam longitudinem vasculum quoddam crassiusculum humore excrementitio plenum appensum est, quod intestinum suo mesenterio adnexum repræsentat, per quod vasa angustissima feruntur: at in hoc, proportionem habita, glandulæ in maiore copia sunt, quam in mesenterio infimi ventris; quod puichre apparet in capitibus eorum, qui cerebro sunt humido, quare multo magis naturæ rei convenire, si plexus glandulosi, quam retiformes appellentur, Varolius asserit; Quod si quis dubitet, an eorum substantia talis sit, eum ad inspectionem remittimus, a nulla enim melior ratio probandi nunc occurrit. Huius usus esse videtur, ut aliarum glandularum more superfluum cerebri humiditatem depascantur, in omnibus enim corporis partibus glandulas hoc præstare, & totum corpus humido superfluo à glandulis exonerari Hippocrates b singularum glandularum totius corporis inductione probat; imò universam cerebri substantiam talem esse, idem statuit. De reliquis vero partibus hic non propositis, statuendum est, quod in priori sectione monuimus.

Quod si lubeat in hac sectione omnes partes demonstrare, hoc ordine progrediendum erit: Omissis omnibus capitis, sectione per longitudinem, tam parte superiore quam inferiore, tam anteriore, quam posteriore ducta, ablatis, & à crassa meningemotus, ipsius crassæ meningis sinus demonstrandi; mox cerebro inverso, ad ejus basin meninx à spinali medulla removenda, relictis tamen portionibus meningis circa nervos, ne disrumpantur, quo ipsorum origo monstrari possit; succedit rete dictum c mirabilibusque quod cerebra putida secarunt, in quibus illi contextus in se concidunt, & insigni humiditate persusi, turgent speciemque mutant, ut parvarum earumque pene infinitarum glandularum formam exhibeant. Hæc Archangel. lib. 3. lib. 5. b Lib. de gland. text. 2. c Sub ipsa membrana spinalem medullam investiente, vasorum mutuo se intersecantium plexus apparet: quod si cuiquam arrideat, rete mirabile vocare, nihil curo: Varolius. In cavitare calvaria & ad.

Et ad sellam sphenoidis arteria ascendit, ubi sub dura membrana adhuc latens in brutis animalibus infinitas propugnacula à se demittens rete mirabile efformat: in hominibus vero non insigne hoc reticulum, sed ipsius potius vnam ac imaginem quandam producit, Fallop. in observ.

rabile, cum glandula pituitaria, quæ pene quadrata est, infundibuli collum, quæ extra crassam meningem subsistunt. Hinc ad spinalis medullæ membranam, ipsam medullam, qua sublevata, nates & testes, foramen in quartum dictam ventriculum, quatuorque ventriculus conspiciuntur, quæ extra cerebrum sunt, ipsum cerebellum, ipsius processus, nervum auditorium, nervos oculi motores & opticos, olfactus organa, ventriculos cerebri duos, cum eorum foramine in infundibulum, & ipsorum corpus callosum, fornicem, plexum choroidem, glandulamque pinealem, accedendum est.

De Capitis altera parte, quæ Facies dicitur.

CAPUT XXIX.

De Facie egit Aristoteles 1. histor. an. 8. at de maximo naturæ studio in hominis decore & pilis in facie, vide Galenum 11. usu part. 14.

Capitis parte capillata, quam ab Aristotele ^a τελεωτον dici supra monuimus, explicata, nunc alteram quæ glabra est & calvæ ^b subiecta, demonstramus. Dicitur ^c hac in homine πεδωπων, & nomen ^c à te ipsa accepisse videtur, monente Philosopho, quod πεδωπων ανθρωπος, antrosum prospiciat: ^d unus enim animalium ^e homo erectus est, solus prospicit anteverfus, vocemque anteverfus mittit. Latinis facies quæ uni homini concessa (cum reliqua animantia os, vel rostrum habeant) quæ secundum Grammaticos à faciendō sic dicta, quod maiore apparatu quam ceteræ partes fabricata fuerit, vel quod homines à brutis differre faciat: in cuius decenti confirmatione elegantia potissimum consistit: dicitur & vultus, à voluntatis indicio, quia pro voluntatis varietate mutatur. Hujus partes duæ sunt, superior, quæ ^f μετωπον, ^e frons, à ferendo quod animi indicia ^g præ se ferat, proprie dicitur, cum tristitiæ, hilaritatis, gravitatis & humilitatis sedes sit, quam partem alii ad faciem, alii ad caput referunt: si corpus integrum perpendatur ^h ad faciem, si vero sceleton, ad cranium pertinebit. eius extrema sunt supercilia; inferior ⁱ pars est à superciliis ad extremum mentum, & pluribus partibus donatur, de cuius partibus externis fusc egimus libro nostro primo, qui de partibus externis inscribitur, cap. 3. At utriusque partes sunt duplices, continentes & contentæ.

Continentes communes & propriæ: communes, cuticula, de qua libro primo: Cutis, quæ in facie, ut & digitorum extremis, pene & seroto, tenuissima est; quæ in malis plerumque rubet, propter affluxum sanguinis à venis jugularis externæ ramo exteriori. ^{repro-}

Unde Plato, referente Plutarcho, ex faciei dignitate, prædixit Alcibiadem ad summum Reipub. fastigium perventurum. Et Nicomachus apud Stobæum monet, studiose considerandam esse faciem ejus, quam quis pro uxore eligere vellet, ut ejus cum qua vivendum, mores deprehendantur. Hoc modo Rufus Ephesus faciem definiit. ^g Gal. in 1 sag. faciem vocat partem superciliis & mento circumscriptam: at Columb. pars capitis mentumque intercedens: Sic Plat. pars tota sub fronte anterior & in lateribus obvia.

† Barba viro
est, non promu-
nimento sed vi-
rili ornamento,
quod femina-
rum facies pu-
ra, quas utique
viris infirmio-
res muniri tu-
ius conveni-
ret, Augusti-
nus l. 22. c. 17.
Dei 24.

h Gal. 11. 15.
part. 14.

i Musculosa fa-
cies cutis, μω-
δες ἀδωρως,
id est, muscu-
lus latus Gale-
ni, qui equi-
tantium capu-
tio similis sit, si
ejus tantum
auferas, quan-
tum pileolo te-
gatur, eo quod
faciem prope to-
tam & collum
regat, Laur.
carnosa mem-
brana vela-
men deest, qua
terminatur in
mento, nec in-
stat larva to-
tam faciem con-
regit, ut existi-
marunt vete-
res anatomici,
Riol.

k idcirco Plato

Γενεῖον appel-
lavit: Home-
rus faciem soli
comparavit.

Constantinus Augustus vetuit, in facie servorum noxiorum scribi, quod facies desudanda non esset, quæ ad celestis
pulchritudinis similitudinem formata esset. Et Arist. 1. probl. 36. inquit, totum hominem in facie, velus compendio-
sa tabella comprehendi: quod & Plutarchus in vita Alexandri Magni confirmavit. Et Adamantius dicebat ex
fronte & vultu etiam in ipso oris silentio naturam proloqui.

re prodeuntibus, quæ inter ipsum & membranam carnosam disseminantur: pueris & mulieribus lævis & polita: quæ tamen in oculorum ambitu tutelæ causa pilis circumdatur & in maribus post adolescentiam numerosis pilis barbam constituentibus decoratur: quod viro non promunimento † sed ornamento, cum & virilitatem & pulchritudinem indicet data est. Venerandus ^h enim magis mas apparet, idque potissimum, si ætatis progressu pili undique ei pulchre circumfundantur; quam etiam ob causam, Natura malas & nasum pilorum experta ac nuda reliquit. Perforata est varie, propter oculos aures, nares & os, partim, quo objectis sensibilibus aditus pateat, partim aerem cibumque intromittat, & partim excrementa emittat: quæ quidem in iis, quorum actio semper requiritur, semper patent; ut narium, respirationis causa; aurium, cum auditus semper necessarius sit. In iis vero, quorum functio non semper desideratur, maxime somni tempore, ipsiisque periculum imminet, majoris tutelæ gratia occludi possunt, ut sunt oculorum & oris foramina.

Pinguedo pauca, & potissimum in buccarum regione, in musculorum spaciis reperitur.

Membrana carnosæ, quæ licet alibi fere nervosa sit, in fronte carnosæ & musculo-
sa, cuti adeo connexa, ut ab ea vix separari possit, & propter musculos faciei illi adna-
tos rubet. Inter quam & cutim venæ modo dictæ feruntur, & glandulæ plures quas
Animellas vocant, disseminantur, ut sub aurium radicibus, in quibus parotides fiunt;
& inter maxillam inferiorem & buccarum regionem humiliores, ubi serophulæ
suboriri solent.

Continentes propriæ; Musculi sunt, ossa & cartilagine, quæ faciem ipsam quasi
constituunt. Musculi, ut frontis, superciliorum, palpebrarum, narium, aliquando &
aurium, labiorum, maxillæ inferioris & buccarum. Ossa, ut frontis, dein oculorum
sex, narium tria; oris sex, utpote maxillæ superioris duo inferioris totidem & palati
duo. Cartilagine, ut aurium & nasi, quæ cum ossibus varie junguntur.

Contentæ in facie partes sunt, quatuor sensuum domicilia, quæ eorum, quibus in
calvaria locus non est organa continet, vel saltem viam ad ipsa in calvaria latitantia
parant; & sunt oculi antèius, aures in lateribus, nasus, os, in quo gustus instrumen-
tum lingua, vocisque larynx. Quare cum in facie sensuum organa quatuor locentur,
animi imago dici consuevit. Nam ut recte Laurentius, in superciliis superbia, in genis
pudor, in mento majestas, in fronte sapientia, in vultu pulchritudo, in genis & men-
to honestas inhabitant: in hac salutis & mortis indicia elucet. Imo fronti oculi sub-
jacent; affectuum animi & corporis indices: nasus, in quo sagacitas, genæ in quibus
rubedo, præsertim in pudore efflorescit: os ex quo sapientia in sapientibus ema-
nat: denique in vultu vivum & expressum Dei simulacrum agnoscitur: quare Deus
hanc partem eligit suam quæ divinitatis participem effecit, cum in primi parentis fa-
ciem, vitæ spiraculum inspiravit & super eam lumen sui vultus, ut sigillum divinæ
creationis certissimum signavit. Quare Hippocrates in Prognosticis vult Medicum
faciem primum spectare, utrum sui similis sit, aut plurimum immutata, in colore, fi-
gura

gura & mole: Et ipse faciem *cadaverosam, ex qua mortem prælagire licet describit. *1. Prognost.
Facies etenim signa certa vitæ subministrat, qualis enim humor in venis, talis in vultu
color efflorescit sanguinei enim facies rosea: biliosi flava: melancholici fusca conspi-
citur: Sic Galenus ex facie hepaticos judicabat, si genarum color purpureus, pulmo-
nis æstum denotat. Ad contentas partes, etiam vasa reduci possunt, de quibus pri-
mo.

De Vasis per faciem disseminatis.

CAPUT XXX.

Vasa quæ per faciem feruntur, Venæ sunt & Arteriæ; Venæ quæ ad caput ferun-
tur, sunt jugulares duæ, altera Interna [tab. 7. lib. 2. SS.] de cujus distributione su-
pra cap. 10. egimus: altera Externa [tab. 7. lib. 2. TT.] quæ à subclavii trunci parte supe-
riore exoritur, & secundum colli latera, utrinque communiter una, sub cute sursum
fertur & omnibus partibus colli externis, capitis & faciei sui lateris graciles furculos
largitur. Verum, ut plurimum sub auris radice [tab. 7. lib. 2. V.] in ramum exteriorem
[y] & interiorem [x] dividitur. Interior, oris, faucium & hyoidis musculos petit, uti
supra ostendimus. Exterior currim capitis & musculos perreptans, sub aure, glandulis
suffulta, in duas propaggines scinditur, quarum altera faciei anteriora [tab. 7. lib. 2. Z.]
petens, in nasum & buccas fertur, & in medio frontis cum alterius lateris ramo jun-
gitur & venam Frontis [tab. 7. lib. 2. æ.] quæ etiam incidi solet, constituit. Altera pro-
pago per latus fertur, & partim ad tempora [tab. 7. lib. 2. æ.] partim ad occiput [tab. 7. lib.
2. *] ramos dispergit. At hujus exterioris venæ rami, in facie & in vertice varie mi-
scentur, à quibus ramuli in calvariæ futuras & foraminula distribuuntur.

Arteriæ Carotides [tab. 12. lib. 1. X. Y.] utrinque una per colli latera venas jugulares
comitantes & asperæ arteriæ adhaerentes, recta caput petunt, & ubi ad fauces perve-
nere, dividuntur [tab. 12. lib. 2. ff.] in ramum exteriorem [g] & interiorem [h] de inte-
rioris distributione cap. 10. egimus; quare nunc de exteriore. Exterior, quæ gracilior
est interiore, & extra fauces consistit, soboles ad buccas [l] & faciei musculos expor-
tat, dein ubi ad aurium radicem pervenit [m] bipartitur: harumque altera auris po-
steriora [o] petit, à qua arteriæ duæ sub aure maxillam inferiorem ^a ingrediuntur, &
secundum ejus longitudinem ad omnes dentium inferiorum radices disper-
guntur, cujus pars alia foramen ad mentum positum egrediens per
labrum incedit. Altera vero [n] tempora frontemque
perreptat, & in faciei musculos absumitur.

Hæc de Vasis faciei.

^a Hujus arte-
ria Vesalius
prorsus non me-
minit, inquit
Columb. ali-
quando in ma-
xilla foramen,
Fallop. in ob-
serv. in carvi-
tatem dentium
De Laur.

De Musculis cutim Capitis mouentibus, frontilibus & occipitalibus.

CAPUT XXXI.

De musculosa frontis natura, vide Galenum lib. de diff. musculor. 4. cur frons depilis sit, & cur ejus cutis sola motu proprio sit praedita, II. usu part. 14.

Cutim capitis ex voluntate nostra moveri diximus, & quidem in aliquibus totius capitis, in plerisque vero solum frontis & faciei, idque ex veterum sententia ^a a musculosa & tenui substantia, ^a quæ cuti frontis unitur, quemadmodum manuum internæ partes & pedum plantæ cum tendone coalescunt: at recentiores, & recte quidem signis faciei partibus musculos peculiares tribuere, cum nulla ^a pars motu voluntario sine musculo moveatur. Verum horum aliqui parte anteriore in fronte, palpebris, naso; alii parte posteriore, in occipito: alii utrinque, ut auriculis, & labiis, & qui buccis dicati sunt, consistunt. ^b

^c Frontis cutis, quæ sua tensione & corrugatione animi affectus varios demonstrat, movetur, non solum ^d membranæ carnosæ beneficio, quæ subiectæ carni connatæ in musculosam substantiam fibris rectis donatam abeat, sed musculis ^e duobus, quod & ductus fibrarum, & motus, qui in his, quemadmodum & aliis musculis apparent, quæ in membrana carnosâ non reperiuntur. Hi in fronte siti sunt [tab. 23, fig. 1. A.] & a parte superiore, in qua capillorum finis est, aliquando etiam ad coronalem futuram oriuntur, ad musculos temporales, dexter ad dextrum, sinister ad sinistram tempus, ubi membrana carnosâ ita firme pericranio & cranio adhæret, ut immobilis existat, quo frons & supercilia aliquo quiescente moveantur, & versus futuram communem, quæ capitis & maxillæ superioris ossa distinguunt, in cutim supra oculos & nasum ad supercilia, tanquam in partes movendas fibris rectis ^f implantantur: quod à Chirurgis notandum, ne frontem transversim incidant, ne superciliorum elevatio pereat: (siquidem supercilia motu recto & simul cutim frontis attrahant) ita tamen ut in medio aliquantulum disjungantur, unde frontis superior pars non movetur in summo vero naso, ubi etiam carnosiores sunt, ita junguntur, ut unus esse videatur. Duos esse non solum Anatomæ docet, sed etiam ratio & experientia: ratio, siquidem natura omnia membra gemina fecerit, quo corpus in æquilibrio sit: experientia, si enim alter vel paralyti ^h afficiatur, vel transversim vulneretur, illius partis motus perit, non autem alterius, cujus etiam motus periret, si unicus duntaxat musculus foret: sic quando commovemur, cutim in media fronte contrahimus & corrugamus, ita ut supercilia sese tangant, quæ cutis contractio non fieret, si unicus musculus esset. Horum usus, fibris suis contractis ⁱ supercilia una cum cute frontis attollere (quibus laxatis in locum

^a Gal. II. us.

part. 15. Muscu-

losa substantia

ac tenuis fron-

tis cuti subji-

tur, quare hac

sola cutis motu

proprio move-

tur.

^b Musculos cu-

taneos vocat

Plat.

^c Frons sub syn-

cipite inter

apsum & oeu-

los, I. hist. 8.

^d Musculus est

non autem ut

Vesalius vo-

luit, pannicu-

lus carnosior

redditus, & si

bræ pluribus

auctus, Fall.

observ.

^e Musculi fron-

tis, Columb.

Laur. muscu-

lus frontis aut

unus aut gemi-

ni, quod non

magnifacio,

Fall. cutim ca-

pitia movens

primum par

Plat. musculi

affectum ani-

mi significativi &

musculi ocularii, Piccolhom.

^f Fibra rectæ, Vesali.

Plat. Laur. obliqua à summo naso tempora-

versus, non rectæ Col. Piccolb.

^g In medio frontis nullus musculus, Columb.

aliquantulum disjuncti, Laur. in medio

coitionem faciunt, Piccolb.

^h Columb. ostendit exemplo Cardinalis, cui cum sinister musculus ob vulnus convulsus

esset, dimidiam tantum frontem movebat.

ⁱ Gal. 9. us part. cutis frontis & musculus tam stricte coalescunt, ut ambo-

rum motus unicus sit, qui supercilia attollit: ut lib. de libris propriis notat se demonstrasse motus superciliorum bacte-

nus

non traditos falsos esse. Nec Galenum nec Vesalium nec alios ante ipsum hoc cognovisse asserit; addens duobus adhuc propriis supercilia uti, Columb.

cum redeunt) propter enim oculos frons ^k moveri debuit; sic enim palpebrae commo- ^{k Gal. 11. uf.}
dius sursum trahuntur, oculi magis aperiuntur, cum multa uno tempore conspi- ^{par. 14. ubi}
cere volumus: ac rursus ^k dum clauduntur, cogi & constringi ad unguem ab omnibus ^{agit de natura}
circumjacentibus, cum alicujus incursum contra se metuant. Nam quod supercilia ^{studio in homi-}
moveantur, probatur ex Galeno, qui ea palpitare, dein contorqueri & inflecti in mor- ^{nis decore, &}
bis scribit, quod apud Hippocratem lethale est: at solus musculus palpitationem & ^{cur frons depi-}
convulsionem parit: verum res tamen ^{*} superciliorum palpitationem bonum omen ^{lus sit, & sola}
credebant, quod scilicet ea quae optabant ex animi sententia si cessura significarent. ^{motu proprio}
Quod autem de pilis sit frons, etiam ^k propter oculos factum, quibus si pili incumbere- ^{prædita.}
rent, obessent, quare ipsam assidue tondere necessum esset: iam vero natura ^k magna ^{* Veteres ex su-}
cura providit, ne corpus homini subinde negotium facesseret, ne villum sibi ipsi ^{perciliis vati-}
necessario serviendo instar mancipii semper haberet addictum. ^{cinium sume-}
^{bant quod Sui-}

Musculi ¹ cutim capitis in posteriora trahentes duo aliquando adsunt, utrinque ^{da ex P. ssido-}
unus, qui tenuis admodum oriuntur ab occipitis linea transversa, in quam musculus ^{nio πάλιν}
scapulae secundus Cucullaris dictus [t. 2. lib. 4. T.] definit: à qua linea fibrae recta sur- ^{divisus dicit-}
sum feruntur, qui musculos hos breves admodum, vix transversum pollicem longi- ^{tur: & πάλ-}
tudine æquantes, sed ita latos, ut unusquisque suo tendine quasi auriculam sui lateris ^{inon, qui}
tangat, constituunt. [t. 12. libr. 4. ab R. sursum.] Desinunt autem in chordam usam la- ^{tali vaticina-}
tam ac tenuissimam, quae ex membrana carnosa facta videtur, & totum caput occu- ^{tionem utebatur.}
pat, & musculos aurium anteriores, & frontis quoque musculo: simul copulat. Ho- ^{Plantas in}
rum duorum munus est, si multum carnosum sint, curim capitis ^m posteriora versus in- ^{Pseudolo: At-}
quibus ea movetur, abducere; quare & supercilia simul trahere creduntur. Verum, ^{que id futurum}
quemadmodum frontis semper reperiuntur: ita vice versa hi occipitis ^{unde, unde di-}
aurium anteriores, saepe non inveniuntur. Præterea musculus orbicularem Aqua- ^{cam nescio.}
pendens superciliis tribuit, qui à palpebrarum circulari musculo differat, quod su- ^{Nisi quod fu-}
percilii musculus fibras crassiores & carnosiores habeat, & quod totus musculus ^{turum est, ita}
major sit; quare supercilium maxime deorsum ad oculum ducere, & cum annulum ^{supercilium sa-}
referat, etiam palpebram inferiorem valide trahere. Aurium, Narium & Labiorum ^{lit.}
musculi sequuntur, de quibus infra suo loco.

Aaa

De tura supra
mamillares

processus oriuntur, triangulares sunt, & in carnosam membranam desinunt, quae frontis etiam musculos excipit. Col.
Musculi in occipite gemini à reliquis omnibus Anatomicis prætermitti, Fallop. observ. secundum par curim capil-
losam capitis movens, Plat.
m Fallop. Plat. & Columb. hic vero & supercilia simul trahere voluit, ostendit exemplo Johan. Antonii Plati, qui u-
niversam curim capitis valide movebat: & suo proprio exemplo. D. Augusti. l. 14. civit. Dei cap. 24. inquit esse qui to-
eam caesariem capite immoto quantum capilli occupant ad frontem cum volunt, deponant revocentque.
m Fallop. & Plat.

Sensuum quatuor domicilia in facie contineri diximus, quintus vero sensus externus, ipse nimirum tactus, per totum corpus dispersus est, & in facie domicilium peculiare non habet. Caput enim animalium facultatum sedem, & rationis domicilium esse, supra ostendimus: quare & Sensus, veluti animæ^a internuncii in capite locari debuerunt. Sensus autem externi quinque numerantur, cum simplicia corpora quinque sint, Cælum & Elementa quatuor. Quare visus Platonice, elemento stellarum proportionem respondet, cuius objectum lucens est: odoratus objectum igneum est: auditus, aereum: gustus, aqueum: tactus, terreum. Inter hos autem visus principatum habere videtur, qui cum auditu vitam beatiorē reddit (quamvis sine gustu homo conservari non possit, cum nutritionis gratia sit comparatus) qui enim vel natura, vel casu, vel ægritudine oculis orbatū sunt, se infelices appellant: nam quemadmodum nox tristis est propter solis absentiam, similiter cæcorum vita, dolore & tristitia perfunditur. Nam sicut^b sol in magno mundo, ira oculus est, ut sol in corpore animalis: non immerito ergo ab Hesychio *ἡελίος πύλαι*, Solis portæ dicuntur; ut enim solis lumine reliqua sydera illustrantur, sic in homine oculorum beneficio, sensus ceteri & commoditatem & voluptatem percipiunt. Quare de oculis^c primo agemus, cum etiam inter nervos optici primum locū obtineant.^d Oculos Græcis *ὀφθαλμοί*,^e quasi *ὠπὸς θάλαμος*, quod sit thalamus, ex quo visus emicat, & ob id oculi ab aliis *φάεα* dicti, quod ex ipsis *φῶς* seu lumen progrediatur. Latinis oculi & ab occultendo, vel occultando, eo quod sub palpebris tanquam teguminiibus, non aliter tanquam sub testa conchæ constituti sint. Sed inquam nomina, quæ fuisse libro de partibus externis ante annos triginta duos edito, pertractavimus.

^a Oculi, aures, lingua, manus & pedes, ea quæ cerebrum cognoscit, administrant, Hipp. de sacro morbo. ^b Gal. 3. us. part. 10. Sic idem narrat Adrianum Imperatorem iratum, cuiusdam servi sui oculum eruisse: cuius sceleris percussus, promissum se daturum quicquid ille posceret: tandem multis compellationibus coactus respondit, oculum suum optare, cuius iacturam nullum minus aquare possit: hinc illa Luscii rogatio ad populum lata, ut qui oculum sciens & volens effodisset, ipse utroque oculo orbaretur.

^c Oculum humanum nemo ante me descripsit, sed omnes belvium magno & turpi errore, in quem ipse quoque Vesalius incidit, in ejus universa pene formatione cum aliis deceptus, hac Columb. d. Oculos omnia animalium genera habent, præter *πῶν ὀφθαλμοῦν*, et si quid imperfectum aliud est. Arist. 1. hist. an. 9. ubi de Talparum oculis agit. Quo autem ordine generentur, vide 2. gener. an. 6. quemadmodum de oculorum in colore & magnitudine, varietate 1. hist. an. 10. de differentiis oculorum in animalibus & eorum causis, 5. gener. an. 1. f. Hipp. de pris. Medic. de nat. human. in Coarctis & alibi. e. Opirani Scholiastes. g. Varroni, Laetantio. h. Gal. 8. us. par. 5. de an. viv. * Philo lib. de legi special. de j. xii, inquit, de celo in hominum animos Philosophia, sed oculi sequestris in id hospitium deducta fuit. f. 1. Metaph. 1.

Sunt autem Oculi facultatis visivæ organa, quibus tanquam speculatoribus^h utimur, non solum ut ea, quæ nocitura sunt, videamus & fugiamus, quæ vero utilia, persequamur (qui usus nobis cum brutis communis est) sed præcipue, ut per ea, quæ visibilia sunt, Dei invisibilis omnipotentiam contemplemur. Recte ergo D. Plato pronuntiavit, quod si oculis careremus, naturæ ordinem ignoraremus: etenim eodem auctore, oculis Philosophia debetur, cui Philo Judæus^{*} subscripsit, siquidem homines ex iis quæ oculis viderunt admiratione rapti, Philosophari & rerum causas investigare ceperunt. Idcirco mirum non est, si homines visum supra reliquos sensus maxime diligant, auctore Aristotele, † quatenus inter sensus hic præcipue nos aliquid cognoscere faciat, & ad rerum multarum scientiam plurimum conferat.

^d Oculum humanum nemo ante me descripsit, sed omnes belvium magno & turpi errore, in quem ipse quoque Vesalius incidit, in ejus universa pene formatione cum aliis deceptus, hac Columb. d. Oculos omnia animalium genera habent, præter *πῶν ὀφθαλμοῦν*, et si quid imperfectum aliud est. Arist. 1. hist. an. 9. ubi de Talparum oculis agit. Quo autem ordine generentur, vide 2. gener. an. 6. quemadmodum de oculorum in colore & magnitudine, varietate 1. hist. an. 10. de differentiis oculorum in animalibus & eorum causis, 5. gener. an. 1. f. Hipp. de pris. Medic. de nat. human. in Coarctis & alibi. e. Opirani Scholiastes. g. Varroni, Laetantio. h. Gal. 8. us. par. 5. de an. viv. * Philo lib. de legi special. de j. xii, inquit, de celo in hominum animos Philosophia, sed oculi sequestris in id hospitium deducta fuit. f. 1. Metaph. 1.

rat, quam haud dubie ob causam, Galenus divina membra nominavit. Et cum tantæ nobilitatis & necessitatis sint, non mirum, si maximo artificio à primo Protoplaste Deo optimo maximo creati sint, quæ ejus sapientiam & majestatem declarant.

Siti sunt in capite tanquam munitissima & eminentissima corporis parte, mox sub fronte, tanquam speculatores: quemadmodum enim speculatores altioribus locis & turribus collocantur, ut insidias longius prospicere ac explorare possint: ita oculi in sublimi locari debuerunt, ut boni custodis munere defungantur, & singula ex alto melius prospiciant quæ fugienda, aut persequenda sunt (quorum causa caput præcipueⁱ conditum est, cum cerebrum illis vicinum esse debuerit, propter nervos optimos molles) & quidem parte^k anteriore, quo rebus recta opponerentur, cum antrosum moveamur, & quæ in lateribus sunt non nihil intueamur: cum ad ea, quæ in tergo sunt, & corpus & caput convertere possimus, in antris osseis concavis, quæ *κοίται*, Polluci & orbitæ^l dicuntur, securitatis gratia, & forte, quo spirituum minor fiat dissipatio, reconditi.

Numero duo sunt, ut cætera^m sensuum instrumenta, ob actionis nobilitatem & perfectionem, ut ad latera prospicerent & unius defectum alter compensaret: dein ut visio à duobus perspicacior sit, cum duo simul juncti rerum distantias facilius percipiant. Et hi exiguo intervallo inter se disiuncti sunt, quod homini peculiare Aristoteles notavit, qui eodem motu simul & semel moventur, quo visio perfectior fiat: nam si altero elevato, alter deprimeretur, objectum simplex geminum appareret, cum visoriorum conorum axes in uno eodemque plano locari debuerint, quam sane actionem, nervorum motoriorum in exortu conjunctio, promoveret, quemadmodum supra ostendimus: at inter animalia in homine oculi minimo intervallo distant, ut Philosophusⁿ ostendit.

Figura sunt^o in homine si solum bulbum spectaveris, rotunda & spherica [tab. 21. f. 3. & 4.] in cæteris vero animalibus, non sunt undique orbiculares, sed vel obliqui, vel depressi [tab. 21. f. 5.] nec mirum, cum hominis figura tanto intervallo à reliquis animalibus distet. At si eos cum musculis suis posteriori parte adpositis perpendas, figuram pyramidalem [tab. 20. fig. 4. & 9.] habent, cujus basis extrorsum vergit, conus introrsum delitescit: quam obtinere & capacitatis gratia, quo plura in se contineant, & celericos motus gratia. Hujus nomine & lubrici facti sunt, & maxime mobiles, quo visum facile, quocunque volumus, convertere possimus. Quare optici volunt propter figuram orbicularem, radios à quacunque parte obveniant ad perpendicularum frangi, id est, ad pupillæ centrum diriggi: & sic rotunditas facit ut oculi quamlibet magnitudinem comprehendant, dum rectæ lineæ in eum cadentes & in centro concurrentes, quanto longius distrahuntur majorem basin intercipiunt, quod aliis figuris, quæ æquale tantum spatium percipiunt non contingit.

Magnitudo eorum non omnibus æqualis est, sed unicuique tanta data est, quanta ad imagines rerum percipiendas usus postulabat: majores tamen & prominentiores, minoribus & in profundo sitis deteriores sunt, quia tales visû hebetiore præditi & fluxionibus magis obnoxii sunt.

Aaa 2

Hic

turbinatam figuram adipiscitur, Plat. rotunda, sed aliquantulum oblonga, Laur.

i Gal. & Avic.
cen.

k 10. us. part.

l ubi querit,

cur non in po-

terioribus et-

jam partibus

oculi extite-

rint; respondet,

quod omnia

sensus instru-

menta nervos

molles possu-

lent, & quod

ejusmodi a ce-

rebello produci

non poterant;

& quod in u-

trumque ipso-

rum productio-

nes à cerebro

immittuntur,

quæ dum per

ossa transseunt,

densantur, quo

ab injuriis tu-

iores sint.

l Camera seu

specula, Plat.

m 10. us. part. 1.

n 10. Probl. 17.

o Figura vere

spherica in ho-

mine, in quo

nihil præterea

sphericum, Col.

rotunda & glo-

bosa, Piccolp.

Oculus cum hu-

moribus rotun-

dus est, sed pro-

pter musculos

Hic autem considerare oportet partes duplices, alias, quæ oculis propugnaculi causa circumponuntur: alias vero, quæ ipsos oculos constituunt. Propugnaculi causa natura ossa undique apposuit, quæ orbitam constituunt, & præter hæc superius superciliis, antè palpebris, eorumque pilis quasi propriis sepimentis obvallavit, atque etiam cute. Cilia enim^o veluti vallum^p quoddam, cum suis pilis corporibus exiguis propulsandis, ne facile apertis oculis incidant, primo loco constituit: dein palpebras, ut simul coeant & compliceantur, oculum claudant, si forte corporum majorum aliquod in eum incurrat: inferne autem genas, ad maiorem angulum, nasum, & ad minorem ossis jugulis productionem, ut si quis forte vehementior ictus fuerit ab eminens repellatur & ab his omnibus majorum corporum occursum prius excipiat, & sic oculus in medio locatus nihil læditur, & cutis, tum ea, quæ supra in fronte est, tum ea, quæ infra est ad malas, motu suo ad patiendi difficultatem, non mediocriter etiam confert: hæc enim undique contracta, oculum intro comprimit, & in angustissimum compellit. Ea enim extensa, & tum rursus in seipsam replicata, oculos aperire & claudere potest.

Orbita oculi, quæ rotunda est [tab. 2. fig. 6. ad Q. tab. 3. f. 8. inter X. & R.] ut in ea oculus volui possit, & oblonga, propter musculos oculum moventes, & perioftio succingitur; formatur ex ossibus capitis, & maxillæ superioris: capitis, vel frontis, vel ossis sphænoïdis; unde in oculorum antris suturæ multiplices, & etiam foramina observantur. Frontis quidem, cujus squamma externa lavis, superiorem hujus camerae fornicem efficit, & ubi utraque squamma rursus jungitur, extrorsum in superciliorum regione prominet [tab. 3. fig. 8. AXR.] & oculum tuetur; quamvis & frontis fornix maxime protuberans hunc ulum præstet, ut cæli lucem qua visibilia opprimerentur, excludant: propterea ij quibus lucis claritas molesta est, frontem corrugant & id vallum ad oculos propius adducunt: imo manum instar tecti oculis imponunt. Sphænoïdes vero in oculi cavo parte posteriore, ubi foraminibus quatuor pervium est [tab. 3. f. 8. iuxta DG.] Maxillæ superioris ossa, primum, quod exteriorem illius eminentiam facit [tab. 3. f. 8. I.] secundum & tertium [tab. 3. fig. 8. ΔΘ.] latere interno, quæ tenuissima sunt (cum & nasi protuberantia etiam propugnaculo sit) & ossis quarti pars, ubi protuberantia in malis constituitur [tab. 3. f. 8. iuxta I.] Sutura in maxillæ ossibus tres, una ad utrumque angulum, tertia in cavitate inferiore: duæ à spongioso osse, ad magnum angulum; aliæ denique à sphænoïdis & frontis osse: His pericranium, musculus obliquus infernus & trochlea suspenduntur. Foramina tria maxima in his conspiciuntur, unum retro rotundum ad nervi optici transitum: alterum in ima oculi cavitate, oblonga est fissura, qua nervus motorius oculi cum venis & arteriis ad oculos, eorumque musculos pertranscunt, de quibus capite de ossibus. Tertium est ad internum angulum ad nasum, in ejus cavitates, nares dictas, pertusum, per quod interdum pars lacrymarum effluit.

Sinus seu circuli utrinque^f duo ad^f hanc oculorum orbitam exurgunt, quos Aristoteles superioris & inferioris palpebræ partes communes dixit, quia ex utraque palpebra utrinque in longum protensa procreantur, imo palpebras in lateribus connectunt & claudunt: qui Græcis[†] *καυθολοι*, *ὅτι τὸ καὶ ἵεσθαι*, id est, pruritum sentiendo, dicuntur, eo quod in ipsis plerumque ob lacrymarum effluxum, sive alterius humoris, pruritus sentiatur; Latinis Hirci, & anguli oculorum, in quibus lacrymæ, & quicquid

p 8. us. part. 5.
10. us. part. 6.
q 11. us. part. 14.

* vallum nasi
prominens duo
commoda præ-
stare videtur:
unum quod al-
terius oculi con-
spectum alteri
eripit, ne mul-
tos splendore à
repercussioni-
bus orto occa-
eantur: alte-
rum quod alti-
tudine sua ter-
minum præscri-
bit appropin-
quationi re-
rum visibilium
Riol.

† Plat. sed A-
quapendens &
os ethmoides
addit.

† Arist. 31.
prob. 16.

^f De angulis o-
culorum Arist.
1. hist. an. 9.
Gal. 10. us. part.
11.
1. hist. 9. Gal.
10. us. part. 11.
& alibi.

quid oculis illabitur, colligitur: horum alter exterior ad tempora, minor & externus canthus; alter interior ad nares, major & internus canthus [tab. 20. fig. 1. b. e. major, d. minor canthus] *παρθύρ*, quasi perfusus Polluci, & *πηγή* Hefychio, quod inde lacrymæ manare soleant, appellatur, quæ tamen nomina potius cavitati, quæ eo loci apparet, tribuenda sunt.

Foramina enim duo * in ^u unoquoque angulo in tarforum extremitate utraque, superiore & inferiore, conspiciuntur [tab. 20. fig. 4. 7. 8. m. n.] quæ in minore cantho, etiam in viventibus vix conspicua, in cadaveribus autem sensum omnino effugiant: at in interno & in maiori angulo, maiora, quæ in viventibus, si quis inspicere voluerit, Fall. observ. Plat. maxime in mulieribus, apparent: in bouum vero mortuorum palpebris optime demonstrari possunt [tab. 20. f. 4. m. n. f. 7. & 8. tantum in maiori cantho exprimuntur. n.] Hæc puncta lacrymalia ^y dicuntur, quod per ea flentibus lacrymæ stillent, potissimum autem per angulum internum, quo tanquam declivore natura ad lacrymarum effluxum vitur: etsi via patentior ipsis sit per nares, cum ad angulum internum in narium summo, foramina magna ossi maxillæ superioris sint insculpta: hæc enim foramina meatus habent, qui sub caruncula in communem sinum in narium cavitatem desinentem, uniuntur; qui ^z canalem proprium in osse squamoso insculptum refert, per quem lacrymæ in nares effunduntur: & hæc cavitas proprie *πηγή*, fons dici meretur. Verum hoc os, quod adeo tenue est, & canali excavatum, à lacrymarum (quas falsis pronuntiavit, & sudori assimilavit Philosophus) ^a aliorumve humorum acrimonia aliquando exulceratur, ^b fitque illa viceris species, quæ fistula lacrymalis dicitur: quæ sanie collecta, si sinus exprimatur, per dictos meatus in internum angulum oculi externi manifeste conspicitur. Quo ergo hæc exulceratio præcaueatur, natura carunculam sine carnem glandulosam ^c *ἐγκανθίδος* vel *ὑπὸ τῷ ὀφθαλμῷ* dictam interiori angulo apposuit (Galeno ^d *σπερματικὴν ὀφθαλμῶν* nominatur) [tab. 20. f. 7. 8. r.] quæ os tuetur; dein & foramini huic ossi insculpto quod in nares pervium est operimento est, ne oculi excrementa in nares delata refluant, & in genas profluant, (ob id caruncula lacrymalis dicta) & sic nos semper lacrymare faciant. Quare qui oculorum affectus curant, ^d caveant, ne acerbis pharmacis hanc carunculam colliquant: hæc enim erosa, vel consumpta, patit æglopa fistulam lacrymalem: per hoc foramen in multis ocularia ^d medicamenta ad nares delata fuere & non multo post inunctionem emuncta, vel per os rejecta: sed de lacrymis pauca aspergamus.

Lacrymas Plato, Aristoteles & Theophrastus sudorem quandam, aut sudoriger-manum, ut & lotio, censuerunt: at dicimus excrementum ^e ei ebrisse. Verum cum in omni coctione excrementum duplex crassum & tenue segregetur; in hac coctione

Aaa 3

excre-

part. II.

a 5. Prob. 35. Lacryma sudor quidam est, & ambo falsa pariter sentiuntur. b Fluxiones in oculos ruentes ex vehementi, & cuiusvis humorum acrimonia palpebras exulcerant, & quibusdam genas, subjectasque oculis partes, ad quas confluxerint, erodunt, tunicam etiam pupillam ambientem exedunt, Hipp. de prisca Medic. c Caruncula in maiori oculi angulo, quæ videtur pituita, ne in genas de sinu præcaverit, Valsal. & Laur. qui addit, & angulum ne ladeatur tueri, Fallop. lacrymalis caruncula, & Plat. qui dicit à lacrymarum injuria vendicare. d Corpus carneum, quod maiori angulo incubat operimentum est foramini, quod est ad nares: foraminis utilitas, ut per hoc in nares oculorum excrementa consuant: ne igitur per angulos excrementa effluant, neve assidue lacrymemus, corpora hæc carnosissima his meatibus adposita, quæ ad proprios meatus impellunt, 10. u. part. II. e Excrementum tertia coctionis in oculo, in humoris vitrei

vitrei & crystallini nutritione, & sanguine tanquam materia ab oculi temperamento genitum. Ab his enim excrementum duplex seceratur, aliud crassum, aliud tenue: Crassum nigredinem illam appositam uves & choroidi adhaerentem, aliud tenue, utpote lacrymas, cui & serosa humiditas admisceri potest, Aquapendens.

excrementum crassum, est pituita illa viscida & crassa, quæ per palatum & os expuitur, aut per nares emungitur. Quod vero tenuius est, partim insensibiliter diffilatur, partim sensibiliter & interdum cum crassis commistum evacuat; interdum ad linguam humectandam, ad loquelam & masticationem: interdum ad totam faciem mittitur, præcipue vero ad genas, tempora & aures; quod comprobant vulnera hisce partibus inflata, quæ quamvis sanata videantur, solet tamen per duos aut tres menses quotidie humoris aquei purissimi magna copia, per foramen in vulnere relictum, quod nulla arte consolidari potuit, effluere potissimum in musculi temporalis vulnere, quam observationem D. Aquapendenti Anatom. & Chirurgo insigni debemus. Quod vero ad musculos mittitur, lacrymarum materia est, nimirum ipsum serum, quod una cum sanguine ad cerebrum deducitur, ut sit $\delta\chi\upsilon\mu\alpha\ \tau\eta\varsigma\ \tau\epsilon\omicron\phi\eta\varsigma$, quo sanguis vasa minutissima per cerebri substantiam dispersa, permeare possit, quod cum nutriendo non sit, in ipsa nutritione cerebri, veluti à lacte serum segregatur, per tenuem ipsius substantiam percolatur. Colligitur autem in oculi antro osseo, quod tantæ capacitatis est, ut cavitatis ne quarta pars ab oculi musculis & nervis repleatur: quæ partim à pinguedine, partim à glandulis, cum raræ sint substantiæ, instar spongiæ combibuntur, colliguntur & detinentur, ne statim emittantur, sed reliquorum excrementorum more convenienti tempore expurgentur. Detinentur vero in oculi antro osseo, ad ejus musculos humectandos, qui propter continuum motum non solum nimium incallescere, sed etiam exsiccari possent, nisi humectarentur & refrigerarentur à lacrymis circum musculos ad pinguedinem positis. Hunc usum præstant, si moderatæ sint; nam si immoderatæ fuerint, & intus detineantur, musculorum motum impediunt. Quare natura sapientissima his expurgandis duas vias paravit, unam per oculorum angulos, alteram per nares, uti modo dictum fuit. Quod si vero guttatim lacrymæ stillarent perpetuo, tam faciem, quam natura semper nitidam servare conatur, deformassent, quod in iis, qui fistulis lacrymalibus laborant, manifestum est. At ne indecoram faciem reddant, visionemve offendant; si sponte & continue effluant, Natura ab aliqua causa moveri voluit: quare vel expressione, vel dilatatione, & attractione eliciuntur. Expressione quidem in oculorum perfrictione, frigore, vento, animi dolore, & fletu, ubi per foramina tarforum finibus insculpta, sudoris modo guttatim scaturiendo profunduntur, musculis faciei & partium circumjacentium sese contrahentibus, alias cum, alias sine ejalatu, gemitu, atque intercisa, ac ceu sub singultiente respiratione & voce in faucibus nonnunquam contracta, aliquando etiam prorsus elisa. Dilatatione vero proliciuntur à calore, risu, sole (oculus enim cum splendidis resistere nequeat, lacrymam provocat) ira & febris acuta^h & ardens, in qua, si cætera exitialiter se non habeant, hæmorrhagiam^h denotant. Quod Hippocr.

f Si in majori copia effundantur, oculos & musculos excandendo ledunt: tum vero & musculos agre oculos movere, experientia quotidie probat: sic si diutius, quam par sit, detineantur & copia immoderata fiant, impurum oculum efficiunt, & visionem de se riorem reddunt, Aquapend.

g Sic habet Hipp. libr. de videndi acie, addens relictam lacrymam calefacere. h Hipp. i. Epid. idem quoque Gal. i. ad Glaucon. at 4. aph. 52. damnas, & 6. Epid. f. i. spontaneas lacrymas probat; involuntarias autem pessime deestatur. Possunt etiam sponte fluere lacrymæ, cum cerebrum aut caput ipsum humorum acrimiarum vaporisationibus tentatum, oculos

culos etiam lacinnas & illacrymantes facit, idque ex natura consilio, non temere; ex magna etiam humorum aut vaporum copia in cerebrum sublatorum potest animalis illa facultas relaxari, & aliquantulum labefactari: itaque humorem illum oculis illabentem, & sua sponte fluxilem vel invite effundere.

pocr.^h docuit, & etiam has esse causas profusionis lacrymarum ex Aristotelisⁱ problematibus colligere possumus. Nec locum hic habet objectio, lacrymas interdum tanta copia profundi, ut vix possibile videatur, tanta copia in oculi orbita contineri posse, nam consecutione quadam serofus hic humor, eo modo, quo pituita à cerebro defluere potest. Hactenus de lacrymis.

Glandulæ^k in super utrique angulo adpositæ sunt, interdum binæ, interdum plures, quo sua substantia rara & laxa excrementum illud serofum cerebri, depascant, à quo oculi externa superficies humectatur, & lacrymarum materia existit, quæ per angulos & tarlos congruo tempore evacuat. Sunt quinetiam hæ glandulæ, loco pulvinaris mollissimi, oculorum contactum durum ad angulos præcaventis. At in brutis aliter se habet, quod ex Fallopio aspergere lubet propter tyrones, in quorum gratiam singulis annis aliquot bovinos oculos secare consuevimus, quo ad humani oculi sectionem paratiores, quando cadaver humanum datur, accedant. In bovino ergo oculo glandula alia callosa ac durior in interno angulo reperitur, quæ ob membranam qua nictant ibi collocata videtur, quæ membrana vngui similis est, tenuissima quidem, sed corneæ tunicæ vel cartilaginis naturam sapiens: quæ motu voluntario ad angulum externum movetur, & oculum palpebris etiam apertis operit. Circa radicem enim membrana quædam validissima glandulæ callosæ hærens, forte, ut dum cutis ad oppositum angulum trahitur, glandulosum illud corpus veluti cornu arcus tendatur, statimque cute remissa recurat, atque ipsam in angulum proprium retrahat. Ducitur autem hæc membrana ad angulum oppositum chorda duplici, altera quidem superius, altera vero inferius sub membrana adnata latente, quæ à musculo quodem in angulo exteriori collocato oritur, qui musculus à Fallopio habetur, pro parte illius musculi, qui totum oculum ad exteriora trahit.

i. c. Probl. 13. & 35. At Aquapend. opinio expurgari lacrymas à natura ab ejus facultate expultrice, ad omnem offensam præcavendam oculi custodia gratia, ut oculos humectant, quod à frigoris calorisque contactu & occursu oculum tueatur. Sic in istis, ut ipsum non oculum, sed lacryma suscipiant, aut si oculum, ut omnino per medias & intercedentes lacrymas minusque patitur.

De k Dua quoque adde, seu glandula

dula in utroque angulo, altera partibus infernis, altera supernis, quæ mentibus non obscuris humidam in oculum effundunt ad motuum facilitatem; quemadmodum glandula lingua radici adjuncta salivam in os derivant, Gal. 10. us. part. 11. Major Anatomicorum pars nullam ponit glandulam, quidam sunt, qui duas addunt, sed neutri placent, quia una tantum manifesta & perpetua, & satis insignis à me reperta in oculi superiore parte prope angulum externum, Fallopio observ. in interno angulo glandulam, quæ depascit excrementum humidum, quod in nutritione oculi secretum, quod si exsuperet, in lacrymas secedit: sin minus oculi externam superficiem humectat, & palpebrarum motu dissipatur sensim exhalat, Varol. Glandula venarum & artiarum divisiones intercedunt, Vesal. plura non habet. Glandula bina altera supra, altera infra est, quæ oculum irrorant, & lacrymas effundunt, Coh. At Laur. glandula in oculi angulo sita humorem à cerebro excipit, oculos irrigant ad motum per has & lacryma fiunt. Glandula in utroque angulo interdum binæ, interdum plures, Aquapend. 1 De hac loquitur est Arist. 2. hist. an. 12.

De Superciliis & Palpebris.

CAPUT XXXIII.

De superciliis egit Aristoteles 1. hist. anim. 9. 3. eiu (dem 11. 2. part. anim. 15. Gal. 11. us. part. 14. De palpebris 1. hist. an. 9. de earum varietate in animalibus 2. part. an. 13. de ciliis 1. hist. om. 9. 2. part. anim. 14. & 15. Galenus de palpebrarum substantia scribit, 10. us. part. 6. 7. de earum motu, 10. us. part. 9. 4. loc. affect. 2. lib. de oculis 14. de palpebra inferiore, cap. 10. De utilitate earum 10. us. part. 9. 11. & lib. de instrumento odoratus, 5.

Supercilia, quæ cum Aristotele^a ad oculos referimus, sic dicta, quod supra cilium sint, ὀφρῦες^b Græcis; hirsutæ sunt frontis extremitates, Ruffo; sive pili supra oculos enati, qui sub fronte bipartito^c distinguuntur. Componuntur autem ex cute, carnis fibris à musculis frontis productis, adipe & pilis. Cutis hæc crassior & durior est: crassior, ut oculos melius muniat: durior, ^equo pili numero æquales sint, nec in im-
mensum crescant: ut enim Galeno monente in palustri & vliginoso loco nihil gene-
ratur, nec item in squalidior solo: ita in sicciore & humidior, pili non erumpunt. Pili hi πλοῖ^d à Medicis, attestat Polluce, nominantur, qui quemadmodum & palpe-
brarum pili una nobiscum^d nascuntur; unde Ægyptiorum sacerdotes, cum reliquos omnes raderent, his solis abstinebant. Et licet ^eæquales sint longitudine, numero & densitate, non tamen recti, sed obliqui producantur (imo arcuatim secundum oculi rotunditatem ducuntur) quo ab oculis facilius omnia adversa deflectant. Quod si breviores, pauciores & rariores essent, non ita oculos tuerentur: si contra longiores & densiores, visioni impedimento forent. At in quamplurimis ^fsenescentibus adeo crescunt, ut tondere oporteat. Causam Aristoteles^f refert, quod in compage ossium posita sint, quæ s senescente ætate laxentur, & inde plus humoris transmitti patiuntur. Verum, quomodo ex hisce pilis animi indicia desumantur ex Aristotele,^h & quomodo veteres animi partem in superciliis posuerint ex Cicerone, in libro nostro de partibus externis ostendimus.

Intermedium inter supercilia spatium, quod ut plurimum depile est, μεσὸφρυον^g Ruffo & Polluci dici, quo Straton Philosophus animi principatum collocavit, ex Plurarcho, etiam loco citato docuimus. Hæc etsi à musculis frontis sursum trahantur, in aliquibus^k tamen duo adhuc muscoli in occipitio [tab. 23. fig. 1. C. alter figura 2. a. a. instar panniculi inversi supra nasum retractus est,] sita reperiuntur, qui cutim capitis posteriora versus abducendo, & eos attrahunt, quemadmodum paulo ante ostendimus; ubi & musculus orbicularis [tab. 23. fig. 2. c.] supercilia deorsum trahens, propositus fuit.

Ufus superciliorum: adjumenti gratia haberi supercilia & cilia Philosophusⁱ dixit: supercilia quidem, utⁱ delabentes humores arceant, velut imbricamentum humoribus, qui capite emanant, paratum: imo instar muri cujusdam^m omnia, quæ à capite defluunt, propulsant, ac primo omnia excipiunt; quare si eos plus quam oporteat mino-

ex quo figuram sumpsimus. 1 2. part. an. 15. m Gal. 11. us. part. 14. & Cicero 2. de Nat. Deor. iis sudorem à capite & fronte defluentem repelli ait.

^a 1. hist. an. 9.
^b Hipp. de loc. in hom. Arist.
^c Gal. oculo- rum exordia, Tertulliano.
^d Cutim durā cartilagini per supercilia con- nexam nostri Conditor sub- jecit, Gal. 11. us. part. 14.
^e 3. hist. an. 11.
^f Solos hos, non eos, qui in pal- pebris sunt, æqualem sem- per servare ma- gnitudinem in- stituit, quibus si quid addide- ris, aut abster- leris illarum utilitatem cor- ruperis, Gal. 11. us. part. 14.
^g Arist. 2. par. an. 15.
^h Arist. 3. hist. an. 11.
ⁱ 1. hist. an. 9.
^j Oratione pro Roscio, & lib. 1. Officior.
^k Julius Pla- centinus ele- ganter pinxit, ex quo figuram sumpsimus. 1 2. part. an. 15. m Gal. 11. us. part. 14. & Cicero 2. de Nat. Deor. iis sudorem à capite & fronte defluentem repelli ait.

minores aut rariores effeceris, utilitatem vitaveris; hi enim influere permittent, quæ prius defendebant.

De Palpebris.

OCulos undique ossibus obvallari, & antris ossibus quasi includi, & ab iis, quæ à fronte defluunt. superciliorum ope defendi non satis erat; cum anterior eorum pars multis periculis sit exposita: uno & b molles cum sint à natura facti, ad faciliorem specierum extrinsecus occurrentium receptionem, pluribus lacionibus obnoxii fuerunt; quare ne ab his offendantur, natura sagax membranæ seu ligamenti & b propugnaculis munivit (unde videmus iis animalibus, quorum b oculos exteror tunica dura tegit, palpebras datas non esse: eo quod facile lædi non possint) quibus antra (ossibus enim c connecti oculos melius fuit) cum oculis obteguntur. Dicuntur autem d Græcis βλέφαρα, quasi τὸ βλέποντος φάρα, id est, visus tunica, unde à Poeta quodam non illepide ὀμματα φάρα, oculi folia appellantur. Palpebræ Ciceroni, vel quod palpitare & tremere videantur, propter citissimum & frequentissimum motum vel quod palpitationi frequenter sint obnoxie: Genæ, Plinio: Cilia, Festo.

Duplices e constituuntur in quolibet oculo, cute per medium dissecta, & in superiore & inferiore em divisa; in utroque enim angulo manifeste continuæ sunt. Superior [tab. 20. fig. 1.3.E.] in homine mobilior est inferiore; hæc enim à quibusdam censetur ex se immobilis, & non nisi f genarum motu moveri, cum tamen à musculo moveatur, sed motu longe minore. Nam si palpebræ oculis usum præstare debuerent, debuit aut superior deorsum, aut inferior sursum, aut ambæ ad mutuam occursum & contactum venire. Jam vero musculus semicircularis in inferiori, non secus ac in superiori reperitur, & in animali vivo moveri manifesto videmus. Nec etiam ita celeriore spatio indigeat, quam tantæ celeritati conveniat. Quare facilius ad mutuam contactum venient, si altera ab altera juvetur. Verum superior in homine & animalibus, quibus inferior immota manet, major est, quia sursum trahi & demitti debuit. Contra in avibus inferior superiore major est eaque sola ut Aristoteles monet moveatur. Inferior [tab. 20. fig. 1.3.F.] superiore multo minor est: si enim major fuisset, in se ipsam h defluens, corrugaretur, laxa fieret, & ab oculo recederet, & quod majus h est, in ea lippiudo, lacryma, & ejusmodi colligerentur, quæ in excernendo h difficultatem haberent; quare parvam h fieri satius fuit: talis enim existens, oculo semper adstricta c sit atque adpressâ, & ad unguem h circumplectitur, & sic excrementa omnia

Bbb

faci- Gal. lib. de insiru. o. 5.

eitas. b Gal. de insiru. o. 5. c Gal. 10. us. par. 7. d Hipp. de prisca med. 3. de vict. in concis &c. e Palpebra superior & inferior 10. us. par. 7. partes superiores & inferiores regentes, Arist. 1. hist. 9. f Gal. 10. us. par. 9. superiores nullius fere utilitatis (inquit) nisi motu voluntario essent præditæ; & mox. inferiorem immobilem esse dixit, & e. 10. quemadmodum & 4. loc. aff. inferiorem prorsus immobilem pronuntiavit, & Vesal. inferior minor & immobilis. Col. primus musculus palpebras claudit & valide adstringit. Fall. palpebra superiores agiles admodum ac prompte mobile: Careano, inferior immobilis: Piecolh. duæ inferiores perstant immutabiles seu immobiles ex se, nisi genarum motu ci- santur. Sic Laur. unica superior mobilis est, quid omni inferioris motu opus, cum per superiorum motum ad inferiora claudatur, & per motum ejusdem ad superiora aperiatur oculus. At Plat. inferior sursum non aihil, cum oculum claudimus, ducitur. g 2. par. an. 13. h Gal. 10. us. par. 10.

a Genus hominum, avium, quadrupedum, tam viviparum, quam oviparum oculos visus custodiendi gratia in- regunt, sed varia qua animal parvum, geminam habent. palpebram & connivere solent: aves veniunt & quadrupedes ovipara, inferior palpebra connivent: nistant aves ab angulis membrana, qua tenuis pupilla ob- teditur: ovium maxime homo connivet: pisces insecta & crustacea palpebram non habent. Arist. 2. par. an. 13. Ex animalibus quadam palpebram habent, quibus non apertis cernere nequeunt: quadam, nempe quibus duri sunt oculi, cistidem carent, lib. de sensu & sensu, quod & Gal. lib. de insiru. o. 5.

k addit Gal.
qua cum essent
ejusmodi, per-
spicuum est,
quod motu
etiam non indi-
gebant.

l Gal. 10. us.

part. 6.

m Sub cute
palpebras con-
tegente mem-
brana sunt te-
nuis, quæ mus-
culos palpe-
brarum move-
res tegunt, 10.
us. part. 9.
n 2. par. an.

13.

o Nullus adeps
sed unguisus
duntaxat hu-
mor inter cu-
tem membra-
namque, Vesali-
us: nullo adipe
infarcitur,
Plat.

p Quomodo
periostium con-
stituit palpe-
bras, vide Gal.
10. us. par. 7.
q 10. us. part.

9.

r Spatium in-
ter duas peri-
ostii portiones
medium visco-
sa, atque un-
guosa occupa-
runt, cum me-
bris quibus-
dam à muscu-
lis extensis: quo
loci etiam quas
vocat idalli-
dos, gigni con-
tingit, unctuo-
sis his corpori-
bus (qua mol-

liendarum sua pinguedine palpebrarum gratia à natura fuerunt comparata,) supra modum naturalem aliquando
auctus, Gal. 10. us. part. 7. { 2. par. an. 13.

facile exprimit. * Quare utramque palpebram, ut ad sensum patet moveri dicimus, superiorem deorsum, inferiorem sursum, ut sibi mutuo occurrant: at cum inferior multo minor sit, exiguum, & obscurum, superior vero, quia major, magnum & evidentem motum edit.

Componuntur palpebræ ex cute, membrana carnosâ, musculis, tunica, tarsis & cli-
liis; quare substantia earum partim mollis, partim dura est: mollis, quatenus mem-
branosa & musculosa dura, quatenus cartilaginosa. Si enim tantum¹ mollis ac car-
nosa fuisset, cum hæ periculis primo obijciantur, propugnaculum non fuissent, & fa-
cilius quam ipsa cornea membrana afficerentur: imo facillime conciderent, rugosæ
fierent, & minus æqualiter omnibus oculi partibus obtenderentur. Si contra admo-
dum¹ dura & ossæ fuisset, neque facile moverentur, neque sine dolore corneam con-
tingerent. Quare¹ ex tali substantia, quæ facile moveri, & cum cornea, sine ejus noxâ,
versari possit, palpebras fieri consentaneum fuit. Cutis tenuissima est, si vsquam ali-
bi, omnis pinguedinis expers, ^m ne motus impediatur. Membrana vero carnosâ di-
cta, ita tenuis^u est, ut cum musculis vix aliarum partium membranam cuti subiectam
æquet, ita ut orbiculares ipsius musculi, nil aliud esse videantur, quam prædicta mem-
brana carneis fibris minimis commixta: ob hanc tenuitatem Aristoteles^o palpebra-
rum cutim sine carne esse dixit, & propterea discissam similiter ac præputium, non
coalescere.

Membrana interior [tab. 20. f. 5. e. e.] à pericranio producta tenuissima, levissima,
imo pericranio tenuior ac levior, perpolita, ne oculorum aciem lædat, cum oculum
contingat: quæ ubi in longitudinem tantam producta est, in quantam palpebras ex-
tendi oportebat, tum in palpebrarum cutim parte superna & inferna orbicularem fa-
cit angulum, & duplicem membranam constituit, ad quam p duplicationem substan-
tia quædam membrana durior & q cartilaginosa attensa est, quam ^{trif. sty} no nominant,
quæ duplicationem p hanc claudit ac comprehendit: at hujus membranæ pars supe-
rior interiorem faciem utriusque palpebræ succingit, & quasi subdividit: altera, oculi
exteriorem rotunditatem, supra musculorum tendines ad iridem p vsque obducit, &
tunicam oculi adnatam dictam, (ei enim continuatur) producit, [tab. 20. fig. 7. VV.]
quæ palpebram oculo amice cõjungit. Tenuitas, ^r autem hæc & lævitas propter celer-
ritatem & velocissimum palpebrarum motum requirebatur, cum ponderosa neque
crebro, neque celerrime moveri possint. Jam vero motus frequentia iis, quæ affice-
re possent, occurrit, celeritate autem omne visionis impedimentum adimit: non er-
go mirum, si palpebrarum corpus læve & tenuissimum est, sic & mollissimum, quo
ad motum agiliores & promptiores sint.

Palpebrarum motus sunt sursum, deorsum, quibus utraque movetur, & utriusque
circularis, quo ambæ palpebræ undique adstringantur; oculos enim aperiri & clau-
di necesse fuit; nam si semper palpebra recti, & ita clausi fuissent, objectorum imagi-
nes nunquam susciperent: aperti vero semper si mansissent, & ab occurrentibus tuti
non fuissent, & cito læderentur, ob spirituum luminis que interni maximam dissipa-
tionem: quare pro necessitate, & aperiendi & claudendi erant, quem motum natu-
ræ instinctu, non consulto fieri Aristoteles^c censuit, & ita contra extrinsecus occur-
rentia

rentia atque incidentia connivere voluit, quod Galenus reprehendit. Sed hic motus licet musculis peragatur & eatenus voluntarius sit, nihilominus videtur non semper ex arbitrio nostro dependere, cum plerisque naturale sit ut nictare non cessent, quos pavidiores dicunt: attamen hic motus partim liber est, partim coactus: Liber motus est, oculorum & tegendorum, & custodiendorum causa, si forte quid molestiam exhibeat, ut lumen valentius, fumus, pulveres, ictus, & quicquid extrinsecus illabi posset. Coactus vero motus, is qui à corporea affectione excitatur, vel corporis affectioni deservit, qui celerrimus est, & cum Galeno creber: quare dum fit, plerumque non animadvertimus, & sic forte naturalem potius quam voluntarium Aristoteles dixit: ut dum oculos diu apertos habuimus, etsi nihil, quod offendere possit, occurrat, cogimur oculos claudere, & quidem celerrime, & magis hyeme, quam æstate, vento spirante, quam aere quieto, frigido quam calido: forsan fit, quod oculus aeris externi contactum assiduum ferre non potest, propter eorum tendines, qui & exquisitissimo sensu præditi (quo oculus ea, quæ offendere possunt, maxime calorem & frigus statim persentiat, nam crystallinum aliquando cum visionis læsione, plus æquo à frigore condensatum constat) & nudi fere aeri externo expositi, cum his nil nisi membrana tenuissima, adnata dicta, imposita sit. Quare ne oculus à videndo unquam, neque à custodiendo, quantum opus est, revocetur, palpebræ motus celeritate & crebritate oculum aperiunt & claudunt. Motus autem hi musculis duobus absolvuntur, uno recto in superiori palpebra, qui eam attollit, & altero orbitali.

Musculus * rectus & oblongus [tab. 20. M. tab. 21. B.] palpebram superiorem attollens, intra ossium cavitatem in orbitæ parte superiore situs est, supra & prope ilium, qui oculum attollit, cui etiam figura similis est, & carneus, sed minor, & qui ab eodem principio, unde & reliqui oculum moventes, posterius ad nervi optici foramen enascitur: hic ab interiore parte, sed cono orbite recta ad superiorem palpebram extensus, tendine satis lato palpebræ extremo ejusve cartilagini inseritur, suisque fibris intro contractis, palpebram sursum trahit, inferiore sponte in suum lorium subsidente, sicque oculum detegendo, aperit.

Musculus γ semicircularis seu orbicularis [tab. 23. f. 1. C. E. t. 20. K.] inter membranam carnosam, & eam, quæ à pericranio producitur, situs est, qui membranofus est,

Bbb 2

& te-

vius duos quidem faciunt, orbicularem quem nominabimus, in duos dividentes, quorum alter attollat, alter deprimat, at revera unus tantum est, qui palpebram claudit superiorem, ipsi Columbo. Fall. Piccolhom. imo utramque palpebram colligit, Plat. Bauhino, Aquap. Hunc etsi Laur. geminum faciat, utrumque tamen palpebram superiorem claudere voluit. Hinc sequitur Galenum, Vesal. & Sylvium oculum aperiientem non agnovisse. Oculum vero aperiientem Fallop. Plat. Laur. & Aquapen. unum faciunt: at Col. & Piccolh. duos, quorum primus admittitur: ipsorum vero secundum oculum circumagere dicimus. x Hunc Galenus non agnovit, qui ab orbiculari musculo bipartito, omnes motus palpebrae absolvi credidit, (10. us. par. 9. 4. loc. aff. 2. at lib. de oculis 14. qui spurius est quatuor palpebra musculos tradit) quem & Vesal. nentiquam novit, & primo à se promulgatum, Fallop. asserit, imo ne Sylvius novit. Columb. Fallop. & Plat. secundum palpebra faciunt. y Primus palpebra musculus, Col. Fall. Plat. Piccolh. at Vesalius & Sylvius secuti Vesal. à Col. & Fallop. in Inst. reprehenditur. Sylvius cilium supernum moventes appellat. Fall. in obs. fatetur se semper in hac cum Galeno & Vesal. opinione fuisse, & se primum anno 1553. errorem agnovisse, partim motum loco Oribasii, lib. de dissect. muscul. ex Galeni cap. 29. partim ex dissectione Phocæ piscis, qui utramque palpebram movent. Laur. hunc

10. us. par. 9.
Sophista non-
nulli, cum ne-
que moventes
musculos, ne-
que motus ra-
tione inveni-
rent, eo impu-
dentia sunt pro-
gressi, ut ipsa-
rum motum à
nostra volun-
tate pendere ne-
garint, sed na-
turale esse,
quemadmo-
dum arteriis,
cordi & aliis
instrumentis
præter volun-
tatem motus
insunt, arbitra-
ti satius esse
mentiri, quam
suam ignoran-
tiam confiteri.
u Musculi pal-
pebrarum vul-
go dicuntur: at
ab Piccolh. mu-
sculi ocularii,
quod motum
palpebris oculo-
rum adferant.
In numero non
conveniunt,
nam Gal. &
veteres, Vesal.
item & Syl-

hunc in duos diuisit, & duos palpebram claudentes vocat, quorum alter ab interiori angulo ortus, totum cilium circum-
det, alter ab eodem angulo & nasi radice exortus in tarsum inferatur.

2 Totam pal-
 pebram occu-
 pat, & claudit
 seu colligit u-
 tramque pal-
 pebram, Plat.
 totum cilium
 circumdat,
 Laur. excepta
 parte inferiore
 ad angulum
 maiorem, a quo
 prohibetur, ne
 prorsus circu-
 laris fiat, Wal-
 lop. in insit.
 a 10. usq. part. 9.
 alter in maiore
 angulo apud
 nasum obli-
 quus ad tarsum
 partem dimi-
 diam peruenit:
 alter & ipse
 quoque obli-
 quus, cuius ca-
 pat ad superci-
 lium ad mino-
 rem angulum
 extensus ad re-
 liquam tarsum
 partem dimi-
 diam sibi pro-
 pinquam per-
 rumpit ille,
 quando agit,
 partem palpe-
 brae sibi conti-

& tenuissimus, ut qui a membrana carnosa fibris circularibus carneis sit adhaesus, se-
 mirotundus in utraque palpebra consistit. Hic ad nasi radicem in angulo maiore, &
 interno inferioris palpebrae, ubi futura communis est capiti & maxillae superiori, acu-
 to principio exoritur, & per inferiorem palpebram, cujus latitudinem imitatur, pro-
 greditur: mox ad angulum exteriorem sursum ad superiorem partem orbitae revolu-
 tus & amplificatus, perque superiorem palpebram progressus, in angulum internum
 & superiorem, acuto fine inferitur, & sic exactum circulum refert, cum exteriorem
 circumferentiam utriusque palpebrae ambiat. Hic versus suum principium attra-
 ctus, uno tempore, superiorem palpebram deorsum, & inferiorem sursum movet &
 ita utramque palpebram mutuo coniungit & adstringit, quod fibrarum continuitas
 in circuitu & angulo, & motus in eodem angulo, praesertim constrictior, qui & visa
 & tactu percipitur, probant. Nihil enim constringi potest, & ad mutuuum contactum
 venire, nisi aliquae partes sursum, aliquae vero deorsum ducantur.

Hic musculus ratione fibrarum, quae continuae sunt, unus, ratione ve-
 ro palpebrarum, duo semicirculares dici possunt, & separati semicirculum,
 ambo juncti, perfectum circulum complent. Hunc Galenus^a agnovit, & ab
 eo omnes palpebrarum motus absolvi voluit, eumque divisit, & alterum ad angulum
 maiorem versus nasum trahere, alterum ad minorem, & dum prior trahit palpebram
 deprimi, si vero posterior, attolli. Sed cum fibrae huius musculi per totam palpebram
 sint continuae, dividi non potest. Inferior vero palpebra, etsi & ipsa sursum & deor-
 sum moveatur, nullum tamen musculus habet, qui motum rectum obeat, sed tan-
 tum orbicularem praedictum, qui ipsam sursum trahit, sed magis ad angulum inter-
 num, tanquam ad suum principium, ut quilibet in seipso tactu deprehendere potest;
 qui tamen motus, ex quorundam sententia, a genarum motu perficitur. Ergo mo-
 tus palpebrarum duobus absolvitur musculis, recto, qui in superiori palpebra eam
 attollit: orbiculari, qui in utraque palpebra, qui tensus inferiorem palpebram sursum,
 superiorem deorsum eodem tempore trahit & ubi maiore adstrictione & oclusio-
 ne opus est, tum musculus superciliorum orbicularis, de quo ante, suppetias fert:
 quemadmodum majori apertioni, frontis musculus auxilio est. Verum pericranium
 membrana, quae musculus hunc obducit, non in orbitae ambitu terminatur, sed ad
 malas usque producitur: quare in ophthalmia humor diffunditur quocunque peri-
 cranio pervadit: ita ut ecchymosis infra ꝑ orbitam duorum digitorum latitudine
 extendatur. Quod si haec demonstrare velis, cultro exiguo acutissima acie praedito
 opus est: separando primum cutem, ita tamen, ut fibrae musculi integre servantur,
 majori diligentia in angulis adhibita: tum musculus separabis, infra ad tarsum supra
 ad supercilium.^b Verum cum in spasmo cynico observatum fuerit, superiorem pal-
 pebram
 pebram
 nuam deorsum trahit: cum vero alter, reliquam sursum trahit: si simul agant, tum oculus non magis erit apertus, quam
 clausus, & ea erit figura, quam Hipp. *σφαιροειδής*, id est, curvum atque reflexum appellavit. Idem Gal. seq. cap. fatetur:
 se majoris anguli musculus nunquam vidisse, hinc patet ipsum ex aliorum sententia locum esse. Idem cum Galeno
 Vesalius sentit. At Gal. loc. aff. tres musculos recenset, duos praedictos, quos innuit palpebram deorsum trahere, & ter-
 tium a fronte natum, qui palpebram sursum trahat. ꝑ Gal. 3. comp. med. local. b Tercium musculus addunt Co-
 lumb.

lumb. & Piccolh. qui ex eodem loco, ex quo & palpebram assollens prodant, & ipsi in subsidium veniat, cum rem gravitatis participem operosus sit sursum erigere, quam deorsum deprimere. Addit Columb. semirari, Galenum Vesal. & veteres, quod hunc musculum, ut & tertium inter musculos oculorum numerarint, cum palpebra deferviant, quæ usque & sitis in brutis quoque sit idem, forte deceptos, quod in orbita eorum sit sint. At hunc tertium Columbi & Piccolh. dicimus esse musculum sextum ipsius oculi.

pebram naturaliter motam fuisse, inferiore palpebra immota, ita ut oculus medius apertus conspiceretur: & cum nervos distinctos habeat, superior quidem ab eo nervo qui per superioris orbitæ foramen erumpit: at inferior ab eo qui per inferioris orbitæ foramen egreditur, an non liceat cuilibet palpebræ suum musculum orbicularem tribuere? sunt qui illum orbicularem majorem & latum nominantes, & alterum minorem Ciliacum vocantes addant qui cilium utriusque palpebræ orbiculatim cingat, ut palpebras inter se exquirit claudat, qui cartilaginis tarsi latitudinem non excedat.

Cartilaginofam quoque palpebrarum substantiam diximus, ad earum extrema respicientes, quibus cartilagine [tab. 20. aa.] inter cutem & membranulam palpebras succingentem, semicirculares corniculatam lunam referentes, teretes, parvæ satis molles, & ab ossibus liberæ inferuntur, quas *ταρσες* Græci, & at Plinius & Galeni interpres cilia vocant. Hæ præter utilitatem supra allatam, etiam propter motum additæ, quo æqualis fiat oculi & clausio & apertio, quatenus membranas tenues firmant, & distentas detinent, ne in motu corrugentur, & ut d. musculus in superiore palpebra commodiorem infertionem præbeant. Volunt etiam propter pilos additos esse, quo tanquam firmiori substantiæ infixi, recti f. & immoti permaneant, quod facile in oculos confidissent: quare Galenus & hanc tarsi secundam utilitatem posuit, & ipsam tenuibus quibusdam foraminibus pertusam tradit.

Pili h. palpebrarum [t. 20 f. 1 bb.] *βλεφαρίδες* Hippocrati, i Aristoteli, k palpebræ, à frequent. palpitacione, Plinio: cilia, aliis, quod oculos celent, ac tueantur, h. mox ut & superciliorum facti sunt, & eleganti ordine dispositi, æqualem magnitudinem & numerum servant: æqualem m dixi magnitudinem, si enim quid addideris, aut absteris illorum utilitatem corruperis: si enim minores fuerint, in ipsos incidere permittent, quæ prius defendebantur: si vero majores aut densiores effeceris, non amplius valuerint murus oculi, si d. carceri m cuidam simile fuerit id operimentum. pu. illas enim occultabunt & obscurabunt, quas tamen omnium instrumentorum minime obcurari oportebat: Ob eam causam Conditor m nostri, æqualem semper magnitudinem servandi necessitatem ipsis imposuit, quod id ad rem pertinet parvorum palpebræ moventiū

Bbb 3

dilatatorū & extenuatorū productione tarsus recipit. & hæc tertia est & maximæ tarsi utilitas, 10. us. part. 9. & Vesal. Fal. e. Durum corpus insit cartilaginis cujusdam subiecti. 10. us. part. 14. f. 10. us. part. 7. 11. ejusd. 14. Hoc affirmant ceteri, ut Vesal. Fall. at Plat. negat, quia pili nullibi illis inserantur. At Arist. 2. part. an. 15. cilia venularum sinibus insidentur, nam ubi cutis finis, ibidem etiam venule desinunt: itaque propter vaporem, qui inde crassiusculus prodit, pilos in foris nasci necesse est nisi quid naturalis officii ad alium usum impediatur: Aquapen. à tarsis cilia prodeunt. 20. us. part. 7. h. Cilia habent ad palpebras, qua pilos obtinent, aves & qua cortice integuntur, carent, excepto struthione Africa (qua partim avis partim quadrupes 4. part. an. 14.) & interea qua pilos habent, homo unus cilium in utraque palpebra obtinet. Quia strupedum generis pili n. n. parvo supina, sed prona potius habentur, homo contra parte magis supina, quam prona, pili enim operimenti gratia adjuncti sunt animalibus. Quadrupes nulla est, qua pilos vel in palpebra inferiori habeat (nonnulli tamen sub ea nascentes habent) vel in cilio, vel in pube, ut homo Enc. Arist. 2. part. an. 14. i. In Coacis aph. 218, k. 1. hist. an. 9. 2. part. an. 15. 1. Gaze, Vesal. Columb. Plat. Aquap. m. 11. us. part. 14.

n 10. us part. 7. pertinere magis videbatur. At quemadmodum ⁿ superciliorum pilos sibi ipsis mutuo incidere præstiterat, ita hos rectos conservari; cum superciliorum usus sit, id quod à capite defluit, priusquam oculis incidat, excipere; sic eorum, qui palpebris insunt, pulverem, parva animalia volitantia, aut similia, ne oculis incidant, prohibere. Sic etiam nec recta sursum ad supercilia, nec recta deorsum ad malas, nec intro in oculos nutantes spectant; primi enim ⁿ, usum cuius gratia creati, labefactassent: secundi, oculis incommodassent, continuitatem obsectorum spectandorum intercedentes. Attamen ut superioris ^{*} palpebræ pili leviter sursum inflectuntur, ita inferiores deorsum incurvantur: nam si recti undique essent, oculis umbram inducerent, & quo minus sursum videre possemus, impedirent. Sic & ⁿ conveniens & commensuratum intervallum inter ipsos est; nam si longius à se destitissent, multa oculis incidere potuissent, à quibus nunc arcantur; sin vero ⁿ sese contingerent, noctem quodammodo oculis offunderent, & usum, cuius gratia facti sunt, everterent, tanta est Con-

** Theodoretus
form. de provid.*

ciliorum; in-

quit, pili nequa-

quam ut super-

ciliorum pili in-

flexi sunt, ne ex-

propugnatori-

bis hostes vel

insidiatores red-

dantur: nec er-

jam secundum

rectam lineam

extenduntur,

ne in palpebra-

rum conjun-

ctione sese foras

invicem atto-

rant, sed foras

nonnihil exten-

duntur, ut ea

qua ex tenuis-

simis corpori-

bis damna ocu-

lis accidunt, ar-

cerent.

o Arist. 3. hist.

an. 11. quomodo

oculi palpebra

sint radende,

vide Hipp. lib.

de videndi a-

cie.

p 11 us part. 14.

q In introduc.

Sic Columb.

visui dirigendo

inserviunt.

Laur. dirigere

dicuntur.

r 10. us part. 7.

Arist. 2. par.

an. 15. † Gal. in defin. inserviunt quoque cilia colligandis palpebris invicem conferta & implexa, D. Basl. hom. 11.

f 2. par. an. 13. pisces palpebris destituuntur, quia perpetuo in aquis degunt: animalia squammosa palpebris carent, cum eorum oculi durissima membrana protegantur, & sinus habeant, in quos oculos suos recipiunt. Pennata pro palpebris pelliculam alba tela similem, eamque mollem habent.

ditionis sapientia simul ac providentia, quam in tota animalis fabricatione adhibuit. Hi nunquam ^o plus in isto excreverunt, & non nisi in ^p magnis partis affectibus defluunt, etsi Philosophus ^o censuerit rebus venereis incaptis defluere, eoque magis, quo usus veneris fuerit amplior, quique lentissime ^o omnium canescant. His munitæ sunt palpebræ tanquam vallo pilorum, non modo, ut aliquibus placet, ornatus oculorum gratia, sed ut spiritus visivos & radios ab ⁱ interiore parte effusos, perspicendi gratia dirigant; siquidem his elapsis vel retortis, nequaquam animal ut antea in rectum vel longum [†] videre potest. Eorundem quoque nictus creber in vigilantibus est, & ut visus recreetur, & ne quid violenter oculis incidat: siquidem ceu vallum [†] quoddam visus ea, quæ oculis patefactis incidere possent, tuentur, cum iis tanquam rete irretiantur.

Habent etiam palpebræ, venas à jugularibus, arterias à carotidibus, & nervos à secundo pari, quæ nutritionem, calorem, sensum & motum deferunt.

Quod vero superiori palpebræ impendit, καίλον, cavum Ruffo [tab. 20. fig. 1. 2. g.] quod vero illi sub inferna palpebra respondet, ὑποκαίλον, subcavum dicitur [tab. 20. fig. 1. 2. h.] & hoc in hydrope & cachexia, & hæmorrhoidum longo fluxu, & menstruorum antiqua purgatione, nonnunquam etiam lippitudinibus inchoantibus intumescere consuevit; quemadmodum in libro partium externarum monuimus.

Usus palpebrarum: etsi Philosophus earum usum dicat, ut oculos tegant, & noxia illapsura impedian; cuius nomine crassissimæ & pinguedine multa obductæ requirerentur: quod neque insectis, neque piscibus, neque ostraceis contingit, attamen Palpebrarum usus plures proponemus, quarum primum & præcipuum dicimus cum Varolio esse, ut corneam ab omni sorditie abstergant. Nam visio in medio diaphano, maximam puritatem postulat: secus enim videre non possemus, ut patet in aqua turbida, & aere caliginosa: ideo cum cornea ob humiditatem ex glandula resudantem, nec non aeris externi contactum, facillime obtenebretur, facta est palpebra, quæ uniformiter oculum contingit, & ubi in oculi apertione attollitur, omni sorditie corneam

neam abstergit ac depurat: Et hæc causa est, cur ita frequenter palpebram moveamus, ubi quidpiam exacte videre volumus. Dein, ut visoria virtus à luce avertatur, ut in somno, quo homo melius quiescat: cum in aere lucido nemo nisi rectis oculis dormire possit, unde animalibus quæ palpebris carent, ut locustæ, cancri, &c. Natura finis quosdam dedit, quo instante somno quasi in cubicula quædam oculos totos recipere: qui mox, cum cernendi voluntas subit, eruntur, & una cum cervicibus suis in sublime extolluntur. Imò natura semper in id intenta, ut sensus in suis actionibus retineantur. Tam ad visus recreationem, ne tot spiritus uno & continuo tempore dissipentur: si enim oculi toto vigiliarum tempore paterent, fatigarentur, & multa incidendo eorum tunicas violarent. Sic si non ex toto integantur, visionem dirigunt, cum quippiam longius rectè prospicere volumus. Quarto, ut oculi molles ab incurstantibus defendantur, cum latius sit, nos eo tempore non videre, & oculos sine noxa servare.

*Attilius
Regulus 2. Con-
sul primo pu-
nico bello in
Africa ex infi-
diis captus,
quod Romam
à Carthagine
sibus invitus
missus, in Sena-
tu captivorum
commutatio-
nem suo consi-
lio impedivif-
set: post redi-*

tum ea poena ab illis mulctatus fuit, ut abscissis palpebris Soli exponeretur, cujus lucem non minus oculos quam vitam offendentem diu sustinere minime potuit. u De inst. odor.

De partibus oculum constituentibus, & quidem de Adipe.

CAPUT XXXVI.

Partes oculum constituentes quinque sunt, Adeps, Musculi, Vasa, Tunica & Humores.

Adeps copiosus [tab. 20. f. 6. T.] oculis adponitur, qui potissimum inter inania musculorum & nervorum spatia reperitur: copiosior quidem ad musculum superiorem, cum major sit, & motibus frequentioribus & robustioribus destinatus; sic ad orbitam inferiorem, copiosus, qui instar pulvinaris, oculis, ne suo pondere ossibus illidant, subjicitur; tum inter musculos & oculi globum plurimus est, ne dum musculi agunt, oculus comprimatur: tandem ad venas & arterias, quo vasa hæc oblinantur, & eorum distensio in oculorum motu prohibeatur. Et glandula occurrit in parte superiore exterioris anguli, adipi immersa, quæ humorem continet, quo oculum ad faciliorem motum iriget.

*Adeps durissimus
oculus copiosus
& albus admo-
dum. Ves. Plat.
Laur. pingue-
do, Columb.
Varol. modo pin-
guedo dicitur.
Aqua pend.*

Ufus adipis, quatenus calidus, oculum natura sua aqueum & frigidum calefacere, & à frigore ambiente fovere; quare oculi nunquam rigent: quatenus humidus, musculos humectare, ne ex frequenti motu exsiccantur; quatenus mollis, ne oculi dum moventur à circumjacentibus ossibus lædantur: quatenus unctuosus & pinguis, oculi munus proprium tum ma velocitate abolvere, & faciliorem motum præbere, & musculis aliquando ex motu exsiccatis, & quasi tabidis alimentum præbere.

De

De musculis oculorum.

CAPUT XXXV.

De his egit Galenus lib. de diff. musc. 5. 10. us. part. 8. lib. de oculis, & 4. loc. aff. 2.

a 10. us. par. 8.
de oculis 4.

b 2. part. an. 10.

e Aquapen-
dens.

d 7. Problem. 8.

e 32. Probl. 25.

quar. Quare

cum parres cor-

poris nostri de-

extra mobiliore

sint, oculus sini-

ster expeditius quam dexter contrahatur?

An propterea quod omnia sinistra dextris humidiora sint, humidiora au-

tem plenius contrahi possunt. An dexter amplius efficere possit: sinister vel ex se, ut humidior, obsequentior sit.

f Gal. 1. mot. musc. 3. g Gal. Vesal. & Anatomici alii, omnes beluinos oculos describere, quare septimum in unoquo-

que posuere, ait Columb. omnes musculos oculorum male enumerat, qui in bove reperiuntur, non autem recte, ut in bo-

ve sunt collocati, qui & octavum omittit, Fallop. h Musculorum in numero non conveniunt. Otto esse auctor libelli de

ocul.

Cum oculi dati sint, ut exploratorum munere defungantur, quo utilia prosequamur, nocitura vero fugiamus, non vero ex quavis^a positione oculi visibilia omnia cernere possint (quemadmodum neque aures ex omni situ audibilia audire possunt) cum neque ex obliquis ac lateribus, neque ex posterioribus, neque ex superioribus vel inferioribus neque aliud quippiam, nisi quod pupillæ rectis lineis opponitur, cernere queant, idcirco^a minime immobiles esse debere, alias duntaxat id, quod ipsis ex directo positum esset, viderent (per directum enim cernimus, inquit^b Philosophus) & sic paucissima videremus. Quare ita dispositi esse debere, ut in omnem partem moveri ac circumagi plurimum possint, ut facile quocunque velint, convertant: & quo munus proprium summa velocitate absolvant, plurimo adipe unctuosos obvoluntur. Sed addit Galenus, cum ipsis oculis, etiam collum (imo caput) ad motus habile factum esse. Nam cum oculus ad omnes loci positiones moveri debuerit, quæ sex sunt, sursum, deorsum, antrosum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum, quibus tanquam ex omnibus mixta septima, quæ in gyrum fit, adjungenda. Jam vero antrosum & posterius non moventur, partim, quia non necessarium, partim, quia impossibile fuit: antrosum enim^c moveri opus non erat, cum oculus non ipsam lucem, sed oculum lux adeat, quæ momento immensum spatium usque ad oculum perlustrat, & intro in ipsum pervenit. Verum sapientissimus rerum Opifex motuum oculorum defectum correxit, ope motus capitis, quod est vestigio ad ea videnda, quæ oculi aut propriis motibus, aut complete præstare non poterant, sese convertit. Quo vero totum id, quod à tergo est, oculis perlustrari possit, cum id sola capitis circumvolutione fieri non possit, motus hic à femoribus adjuvatur, dum totum corpus invertitur. Sic motum oculi sursum adjuvat, capitis motus retrorsum & spinæ totius, quod experiuntur ii, qui fornicem templi alienius sublimis inspicere volunt: sic deorsum & capitis & colli motus, qui antrosum fit. Quare cum motu^a voluntario oculis præditos esse oportuerit, & omnes motus per musculos fiant, idcirco Opifex oculis musculos dedit, quibus celerrime moventur: hinc oculus corporis nostri pars mobilissima à Philosopho^d dicitur, qui tamen voluit^e, oculum sinistram dextro expeditus contrahi. Jam vero, cum oculi humani motus sex^f sint, sex musculos quilibet obtrine-

Musculi igitur in oculo humano, quemadmodum & simia sex^h numerantur; quadrupedi-

o. al. 14. voluit, quorum quinque oculum movent, tres nervi fundamentum corroborant: quibus addit quatuor palpebras moventes. Septem fecit Galenus, quorum quatuor rectis motibus praesint, duo totum oculum circumvertant, septimus oculum firmiter, lib. de dissect. muscul. 5. 10. us. part. 8. 4. loc. off. 2. (Piccolb. dicit posteriori hoc loco, Galenum tantum se p. fuisse) secuti sunt Galenum, Vesalius & Eusebius. Sex sunt Fallop. Carcano, Plat. (hic figuram Vesalii exhibet.) V. ro io Bauhino, L. uentio. Quinque non sex esse Lycus opinabatur, sed eos qui non sex, sed quinque dicant, non solum in numero, sed etiam actionibus cognoscendus errare, asserit Galenus 10. us. part. 8. Sic Columbus quinque censuit, quintum sum dicens inventum: secuti sunt Valverda & Piccolb. at quem nos sextum dicimus, illi palpebra tertium faciunt.

pedibus autem prona incedentibus septimus additur, qui in duos, tres, vel quatuor dividi potest. Sex sunt, quia oculi humani motus sex existant: quatuor recti, quibus quatuor praesint, motui qui sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum fit: duo obliqui motus, quare & duo musculi, quorum munus est circumagere, & in gyram flectere: horum tamen unus exacte obliquus, alter partim rectus, partim obliquus est. Omnes tamen in posteriore oculi sede, intra calvariae cavitate nervum opticum committentes, siti sunt; qui dum adhuc in suo situ sunt, simul cum oculo figuram pyramidalem seu turbinatam constituunt [t. 2. o. fig. 6. & 7.] ex his crassiores & corpulentiores sunt recti, qui eandem structuram, originem & insertionem habent, & per oculi longitudinem recta procedunt: obliqui vero minus carnosus sunt. Parvi sunt, quo celerius moveri possint, ad quod oculi figura rotunda plurimum confert, (motui enim celerrimo sphaerica figura maxime idonea, quae motus omnes alios mira velocitate praecedat, quod ex sphaericitate coeli deprehendere licet) quo ad omnes res visibiles conspiciendas minimo tempore ferantur; ob quam etiam causam caput velocissime movetur, cum exigua sui parte ossi quiescenti incumbat. Recti quatuor versus radi-ces nervi optici contigui, ab orbitae ossis parte profundiore, quam os sphaenoideum constituit iuxta foramen, e quo nervus visorius prodeit, acuto principio exoritur, toto ductu carnosus, & ventis fere tereti versus anteriora ducuntur, & paulo supra oculi medium in latissimum, tenuissimum & membranofum tendinem desinunt, quo anterieus oculum totum cingunt, & corneae tunicae qua parte pellucida est, iuxta iridem majori oculi circulo pertinacissime adnascuntur; hique tendines simul juncti, tunicam innominatam Columbi efformant, & oculi candorem sub lucidum constituant: horum enim musculorum tendinibus potius, quam adnatæ tunicae, hic candor acceptus ferri debet.

Primus [tab. 2. 1. fig. 1. 3. 4. D. fig. 5. d.] in superiori loco positus, carnosus, & teres, ceteris crassior, secundo major & robustior, cum oculum p. sursum & versus supercilia

Ccc

tol-
eandem patitur
notam, quam

sepius Galeno imputat, dum ipsum suis simis delusum multa comminisci ait, Fall. in instit. Quatuor cruris angulos constituere videntur, superior ab osse frontis, inferior à mala, dexter ab ossibus nasi, sinister à Zygomate, Piccolbom. Oriuntur à membrana dura cerebri, opticum obvolvante, & è nervo secundi paris, Vesal. à sphaenoide duraque man-are exorti, Columb. à membrana oculi orbitam succingente, & membrana opticum vestiente, Plat. à pericranio, Aquapend. errant, qui ab interiore membrana eaque crassa opticum ambiente, enasci putant. Hoc enim sensui omnino adversatur, nec à membrana enasci debuerunt, aut potuerunt, non debuerunt, quia membrana exquisitissimi sensus nervum circumdat: itaque muscoli in motibus suis nervum comprimerent, & visioni obessent; non potuerunt, quia firmi basi non adherent: quare ab interiore & profundiore orbita, Laur. n. Membrana hac ad iridem non pertingit, Colomb. o. Velut Gal. validissimi aponeurosisbus circulum efficiunt lati tendinis in iridem ac corneam desinentis, 10. us. part. 8. & 1. mot. muscul. 3. p. Tertius Gal. 10. us. part. 8. Vesal.

tollat, & majore robore in attollendo, quam deprimendo opus sit: hic attollens & superbus dicitur.

¶ Quartus Gal.

¶ Vesal.

¶ Primus Gal.

¶ Vesal.

¶ Dissert. muscul.

¶ Secundus Gal.

¶ Vesal.

¶ Vesal. Col.

Fallop. Aquap.

Verum Piccol.

ait hos quatuor

quando diver-

sus temporibus

cum aliqua mo-

ra moveatur,

hoc est, contra-

hantur versus

suum princi-

pium, tum quæ

libet oculum

versus suam o-

riginem move-

re. Quando au-

tem diversis

temporibus sine

mora, sed success-

sive, tunc oca-

lum in orbem

circumferre (qua

& Columbi sententia est)

quando vero omnes eodem momento agunt, tunc sistere, firmare, & immo-

bilem oculum reddere, quibus in subsidium quintus veniat: sive illi quatuor seorsim sive simul agant. At Laur. om-

nibus sex simul operantibus & villis intendentibus sistitur. ¶ Sextus Fall. Plat. Laur. quintus, Gal. & Vesal.

¶ Columb. hunc se invenisse & descripsisse dicit, & transversum sub quatuor rectis situm, oculi medietatem completi &

corneæ oriri, & in eundem desinere, admirabilem esse, qui à latere tendine latiusculo præditus sit, quo corneæ adhareat:

in cuius medium nervus insignis crassusque satis ingreditur, qui æreus, strahatur, oculum sursum verti & cir-

cumagi, imo & in sua sede immotum contineri & sibi. Cuius forte usus sit, ut ejus auxilio cælum intueamur: Piccolh.

existimat nasci, aut adhaerere transversum superiori orbitæ, & in utrumque latum oculi ad corneam exporrigi, & ori-

ginem ejus ratione dextri lateris, videri sinistram, & ratione sinistri, videri dextram: cuius usus, ut quatuor rectis in

subsidium veniat, sive seorsim, sive simul agant, hic superiori oculum sursum trahenti opem fert, & potius ad superio-

ris, quam inferioris musculi actionem concurrat: hic etiam oculum sistit, ut situs docet, contractus versus suam origi-

nem, & vertit in gyrum aliorum motum adjuvans, & oculum continet, ne sede excidat. Dein reprehendit eos, qui ab

oculo oriri, & in eum desinere volunt: nam si omne, quod movetur, aliquo quiescente moveretur, & in motibus muscu-

lorum, quiescente origine musculi movetur, sequeretur eodem temporis articulo oculum & moveri & quiescere, hæc

Piccolhom Fallop. in observ. inquit, quintum addere Valverdam, sed quid sibi velit, non intelligere (is Columbum imi-

tatur) mox inquit, cum fortassis de cepisse musculi huius obliquum, & fere lateralem inter alios situm, quod & Laur.

asserit.

¶ Sextus Galeno & Vesalio: quintus, Fall. Plat. Laur. at Columbo & Piccolhom tertius palpebra musculus, verum hos

obliquos inquit Aquapend. nullum neque agnovisse, neque descripsisse, quam Fallop. unde errent illi, qui obliquos ocu-

lorum motus à musculis rectis vicissim laxatis ac tensis perfici velint. Quibus reprehendit Columbum, qui voluit, si

omnes una sub sequenti motu operentur, circularem motum effici, quod etiam à quatuor musculis brachialis fieri dicit:

huius opinionis & Piccolhom fuit. Quod & Fall. sic reprehendit, fieri inquit, ut ex refractis duobus vel pluribus mo-

¶ Secundus [tab. 21. f. 2. 3. 4. E. f. 5. e.] huic oppositus parte inferiore situs, oculum deorsum & versus malas trahit, & minor est illo, cum oculus suo quoque pondere deorsum inclinaret, & deprimens & humilis nominatur.

¶ Tertius [t. 21. f. 1. 2. 3. 4. G. f. 5. f.] in majori angulo locatus, oculum introrsum versus nasum ducit, & adducens & bibitorius vocatur.

¶ Quartus [tab. 21. f. 1. 2. 3. 4. F. f. 5. n.] illi oppositus, ad externum latus repositus, oculum extrorsum ad parvum angulum, seu tempora contorquet, & abducens seu indignatorius dicitur. Verum ab his quatuor si simul agant, oculum intro trahitur, sistitur, firmatur & continetur, quem motum tonicum Medici vocant.

¶ Quintus qui inferior seu minor [tab. 21. f. 2. 3. 4. I. f. 5. B.] latere externo in cavitate inferiore positus inter oculum & tendines musculorum secundi & quarti (quare aliqui ipsum ab oculo oriri, & in eundem inferi dixerunt) oritur ab ea rima, quæ cœu futura apparet ossis orbitæ inferioris, primum os maxillæ cum quarto jungentis, ali- quando à squamma ossæ, carnoso principio: qui gracilis est, & teres & brevis, & exacte obliquus, qui oblique versus externum angulum incedens, oculum amplexatus, tendine brevi, & aliquatenus rotundo, qui nervosa tenuitate sua iuxta iridem obliqua linea implantatur, prope sexti insertionem, ita ut aliquando utriusque unus, & idem tendo videatur. Huius munus, ut contractis suis fibris oblique deorsum ad angulum externum oculum in gyrum voluat & pupillam versus nares retrahat.

¶ Sextus qui inter obliquos superior & major [tab. 21. fig. 1. 2. 3. 4. H. f. 5. i.] latere interno superiore parte sub rectis situs, partim rectus, partim obliquus est, & ab eodem loco oritur, unde is, qui oculum recta ad internum angulum trahit, iuxta latus forami- nis

ribus rectis, resulcet circularis, cum inter rectum & curvum nulla detur proportio. At Plaz. si duo recti utriusq; lateris simul agant, obliquus quoque fit motus.

nis visorii in orbitæ parte postrema, & tam in homine, quam in brutis, ad anguli interni exteriorem fere marginem, in tendinem teretem & gracilem, & longissimum [tab. 21. f. 1. & 2. a.] (quanto enim longior & robustior, cæteris vero gracilior est) definit, quoad ^b cartilaginem exiguam canalis modo excavatam, quasi per anulum ut potius tanquam funis trochleam Fallopio primo sic dictam, (quam in oculo bovis, sed imperfectam, hæcenus demonstravimus) in majori angulo sitam reflectitur & circumrotatur, & oblique procedens ad angulum rectum [t. 21. f. 1. & 2. b. at in 3. & 4. ab osse reuulsa,] versus oculi partem superiorem inter primum & quintum obliqua ali-

^b Cartilagine vocant, & quidem trochleam, Fallop. Laur. Aquapend. at Plaz. dicit transverso ligamento duro ab osse progresso continuari.

quantulum linea inseritur: at tendo ligamento ^b quodam per totum ductum, quasi vagina quadam obvoluitur. Hic dum intro ad principium trahitur tendine suo circulari quodam motu oculum ipsum ad angulum internum obvoluit & sistit, ut ali- quod objectum firmis oculis diutius inspicere & etiam cælum contemplari possimus. Hi duo circumagentes, ^c alter superior, alter inferior dicitur, circulares, amato- rii: & sextum trochleæ musculus nominant.

^c Circumversioni præcipue conducunt, at tamen & sursum & deorsum oculum quodammodo agunt, Vesal.

Septimus musculus in brutis ^d datur [tab. 2. fig. 5. n.] sex enumeratis subiectus, qui solus figuram habet eam, quam priores sex efformare diximus: hic brevis est, nervum ^e opticum [t. 2. f. 5. l.] orbicularim, adipe tamen intercedente ambit, & in priora porrectus dilatur, totumque oculi globum ad radicem amplectitur, & circulum quoque efformat, eo modo, quo quatuor primi ad iridem suis tendinibus circulum efficiebant, & in duram tunicam oculi carnis inseritur, qui in duos, ^f tres vel quatuor dividi potest. Cuius usus ^g oculos brutorum (cum prona terram spectent) deorsum nutantes, & pondere suo propendentes, retinere, sursum trahere & firmare; & ne nervus ^h opticus molli ullo pacto in processu divertatur, & distensione periclitetur, obvolvere. Quo musculo homo non indiguit, cum sapientissimus Opifex homini tanquam animalium divinissimo, os sublime dederit, cælumque videre iusserit: quod si interdum in terram inclinatus aliquid spectet, aut agat, musculi recti omnes simul, si in officio sint, facile id præstant, cum membranæ oculi orbitam succin-

^d Aquatilia, & inter ea lucius piscis, sex tantum musculi habent, quorum duo obliqui decussatim se intersecant, Aquapend.

^e Musculus meatum ipsum comprehendens, 4. loc. affect. 2. Quo magnus circa radicem, 10.

genti fibris connascentur.

Ostium, qui in bobus reperitur, Fallopius his addit, qui cartilaginosam illam membranam, quam Philosophus ⁱ δέγμα ἐν τῇ κοιλίᾳ vocat, trahit, qua animalia bruta nictitare solent, cum metuunt, ne oculis aliquid incidat, & οὐραγεδαμύττει tunc à Philosopho dicuntur: nisi forte quis velit, partem esse illius, qui oculum ad exteriorem angulum trahit.

Ccc 2

Quo

^{us} part. 8. ^f Musculus circa oculi basim situs, si ve quis unum dicat, si ve duplicem, si ve triplicem: si ve etiam duos vel tres coalitos, Gal. dissect. musc. 5. 4. loc. aff. 2. quibusdam Anatomicis triplex: aliis duplex, nonnullis simplex esse videtur: at una est omnium utilitas, 10. us. part. 8. nullam inscriptionem obinet, nisi fortassis ana in inferiori sede: quare miror ab aliis duorum: aliis trium loco enumeratum, cum hunc vix obiter descripserint, Vesal.

^g Ad firmandum oculum in motu tonico, cum pusillum aliquod corpus accurate & directe nobis inspicendum est, Gal. de dissect. musc. 5. ^h Constringit ac munit nervi illius molli immisionem: oculum vero sursum attollens, & elevans, ac nonnihil etiam simul connectens: facile enim rumpetur molli ille nervus in vehementibus in caput lapsibus, violententer concussus, nisi undique stabiliretur, 10. us. part. 8. & 4. loc. aff. 2. optico obducitur instar tegumenti, & oculum rectis motibus agit, prout has vel illas fibras contraxerit laxaverit ve, Vesal. i. 2. hist. an. 12.

Quo vero muscoli hi recte conspiciantur, ubi cerebrum ablatum fuerit, orbita ad utrumque angulum usque ad nervum opticum, serra dissecetur: cavendo tamen, ne in angulo interiore trochlea laedatur: mox pericranium ab osse separandum, & orbitæ pars superior retrorsum trudenda, tum adeps auferenda, & muscoli, tam palpebræ, quam oculi cum vasis demonstrandi: & si voles, cujuslibet musculi proprium motum observare, musculis in suo situ existentibus, cuilibet non longe à tendine filum alligabis, & trahes. Potest etiam oculus integer, ex sua orbita cum trochlea in interiore angulo sita, eximi & demonstrari.

De Vasis oculorum.

CAPUT XXXVII.

Quomodo vena & arteria ad oculum ferantur cum retina, vide 10. us. part. 2. De nervis vero agit lib. de dissect. nerv. 2. & 3. 10. us. part. 12. ubi de modo visionis tractavit: cur optici unum principium non habeant, & de eorum coitione, vide 10. us. part. 14. 7. de plac. 4. & 5. lib. de oculis 3.

^a Vena & arteria oculi constitutionem subintrant, Vesal.

^b à trunco maximo cerebri, quem spinalem medullam vocant ex posteriore ejus parte

optici oriuntur, 22. f. 2. 4. 8. a.

^c Varolius à posteriore, & infima cerebri

parte, à spinalis medulla principio, etsi tota antiquitas cum

Galeno 7. Plac. 4. secus crediderit, Aquapen.

^d Ad oculos

^e φλέβας λέγουσιν.

venula tenues ad visionem ex cerebro per meningem tendunt: ha venula humore purissimo de cerebro visionem alunt: in quo etiam rerum species in oculis apparent, eadem quoque ubi rescicata fuerint, visionem extinguunt, Hipp. de loc. in hom. productiones à cerebro vocat Gal. 10. us. part. 1. d. 16. us. part. 3. c. 7. plac. 5. f. 7. plac. 4. g. 16. us. part. 3. ex Herophilo notat, hos interius per universum ductum perforatos esse, cuius meatus gratia crassissimi facti sunt. h. 10. us. part. 12. 7. plac. 5.

^f molliores, cum à luce tantum afficiantur, quam valde refractam recipiunt: longissimi, cum ab eorum exortu ad oculi orbitam via longa sit: rara textura: quare perforatos Herophilus credidit, & Galenus 8. πηγῆς & meatus visorios appellavit; & per hos non solum ^h facultatem sentientem, sed etiam spiritus animales, in quo facultas fundatur, transire: quo & copiosius & validius sentiant, per alios vero nervos omnes, virtutem solum vehi Galenus voluit. Hi in exortu & fine distincti sunt, at ubi ad medium fere progressi sunt, supra

Vasa, quæ ad oculum mittuntur, sunt venæ^a & arteriæ, quibus nervi, cum etiam non secus, quam illa organa sint communia, adduntur. Venæ, quæ ad oculum feruntur, à jugularibus venis prodeunt, & sanguinem pro eorum nutritione deferunt.

Arteriæ vero à carotidibus pronascuntur, & ad insci caloris moderationem & vitam, una cum nervis per musculos & adipem disperguntur, & per membranas^b distribuuntur [hoc ostendit tab. 22. fig. 2. & 3. h.]

Nervi duplices sunt, optici & motorii, qui ex medulla cerebri in cranio adhuc existente, & spinalem^b constituente prodeunt. ^c Opticus [tab. 21. fig. 1. & 3. K. f. 5. a. tab. 22. f. 2. 4. 8. a.] qui omnes, seu visorios utrinque unus est: hi inter omnes sensorios nervos, maximi, crassissimi, mollissimi, ^d longissimi sunt raræque textura: utraque meninge involuti [t. 22. f. 2. a. b. c.] Maximi & crassissimi, quo copiosissima sentiendi facultas ad oculos deferatur, & quo promptius lucem sentire, & multipliciter affici possint: mollissimi, ^e quo citissime afficiantur, cum sensorii sint nervi: sensus autem percipiendo & pariendo perficiatur: imo ceteris omnibus^f molliores, cum à luce tantum afficiantur, quam valde refractam recipiunt: longissimi, cum ab eorum exortu ad oculi orbitam via longa sit: rara textura: quare perforatos Herophilus credidit, & Galenus 8. πηγῆς & meatus visorios appellavit; & per hos non solum ^h facultatem sentientem, sed etiam spiritus animales, in quo facultas fundatur, transire: quo & copiosius & validius sentiant, per alios vero nervos omnes, virtutem solum vehi Galenus voluit. Hi in exortu & fine distincti sunt, at ubi ad medium fere progressi sunt, supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra

supra ossis sphœnoidis sellam, antequam calvaria excidant, dexter cum sinistro [2. 14. i Gal. 10. us. f. 1. GG.] latiores redditi mutuo uniuntur, non per adhaerentiam, aut intercussationem, vel quod alter alterum conscendat, sed per omnimodam unionem, & medullæ confusionem ita junguntur, ut alter ab altero separari non possit (raro enim in Anatomie separati reperti fuere) [tab. 14. f. 1. H.] cujus conjunctionis ^k usus, partim ut eandem planitiem pupillæ observent, ne ^l objecta visibilia duplicia juxta oculorum dupliciter appareant: partim, ut rerum visibilium idæ uniantur, sicque facultas communis utriusque fiat, spiritu visivo ab uno oculo ad alterum momento ad visus certitudinem delato. Illud probat unus oculi sursum vel deorsum compressio, ubi omnia gemina apparent: quare quemadmodum oculos parallelos esse convenit, sic & nervos, qui propter oculorum motum (præsertim ubi unus tantum musculus inferior aut superior movetur, & oculus ad unam tantum partem volvitur) à plano declinare poterat, præsertim cum musculi opticos, cingant, illisque adhaereant: idcirco Natura merito illos conjungi voluit. Hoc vero, si manum inter oculos naso secundum ejus longitudinem, imposueris, ita ut ambobus oculis objecta videre nequeas, oculo utroque obscurius videbis, quam si altero clauso objectum inspexeris; nam posteriori modo facultas, quæ prius ad utrumque mittebatur, in unum jam commeat. Adde & tertiam conjunctionis utilitatem, ut robustiores sint, propter viæ longitudinem, cum eos Natura membranosis nexibus non suffulciverit. Mox rursus distincti, quilibet per proprium foramen, quod retro in oculi concavo efformatum est, calvaria excidit [tab. 14. fig. 1. supra H.] & dexter dextrum, sinister sinistrum oculum adit, & in eum implantatur. Hi in homine in corneæ tunicæ centrum [vide tab. 22. f. 2. 3. 4. 8.] parte posteriore inseruntur, eo quod uni tantum homini recta prospicere datum sit: in brutis vero, velut bove & equo, quorum oculi ab invicem plurimum recedunt, linea insigniter obliqua ad oculi ambitum perveniunt, & non in centrum desinunt: quo fit, ut brutorum lumina telluris latus utrumque ad progressum tantummodo, & alimenta capienda spectare, apta creata sint. Et hi, ubi in oculos pervenere, ^l dilatantur, & instar membranae singuli humorem vitreum complectuntur. Horum usus facultatem visivam dignoscendi à cerebro deferre, quæ in oculis ad species visibilium contrahitur, ubi in oculi membranas nervus expanditur: si enim nervus hic obstruatur, ut in eo affectu sit, quem Guttam serenam Arabes vocant, videndi actio omnino perit.

Motorius utrinque unus, qui ad musculum quemlibet pro motu nervulum mittit [tab. 21. fig. 3. & 4. hoc ostenditur] quemadmodum musculorum principium à nervo diligenter separanti occurrant, & in membranas diffunditur. Hi, dexter nimirum, cum sinistro in exortu, continui sunt, unde fit, quod uno oculo moto, alter simul moveatur, cum ex anteriori parte spinalis medullæ simul tanquam in puncto conjuncti in Cur simul prodeant, quo idem objectum eademque lux, eodemque modo in oculum utrinque eodem tempore ingrediatur, quo unus fiat sensus, & una dignotio, quod ad sensus perfectionem facit, ne quod unum & simplex est, duplex appareat: quod fieret, si alter sursum, alter deorsum ferri posset. Hoc verum esse, facile disces, si digito alterutrum oculum vel deprimas, vel attollas: Sic enim omnia objecta duplicia, alterum ^l Ccc 3 altius, Respondet, quia unicum morus principium sit, & eadem origo in opticorum coitu. Verum hic coitus ad motum nihil facit sed solum ad sensum: quare prodest, ne unum visile duplex appareat.

10. us. par. 13.
in somnio Galeni non credendum est, ut duo con- visionis unus iudicetur: nam in caseris sensibus alia ratio est, Casalp. l. 5. prax. 42.

altius, alterum depressius apparebunt: Si vero oculus in latus moveas, cum pupilla in eadem sint linea, objectum duplex non videbitur: quare Galenus¹¹ visiorum con-
norum axes in uno & eodem plano locari debere, ne quod unum est, duplex appareat, scribit: hinc in musculorum oculi paralyti & convulsione, saepe objecta gemina obversantur, quia oculi ab una superficie recedunt. Sic opticiis convulsis vel relaxatis, cum pupilla in eadem linea non sit, res geminae apparent; atque hanc ob causam etiam ebriis id aliquando accidit.

10. us. par. 1.

Ab hisce instrumentis, venis, arteriis & nervis ad oculum spiritus copiosi feruntur, naturales, vitales & animales, qui visivi proprie hic dicuntur: quare pro copia spirituum in oculis contentorum, oculorum magnitudo variat, variat & splendor; hinc jamjam morituris parvi, languidi & obscuri apparent; & ii, qui Veneri nimium indulgent, minores habent. Sic videmus oculos viventis tenfos & plenos; mortui vero minores, laxos, & rugos: spirituum enim praesentia & absentia, oculum viventem a mortuo distinguit, & pro varia ejus dispositione, varias animi affectiones solo aspectu dijudicamus: quo sane argumento etiam spiritus in corpore esse, ad sensum probare possumus: quemadmodum & hoc argumento, quod oculo altero clauso, si alterius oculi pupilla (ut Galenus^o docet) inspicitur, momento dilatari conspicietur, quia spiritus copiosior per tunicam, reticularem dictam, in vucam illabitur, ipsiusque foramen pupillam dictam dilatat; & denique, quod oculi interdum obscuri & languidi, interdum splendidi & alacres conspiciuntur. At ne spiritus sua tenuitate penetrando exhalent, membrana crassa, densa, & maxime robusta, Cornea dicta, impedit.

^a Alii membranas, alii tunicas vocant; Cicerone pelliculas; Hipp. *de membris*, *de oculis*, *lib. de carnibus*, *lib. de locis*, vocat.

De Membris^a Oculorum.

CAPUT XXXVIII.

De his Hippoc. lib. de carnibus, & de locis in homine; Galen. 10. us. par. 2. 3. 4. 6. lib. de oculis, lib. de Anat. vivor. cap. de oculis.

Oculorum musculis & vasis explicatis & remotis, nunc occurrit oculus, globi modo rotundus [tab. 21. f. 3. & 4. tab. 22. f. 2. & 3.] qui & mundo & ovo conferri potest, & quoad figuram, & quoad constructionem. Ovo quidem, cum membranis, putamine, quod membrana indurata est, & tenui membrana subiecta, ac humoribus albo & luteo confert. Sic & oculi globus & membranis & humoribus donatur: membranis quidem, cum naturae sit aquae, ut sua sede contineatur, & humores ambiant, debuit corpore aliquo solidiore constare: quamvis etiam & visionem non parum juvent: humores vero visus gratia obtinuit.

^b Duas tantum Hippocratem numerat.

Membrantarum^b numerus apud Auctores varius est: at duplices facimus, alias toti oculo

se, aranea & retina omitta, iatroduci auctor refert. Tres agnovit Hipp. de locis in homine, crassorem supernam, mediam tenuiorem, & tertiam tenuem, qua humorem conservat. At libro de carnibus, multa sunt, aranea, tunica, qua oculi pellucido praetenduntur. Quatuor Graecis, ut plurimum, ut Ruffo, cornea, rhagoides, aranea, seu vitrea & crystallina. Quinque Sylvio, Fallop. cornea, adnata, vucua, retiformis, aranea. Piccolhom. adnata, innominata, cornea, vucua, aranea.

nea. Sex Vesal. aranea, retina, uvea, ciliaris, dura, adhaerens: Columb. adnata, innominata, cornea, uvea, retina, aranea, Plat. adnata, ex musculorum tenuitatibus, cornea, uvea, crystalloides, hyaloides, retina: Laur. conjunctiva, cornea, uvea, aranea, reticularis, vitrea. Septem Gal. 10. u. partium 7. Arabibus: Sic Fuchsio & Aquapendenti, cornea, sclerotica, conjunctiva, uvea, choroides, retina, aranea. Rioli duo tantum communes & uvea, cornea & uvea. Altim. de ophthalm. tres propriae 1. interna magis reticularis, 2. u. uiformis, 3. corniformis: est & 4. quam agnam vocant, quod praedictis agnata sit, ligamentum existens toti oculo.

oculo communes, alias humoribus proprias: communes, corneam & uveam: proprias, crystallinam & vitream. Verum cum communiter septem recenscantur, Adnata, Cornea, Dura, Uvea, Choroides, Aranea & Retina; aliis adhuc innominatam, & Vitream addentibus, has omnes Anatomico ordine recenscimus.

Prima est Adnata, e quasi circa oculum nata, *ἡντινὸς* dicta, quod aliis mem- *c Galeno septi-*
branis oculum constituentibus foris adhæreat: quare & adhærens, quasi ascititia. *ma, 10. u. part.*
Hæc extima est, & cum cornea parte pellucida ante dissectionem e primo se offert, *2. Senta, Vesal.*
ipsius cornea parti albæ incumbens, quæ à pericranio *tertia Aquap-*
præterquam, ubi palpebram producit: ad eam enim, ubi peruenit, veluti angulum fa- *pendenti, prima*
ciens duplicatur, & altera pars palpebram succingit: altera [tab. 20. fig. 6. 7. 8. V.] han- *Columbo, Plat.*
adnatam constituit, & anteriore tantum parte, ubi oculi album apparet, & tenuior *Piccol. Laur.*
reddita est, ipsam tegit, dimidium oculi bulbum succingens, foramine è directo pu- *d Gal. 4. comp.*
pillæ relicto, quare in majorem circulum iridis desinit, & cum cornea continuatur *medic. secund.*
[tab. 20. fig. 7. & 8. V. & t. 22. f. 1. d.] Alba dicitur à colore, quem possidet, qui talis ap- *loc. 2.*
paret, quia musculorum tendines subiecti, eam albedinem repræsentant: & Hippo- *c 10. u. part. 2.*
crates *ἡ λευκὴ*, album oculi vocavit; albedinis autem hujus usus est, ut oculus à solis luce *f A periosio*
mitius illustretur, quippe quod lux in nigrum corpus fortius agat, siquidem nigrum *Gal. 10. u. part.*
radios cogit, quos album disgregat; lavis est. Hujus interventu oculus orbitæ, & in- *2. at Aquapen-*
terioribus ossibus adhærescit, & veluti ligamentum ad circumposita ossa existit: hinc *à periosio &*
vulgo conjunctiva, à conjungendo dicta, quod omnes oculi membranas simul jun- *tendinibus mu-*
gar, quo oculus firmior reddatur; vel potius, *g Vesal. Col.*
copuletur. Sic & oculum palpebris & capiti jungit, & ut summatim dicam, oculum, *quamvis non*
ne ossium duritia lædatur tuetur; cum ossibus, cum palpebris, cum cæteris tunicis *ita reuera, ut*
conjungit & stabilis, ita ut oculus in sua orbita detineatur, ne in violentis motibus ex- *apparet, alba*
cidat, & libere moveatur, & simul musculos e oculum moventes operit, & propriis se- *fit, Aquapen-*
dibus firmat. Sed cum ligamenti munere defungatur, magis quam membrana, verius *h In Coacis*
ligamentum esse arbitramur. Hæc venulis [tab. 20. f. 6. 7. 8. e.] & arteriis quampluri- *aph. 218.*
mis conspersa, quæ communiter in recte habentibus non apparent, nonnunquam *i Theophil. lib.*
admodum tubent, & cum copioso sanguine turgent, maxime conspicuæ fiunt, ut live- *4 cap. 10. at*
in ophthalmia; nam, ut habet Hippocrates aliquando album hoc rubescit, aut live- *Gal. de oculis*
scit, aut nigris venis refertum est, & nihil probi præ se fert. Hæc sensum tactus oculo *2. & 4. quia*
communicat, cum nec extrinsecus nec intrinsecus sentiat, & palpebrarum dolor, tan- *alias tunicas*
tum hujus tunicae causa illum molestat. *tra se jungat.*
Secunda est innominata dicta quibusdam, quasi hæcenus fuerit incognita, cum *ke Alexan. Be-*
tamen *m Galeno* fuerit nota, quæ à musculorum nerveis tendinibus enascitur, & pro- *nedicto funda-*
pe iri- *dicatur, vel*
funde, qua la- *quod non into-*
pides jaciun- *tum orbicula-*
ta sit, instar
fundæ, qua la-
pides jaciun-

tur, vel quod venulis & arteriis constans fundæ similitudinem præ se ferat, Laur. 1 Gal. sexta, Columb. Plat. Pic-
colom. secunda. m 10. u. part. 3. musculi, ait, acervati suis aponeurosis circulum unum efficiunt latitendinis in
iridem desinentis, & 10. u. part. 2. ad circulum sextæ quadam tunica extrinsecus prope accedit, in duram tunicam in-
serta,

sera, in qua musculorum oculos morventium sunt duntaxat. Riol. circulus membranosus ex aponeurosis musculorum conflatus.

peiridem subadnata terminatur: hique illius candorem impensius augere videntur, cum lucido quodam candore præditi sint: at cum nihil aliud sit, quam musculorum *Σπορυπόσεις*, membrana neutiquam dicenda videtur, sed musculorum pars, quæ cum iis quoque demonstranda venit: si quis tamen membranam velit, hujus usum dicemus esse, ut hujus interventu, musculorum in corneam commoda insertio fiat [tab. 21. f. 5. apparet.]

*in Hipp. prima
superna max-
imen, crassior,
lib. de locis in
homine: prima
qua cornea*

Fallop. 2. Laur.

3. Columb. Ar.

chan. at Plaz.

tertia pars cor-

nea dicta, 5.

Gal. 6. & dura

Vesal. dura &

nervosu tuni-

ca 1. mot. musc.

3. exterioris tu-

nica pars ante-

rior cornea,

Fallop. adnata,

& à colore al-

ba, quæ ad me-

dium oculi

cornea red-

ditur. Varo-

lo. At Fuchsi

pars anterior

corneæ pro 5. &

& posterior pro

sexta recense-

tur, & Aqua-

pend. pro prima

& secunda.

Riol. imperite

in duas tuni-

cas dirimitur.

o 10. us. part.

2.

p Gracorum

plerique uni-

versam tuni-

cam sic viden-

tur appellasse.

Vesal. at Fall.

in observ. sibi

persuadere non potest, hanc durioris partem esse, cum non solum substantia, sed etiam crassitie & figura à dura menin-

ge differat, quia hac per se sola, quasi sphericam aliam cavitationem constituit, extra dura superficiem, & veluti novum

tuberculum, ita ut ob humorem albugineum tantum facta videatur. q Ab uno angulo ad alterum latior est, non ta-

men exacte ovalis: in piscibus vero conum amulatur, Aquapen. 1 10. us. part. 12. In gammaris & piscibus, & iis,

qui palpebra carent, ita duri, ut exacte cornu laternarum, rigiditatem quoque præ se ferat. Aquap. 1 10. us. part. 6.

Tertiaⁿ cornea dicta, quæ & ratione substantiæ, & ratione exortus crassa & dura dicitur, quod à dura cerebri meninge, visorium nervum in vestiente producat. Hic admiranda est, Opificis sapientia, ° qui cum nusquam alibi à quovis nervo, meninges, quæ cum eis producuntur, separasset, sed ut nutrentur, simul & operirentur, cum eis deduxisset, hic duntaxat, ubi nervum in oculum inseruit, utraque ab ipso sejungens, crassas ac duras, imo duriores, quam quæ cerebrum complectuntur, effecit. Ubi enim oculo parte posteriore applantatur [1. 22. f. 3. c.] dilatur, & orbicularem membranam constituit [tab. 22. fig. 2. & 3. ostendit.] quæ totum oculum ambit, quamvis non passim sibi similis sit, neque simplici nomine donetur: pars enim anterior diaphanes est, pars vero posterior opaca. Quare sunt, qui Arabes imitati, ex hac duas fecere. Nam cum visio transparentia indigeat, membrana hæc, ubi ad oculi medium anteriùs accessit, è directo crystallini humoris adeo condensatur, ut in corneam substantiam degeneret, quæ pars anterior [tab. 22. fig. 1. c. m.] *νεπαρωειδής*, p cornicularis, seu corniformis dicitur, quod in medio usque ad iridem cornu laternarum attenuato denso & expolito sit similis, non solum pelluciditate, quo lumen recipiat, sed etiam substantia, cum in plures laminas dividi, radique possit, estque tam intus, quam foris ab omni connexu libera. Rotunda est, circularis, dura, densa, tenuis, tensa, diaphanes, splendens, perpolita & levis. Rotunda quidem & circularis in homine, (in bovis ¶ ovalis potius figuræ) in oculi medio protuberans, non solum, ut la sioni minus sit obnoxia, sed eam maxime ob causam, ut oculus majora se videat, hoc est, rerum maximarum ideas & species, & quidem integras percipiat, & lux ingrediens impensius uniatur, angustior & tenuior reddatur, & per pupillam ad crystallinum ferantur. Hoc rotunditatis & extuberantiæ beneficio fieri, speculo demonstratur, nam speculorum fragmenta oblonga inspicientes faciem, integram non videmus, quia figura plana est, & in plano lucis radii perpendiculares non uniuntur, in rotundo vero in unum punctum concurrunt; Per pyramidem enim fieri visionem, docuit Galen, quare in quovis minimo speculi tuberculo totam faciem conspiciamus: Hinc liquet, quod si hæc pars alterius figuræ, quam circularis esset, quod rerum maximarum simulacra ad oculum uno aspectu pervenire non possent. Dura, quo tum seipsam, tum humorem crystallinum tueatur, ne externisⁱ iniuriis obnoxia sit, neve levissimis oculi cursu.

cutibus cedat. Densa, non solum ut duricie ad resistendum auxilio sit, sed etiam ad humoris, tam aquei, quam vitrei conservationem, ne foras exsulent; & ne spiritus sua tenuitate penetrando, exhalent: quare in vivente animali ex spirituum abundantia plurimum tenditur, parte potissimum anteriore, ac nitet; in mortuo vero, spiritu extincto, illico flaccescit & corrugatur; quare visio spiritibus extra oculum fluentibus fieri non potest: cum oculi viventis tensio non aliunde proveniat, quam a spiritu multa copia incluso. Et licet prima sit omnium oculi partium, quæ iniuriis omnibus exposita sit, frigoris & æstus & incidentium & contudentium incursum excipiat, munita tamen est palpebris, ciliis, ossibus atque cute. Idcirco etiam non simplex est, sed quasi ex pluribus corticibus seu quatuor laminis composita (hinc Avicenna quadruplicem fecit) quibus Ruffus^a vult, epidermida^x superincumbere, quæ cæteris laminis longe tenuior sit, ut si forte una erodatur, cæteræ ad crystallini tutelam adsint. Te-
nuissima, (crassior enim existens propugnaculum^y quidem esse poterat, at tenebras perpetuas offunderet, lucisque transitum impediret) ut splendores, & lucem libere ac sine mora transmittat, quo humor crystallinus sensibilia propria sentiat: quare & diaphana, clara & splensens, y quia talis ad splendorem transmittendum oportuna erat, non secus ac cornua accuratissime derasa & extenuata. Tensa etiam esse debuit; Corrugata enim inæqualique reddita debitam extuberantiam & æqualitatem & diaphanum amitteret, sique visus labefactaretur, quod in senibus videmus: in quibus interdum adeo rugosa fit, ut alii nihil prorsus, alii vero male, aut vix adhuc videant; incidentibus enim^z aliis super alios rugis, & tunica ob eam causam duplicata, & crassioriem acquisitivam assumente, quod ob imbecillitatem senectæ fit, & ob spiritus ad pupillam affluentis inopiam, ubi etiam pupilla angustatur. Diaphana, ut visibilibus formis per via sit, & lucem immittat; sed hæc membranæ luciditas à luciditate aeris diversa est, ut inde lucis refraçtio sequatur: quomodo autem lux progrediatur, & ipsius fiat refraçtio, cum ad opticos potius quam Anatomicos, pertineat, qui volet, Opticos scriptores potissimum Vitellium & Alharen consulat, & etiam Aquapendentem Anatomicum, qui eleganter hæc libr. de oculo tractavit. Perpolita & levis, ut in ea species rerum resu^ygeant, ac commode recipiantur, & species externis confimiles crystallino repræsententur. Aspera^z enim, si foret, & eminentias & cavitates haberet, lux non æqualiter offerretur: ubi enim cavitates, facilius & clarius, ubi eminentiæ, difficilius & obscurius species permeant; & hæc asperitas palpebræ molesta esset, ut fieri solet, quando inter utramque aliquid incidit. At cum densa sit, dura ac tenuis, in se ipsam nec venas, imo nec arterias, nec nervos recipere potuit, nec debuit; hæc enim visioni obessent, & adversus externas offensiones crystallinum tueri quidem potuisset: eandem tamen sua duritie nihilominus molestasset: & tertio visoriam facultatem oculis superne immisissam, imo splendorem discerneret. Nam à splendida & vehementi luce oculos offendi, quilibet in se experiri potest, quod & Xenophontis^a milites testantur, quorum oculi, cum per multam nivem iter fecissent, valde læsi fue-

D d d

re. Sic^a Dionys. Sicilia tyrannus domum super car-

cerem construxit clarissimam ac longe splendidissimam calce illitam: in quam domum postquam diutissime carcere in-
fimo fuissent conclusi, vinctos sursum educebat, qui ex multa ac profunda caligine in splendidam lucem egressi, lucem
quidem erant cupide intuituri, intuiti vero occubantur, lucis splendide occursum repentinum ac confertum non
ferentes.

b In magnis So-
lis eclypsibus
stella ob ean-
dem causam
nobis apparet,
quod etiam
suis tempori-
bus accidisse
Thucydides re-
fert: sed & ex
puteis profun-
dis stella conspi-
ciuntur potis-
simum, quando
Sol non est in
meridie.
c 10. us. part. 3.

d Sexta Fuchf. mus.
exterioris tuni-
ca pars poste-
rior, Fallop. se-
cunda Aqua-
pend qui sciro-
ticam nomi-
nat: tertia pars
dura dicta,
Plat.
e In lucio pisce
cartilagineam
substantiam
emulatur, cum
palpebris ca-
reat, Aquap.
f Ves. & Aqua-
pen. at Plat. fi-
bris multis,
quas venulas
esse putarunt,
cum tamen ve-
na nulla ocu-
lum subeant.
g Sic & Aqua-
pend.
h Fall. observ.
i Fuchsius &
Aquap. cum
Arabibus.

re. Sic qui ophthalmia laborant, luce quidem offenduntur, fusca vero ac cærulea, sine dolore intuentur. Hinc fit, quod qui luce clara à longinquo quippiam percipere vo-
lunt, aut manus supra oculos ad ipsa supercilia obtendunt, aut aliud quippiam, quod
manibus tum majus, tum densius est. b Sic constat aliquos, qui fixis oculis Solem
ipsum propter eclypsen imprudentes intuiti sunt, prorsus fuisse occæcatos. Fit hoc
eo modo, quo ellychnium vel candela ardens, sub Sole luculento constituta, quæ
protinus extinguitur: Sic, si candelam accensam prope flammam magnam posueris,
repente extinguitur: quia minor lux à majore vincitur & dissipatur. Sic ergo in oculo
c non solus crystallini splendor, sed cum eo etiam vitrei dissipatur. Quare his pruden-
tissimus Opifex e providens, choroidem tunicam interposuit, quæ multis partibus
tum nigra, tum fusca, in bobus etiam cærulea effecta est, quæ corneam sibi vicinam,
qua parte eam contingit, alit, & ne humori crystallino incidat, prohibet (quamvis
illud sua rotunditate & extuberantia etiam præstare possit) & ratione sui coloris nigri,
& in bobus cærulei, visui affecto spectaculum e medicamento sum est: & hæc cautela
est, quod omnes Natura duce cum lucis splendore offendimur, palpebras repente
claudimus, ad remedium naturale properantes. Ostendi hoc potest exemplo picto-
rum, qui cum in albis coriis pingunt, eorum visus facile offenditur, si remedio desti-
tuantur: quare colores cæruleos ac fuscios apponunt, in quos subinde intuentes, ocu-
los recreant ac reficiunt. Latior etiam est cornea, ipsa vicia, quo ex longinquo etiam
res maximas videamus, quam vis indistincta hæc visio sit, quo noxia fugere quea-

mus.
Posterior d vero hujus tunicæ pars, oculi posteriorem sedem, & totam anteriorem
usque ad circulum [tab. 20. fig. 7. & 8. f.] constituens, dura & crassa, opaca (sicuti al-
bum ovi coctum à crudo, ita ab hac cornea colore differt) dura est & tensa ratione
exortus, quamvis neque nervi tunicam anteriorem tenuitate, aut crassam cerebri
membranam, à qua illa oritur, crassitie æmuletur, cum quadruplo fere crassior sit;
nam, ubi oculi tunicam efformat, incrassatur & obduratur, cum summe dura & cras-
sissima esse e debuerit, firmitatis & roboris gratia, cum totius oculi globum & cavita-
tem pro humoribus continendis e formare debuerit (hujusque beneficio oculi figu-
ra rotunda & efficitur & conservatur; integra etiam facta; sola enim totum oculum
cingit, ne quid ex eo effluat,) & musculorum omnium insertiones excipere, eorum-
dem, ut & adipis pondus sustinere, quo humorum contentorum naturalis figura
conseruetur, & venarum & arteriarum [tab. 22. fig. 3. h. h.] quasi basis sit, quæ prope
nervum post vitreum humorem huic membranæ applicantur, postea antè porri-
guntur donec per choroidem distribuuntur. Horum vasorum f ope, quemadmo-
dum & exigui nexibus, veluti ligamentis membrana hæc choroidi ita adhæret, ut si-
bi invicem alligentur [tab. 22. f. 3. h. i.] cujus connexus utilitas, ne forte hæc tunica so-
la aliis oculi partibus immotis moveatur: quemadmodum g videmus linteum pilæ
perpolitæ obvolutum moveri. Crassa & opaca, quo species receptæ multo clarius
eluceant, ut in speculo fieri videmus, si corpus densius à parte posteriore sit adposi-
tum, imagines intuentes videmus; non autem, si corpus densius sen plumbum remo-
veatur. Hanc partem candidā h cum parte anteriore, neq; natura, neq; colore similem
asserunt, quare recentiorum aliqui i à priore distinxerunt, & hanc corneæ suis termi-
nis continuari asserunt, quæ sub adnata, & tendinibus musculorum fixa est, & à dura mem-

membrana nervum cingente, generatur; cum ea enim continua est (ut patebit ei, qui acutissimo cultro nervi tunicam per longitudinem separarit, usque dum ad hanc membranam pervenerit) quare *σκληρότης* & *σκληρωτική* dicitur, Ruffo candida, et si communiter candidæ seu albæ nomen Adnatæ tribuatur. At cum utriusque substantiæ una & eadem sit continuïtas, nullaque ex parte separabilis, idcirco has duas non distinguimus. Hujus beneficio oculus sistitur & sequens membrana, quæ ad subiectam quidem tuendam satis virium habeat, non vero seipsam, defenditur, & humores secundum debitam dispositionem continentur, ipseque crystallinus ab ambientis aeris frigore & æstu conservatur.

De Membrana uvea, seu Choroide, Pupilla, Iride & Ligamento ciliari.

CAPUT XXXIX.

De his egit Galenus 10. us. part. 2. 3. 4. & 6.

Uvea, a membranarum quarta est, quæ *αγοειδής* b & *ρῶξ* Græcis dicitur, quod a Hæc secunda uveæ acini corio colore similis sit: vel *ραγὶ* *αφύλης*, acino uvæ, c cum quo externa levitate, & interna asperitate confertur: nam exterius, qua corneam respicit levitate, interius vero qua crystallinum spectat, aspera seu potius inæqualis, propter venarum & arteriarum furculos a cornea in hanc pertingentes [t. 22. f. 3. & 4. ll.] vel quod ratione nigredinis acino assimilatur, cum colore e atro sit, imo rectius, si uvæ acino comparemus, a quo pedunculus avulsus sit, cum humorem albugineum, quemadmodum uvæ acinus succum similem contineat.

Membrana est inter corneam & retinam dictam sita, quæ huic posteriore parte solidum accumbit, anteriùs vero inter corneam & araneam, & humorem aqueum [t. 22. f. 1. c.] completitur. Connectitur, posterius quidem nervo optico, retinæ; corneæ vero venarum d & arteriarum furculis [t. 22. f. 3.] & ad iridem fibrosis nexibus, sed non admodum validis, adhæret: anteriùs vero undique libera est, quo contrahi & dilatari possit. Figura, non ut prior, exactum globum refert (cum non totum oculum cingat) sed anteriore parte [t. 22. f. 4. m m. f. 7. ad n.] introrsum nonnihil comprimitur, ubi foraminerotundo pervia est.

Oritur ducit à tenui e meninge [t. 22. f. 1. f. 4. & 5.] nam ubi tenuis meninx nervum opticum investit [t. 22. f. 2. b.] mox sub cornea dilatatur, ut hanc membranam constituat, anteriora petit, totumque oculum, anteriore parte excepta, cingit, ubi ad oculi circulum majorem, seu iridem, corneæ continuatur, & versus posteriorem partem reflexa reduplicatur, in f medio perforatur, quod foramen uveæ, & etiam Pupilla dicitur. Differt autem à tenui meninge, crassitie, quod ea longe sit crassior, potissimum parte anteriore, ubi duplo posteriore crassior est; dein colore, cum nervi tunica alba sit, hæc vero oculum cingens, utraque facie nigra est; & cum à tenui meninge producatur etiam g *χογοειδής* dicitur: maxime vero, quia per hanc vasa d

Ddd 2

g plu

citur, reliqua vero sede tantum fibris cohaeret, quas venulas esse putarunt. e 10. us. part. 2. Ves. Col. Fall. Plat. Piccolh. Laur. a choroide nascitur à crystallini circumferentia, ad anteriores partes pronata choroide, estq; duplo choroide crassior, Aquapen. f Sic & Col. retrorsum in illius rotunditatem pressa, Plat. g 10. us. part. 2. & ex eo Aquap. venarum

Et arteriarum sarculi plures in uveam, Vesal. Venas & arterias oculi sustinet, Fallop. Vasa sere omnia tunicarum suffulcit, Laur. fibra multa, quas venulas esse putarunt, cum tamen vena nullibi oculum subeant, Plat. venis & arteriis plurimis scaturit uvea, Piccolhom.

plurima sparguntur, & quod instar *χοεις* quam plurima vasa inter se velut colligat; quod in bobus optime conspicitur, in quibus per oculi longitudinem convenienti intervallo discurrent, à quibus veluti filamenta totam choroidem intertexunt, quo modo per tenuem meningem etiam in cerebro distribuuntur; & ab hac in retinam dictam ramusculi producuntur, quod tum, quando Uvea ab ea separatur, conspicuum fit.

In 10. usq. part. 6. ut quem splendorem transmittit, foras emittat.
i Instar spongiae dixit Galenus.

& Nulla alia tunica est inter corneam & crystallinum media, Gal. 10. usq. part. 4.
ὁ ὕψος λαττον οἶον ἐὰν τοῖς οἷς.
ἐστὶ Gal. 10. usq. part. 4.
In 10. usq. part. 5.

Hæc venosa^h est, mollis, nigra ac pertusa: Venosa, quo corneam nutriat; mollis, ne contactu suo crystallinum ledat, & ad pupillæ motum apta sit, ad quem rigida inepta fuisset; nigra, vel potius fusca, ut splendorem colligat, atque ad pupillam transmittat; pertusa^h è directo humoris crystallini, quo species visibilium corneam & aqueum humorem permeantes, tandem ad crystallinum perveniant. Et licet humida sit, ac mollisⁱ & crystallino vicina, ipsi tamen innoxia, extrinsecus vero densa est: quemadmodum enim crystallinus ab hac offendi non debet, sic nec ipsa à cornea affici; inter corneæ enim partem diaphanam & crystallinum ponitur, neutram tamen partem attingit. Sic, ne crystallinus à cornea per foramen hoc uveæ tangatur^k & lædatur, cum veluti per tenue admodum & album cornu, splendor internus cum externo communicet ac commisceatur, non solum hanc corneæ portionem foras longius abduxit; sed etiam humorem quendam tenuem ac syncerum, qualis in ovis reperitur, crystallino circumfudit, ac tertio spiritu aereo & splendido omnem pupillæ locum opplevit. Quod autem locus hic humiditatem^m tenuem contrineat, & spiritu plenus sit, ex eo probatur, quod in vivis oculum vehementer tensum, & undique plenum videmus, & nullam corneæ partem laxam & corrugatam: at si mortui inspexeris, etiam ante dissectionem rugosam comperies; & ubi corneam diffecueris, statim humor tenuis occurrit, qui etiam in compunctionibus per vulnus effluere solet: & statim totus oculus rugosus contractus ac laxus fit: & si tunicas à crystallino deductas distenderis, intervallum maximum vacuum apparebit; hinc patet animali viventi tunicas distentas fuisse, aut à spiritu quodam, aut humore, aut utroque. Imo si oculorum alter claudatur, alterius aperte pupilla amplificata ac dilatata, & veluti inflata conspicitur. Pupillam autem spiritu impletam amplificari, aperto vero contrahi docet Galenus, quo etiam argumento spiritum animale dari, probare vult. Hoc aut fieri, quod totus spiritus ad oculum apertum feratur, qui alias, utroque aperto, in utrumque divideretur. Sed dissectione quoque probat Galenus, si inquit, Uveam ab internis inflaris, foramen diduci cernes. Quare spatium^m omne quod est ante humorem crystallinum spiritu & humore tenui simul repletur, & quidem in cæteris partibus humore, in ipsa vero pupilla spiritu plurimo.

in Hipp. de carnibus, Gal. 10. usq. part. 4. ut

Hipp. de locis in homine, & Vis dicitur, ubi ait, pupillam in oculo interdum minime rotundam apparere, si, inquit, in ipsius visus humorem purum, cruentus aliquis humor inciderit, huic pupilla intrus in oculo minime rotunda ob eam causam apparet, quod in cruentum illud visionem non recipit: hincque quod cernitur, rotundum esse desinit. Aristoteli b. b. 1.

Pupilla Græcis *ῥαγή*,ⁿ visio [tab. 22. f. 4. 5. 6. 7. n.] pupula, oculi fenestra, nigrum oculi,

hist. an. 9. humor oculi interior, quo videmus pupilla regnare est (intelligit crystallinum) quod eam ambit, nigrum dicitur, quod nigrum circumdat candidum.

oculi, & oculi foramen quoque dicitur: foramen est hujus membranæ & minor oculi circulus [*tab. 22. fig. 2. 3. g.*] quod in oculi centro puncti prænigri instar conspicitur, & quia in profundo sita est, & quod tunica eam ° ambientes nigræ existant. Hoc foramen non solum minus est toto corneæ ambitu: sed etiam à cornea distare debuit, ne visibilium imaginum per totam corneam ingressum, qui etiam ipsius latus extremum ad pupillam feratur, impediret; quare, ubi uvea ad corneam partem pellucidam pervenit, non amplius rotunda est, sed ad posteriora reflectitur, & versus crystallinum inclinat, in medio pupillæ foramen habes, ut eleganter etiam Varolius monuit. Est autem pupilla in homine & aliis quibusdam animalibus, ut canibus & rotundatim nonnullis brutis, ut bobus, ovibus, capris oblongæ rimæ speciem, & quasi circulum in medio compressum refert, & fere ovalis est: & ratione motus, qui vel ab animali spiritu, vel à luce prodit, dilatatur & contrahitur, ita ut modo figuram rotundam seruet, modo aliam suscipiat, ut in cato, & in quo rimam angustatā contrahit. Dilatationem & coarctationem pupillæ, spiritui animali Galenus ascripsit; at Aquependentis sententia uveæ foramen pro lucis vehementis aut debilis accessu aerecessu dilatari aut constringi; in majore luce eam contrahi ad crystallini tutelam, cum is sæpe numero à luce valde offendatur: in minori, dilatari ad meliorem visionem, ad pleraque visilia videnda, quæ alioqui non apparerent (quod notandum iis, qui eos inspicere volunt, qui de oculorum affectu & diminuta visione conqueruntur, ut id loco potius obscuro, quam lucido faciant) sic nec valentior offendit, cum copia minor ad crystallinum feratur: nec debilius eum movet, cum majori copia intus recepta sit. Hujus motus causam efficientem negat spiritum animale esse, cum à vehementi luce spiritus attenuetur, diffundatur, & copiosior reddatur, & sic foramen ampliari debebat: sicuti à debili densari & minui, sicque foramen angustari, cum tamen contrarium eveniat. Quare ab uveæ tunicæ facultate propria proficisci censet, quæ tamen à luce externa oculum ingrediente excitetur. At videmus in suffusionibus pupillam dilatari ac constringi, cum lux vehemens (cum ægre ingrediatur) iis obesse non possit, tamen oculo altero clauso foramen contrahitur, quod sane non nisi à spiritu fieri potest. Foraminis hujus usus, simulacris acceptis transitum præbere ad crystallinum, cuius pars per hoc dregitur: nisi in perforata hic esset uvea, oēs oculi partes frustra creatæ essent, cum crystallinus cum suis objectis nullam cōmunionem habeat, quam per hoc uveæ foramen. Et hac dilatata vel coarctata rectius deteriusve cernimus. Hinc re- & Galenus statuit, pupillæ dilatatione quæ mydriasis dicitur, sive primo talis fuerit, sive post accesserit, semper visui obesse: at coarctationem à nativitate, acutissimi visus causam esse: in illa enim spiritus animalis influens totum spatium ante crystallinum replere non potest; sicut contra in minore pupilla colligitur & constringitur. Adde 2. quod ad perfectam visionem requiratur, ut species visibiles per lineam rectam fluant, & quidem modo canali ad oculum & ad crystallini centrum angulo acuto, quo ei imprimantur: quare pupillæ foramen adeo angustum est, quo ab ipsius lateribus productæ lineæ tanquam à basi centrum crystallini in angulo acuto contingant, quare pupilla aciem non sinit vagari, sed veluti canalis dirigit. Quod si vero

Ddd 3

pupil-

*o Hipp. lib. de
carn. quæ pupil-
la oculi appellat-
tur, nigra ap-
paret, eo quod
in profundo sita
non est tamen
nigra si quis in-
spiciat, sed alba
ac pellucida:
idem Columb.
Et Polluci, oculi
li pars media
nigra, pupilla
nominatur &
ejus, & endor
vultu. quia o-
culi camera in-
trinsecus nigra
quæ hic tan-
tum videtur,
& ejusmodi co-
lorem repræ-
sentat, Plas.
p Arist. 3. hist.
an. 18. pupillas
omnibus ani-
manibus eas-
dem esse vo-
luit; & Plin.
lib. 7. cap. 2. me-
minis pupillæ
duplicis in sin-
gulis oculis.
q Configuram
in lucio pisce re-
fert, Aquapen-
tio. us. par. 4.
1. Sympt. caus.*

pupilla adeo dilatetur, ut lineæ ab ea productæ in crystallini centro angulum vel rectum vel obtusum faciant, statim visio aboletur. Hinc patet pupillæ naturalem latitudinem, aut angustiam plurimum facere ad visionem, præsertim ad debitam distantiam inter objectum visibile & sensorium visus.

Membrana hæc pro ratione partium, diversos colores obtinet; foris enim, qua corneam duramque attingit, nigra est: interius vero, ^r qua aqueum & crystallinum respicit, nigra vel fusca. At ubi iridem constituit; nunc ^u cærulea, nunc cæsia, nunc nigra, posterior denique, ubi primo pronascitur, subalba est & mox viridis, dein cærulea, ut in bobus (in brutis diversicolor est) eleganter conspicitur. Niger hic color (ut recte Galenus, ^x qui de cæruleo loquitur) admiratione dignus est, cum in corpore universo color similis non reperiatur: Hic licet in aliis oculis secundum magis & minus differat, in omnibus tamen niger, vel fuscus est, ut eo crystallinus humor, cum aliis pellucidis corporibus, ad splendoris collectionem obducatur. Quemadmodum enim lumen quodlibet etiam parvum in loco obscuro, & in tenebris, magis quam in loco claro conspicitur, & objecta circumstantia perspicua reddit; ideo, quo splendores oculo conclusi efficaciores essent, & visibilium species crystallino melius apparerent, totus oculi ambitus interior obscura & nigra hac membrana vestitur, ^y cuius opacitate & colore crystallinus quasi obductus undique obscuratur, & lux nigritiem & opacitatem refugiens in crystallino unitur; sicq; ut recte Aquapædens, lux debilis in crystallino magis apparet: imo ad spiritus collectionem facere dicimus: ubi enim à vehementi luce crystallinus affectus est, palpebris clausis ad fuscus illos colores se convertens, reficitur, spiritibus; visionis ad hos colores conversis, quemadmodum plenius in Corneæ historia ostendimus. Quare circa pupillam quoque crassior est, cum parte anteriore, qua luci accessus patet, crystallino tenebras offundere debuerit: parte enim posteriore cornea crassissima & densissima obvolvitur. Et hanc ob causam inter corneam & crystallinum, membrana hæc nigra est. Hæc autem nigredo parti internæ, qua humores respicit, innata esse videtur: qua vero corneam posterius respicit, cum tangentium digitos tingat & inficiet, ascititia est, & si abluatur, fere omnis auferitur, & membrana alba redditur. Illa vero non inficit, alias corpora pellucida, quæ respicit & cingit, aliquando à nigritie conspurcata, puritatem amitterent. Hanc nigredinem excrementum crassum esse, quod in crystallini nutritione segregetur, quemadmodum & aqueus humor ipsius sit excrementum tenue, sunt qui velint. Quemadmodum autem nigredo hæc exterius in omnibus perpetuo est, sic interius potissimum, qua vitreum respicit, etiam fusca est membrana, in nonnullis cærulea, (hinc cærulea tunica Galen^b dicta) & viridis, ut in bobus: ubi vero antè compimitur, perforatur, & corneæ pellucidam partem respicit, in hominibus concolor non est, sed diversicolor apparet: ita tamen, ut semper colorem eum exprimat, qui in iride oculi sanis occurrit; cuius etiam gratia oculos ^c nigros, aut fulvos, aut cæsijs, aut caprinos (qui morum optimorum indicium Philosopho) ^e aut splendidos dicimus: quare solum hominem inter omnia animalia numerosa oculorum varietate notari, Philosophus ^d scripsit, cum cæteris in suo genere coloridem sit,

equis

^r Interna super
ficies diversis,
sed interim om
nibus homini
bus iidem co
loribus inter
stinguitur: in
posteriore sede
ubi nascitur
subalba, mox
viridis, dein cæ
rulea, antè
impenso nigra,
Vesal. idem
Laur. In homi
ne nigra, pu
nicum, cæru
leum, rubrum,
Col. in uno ma
gis nigricat, al
tero magis al
bescit, in alijs
cæruleum, alijs
viridem, in al
ijs alios refert,
Piccol.

^u Pro diversa
cerebri & ocu
lorum tempe
rie, Laur.

^x 10. us. part. 3.

^y Ex ratione
fungi, squam
ma piscium, no
tiluca, cati
oculi in tene
bris lucent, in
terdiu nequa
quam, Aqua
pend.

^z Arist. 31. prob.
^a quærit, cur
vi, uex diu
turna in spe.

^e Hone defatigetur, & deterior reddatur, ad virides vero & herbascentes, ut olera, cæteraque recreatur: an quia alba &

nigra videndi viribus efficiant, colores vero illi medium obtineant.

^a Gal. de nat. viror. cap. de oculis. ^b x. u. & p. 10. us. part. 4. ^c Ruffus lib. 1. cap. 5. Arist. 1. hist. an. 10. & 5. gener.

^d Arist. 1. d. 5. gen. an. 1. Plin. lib. 11. cap. 37.

equis exceptis, qui oculis cæsis interdum proveniunt. Quare locus hic inter pupil-
lam & album.

Iris, *ἰρις* dicitur, nomine à celestis iridis similitudine translato, cum circulus hic
oculi major [tab. 22. f. 2. 3. f. tab. 20. fig. 7. 8. f.] coloribus variis, qui per corneam etiam
translucent, distinctus sit: nonnullis *σεφάρα*, corona: quoniam ex septem ^{c10. u. f. part. 2.} circulis
sibi ipsis ordine insidentibus, crassitie tamen & colore differentibus & ex membra-
nis prodeuntibus componi Galenus voluit: primus circulus fit à nervo optici in me-
dium crystallini insertionem, unde circulus maximus in pellucido corpore exprimitur.
Secundus est in circuitu humoris vitrei, crystallinum o. biculatim cingentis. Tertius
à retina dependet, prout ligamentum vitrei & crystallini humoris esse volunt. Quar-
tus ab uvea dirigitur, prout versus crystallinum ducitur. Quintus à cornea, quæ fibra-
rum intervntu circulo crystallini annectitur. Sextus circulus à tendinibus musculo-
rum efficitur. Septimus circulus ab adnata promanat. Hanc colorum ^{idem statuit in} varietatem ad
humores aqueum & crystallinum, ad membranam vueam, & ad spiritus referri posse
censemus. Cæsi enim coloris causa, ratione crystallini, est ipsius copia, splendor &
situs prominens: ratione albuginei, splendor & paucitas; paucus enim, crystallini ful-
gorem minus impedit: nigredinis, contrariæ sunt causæ, crystallini paucitas, impuri-
tas & profundior situs, & aquei impuritas & copia: intermedii colores à causis inter-
mediis pendunt. Ratione vueæ, cum sola variegata sit, variegatum oculum profert:
quare & in iride varii colores sunt, cum ibi vuea varie colorata sit. Ratione spirituum,
ad cæsum colorem tenues, puri, splendidi, copiosi conferunt: contra crassi, impuri,
caliginosi, pauci, nigredinis causæ esse possunt. Ufus hujus varietatis colorum, qui in
iride

<sup>septem esse sibi-
ipsis insidentes
crassitie tamen
ac colore disti-
dentes ex mem-
branis prode-
untes, quos, si
probe hac dis-
secantur, & ni-
hil confunda-
tur, demonstra-
re liceat.</sup>
<sup>f. Opiniones va-
ria sunt.</sup>
<sup>I. Empedoclis
(ab Arist. 5.
gen. an. 1. alla-
ta) qui oculum
ex igne & aqua
componebat,
cæsum colorem
ex ignis prado-
minio fieri: ni-</sup>

gros autem plus aque, quam ignis habere. II. Aristotelis l. c. qui ad humorum copiam & paucitatem reulit, & æ-
ris & aqua exemplo ostendit: nam si profundior aquam, aut multum ærem inspicimus, utrumque nigrum & ob-
scurum videbitur, si alterutrum paucum, cæsum & splendens color apparebit. Col. reprehendit Aristotelem ratione
nulla addita.

III. Galeni libro artis Medic. 27. qui humoris crystallini & aquei copiam, splendorem & situm causam censuit: cæ-
sus, inquit, fit vel propter copiam, vel splendorem crystallini, aut situm prominentem, nec non aquei humoris paucita-
tem, ac puritatem: niger ob crystallini raritatem, aut situm profundiorum, vel quia splendidus ex quibus non est, aut quia
aqueus copiosior est, nec satis purus. Vesalius & Aristotelis & Galenum reprehendit his verbis: Hic color non ex humorum
oculi copia, aut defectu aut tenuitate, aut pupille collectione vel dilatatione, aut oculi profunditate, aut tenuitate
consurgit.

IV. Avicenna, qui ad uveæ colorem reulit, quæ ut varie colorata est, ita colores varios in oculis profert, si carulea,
caruleos si nigra, nigros causat, quem Vesal. sequutus est.

V. Averrhois, albedinem oculi à frigiditate, nigredinem à caliditate fieri putavit.

VI. Varoli qui in spirituum & aquei humoris inaequalem copiam, quæ prout in diversis ejus loci partibus interci-
dit, diversos colores repræsentare voluit: color, ait, qui ab uvea, à cornea recedente resultat, solet ob quandam apparen-
tem varietatem iridis appellari: apparentem dicit, quia revera eo in loco non adest vera colorum diversitas, sed apparet,
quia cornea uvea inaequaliter superstat, sicque inæqualis spirituum & humoris copia intercedit.

VII. Piccolhom. qui colores varios in iride vult causari ab imparitate venarum in uvea existentium (quæ etiam
aranea communicantur) sanguinem varie preparatum in se continentium propter varietatem partium alendarum ab
aliis multum dissimilium: idcirco etiam uveam in hominibus non esse concolorem, quo oculi defessi potissimum ex viri-
di plurimum recreantur: idcirco etiam nos sæpe oculos claudere, quo spiritus dispersi recreantur.

IX. Laurentii, qui ad humeros aqueum & crystallinum, tunicam uveam variegatam & spiritus re-
fert.

iride sunt, aliqui ad pulchritudinem referant, cum nulla pars visui objecta impolita relicta sit. An forte hac colorum diversitate rerum externarum colores vari, melius illic expressi, crystallino offeruntur? At in iis animalibus, quæ noctu vident, cum iris tantum locus splendidus sit, hujus forte gratia animalia noctu videre Aquapendens suspicatur, in quibus iris & fulgida est, quod si homini similem habere contingat, similiter noctu videbit, quod de Tiberio Cæsare Suetonius prodidit.

g In lucio pisce
hujusmodi cro-
ceus color, qua-
si exactam fla-
viam bilem re-
fert, quæ etiam
à tunica sepa-
rata invenit-
tur. Aquap.
h Fuchsius, qui
3. & 4. fecit.
Aquapenpen-
dens, cui 4. &
5. est.
i Gal. 10. us.
part. 2. tunica

Tandem membranam hanc, recentiorum aliqui Arabes^h imitati, in partes duas divisere, & partem anteriorem vucam, posteriorem choroidem sive secundinam nominant, at cum utriusque una sit continuitas, non distinguimus.

Ex ipsius vucæ tunicæ i circumferentia [tab. 22. fig. 17.] tenuia quædam filamenta recta feruntur, quæ lineas nigras referunt, palpebrarum pilis similes quæ ad crystallini humoris margines pertingunt, & licet in aranea collocentur, crystallinum tamen orbiculatim cingunt: horum ope vucæ extremæ [tab. 22. fig. 7. o. o.] membranæ crystallinæ jungitur, & ipse crystallinus vicinis partibus annectitur: quare cum vinculi munere fungantur, non membrana, sed ligamentum^k ciliare, à forma Fallopius nominavit; alii vero interstitium ciliare, quia aqueum humorem à vitreo secernit: alii membranam pupillarem alii pupillæ crepidinem appellant.

palpebrarum pilis assimilata ad interstitium vel septum inter vitreum & aqueum, Vesal. membrana instar ciliorum Vesalium somniasse Columb. (qui lineas appellat, sed unde producantur, non dicit) asserit Ciliarem tunicam hic comminiscuntur, cum circulus & copula tunicarum sit, Aquap. Vitreum humorem anteriore parte tunicam habere ab uvea processibus efformatam, quæ velut interstitium sit, &c. asserit Fallop. in Instir. at in obs. air tunicam non esse, sed potius nexum aut ligamentum: processus ciliares, & filamenta ciliaria, Plat. modo interstitium ciliare, modo ciliarem tunicam vocat Laur. & Vinculum simul sunt, simul etiam alimentum adferunt, 10. us. part. 2.

De Membrana Aranea, seu chrystalloide, vitrea & retina.

CAPUT XL.

a De hac Gal.
10. us. part. 6.
b Hipp. de locis
in homine
c tenuis &
d tenuissima, quæ
humorem con-
servat. 1. est Ve-
salio. 2. Fuch-
sio. 3. Hipp. 4.
Gal. & Laur. 5.
Sylvio Fallop.
Piccolh. 6. Co-
lumbo 7. Aquapen

ARanea^a quæ ἀράχνη^b, araneiformis dicitur & a Ruffo φάγγειδης^c, lenticularis à figura, at rectius chrystalloides, ab humore, cujus tunica propria est: imo ipsius superficies appellatur: aliis speculum, quod speculi instar pellucida sit. Hanc aliis à tenui^c meninge, alii à retina^d oriri volunt; quam in prima conformatione ex semine cum crystallino, quia ex purissima & lucidissima seminis portione conflatur, genitam censemus. Tenuissima^b est, densissima, levissima, alba, exacte pellucida & splens, quo lucem admittat, & ab ea immutetur (hæc enim sola vere lucis affectiones & suscipit & sentit) & ne crassitie visioni ob sit, substantia non modo ceptarum^a pelliculis similis est, verum etiam aranearum^a telis tenuitate (non autem densitate) quare ἀράχνη^e f Græcis dicta fuit. Hæc crystallinum humorem parte tam anteriori, f quam

re, f quam
lumbo 7. Aquapen Ruffus divisit in anteriorem partem, & laterales ciliis similem, c Columb. d Ubi uvea in crystallini maximum circulum inseritur, ubi retina naturam amittit atque immutat, ut vero à nervi substantia seu retina exoritur, lucis affectiones sentit, & actio seu visio consequitur, Aquapend. at Piccolhom. ex optico nervo tenuissime fufo & dilatato. e Colorem nigrum gerit, natum ex venis & arteriis, quibus plurimis illa confersa est, quibus etiam uvea scaret, Piccolhom. f Non totum vestit humorem, sed tantum, quæ uveam tangit, & extra prominet, tenui ac lucida hac tunica induitur, at qua

et qua vitreo invehitur tunica expers, quia humores inter se conjungi præstiterat. Gal. 10. us. part. 6. Ruffus totum obvolvere vult, at dimidiam ad uvæ foramen prominere, dimidiam ad retinam committi: Colum. statuit, humorem vitreum & crystallinum obvolvere. (sic & Piccolb.) & Vesalium reprehendit, quod hanc dividat: & ignoret vitreum etiam circumdare, & Galenum: Piccolb. araneam cum retina, (cujus non meminit) confundit, undique ac circumcirca uvæam succingit, cui aranea crystallinum humorem parte anteriore tegit, Vesal. & Fallop. Instit. quibusdam non tunica sed membrana a quadam congelatio dicta fuit. Ruffo auctore, & hic aliquo modo, ut lib. 1. cap. 23. araneam cum retina confundit, volens eandem tunicam, quæ vitreum obvolvit, dici & arachnoïdem ab antiquis & ab Herophilo. retinam ab aliis hyaloidem ab inclusio humore nominari, & lib. 2. cap. 3. ait vocari ab humoris concretionē hyaloidem, à tenuitate arachnoïdem, à vasorum contextu amphiblastroïdem: quæ vero crystallinum investiat, antiquitus nomine caruisse. Hippocrates de carnibus de crystallino agens, & de hac membrana, oculi pellucido *ἡ ὀφθαλμὸς* mul-
tas tunicas præterendi dicit, & in hoc pellucido lumen & splendida cuncta lucem reflectunt. Per hanc igitur, in quo lu-
men reflectitur, visio fit: mox subiungit: (*ἡ τῆς*) tunicam vero appellamus, id quod velut pellicula, diuise inest, quæ
nequaquam ad aspectum nigra est, sed alba & pellucida, & oculi humidum glutinosum. Aristoteles 5. gen. an. secutus
Hippocratem sub nomine cutis araneam proposuit, quam humori obtendi, & translucidam esse voluit. Riol. Arachnoi-
des crystallini tunica nulla est: quæ polita mihi videtur ob crassitiem crystallini, recteque Ruffus à concreto humore
crystalloïdem appellavit.

re, f quam posteriore tegit, immediate ambit & stabilis: nam ut universus ad sentien-
dum aptus fiat, ab hac crystallinus in orbem obvolui debuit, quæ antea crassior,
densior & validior est. Nam cum visio antea fiat, idcirco sentiendi vis ibi magis vi-
gere debuit, cum ibi lux ob crystallini rotunditatem & aquei refractionem impen-
dius uniatur; quare & visio & pupilla, hæc pars à Ruffo appellatur: & cum in hac velut
in speculo (cum lævis sit, & super omnia specula fulgens) pupillæ εἰδωλον^a consistat,
idcirco idolum ac simulacrum visionis Galenus^a appellavit: quin & externis injuriis
& vixæ contactui densitate sua erat oportunior: contra posterior pars laxior, rarior
ac tenuior est. Hac ablata (dextre enim secanti, integra ab humore separari potest)
crystallini figura destruitur, non amplius humor lævis, æqualis & politus, nec in seip-
so constans, sed ad latera procidens conspicitur. In summa humor hic non modo
sentiendi vim, & substantiæ suæ tum molem, tum formam, sed & efficaciam huic suæ
membranz debet. Venas nullas habet, sed à ciliari nutriri videtur.

Vitrea *ὀφθαλμοειδής*, quam primus Ruffus sic nominasse videtur, humoris vitrei tu-
nica est, quam^b aliqui cum aranea, alii cum amphiblastroïde, eandem fecerunt, ab utra-
que tamen substantia differt, cum tenuissima sit, & vitreum humorem undiqueque
cingat, quo eum retineat, ne is vel disfluat, vel aqueo humori confundatur: nam non
nisi frequentri sectione filamentis solutis fluidus redditur & velut in aquam liquecit:
alii eam prætermiserunt, quia ab aranea utrumque humorem involui voluerunt: in
hujus medio ligamentum ciliare, apparet.

ⁱ Retina [tab. 2. fig. 8.] seu retiformis & reticularis, *ἀμφιβληστροειδής*, ¹ quod figu-
ra *ἀμφιβληστροῦ*, id est, reti parvo sit similis, scilicet piscatorum reticulo rotundo,
quod in orbem ad pisces capiendos jacitur, aut baculo appenso in aquam mergitur.
Hæc ex cerebriⁱ portione superne per nervum opticum descendente, seu nervi me-
dulla, ubi primum nervus oculum attingit, oritur, & ex ipsius nervi radice pender:
Ecc inde

esse cum humo-
ris vitrei tunica, & hanc vitrei tunicam, illam crystallinam, ab Anatomicis arachnoïdem dictam, nominat. i Gal.
10. us. part. 2. de hac egit: vel *ὅτι τὸ ἀμφιβλᾶν*, hoc est, à circumspiciendo. At Herophilus, referente Ruffo lib. 1. cap.
23. reti contratio assimilavit, dimidio ovi putamini aliqui assimilarunt, 1. est Euchsio. 2. Vesal. 4. 4. Sylv. Fallop. 5. Col.
Laur. 6. Aquapendenti hæc humori vitreo more fibrarum intertexta, non debet inter tunicas referri, Riol.

g Fallop. Plat.
Laur. 6.
h Columb. &
Piccolb. cum
aranea confun-
dunt; arachnoi-
dem vitreum
humorem con-
tinere vult
Fallop. Instit.
at in obser. re-
prehendit eos,
qui volunt cry-
stallini tuni-
cam eandem
esse cum humo-
re

inde ad oculi dimidium progreditur, & intra vueæ cavitatem, cui immediate accumbit, non autem neçtitur, amplificatur^k vitreumque humorem, citra tamen connexum, reticuli instar ambit. Mollis est, rubescens, ^l mucosus similis, non ut cerebri substantia solida & crassa.

Idcirco necⁱ substantia, necⁱ colore membrana, nec membranæ seu tunica nomen^m meretur; nam si ab utroque humore separatam eximeris & seposueris, & in unum acervum [tab. 22. f. 8. e.] conjeceris, videbitur tibi^m cerebri portio quædam exempta & dilatata quare Galeno^m corpus ἀμφιβληστροειδὲς dicitur. ⁱ Venas & arteriasⁿ plures & conspicuas, & multo crebriores licet exiles, quam suæ moli conveniat obtinet: nam cum nervi omnes tenuis meningis portione obducantur, venam & arteriam secum retina adfert, quo non solum nervis, verum etiam oculorum humoribus alimentum natura provideat ac præparet. In his ergo sanguis continetur, neque crassus, neque sæculentus, sed tenuis & fluidus, quo alimentum^o fiat vitreo & crystallino humori, qui ceu purissima corpora sanguine purissimo indigebant. Opaca est, & corpulenta, non diaphana, quo à luce non afficiatur, nec immutetur. Usus pri-
mus & maximus, p^r ut sentiendi facultatē superne ad crystallinum deferat, cum à nervi substantia oriatur. Dein, ut spiritus visivi per crystallinū & universum oculū diffundantur, & crystallini q^u alterationes percipiat, & rerū visibilium ideas ad cerebrum tanquam iudicem deferat. Tum, quatenus vueam & vitreum humorem intercedit, impedit, ne vitrei substantia purissima ab vueæ nigritie conspurcata vitietur.

plac. tunicam vocavit. Vesalius, nomen aptius indid non potest, quam tunica; contra Col. & Plat. male tunicam dici scribunt. n^o Aliquot venis & arteriis extreme gracilibus & obscuris intertexta, Vesal. At Plat. nulla vasa possidet. o Vitreo alimentum adferunt, Columb. Aquapend. p^r Ut cum crystallinus alteratur id sentiat Gal. 10. us. part. 2. At Aquapend. contra, retinam lucis alterationes sentire non debere, asserit: etsi in genere sentiendi facultate sit prædita: sic enim sensus non magis in crystallino, quam in vitreo humore perficeretur. q^u Sic & Laur.

De Humoribus.

CAPUT XLII

De his egit Galenus 10. us. part. 1. 4. 5. 6. & 7. de plac. item lib. de oculis, cap. 2. & 3.

HVMORES oculorum partes nobilissimæ intra oculorum tunicas continentur, qui tres sunt, figura atque consistentia varii, lucidi tamen omnes ac perspicui, sedibusque distincti, oculi tamen cavitatem implentes, & visionis actionem adjuvantes, Aqueus, Crystallinus & vitreus, inter quos crystallini major & dignitas & utilitas, quare anima oculi, & centrum oculi, & specillum interius dicitur.

^a Aqueus [tab. 22. f. 10. & 16. γ. & 19.] Galeno ὑγρότης λεπτὴ, aut ὑγρὸν λεπτόν κατὰ humor Rhagor-τὴν κέπλην, humor tenuis aliorum respectu dicitur: aliis ὑδατοειδὴς ob fluxibilitatem^o aquæ^b similem, & quod aquæ modo pellucidus sit: hanc forte ob causam Aristoteles oculum
caus. sympt. 2. Et tot 2. f. 3. c. 23. De humoris aquei & spiritus in oculis utilitate, vide Gal. 10. us. part. 5. & 6. Avicenna glaciale excrementum, sed male, Laur. b^o Aqua modo tenuis & fluidus, quemadmodum secantibus & suffusiones curantibus occurrat, Vesal. ob similitudinem aquæ purissimæ, aqueus appellatur, Varol. liquidam aquam per omnia refert, Plat.

oculum aqueum aduersus Platonem, qui igneum voluit, statuit. Albugineus à substantia & colore, quia albo ovi humori assimilatur; unde, *ὡδὲς ὄρνιν* Etio, & c. Non puto Graecos ei assimilasse, cum non ita crassus sit, & multum accedat humori, quem ex recentibus & integris oculis signis adpositis resudare cernimus, Vesal. Tenuitate & puritate ovi candidum refert, Laur. ab aqua vel ovi candido nomen habet, Piccolb. humori, qui in ovis cernitur persimilis, Aquapend. d. 10. us. part. 4. * non tantum crystallino obiectus est, verum etiam vitreo circumfusus & totus in vitreum continetur, quod cognoscet, si oculum parte postica secueris, humorem

oculum aqueum aduersus Platonem, qui igneum voluit, statuit. Albugineus à substantia & colore, quia albo ovi humori assimilatur; unde, *ὡδὲς ὄρνιν* Etio, & c. Non puto Graecos ei assimilasse, cum non ita crassus sit, & multum accedat humori, quem ex recentibus & integris oculis signis adpositis resudare cernimus, Vesal. Tenuitate & puritate ovi candidum refert, Laur. ab aqua vel ovi candido nomen habet, Piccolb. humori, qui in ovis cernitur persimilis, Aquapend. d. 10. us. part. 4. * non tantum crystallino obiectus est, verum etiam vitreo circumfusus & totus in vitreum continetur, quod cognoscet, si oculum parte postica secueris, humorem

^h Crystallinus [tab. 22. f. 11. 13. & 14.] huic subjacet, qui *κρυσταλλοειδής*; quod ita splendeat, ut non consistentia & duritie, sed lumine & perspicuitate, purissimo crystallo similis sit; quare *Ἀλφάρεος τὸ ὄφθαλμὸν* Hippocrates appellavit. *Κόρη*, pupilla Aristoteli dicitur. ^k quibusdam Gemma oculi: Hic ex purissima & lucidissima seminis portione & sanguinis materni sincerissima portione, tanquam pars corporis, & quidem similis conflatur: partem enim esse & Galeni auctoritas, & ratio suadent: quia ipsi partis definito, tam generalis, quam specialis competit: nam cum cæteris partibus in utero generatur, circumscriptionem propriam habet, vivit, nutritur, & tractum actionem edit; quare & Galenus inter partes similes, & crystallinum & vitreum recensuit. Hic in hominibus ^m medium oculi locum non occupat, sed extra centrum

Ecc 2

loca-

aqueum effluere videbis, ut si antea secaveretur, Riol. e. Tantum humoris aquei, quantum vitrei male Vesal. credit, Colum. f. Excrementum in crystallini nutritione, Gal. de Anatomia vivorum, cap. de oculis, Col. Varolio, Aquapend. g. Gal. 4. caus. sympt. humorem albugineum in pueris renatum vidit. Celsus l. 6. affirmat, hirudinibus amissam ex vulnere oculorum aciem, interposito tempore restitui, sensum jactura ejus humoris reparata. Benivenius in suis observ. similem historiam proponit. Langius quoque lib. 1. epist. 7. confirmat. Idem testatur Columbus, qui bis prorsum effusum vidit, & renatum, ut eodem oculo cernere denovo potuerint, & Varolius se observasse scribit: qui ambo excrementum faciunt; in morbis absumi, monet Plat. At Laur. pars est oculi vivens & spermatica, non excrementum, nam easdem dotes perpetuo servat figura, puritatis, quantitatis: est crystallini propugnaculum, & instar ocularium simulacra ad crystallinum defert: si effluxerit, resarci vix potest, & visionem omnino extinguit, & inter hos duos tunica intercedit.

h de hoc 10. us. part. 1. & 6. 7. de plac. 5. lib. de oculis 2. i. de Carnibus. k. 1. hist. 9. & 5. gen. an. 1. Russo interdum à figura gutta humoris, Avicenna gutta & grandio. l. Inter partes recenset Galenus 1. Meth. 6. & 1. caus. sympt. m. Medium locum obtinet, non modo, ut tanquam princeps oculi pars, quo ab injuriis externis sit remotissimus, sed & c. de Anat. viv. cap. de oculis, & lib. de oculis cap. 2. Vesal. exquire in centro situm putat: quare à Columbo reprehenditur: in situ anteriore non medio, Varol. sede media magis quam in centro, Plat. in medio locatus, Piccolhom. in anteriorem partem magis propendet. Aquapend. fere in medio oculi, veluti in centro, ut utrumque lumen & internum & externum facile admittat, neque utriusque consuecat nimium, Laur.

locatus, pupillæ vicinus est, quo visio clarior & uberius fiat: clarior, quia si simulacra altius penetrarent, eo modo quo ea quæ aquis immerfa, obscuriora viderentur: uberior, quia si in centro situs foret, maiorem partem eorum quæ intueri potest, non videret: quare antè situs est, [tab. 22. fig. 1. a.] membrana siquidem ipsum continens, oculum in duas inæquales portiones secat, quarum anterior quadruplo minor est posteriore: præterea magis ad internum angulum, quam ad externum non nihil accedit: & id siquidem alia corpora ante ipsum, alia post ipsum ponenda erant, quo alia ipsi inserviant: alia ipsum defendant, alia ipsum adjuvent: at in bobus, oculi parti inferiori vicinior est.

n Nulla inter
crystall. & vi-
treum mem-
brana interja-
cet: ante ta-
men ab aranea
regitur, Col. à
vitreo nulla tu-
nica disrumpitur
Piccol.

o In oculo lu-
minosus est Ga-
leno, quod fal-
sum dicit A-
quapen.

p 10. us. part. 1.
at Plat. Cry-
stallinus hu-
mor perspicil-
lum est nervi
visorii, ante
ipsum & pu-
pilla foramen
collocatus.

q de sympto.
causis.

r 10. us. part.
Ad lenis simi-
litudinem, Ruf-
f. Vesal. Col.
Plat.

r Rotunditas

hæc Galeno ignota, secundum Aquapen. Gal. 10. us. part. 6. non inquit, sphaera absoluta est, & undique æquabilis, quia non erat tutum, neque enim incumbentes circulos ac coalescentes, qui in spatio sunt iridis, nunquam quo modo nunc admisisset, dein in vehementi motu, aut plaga oculi, periculum fuisset, ne ex vitreo exturbaretur, cum sedes in rotunditate fallacior sit, quam in planis: & 10. us. par. ultim. ut majori sui parte cum objectu communicaret: At Laur. qua pupillam spectat, pressior: Varol. & Piccol. qua vitreo immergitur, planior apparet, antè magis, quam postè de-
pressius.

Hunc tunica crystalloides, quam speculum vocant, undiqueⁿ cingit; quæ ante-
rius densa & perpolita, posterius vero laxa est: hac ablata, substantia crystallini se of-
fert, quæ aquea est, non tantum fluida, sed condensata instar aquæ, quæ mediocriter
in glaciem concrevit, & ubi membrana, qua compacta continebatur, ablata est, ad
latera concidens, aliquantum dilabitur, hinc glacialis dicitur, & nonnullis s grandio.
Hic antè aqueo humore perfunditur [tab. 22. f. 10. & 16.] posterius humori vitreo^o
insidet, & veluti innata, ac si globus aquæ innataret [tab. 22. f. 10. & 12.]

Est autem omnis coloris expers: si enim ruber aut flavus existeret, omnia quæ vi-
dentur, & rubra & flava apparerent, ut in Ictericis aliquando fit; quo ergo colorum
omnium species, quos primo apprehendit, citissime suscipiat, coloris alieni expers
est, clarus, splendidus, & perspicuus, ut à luce alteretur & immutetur, & pellucidus,
ita ut si litteris scriptis imponatur, eas majores specilli modo exhibeat: tantaque huic
vis inest speculi, ut tam exiguum corpusculum, totam hominis imaginem reddat,
quæ quamdiu in crystallino elucebit, non est augurium timendi mortem in ægritudine,
inquit Plinius. Hac enim sola ratione^p à coloribus immutatur; imo solus à colo-
ribus alteratur, & rerum visibilium species recipit; qui tamen non eo plane modo,
quo aqueus perspicuus est, quo in eo novalucis refractione fiat: quare densior est, ut in
ejus superficie lux ad perpendicularum refrangatur: sic enim lux impensius unitur &
roboratur: mediocriter durus, ut in eo simulacra fieri possint, & crassus, ita tamen,
ut sit diaphanes, quo luci transitum concedat, superficie lævi, & insigniter lubrica.
Verum, cum mollitie lentorem obtinet, ita ut digitis comprimenti glutinis modo ad-
hæreat. Magnitudine lupino æqualis; figura quodammodo ad lentis^r majoris simili-
tudinem accedit, unde Phlegon^s, lenticularis, Aetio: at in piscibus exacte rotundus
est, antè fere plana, lenticulæ extuberantiam referens (hinc nonnullis^s diogenis^s à
disci similitudine) ut splendorem commodius suscipiat; & majore spatio rerum om-
nium simulacra admittat, quibus excipiendis globosam figuram non esse aptam &
capacem Galenus^r docet: at parte posteriore, perfectam rotunditatem habet, quo
vitreo

vitreo humori melius infideat: secundum latera magis protuberans. Ne vero è propria sede in oculorum motu declinet, & veluti suspensus in oculi camera retineatur, per ligamentum^u ciliare vueæ jungitur, sed tantum in circuitu & maxima crystallini circumferentia; anteriore vero & posteriore parte liber est, ne corporum diaphanorum continuitatem intercipiat.

^x Vitreus [tab. 22. f. 1. b. f. 18. 20.] *ὁ αλοειδής* & vitriformis, quod consistentia seu crassitie vitreo y fuso, colore vero & luciditate vitro jam densato & refrigerato respondeat: hic posteriore sede locatus est, licet & anterioris non exiguam portionem occupet, ita ut ex quatuor oculi partibus concavis, tres repleat, [tab. 22. f. 10. & 20. x.] & quadruplo crystalloidem superat, quo spiritum visivum, ne subito dissipetur, aliquantum contineat & si quid luminis crystallinum fugerit, in eo hebetetur, ne ab opaco & colorato vueæ corpore ad crystallinum refiliat, eaque lucis repressione visio turbetur. Substantia ipsius consistentiam aliquam habet, quæ tamen crystallino longe mollior, & tenuior, quo ipsi sedem aptam paret, aqueo tamen minus fluidus; & non minus quam crystallinus^z splendidus. Figura, dum adhuc in oculo est, plus quam dimidiatum globum refert [tab. 22. fig. 9. & 20.] Cujus superficies posterior rotunda seu convexa; anterior plana quidem, quæ tamen in medio sinum habet [tab. 22. fig. 9. r. & 18. β.] quo crystallinum rectius amplectatur: qui licet à retiformi dicta tunica cingatur, à qua beneficio venarum per eam disseminatarum nutritur, propria tamen tunica, vitrea nominata donatur, qua rupta in aquam liquefcere ac fundi statim videtur.

^u Varolius hoc aranea tribuit, qua suo ambitu oculorum cavitate inter se connectitur.
^u Allugenus Russo libr. 2. cap. 3. y 10. us. part. 1. & tantum albus, quantum si intellectus vis, exiguum nigrum multo albius per totum admistum esse & albedinis perfectionem adulterat esse, quod Gal. voluit vitreum humorem albe

^dine tantum à crystallino superari, quantum ipse sanguinem superat; ita ut auctor libri de Anat. vivor vitrei colorem inter album & rubrum posuerit. Hoc falsum dicit Aquap. Nam si inter se conferas, vitreum crystallino, tum albidiorum, tum magis splendidum conspicies.

^z Splendidissimus quoque Vesalio: ambo exquisitissima puritate, pelluciditate, claritate perspicui, Aquapem.

De Humorum Oculi utilitate & visione.

CAPUT XLII.

De oculo & visione Galenus omnium diligentissime egit, ut qui de visione libros tres scripsit, & de eatoro fere lib. 7. de Plac. verba fecit. De oculi vero partibus & usu, integro 10. de us. part. libro, & libro de oculis, modo Galeni sit. tractavit; nec mirum cum 10. us. part. 12. fateatur, se somnio perpulsum, ut qua de oculis sciret, nullo modo retineret.

Cum admirandam sapientiam, providentiam & bonitatem Dei Opt. Max. in divinis membrorum, oculorum nimirum conformatione exposuerimus, & de eorum usu, in cuiuslibet partis explicatione, non pauca dixerimus, nonnulla adhuc à proposito minime aliena, quæ ad humorum usum facient, aspergemus, quæ si eum jam dictis prius jungantur, verum & oculi usum, & verum visionis modum, à Philosopho potius, quam Anatomico proponendum, exponent.

Oculos visionis instrumenta esse, quo res omnes visibiles tam proprias, quam communes percipiant & videant, nemo nescit: proprias, ut colores omnes; communes,

nes, rei figuram, magnitudinem, numerum, motum & situm: quæ qualitates sunt sensibiles, omnibus sensibus communes: ita ut recte dicatur, oculum hominem non videre, sed res visibiles in homine, ut colores, & partium ejus situm, figuram, magnitudinem, numerum & motum; ex quibus postea mens, rem illam hominem esse colligit, & sic de cæteris. At oculus ex pluribus partibus jam explicatis constat, quæ omnes in visionis usum creatæ sunt. Verum, cum in quolibet instrumento, quod ex pluribus partibus componitur, pars una habeatur similis, cui actio potissimum accepta referenda sit, talis in oculo quoque erit, quam dicimus esse crystallinum humorem, qui actionis auctor est, cum in eo rerum visibilium species suscipiantur & dignoscantur: quædam vero sunt, sine quibus actio fieri non potest, ut est nervus opticus, qui videndi facultatem deferret: quædam, per quas melius fit actio, ut membranae & muscoli: quædam ad horum omnium conservationem constitutæ sunt, ut sunt palpebrae & circumjectæ partes.

a De visionis modo, qui vollet, consulat Philosophos, maxime Aristotelem, lib. de Anima, de sensu & sensibili, & Alexandri comment. Gal. 7. de plac. 10. us. part. 12. & 13.

Opticos Alhagen. Vitellium, & inter recentiores Aquapendentem: opinionæ enim diversæ sunt.

I. Emissione fieri, & quidem vel per luminis emissionem ad objectum, cuius reflexio fiat ad oculum, ac pila ad parietem impulsæ ad manum reditus; ut Pythagoras voluit. Vel emissionem radiorum & luminis simul, ut Empedocles, Hipparchus, Niceus, vel radiorum emissionem ad objecta figura pyramidis, cuius conus sit in oculo, basis in objecto visibili, ut optici voluerunt. Vel spiritum à corde ad pupillam ferri, qui ad visibilia extendatur, ut Chrysippus & Stoici aurum arunt.

II. Receptione fieri, & quidem vel à corpore, quod videtur, ad nostros oculos aliquid corporeum mitti, ut Epicurus, Democritus & Leucippus, vel beneficio medii aeris lucidi à coloribus rerum visibilium alterati, ut statueret Aristoteles, Alexander, Themisthius, Averrhoes, & ceteri Peripatetici, & ex recentioribus Laurent. & Aquapend.

III. Emissione & receptione: Plato in Timæo voluit, ignem seu lumen in oculis contentum, extra oculum manare, & cum diurno lumine jungi, & ex illa conjunctione & concursu passionem quandam resultare, qua ad animam evolet, & ipsam protinus intus moveat, & sic videndi actionem perfici, in quam sententiam Galenus descendit, ut videre est 7. de plac. 6. sic 10. us. part. 12. lumen oculi internum cum externo commisceri dixit: verum, quod ab oculis exit, inquit Aphrodisæus, aut corporeum est, aut incorporeum: non incorporeum, quia nec exire, nec locum mutare, nec in oculo esse, ut in loco, possunt incorporea non corporeum, quia unico die oculus destrueretur, nec momento ad æthera usque ferretur, cum nullum corpus in instante moveatur: adde, quod spirantibus ventus dissiparetur & daretur corporum penetratio: quod si aerem huic corpusculo excurrenti cedere velis, nunquam visio fiet, quia non fiet radii continuatio cum oculo.

b Gal. 1. de caus. sympt. 10. us. part. de instrum. odoratus 3. & 2. Meth. 8. his argumentis.

I. Quia in oculo sit, cui in toto corpore similis non reperitur. II. Quia hic solus à coloribus alteratur.

III. Quia solus sit luminosus. Respondent ad I. idem de aqueo & vitreo humore, & oculorum tunicis dici posse, cum similes in corpore non sint: ad II. & reliquos humores & corneam tunicam, quatenus diaphana sunt; à coloribus alterari posse, ad III. & reliquos duos humores à luce externa lucidos fieri.

c 3. de Anima.

Cum ergo per nervos opticos facultas à cerebro ipsis oculis accedat, qui rerum extrinsecus appellentium exploratores sunt, quo rerum externarum cognitionem adipiscantur, sensile nervum tangat oportet; cum omnis actio, Philosopho monente, per contactum fiat: hic autem fit per medium, cum sensus sua sensilia medio quopiam percipiant; siquidem omnis sensus tactus sit, & tangendo sentiat. Quare cum nervus ab objecto visibili separatus sit, necessum est, quo visio fiat, ut contactus fiat; vel nervi ad sensile, vel sensilis ad nervum; vel, ut ad aliquam usque partem, utrumque ad alterum moveatur. At cum duobus prioribus modis fieri non posse, sensu probari possit, sequetur, tertio modo fieri debere: Si tertio modo, tum vel à nervo, ad objecta visibilia aliquid prodit: vel contra, ab objectis ad nervum quippiam mittitur:

fitur: vel utrumque fit: hoc est, visio fiet, vel per emissionem spirituum, vel per receptionem radiorum, vel emissionem & receptionem simul. At spiritus ad rem videndam à nervo non fertur, alias solus nervus, à quo facultas profluit, actionem hanc absolvere posset, & extra oculum dignotio fieret. Neque à corpore, quod videtur, ad nostros oculos aliquid corporeum mittitur: sic enim corpora objecta continua diffusionem diminuerentur. Nec tertio modo fit, ut spiritus, vel radius, vel lumen ad rem videndam aliquousque progrediatur, & objecti quippiam ad spiritum usque moveatur, ita ut in medio contactus fiat; alias huic actioni nervus suffecisset, & dignotio extra oculum fieret.

Quare cum Philosopho censemus beneficii medio fieri, ita ut qualitas quædam medium & interjectum aerem perspicuum colore afficiens & immutans, & rebus ipsis species visibiles per unicam lineam rectam ab objecto ad oculos, imo ad crystallini humoris centrum, transeat. Sic aer, qui medius est inter oculum & objectum, huius dignotionem deferret & primo colorem: aer enim à coloribus alteratur, & colorem illum tactu percipit: quemadmodum Sol lucis suæ splendore aerem contingens eum illustrat, ita & colores aerem contingentes immutant: aer autem colorum capax est, ubi serenus est, luminosus & Solis fulgore collustratus.

Visio ergo per visibilibus species receptionem fit, quando lux visibilium formis aff. & per diaphana oculorum corpora suis radiis rectis primum, mox vario modo refractis, oculum ingreditur, & colore crystallinum afficit, qui tanquam primum visionis instrumentum, species rerum visibilium in instanti recipit, quorum refractione in membranis fit, perfectio in opticorum coitu perceptio denique in cerebro. Lux enim proprium est visus objectum, quod visum movet & afficit, lux inquam colorum formis affecta, & quidem lux externa. Infitam enim lucem in oculo homo non habet alias noctu & etiam videret, lumine extra missio; quemadmodum animalia illa quæ noctu alimentum quaerunt, quæ interdiu deterius vident. Sic & homo, si lucem infitam haberet, interdiu deterius videret, ut prædicta animalia docent. Jam vero lux visibilium rerum simulacris affecta, cum per radiorum refractionem fieri debeat, diversa corpora diaphana requirit, & primo per aerem progressa, mox per aquam ad refractionem in oculo faciendam progredi debuit. Visionis enim instrumentum a quo cum est, quemadmodum Anatome & tota oculi compositio docent (unde forte

*Democritus
& Leucippus
corpora recipi
existimarunt:
Epicurus ob-
jecti visibilis ra-
dios. Alexan-
der imaginem
rei, non tan-
quam in subje-
cto, sed velut in
speculo. Arist.
tantum species,
qua incorporea
individua, quæ
in medio & or-
gano produci-
tur, ac multi-
plicatur per*

simplicem emanationem, ut è Sole lumen, ex corpore umbra prodir. F. Locus receptionis: Aristoteles in pupilla, sic enim crystallinum vocat: Galenus nunc in crystallino, nunc in ejus tunica. Avicenna in opticorum nervorum coitu, ideo objectum unicum apparere. Sunt, qui in cerebri substantia recipi velint, quia sensus omnis à cerebro fit. Laurentius vult nervum opticum visiles spiritus ad crystallinum deferre, & species ab eo ad cerebrum tanquam censorem & judicem trajicere. g. Ut Tiberius Cæsar, Suetonio referente, & Cardanus, ac Io. Bapt. Porta Neapolit. ipse se affirmant. h. Platoni, qui luminis emissionem visum fieri voluit, natura ignea est: ignis autem illius, qui non urit, sed illuminando irvehit, cui triplex ignis est, lucens, non urens, lucens & urens, urens nō lucens. Gal. 10. us. part. 12. 7. de plac. 6. Oculum appellat organum lucidum & solarem animalis particulam. Democrito, Aristoteli & Peripateticis oculus aqueus est, quare contra Platonicos lib. de sensu & sensili scripsit. Carpentarius Platonem & Aristotelem conciliaturus, duo ait, in oculo esse quæ visionem efficiunt, spiritum visilem lucidissimum, à cerebro per nervos influentem & crystallinum humorem: ratione spiritus ac luminis interni, nec non objecti luminosi, igneum esse oculum: aqueum vero ratione crystallini. At sic omne sensorium igneum esset, quia omnia sensuum organa suos spiritus animales ejusdem natura, tenuitatis & fulgoris haberet, ut recte Laurentius refert.

i De locis in ho-
mine.

Hippocrat. i visum à cerebro humido ali dixit) aquæ autem proprium est recipere. Quo vero visilium species in oculo retineantur, diaphano & denso corpore opus fuit.

Quare oculus non solum aqueus factus, ut refraction fiat, sed ut talis existens varie crassescat, & varia diaphana corpora creet; unde lucis variat in oculis refraction. Et licet aqueus humor diaphanus sit, ac lucem admittat; diversum tamen diaphanum, à cornea habet, quo in aqueo, nova refraction fiat: hæc autem refraction à perpendiculari fit. Prima fit ab aere, in corneam densius diaphanum; alter à cornea in aqueum, tenuius diaphanum, ubi lux in aqueo unita & fortior reddita, ad crystallinum pertingit, in quo tanquam densiori lux adhuc impensius unitur. Verum, quemadmodum in oculo naturaliter refractiones quatuor fiunt, ad corneam, aqueum, crystallinum, & vitreum humorem; sic in perspicillis sex fiunt, quæ duo præstant, visilia clariora & maiora reddendo. Quia primo lux ab aere ratiore diaphano, intrat in specilla, quæ crassiore sunt diaphano; inde rursus in aerem rarius diaphanum, à quo in corneam densius, & à cornea in rarius aqueum; ab hoc in densius diaphanum crystallinum, & tandem in vitreum, ita, ut ex tenuiore diaphano, in crassius alternatim procedat. Alter aquei humoris usus, spatium vacuum implere, & corneam tenens conservare & humectare, ne arefctens corrugetur, sicque crassior evadat, & rerum visibilium receptionem impediat. Tum corneæ, uvæ & crystallini siccitatem^k prohibere, ut sicciorum natura diaphana, sine qua visio fieri non potest, suo madore semper irrigando, conservetur. Hoc enim in compunctionibus effuso vel exsiccat, cornea concidit, rugosa & opaca redditur. Quarto, ut crystallini propugnaculum sit, ne cornea crystallinum per pupillæ foramen tangens, duritie sua lædat. Quinto, ut exteriorum colorum^l impetuosiorum ad crystallinum occursum impediat: vel ut instar propugnaculi crystallino objectus, luminis externi splendorem affatim irruentem obtundat: nam splendidam lucem^m in offensa ferre non potest, eoque factum ut Rhagoides tunica, quæ colorata crystallino sit prætexta: quo visus à splendida luce laborans reficiatur: & ut rerum visibilium ideas ocularium seu perspicillorum instar (unde Aristoteli imaginum delator dicitur) elevet, ut eæ plenius multo & rectius percipiantur: cum enim rerum externarum imagines ad angustum pupillæ foramen pervenire, humoris aquei ratione quasi attolluntur, ut tum visio rectius perficiatur; nam cum visio perspicuitatem requirat, ob id humor limpidissimus, ante crystallinum visionis primum instrumentum, collocatus est. Sic videmus eos qui in minutissimis operibus occupantur, ampullam vitream aqua limpidissima plenam lumini præponere, ut radiorum à tergo collectione res minimas distinctius & accuratius cernant.

I Gal. i. caus. sympt. munitum ejus hic humor est, quo externum splendorem sine offensa sustineat: cum eo etiam quod substantia crystallini humoris nonnihil conducit. Ut ex æterni luminis splendor affatim occurrentes infringatur, & cum interno lumine consuescat externum; est enim veluti medium quoddam delationis imaginum, Laur. Humor oculis interior pupilla, Arist. i. hist. an. 9. 5. gen. an. 1. m Gal. i. caus. sympt. Rhagoides tunica visus instrumento prætexta, qua nigra simul & carulea, quod hi colores visum ubi à splendida luce laborat, maxime consolentur.

Crystallini vero usus, ut sit primum & præcipuum visionis instrumentum, in quo visio perficitur, quare idolum & simulacrum visionis nonnulli appellant: imo & pupillam Aristoteles nominavit, quia in anteriore parte potissimum visio fiat. Præcipuum enim

enim visionis instrumentum, omni colore secundum se carere debuit: siquidem omne recipiens, ut inquit Philosophi, à natura recepti denudatum esse debuit, eo quod idem in seipsum agere non potest, nec à seipso pati. Aliquid autem omni colore carere cognoscimus, quando diversis coloribus oppositum, res repræsentat, talia sunt aer, aqua, crystallus & huiusmodi. Quare visionis instrumentum oportebat esse vel æreum, vel aqueum, vel crystallinum. Non debuit esse æreum, quia tunc instrumentum objectum cognoscit, quando ita ab eo patitur, ut illud fiat: colores vero, qui in ære recipiuntur, per ipsum fluunt, nulla facta in eo mutatione. Non debuit esse aqueum: nam licet species colorum magis in aqua, quam ære imprimantur, non tamen in ea colores ita imprimuntur, ut spectantibus in ipsa esse appareant, sed per ipsum quemadmodum per oculum fluunt. Crystallinus ergo præcipuum visionis instrumentum erit, res visibiles recipiens, quod probatur autopsia. Si enim crystalli portionem crassiusculam & rotundam corporibus coloratis opponamus, tum colores, ex quacunque parte inspicias, ita in eo conspiciuntur, ut ejusdem proprii, non aliunde fluentes esse videantur: quare in crystallo, non solum colores recipiuntur, sed etiam ita retinentur, ut ejus potentia in colorem, quem recipit, mutetur. Causa hujus est, quia in crystallo non solum humidum aqueum, sed etiam glutinosum adest, quod colorum idola suo lentore retinent. Idcirco etiam natura intra oculum humorem locavit subrotundum, glutinosum, crystalli imaginem referentem, in quem tanquam peculiare visionis instrumentum colorum simulacra recipiuntur, qui crystallinus humor dicitur; quem si oculo exemptum inspicias colore omni prorsus destitutum, & colores circumpositos tanquam proprios repræsentare videbis, & si dissecueris, ex humido glutinoso compositum invenies. Et quia sensatio receptio quædam est, idcirco hanc formam obtinuit: cujus actio, mediante sua membrana crystalloide, quam araneam vocant, pellucida & sensitiva adaugetur. Si enim exemptus characteribus vitri instar applicetur, ad hunc membrana intactus, specillorum modo, quæ ex crystallo & vitro fiunt, majores longe videbuntur, quam si humor adponatur, unde forte specillorum inventio prodiit: cum humor hic nervi visorii perspicillum sit, qui species illabentes colligit, & perspicilli modo retiformi res majores præferat. Absolvitur autem visio & alteratione & dignotione. Quod vero in hoc alteratio fiat, pellucidus factus, aliter tamen quam aqueus, quo à luce alteretur & immutetur. Et cum in hoc lux imprimi & firmari debuerit, aqueo densior est, ut in ejus superficie lux ad perpendiculum refringatur: Sic enim lux impensius unitur & corroboratur, radiis magis obliquis, & propter refractionem in unum concurrentibus. Quare crystallinus, cæteris in oculo diaphanis, utpote, cornea humoribus aqueo & vitreo, crassius est, quia non ut cætera solum luces & colores reddere, & iis viam tantum præbere debuit sed eadem detinere, pati & visilia sentire debuit, quare crassitie sua formarum transitum prohibet, quæ in ejus superficie & corpore figuntur; ut ea sentiat: sensus autem non fit, nisi patiatur: pati autem non potest, nisi actio agentis in eodem recipiatur. At quo in eo species imprimantur, mollis est, instar cera; & ut magis adhæreant, viscidus est: hinc fit, quod luce valida, ut Solis ad crystallinum delata, cum lucis simulacra, in eo aliquantum remaneant, is & doleat & labefactetur. At visibilibus rerum simulacra, naturaliter in eo diutius non detinentur, quam ad ea percipienda opus sit; sed recedunt, alias imperfectus visus redderetur, cum non nisi prioribus

Fff

ribus

ribus recedentibus alias species admittere possit, & post recessum, alteratio in eo non remanet. Sic crystallini conformatio ad meliorem visionem facit: quare politus est, ut species externis consimiles ei offerantur; rotundus est, ut in eo lux, ejusque perpendiculares radii uniantur, & lux robustissima in eius superficie, ubi sentiens facultas viget, colligatur; & ideæ rerum etiam maximarum integræ ad eum perveniant; antèrius tamen rotunditas depressa est, ad meliorem formarum receptionem: posterius rotundus est, ut lux ad crystallinum delata, in seipso uniat, & longius non progrediatur, sed in vitreo subsistat. Antèrius & posterius liber est, quia oportebat lucem, quæ recta semper fertur, per continua diaphana oculorum corpora liberum transitum habere, quo cuncta, quæ inter crystallinum & rem visam, continuitate diaphani continentur. At non undique solutus esse debuit, alias quolibet motu, oculi constructio labefacta fuisset; quare in circuitu alligari debuit, & anteriorum positus, ut à circumstantibus ministerium capiat.

n Vitreus diaphanus Opticus, quo lux tra: sive possit. Et ubi crystallinum permea vit, ulterius fundatur: Et nervi optici con carum petas, ubi demum visionem perfici volunt.

Vitreus post crystallinum locatur, ne lux transvecta, statim ab opacis & coloratis membranis, retina & uvea foedata ad crystallinum revertatur, & sic colores internos tanquam propinquiore sentiat: & ut in eo tanquam diaphano, ⁿ diverso tamen à crystallini diaphano, fiat nova lucis refraçtio, & quasi debilitatio, & quia vitrei substantia rarior est, in eo lux dispergitur, evanescit, & tandem sua copia omnino obumbrat, retinæ molliæ difficile refluxum permittente. Dein ipsius usus est, monente Galeno, ut crystallinum per diadosin seu transumptionem nutriat: censuit enim, crystallinum ex sanguine nutriri non posse; sed hic limitatione opus est: cum enim omnes partes sanguine nutrantur, & crystallinus humor pars sit, & is sanguine nutrietur; verum non immediate, sed mediate; nam cum neque crystallino, neque vitreo venæ insint: quantum quidem inspectione probari possit, ad ipsos sanguis deferri non potuit; imo non debuit, ne crystallinum, qui colorum expers esse debuit, suo colore inficiat, sicque visionem corrumpat: Alimentum ergo postulabat jam præparatum, & quod mediate ad ipsum deferretur: quare sanguis ex venis per uveam membranam excurrentibus, in quibus adhuc crassus est, & nigricans in minores ramos per retinam excurrentes effundit, & utrinque alteratus, in his floridus est, tenuis & rubedine clara donatus, qui à vitreo assumitur, & in eo magis adhuc præparatus, in alimentum & ipsius & crystallini cedit. Hinc Galenus inquit, vitreum ad crystallinum se habere, quemadmodum se habeat ventriculus ad hepar. At ^o cum in omni alimenti mutatione excrementa duo, tenue & crassum segregetur; tenue hic volunt, esse ipsum aqueum & humorem: crassum vero humorem illum atrum & opacum, qui in uvea

*o De oculis 3.
p Columb. Varol. Aquapen.
q Aquapend.
De nutritione*

crystallini opiniones. Gal. 10. us. part. 1. voluit crystallinum à vitreo, vitreum à corpore ipsum ambiente, (id est, retina) per diadosin nutriri, quia humori crystallino, qui albus est, clarus ac splendens ex sanguine nutriri non licebat, ut qui multum qualitatibus ab eo dissidet, sed alimentum quoddam familiarius postulabat: quare illi à natura contigit alimentum accommodatum humor vitreus, qui quanto crassior est sanguine, & albus magis, tanto à crystallino humore, humiditate atque albedine relinquitur: hic enim albus est planissime ac mediocriter durus. Hæc ille. Sic & Varolus ad hanc opinionem accedens, inquit: Cum unumquodque ex determinato proxime nutriatur, ideo crystallino posterius vitreus adposuit, qui consistentia crystallino mollior est, & tenuior; & ne parti, tam nobili & spirituum abundantia dissolubili, alimentum unquam deesset, tanta vitrei quantitas est, in qua nutritione crystallinus, vitrei partes crassiores, cum eo longe crassior & densior sit, in naturam propriam vertit; Tenuior vero pars vitrei, tanquam excre-

Excrementum inutile à crystallino facernit, & humorem aqueum dictum constituit. Varolus. Verum Archangelus, qui vult crystallinum vitreo nutrir, ut os medulla nutriatur, inquit, si crystallinus & vitreus partes sunt corporis, tunc pars una alteram nutrit? R. Natura effecit, ut à nutritione vitrei multum superflueret, quod crystallini pabulum est idoneum. Quomodo dicit Galenus in vitreo nullam esse venam? R. Nullam ex stare conspicuam, at multas inesse, quæ præ exilitate oculorum obtutum effugiant: Idcirco vitreum non esse ita candidum, ut sit crystallinus, quia cæcis venis plurimis sit conspersus: sic in adnata membrana nullas venas apparere, at in inflammatione latentes conspicuas reddi: in cerebri substantia, cum scinditur, nullas venas apparere, at cum inflammatione obsidetur, innumerares per ipsius substantiam conspici: hæc ille: Laurentius vult, vitreum ali sanguine, & venulas à ciliari interstitio accipere: ipsum crystallino sanguinem præparare, quem immutet, ne color erubro, & venulis glacialis inficiatur, non tamen vitrei humoris substantiam in crystallinum transire, eique assimilari, non tamen albugineum ipsius excrementum esse. Aquapendent. sententia: à sanguine nutrir, & quemadmodum ossa, & membrana, quæ albißima sunt, & à natura sanguinis distant, ex temperamenti proprietate sanguinem in os transmutat: ita & crystallino usurvenire, sanguinem è venis uveæ in retinam delato, & quo in horum corporum substantiam vitidam converti possit, deputari, crassum in choroidem deponi, & in uvea colligi: tanne vero humorem aqueum existere. Non vero posse crystallinum à vitreo per diadosin nutrir, quia intercedat aranea tunica inter utrumque humorem, quod Galenus ignoravit, qui tantum anteriorem crystallini partem integri censuit, & hinc in errorem hunc lapsus esse.

in uvea reperitur, & à qua, ut in uvea monuimus, ablutione auferri potest, cujus tamen utriusque excrementi insignis utilitas est, ut suo loco diximus. Tum, ut spiritus visivos ad crystallini illustrationem retineat. Tandem, ut eum, à membranarum duritie conservet, eique sedem suppeditet.

De Auribus.

CAPUT XLIII.

SENsorio visus expedito, nunc disciplinæ sensim^a seu auditus organon, cum is ad artes & scientias excipiendas creatus sit, earumque usum proximum à luminibus natura nobis dederit, ut Celsus loquitur. Aurium, inquam, fabricam, non minore artificio creatam & formatam explicare aggrediamur: quæ visu apprimè jucunda, sed explicatu & ostensu admodum difficilis est, cum in auribus multæ sint particulae, & quæ exiguæ aspectumque prope effugientes, & in angusto spatio inter ossa reconditæ delitescant. Dicturi autem sumus ea, quæ partim ex dissectionibus didicimus, partim ex scriptis doctissimis, potissimum Fallopii, Eustachii, Volcheri, Arantii, Aquapendentis & Placentini hausimus: ad quod præstandum Dei opem imploramus, ut is mentis aciem clementer largiatur, quo ejus miracula, divinam atque infinitam sapientiam ac bonitatem explicare possimus, & ut ea, quæ succincte dicturi sumus, etiam perspicue proponere queamus.

Aures ab hauriendis^b vocibus dictæ, Græcis ὠτις & αὐριον, à voce accipiendæ ἀκούω nominantur. Cujus instrumenti partes plures sunt, quæ omnes ad soni in aurem receptionem & intensionem faciunt, quarum aliæ sunt, sine quib. auditio & soni receptio fieri non potest; aliæ, ad meliorem receptionem & auditionem necessariae: aliæ prodenique, ad omnium conservationem creatæ sunt. Dividimus cum^d Hippocrate, in aurem externam, & aurem internam: de externa primo.

Fff 2

De sensu & sensibili, cap. I.

^b Laetatio & Virgilio. ^c Aristoteles dicit aures, ἀκούω auditum vocat, i. hist. an. 15. ^d Aures, partem modo externam, modo internam significare apud Hipp. colligitur ex Coacis aphor. 192. & seq.

De Aure externa, sive auricula.

CAPUT XLIV.

De hac Aristoteles 1. histor. anim. 11. & 2. part. anim. 10. 11. 12. & 5. gener. anim. 2. Galen. 11. 12. part. 12.

a 1. hist. an. 11.
eorum qua sen-
sum audiendi
obtinere: aliis
auricula sunt,
aliis desunt,
meatusque pa-
rent ipsi audi-
endi, ut iis, qui
penna aut cor-
tice, squamma
ve integuntur:
at ea, qua ani-
mal generant,
omnia auricu-
las habent, ex-
cepto vitulo ma-
rino ac delphi-
no, Arist. l. c. &
2. part. an. 15.
aves meatus
tantum audi-
torios habent:
quod enim cu-
tis earum du-
rior sit, nec pi-
lus, sed penus
integuntur,
ideo materia ca-
rent, ex qua au-
ricula creantur

quadrupedes

etiam animal parientes (Gaza mali doctrix ovipara pro Gazax legiti, quod ex 1. hist. an. 11. probatur) & corticata eo-
dem modo se habent. Vitulus marinus, inter ea qua animal parit, cavernas tantum habent ad audiendum, utpote
quia manca sit quadrupes: & 5. gen. an. 2. quia quadrupes Gazax (Gaza oviparum vertit) aures non habet, sed
tantum meatus, quia vitam in humore traducit. Pisces, qua parte audiunt, a nemine penitus exploratum est, an e-
nim foramina ante oculos posita ad audiendum, an ad odorandum data sint, ambigitur. Verum qua oculis carent, ca-
rent & auribus, ut myrtili, ostrea, & omnia dura testa instructa, in piscibus respirantibus, & pulmonem habentibus, ut
balenis, delphinis, vitulis marinis, aures haud latitant, quamvis meatus exterior in vestigatu difficilis sit, Placent.
b Gal. de instrum. odorat. 2. c Aves, si haberent auricularum cavitatem, aer perpetuo incidens volarum remorare-
tur quemadmodum ventus adversus veli concavum tangens, navim retardatur. d Cicero 2. de nat. deor. e Arist.
2. par. an. 10. voluit sonum quoquo versum diffundi: aures, ait, orbem capitis aequis portionib. secant tenentque medium:
auditur non modo per directum, sed undique. At Gal. 10. 11. par. 8. non ex omni parte audibilia audire censuit. f Auditis

et quae

et ejus sensorium et aures (nota in Greco ἡ τοῦ ἀκοῦσθαι αὐτῆς, ἡ τοῦ ἀκοῦσθαι, vertit Gaza, ejusque partem sensoriam, id est, aures,) à latere quidem eodem in orbe, quo oculos Arist. 1. hist. 15. quadrupedum nonnullis aures posita superius sunt, 1. hist. 11. Simia aures mediam positionem inter bruta et homines obtinere, cum animal sit medium inter hominis figuram erectam, et quadrupedis pronam: cui etiam non omnino immobiles, ut homini, neque mobiles, ut brutis, sed ex quo motu praeclara, et paulo altius, quam in homine posita. A quapendens et Placentinus.

colorum occupant, & quidem in homine immobiles; at in quadrupedibus in summo capite, cum fere semper capite sint ad terram inclinato, vicium quærentes, & mobiles sitæ sunt.

Figura 8 sunt rotunda seu semicirculari, [tab. 23. fig. 1. F. tab. 24. fig. 1. b. b.] quia rotundum ab iniuriis omnium est remotissimum, & quo essent capacissima; extrinsecus convexæ, intrinsecus antri in modum cavæ, quibus cavitatibus convexitates respondent, ne quid ex inopinato intro irruat, neve aures facile afficiantur. Ab his enim anfractibus, tanquam corporibus concavis, non solum aeris irruentis sonus prompte exacteque hauritur, & intensissime excipitur, sed etiam refrangitur, ac pilæ instar recurrit: ex qua circulari refractione harmonia ad tympanum citra molestiam pertingit & acutius, fortius ac distinctus aeri interno imprimitur, & diutius quoque sonat; quemadmodum in conchylis a auribus ad motus fieri experimur, & nervo auditorio exactius offertur. Hoc ostenditur, primo eo, quod soni in concavis durisque corporibus exactissime recipiuntur. Dein etiam, quod iis, quibus hæc pars abscissa est, ob tuse, confusa ratione, & murmuræ soni, articulatae vocis fluentis aquæ, aut ressonantis cicadæ in modum offeruntur: imo & alterius auri non absente audiendi facultas perturbatur, nisi auri abscissæ foramen occludatur, Arantio monente. Sic & surdastri, quo accuratius audiant, manus cavas à posterioribus ad anteriora spectantes, obtundunt: cum & auri in cavitates antrorsum spectent; quo animal ad sonum accipiendum occurrat, quod Hadrianum Imperatorem fecisse legimus. Quamvis & hæc aeris refractione utilis sit, ne aer frigidior, vel immensi soni subito irruentes offendant.

Magnitudine variant: in aliis enim maiores, in aliis minores sunt: magnitudini sui corporis proportionem respondent: quamvis etiam à calore vitali vehementiore se invicem superent: hic enim insignis, quandoque magnas ac insignes aures efficit: at tamen aliorum animalium respectu parvæ, tum ad ornatum, tum quia caput pileo, galeis lustralis tegumentis tegendum fuit: quare si magnitudo ea, quæ in brutis est, etiam in homine fuisset, plurimum obfuisse; tam magnæ tamen sunt, ut ad sonare, & meatum operire possint.

Geminæ factæ sunt, non tam, ut una læsa altera frui possimus, (quamvis hæc magna sit commoditas) quam ob sensus necessitatem, ejusque perfectionem.

Dividitur tota auris, quæ vannum^m fert, ad imitationem auctoris introductoⁿ rii, in partem superiorem & inferiorem: superior, quæ dura & erecta est, quam sine nomine Aristoteles^o reliquit: ejus vero interpretes, auris externæ, quam auriculam nominat, partem superiorem, pinnam vocat, [tab. 23. fig. IV. tab. 24. b. b.] tam propter for-

FFF 3

mam, star expansa.

Plat. et Plac.

cent. n. Sub auditorio meatu particula pinguis ab aure suspensa fibra est seu auricula: superior pinna. o 1 hist. an. 11. αὐτῆς δὲ πτεγας, πὶ πρὸς αὐτὴν μὲν: τὸ δὲ, λῶβος. quæ verba ita vertit Gaza, auris pars exterior, cui nomen auriculae, parte consistat superiore, pinna, inferiore, fibra.

g. Supra rotunda, et infra in pinnam definit, Columb.

h. Referunt, Scythias propter frigoris aures commori, et sic

quam plurimis auditum laedere quare, ut melius audiant, cochleæ testam

auribus admovent, ut in concavitate facili concludatur aer suscipiatur, Aquap.

i. Arantius, Laur.

k. Asian. Romanorum consul testis est locupletissimus, Gal. 11. n. part. 12. in latimohabetur Hadrianus.

l. Gal. 11. n. part. 12.

m. Vesal. in examin. vanni in mam, star expansa.

Plat. et Plac.

nam, quam usum: propter formam, quia si conchæ generi, quæ pinna dicitur, simili est: propter utrumque vero, nam quemadmodum pisces pinnis innatant, & earum ope innatando remorum loco utuntur: sic & hæc capiti à latere adherent, quo sonos & voces detineant, ne ad caput appulsi, priusquam aerem internum moveant, aberrant: eandem ob causam etiam ab aliis *πτερυγωμα* Pala dicitur. Latior est, quo ab ea maxime parte soni excipiantur, qui dein deorsum per helicen, quæ ad aeris circulationes adaptata in concham, indeque in meatum auditorium excurrant.

p. Introduc.

q. Russo.

q. Ciceroni ad

q. fratrem, li-

bro 2. cui &

ansa auricula,

quæ pars in ve-

recundia rube-

re solet, Laur.

Inferior ab illa propendens & mollis [tab. 23. f. 1. E. f. 2. K. tab. 24. f. 1. a.] *λοβος*, *δοτό τῆ λαμβάνειν*, quod eam partem apprehendamus, cum quempiam admonemus, & hæc forte ratio, cur auris memoriæ consecrata sit: Latinis fibra, lobus & auricula infima: qua in humano corpore nil mollius est, aut flexibilis, cum nec osse rigeat, nec cartilagine dure scat, neque nervis intendatur: quare sine magna molestia perforatur, & ornamentis appensis ornari solet: cuius usus, excrementa, quæ ex auribus fluunt, deorsum derivare.

x. Russo.

Quod totam auris circumferentiam exteriorem ambit, à tortuositate *ἐλκ*, capreolus, quod capreolum seu claviculam vitium referat [tab. 23. f. 1. FF. tab. 24. f. 1. b. b.] interior ambitus prior, quasi oppositus, in cuius medio cavitas [tab. 24. f. 1. c. c.] *ἀνθελίς* dicitur: quibusdam à similitudine, scapha. Cavitas magna, quæ ab illa fere circumscibitur [tab. 24. f. 1. d.] *κόγχη*, concha, quod conchæ instar anfractuosa sit, nominatur: Hæc auris externæ pars præcipua est, & magna, cum sonum universum, qui vagus per helicen ferebatur, colligere debuerit: hæc versus meatum auditorium exacuitur, quo sonus ei subito offeratur. Iuxta meatum auditorium cavitas est, in qua velut in alveo sordes colliguntur, quam *κνίφη* advearium nominant: at sordes, quas *ρῦπες* *ἐν τοῖς ὠσὶ*, Hippocrates, Aristoteles appellarunt, has Rufus *κνίφη* vocavit. Latinis veteribus cerumina & marmorata dicuntur. Cerumina forte à colore, cum plerunque ceræ instar croceæ & spissæ sint (licet interdum & aliter coloratæ sint) quare à bilioso humore excrementitio ^{aa} eas gigni & earum color croceus & amaritudo summa ostendunt, quæ bilis sero permixta, ex cerebro sensim in hanc aurium cavitatem transudans in ea colligitur, & nisi repurgetur, aures opplet & diutius retenta crassescit, tandemque indurecit. Hæc si dulces fuerint, lethale esse Hippocrates ^{bb} scribit: & has in mortuis dulces esse, huiusque rei causam Aristotelem in questionibus physicis explicasse, Appollonius ^{cc} refert. At ne frustra in auribus hæreant, earum usum esse Cicero ^{dd} censuit, ut si quæ minima bestiola irrumpere conetur, in sordibus his tanquam in visco inhaereat.

u. Egin. Hesy-

chius Pollux

in nom. idem

esse cum mea-

tu auditus Pla-

cent. voluit.

u. 6. epid. sect.

5. aph. 18. &

Egin.

x. 32. prob. 4.

y. 1. de par. hom.

36. Aphrod. in

prob. Pollux,

Suidas, Ari-

stoph. Schol.

z. Crassius apud

Ruffum, For-

sus apud Hipp.

aurium mar-

morata, Plin-

nii, Gorræo in

defin. aa. Arist. l. c. amara: an quia putri sudore contrahuntur, qui salsus amarusque est? putredo namque est causa

salsedinis; Gal. 2. diff. febr. quod vero putridum & salsum procedente tempore amarum fit, propter consumptionem ma-

jorem in humido aquoso factam, Zerbis in anat. At Rhasis in introd. med. ait amaras ob vapores biliosos qui sua levi-

tate in cerebrum feruntur & ad aures pelluntur, veluti cerebri superfuitates colerica, sicut melancholica per oculos:

phlegmatica & sanguinea per os & naves. bb. l. c. aurium sordes hominibus dulces quidem lethales, amara vero mini-

me. cc. in lib. de mirab. hist. dd. 2. de nat. Deor. & Russo & Polluc.

Conchæ opposita & adnata eminentia [tab. 23. f. 2. L. tab. 24. f. 1. e.] versus tempora, quæ recti modo supra meatum auditorium elata est *κεκρυμ*, hircus, quia in hac parte pili crescant, qui in aliquibus rigidi & densi hirci barbulam imitantur: pars huic opposita, cui auricula infima appender, & quoque pilosa est [tab. 24. f. 1. f.] *ἀντίρεια*.

7. utriusque usus, concham efformare, & ne sordes à temporibus in meatum illabantur, impedire. Inter hæc duo quasi sulcus excavatus est, & quasi dimidiatus orbis efficitur, qui *ἐν τῇ* Herophilo, & *ἐν τῇ* Polluci dicitur, per quem tanquam rivulum vel sulcum declivorem aurium excrementa, sive pus, & alia quævis fluxilis materia in concha collecta, expurgetur, sed plura de partibus externis cupienti, librum nostrum de partibus externis consulat.

Ulus totius auris ^{ff} externa, quæ vanni instar expansa est (non enim solum ornatus ^{ff} Nam ut la-
gratia, sed etiam tutelæ causa creata) soni species per aerem vagantes cum aere inter-
cipere, & tanquam in sinu colligere, & infundibuli latoris instar excipere: (quare ^{pis in mediam}
varii canaliculi ad foramen desinentes impressi, quo sonos circulariter motus inter-
cipiant) per anfractus ad auris meatus ducant & ipsius imperum, ne cum violentia ^{quiescentem}
subjens, tympani membranulam lædat, viæ obliquitate exsolvere: & si forte mea-
tum ^{dejectus, hanc} auditorium præterlapsus sit, à parte posteriore repulsus, antrosum versus ca-
vitatem feratur. Nam cum meatus à lateribus sit collocatus, facile sonus ipsum præ-
teriret: & cum is à parte posteriore antrosum vergant, & nos antrosum moveamur, ^{mores in orbes}
si nihil à parte posteriore obstaret, difficulter audiremus, appulsæ enim voces meatum ^{sibi succeden-}
præterlaberentur (hinc bruta animantia naturæ instinctu aures ad sonos vocesque ^{res semper ma-}
circumagunt) & quo his usibus commodius inserviat natura eas ex cartilaginea sub-
stantia efformare voluit, quo semper prominere: & nisi obstetricum & nutricum ^{jores evadentes}
ligaturis, nec non longo decubitu super latera, aures deprimere, exterius ma-
gis prominere, & sic sonos melius interciperent, quare exactiore auditu præditi ^{ita res vocem}
essimus. ^{sonumque eden-}
^{tes, aerem mo-}
^{vent in orbes}
^{sibi succedentes}
^{ita ut qui rei}
^{sonum edenti}
^{sunt vicini,}
^{sint parvi, reli-}
^{que proxime}
^{succedentes præ-}

portione semper majores evadunt, quoad perveniant ad aures, in quas impingentes intro in meatum auditorium sub-
eunt: alioqui præterlapsi, laberentur atque errarent, nec auditio fieret, aut certe male fieret. Piccolb.

De Partibus Aures externam constituentibus.

CAPUT XLV.

AVrem externam duplices partes, communes & propriæ constituunt: commu-
nes, cuticula, cutis, membrana nervea, caro, & pinguedinis aliquid in lobo: pro-
priæ, muscoli, venæ, arteriæ, nervi & cartilago.

Cuticula libro primo explicata fuit, quemadmodum & cæteræ partes communes,
quæ hic etiam non nisi ab humorum acrimonia, aut igne, pustula, borta à cute di-
velli potest: quæ cutim investit, ut eam levissimam ac maxime politam reddat, eam-
que cum sensus exquisitissimi sit, ab iniuriis externis tueatur.

Cutis tenuissima est, in auris tantum gibbo latere crassior; in convexo, & quo au-
ditus foramini vicinior est, tenuior existit: hac & foris & intus undique aures investi-
untur, quo carni paucissimæ, & cartilagini validissimæ & firmissimæ adhæret; quo au-
ris superficies, interior potissimum perpolita sit, ne corrugari aut inæqualis reddi
(quod ad decorum quoque facit) possit, ne soni receptio impediatur, cum ad soni re-
ceptio-

a 15. Probl. 7.
*quærit, cur do-
 mus nuper illi-
 ta magis reser-
 net: id refert in
 in levitatem,
 quæ à densifica-
 re provenit.*
 b De aurium
 venis, Hipp. 1.
 de nat. hom.

ceptionem & resonantiam levitatem facere^a Aristoteles testetur: quare & meatus au-
 ditorius, cute densa, dura, tenui, ac perpolita, quæ valde admodum adhærescit
 quemadmodum & membrana nervea, quæ cum totum corpus investiat, & auriculam
 ambiat, sed cuti, quemadmodum in vola manus valide connexa. Quia vero auricu-
 lam inferiorem pendulam succingit, cum membrana & carne adeo commixta est,
 ut ab iis recte separari non possit; quare carnosâ, & etiam subpinguis ac fungosâ
 existit.

Vasâ obtinent: Venas quidem^b à jugulari externa ramulos hinc inde disperfos
 [tab. 23. fig. 1. DDD.] dein à iugularis internæ calvariæ basin ingressâ, ramo graciliore
 per ossis temporum foramen quartum, quamvis etiam ramulus ad auditus organum,
 & in cavitatem primam mittatur [tab. 11. fig. 13. n.] quæ sanguinem pro nutritione par-
 tium contentarum, & forte actis quoque congeniti, devehunt. Venas enim in hanc
 cavitatem, & ad membranulam ferri, probatur dissectione eorum, qui ex inflamma-
 tione cerebri & aurium interjere: meatu enim auditorio dextre aperto, venulæ in
 membranulam conspiciuntur, quæ in non inflammatis non apparent, eo modo, quo
 in oculis fieri monuimus. Horum vasorum scarificationem multi probant in den-
 tium doloribus: & Hippocrates in^c cedmatibus *ὀδὸν μαται* Galenus^d diuturnos affe-
 ctus ex defluxione qui citra articulos omnes, aut præcipue circa coxam fiunt inter-
 pretatus est) eorum pertusionem commendat: quare Valesius notavit Sarracenos in
 pluribus morbis aures posticas scarificare & ischiadicis omnibus auriculæ partem
 internam, quæ cartilago veluti replicata extuberat, cauterio feliciter urere: forsan
 quod à capite materia fluens hac unctione intercipiatur: & Galenus,^e in antiquis he-
 patis & lienis affectibus, venas pone aures religiose secari scribit. Arterias^f à caroti-
 dis ramo interiore; arteria nimirum secunda, & exteriori versus auris posteriorem
 regionem [tab. 12. lib. 2. o.] quo partes illæ, imo & aer congenitus vita fruuntur. Et
 hic notanda propago arteriæ carotidis, quæ auris antitragum perreptans ad maxillam
 superiorem fertur quo dentibus singulis spiritum vitalem suppeditet: per quem ra-
 mum haud dubie humores acres in dentes quandoq; delabuntur & insignem odon-
 talgiam causant: hac enim propagine ab aliquibus secta, humoreque delabente in-
 tercepto mirabiliter dolor dentium sedatus fuit. Nervos^g duos minimos à poste-
 rioribus, duos à lateribus à secunda medullæ cervicis conjugatione, qui tamen omnes
 exigui sunt, per cutim ad sensum tactus, & musculos, quando adsunt, ad motum dis-
 seminatos.

De

e 6. epid. sect. 5.
 aph. 2. 1. κεδυ-
 ταν τας: & τισιν
 αὐτῶν ἐμὸν
 φλέβας καὶ
 d in com. & in
 exegefi: & Ero-
 zianus apud
 Hipp.
 e 9. καὶ τῶν
 f arteria quæ
 post aures inci-
 duntur, Bil-
 hasseisse albu-
 cast. 2. c. 2. di-
 cuntur.
 g 16. us. part. 6.
 ex spinali me-
 dulla colli, ner-
 vos sursum du-
 cere ipsam non
 pignit, magnos
 quidem in ca-
 teris animalibus, quibus & temporalis musculus est maximus, atque aurium substantia est, facileque ac multum mo-
 vetur: omnino autem exiguos in animalibus, quibus nihil horum inest, ut homini & simia, nam & musculus tem-
 poralis inest exiguus, & aurium substantia fere immobilis, quod ipsorum quibusdam ea sit minima, hac Ga-
 lenus.

Aures etsi homini fere semper immobiles^a sint, ita ut in paucis motus sensu deprehendatur, attamen vim motricem hominum auriculis influere, & musculi, quorum actio est motus, & nervi, qui circa aures communiter observantur, comprobant. Quod vero motus hic rarus, & sensibus minus sit perspicuus, causa triplex est; vel quia aurium musculi exigui sunt (ita ut Galenus^b delineamenta quædam musculorum appellavit) & nervorum filamenta exigua habent, sic ut spiritus motorii copia sufficiens non influat; vel quia, si moverentur, auditio depravata fieret, præsertim cum parvæ sint: quare capitis motu velocissimo ad sonum recipiendum, quoquo versum moveri possunt, cum in^c quadrupedibus, cum majores habent, & non ita expedito capitis motu sint, mobiles existunt, quo omni ex parte^d sonos recipiant: licet iis & muscas abigant, quas homo manibus abigere potest; vel quia nimis breves sunt, & aures cartilaginosa, quo minus musculi, & nervorum ramuli expandi possunt. Quare nunc musculos auricularum in homine explicemus, quorum inventio Fallopio debetur. Sunt autem duplices, communes & proprii, in iis, in quibus aures manifeste moventur, recte conspicui.

Primus^e communis est auriculæ, & utrique labro, & est portiuncula illius, qui primus inter genas, & faciei cutim moventes numeratur, qui *αὐτομαμωδὲς*, [tab. 27. f. 1. T.] & quadratus dicitur: hic aliquando carnosus redditur, & suis fibris ascendens in auris radicem [tab. 27. f. 1. O.] sub fibra inseritur, & deorsum in hoc vel illud latius trahit: latus est, tenuis & figuræ quadrilateræ.

Alter^f qui proprius est [tab. 27. fig. 1. juxta B. tab. 23. fig. 1. BB. f. 2. A.] in anteriore parte situs, musculo temporali superponitur, & à frontis muscoli sine superiore, & extremi, quo temporali contiguus est, oritur, qui versus aurem descendens angustior

Ggg

red-

sculi aures moventes hætenus mihi non sunt observati in hominibus, sed canibus & caudatis simiis, Vesal. in exam. Plerique Anatomici nullam mentionem fecere, quod eorum oculos subterfugerint: alii quidem, quod ex tenuissima membrana carnea fibrarum musculosarum conspersione coagmentati sint, & sic facile exsiccentur, interdum pinguedine oblit, sub hac tanquam involucri latitant: alii, quod sub auricula ligamento occultati sint: hæc causa, quod à nemine, me sciente, qui anatomica scribere cogniti sint: mihi nunquam hominis caput contigit, cui omnes defuerint. Observavi pauciores quam sex, semel sex, plures nunquam, quorum unus communis, reliqui proprii in iis animalibus, quæ auricula carent, cutis meatum auditorium ambiens, & auricula vicem gerens, musculos habet, ut anser, gallus indicus, Placens. b 16. us. part. 6. & 11. us. part. 12. aut nihil omnino movetur in hominibus, aut exiguum quendam atque obversum habent motum: cum enim parvæ sint, parum omnino, aut prorsus nihil erant, quod nos juvasset, si mobiles ac semper circumagere, ac vertere ad sonos ac voces, usum partium à natura edocta; at hominibus magnitudo tanta incommoda esset, Gal. 11. us. part. 12. d Sic enim melius undique strepitus circumactæ excipiunt, Arist. 2. part. an. 11. e Quibusdam hominibus, ut & simiis huius beneficio aures moventur, Vesalio: primus musculi à buccis in auris pin-
nam, Columb. musculus tertius aurium, Fallop. Laur. Musculus communis inferior aurem movens, Plat. Musculus auricula

ricula communis, Plat. f. Musculus 1. auris, Fallop. Laur. musculus privatus aurium anterior, Plat. quem videtur in duos divisisse, altera parte musculum privatum, alterum musculum commune superiorem faciendo: Musculorum priorum primus, Placens.

g Suo sine in eam partem, qua fibra oppositur, & principium ejus, qua & non auricula vocata est, inseritur, Fallop. obser. h Musculus secundus à mammillari processu, Col. Musc. 2. sed non à mammillari processu, ut aliqui opinati sunt, Fallop. musc. 2. Laur. Plac. Musculus

redditur, & tendinosus in auris superiorem & partem inseritur: hic tenuis est, cum ex carnea membrana carnis fibris conspersa, ut & ceteri aurium musculi producantur, & temporali multo minor, & ex rotunditate oblongatus est. Hujus usus, aurem ad superiora & anteriora trahere.

h Tertius [t. 27. f. 1. juxta O.] ab occipitio, & musculorum occipitii involucris, supra mammillarem processum oritur, ubi musculi caput, & scapulam moventes desinunt: hic principio angusto exortus, deorsum per transversum fertur, & paulo latior redditur, ac si in duos vel tres digitos divideretur, auri posterius implantatur, ut illam ad posteriora, & aliquantum altiora trahat. ⁱ

Quartus, nonnunquam sub ligamento cartilaginis auris, substantia quadam lata, carnosa & fibrosa à mammillari processu prodicens, in progressu angustatur, donec in tendinem abeat; qui in totam radicem cartilaginis auris [tab. 23. f. 2. H.] infigitur, & quidem portione una superne, altera media, & tertia inferne. Hinc Placentinus laboriosissimus Anatomicus, ex hac massa tres fecit [tab. 23. fig. 2. BCDEFG.] ratione insertionis musculos, quos tamen ex uno loco, & quidem confusos, prodire asserit.

privatus posterior supra mammillarem processum, Plat. i Hi saepe non reperiuntur: quotiescunque autem ii, qui in occipitio siti sunt, reperiuntur: simul & hi ipsius auris manifeste reperiuntur; Fallop. obser. Prater hos semel unum tantum, semel prater hunc adhuc duos, sub auricula vinculo latitantes reperi, Placens.

De Cartilagine auriculæ.

CAPUT XLVII.

De hac Galenus 11. us. part. 12.

a Arist. 2. par. an. 9.

b Hoc sensu semper egimus. Cicero 2. de Nat. deorum. c Arist. de audibilibus.

Auriculæ substantia [anterior auriculæ facies excoarctata, tab. 23. fig. 1.] nec ossea, nec carnea, sed inter hæc media esse debuit: si enim ossea fuisset, vel ex osse tenui, vel crasso constaret: si tenui, tum levi de causa, & facile^a frangeretur; si ex crasso & solido, capiti oneri fuisset, & rebus foris ingruentibus non cederet, & earundem vim exsolvere non posset. Si vero mollis esset, ut caro, in seipsam concidens ad formandas cavitates inepta foret, nec fornicis vel conchæ, aut cavitatis figuram servaret, nec sonum receperet, (cum sonus ad durum firmeretur) sicque aeris ingressus prohiberetur, & facile contunderetur. Quare ex substantia mediocriter molli, mediocriter dura, constare debuit; quo ob molliem mediocrem, in omnes modos flecti, & corporum incurrentium occursum cedere possit, quo minus contusioni & ruptioni subiaciatur: ob duritiem vero mediocrem expandi, erecta manere, & semper patere potest & debet, quo aerem cum sonis colligat, cum sensus^b is etiam dormientibus necessarius sit, ut à somno excitentur. Dein, quo in ea cavitates & anfractus creentur, ne adjectæ voces labantur: nam, dum sonus per^c cavitates excurrit, vires acquirit: & sic ex

fic ex ipsa refractione, harmonia & modulatione adepta, ad membranam citra tristem sensum pertingat. Et quia mediocriter dura, idcirco sonora, sicque sonus melius recipitur & formatur, nec echo excitatur, nec idem, quod cum cochleæ teste auribus admota fieri solet, contingit, ubi exiguus sibilus, ac velut aquæ decurrentis sonus in auribus auditionem turbans, excitatur. Quare cartilagine constat [tab. 23. f. 1.] unica, eaque flexibili cute tenui eaque pertinaciter obducta, quæ veluti è temporibus educitur, à quibus plus minusve recedit. Enascitur enim ex orbiculo ^d [tab. 3. d In brutis duobus pluribusque] foraminis meatus auditorii, quod in osse temporum eclatum est, & in circumferentia exasperatum, quo promptius educatur, estque ^e ad exortum crassior & durior: crassior, quo radice firmiore nitatur: durior quoque ob ossis temporis, unde procedit, vicinitatem, & quo longius à capitis osse recedit, eo mollior & tenuior evadit. Hæc cartilago in homine continua est: in brutis tres vel quatuor cartilagine in vicem connexæ, pro auriculæ magnitudine existunt.

Ligamento quoque valido hæc cartilago ossi petroso circa foramen auditorium alligatur [tab. 23. fig. 2. CCC.] quod à pericranio, ubi versus processum mamillarem tendit, aliquot propaginibus exoritur; quæ ubi ad aurem pervenere, in unum ligamentum coeunt, superiori ac gibbæ auris parti se inserit, quo cartilaginem erectam & suspensam teneat. Cartilago hæc auditus meatui opponitur, quo ipsius ope foramen longius extendatur, ac latius pateat, ad sonos promptius percipiendos.

De Aure interna.

CAPUT XLIX.

Auris internæ partes plures sunt, foramina seu ductus quinque, cavernulæ tres, ossicula tria, membranula tympani, muscoli duo, nervus à quarto & quinto pari, vena, arteria & aer congenitus, quæ omnia Os unum, petrosum dictum continet.

Est autem os ^a petrosum [tab. 3. fig. f. a.] processus tertius, & interior ossis temporum, quod ab auris meatu inter processum mamillarem, & processum ossis jugalis, oblique antrorsum ducitur, & in calvariæ interiore basi [tab. 24. f. 2. ab a. F. versus C. & V. temp. ossa ad basin an-] inter os sphænoideum & occipitis protuberat, ita ut in calvaria interiore magis conspicuus sit. Processus hic quoquo modo ^b rotundus est, quo aeris congeniti majorem copiam contineat, oblongus, jugi in modum extensus, propter nervum auditorium, qui cum post opticum molliissimus sit, absque sustentaculo longe à cerebro sine rupturæ periculo ferri non potuit; quare hoc os introrsum productum est, quo statim nervum extra cerebelli substantiam productum tuto excipere possit: dein hæc productio prolongata est, ut canalem accommodatum consequatur, per quem vel venæ jugularis ramus, vel arteriæ carotidis ad cerebrum deferatur. At, ubi à temporum osse prodit, latior & crassior est, quo illi anfractus & cavitates imprimi queant; sensim procedens in acutum definit, ubi vena vel arteria cerebrum ingreditur; & sic totus processus pyramidis ^b figuram refert [tab. 24. f. 3. o.] Hic insigniter durus est auditus instrumentum locatum est, Pisolium. ^b Forma in simia prope ad humanam accedit, in aliis brutis, quam longissime distat, Volcher.

Ggg 2

ditus vel petrosum

& Auditus se-
 dem, quia au-
 ditus inferuit,
 appellabimus,
 vocatur & au-
 ris, & propter
 obliquum du-
 ctum οκλῶδς
 πῶς & ἡς
 κῆκῆς, meatus
 obliquus, Vol-
 sher.

d In brutis offi-
 temporum ita
 affidet, ut non
 solum in juven-
 cis, verum et-
 jam in pro ve-
 ftioribus facil-
 lime separari,
 & in duas par-
 tes dividi pos-
 sit, Volcher.

c Perforatum
quoque est, quo
aer sonorum spe-
ciebus informa-
tus subire pos-
sit. Siquidem
ad ea sentienti
organâ, quæ in-
tra calviam
continentur,
necessario duc-
tus, atque can-
nales requirun-
tur, quemad-
modum etiam
in olfactu, quo
aer rerum odo-
ratibilium &
aspidibilibus in-
simulacra ge-
rens, ad instru-
mentum prin-
cipalissimum,
& olfactus &
auditus pene-
trare possit:

quare ut nares propter odoratum sic os petrosum perforatum propter auditum creatum fuit, Piccolhom. f. Ductus secundus organi auditus, Plac. g. Sextum temporum, quartum auditus, Plat. h. Fallop. i. Septimum temporum, &

ditus organi causa, cum quovis osse durissimo durior sit, quare os *lithoideum* petrosum seu lapidosum dicitur: nonnullis, qui temporum ossa lapidea nominant, lapidosorum ossium processus interior appellatur. In infantibus os labyrinthi nominari, supra, capite sexto offendimus, in quibus ab osse temporum separatus existit, & ductum meatum auditorium in adultis efformante, media ex parte caret, cum meatus hic in infantibus totus adhuc cartilagineus, ab osse pettolo distinctus reperiatur. Quare cum eo ductu careat, in infantibus sine ossis fractione, tympanum & eius membrana & circulus osseus membrana affixus statim in conspectum se offerunt: at ubi corporibus augeſcentibus exsiccantur, ossea fit, quemadmodum & meatus auditorius, & os petrosum, ossis temporum parti squammosa, cui subſternitur, artissime coalescit, ut illud hujus processus esse videatur. Hujus consideramus partem externam & internam: externam, quatenus vel intra cranium, vel extra cranium conspicitur. Externa pars intra calvariae cavitate, crusta densissima & durissima, dentium substantia duritie omnino simili obducitur, superfœcie est, non ut extrinsecus, aspera, sed levi, eaque inæquali, cum in ipsius longitudinis medio extuberet, propter ossiculæ auditus, quæ eo loci continentur [tab. 24. f. 2. inter n. & E. humilior] sic etiam superne, linea acuta & aspera per ipsius longitudinem ducitur, qua in duo latera dividitur, & antè in acutiem asperam definit [tab. 24. f. 2. à F. versus d.]

Foramina duplicia habet, alia intra, alia extra calvariam : intra calvariam duorum alterum in processum facie posteriora respiciente [tab. 4. fig. 10. a. tab. 24. f. 2. d. a. d. e.] quod oblique extrorsum ad processum sedem fere mediam procedit: amplum est satis ac patens, leve ac subrotundum in ingressu, ac velut in sedes duas sensim dilatatum, in quod nervus auditorius implantatur, & pro temporum foramine septimo recensuimus. At sinus hic in puerulorum ossibus brevior est, & antri cujusdam sinuati, vel etiam porticus speciem habet: in adultis vero osse aucto, forma priore relicta meatus seu cuniculi formam recipit: cum paulo post ingressum (quod etiam circa dissectionem ossis in cranio occurrit) in profundo foramina duo conspiciantur, quæ in sinus seu canales duos, superiorem & inferiorem abeunt [tab. 24. f. 2. e. f.] in quos nervus divisus fertur. Alterum foramen elatius est, & manifestus versus meatus auditorii sedem superiorem, & oblique extrorsum ad processum mediam fere sedem in canalem, qui Aquæductus dicitur, fertur: [tab. 23. fig. 3. H.] & à secunda & tertia cavitate, squamma tenui tantum dirimitur, & nervi majorem portionem deducit [tab. 24. f. 2. e.] de quo in cavitate prima acturi sumus. Alterum foramen humilius est, exilius, modo simplex, modo geminum in meatus sede interiore & nervi propages exiguas in cavitatem secundam & tertiam deducit [tab. 24. f. 2. f.]

Foramen¹ alterum [*tab. 24. fig. 2. γ.*] in processu latere anteriore angustum admodum, & rimulæ modo asperum, per quod arteriola ab auditu organo ad calvariam fertur; & hoc pro octavo¹ enumeravimus.

Foramina extra calvariam tria habet: ^k primum, (quod pro temporum primo re-
censuimus) in meatum auditorium [tab. 3. fig. 9. γ. tab. 2. 4. fig. 2. α.] qui πόρος ἀναστατός
1 dicitur

quintum auditus, Plat. k. Primus meatus in processu petroso, Volch. temporum 3. & auditus 1. Plat. cui & meatus seu antrum angustissimum, hinc aliqui pro caverna prima recensuerunt; primus ductus, organi auditus, Placent. meatus auditorius conchion appellatus in cavernam ossis lapidei finitur, Eustach. Primus auris meatus (quatuor enim auri interna meatus tribuit) & cavitus prima, Laur.

1 dicitur, abie. Meatus hic propter cartilaginem ad initium extensam & ampliatam, I De hoc Gale-
 amplum quoque orificium nactus est, quod cavernulam refert, & inter processum
 mamillarem & ossis jugalis partem fertur: in puerulis^m quidem totus, quasi carti-
 laginosus, in adultis media ex parte cartilaginosa, cartilagine ab auris cartilagine
 enata, & media ex parte osseus, nam ex osseo circulo ossis temporis enascitur: siqui-
 dem in prima formatione instar annuli ossei, à temporum osse, cartilagine intermedia
 [tab. off. f. 5. & 7. f.] propter membranæ tympani exortum, distinctus est, quemadmo-
 dum in calvariis^u puerorum ad septimum fere mensem coctione scungi potest: in
 cæteris vero exsiccatur, & crusta oblitteratur, ita ut per symphasin committatur, &
 annulus seu circulus osseus, de quo capite sequenti, à meatu prædicto non amplius
 distinguatur, sed reliquo ossi unitus, parumque angustatus tubulum [tab. 24. f. 2. ll.] tingit, qui in
 seu canalem oblongum, & aliquantulum rotundum, quo plus aeris excipiat, & sono
 aditus major pateat, cum jam angustior redditus sit, & osseum constituit: qui intro
 ad membranulam tympani usque [tab. 24. f. 2. ab e. ad c.] fertur, & quidem oblique sur-
 sum; vel si mavis, ab interioribus aliquantulum declivis, & à posteriore antrorsum
 oblique nonnihil in aurem externam (ubi paulo amplior redditur) fertur. Ductus
 obliquus est, & nonnihil flexuosus, o quo aeris frigidioris confertim irruentis vires
 exsolvantur, ne membranulæ & nervi auditorii harmonia dissolvatur; dein, quo so-
 nus vehemens appulsus, antequam membranulam afficiat, aeri interno & nervo
 communicetur, & placide contangendo, sonus vehemens infringatur: cum ictus
 obliquus minus quam is qui recta fertur, offendat; ex ingentem bombardarum
 sono, campanarum maxima pulsatione & frigore intolerabili aures dolore affici,
 quandoque membranulam rumpi, unde surditas sequatur, experientia constat. Fer-
 tur autem oblique à posteriore parte antrorsum sursum, ne facile quid contrarium
 aurem ingrediatur: & si forte quid extraneum ingressum sit, facilius excidat. Sensum
 angustatur, & quo aer percussus in angustum colligatur, quo tanto distinctius au-
 dire queamus: dein, quo animalculorum ingressus prohibeatur, & exiguum cor-
 porum impetus longe propulsetur; cujus nomine etiam humor biliosus, viscidus,
 amarus & eo loci est, quo tanquam visco^r capiantur: quare & pili trago & antitrigo
 infixi sunt. Solidus quoque est & durus, sic enim sonus in transitu, ad hujus meatus
 seu canalis parietes osseos & duros vehementius impulsus, magis intenditur, quam si
 membraneus vel mollis esset.

Ggg 3

Cute
circulariter
fertur, quem

admodum aqua stagnantis superficies calculo in ipsum projecto, Varolio. p. Gal. xi. us. part. 12. sic ait. Superest audi-
 tus instrumentum, in quo & ipso primum quidem meatus, qui est in osse lapideo, involucri efficit, ne quid eorum, quo
 extrinsecus incident, ipsi nocerent, de quo flexu abunde ante tractavimus: hæc Galenus. Sunt, qui putant, Galenum
 hoc loco per involucri membranam tympani intellexisse, sed falluntur: primo, quia ait, se de hoc flexu ante egisse;
 dein, in Græco habetur ελγυ, id est flexum, non εκέπαιμυ vel σεζαμμε, quibus nominibus membranam Galenus &
 us. part. 6. donavit: sed interpret ipsum decipit. q. 32. Problem. 4. r. Cicero 2. de Natur. deorum.

Cute etiam investitur, partim ut sonus obtundatur, qui in nudum os impingens vehementius resonaret; partim, ne ab aere tactus corrumpatur: quare dura est, densa, perpolita & ossi valde connexa. Hic denique meatus in principio & fine, quasi circum habet, quorum exterior asper est [tab. 24. f. 2. b.] propter cartilaginem auris, quæ ei adnascitur: interiori vero membranula tympani adnectitur [tab. 24. f. 2. c.] Usus huius meatus primarius, ut per eum aer per sonum alteratus, ad aurem delatus, in ejus concavum à parte posteriore antrorsum oblique ad tympani membranam deferatur; cum per canales angustos, concavos, lævigatos & duros soni non solum facile, sed etiam exquisitè ferantur. Hoc patebit ei, qui tubulum, quo ad aquæ ductus vimur, ad alterum orificium digito percusserit, ita leviter, ut etiam adstans non exaudiat, alius vero alteri orificio aurem admoveat, optime percipiet: quia in tubo tanquam loco angusto, aere densato, sonus quoque unitur & exacuitur. Secundario quoque Natura hoc meatu utitur, ad bilis cerebri (rarius pituitæ, cum crassior sit) expurgationem, quæ per venas ad membranulam tympani pertingit, & per eam in auris meatum transludat. In hoc meatu musculus reperitur, de quo infra.

¶ Nam si aer percussus transierit per locum amplum, diffunditur, dissipatur, & de vi sua multum amittit: at per angustum transiens, in unum colligitur,

& ex illa collectione majorem vim acquirit, Volcher. Idem vult & Aquapendens. Quibusdam huius meatus angustia ad soni intensiorem, & exactiorem ejus delationem facere videtur, at contrarium est, nam licet fistularum angustia exacuat, & intendat sonum, qui in ipsis primus excitatur, attamen, qui à foris per ipsas fertur, non exacuitur, sed labefactatur, & debilitatur, Placentinus. t. Temporum 4. & auditus 2. Plat. u. Si modo hic elabatur, Plat.

Foramen alterum, quod pro temporum quarto recensuimus [tab. 3. f. 9. V.] hoc anterius juxta sphænoideis ossis primum situm est, & priori longe angustius: obliquum est, breve & geminum: venæ jugularis solum intro mittit, & nonnunquam nervi auditorii ramulum emittit.

De Canali, qui ex aure in os fertur.

CAPUT XLIX.

Aristoteles I. hist. anim. II. & in problematibus.

a Hic meatus earverne ossis lapidei alter est, inventu facilis, à ceteris tamen aut plane contemnitur, aut negligenter præmittitur, Eustach foramen temporum 4. Col. 1. Fallop. temporum 5. & auditus 3. Plat. canaliculus ab aure ad palatum, Laur. tertius auctus organi auditus, Placent.

Ossis petrosi foramen externum tertium, ^a quod temporum quintum esse superius diximus [tab. 3. f. 9. d.] inter processum mamillarem & appendicem styloideum situm est, & desinit in meatum, seu canalem, qui ab aure in os fertur, cujus Aristoteles meminit: primus autem Eustachius, & post eum Volcherus, eleganter descripsit. Hic ductus seu meatus canaliculo rotundo persimilis est, & calami tenuioris instar in principio amplus, qui oblique ad capitis basis latus anterius interiusque procedens in foraminum quatuor medio, totum os penetrat, & perfodit (sunt autem foramina quatuor, primum sede posteriore, ubi arteria carotis calvariam ingreditur; secundum est anteriori sede, per quod quartum par nervorum vulgo dictum, cranio excidit: tertium, ad extremum latus, arteriæ in cerebri meningem crassam distribuendæ aditum patefaciens; quartum ad latus internum, fissura, quæ à sphænoide & petrosi ossis partibus extremis, oblique infra & ante ductis, sit) quo cum pervenit, substantia partim cartilaginea, partim membranosa adaugetur; nam ad fissuram, quæ ossi sphænoidei

noidi & temporum communis est, substantia est cartilaginea & admodum crassa: parte vero opposita exacta cartilago non est, sed veluti membranosa, tenuiorque reddita. Canalis hic, alterius generis substantia auctus, inter duos faucium, seu gulæ musculos secundum prædictæ fissuræ ductum procedens, juxta apophysis pterygoeidis radicem, & quidem parte interna, in narium cavitatem alteram terminatur, & in palati tunicam crassam prope radicem uvulæ inferitur. At hujus meatus extremitas interna, qua narium cavitatem mediam respicit, cartilago robusta est, plurimum extuberans, & narium tunica mucosa obducta, & meatus fini, quasi janitor præfecta esse videtur. Figura teres non est, sed aliquantulum depressa, angulos duos efficiens; cavitatem latitudine calamus, quo scribimus, fere adæquat, ita tamen, ut in fine duplo latior sit, quam in principio, & similiter tunica mucosa, sed tenui induitur. Cartilaginosis fuit, quo semper pateret via, & ne duritie sua partes vicinas læderet, sed facile absque fracturæ periculo cederet; dein tunica mucosa^b valvulæ instar obductus, ne semper hic meatus in ore patente sit orificio, sed pro necessitate pateat, alias quasi concidat, ne facile mali vapores ex ore in aures transcant. Desinit autem utrinque in terminum, qui narium, palato, & huic canali communis est, quo hoc modo excrementorum cerebri commodum receptaculum sit; & quo meatus hic pro necessitate aperitur, desinit utrinque, ubi unus faucium musculus consistit; quare dum fauces dilatantur, sive aperiuntur ab his musculis ad deglutitionem, etiam meatus hic reseratur.

Uti hujus præcipuus, expurgationi inservire, & ab aure in os excrementa à capite delabentia deducere, & aerem implantatum expurgare; plurima enim excrementa hic colligi necesse est, cum cerebrum excrementis abundans impositum sit: & ex his, quæ foris in aure per transudationem congregantur, ad aures multa excrementa ferri colligere possumus. Si enim tot sunt ea, quæ per densam membranam transsulant, quæ tenuissima fuerunt, quanto plura erunt, quæ intus latitant, quæ præ crassitie transsudare non potuerunt. Quare testatur Aquapendens se sæpius, at præsertim in pueris, cavitates internas crasso humore, veluti muco, & quidem multo, repletas competisse, qui per hunc canalem expurgari debet: vel si intus subsistat, vel aurem penitus obturat, vel à calore innato resolvitur, inflatus convertitur, unde tinnitus aurium, susurrus, auditus depravatio & amissio, nisi per canalem hunc expurgetur, quem tamè symptomaticè expurgari, curatio docet, quâdo masticatoriis utimur. Hinc Medicos notare convenit in aurium affectibus internis, masticatoria^d præstantissima esse, cum ab auribus non angustis foraminibus, sed amplissima via, materiæ etiam crassæ, vel à Natura expelli, vel medicamenti masticatorum ope, commode expurgari possint: & sic meatus sicillimus ad soni exceptionem conservatur, cum sicca^e ad sonum recipiendum aptissima sint.

Alter usus ad aeris congeniti primum expurgationem, quo clarus, siccus ac tenuis sit: nam & meatus & aer congenitus necessario sicca conservari debent. Dein ad ejusdem^f refectionem & absumpti restaurationem, novus per hunc meatum ex ore superpedi-

^b Ductus hic cartilagineus est, & quandam habet pelliculam valvulæ instar, ut ab aure in os recrementis expurgandis pateat auditus, non autem recurrat in aures eadem illuvies, Laur. c Eustachius hunc usum solum tribuit, & masticatoriis usum probat: primus usus, Volchero.

^d Tertia utilitas, Placent.

^e Hipp. 2. aph. 17. Ventus Aquilo si ve aquilonarius constitutio, propterea quod sicca est, & humiditates corporis consumit, ideo corpora bene mobilia, & melius audientia facit: austrina contra auditum obrundit.

^f Primus usus ac præcipuus, Plac. alter usus, Aquap. ad aeris vernaculi expurgationem natura construxit.

pedietur; nam cum is à calore interno perpetuo absumatur, per alterius novi regenerationem conservari debuit: ab aere autem externo hoc fit, quia congenitus ab exteriori primo constitutus fuit. At aërem ex ore in aures pervenire, & Aristoteles & experientia docet, quod inter oscitandum fit (cum ore valde patulo fiat) cuius indicium, quod in auribus strepitus excitetur; sic dum nares emungimus, dum spiritum vi cohibemus, aërem aures ingredi semper percipimus, sed cum quadam aeris implantati perturbatione, quia pulsu intro fertur; quando vero ultro & vi sua in aurem se infinat pro refectione, tum aer motu placido ingreditur & communicatur, & à nobis non percipitur; & cum per longum ductum feratur, ideo nullo modo ipsum offendit, sed nutrit & reficit. Hunc forte ob meatum, Alcmeon, cuius Aristoteles meminit, arbitratus est capras, non modo ore ac naribus, verum etiam auribus spirare.

*h. Secundus
usus, Placent.
quartus, A-
quapen.*

Tertius^h usus, ut si forte sonus per meatum auditorium ad nervum recte devchi non possit, os ingressus per hanc viam aliquo modo aurium intima petat, & ita surdastis subveniatur, quos hiant ore voces & sonos excipere videmus: & hoc musicis instrumentis probatur: nam si aure utraque obturata, baculo dentibus apprehenso ea contingas, exquisitius pulsari audes: sic cupienti scire noctu, an aliquis adveniat, si baculi aut ensis alterum extremum terræ affigat, alterum vero dentibus apprehendat, è longinquo magis audiet, præsertim si via saxosa sit.

*à Tertius usus,
Volch. & A.
quap. meminit
& Laur.*

Quartusⁱ usus, ut in vehementissimo strepitu, ut bombardarum, tonitru, aliove impetuoso sono, membranula non rumpatur; quod fieret, si aeri congenito nullus pateret exitus, qui commotus membranulam extra, aer vero externus eam intro pelleret: at cum aer congenitus exitum habeat; membranæ cedendi locum concedit. Hic meatus facile reperitur, si in exsiccatis calvariis seta porcina meatui auditorio induatur, ea ad palati seu faucium regionem exibat: in recenti vero capite, hujus foramina ad palatum conspiciuntur.

Altera hujus processus lapidosi pars & superficies exterior extra cranium consistens, tuberibus, sinubus, porositatibus & lineis exasperatur, & inæqualis redditur, ita, ut veteres recte rupi præruptæ assimilarint; cuius inæqualitatis usus est, ut muscoli rectius pronascentur, vel inserantur.

*k. Usitate os ca-
laminum, os
styloide, os sagi-
tale, os clava-
le os arcuale
& calcar ca-
pitis, Volcher.*

Donatur quoque processu & appendice: processu quidem crassiore, qui cum papillis mammarum similis sit, *μασταιδης*, mammillaris dicitur [tab. 3. fig. 8. M. f. 9. K.] qui in infantibus nondum adest, sed postmodum exoritur. Appendice vero tenui, oblonga, acuta, quæ à columnæ rectitudine *στυλοειδης*,^k styloides, & *πληκτεον* à calcaris effigie dicitur [tab. 3. f. 9. 11.] quæ in nuper natis cartilaginea est, & ubi ossa augescunt, & cartilagine exsiccantur, ossea fit, plerumque tamen vestigio cartilaginis, quemadmodum in appendicibus fieri solet, remanente. Sed de his plenius in historia ossium capitis. Et hæc est superficies externa processus petrosi, tam intra, quam extra calvariam existentis.

Intrinscus vero hoc os petrosum solidum non est, ne pondere nimium gravet, sed totum cavernis, ductibus & foraminibus innumeris, & pene infinitis pertusum est [tab. 24. f. 2. a. g. 3. 2. m. n. E. i.] & majori ex parte spongiosum, quo in iis aer implantatus elaboretur & excoquatur. At in media sede cavitates tres insigniores auditus gra-

tia

tia efformatae notantur: at laminae eas efformantes, et si tenuissimae sint ad ossis levitatem, densissimae tamen existunt. Verum, cum meatum auditorium & cavitatem primam, membrana tympani distinguat, de hac primo dicendum erit.

De Membranula Conchae, seu tympani.

CAPUT L.

De hac egit Hippoc. lib. de carnibus δέπμα vocans. Aristot. 2. de anima textu 83. μάλινγξ: vide & 5. gen. an. 2. Galen. 8. us. par. 6. secundo de ea verba fecit, modo συνέπωμα, operimentum, modo συνέπωμα, tegumentum nervi auditus nominans.

Membranula^a conchae seu tympani, cujus Hippocr. b primus δέματ^c πένες τῆ^d αὐγῆς, pellicula in meatu auditorio, nomine meminit. Aristoteli^e μάλινγξ, nonnullis membrana simpliciter: d Galeno^e συνέπωμα, operimentum & συνέπωμα tegumentum dicitur: aliis tympanum, vel quod cavitati primae obtendatur, eo modo quo membrana tympano bellico: vel quia, veluti membrana bellici tympani ligno, ita haec aere sonora fiat: rectius tympani membranula vocabitur, eo quod, cum tensa sit, & aer externus cum sonis ad eam appellit, membranulae tympani bellici modo sonora sit [tab. 2.4. fig. 3. & 4. p. tab. 26. d.] Sitae est finiet meatum auditorium, cujus finis intrinsecus apposita est & cavitatem primam, quam tympanum vocamus; quae in anteriore & superiore regionem inclinans oblique extenditur, non secus^h ac si callum scriptorium, ea parte, qua dera^{us} est & attemperatus, tensa membrana obducamus: ratio sitis, quo cavitatem primam recta magis respiciat, quae meatu auditorio elatior est; dein, ne aer impetuofus, aut aqua, aut quid aliud meatum ingressurum, quid auditui noxia recta membranulam petat & laedit. Haec in viventibus patulas aures habentibus, vel in Sole, vel candela apposita extrinsecus conspici potest.

Figura est orbiculari [tab. 2.4. fig. 6. x. l. tab. 26. d.] quae in medio aliquantulum intro curvatur, eo modo quo folium cotyledonis seu umbilici Veneris, quo sonum extrinsecus advenientem suscipiat, quia a concavis sonus plenius ac perfectius excipitur.

Substantia ex ipsius ortuⁱ colligi potest, de quo controvertitur. Aliis a perioftio

H h h

offis

Ex recentioribus Anatomicis quidam praclarissimi viri contendunt, a Galeno nullam factam mentionem, quin imo negatam: cum tamen Galeno cognita fuerit (8. us. par. 6. & 11. ejusdem 12.) & non semel ejus meminerit, Plac.

b De caribus τὸ δέματ^c πένες τῆ^d αὐγῆς τὸ συνέπωμα, δὲ πένες τῆ^e αὐγῆς τὸ συνέπωμα, ἐν τῇ αὐτῇ δέματ^f πένες τῆ^g αὐγῆς τὸ συνέπωμα, c 8. us. par. 6. f Membrana cavitatis sedem succingens, qui duarum meminit, alterius, cui incisus exterius erus innascitur: alterius membranula tenuissima, & prorsus pellucida, cui malleus transversim innascitur, eo modo, quo in tympani fidem unam atque alteram crassiores membranae obtendi conspiciamus, haec Vesal. In imo anfractu membrana, μάλινγξ vocata, Benedic. in media fere sinus regione membrana, qua ibi obducitur, & carvenerulas in eo sinu existentes implet, cui malleus & incus adheret, Columb. Membranulae tympani, quae myringa auris Barbaris, Fallop. myrinx, Volcher. Tympanum, Arantio, Plat. Varol. Lant. tympanum, myrinx, myringa & membrana, Plac. g Non transversim, Fallop Volcher. Plat. h Fallop. observ. Volcher. eo modo obtegit foramen cavitatis, quod aurem spectat, quo vas fundo obturatur, Vesal. i Panniculus subribis contextus ex villis nervorum auditus, Mund. secundum aliquos a nervo, secundum alios a pia matre, quae cum nervo

nervo in cavitatem tranſit, Carpus, membrana ſubtilis dura, ad quam tranſit nervus, Maſſa: hæc membrana à cerebro eſt, cujus connexione lingua annectitur, quare verba ediscuntur, quæ prius audiuntur, deinde ore pronunciantur: qualis enim motus per ſenſorium ſubierit, talis ab una & eadem effigie motus per vocem agitur, vel quod aud. erit, idem referas, Alexand. Bened. à dura meningis portione ortum ducit, cujus naturam omnino refert, Laur. à per. ſtiti, quod ſub cute meatum auditorium inveſtit, Volch. membrana producitur à tenui meninge nervos auditivos involvente, illic amplificata, & veluti vſculam conſtituente, quæ audiendi instrumentum, corpus æreum comprehendit & amplexatur, & mox, ait, unum anfractum craſſior meninx ſuccingit & obducit: nervus autem auditorius in eam membranam ſuſus explicatur, quæ foramini eſt obſecta, quæ concluſum tenet æreum corpus &c. Piccolhom. Semini ejus originem acceptam ferre rationi minime diſſentaneum, Aquapen. à Pericranio, nam cum ſicciſſima ſit, quomodo à cerebro humidiſſimo produceretur: nec ab ejus involucri, quia meninges ſemper actu ſunt humide, ad ſonum efficiendum vel recipiendum ineptiſſima: nec à nervulis, cum nervuli molliores ſint, quam ut ex iis membrana ſicciſſ. generatio fiat; adde, quod ſubſtantia cerebri plurimum habet, nihil autem tympanum habere conſtat, Plac. à tenui meninge oriri credere, quod falſum eſt; quare ut informatione mollius principium haberet, unde texeretur, Natura cartilaginem inter oſtemporum, & annulum oſſeum in infantibus interpoſuit, Fallop. obſerv. membrana myrinx mollius ex cartilagine & oſſe adipeſcitur principium, Volch. expansi nervi ſpeciem refert, Arant. membranam hanc viridem eſſe ſenſit Parvius.

oſſis ſubjecti, aliis ex craſſa, aliis ex tenui meninge, aliis à quinti paris nervorum ramo produci ſtatuentibus. Sane cum hanc membranulam ſubſtantiaæ proprietate à cæteris membranis diverſam animadverteremus, eam ex ſemine in prima conformatione generari cenſuimus; quo modo cryſtallini humoris membranam, à ſemine ortum duxiſſe ſupra monuimus: niſi lubeat, eam à perjoſtio producere. Nam ſi infantis caput inſpicias, hanc membranulam cum perjoſtio [tabul. 26. k k.] quæ oſſis squammoſum & vicina obducit, coherere videbis, & ad meatum auditorium perioſtium dilatatum, ubi parvus proceſſus oblique rotundus ex oſſe petroſo erumpit, calamo ſcriptorio, cui prima obliqua inciſio facta eſt, ſimilis: qui proceſſus factus eſt, quo membranula cum oſſe petroſo connectatur.

^k Circulus oſſeus linea modo in cavitate extuberans, Voſſal. proceſſus parvus leviter excavatus duc habens margines oſſeos eminentes, Volch. circumſerentia eminentior oſſis temporum, Arant.

Annulus ^k vel circulus oſſeus, hic proceſſus dicitur [tab. 24. fig. 3. * tab. 26. e.] ex cuius circumſerentia meatus auditorius educitur: duplici eſt principio [tab. 26. n.] & quidem inferiore tuberculum referente, quæ ex oſſe ſquammoſo enaſcitur, & cavitationis primæ oſtiolo parum oblique introcedens, apponitur: hic intrinſecus ſulcum orbiculatim impreſſum habet, ſeu in medio circumcirca leviter excavatus eſt, marginibus oſſeis utrinque eminentibus: quo membranula huic ſulco ſecundum circumſerentiam firmiſſime attendatur & innascat, ne violentis motibus agitata lædatur, & quidem vel ab aeris externi introrſum, vel aeris interni extrorſum impulſu, ut oſcillatione, ſpiritus cohibitione magna & narium emunctione: quare membranulae tympani ſubjicitur [tab. 24. f. 3. 4. q. tab. 26. d.] quemadmodum etiam in militari tympano, circulum, ut ejus membranam tendat, ſubjici videmus. Et hic in infantibus ab oſſe temporum ſeparatu facilis eſt: in adultioribus ab una parte cum oſſe petroſo, ab altera cum meatu auditorio artiſſime coit, ita ut ſeparata aliquando fuiſſe neget (ſulco tamen remanente) & ab eo integer ſeparari non poteſt, & ſic membranula tympani in circuitu à pericranio ſecerni videtur.

Quare Galen. inquirens ſubſtantiam hujus membranulae, comparatione facta inter tegumentum nervorum opticorum, & auditoriorum primo; dein ipſius oſſis tactus; oſtendit nervos nudos penitus non fuiſſe relinquendos, ne omnibus iniuriis externis expoſiti ſint: quare operimento indigebant, aut craſſo & denſo, ut oculi: aut admodum

dum raro & poroso, aut denique mediocri: sed densum & crassum fieri non debuit, quia impedivisset, quo minus aer motus accederet; præsertim, si parvus esset motus, qualis vocibus exiguis inest. Nec ratum ac tenue faciendum erat, ut aeri esset pervium ac penetrabile: sic enim & nervi facile laderentur, & cerebrum ipsum refrigeraretur. Quare Natura munimentum construxit, ut instrumenti securitatem adjuvaret, quod mediocre habet consistentiam. Sic ergo concludit: Quod cum Natura prospexisset, constructionem cum forti propugnaculo ad patiendi difficultatem fore quidem accommodum, at sensorium ipsum surdum effecturam: si vero constructio nullum haberet munimentum, eam iniuriis aptissimam futuram: tertium autem, si modo mediocre aliquod ad securitatem adepta esset amplius adjumentum satis ipsam habituram; hæc Galenus. Idem de olfactus operimento agens, inquit, requiri se præcipue, quod rarius sit ipso auditus operimento, quod densius est, cum crassius sit objectum, quod olfactui subijcitur vaporosa substantia odores deferens: tenuius objectum auditus, quod est aer sono informatus. Hæc probant, Galeno hanc membranam cognitam fuisse, & pro Galeni defensione adducta fuere.

Est ergo hujus membranæ substantia tenuis, densa, sicca, pellucida & sensus exquisiti: tenuis, ita ut aranearum telæ Hippocrates assimilarit, ut sonum in subtilem transmittere possit, cum necesse sit, sonum cum cum aere ingenito communicari (licet aeris externi substantia cum interni aeris communicari nequeat) & pulsationem ad auditum necessariam perferre. Quare ossea esse non debuit, alias surdum sensorium foret. Sic enim congenitus aer, aeris externi alterationem & sonum non admitteret: quod si os admodum attenuatum foret, ad aeris violenti incursum frangeretur. Nec carneum esse debuit, quia laxum excipiens ad sonum transmittendum ineptum foret, & quia molle, & multa humiditate imbutum, multa admitteret, quæ membranosa substantia propulsare potest. Quare septum hoc membraneum est, & quidem tenue. Nam si membrana hæc à prima conformatione crassior & densior produceretur, surditatem in incurabilem profert. Sic videmus interdum ante membranam hanc exterius tunicam quandam crassiorem præter naturam adnasci, quæ cuius Aegineta p meminit; qui etiam curandi modum docet, & cum adest, præsertim à nativitate surdos faciunt, & consequenter muti sæpe à nativitate fiunt; quod ignotas inauditasque voces, nec animo concipere, nec voce pronunciare sciunt: & quemadmodum hæc exterius apposita auditum tollit, ita quoque fit, si eidem interius mucus opponatur, vel humoris affluxu perfundatur, gravis ac difficilis auditus sequitur & surditas curatu difficilis; si vero tenui humore mædeat, aurium tinnitus, sibilationes & murmura afferre solet.

Densa quoque est, nullis poris conspicuis, & nervosa & robusta, quo injuriis externis resistat, aeris violento incursum propellat. Siccissima est, ut sonos prompte excipiendo, rectius perfonet: Soni enim simulacrum sine materia in hac membrana recipi, eo modo, quo colorum imagines in cornea suscipiuntur, suspicamus.

Hhh 2

Siccif.

zur, omnia perreptat, penetrat, & translapsus undique audiri potest, quia mentus aliqua in parte invenis.
o Arantius, Laur. p Lib. 2. cap. 23. Aquapendens affirmat se bis observasse.
q Corpus nervosum est mediocri densitate præditum, non pervium, sed summa sua tenuitate, & siccitate ratione transsonorum est, Placent.

l Judicium exquisitum differentiarum soni, tum odoris in sinceritate sensorii, summaque membrana positum esse, dicit Arist. 5 gen. an. 2. m Sonum, aeremque subtilem, Volch.

n Soni murum etiam transire possunt. At Arist. 11. prob. 49. querit quare lux, quæ tenuior est, velocior & deductior corpora densa & solida penetrare non possit. R. quod lux directo itinere feratur, itaque si quid rectius exponatur, lucis progressus impeditur: at stratus quia spiritus est, quo quo versus se

Siccissima enim ad sonum concipiendum maxime facere dixit Hippocrates, & cum plurimum resonat, tum maxime auditur; quod etiam experientia in bracteis ex orichalco tenuissimis, densissimis & siccissimis commonstrat. Est quoque pellucida instar cuiusdam speculi perpolita, intus forisque laevigata, nisi quod interius malleoli processus superne ad ipsius medium, quemadmodum nervus tympano militari transversim attenditur.

Septum caritatem primam à secunda discernit vice discriminans, Laur.

Ufus membranulae meatum auditorium in orbem claudere, & instar septi (hinc quibusdam septum membraneum & mediastinum) à cavitate prima distinguere, partes externas ab internis dirimere: potissimum vero aerem congenitum, cuius munus est sonos excipere, ab aere externo separare, ne ob permutationem & confusionem cum externo conturbetur, & aere nebuloso vel fumoso, crassior & caliginosior reddatur, & sic ad auditum ineptior fiat, quamvis & hoc septo cohibeatur, ne sponte diffusetur, aut vehementibus fragoribus dissipetur: neve aer externus frigidior & calidior influens, nervos & cerebrum offendant: dein partes internas ab externis injuriis tueri, ut si forte sub aqua simus, aqua non influat, vel animalcula minima, vel pulveres ad interiora non irrepant, & sic auditum corrumpant. At ne ab assiduis his incurfionibus & violenti aeris impulsu, & ob sui tenuitatem membranula periclitetur, sensoriique facultas tollatur, Natura adhuc tutelae causa, interne ossicula tria chordam & musculos duos addidit (de quibus nunc sermo erit) quorum beneficio aeris fluctuantis impetum probe sustineat.

De ossiculis organi auditus, & de Chordae.

CAPUT LI.

An de his Galenus egerit in libro de motibus obscuris, qui perijt? & utrum in sine lib. de ossibus haec innuit, dum quadam ossicula se consulto pratermisit dicit à forte quod eorum usum non assequeretur, cum & recentiorum aliqui horum usus & officia incerta conjectura nos assequi asserant; imo inter se de eorum usu discrepent.

a Galeno incognita, & à recentioribus inventa esse; recentiores omnes statuunt: inter hos Placentinus asserit, Galenum auditus organum solum in simis, qua ossiculis his ca-

Auditus organi ossicula tria ante seculum incognita fuisse videntur, & à posterioris primum inventa: duorum, in eudis & malleoli inventio Anatomies restauratori Ioh. Carpi Bononiensi debetur, tertii vero inventorem se esse Iohan. Philippum Ingrassias asserit: Columbus vero sibi, & Eustachius sibi quoque inventionem adscribit, sed ad rem.

Sita:

rent, perlustrasse: Quare Carpo duorum inventionem tribuunt: Cuius haec sunt in sua Isagoge: Panniculo intra cavitatem adjacent duo ossicula parva apta moveri ab aere ibidem proximo moto, qua in suo motu se invicem percutiunt: à quibus secundum aliquos causantur omnes species soni plus & minus secundum aerem extrinsecus motum: haec Carpius, nec plura habet. At Massa haec: supra membranam intus sunt duo ossicula ad modum malleolorum tympani, & ideo malleolos vocant, & sunt mobilia, & adherentia, & moventur ad motum membranae: Sylvius haec: Ossicula duo meatui auditorio harentia, sed mobilia, & membranam tenuem, densam, ceu tympanum percutientia ad sonum & auditum facere putantur, Nicolao Massa Veneto. Vesal. in suo opere incudem & malleum nominat, sed inventoris non meminit, at in examine Obs. Fallopii à Fallopio monitus & stapedis mentionem facit, Ingrassia inventionem tribuens. Col. ait.

ait, Carpum duos primum, se verum tertium stapeda invenisse. Joh. Philip. Ingrassias, anno 1546. Neapoli tertium ossiculum non invenimus, sed reperimus, quia minime quarebamus, & Stapha nomen imp sumus, &c. Fallo. in obser. duo primum in lucem produxit Jac. Carpenis primus quoque procul omni dubio Anatomica artis restaurator: sed Vesalius primus malleolum, & incudem à similitudine appellavit: tertium Ingrassias invenit, quod ego anno 1548. Pisti ostendi: hæc Fallop. At Eustachius, posteriores duo parva ossicula in lapidei ossi caverna se reperisse protestantur, quorum alterum quadrata incudi, aut molari denti appositissime, alterum malleo aut femori, sed parum apte comparantur, quod duo, quantum scio, primi indicaverunt Alexander Achillinus, Bononiensis Philosophus, & Jacobus Carpenis Chirurgus &c. neuser tamen inventionis palmam sibi vendicat: tertium ego primus novi: Volcher. tria ossicula præcis incognita, duo à Jac. Carpeni, unum ab Ingrassia inventum. Piccolhom. veteribus penitus incognita: junioribus aliis unum, aliis duo, aliis tria innotuerunt. Plat. Varolio, tria ossicula.

Sita sunt hæc ossicula in cavitate prima, quam tympanum, ab usu, vocabimus, quæ in processu ossis diversa figura prædita, & à rerum externarum similitudine nomina consecuta sunt, sis temporum

Malleus, Incus & Stapes nominantur [tab. 24. f. 6. 7. & 8.]

Malleus [tab. 24. f. 4. r. f. 5. c. f. 8. q. tab. 26. c. l.] in primæ cavitationis principio [tabul. 24. f. 2. juxta c.] ad meatus auditorii finem situs est: quod ossiculum malleo non tam simile, quæ caverna instar

gura quam quod instar mallei incudi incumbat, simile, alii ossi femoris, & affimilabranâ investit, quo sinu cavernula, quas mē-

runt; ei nimirum parti, cui femoris inferiora capita resecta sunt, & pars inferior excujus prope media regione affimilabranâ investit, quas mē-

quirit exacuta: incuvum est longiusculum, quod capitulum, cervicem & caudamstant ossicula

habet. Capitulum sive tuberculum, pars est superior crassiuscula, extuberans & obfuit membranâ

longa: capitulum enim hoc perfecte rotundum non est, cum summmitati ejus externæadnexa, Columb. in extre-

finulus oblongus insculptus sit, quo Incudis capitulum suscipiat, eique committatur: lumb. in extre-

& hoc sursum anteriora versus ad meatus auditorii latus tollit. Cervice est angusta, rioris concha

quæ parte posteriore processus duos exiguos, tenues & acutos emittit, quorum elarione sita

tion ligamentum seu chorda adheret: humiliori vero membranulæ incumbit, ne sunt, Plac.

plus iusto intro pellatur & frangatur; cujus idem usus videtur, qui funiculorum, quosc Incus à figura; malleus ab

inferiori tympani bellici membranæ, ars Naturæ æmula, prætereendere consuevit, ne usu & forma,

scilicet interiore in tympano inclusi, & toties percussi aeris impetu divelleretur. Inter stapes à forma;

hos finulus est, & ex opposito tuberculum, cui muscoli tendo alter, alter vero cervici Volchero: à forma; potius quâ

implantatur. ab officio & usu nomina sortuntur, Laur.

Hhh 3

Cauda

Ab usu potius, quam à forma diei existimant, quod dum membrana movetur, & malleus moveatur: vel quod instar mallei fabrilis membranam percutiat, Volcherus. e Quemadmodum femur juxta cervicem duos afficiit processus, sic & hoc ossiculum eadem sede processulos sibi vendicat, quo membranula sua firmitus innascat: Deinde, ut femoris cervix oblique ad coxendicis sinum vergens in caput rotundum cessat: sic hoc à membrana introsum vadens in rotundum caput, læve, minime asperum desinens, alterius ossis superiori parti membrana interventus committitur: ac si malleus incudi laxè alligaretur: hæc Vesalius, qui pro secundo recensuit. Idem ferre habet Volcherus. Contra Eustachius & Placentinus, femori comparantur parum apte, cum extremâ pars femoris duabus apophysibus terminetur, ejusque caput superius & collum, pro sua magnitudine parvum est, sed ossiculi finis tenuius & acutius, caput vero ita magnum, ut potior ipsius pars & crassior putanda sit. Quare Columbus sic: primum femoris figura simillimum, parte inferna mucronis ritu in acutum tendit, parte altera capite est oblongo & rotundo: duobus donatur processibus, similibus iis, quos rotatores in femore vocamus: parte acuta ac tenui membranula inseritur, quæ intenditur ipsi, ac illi, quod succedit, ad quam pariter extenditur & adheret, veluti ad eam stratum, parte altera crassiore & capite insignita, membranam tympani modo quatit: quare ab usu potius, quam à forma malleum dicere, quemadmodum alterum incudi simili volvere, quod illius mallei percussio excipiat.

f Cauda vel pe-
diculus, Fall.
processus, can-
da, pediculus
Volcher. proces-
sus velut can-
da reflexa, A-
rant. processum
Et tuber mal-
leolo tribuit,
Laur.
g In acutum
illius proces-
sum nervulus
desinit à quin-
to pari, à quo
item nervu-
lus tortuosus in
labyrinthum
inseritur, Co-
lumb.
h Alterum of-
ficulum (id est
malleus) alteri
membrana in-
nascitur, secun-
dum longi-
tudinem longo
Et tenui processu,
Vesalius.
i Eulerum chor-
da, ne in per-
cussione à suo
loco dimoveat-
ur, Volcherus.
k Volcherus.
l Articuli spe-
cie, qua lubri-
cis Et levibus
superficiebus
fit, Volch. Et
Plat. per gin-
gymum, Pla-
cent.
m Non enim in-
vitus, quemad-
modum in mor-
tuis coherere

suspicamur, Arant. utriusque ossis conjunctio valde adstricta, Aquapend. m Minus incude, Aquapend. longius,
Plat. n Sic primus Vesal nominavit, Et primo loco recensuit, à ceteris secundo loco, Et Col. incus: Fall. incus vel
dens: incus Et molaris dens, Arant. Plac. ceteris incus. o Sic Et Volcher. p Columbus Et Piccolh. q Incus parte po-
steriore crassiusculam planam incudis partem refert, Et in duos acutos processus instar crurum desinit: quorum alterum in
teritum officulum immititur, Et in membranula assidue detinetur, Columb. r Vesal. Col. aptissime ait, Eustach. Vol-
cher. Plat. Aquapend.

Cauda vero^f sive pediculus tenuis est, in summo latiusculus, qui etiam in apophy-
sin exiguam definit, qui musculi insertionem seu tendinem excipit: mox versus po-
steriora & inferiora delatus sensim in processum tenuem & acutum, & nonnihil
asperiusculum instar caudæ reflexæ, imo in apicem incurvum quasi uncum finit, quo
membranulæ^h tympani, non extremitate sua, sed secundum sui longitudinem ultra
mediam membranæ latitudinem quam pertinacissime adhæret] *tab. 24. fig. 4. r. ad p.*
partim, quo ipsum contra impetum internum tueatur, ne ultra præfinitum termi-
numⁱ extra pulsum laceretur (ad quod etiam chorda, de qua infra, non parum con-
fert) partim, quo eam deorsum & intro trahendo, cum suo unco ad interiora reclinet,
sicque membranulam interiorem convexam, exterius concavam reddit, & in tali
figura conservat, quo aer externus meatum auditorium ingressus, ad membranulæ
centrum, ubi malleus appendet, à membranæ lateribus ad centrum perveniat, & ad
soni interiorem communicationem uniatur, & intendatur.

Verum, quemadmodum membranulæ [*tab. 24. f. 6. n.*] suo processu inferiore, &
pediculi latere inferiore, & meatus auditorii orbitæ, beneficio ligamenti (quod trans-
versim ab uno meatus tuberculo in alterius lateris tuberculum fertur) adnascitur, ita
ut à membrana^k nullibi solutus sit, imo valide compactus: sic capitulo sui Incudi, cui
incumbit per eam articulationis speciem, quæ ginglymos dicitur, cartilagine illita ar-
ticulatur [*tab. 24. f. 6. 7. & 8.*] & cum in Malleo & Incude utrumque sit, & cavitatis &
caput, & malleus supra incudem movetur. At Malleus & Incus ita arcte mutuo arti-
culantur in mortuis, an vero in^l viventibus ambigitur, ita ut natura his tanquam uno
& continuo, & tanquam duobus seu interceptis utatur; duobus quidem, ad mem-
branæ tutelam; continuo vero, ad soni delationem: quare licet hæc articulatio per
gingymum fieri dicatur, cum se mutuo suscipiant & suscipiantur, propter tamen ad-
eo arctam copulationem potius per synarthrosin coarticulata dici deberent, ut non-
nulli volunt. Hoc Incude^m longius, sed tenuius est, quia supra Incudem moveri de-
buit, & id quod gestat, majus esse debet, eo quod gestatur: ambo tamen, ubi articu-
lantur, majora sunt, aliorum ossium more, cum crassiore parte mutuo se respiciant.

ⁿ Incus [*tab. 24. f. 4. fig. 5. 1. f. 7. & 8. 6. tab. 26. m.*] officulum secundum est, quod in
cavitatis primæ latere posteriore situm est, & malleo adjacet, cui opponitur, & par-
tem^o membranulæ à malleo non rectam integit; ita tamen, ut^o crassiore sui portio-
ne aurem spectet, crutibus tympanum: huic aliqui ab actione nomen tribui volunt,
eo quod incudis modo, malleoli permoti, p ac percipientis ictus excipiat: aliis à simi-
litudine, quam cum incude fabrilis habet, non cum majore, sed minore, qui partim
planus, partim rotundus effigi solet. Quare q cum planities non adsit, ut incudi
majori, sed ejus loco cavitatis in r qualis, cujusmodi in dentibus molaribus conspicitur,
denti molari, duas tantum radices, alteram longiorem ac tenuiorem, alteram crassio-
rem & breviorē habenti, rectius r comparatur, & à nonnullis Deus dicitur. Hoc bre-

brevius est & crassius ^(malleo), & capitulum, cruraque duo obtinet; nam superiore extremo crassius est, & extuberans & levi cavitate malleoli tuberculum excipit: ei enim ^(sinus) exsculptus, in cuius medio linea extuberat, quemadmodum in osse cubiti, ubi cum brachio articulatur; ut vere ginglymos hic sit, quo articulatio ad motum fiat. Et quemadmodum capitulo suo articulatur cum malleo, sic suis processibus adnascitur & meatus auditorii orbitæ & stapedis vertici. Alterum enim ejus extremum inferius & tenuius, duos exiguos tenues & acutos processus (quos crura vocant^u) invicem distantes emittit: altero elatiore, brevior, crassior, latiusculo, & nonnihil intorto, ossi temporum squamoso innititur, & ligamento transverso orbitæ, parieti ipsius tympani hæret, ea parte, qua Aquæ ductus labitur: hacque ratione malleo firmius necitur, ne in membranulæ vehementi percussione à se mutuo separentur. Longiore vero processu, graciliore, declivi, & nonnihil quoque intorto sursum ex membranula eminet, & stapedis vertici ligamentali nexu alligatur, & per arthrodiam affigitur, & partem eam membranulæ occupat, in qua malleus non est, quo ejus partis ^(b) pulsationem percipiat, & sonum stapedi communicet, unde per foramina ^(c) parva ad nervum auditorium deferatur.

Stapes ^(a) [tab. 2.4. f. 4. t. f. 8. T. tab. 26. f.] ossiculum tertium est, cui primi inventores à similitudine staphæ vel stapedis nomen imposuere: hoc in cavitatis ^(b) primæ parte, quasi media ad ipsius fenestram ovalem situm est, & in brutis trianguli, & Græcorum ^(c) Δ. figuram exprimit [tab. 2.4. figura 8. brutorum proponit] in homine vero ex duobus

(Incus malleo
duplo major,
Aquapen. cras-
sior & brevior,
Volch. brevior,
Plat.
Cavitas inae-
qualis, Aqua-
pend.
Fallop. Pla-
cen. Laur. cru-
ra duo tribuit.
Volch. præter
caput & crura
gemina, ad-
huc proces-
sum minorem
adscribit, pe-
dem vocatum,
cujus munus
chordam in sua
sede conserva-
re, ne ea sur-
sum tendat.
Membrana
magis, quam
x

exterioris crus innascitur, & extremo quasi in vinculum cessat, quo membrana implicetur, & firmius connectatur. Vesal. y Sic & Volcherus: usum incudis vult Varolius, ut stapeda in loco naturali firmiter maneat. Stapedis inventionem sic proposuit Ingrassias lib. de ossibus an. 1546. Neapoli tertium ossiculum non invenimus, sed reperimus, quia minime quærebamus: scalpro & malleo auris ossa percutientes, ut internas cavernulas, & in ipsis contentas substantias Scholaribus ostenderemus, ubi duo prima ossicula demonstraveram, tertium ossiculum, ne scio quomodo in tabula plana, casu potius inspicimus &c. Statim igitur boum diversa capita dissecare aggressi, invenimus: unde ad humani capitis dissectionem reversi, illud vel clausis oculis invenimus, & stapha primum nomen imposuimus; nonnulli tamen stapedum appellantes, inventoris tam rei, quam nominis titulum sibi vendicantes, &c. (intelligit Col-ligi Fallop.) id ossiculum novisse, Romæque non paucis ostendisse, atque in as incidendum curasse, &c. Latitat in cavernula quadam fere rotunda, intra sinum auditorium exsculpta, cavum & perforatum egregie & staphæ naturam imitatur, capitulum quoddam rotundum habet, quo ad incudis processum accedit, Columb. c Figura triangula stapha, seu stapeda, Eustach. delta Græca litera majuscula formam habet, unde os deltoides aliquando nominavimus, & stapham, cum qua majorem similitudinem habet, quam alia duo cum malleo & incude: nonnulli stapedem, alii stapedam Grammaticæ potius, quam Latine vocant. Verum non assimilavimus ferrea nostri temporis staphæ, in qua equorum sellæ insidentes pedes sistant, sed lingua cuidam staphæ, qua in Sicilia utimur, Vice regia quædam Pragmatica olim prohibuit ne ferreis utamur, quoties mulis, quæ stipendio quodam locari solent, superinsede-mus; triangulares enim absque ullo interim distincto foramine per quod coriarium lorum staphile à nostris vocatum transmittitur: sed per idem amplum foramen, ejusque superiorem angulum acutum cannabinos funes mularum do-mini traducunt. Quamquam & antiquissimas veterum stapedas ferreas, vel rubigine semierosas vidimus quin imo, & in veteribus picturis ejusdem formæ fuisse observavimus: hæc Ingrassias. Stapedis, aut staphæ nostrorum patrum, effigiem gestat, quia illarum Stapedes erant veluti triangulares orbes sine alio distincto foramine, quod postea nostris additum, ut lorum traduceretur, Fallop. observ. vide & Col. Stapedem vel Δ. Græcorum pulcre repræsentat; quemadmodum diligenter primus descripsi, Plat. Ossiculum triangulare inane, quod stapedam vocant, quod pupillam audi-tus (abusu) libenter appellarem, Varolius: Staphæ equestri simile est tertium, pluribus non describis Piccolhom.

Stape-

Stapedis vel trianguli imaginem refert, Arant. Stapedem antiquorum refert, triangularis est, figuram Δ. representans, Laurent. Tribus lateribus atque angulis tanquam triangulus. Aquapend. stapedem, & antiquitus fuisse, nimirum triangulari forma, sive foramine, per quod lorum, ut in nostris stapedibus transmittitur. Est enim triangulare, representans quodammodo Græcorum Δ. vel formam triangularem, qui annulis aliquot obfistis mendicum cantilenis apud multas nationes accommodatur, Volch. Stapedem non antiquorum sed nostrum refert: at in brutis antiquorum stapedi simile, neque ulla pacto triangulo, neque Græcorum Δ. assimile stapes, stassa & stapeda, Placenz.

bus duobus efformatum [fig. 7. ostendit] dici potest, altero superiore arcus instar convexo, cujus crura duo minutissima nonnihil sinuata, & angustiora reddita basi transversæ inferuntur: vertex ipsius acutus non est, sed capitulo minuto, plano & rotundo, quo incudis longiusculam apophysis arcus instar sustinet; vel si mavis huic apophysi ligamenti beneficio stapes^d appendet; crura vero exigua à se invicem parum recedentia, foramen^e longiusculum efformant: at basis, quæ altera ipsius pars est, transversa est, latiuscula, & in marginibus crassescens, ipsaque crura utrinque excedens, qua ossi ad fenestellam ovalem præponitur & articulatur, firmiterque membranulæ foramen illud claudenti apponitur, idque beneficio ligamenti à capitulo latere, quod cavitatem γλωκοειδὴν habet, exorto: & sic stapham seu stapedem equestrem exactissime refert. Hoc cæteris multo minus est: si enim majus esset & ponderosius, tum una cum duobus aliis motum, membranulam, deorsum traheret. In medio inane, seu stapedis modo pertusum est, quo levius sit, & quo aer innatus sese infundet & agitetur, quo sonum, quem ab incude communicatum exceperit, non solum ad cavitatis primæ profundum deferat, sed ulterius quoque alteri cavitati ad meliorem auditionem communicet, & per fenestellam^f ovalem ad labyrinthum deferat: quare sine stapede, soni delatio in totam cavitatem ferri non posset. Exempli gratia, quemadmodum species visibilis intra corneam recepta, prius pupillæ foramen angustum permeat, quam ad crystallinum perveniat: ita species soni membranulæ concavum ingressa, foramen exiguum velut per pupillam (unde stapes, pupilla auditus dicitur, Varolio) ad auditus organum præcipuum permeare debuit: quare per stapedis inane transit in cavitates ossi petroso insculptas ad aerem congenitum, qui crystallino comparari potest; ut quemadmodum crystallinus præcipuum visionis instrumentum ratione receptionis, sic & aer hic soni receptionis, non dijudicationis, existit.

Et ne ossicula hæc tria vacillando, membranulam, cui firmissime appensa sunt, nimium trahendo lædant, ligamento quodam tenuissimo, seu chorda ad stapedis verticem pertingente transversim à lateribus ossi alligatur. Imo inter se membranulis tenuissimis & mollibus, quæ ligamenti vicem gerunt, connectuntur, & quidem articulis duobus, qui in extremitate cartilagine^h ex modo, quo & reliqua ossa incrustantur, & sic ipsorum syntaxis, à natura cæterarum articulationum non discrepat.

Tria autemⁱ creata sunt ob motum & dearticulationem ad membranulæ custodiam, ne ab aeris motu aliquo violento frangatur: nam si unicum esset, vel membranula impulsæ, cum propter ossis rigiditatem & duritiem cedere non posset, rumpere-
tur; vel processus ossis fracturæ periculum subiret: quare tympani membranula mallei pediculo innititur, ne plus iusto intro pullum frangatur, & ipsi pediculus tenacissime

d Incus crure
longiore stape-
di obligatur:
stapes basi la-
tiuscula fene-
stra ovali im-
mersus summo
ossis acuto apice
incudis mini-
mum tubercu-
lum excipit,
Laur.

e Cæcumine
perforatum e-
gregio, Col. fo-
ramen triangu-
lare, Plat. fora-
men oblongum
Aquapend. fora-
men ovale, In-
grass. in medio
perforatum
multis forami-
nibus instar
spongia opple-
tum: in super-
ficie æquale &
planum: infe-
riore sede te-
nuius & aspe-
rum, Volch.

f Volch.
g Aquapend.
h Col. Fallop.
Volch. Plat. at
Aquapend. non
ut cætera ossa
ad articulatio-
nem molli car-
tilagine incrustatur.
i Ossicula in aliis animalibus tria exigua, in aliis duo, ut anser, malleus & stapes, in aliis ut se-
mita, nullum, Plac.

crissime adhaeret, ne nimium extrapellatur. At quo tutius utrique motui resistat
 (quod cum aliqua cessione tutius fit) non unum tantum, quo creatum, sed propter in-
 flexionem officula duo alia & musculi duo additi fuerunt, quod dum malleus cum mem-
 branula, vel intorsum vel extorsum pellitur, motum cohibeant: nam officulum
 hoc, malleo assimilatum ^k duplici motu, quasi fluxu & refluxu impellitur & recurrit:
 intorsum primum ad motum membranulae, cui connexum est: quae ab aeris in uen-
 tis impulsu agitata, intro & sursum pellitur, & intus gibba tantisper existit, donec aer
 congenitus à sonis & vocibus afficiatur, qui per cochleae ambitus & circumvolutio-
 nes & cuniculos oberrans efficit, ut à nervi quinti paris propaginibus sonorum spec-
 ies suscipiantur, ac temporis momento cerebro subministrentur. At ne membra-
 nula intorsum pellatur, malleus ei propugnaculo est: huius vero terminus est In-
 cudis sinulus, cui mallei capitulum ad articulationem quandam jungitur: quare incu-
 dis os stabile & firmum existens, membranula intro cessionem sinit, non aliter
 quam in horologiis ^l ferrea illa eminentia temporis mensura ne vterius circumvol-
 vatur, fines constituunt. Et sicut incus, malleo motum definens ei simulatur: quare
 duo crura obtinuit, quibus ossi petroso & stapedi firmatur, ita & stapes basi stabili pe-
 troso ossis cavitati prope cochleam insists, incudis alteram apophysin longiuscu-
 lam, suo vertice arcus in modum sinuato, eleganter sustinet. Motus vero alter, qui
 extorsum fit, ubi in pristinum statum tympani membranula cum malleo redit, par-
 tim à motu naturali aeris irruentis impulsu desinere malleus sponte sua, membranula
 vero interventu mallei in priorem statum redit; partim à motu arbitrarii instrumen-
 to, ipso musculo absolvitur, dum ad suum principium contrahitur, & simul mallei ca-
 pitulum ab incudis articulatione segregat, & propter mallei recurvatum processum,
 membranula extorsum pellitur. Verum praeter hæc duo officula etiam musculi auri
 internæ, alter quidem contra interdum, alter contra externum impulsu, membra-
 nulae auxilio est.

Substantia horum m dura est, densa & perpolitata; dura, quo ad auditum faciant, & etiam membranulam firmiter densa & perpolitata; ad soni receptionem & delationem. Et licet a ceteris ossibus specie & figura distincta sint in duobus tamen potissimum differunt; primo, quod n perostio non cingantur, ne ad soni receptionem inepta fiant; talia enim inepta esse experieris, si corpus aliquod durum panno molli involveris; quod percussum non eum sonum edit, quem cum nudatum esset, edebat; deinde, quod haec recens natis jam perfecta^o sunt, & eandem, quam in adultis magnitudinem habent; partim, quia homo omni aetate auditu opus habet, imo in principio ortus nostri plurimum indigemus, tum ad idioma^a, tum ad disciplinas capeffendas; partim, quia membranula in quavis aetate periculum impendebat. Non tamen ita dura, ut in adultis, cum in infantibus p humiditas abundet; unde etiam infantes ob-

Iii

tusius

Nullam pro magnitudinis portione continere, praefertim duo priora, tertium enim propter nimiam tenuitatem solidum esse crediderim hac Cui. Non ramen soliditas hac tanta est, ut foraminibus parvis privata sint: in quibusdam medulla pro portione inesse, duo maiora ossa praecipue foraminibus latente: tertium ob sui tenuitatem minime, Velch. solidissima sunt, ut resonent. Laur. v. Aquapend. Placent. o Plat. Varolius, Aquapend. in infantibus recens natis & adultis aequalia, Volcher. Avic. Laur. Plac. p. In infantibus media parte cartilaginosa, nec minus repleta: in adultis cave sapissime reperi, Placent.

tufius adultis audiunt; cum ad exactiorem auditum, instrumenti siccitas potissimum requiratur. Sunt etiam ^q cava, quo leviora sint, & medullam pro nutritione continent, quamvis etiam ad soni delationem faciant.

Ufus: etsi hæc tria officula quantitate quidem minima ^r sint, usu tamen maxima esse ex jam dictis patere potest, & ut summam dicam, horum usus membranulam tympani stabilire & defendere, ne dum aer vel internus vel externus, ut ex tonitru, vehementius in eam irruit, divellatur. ^r Dein, ut aliquo modo auditui conferant, quatenus eorum auxilio sonus ^r ad nervum auditorium successione quadam deferatur, & ex horum commotione chorda pulsetur, aer implantatus ad sonum percipiendum commoveatur, cum chorda à membrana non ita vehementer pulsari possit, ac ab offibus, & sic officula hæc cum chorda aeris externi appulsu vibrata ad sonorum distinctionem conferunt, quemadmodum dentes ad vocis explanationem.

Chorda ^a etiam membranulæ subiecta est tenuissima, nervosa tamen, quæ non ex toto

q Addit Aqua pend. tertiam differentiam, quod à membranula hæc officula veluti suspensa & soluta pendent, quo aer externus una cum

sono perveni-

ens statim per malleum & incidem aeri complantato communicetur: sonum enim magis communicari corporibus duris, quæ alteri extremo appensa sunt, altero vero soluta, ut si ferrum fune suspensum percutias, sonus manifestior editur, quam si non sit suspensum. At Placentini hæc sunt: Nuga sunt: stapeda ab incude, & hæc una cum malleo à membrana veluti suspensa pendere ac librari, ut facilius ac melius sonum recipiant & deferant, quia optima soni transmissio quies in mediam expetit.

^r De usu horum officulorum communis opinio, aerem, qui dum sonus editur, tanquam unda fluctuat, membranam meatui auditorio obductam pulsare, ab illa consecutione quadam officula moveri. Respondit Eustachius, ad hunc rudem motum obcurdum, quid oportebat sapientissimum animalium opificem tantum studium adhibere. Nam aer irruens membrana, sine tali organorum apparatu percuti, aut officulo, aut aliquo solidiore corpore nulla arte elaborato poterat. Vesalio, num officula hæc officio fungantur, quemadmodum formam referunt, & levissimo afflatu secundum officulum (id est malleum) cui membrana innascitur, inter dissecandum movetur primo officulo quodammodo quiescente, haud assertum velim, cum auditus rationem non satis percipiam: Culum ex aeris motu auditorio fit, ictus aeris in meatum ad hæc officula deferatur, sicque ibi quadam repercussio, ad eum cendum sonitum, qui sentitur: nam cedente membrana, hæc officula moveri, & invicem confricari necessum est: primum enim aeris ictu percussus, in alterum impingit & ferit. Objicit Volcher, credidisse Columbrum, baculorum more, quibus tympanum pulsatur, membranam à malleo quati, at malleum nullibi membrana solutum esse, imo validam compactionem in membrana existere: addit, si ex mutua confricatione officulorum hic sonus fieri deberet, tum inutilis foret chondrodes copulatio, quæ illum attritum impedit: quare usum & officia incerta conjectura nos assequi. Sunt qui volunt, horum officulorum usum esse, sonum recipere, & aeri implantato communicare, sed male, Placent. Sic vero Piccolhom. Staphylia locata est, ut quasi pensilem teneat vesiculam illam, in qua conclusum est aerem audiendi instrumentum: cui vesicula, cum incus adhareseat, malleus percurrens incidem, commotus ab aere sonoro foris intro appellente, necesse est instrumentum auditus eodem penitus motu cieri, quo exterior aer, ideoque eam omnino soni speciem, & similitudinem audiendi facultatem movere, qualis ab aere illac geritur: Sic audiendi instrumentum movetur à rebus audibilibus, sicque ipsa auditio.

^r Non ita necessaria & utilis historia, ut investigatione ob reconditum in iis artificium digna est, eo quod usus officiarum incerta conjectura assequamur, Volcherus.

^r Hic tertius usus est Volchero, quem verus usus, ut ipse scribit, latet.

^u Primus usus Volchero, sic autem probat: invenias tibi trabem, vel ferrum, quam potes, longissimum, collesce aliquem ab altero fine, tu vero stes ab altero, ferias digitorum condylo partem unam ita leviter, ut ictus vix à te percipiat, alter vero ex altero fine trabis collocatus, si aurem propius ad trabem admoveat, quam longissime à te distans, exquisitus tamen ictum percipiet, atque tu: sed aliquo post tempore, siquidem per lignum sonus non ita cito, atque per aerem permeare potest, idem attestantur musica instrumenta.

^a Ramulus nervi quarti paris, Eustach. per mediam hanc cavitatem filum vel chorda quadam tenuissima percurrit, vel articulo, quo stapes cum incudis crure altero copulatur, attenditur, quidam nervulum opinati, ego quid sit, ignoret, ali-

ro; aliquando arteriola, aliquando nervus videtur, pro nervo imposterum judicabo Fall. obser. idem fore Volch. filum seu chordula, Ingrass. Aquap. funiculus ligamentalis tenuissimus per diametrum ductus, Aran. chorda toti membranae perinde, ut nervus militari tympano, attenditur, tam exilis est, ut quid sit, dubitetur, Laur. chorda tympano neque annexa, & vix ejus tertia parti subensa, corpus nervosum, malleum colligans, Plac.

roto membranulam succingit, sed ipsius medium percurrrens, illi articulo, quo stapes cum incudis crure altero copulatur, attenditur; & si extrahatur, triplo, aut quadruplo longior est: hæc à quibusdam filum appellatur & aliis arteriola, aliis nervulus, aliis ligamentum, aliis tendo ^b censetur. Verum vel ex ligamento, vel ex nervo, ^b Quod si hoc vel utrisque junctis constare debet: at ligamenta duriora sunt, quam ut parvo rum nullum ictu cedant: nervus vero ita robustus est, ut quamvis vehementer impellatur, difficul- sit, corpus sui ter frangi possit; ita mollis, ut ex commotione facile moveatur, quod ad sonum exci- generis sit, ne- piendum requiritur. Quare ramulum nervi quarti dicti partis cerebri esse Eustachius cesse est, Aqua- asserit. Hujus usus ^c ad pulsationem: quemadmodum enim in tympano bellico, ex ^c Hæc connexio chordæ per corium expansæ repercussione, sonus fit: sic in aure hæc chorda ex exce- nom illam, patione verberationis à tribus ossiculis facta, aerem congenitum percutit. quam cum tym- pano malleus

habet, firmitus colligat: docetur à nonnullis ipsum ex exceptione verberationis à tribus ossiculis facta aerem internum percutere: at hoc dogma inde confutatur, quod motus receptionem impediatur, Volcherus.

De Musculis ^a Auris internæ.

CAPUT XLVI.

Cum Malleolus ad incudem dearticuletur, & quidem ea articulationis specie, quæ ginglymos dicitur: idcirco horum motus exiguus & obscurus est: moventur autem una cum membranula, cui malleus appensus est, sursum & deorsum, musculo altero intra membranulam, altero extra eam constituto.

Musculus internus [tab. 26. i.] ab Eustachio primo ^b descriptus, in osse petroso sit- ri nequit, tri- tus, exiguus est, cum eo, in toto corpore minor non sit; elegantia tamen & constru- buere illis vo- ctionis artificio nulli cedens: hic in ossis sphænoidei basi ea sede qua cum radice pro- luit: quem mus- cessus petrosi, & additamento ossis occipitis effractum foramen constituit, enasci- culum nemo- tur: à substantia ligamento simili, mox carnea evadens, sensim ad medium usque la- quod sciam, tior aliquanto redditur; dein rursus angustior factus, duos ^c tendines gracillimos Eustachius: mi- musculus mal- producit [tab. 26. f. 5. infra i.] & alterum elatiori mallei apophysi, alterum ejus cervici nimis quidam lei in incudem ali- infigit. At in canibus, parum ante insertionem, carneam & rotundam ^d glandulam concussione fa- vet, Ingrass.

Iii 2

musculus unus ex Eustachii sententia, duos ex aliorum refert, (illum ex Eustachio describit, alterum vero non) Volch. Musculus minimus intra organum auditus, alias perperam à me rejectus, Varolius: ad sunt ad pulsationem musculi ita exiles, ut fere sensum effugiant: hæc solum habet Laur. musculi duo internus & exterior, Aquapen. musculi in aliis a- nimalibus duo exiles ossiculis alligati: in aliis unus, in aliis nullus: at duos tum in hominibus, tum in equis, cane & por- co observavi, qui in hominibus longe aliam figuram, ac ortum, quam in brutis habent, Placent. ^b Hoc asserunt Volch. Aran. & Plac. eum quoque Aquapen. descripsit.

^c Eustachius unum tendinem tribuit, qui majori & superiori apophysi inseratur; Volch. & Aquapen. Eustachium se- quuntur: at Placent. duos tribuit. Aran. apophysi à cervicis basi extuberante inseri tendinem scribit. ^d Sinui ner- vosum

vosum & fibrosum instar rotundæ & oblongæ glandulæ, cum integrum est organum, insidit, Vesal. in examine: musculus unus, vel ut Vesalius rotundæ & oblongæ glandulæ, Volch. sinus primus glandulosus quid continet, in pecoribus, an in homine inveniat, ignoro, forte musculus est quorundam, Plac. in equo, porco, cane, duo reperiuntur muscoli in ipsa cavitate conchæ dictæ, sinibus propriis insistentes, rotundi instar glandulæ cujusdam, exilis, unus tantum altero major & oblongior: minor à tenui & longiusculo filo, quasi ligamentali ortus, tendine subbrevis & tenuissimo, stapedis capitulo alligatur. Major, tendine tenuissimo ac brevi alterius mallei apophysi affixo donatus, ex osse immediate prodit. Horum magnitudo in equo & cane pene æqualis est: nec in recens natis minor, quam in adultis. An in aliis animalibus etiam sint hi duo muscoli, ignoro: Verum de scriptis non dissimilem sapius in eis vidi, Plac.

aliquantulum depressam annexam habet, membranæ non appenditur, ne hæc, si sola trahatur, ob sui tenuitatem, ruptionis periculo subiciatur. Hic, ut præcedenti capite dictum fuit, dum agit, mallei caput oblique antrosum, & ad interiora trahit, ab incude deducit, & malleoli processu recurvato, membranulam ad exteriora pellit. Ut hunc esse probatur experimento, hoc pacto: si quis musculum hunc (in capite recenti, & particulis probe administratis) specillo acuminato ad suam originem traxerit, duplicem usum deprehendet, alterum, quod malleoli capitulum ab incudis contactu recedet & attolletur; alterum qui consequitur, quod membranula ad externam regionem impelletur. Motus autem hic, qui in auribus fit, & voluntarius esse videtur, cum à musculo motus voluntarii instrumento perficiatur, non facile animadvertitur, imo vel inviti etiam audimus: ratio, quia exiguus valde est. Nec defunt exempla musculorum, quorum actiones tam in dormientibus, quam vigilantibus perspectas habemus, quas tamen non observamus & quasi præter voluntatem fieri videntur, ut in musculis respirationi, oculis, palpebris, vesicæ & ano famulantibus. In nonnullis tamen evidentem esse, ut ab iis vel crebriorem, vel tardiorē effici posse, sic probatur: quia motus sensibilis est, & cum sit epitu quodam est, perinde ac si quis tria fila modico intervallo distantia tendat, & plectro percutiat, ut in fidibus etiam fieri consuevit: aut si quis vngue tabulam per transversum linearem scalpat, vel scintillam ignis excussam audiat: præcipue enim cum oscitare incipimus, percipitur, quem tam a motum in principio sonus obscurior ab aere commoto præcedit, similis ei sono, qui fit à baculo aerem percutiente. At hic motus & strepitus in aure à multis non observatur, nec usum habere videtur, nec ad audiendum confert. Nam si sonus exterius fiat, & eodem tempore quis hunc motum molatur, deterius sonus externus audietur: quare vel ex necessitate materiæ contingere videtur, & musculorum motum necessaria industria illas partes ad audiendum excitare studeat, vel se quid in aure moveri, vel audiendi vim intendi persentiscere. Equidem id non ita auditui proprie atque communiter motui, atque omnibus sensibus tribuere queo: nam ad alicujus animalis operationis intentionem excitandam omnes alii sensus concurrere videntur, Volch. De musculi ab Eustachio observati usu neminem scripsisse nori, quem qui negant, vel non reperiunt, aut negligentes, aut hebeti visum præditi sunt: qui vero dissimulant, aliena laudis invidi censendi: cujus actio caput mallei oblique, antrosum & ad interiora vellere, ab incude diducere, & recurvato processu mallei apophysi tympanum ad exteriora pellere: ut aer de novo influens in illum agere, insitumque aerem afficere possit: nam si semel impulso usque ad ossiculorum contactum & tympano, musculi opera rursus non se jungerentur, continuo aere vix affecto, imperfecta admodum actio redderetur. Quæ rationi conveniens videtur toties extra quam intro cedere tympanum, ad interiora quidem à strepitu aerem impellente: ad exteriora vero, cum à naturali motu, tum à motu arbitrarii instrumento: hæc Arant. in observ. Anat. Arantii opinionem sic refutat Plac. quod si, ait, ita esset, malleo nihil affligeret, quod ejus motum ad interiora moderaretur, & sic tympanum, etsi à circumferentia ad sui medietatem usque malleus protensus sit, à periculo non esset vindicatum. His musculi tribuitur concussio & attritio ossiculorum, quam perpetuus in auribus strepitus sequitur: quem tamen non omnes persentiant: verum de hac doctrina non plus quam de nugis & fabulis æstimandum esse, requiritur soni producendi, & medii interni conditiones, perspicue evincunt, Plac.

cessario consequi ad malleoli ad incudem attritum, vel excutiendorum vaporum gratia factum: nam in febribus, ubi major ad caput evaporatio fit, frequentius hic strepitus per sentitur, ut vapores etiam aurium cavitatem opplentes, per huiusmodi motum excutiantur, tum tamen motus non omnino liber est. Sic quando aures in os per canalem explicatum, expurgantur, titillationem in oris parte interna ad uvulæ radicem in meipso sentire soleo, & tunc sapius salivam deglutiendo, motum illum in auribus frequentem fieri ex strepitu colligo, & titillationem, ex materia, citius in os expurgata, sedari sentio. Fit autem eodem tempore in aure utraque, quemadmodum & uno oculo moto, & alterum moveri ostendimus. At ne quis arbitretur in majoribus animalibus melius, quam in homine hunc musculum conspici: quamvis enim hoc destituta non sint, is tamen in plerisque longe minor quam in homine occurrit, & difficilior cernitur. Hunc si lubet inquirere, oportet processum petrosi secundum longitudinem, ubi linea minime alte insculpta est, leviter incidere (principio tamen ad os sphænoideis facto) cum is secundum longitudinem feratur, & in tympani membranam excutrat.

Musculus alter [*tab. 26. fig. 1. a. cuius insertio b.*] in meatus auditorii superiore regione circa medium extra membranulam tympani consistit & tendine suo nerveo malleoli cervici affigitur: de cuius inventione duo præstantissimi Patavinæ Scholæ Anatomici certant. Etenim Hieronymus Fabricius ab Aquapendente se anno 1599. invenisse asserit. At Iulius Cæsius Placentinus scribit, se anno 1593 7. Martii primo observasse. Sed quisque horum inventor sit, laudem diligentia uterque meretur, & ut constet, nos utrumque magnifacere, utriusque descriptionem subijciemus, à seniore principio facto: Etenim neutri quicquam derogatum volumus, cum utrumque & amemus & observemus: illo etenim per biennium præceptore usi sumus; hunc vero amicū & studiorum collegam habuimus, amicitiam mutuis literis sanctam tectam conservavimus. Sic ergo Aquapend.

Præterea hoc an. 1599. musculum invenire visus sum in meatu auditorio, qui *περὶ τοῦ ἀκροῦ* dicitur, [*tab. 24. fig. 9.*] qui extra membranam est, exiguus, carneus, non expers tendinis, qui à medietate ipsius ductus seu meatus recta fertur, usque quo in membranam exterius ad ejus ferme centrum inseratur, ea scilicet parte, qua malleus intus membranæ annectitur: quam exterius una cum malleo trahit. Invenies hunc novum musculum, si in recenti cadavere corticem ossis meatus auditorii hinc inde aut ex una parte malleo cultrium pertundente incidas, & dextre huiusmodi os ad latera revoluas: Sic enim tibi apparebit musculus, quem sane in omnibus postea non reperi, quamvis existimem, ipsum esse necessarium. Sic vero Placentinus.

In homine musculus alter, in superiori meatus auditorii regione [*tab. 26. fig. 1. a. b.*] consistit, circa cuius medium cutis & membrana, quæ implicata in vicem meatus auditorii investiant, evidenter ad hunc musculum efformandum, degenerant in corpus carneum, sed pene membranofum, fibris distinctum tendinis haud expers, rotundum, in progressu sensim constrictum, & recta ad tympanum delatum ac insertum, non in membranam exterius ad ejus ferme centrum, sed suo tendine, quem supra inter tympanum, & eam ossis temporis partem, à qua osseus annulus prodit, duabus invicem distantibus extremitatibus in concham transmittit, interius in mallei tuberculum sive caput inter humiliorem & elatiorem apophysin. Si mihi primam

hujus musculi inventionem attribuiam, sua laude verum non fraudabo inventorem; quem ego anno 1593. 7. Martii in praesentia, &c. observavi: hæc Placentinus.

Usum tam interni quam externi Aquapendens sic expressit; Ufus horum musculorum est ad membranæ custodiam, quæ cum è duobus locis rumpi labefactarique periclitaretur, exterius & interius^h, ex utraque parte paravit Natura præsidium. Exterius enim introrsum trudendo; interius autem extrorsum membranam evertendo, aer violenter motus rumpere poterat: & exterius quidem externus aer, qui vehementius una cum sono fertur: Interius autem spiritus interclusus, & ex ore in auditum ingrediens, impetum membranæ intus extra faciens; at in oscitatione, narium emunctione, spiritus cohibitione, magnis conatibus, magna voce, sæcum excretionem, & similibus violare membranam poterat: ideoque externus musculus cum membrana introrsum adigitur, extrorsum ipsam trahit. Internus autem, cum extra evertitur, intro terrahit: suntque musculi hi duabus deservientes necessitatibus ad membranæ custodiam ne rumpatur. Fuitque hocⁱ munus custodiendi membranam musculis & voluntariis instrumentis commissum, quando si aliud quodvis vinculum custos fuisset, tunc uno tenore semper tensum, nequaquam membranam custodisset. Unde prout variæ sunt aeris ad membranam impulsiones, sic varios effici motus, qui in majoris ac minoris ratione consistant, par erat: atque hi nequaquam à ligamento eodem tenore semper agente, sed musculis, qui cum quadam analogia & mensura operantur, committendi erant; qui contrahendo sese & laxando plus minusve, prout opus est, aeris variis impulsionibus, motu vario, qui in majoris minorisque ratione consistit, custodiam agunt: atque ita ictus membranam suscipere permittunt; ut neq; ipsos prorsus evertere, neque ab ipsis prorsus everti membranam patiantur. In summa partim cedendo, partim etiam obluendo hi musculi id præstant, ut membranam à ruptione tueantur: hæc ille.

At sic Placentinus: musculorum internæ auri, alter malleo contra internum impulsus, alter contra externum famulatur; qui à me inventus, ac in concham tendentem transmittit majori mallei processulo adnectens, hinc partem mallei intus inclinantem extrorsum trahendo, ac compressionem ejus in incudem factam, sic moderando, ipsi contra internum propugnaculo existit. Qui ab osse cuneiformi prognatus, in concham ad cervicem mallei delatus, eique insertus est, ipsi contra alterum impulsus opem præstat, ejus introcessionem definiens. Etenim cum tympanum, aeris externi irruptione cum malleo intro agitur, hic musculus eorum sistit motum, ne ultra præfinitam metam, tympanum cum malleo intro pulsum rumpatur: hæc tenus Placentinus.

De

musculi & voluntariis instrumentis commissum: ut sicut variæ sunt aeris ad membranam impulsiones: sic cohibitio, ac sistencia motus mallei varia fieret. Ad hanc sane functionem, non ligamenta, eodem tenore semper agentia, sed musculi voluntarii motus organa, & quæ cum quadam analogia & mensura operantur. & plus minusve, prout opus est, contrahendo sese & laxando, aeris variis impulsionibus, quarum quidem varietas, in majoris minorisque ratione consistit, vario motu resistere poterunt, Placent.

Quamvis sonus etiam in vitâ auditum moveat, tamen voluntaria quædam animadversio in nobis existit, quam ad libitum in omni sensu exercemus, volentes rectum judicium habere de quolibet sensibili: quare sicut mediantibus oculi mu-

li musculus, nos voluntarie dirigimus centrum crystallini ad aliquod objectum diligenter spectandum: ita intra organum auditus quidam minimus musculus locatur, qui ab anteriore sede natus in articulationem trianguli cum incude inseritur, quo musculo contracto, triangulus seu stapeda cedente interim articulo incudis cum malleo, ad anteriora aliquantisper trahitur, & ad centrum tympani magis è directo appropinquatur, tuncque optimus cum animadversione & iudicio fit auditus: non secus ac contingit, quando minimum visibile intuemur per lineam corneæ, pupilla & crystallino concentricam: non ergo ossicula à musculo mota faciunt intra organum auditus, tot ac tam varios sonos, ut opinari sunt, Varolius.

De Cavitatibus Ossis petrosi.

CAPUT LVII.

ET si Os petrosum, ut supra ostendimus, intrinsecus totum cavernosum & spongiosum sit & veteres unius solum cavernæ meminerint, tres tamen præcipuas & magni momenti recensebimus, quas antra & cavernas etiam recentiores nominant: quæ in ossis huius sede media, qua maxime extuberat, formata sunt, quo auditus organa, utpote membranulam, ossicula tria, musculum internum, chordam, nervum auditorium & aerem congenitum, seu medium contineant; quæ in pueris, quam adultis facilius integræ & distinctæ demonstrari possunt; quibus singulis nomina propria à rebus externis mutuata, indita fuere, sunt autem Concha seu tympanum, Labyrinthus & Cochlea.

Prima ^d [tab. 24. f. 2. h. à c. ad E. tab. 26. q. r.] cavitas, membranulæ tympani ablata conspicitur: quæ Concha à conchiliorum similitudine dicitur: vel tympanum, si quidem cavitas hæc sua membranula tecta, tympanum militare referat, nam membranula percussa sonat: quemadmodum tympani militaris membrana pulsa ob aerem contentum, sonum edit: quare in homine ab usu, in brutis vero ex usu & figura, cum tympani Turcici ^f instar in ruminantibus formatum sit, nomen obtinuit: dicitur

a Cavitatem unam veteres agnovērunt, ut Carpus, Piccol. cavitas rotunda, quantitatis unius ungula, Massa. Carvernam habet intrinsecus instar labyrinthi, & quatuor nervus foramen cecum & labyrinthi in osse temporali situm, qui in aures desinit, : ingreditur, Conchilium. Cavitates quadam plures

ne sunt & levæ, quadam laxiores pumicis & spongia modo cavernosa, & admodum varia, & præcipuam quinti nervi portio tanquam membranula involuit, Vesal. b Ut in avibus fere, Placent. c In osse petroso meatus sunt quatuor, meatus auditorius, tympanum, labyrinthus & cochlea, Volch. & Laur. d Aristoteles multorum Philosophorum sententia, cochleam vocat, sed qui hoc dicunt, Aristotelem non recte intellexerunt, cum nullam similitudinem nec in homine, nec brutis cum cochlea habeat: dein ex verbis Aristotelis 1. hist. 11. idelicet non potest, ait: pars interior forma anfractus cochleæ similis desinit in os, quod auriculam plane imitatur, in quod quasi novissimum vasculum strepitus devenit. Vult Volcher. Aristotelem hic intellexisse tertiam cum secundam in tertia cochleæ forma conspicitur, & non in secunda, quod si vocasset concham à conchiliorum similitudine, jam aurium brutorum meatui secundo ascribi posset: Et quod dicat, Aristoteles desinere in os auricula simile, in brutis, non in homine verum est, Volch. Cochleam neminare error est, Aquapen. Aristotelem cochleam appellare quorundam opinio, sic & Eustachium appellare Volcherus censuit: at in nullius scriptis hoc manifeste apparet; verum aut omnes tres simul sumptas, quia sic cochleam in brutis animantibus representant: aut non hanc, sed aliorum alteram illi significarunt, Plac. Secundus auris meatus vel cavitas, Volch. Secundus meatus, cochlea Aristoteli, Laur. e Aquapen. Placent. & Arantio interna cavitas, conchion dicta. f Fallop. Plat. quod reprehendit Volcherus, quia intus fenestras, foramina & anfractus habet, ita ut tympano nulla ratione conferri possit: at in brutis, & præcipue ruminantibus tympanum refert, cum meatum instar mediæ conchæ, vel tympani Turcici formatum habeat: homines vero à celo à tympano forma discrepantem consequuntur. Idem fere Placent. tympani nomine non primum modo aurum, ut nonnullis non inepte interim placet, multo minus extimam membranam, ut imperite alii sumptere, sed totum

eorum ossum connexum intelligimus, auditus organum constituens, à prima membrana ad extremum usque cochlea serminum. Ingrass. & Vesalius in exam. assimilat, fodina ampla, à qua plures cuniculi & via principium habent, & in canalem huc illucve incedentes regrediuntur.

g. Volch. Plac. citur & pelvis & antrum. Hæc ossis petrosi principio insculpta est, inter mammillaris processus radices & sedem illam, cui maxillæ caput ad articulum inferitur & parte externa meatu auditorium respicit, à quo sola membranula separatur [t. 24. f. 2. ab h. versus c.] hinc auris regione intima inflammata vel exulcerata, ex maxillæ inferioris motu, in aure dolor excitatur: interne vero à foramine arteriæ carotidis squamma tenui distinguitur [t. 24. f. 2. ab h. ad L.] Amplior est multo reliquis duab. cavitatibus, cum quib. per successivum ingressum jungitur, quo aerem cogenitum copiosum contineat & plures sonos, qui passim eodem tempore fiunt, & ex variis locis mittuntur, suscipiat: de n cum aer internus ab externo primum moveri, motusque soni imaginem ad nervum auditorium deferre debuerit, & quo purus remaneret, expurgari debuit: idcirco in cavitare hac instrumenta^h pulsationi, traiectioni & expurgationi dicata, indita fuere: pulsationi ossicula tria, chorda tympano attensa & muscoli: delationi, fenestellæ duæ: expurgationi: ductus in palatum vergens inservit: quæ sane cavitatem non minimam requirebant: quare & subrotunda & oblonga, i quo capacissima sit. Est quinetiam una, quo plures soni eodem tempore facti, uno tempore recipiantur. Si enim hæc cavitas prima in plures^k distincta foret, sonus nec eodem tempore, nec eodẽ modo recipiretur.^l Superficies ipsius interior inæqualis, cū alibi depressiones & foramina, alibi tubera ostentet: imo statim post membranulam sursum versus anteriora^m fertur & angustatur: dein se dilatans ad superiora retrorsum tendit, & quasi alia cavitas ad inferiora deorsum producit, quæ pars in homineⁿ velicæ formam [t. b. 26. f. 8. & 9.] in vitulo maifupio aurigarum, in hædis & agnis peris mercaticum assimilari potest. Est etiam aspera & spongiosa: aspera, quia sonos recipere, non autem reflectere & duplicare debuit: nam si æqualis & lævigata foret, quemadmodum templorum fornices sunt, echo excitaretur: spongiosa, ut si forte sonus vehementior ingressus sit, qui auditum lædere posset, cavernularum beneficio vis eius retundatur: imo etiam, ut ibi aer congenitus elaboretur, & ad perfectionem perducatur. Substantia tamen est durissima & lapidea, quo ex aere vehementer impulsio sonus optime fiat.

Membrana etiam secundum quasdam partes, à pericranio producta oblinitur: ubi enim pericranium tympani membranulam constituit, duplicatur, in plures partes divisa aliquas hujus cavitatis partes investit.

At cum cavitas hæc aeri implantato destinata sit, qui aerem externum à sono alteratum excipere debet, ut percutiatur, necessum est: at cum beneficio membranulæ à meatu externo distinguatur, aeris externi alterationem absque aliis mediis excipere nequit;

g. dignosceretur, Aquap. m. Volcherus. Placent. n. Volcher. Meatus internus & propria sedes auditus, aeri implantato destinatus est, ut in eo fiat sonus, rinitus & susurrus, Volch. aerem quandam puriorem, connatum vel insitum continere summi Philosophi professi sunt, hunc pulsato à vocibus tympano affici: unde in cochlea & alios cecos anfractus. ac quinti soboles nervorum agere consueverunt; ut quadam in invius labyrinthis refractione ac modulatione acquisita ad communem sensum soni species perveniant. Arant. aer vernaculus in hac continetur, Laur. in hac sensus audiendi celebratur, Aquap. est proprium medii interni ac complantati domicilium, Placent.

nequit, quare pulsatione opus fuit, quæ officulis, chorda & musculis absolvatur: at quo aer internus pulsatione alteratus ad sonum conferat, canales facti sunt, qui tanquam huius aeris latores ad nervum auditorium deferant, nimirum fenestellæ duæ, cum meatu in labyrinthum: verum aerem congenitum opus fuit purum conservari: & aere per os attracto foveri & sustentari: quare canalis in palatum ex hac cavitate vergens à Natura creatus, per quem & expurgatur, & aer novus ad ingeniti nutritionem succedit: de iis, quæ ad pulsationem & expurgationem faciunt, cum dictum fuerit, nunc de iis, quæ delationi soni inserviunt, sermo erit.

De duabus Fenestellis & Aquaductu in cavitate prima.

CAPUT LVIII.

Foramina^a duo in cavitate hac reperiuntur, exigua tamen, quæ aliquibus^b Fenestra vel Fenestellæ dicuntur, quæ meatus auditorii orbem veluti ex superiore sede spectant; quorum alterum antè & elatius versus faciem spectans [tab. 23. f. 4. & 5. f. 2. k.] in cavitatis quasi medio, figura est ovali: (quare fenestella^c ovalis dici meretur) oblonga, à lateribus compressa, & sede posteriore in cochleam^d insigni amplitudine se aperit, & cum cochleæ anteriore sede ita commune efficitur, ut non aliter fenestella ovalis in foramen cochleæ, quam huius foramen in fenestellam pertinere, quis asserere possit: hoc etiam foramini posteriori se conjungit, & in interiora progrediens, dilatatur, forumque quodammodo, aut fodinæ alicujus metallicæ præcipuam sedem constituit, à qua^e multæ plateæ, aut vix, aut cuniculi excurrunt. Huic stapedis basis incumbit, & magna ex^f parte claudit. Alterum^g foramen posterius est & humilius [tab. 23. f. 3. & 4. G. tab. 24. f. 2. l.] quod rotundum est priore minus, & paulo angustius, in homine; at in vitulo^h & ove paulo amplius & nonnihil extuberans; c semper patens, & ad cavitatis posteriora declinans: & cum priori in cavitate, quæ per os penetrans in canalē geminum scinditur, de quo mox dicturi sumus. Inter utramque [tab. 24. f. 2. k. & l.] fenestellam (supra humilius foramen) tuberculum intercedit, quod cum foramine rotundo & tuberculo extuberante subdito superiori sedi, parvæ conchæ conferri potuit, quæ in frenorumⁱ ornamenta adhibetur: in tuberculo vero camera tertiæ cavitatis sive cochleæ latitat. Munus est, sonum aeri implantato communicatum per pulsationem excipere, & ad cavitates sequentes transmittere.

In canalē geminum foramen humilius finditur, qui sibi mutuo accumbunt [tab. 24. fig. 2. ii.] & squamma ossea tenuissima dividuntur, & altero eum fenestella ovali cochleam petit; altero in labyrinthum fertur. ^k Horum anterior venæ jugularis sobolem intromittit, & ramulum quinti paris emittit.

Aquæductui^l posterior canalis [tab. 23. f. 3. H. tab. 24. f. 2. g.] assimilatur, ob similitudinem, ^{K k k}

^a Ab hac cavitate in alia cavitate infunditur. ^b Fenestellæ. ^c Fenestella ovalis. ^d In labyrinthum via est, monente Fallopio, ait Aquapendens; in cochleam sese aperit, Plac. in buccinosum antrum se aperit, Volcherus. ^e Sic & Vesal. in exam. & Volcher. ^f Stapedis basis claudit, & semper clausa manet, Fallop. Volcher. Plat. magna ex parte claudit, Aquapend. in cochleam se aperit; attamen membrana, cui stapedis basis appositæ est, clausum existit, Plac. ^g Posterius foramen, Vesal. ^h Volch. & Plac. ⁱ Vesal. Volch. Plat. Placent. ^k Volcher. ponit hic meatus tertium communem parti anteriori & posteriori foramini, vel utraque fenestra, ubi termini fenestrarum congregiuntur, & unde labyrinthus & cochleæ prodeunt. ^l Sic Fallop. & Placent. cui & cacus meatus, quartus meatus processus petrosi, ossis canalis

lis, qui à quibusdam cæcus meatus & cochlearis meatus, capreolaris meatus, & à Fallopio; Aquaductus, Volcher.

dinem, quam cum aquæ canalibus per cuniculos impositis, & hinc inde vario modo diductis habet, & à quibusdam cochlearis canalis, à veteribus & Galeno^m cæcus meatus, aliis tortuosus vel capreolaris, non quod cæcusⁿ sit, sed ex eo, quod seta porcina immissa difficulter perquiri possit: imo in arida calvaria bovis, hoc foramen, setam nulla fere ratione transmittit. Hic tortuose antrorsum primum, mox retrorsum & oblique supra foramen cavitatis primæ fertur: inde deorsum delatus in foramen auditus quintum [tab. 24. f. 2. α. β. γ. δ.] definit. Foraminibus pervius est, in principio [α.] quod illi eum meatus auditorii nervi sede elatiore commune est: dein in ductu medio, & quidem externæ in hujus canalis anteriore sede [δ.] foramen auditus quintum constituit, & arteriam à se dimittit: sic & sede interna [γ.] ad cavitatis secundæ initium se aperit, in fine quoque foramen habet [β.] quod in auditus os tertium definit. Per hunc canalem, nervi auditorii major portio & arteria varie deducitur & dilatatur: postquam enim nervi quinti paris ramus indurescere debuit, debuit etiam per ossis durissimum & siccissimum anfractuosum foramen deduci, maxime cum per locum alium via non pateat.

m Tu φδδς Galeno & Vesalio non sine errore cæcum meatum appellant, quod nomen tertie cavitati potius debetur, Fallopi.

n Cæcum etiam dici potest, quod tenuis & circumducti vertiginosique in istius loco per pulchre censetur, Volcher.

De Labyrintho & Cochlea, sive cavitate secunda & tertia ossis petrosi.

CAPUT LIX.

a Cavitas tertia, quam labyrinthum vocant, Volcher.

(cui & meatus tertius sedis auditus) Laur.

b Cavitas secunda, Fallopi. Plat.

c Antrum fodiinarum, Ves.

d Fall. Ves. in exam. labyrinthus vel fodina, Plat.

e Sic & Plat.

f Fall. Volcher. at sic Plat. & Plac.

con. transverso ab interioribus extrorsum recta ab anterioribus retrorsum: oblique à posterioribus retrorsum.

Cavitas^a altera à variis anfractibus & cuniculis labyrinthus^b & fodina^c dicitur quæ in petrosi ossis sede posteriore & anteriore, seu hujus processus radici insculpta est, & à nervi auditorii meatu squamma tantum distinguitur [tab. 24. fig. 2. inter m. & e.] rotunda est & priore minor; quæ ubi sub tuberculo & post fenestellam ovalem sese cavitati sequenti jungit, interiora subiens dilatatur, & forum quodammodo, aut fodinæ alicujus (ut ante monuimus) metallicæ præcipuam sedem constituit, à qua multæ viæ excurrunt, quæ per ossis substantiam duram, veluti in circulum excavati procedentes in amplam cameram rursus revertuntur. Has vias cuniculos^d vocamus, seu semicirculos^e osseos [tab. 23. f. 4. & 5. NNN. tab. 24. f. 2. m. 1. 2. 3. & distinctum m. cum ch. 1. 2. 3. fig. 6. V.] & tres constituimus, quæ ita feruntur, ut duo angulis quasi rectis sese bis interfecerint: manifestior autem intersectio supra cavitatis tertiæ apicem perficitur, ubi foramen quinti paris nervum excipiens finit. Oriuntur autem principio satis amplo, & sensim angustiores redduntur, cum per canalem latum sonum ferri commodum non fuerit, & hi per ossis substantiam delati, & circulares reflexi ad suum principium recurrunt, ita tamen, ut toto processu nunquam in se invicem manifeste pateant. Horum^f unus inferior ab anteriore parte cavitatis divergens, exterius (in eadem tamen cavitate) fertur; dein reflexus per angulum posteriorem recurrit: alter^f ab eodem angulo anteriori prodit, qui sursum latus semicirculo facto per angulum posteriorem regreditur: tertius^f oritur & finit in cavitatis angulo posteriore; nam inde ortus, perforatoque ossis canali quodam circulari exteriora versus, illuc iterum revertitur. Et hi in infantibus integri à cavitate & crusta, qua os obducitur, separa-

parari possunt, qui temporis successu lapidescunt & uniuntur. Hi canaliculi in longum produci non potuerunt, propter ossis petrosi brevitatem, licet utile foret, cum longitudo ad sonorum aciem utilis sit. Quare natura horum brevitatem circumvolutione compensavit: quamvis & hæ spiræ & circumvolutiones auditui inserviant, quatenus per has, quasi per diversos gradus voces sensim elaboratæ, & quodammodo fractæ in cerebrum ascendant. Canaliculi quoque hi in superficie interiore membrana quadam mollissima ac tenuissima vestiuntur.

Foramina habet, siquidem cuniculi suo egressu & recurso in hanc cavitatem foramina sex faciunt: in hanc etiam à prima cavitate & foramina duo desinunt: sic etiam minutissima quædam à nervi auditorii meatu humiliore & à canali communi [tab. 24. f. 2. y.] Horum anfractuus usus, ut soni per adeo angusta loca delati, acutiores fiant, nec dissipentur, quod ex artificialibus instrumentis, præcipue musicis satis liquet; utpote ex fistulis manualibus & organis: hæ enim quanto angustiores longioresque sunt, tanto acutiorem sonum reddunt: primo enim aer quietus ac tranquillus in canalibus contentus soni alterationem facilius excipit, quam aer ex agitatione conturbatus: dein aer angusto loco conclusus, non dissipatur; sed unitus permanens, sonum maiorem ac efficaciorē, quam dispersus, edit.

Cavitas ⁱ tertia, Cochlea ^k à meatu flexuosa obliquitate, quæ cochleæ gyrum elegantissime imitatur [t. 23. f. 4 & 5. O. t. 24. f. 2. sub n.] live ^l quod testæ cochleari exteriore superficie rotunda detracta, & parte anteriore, quæ in spiras contorquetur, reservata, similis sit, dicitur. A ^l Vesalio ^m buccinosum antrum vocatur, à buccina cornu recurvo ac contorto, quo pastores pecus convocare solebant; vel potius à buccina conchilii specie, à quibusdam foramen cæcum & cavitas cæca nominatur; quia exitum non habere, nonnullis visum fuit: verum et si spirarum modo convolvatur, tamen exitu non caret, cum in medio, parte ea, cui spiræ innituntur à principio ad finem usque meatu angusto & recto pervia sit: nam si cavitas hæc cæca esset, aer percussus nervo occurrere non posset. Hæc duabus prioribus longe minor est, in anteriore sede processus sub tuberculo cavitatis primæ sita, quo sono, qui à posteriore parte antrosum vergit, occurrat: & à canali aquæ ductui simili, qui in medio processu petroso situs est, ossi tenui ponticulum referente distinguitur [tab. 24. fig. 2. inter n. & f.] oblonga est, sed incurva, gyros tres ⁿ nonnunquam & quatuor, sese mutuo excipientes, cochleæ in modum habens, quibus introsum nonnihil & deorsum introquetur. At spirarum ⁿ elatior, superiorem sedem obtinet, & nervum suscipit; angustior inferiorem & ossis cavo terminatur, & exitum ^o consequitur. In hanc, cavita-

Kkk 2

vita-
rare autem, seu
ad ordinem

quendam redigere aut dirigere, non est, ut quispiam tentet. Vanus enim, ut puto, omnis erit susceptus labor. Deprehendes hac certissima esse, si sine ullo delectu ex omni ferme parte huiusmodi osseum organum incidas; videre enim videberis, una excepta externa crusta, reliquum ossis cavernosum, foraminulentum, pertusum & spongiosum totum apparere. Aquap. h. Non innumeri, neque invicem adeo intricati, ut dinumerari, seu ad ordinem quendam redigi non possint, Plac. i. Cavitas quarta, Volch. (cui & meatu quartus sedus auditus) Laur. de qua hæc solum, postrema cavitas Fall. cochlea dicitur, quod testa cochleæ similis sit: sunt qui foramen cæcum vocant, k. Cochlea vel cochlearis cavitas vel cæca, Fallop. antrum buccinosum, Vesal. in exam. cochleata vel buccinata à forma, Volch. (qui & cæcam cavitationem dici monet) & Plat. cochlea & cochleatum antrum, cæca cavitas alii, quia putarunt, eam secundum totum ductum spirarum pertusam non esse, Plac. l. Eustachius, Volch. m. Volch. Plac. n. Tribus spiris, Eustach. tribus quatuorve gyris, Volch. o. Si quis hanc cavitationem cæcum meatum appellavit, cum nullum velu-

A prima cavitate in alias aliasque itur propemodum infinitas caver nulas, quibus auditorium organum unum sum ita reservatum est, ut assenti ac dinumerare possibile non sit: à primo tamen foramine ex conchâ, ut vult Fallop. labyrinthum ducit in cochleam: tertium in alias ducit cavitates, quæ tam innumera sunt, invicemque intricata, ut merito labyrinthus dicantur. & admirari quidem eos liceat, dinumerare autem, seu ad ordinem

veluti cochlearum testa exitum habeat, non male feceris, Fallop. Meatum, in quem nervus auditorius inferitur, per meare aliqui negant: aliqui in medio cui spira innituntur, perviam esse ajunt: definit in cochleam mediate interposita ossa lamina pratenui in meatum nervi auditorii, Plac.

Foramen humilium, Plac.
 sarius Plac.
 q Eustachius
 & Volcherus,
 duplici constat
 helice, altera os
 sea latiore, qua
 à labyrintho
 est continua,
 altera membra
 nosa & molli,
 quem ea for
 mat membra
 na, qua duplex
 hoc antrum ve
 stiens, utram
 que observat fe
 nestram, Plac.
 r Galeno in li
 bro de historia
 philosophica re
 sto.
 f. 1. hist. an. 11.
 t Quintiparis
 nervus insignio
 re sua portione
 cavitatem tem
 poris ossi inci
 sam membra
 na ritu succin
 git & oblini
 non quidem u
 niversam, sed
 nonnullas ipsius
 sedes, ac si inf
 gnior nervi
 portio in plures
 membranas diduceretur, qua aliquot ejus regionis cavitates obducerent, Vesal. an sit nervus expansus, an aliud non re
 fert, Fallopius, membranulas à nervorum fibellis diductas succingi putantur, Plac.
 u Fallopius, qui addit, verisimile à distis propaginibus membranulam ortum ducere: idem & Volcherus. Eustachius
 vult etiam vel quatuor foramina minima reperiri, qua à canali in secundam & tertiam cavitatem pertingunt.
 x Usus hujus cavitatis docet ac confirmat buccinosa testa multis gyris circumvoluta: nam si talem testam foramine
 suo quis auri admoveat, viros quis audiet sibilos ac tinnitus, susurrosque excitari, quod si quis apertum caput perfora
 to inflaret, tuba in modum sonus edetur, Volch.

vitatis primæ foramen, p seu fenestella ovalis [t. 24. f. 2. l.] definit, & quidem in hujus
 ossis spiram majorem. Hoc os cochleæ, ex spirarum q duplici genere constat, qua
 rum alterum ab ossa substantia admodum tenui & sicca, & quæ facile teritur, crea
 tur, & undiquaque serpenti in spiras convoluti similis. Alterum ab Eustachio pri
 mum propositum, quod ex materia fit molli, mucosa, firma tamen, & quæ nescio,
 quid q arenosi permixtum habet: oritur ex medio spatio spirarum primarum, tan
 quam ex ampliori basi, sensimque extenuatum in acumen definit, sed non tam alte
 conscendit, ut ossis ambitum, qui spiras priores terminat, attingat. Hanc miram Opi
 ficis nostri industriam, primus Empedocles innuisse videtur, cum t auditum spiritus
 impulsione fieri docuit, qui cochleæ simile intra aurem tintinnabuli instar suspensum
 percutit, ac pulsat: cui etiam Aristoteles t assentire videtur, asserens auris anteriorem
 partem forma anfractui cochleæ similem, in os desinere, quod auriculam plane imi
 tatur. Hæc, ut & secunda cavitas, & ejus cuniculi, eo modo, quo etiam dentium ca
 vitates naturales, membranula quadam t molliissima ac tenuissima vestiuntur. In
 hanc cavitatem, non secus quam præcedentem, à canali, per quem nervum audito
 rium ferri diximus, tria, aut quatuor foramina minima, & adeo exilia, ut vix capil
 lum aliquando admittant, feruntur, per quæ nervuli à quinto pari, aut ipsorum fa
 cultas membranulæ dictæ communicatur. Et licet in prima cavitate maxime auditus
 fieri credatur, non tamen negari potest, quin & in aliis fiat, cum in eas, uti dictum,
 nervorum propagines ferantur, & ab his quoque spiritus animalis & aer congenitus
 contineatur: nihilominus tamen posteriores duæ cavitates videntur potius echo,
 seu soni ad primam cavitatem reflexum, prohibere.

Quod vero x cavitates hæc foramina habeant, variæ magnitudinis, longitudinis &
 figuræ, id propter sonorum differentiam factum: gravis enim sonus & aer copiosus
 amplum foramen; contra acutus, angustius requirit: longitudo vero, soni reflexio
 nem & echo prohibet: quare sonus major, longiores; minor breviores cavernulas
 postulat, quo sonus in iis veluti contabescat, & echo impediatur: figuræ varietas, vel
 ad soni & aeris naturalem delationem facit, quæ per circulationes & gyros, ut pluri
 mum fit: vel ut in iis sonus quiescat, qui citius quiescit, si circumgyretur, quam si re
 cta feratur.

De

De Nervo, qui ad aures fertur.

CAPUT LX.

De hoc Galen. 8. usq. part. 6. de diff. nervor. 6.

Nervus auditorius tandem occurrit, qui quintum cerebri par vulgo dictam constituit, [tab. 14. fig. 1. & 2. a. tab. 13. fig. 20. M.] qui ex^a cerebelli processu transverso prodiens, crassus est & magnus cerebelloque proximus, cum spiritum animale co- piosum conferre debuerit. Hic in primum foramen amplum & proprium, quod ossi petroso intra calvariam insculptum est, se insinuat, & perpetuo latens antarius fer- tur; qui ad processum petrosi fere medium extensus, in duas partes inæquales finditur; alteram magnam, alteram parvam gracilem valde & ^b duriores: durior est altera, non secundum totam longitudinem, sed solum partem eam, qua altera longior est. Gracilior ramus per prædicti meatus foramen superius canalem osseum occultum, quem Aquæductum vocavimus, subintrat, versus capitis anteriora serpit: dein refle- xus cavitatem primam ingressus proprio hoc canali deorsum, & versus posteriora ad pinnae auris radicem foras ex ossè elabitur, & in tres præcipuos ramulos scinditur: quorum major & elatior in auriculæ radicem anteriorem & posteriorem, ejusque fibram excurrit: alter inferior per maxillam latus, in masseterem & buccas moven- tem primum distribuitur: tertius medius & capillaris in partes glandulosas & mem- branosas ad auriculæ radicem disseminatur; reliqui capillares in laryngis & ossis hyoi- dis musculos absumentur, * ob quam communionem vasorum (quæ una est apud Hipp. & Galenum, causa simplicis consensus) aurium & linguæ affectus facile com- municantur, hinc auris membrana vellicata, tussis sicca sequitur: hinc propter ob- structionem nervi auditorii à prima conformatione, qui surdi nascuntur, pariter & muti generantur.

Altera vero & crassior ^c nervi portio, quæ mollis est, & proprie nervus audito- rius existit, cum solum ad audiendum faciat, per prædicti meatus foramen inferius fertur, & etiam in hujus ossis cavernas discurret: ^d potiores tamen rami in prima, tan- quam

^a Ab auribus meatus in oc- ciput penetrat 2. part. an. 10. ab interiore au- ris parte mea- tus ad cere- brum nullus est. 1. hist. an. 11. quinta conju- gatio posterior oritur à cerebel- lo proxime sub nervis gustato- riis (Piccolli.) pluribus surcis- lis procedens, invicem mox connexis, inde- que in duas di- visa inæquales propagines, una altera gracilio- re, utraque per secundum du- ctum auris ad concham & la- byrinthum fer- tur. Plac.

^b Mollities &

durities nervorum à tribus pendet: vel ab exortu; sic qui à cerebro molliores, qui à cerebello & spinali modulla durio- res: vel à distantia: quia longius à principio distant, vel propius sunt: sic optici mollissimi, manuum & pedum duris- simi sunt, vel à contactu duriorum corporum, ut ossium, cartilaginum & membranarum molliem & duritiem com- parant. Plac.

* Sunt qui existiment nervum 5. conjugationis & septima qui linguam movet, in exortu eadem tunica vestiri, propter- ea earum partium affectus facile communicari: sed contrarium suadet autopsia: utriusque enim conjugationis ductus diversi sunt & satis longo intervallo inter se distant. Laur. ^c Major propago secundum longitudinem instar semicir- culi eleganter excavatur, minoremque quod alios fugit, amice suscipit & amplectitur, eoque modo amba simul juncta, oblique in anteriorem & posteriorem partem usque ad extremum sinus in osse petreo sinuli earum gratia exsculpi proce- dunt: ubi minor propago à majore recedens, parvum foramen sibi paratum invenit & ingreditur, miroque admodum flexu oinceffu extra calvariam elabitur. Major autem propago, videtur in tres portiones parum invicem distantes terminari: ex quib. præcipua exiguo foramine in cochleatum os pervio obducitur, Eustac. Idem refert Volch. quem admo- dum & ea, quæ habet Fall. & Ves. in suo exam. in obs. Fallopi. & Fallopi sententiam approbat. ^d Hic conquiescit, nec ulterius subit, ibidemq. ossæ lamina, quæ semitam nervi auditorii à concha & labyrintho dirimit, impingitur, & adno- ditur. Plac.

quam potiore & maiore cavitate terminantur, & instar membranæ exquisitissimi sensus dilatantur & sonorum omnium species ad cerebrum defert, sicque auditus præcipuum instrumentum fit. Quare in hac cavitate potissimum auditum celebrari volunt, cum ad eam spiritus animalis à nervo influat, qui aeri congenito commisceatur, & ita sensum sensibilis ipsum aerem consequi aliqui putant. Ab eadem in alias cavitates geminas per foraminula angustissima dicti canalis, fibellæ feruntur, & membranæ, quæ cavitationem secundam & tertiam succingit, communicantur. Ufus huius nervi ex Galeni^e & Averrois^f sententia, ut auditus sit organum & sensibile extorsum occurrens excipiat, & sonorum imagines ad cerebrum tanquam iudicem deferat.

e 8. us. part. 6.
f 2. Collect. hic
sonorū omnium
imagines ad
sensum com-
munem tan-
quam iudicem
& censorem ve-
hit, Laur.
g Eustachius,
Volcherus, &
Plac.

Verum 8 à quarti paris nervorum cerebri ramo, exilis propago itinere reflexo iuxta canalem osseum, qui in palatum abit, aurium cavitationem permeans ingreditur, & oblique tympano, ac dein malleo supra musculi insertionem adhærescit, & ulterius procedens, os petrosum, in posteriore sede meatus auditorii perforat, mox deorsum, reflexa parum, repit, & tandem cum graciliori duriorque ramo quinti paris iungitur & coit. Hunc nervum voluit Eustachius, filum seu chordam tenuissimam alios vocare, quam per membranæ tympani medium currere asserant; sed unde oriatur, & qua incidat, & num nervus, an arteriola sit, ipsos ignorare.

De Aere Auribus implantato.

CAPUT LXI.

a 7. de Plac. at
lib. de oculis, vi
sus, igneum; au-
ditus aereum;
gustus aquo-
sum; tactus,
terreum; & ol-
factus, fumo-
sum esse scribi-
tur.
b Cum Gale-
no de instrum.
odoratus 2. *c* A primo animalis ortu hunc aerem à Creatore huic meatui immissum præci-
piunt, in quo decepti sunt, id est, si implantatus esset, alium aerem foris non admitteret, nec ingressu exitus pateret:
at ore & naribus occlusis, spiritu cohibito, & buccis inflatis, aer ab ore in aurem impellitur & auditus organa percus-
sit: aer vero impulsus ex transglutinationis conformatione regreditur. 2. Sape status sive halitus crassus tinnitum exci-
tans, masticatione educitur. 3. Via manifesta est, & satis ampla à secunda cavitate in os, per quam cavitas ista masti-
catoris aliusve expurgatur. Quare opinandum, aerem implantatum non esse in secunda cavitate inclusum. A cere-
bro per nervos eo transfundi, ut major pars opinatur, vix potest, cum nullus nervus in aurem terminetur. Est quidem
via aperta ab ore & naribus, per quam aer externus in secundam cavitationem immitti potest: sed num hic aer ad audi-
endum aptus sit, non ita liquet: ceterum cum hic spiritus nihil præter aeris in sono mutationem pati debeat, consicien-
dum est, per os & nares aerem externum immitti in secundam cavitationem, indeque generari, vel saltem forveri aerem
implantatum. Imo etsi aliunde quam ab externo prodiret aere, tamen sine dubio non erit sincerus, purus, & impermix-
tus. Aer hic qualiscunque sit, est primum & præcipuum audiendi instrumentum, pars scilicet animæ. Secundaria au-
tem instrumenta sunt ea omnes partes, quæ ad audiendum aliquid adjuvanti præbent, Volcherus. *d* 2. de anima 8. tex.
33 quo capite de sono, voce, & auditu agit: sensorium audiendi aer est 2. part. an. 10.

latus fuit: aliis congenitus, implantatus, complantatus & inædificatus. Conflatur autem ex seminis substantia aerea, eaque purissima, cui sanguinis materni substantia aerea purissima affunditur, ut proprium quasi corpus sortiatur. Hic in aurium ^e cavitatibus continetur, & hoc ex eo probari potest, quod omnes cavernæ, prima excepta, in qua ossicula, musculus & chorda, vacuæ sunt, cum tamen vacuum in natura non detur: quare & Aristoteles alique veteres aere plenas esse asseruerunt.

Est autem tenuis, purus, omnis soni expers, immobilis, multus & copiosus, & ab externo separatus; tenuis, & purus, quo promptius & perfectius sonum externum admittat: nam per crassum & nebulosum aërem, sonus infirme vehitur, & difficulter auditur: unde & voces nostræ hyberno tempore, quam æstivo graviore sunt: quia, ut Philosophus voluit, aer tam interior, quam exterior hyeme crassior est: crassior autem eum sit, tardius movetur. Omnis soni expers; quare noctu res melius audiri possunt; quia nullus strepitus est, ut Philosophus monuit: accedit, & quod aer interdum densus, quia luce radiisque refractus, noctu vero rarior, quod ex eo ignis & radii decesserunt. Idcirco aer externus, qui à sonis alteratus, & undæ instar fluctuans ad aures defertur, aurem internam ingredi non debuit, neque aerem congenitum tangere: nam si ingrederetur, & auditus imperfectus redderetur, & auditus instrumentum citissime labefacteretur; quod oscitatione ex Aristotele probatur: inter oscitandum enim minus audire possumus, eo quod multum spiritus effluentis, aures etiam intrinsecus subit, ut motio vel sensu percipi possit: sic dum interior, exteriori occurrenti renititur, strepitus in auribus nascitur, spirituque circumactio, minus audimus.

Immobilis esse debuit per se & natura sua, ad bene audiendum, ut omnes soni differenter, ac ex æte suscipiat: qui etiam aerem internam requirit, aurium tinnitus & sonitus & aer ventorum agitatione commotus ostendunt. Mobilis tamen est, non quod sponte semper moveatur, sed quod ad levem impulsu ab aere externo moveatur, & motu locali agitur, quatenus membranulam tympani pulsans, simul & aerem internum movet, quo soni speciem consimilem induat. Copiosus & multus, talis enim ad soni plenam receptionem conducit.

Ab externo separatus est intercedente membranula tympani, ne auditus instrumentum labefacteretur: ab aere enim externo ingrediente modo frigidior, modo calidior, modo sonus: adstringitur membranula tenuissima.

ma, à qua undique circumsepitur, qua mediante committitur tribus ossiculis: geminum est dextrum & sinistrum: principium, à quo exoritur, non agnovit, cum pars sit à ceteris distincta, peculiarem substantiam & corpulentiam sortita: at principium ex quo, ei attribuitur: sit enim ex aerea seminis substantia, cui affunditur aerea substantia sanguinis materni, ut illius moles ac corpulentia aerea perficiatur, & sic consurgit corporis humani pars aerea, qua pars est similis, principalissimum audiendi instrumentum: alia vero partes addita ad felicem auditionem exercendam, f. 11. Problem. 17. Cur voces nostræ graviore sint hyberno tempore, querit.

g. 15. Problem. 33. Cur nox ad audiendum aptior sit, quam dies querit: Utrum, ut Anaxagoras ait, quod aer interdum stridet, à Sole concalfactus & obstrepat, noctu requiescit, utpote cum omnis calor absuerit. h. 5 gen. an. 2. 11. problem. 29. qua de causa oscitantes minus audire possumus, querit.

i. Aer, qui in auribus immoratur, siue intus conditus est, ut sit immobilis, quo ex æte sentiat omnes differentias motus, Arist. 2. de Anima 8. alii immobilem dicunt, quia non moveatur ab alio, sed idem in auribus semper maneat: alii, quia naturalem nullum habet sonum, sed potest omnes sonorum differentias suscipere, Laur. k. Aliis, ut plures sonos, qui passim eodem tempore fiunt, recipere valeat: contra Plac. non enim ob partium multipliciter sonos plures excipit, cum à qualibet ejus parte recipiatur, quicunque in aurem illabitur.

^e Aer vernaculus in secundo auris meatus

(intelligit e-

vitatem pri-

mam) contine-

tur, quem in-

edificatum &

immobilem vo-

cat Aristoteles,

Laur. Audien-

di instrumen-

tum, seu corpus

aereum, in ex-

tremo eo antro

sen ductu, qui

exsculptus est

in lapideis ossi-

buis, cui auris

assiste, si-

tum est: figu-

ram globosam

imitari proba-

bile est, cum

hanc natura,

quoad fieri po-

test, partibus

omnibus imper-

tiat, magnitu-

dine maxime

exiguum est,

cum minimum

quid satis sit ad

recipiendos so-

nos: adstringi-

tur membra-

nula tenuissi-

lidiore, nervi auditorij & propter continuitatem cerebellum & cerebrum laderetur. Imo, si aer externus ipsi congenito proxime jungeretur & commisceretur, cum externus in motu perpetuo sit, & satis crassus & impurus, saepe etiam fumosus, interdum animalculis parvis refertus, auditus proculdubio periret: nam & congenitus crassus, caliginosus, pulverulentus ac fumosus redderetur, & animalculis repleretur. Sape etiam propter aeris externi violentum motum, congenitus, & cum eo spiritus animalis e propria sede pelleretur, & auditorius meatus surdus penitus evaderet; hujus etiam membranula beneficio, sub aqua existentibus, aqua ingressus & auditus privatio impeditur: sicuti piscatoribus & iis evenit, qui in aquam frequenter demerguntur: iis enim aures rumpi, & auditu privari, testis est Aristoteles in Problematibus.

Hic ejusdem naturae cum aere externo non est, sed cum eo similitudinem quandam habet, quod ex his Galeni verbis elici posse videtur: non autem à quovis sensibili omne sensorium immutatur, sed splendidum quidem & luminosum à coloribus: aereum à sonis; vaporosum ab odoribus, & ut in summa dicam, simile simili notum atque familiare. Quare hujus aeris naturam eandem esse cum animali spiritu, quem aereum esse constat, censemus: & utriusque eadem & conservationis & refectionis ratio: hic successive generatur & dissipatur, quemadmodum spiritus animalis quotidie dissipatur, & quotidie novus regeneratur; sic aer auribus inclusus ex parte & generatur & dissipatur: nam si omnino periret, simul etiam audiendi potentia periret. Reficitur autem & novus restituitur, ex aere per nares & per os inspirato, maxime vero per os, qui per viam amplam & patentem ad aures per canalem, per quem etiam repurgatur, transfluit.

Ullus hoc audiendi facultas utitur, tanquam medio interno, ad sonos & voces suscipiendos & transvehendos ad nervum auditorium, quo cognoscantur, & quemadmodum in omni alio sensus instrumento ad sensus externos perficiendos, medium & internum & externum requiritur: internum quidem, ut in visu, humoraqueus;

1 Simplicius, aerem hunc implantatum, animatum esse scripsit.

2 Aereum hoc corpus sanguine per venas de lato nutritur, Et id quidem per diadosin seu transsumptionem: quemadmodum crystallinus vitreo nutritur per diadosin, ex hoc ve-

luti exurgens, quantum ad sui nutritionem satis est, sicuti vitreus ex membrana aranea alimentum sibi accommodatum transsumit, & quidem hac ratione: in aranea vena sunt, & sanguine nutritur, quod post hujus nutritionem superfluum est, à vitreo transsumitur, quo cum fuerit nutritus, quod ex vitrei nutritione superfluum est, à crystallino ut idoneum alimentum transsumitur, & ita crystallinus nutritur alimentum à vitreo preparato, & vitreus alitur alimentum ab aranea preparato, utriusque superfluum. Idem in aereo audiendi instrumento usu venit. Nam membrana illud investiens venas accipit, & sanguine nutritur, quod ex ejus nutritione superfluum est, & à sanguinis natura jam plurimum distat, ab aereo illo corpore in propriam passionem transsumitur & attrahitur. Verum quo & vita fruatur hoc audiendi instrumentum, omnesque partes ei ministrantes, arteria in organum audiendi structuram constituunt, Piccollo. n. Aer sensorium audiendi est, Arist. 2. part. an. 10. 5. gen. an. 2. Veteres enim hunc aerem princeps & primarium auditus organum esse existimant; & hujus aeris ratione auditus naturam aream esse docuit Arist. Spiritus aeris inclusus proprium auditus organum est, Varolio: Aer hic primum & precipuum audiendi instrumentum est, pars scilicet anima, Volch. Auditus principalissimum instrumentum est quo audiendi facultas in vocibus & sonis percipiendis & judicandis utitur, Piccollo. hujus munus sonos externos suscipere, & sic auditus precipuus auctor est, Aquap. est materia soni recipiendi, medium transvehendi: receptum enim sonum non cognoscit, vel judicat, cum inanimatus sit hic aer: anima autem actio aliqua, ab eo quod anima experta est, edi non potest, Placent. ad auditum maxime necessarius, sine quo auditum vix fieri puto: sed princeps esse auditus organum nunquam mihi persuaserim, &c. maxime cum anima experta sit, sed potius medium internum, Laur.

queus; in gustu, saliva; in odoratu, ossa spongiosa; in tactu, cutis ^o medium internum ^o Cuticula, ^{Laur.} censetur, in quibus formæ à rebus denudantur, & ita denudatæ ad princeps sensorium trajiciuntur. Sic in auditu aer hic congenitus est, qui ad soni receptionem ac delationem auribus implantari debuit. At rursus, quemadmodum in omni sensus instrumento medium internum datur, à parte principali distinctum, & cui tanquam præcipuo instrumento organi actio debetur, sicut in visus organo, albugineus humor medium internum censetur; pars vero principalis crystallinus humor, recipiens, non vero dijudicans. Sic in auditu medium hic aer est, pars vero principalis, nervus auditorius ad cerebellum deferens.

Auditus quomodo fiat, & de soni natura.

CAPUT LXII.

Consule Aristotelem 2. de anim. cap. 8. 5. gen. anim. 2. lib. II. cum titulum de iis, quæ sub auditum cadunt, sive de audibilibus: & sect. XI. Problem.

Cum Philosophi naturalis sit, non Anatomici, audiendi modum explicare, paucis ratione structuræ auris, quæ veteribus majori ex parte incognita fuit, modum exponemus. Auris audiendi sensorium est, & auris actio, sensus est auditus: ad quem sensum tria requiruntur; objectum, medium, & instrumentum. Objectum res sunt audibiles, hoc est, soni. Sonus ^a qualitas est prodiens ex ^b aere à duris solidisque corporibus, iisque lævibus, concavis & amplis, affatim magnoque impetu invicem collisus & concurrentibus, percussio; quam definitionem sequentia explicabunt. Medium aliud externum est, aliud internum. Externum, secundum Philosophum, aer ^c est, & aqua; sed in aqua vel nullus, vel levis admodum sonus fit, qui ab homine sub aqua latitante exaudiri, à piscibus tamen optime exaudiri, ii qui mugilum piscationi nocturnæ interfuere, norunt. Et quantumvis aqua descendens in aquam, sonum edat, hoc ab aqua quidem fit, sed in aere ejusque interventu. Internum medium aer est congenitus, aurium cavernis inclusus. Instrumentum licet dici possit tota auris interna, suis cavitatibus, aliisque particulis supra explicatis donata, & communiter à Philosophis & Medicis aer congenitus præcipuum & proprium auditus organum statuatur, eo quod, sicut in oculo crystallinus, objectum videlicet lucem suscipiat, sic aer congenitus sonos: nobis tamen nervus auditorius id esse videtur. Cum Galenus enim statuimus, non solam alterationem seu receptionem, quæ per aerem congenitum fit, sensum esse, sed alterationis dignotionem; quare per aerem hunc, soni & voces ad nervum, tanquam ad substantiam sentientem, & inde ad sensum communem, quo dijudicentur, transferuntur. Nam si dignosci debent, substantiam sentientem tangere debent, cum omnis actio per contactum fiat. At facultas sentiens cum extra corpus non feratur, necessum est, sonum ad aurem ferri: qui cum à duris corporibus se mutuo percutientibus, tanquam à causis efficientibus generetur: (molliora namque ^d facile cedunt, & vi impellentis non resistunt) & in aere tanquam materia recipiatur: aer sonum comitatur, & etiam longius vehit; ad aeris enim motionem sonos quoque deferri, campanæ distantis sonus declarat, quando ventus versus nos

LII

flat:

fiat: sic etiam, quando duo corpora dura simul percutiuntur, percussione[m] videmus, antequam sonum audiamus: sonum enim tunc primum audimus, quando aer motus sonum detulit; siquidem motus huiusmodi momento non fiat, sed in tempore: qui longius plus minusve vehitur, prout vehementior & celerior duorum corporum renitentium percussio (quod Philosophus in sono requirit) fuerit, & consequenter ipsius aeris ictus & repulsus; quod in tympanis videmus: in quibus si corium ipsorum humidum laxumque fuerit, sonus obtusus vel nullus redditur; sic & in omnibus musicis instrumentis fidibus obductis, contingit. Aer soni qualitate affectus aerem proximum impellit & alterat, & successione vicinior commovetur, donec ad aures externas perveniat: idque eo modo, quo lapillus^e in aquam injectus, circulos undosos

^e Polch. Laur.

Aquapend.

^f Quomodo aures fiat, op-

niones varia: antiquitas enim Anatomesignara aliter sensit, quam nunc fiat. I. Empedocles, qui putavit, auditum fieri, quod aer aurium internam partem impellat; cum enim ea in cochleæ morem convoluta sit, ac tanquam tintinnabulum edito in loco appensa, omnes aeris appulsus percipit.

II. Alcmeonis, qui ideo nos audire credidit, quod aures intus sint vacua; vacua enim omnia, cum in ipsa vox incidit, resonare, quare Arist. 2. de anim. 8.

III. Diogenis in capite aerem esse, qui vocibus percutiatur & commoveatur; contra quem Hipp. libr. de carnibus. Sunt quidam, inquit, qui de natura scribentes, cerebrum sonum edere prodiderunt: hoc autem fieri non potest; nam cerebrum ipsum humidum est, & nullum humidum resonat, sed quia sicca sunt. Quae vero resonant, auditionem faciunt.

IV. Hipp. de locis in homine, primū perforata est, qua parte audimus: etenim vacua circa aures loca, nil aliud præter strepitum & clamorem inaudiunt: quicquid vero per meningem in cerebrum pervenerit, id plane hac parte auditur, ubi unicum foramen per membranam circumvolvuntem penetrat. Et lib. de carnibus. Hanc vero ob causam auditio fit, aurium foramina ad os durum & siccum lapidi simile perveniunt, cui cavitas fistulosa addita est. Soni autem in durum impingunt, & os cavum per ipsum durum resonat. Pellicula vero in ipso meatu auditorio, iuxta os durum tenuis est, ad instar tele aranei, præ reliquis pelliculis siccissima, quod autem siccissimum est, id ad sonum concipiendum maxime facere, multis argumentis comprobari potest: cum ergo plurimum resonat, tum maxime audimus.

V. Platonis, aer auribus insidens pulsatur, pulsus in principem animi sedem mittitur, sicque auditus fit. Aristoteli auditus fit, ubi aer movetur, à duobus corporibus solidis, quorum id, quod verberatur planum est, quo aer inde resistit. Hac autem inter se vi, & vehementer percuti debent, quo aer percussus non diffundatur, & percutientis motus aeris dissipationem præveniat: nam id sonum efficit, quo continuatione aerem unum usque ad auditum movet. Inest autem auditui quidam insitus aer: atque cum auditus in aere fit, cum aer externus movetur & ab eo internus movetur & agitur, qui alias per se immobilis, ut differentias motus omnes exacte sentiat.

VI. Galeni 8. us part. 6. ad aures descendere propaginem quandam à cerebro erat necesse sensibile extrinsecus occurrurum exceptura, sed quoniam sonus & vox id ipsum erant: si ve aer percussus, si ve aeris quadam percussio: nihil enim inter est, modo unum hoc consuet, motum, qui percussione fit, quasi procellam ac fluctum progredi oportere, atque ad cerebrum ascendere.

VII. Vesalii & ejus asseclarum, nervum quinti paris per meatum quandam tortuosum procedere, & in membranam aurium foramini obductam se explicare: quae cum tenuis, sicca & valde tensa sit, ab aere pulsata accedente ossium duritia, quae antrum cochleam ve emulatur, sonum efficere, sine alio Natura artificio. Sic Columbus, quinti paris nervi adminiculo audimus: qui ad labyrinthi dimidium crassior redditur, & tantum non membranam constituit.

VIII. Masse, ex motu malleolorum causatur sonus si ve consonantia, unde fit auditus.

IX. Voleheri aer externus soni qualitate affectus in membranam myringam incurrit: hac pulsata, ossicula ei colligata commovet: Ossicula vero nervum membranam per transversum expansum percutiunt. Idem nervus in membranam repercutitur: unde aer inclusus alterationem & sonos excipit: Soni per aurium tortuosos & fluxuosos anfractus citra ullam turbam feruntur ad nervum auditorium: hoc exploratore & ministro, strepitus imago ad sentiendi principium transmittitur. Idem fere Laurentius, aer externus à duris solidisque corporibus percussus, & soni qualitate affectus vicinum aerem alterat; hic proximum afficit, donec continuatione quadam ad aures perventum fuerit, qui per meatum auditorium primum membranam alliditur: hac pulsata ossicula tria movet, ejusque characterem momen-

re imprimit: hunc sonum vernaculus aer statim excipit, quem per fenestellas in tortuosos anfractus & labyrinthum, mox in cochleam deferret, ab hac in nervum auditorium trajicit, & ab eo ad communem sensum, tanquam censorem & judicem.

X. Piccolhom. sic fit auditio: res sonum edens, soni speciem aeri imprimit, huncque movet & propellit, usque ad audiendi instrumentum, quod cum aereum sit, quo sonorum species recipiat, moveri quodammodo debuit: proin stapha, quasi pensilem tenens vesiculam illam, (id est, membranulam tympani) cui aereum audiendi instrumentum conclusum est, & cum huic incus adhærescat, malleus percussus incudem commotus ab aere sonoro foris intro appellense, necesse est, instrumentum auditus eodem motu cieri, quo exterior aer, ideoque eam omnino soni speciem & similitudinem audiendi facultatem movere, qualis ab aere illuc geritur. Verum nervi auditorii in hoc aereum audiendi instrumentum terminantur: cum horum nervorum membrana amplificata, corpus illud aereum amplexetur, sicut nervi optici ad humorem crystallinum perveniunt: & ut hi à sede sensus communis spiritu animali vectore facultatem videndi ad crystallinum ferunt: ita illi ab eadem sede facultatem audiendi in principalissimum audiendi instrumentum, ut rerum audibilibus perceptio fiat, vehunt: sicque auditus cum rerum audibilibus sonum apprehendit, ad mentem deferret, tumque ratio mensve sensitiva aut intellectiva colligit & cognoscit illud, quod sonum edit, vel campanum, vel tympanum, vel quid aliud esse.

fos excitat, quorum alter alterum impellit, quoad aliquā ad ripam impellat, vel in latis aquis sponte solvantur: ita ex aeris percussione, velut circuli in aere generantur, donec successione ad auditus organum perventum sit, & hanc aeris percussus continuationem, undam vocalem, Avicenna & veteres Anatomici nominant.

Quod si lapillus sive gleba aliudve magnum sit, atque magna vi injiciatur, ita ut suos gyros vehementer in ripas fluminum vel stagnorum impulerit, circuli repelluntur, & geminatim ad primum gyrum recurrunt. Simili ratione fit, si adversus loca concamerata, & testudinibus obducta, sylvas atque montes loquamur, vel clamemus; nam in iis vox duplicatur, ac echo excitatur. Verum non omnis aer æqualiter sonum excipit: nam purus & tenuis, & clarus, vehementer & celeriter motus à corporibus duris, & superficie lata, (acus enim acum feriens, sonum, ut loquitur Philoſophus, non efficit) percussus citius ac clarius sonum suscipit, quam aere & corporibus contrario modo se habentibus. At aer, qui loco concavo continetur, omnium perfectissime sonorum species suscipit; quia per reflexionem complures post primum efficiunt ictus: ad sonum enim aeris reverberatio desideratur, quod antra, specus, sylvæ, montes cavernosi, putei, locaque cava atque angusta attestantur, quæ non tantum sonos, verum etiam voces articulas exceptas reddunt. Hæc de Natura & generatione soni; nunc de communicatione aeris percussus cum aere interno & partibus internis.

Aer externus, tanquam medium externum, à duorum corporum duriorum mutua percussione impulsus & commotus, & soni qualitate affectus, sonum, qui inde exsurgit, ad aurem deferret, qui per meatum auditorium semper apertum, ad membranulam tympani impellens eam commovet, qua commota aer congenitus quoque movetur, sonosque vel ejus characteres recipit, quos ex cavitate prima per stapedis foramen, & fenestellam ovalem ad sequentes cavitates labyrinthum & cochleam transfert; hinc ad nervum auditorium & ipsius principium cerebellum, & ad communem sensum, tanquam judicem, quo sonorum differentias dijudicet, deferret. Et

f Meatus sensoriorum omnium tendunt

ad cor, aut ad
mam.

LII 2

cordis proportionale, si corde carent: itaque meatus audiendi, quoniam hoc sensorium aeris est, qua spiritus nativus in aliis pulsus, in aliis spirationem facit, hac desinit, s. gen. an. 2. Sunt, qui cum viderent, nervum auditorium ad primum

nam earisatem, ubi aer congenitus plurimus est, dixerunt, ibi sonum tantum recipi, tum substantiam sentientem tangere, Circa sensum seu dignotionem soni contingere, quod verum non est, Aquapend.

quia nervi auditus in ponte cerebelli, unde prodeunt, conjunguntur, sonus sub ratione unius, non duorum, apprehenditur. At ne plus justo membranula intro pellatur, Natura ossiculis tribus & musculis, uti sup. dictum fuit, prospexit.

*g De sensu & sensibili.
h 3. De anim.
tex. 68. seu in fine libri.*

Utilitas autem sensus auditus secundum Aristotelem est, ad § adquirendam sapientiam, & prudentiam: nam sermo, cum sit audibilis, disciplina causa existit: dein ^h ut significetur aliquid ipsi, quemadmodum vocis & linguae utilitas est, ut significetur aliquid alteri.

Glandula ad Aures.

CAPUT LXIII.

a Glandula sunt ad utramque aurium partem circa venas jugulares colli, Hipp. de gland.

EXterius circa aures ^a corpora sunt glandulosa & solida, sive glandulae insignes & crassae [tab. 23. fig. 1. G.] quas Parotides aliqui vocant: sunt autem non tantum pone aures, sed ad utrumque latum & sub aure. Quarum usus praecipuus partes circumjectas humectare: nam ob validos & frequentes incidendi, confringendi, alimentum comminuendi, ac tandem loquendi motus, articulatio his destituta, facile exsiccari, & motui inepta reddi potuisset: quamvis etiam muscutorum temporalium tendinibus maxillae processibus infixis, propugnaculi loco sint. Dein vasorum divisiones muniunt ac tuentur. Tum, ut aliquando cerebri excrementa suscipiant, quare cerebri emunctoria quibusdam dicuntur: & earum tumor à Galeno ^b *περὶ τῆς* dicitur, qui causatur à materia in eas vel à capite decumbente, & ibi postea impacta: vel à toto corpore confluyente, quod aliquando per crises in febribus vfluvenire solet.

b 3. περὶ τῆς

e Sic refert Vesal. quibus omnes glandulas pro tertio genere glandularum in faucibus existensium, recenset.

Sunt & aliae numerosae glandulae, sub maxilla inferiore, toto spacio à maxilla circumscripto [tab. 27. f. 2. inter μ. O. R.] sub musculis ossis hyoidis & linguae: quae glandulis iis, quae sub axillis & in inguinibus sunt, correspondent, & peculiari nomine carent: licet vulgus in animalibus, quibus vescimur, & potissimum in porcis sylvestribus in deliciis habeant, ^c Animellas & Lacticinia nuncupent.

Harum qui & superiorum usus: in quibus etiam varii affectus, praecipue vero Scrophulae, contingunt.

De

De Naso Olfactus instrumento.

CAPUT LXIV.

De Naso egit Aristoteles 1. hist. anim. 11. & 2. part. anim. 10. & 16. Nasi constitutionem ejusque partes examinavit Galenus lib. de instrument. odorat. 2. & 11. us. part. 17. ubi de ejus quoque tunica egit: de ossibus vero lib. de ossib. 4. & 11. us. part. 19. de musculis, lib. de dissec. muscul. 3. & 11. us. part. 17. & 4. ad. an. 4. de foraminum narium usu 8. us. part. 6.

Cum ea, quæ ad sensum auditus pertinent, expediverimus, nunc de sensu olfactus sermo erit: & quemadmodum Aurē aliam externam, aliam internam diximus: sic & Nasum alium externum, alium internum facimus. Nasus ^a externus, ^a Naso inest ve
quod homo & animalia quadrupedia & vivipara, non vero ^b aves, & serpentes (quæ ^b nuntas, & quid
foramina tantum habent) donantur, ^c dicitur, à ^c pēw, quod per eum sordes & capi- ^c regium, quasi
tis superfluitates defluant; aliis ^d μυχτῆρ dicitur, à ^d mucore, excremento pituitoso per illum ^d peculiaris qua-
destillante: Est autem ^e faciei pars protuberans, spiritui ^e meatum præbens, liquidem ^e dam imperan-
aerem ea parte reddamus & accipiamus: aliis instrumentorum olfactus propugnacu- ^e di dexteritas in
lum, cum tamen ea non contineat, nec calvaria excidant, ipsis tamen ministrare, ne- ^e eo eniteat. Egi-
gari non potest, cum naso absente, minus recte olfaciamus. ^e prii in suis Hy-
^e roglyphicis, sa-
Situs est inter oculos, siquidē pars spirandi medium ^e tenere, & ante posita esse de- ^e gaces homines
bit: quare in ^e medio trium sensoriorū, visus, auditus, gustus natura constituit; quasi ^e notabant naso.
per lineam fabrilē directam, ad respirationis agitationem. Quare & sursum est, ^e Festus saga-
quia, ut ait & Cicero, omnis odor ad superiora feratur (quem sic commodius reci- ^e ces nasutos vo-
pit) & quod cibi & potionis judicium magnum sit, non sine causā oris vicinitatem se- ^e b Aves & ser-
cutus est, & in homine tantum loco altiore, propter venustatem collocatus est. Hic ex ^e penses, & qua
basi lata sensim in acutiē obtusā definit: vel potius ab ⁱ oculorum angulis in- ^e ex quadrupedi-
ternis acuto mucrone incipiens ad labri fere principium finit. ^e bus sanguinea
^e ovipara nō-
Dividitur in partē superiorem immobilem, quæ ossea est, & partē inferiorem, ^e gus tū μυχτῆ-
quæ mobilis ^k & cartilaginea est: totius autem nasi pars superior, dorsum dicitur, e- ^e gov, foramina
jusque pars acuminata ^l πῦρς πᾶρς ^l nasi spina vocatur. Inferior vero pars, ubi in nares ^e narium ante
se fundit, ^m ἀρροπίων ^l imum nasi dicitur; quemadmodum & extrema rotunditas ^e os habent, sed
ob rotunditatem, nasi orbiculus & globulus nominatur. At intrinsecus ^e non ita expla-
septi beneficio in duos sinus diuiditur, quos ⁿ πῖτῖνες, nares nominant, quod per eos ^e nata, ut nares
odor vel spiritus innare non desinat; aliis ⁿ μυχτῆρες, ⁿ & τῶν πῖνῶν πόροι ^o dicuntur. Di- ^e sint, nisi spiran-
visionis usus, quo olfaciendi actio præstantior fiat: nam in sentiendi partibus exce- ^e di officio, qua
pto tactu (in quo incertum est) sensus bipartitus est, propter duplicem corporis par- ^e suo rostro conti-
^e nent: animalia
tem vero, quæ non
spirant nari-

LII 3

bus carent, & alia branchiis, alia fistula, alia præcinctu, ut insecta odores sentiunt, 2. part. anim. 16.
c Arist. 1. hist. 11. 2. part. 16. Gal. de instrument. olfactus 3. & in Introduc. d 1. hist. 11. Gal. instrument. olfactus 3.
e 2. part. an. 10. f 1. hist. an. 11. g 2. de natura Deorum. i. Sic & Laur. k Mobilis nasus est, & non sicut auris
immobilis secundum naturam 1. hist. 11. l Polluci.
m Russo & Polluci. n Arist. 2. part. 10. o Gal. instrument. olfact. 3. τὸ ἀχρεὺς κενόν: meatum vero inanem
vocant, 1. hist. an. 11.

tem dextram & sinistram: sic & μυκτήρων, ait Philosophus, ⁿ vis bipartita est, quæ si alter sita distractaque esset, ut aures, suo officio fungi non posset; cum olfactus in nares habentibus, per spirationem fiat. Prodest quoque hæc divisio, quo vna obstructa, altera pateat, quo & inspirare & expirare queamus; hinc utraque obstructa, os ipsum apertum, narium usum, ne homo suffocetur, præstat. Notandum insuper & utrumque foramen, quod in singulis naribus unum est, circa nasi medium in duas partes quasi divisum esse: quarum altera pars supra palatum fertur, in oris intima & fauces: unde fit, ut aliquando potus per nares effluat: altera sursum ad os spongioides ascendit; hinc ea, quæ naribus iniiciuntur, naso clauso in os delabi solent. Narium exteriores partes foramina ambientes πτερυγίαλæ & pinnae dicuntur.

Constat autem nasus, cuticula, cute, musculis, venis, arteriis, nervis, ossibus, cartilaginibus & tunica interna.

Cutis, qua integitur, tenuis est: cartilagini & musculis firmissime affixa, ut vix illacerata separari queat; hæc ad pinnas progressa introrsum vergit, ut replicata narium margines ipsamque columnam constituat: nam sub septo, in narium medio, ubi pars carnosâ prominens labioque vicina, quæ κίων, ^r columna dicitur, & in aliquibus propendet, crassa & fungosa est, ita, ut cartilaginem, à qua tamen distingui debet, æmuletur, & in ambitu pilis cingitur, qui Vibrissi dicuntur, ^r quod iis dum vi evelluntur, caput vibretur: quorum usus, ne animalcula nares intrare possint, vel etiam inspiratione attrahi Pinguedine destituitur, ne ejus moles adaugeatur, quod deforme esset.

Verum cum in ^t inspirationibus paulo majoribus & subitis, & efflationibus, alarum nasi motus non parum conferat, idcirco eas mobiles esse oportuit: & cum ex animalis voluntate moveantur, idcirco eis musculos ^t inseri necesse fuit. Et si enim dilatio & contractio alarum, à labiorum musculis, quatenus etiam narium alas tangunt, perfici videatur, quemadmodum etiam primus buccarum ⁿ musculus, qui à membrana carnosâ constituitur [tab. 26. fig. 1. f.] in nasi radicem inseritur: attamen musculos naso peculiares duplices in nasutis facimus, alios dilatationi inservientes, alios contractioni: illi nares claudunt (quamvis & in inspiratione ⁿ alæ introducuntur) hi referant: qui tamen exigui sunt, ut partium ab eis movendarum ratio postulabat. Verum muscoli narium duplices sunt, communes & proprii, hique vel dilatant, vel constringunt. Communis unicus est, portio musculi orbicularis superne labra cingentis, quæ cum labrum superius deorsum trahitur, nasum deprimit.

Muscu-

p Gal. instr.
olfact. 2.
q Introduc.
auctor.

x Polluci &
Russo.
f Paulo apud
Vesalium.

t 11. us. part.
17. Musculo-
rum numerus
varius; Gal.
diff. muscul. 3.
duo usque qua-
que exigui à
malis incipien-
tes utrinque u-
nus, in sibi re-
spondentem na-
si alam ipsam
aperientes, inse-
runtur: & 11.
us. part. 17. Sub
tus malas juxta

principia musculorum ad labia descendunt enascuntur, cum quibus quadantenus conjuncti semper magis, magisque obliqui ad nasum feruntur: hos solos etiam Varolius agnoscit. Vesalio quatuor, duo externi dilatantes, duo interni constringentes: Columbo duorum dilatantes, ab illis tamen diverſi, claudentes non agnoscit: à musculis enim labro opem ferentibus, non à propriis fieri statuit: quando enim naribus aliquid attrahere volumus, superius labrum constringere cogimur. Fallopio sunt octo, quatuor à Vesalio propositi, duo à Columbo, quibus duos adhuc addit: Platero sex, quatuor Vesalii, duo Fallopii; duos vero Columbi prætermittit. Piccolh. duos dilatantes Columbi enumerat, addens nares adstringi à musculo labii superioris; quemadmodum & narium curis à musculo maxilla superioris corrigitur. Laurentio, quatuor per exigui, quorum duo dilatant à fronte acuto carnosaque principio, duo constringunt, labiorum musculis continui.

u Primus buccarum, labiorum & nasi, Vesal. primus musculus faciei, Fallop. x In vehementioribus inspirationibus ala spiritus impetum sequuntur, Gal. diff. muscul. 3.

Musculi nares dilatantes quatuor sunt, duo y exigui ab osse malarum juxta labiorum musculum tertium: & canale osseo, qui circa nares est, utrinque unus oritur, y s. par buccarum, Vesal. carnosus magis, quam nervosus, & supra dorsum nasi delatus, partim in pinnam anteriorem, partim in labii superioris partem, quam phyltrum vocant, inseritur; ipsam simul cum ala nasi extrorsum sursumque trahendo, nares non nihil referat [tab. 26. fig. 1. F.] Nam cum olfactus tractu^z perficiatur, ex tractu alae nasi simul accedunt, & foramina narium aliquantum obstruuntur, quare in olfactu foramina narium ab his aperiuntur, & aperta conservantur.

Duo alii^a a futura frontis, ubi musculorum frontis fini permiscuntur, ad medium upercilium & spina narium acuto, & carnosio principio exoriuntur, trianguli formam pene referentes, qui deorsum oblique supra nasi ossa delati, latioresque redditi, in pinnas implantantur, quas fibris suis rectis sursum trahunt, naresque dilatant.

Nares^b constringunt quatuor: quorum duo^c circa radicem pinnae narium exoriuntur carnosae, sed parvi, qui supra alam transversim latissimam amplexantes, ad angulum narium inferuntur, qui ad principium contracti, ala depreffa nares non nihil obcludunt, [tab. 26. fig. 2. juxta K.]

Duo alii^d in narium amplitudine sub tunica succingente reconditi, tenuissimi sunt, membranei, a nasi ossis extremitate exortis inferuntur, ut eas introducendo constringant, qui in nasutis, quemadmodum & caeteri reperiuntur, [tab. 26. fig. 2. sub K.] His remotis, nasi corpus nudum apparet, ex duabus diversis substantiis constitutum, cum pars superior ossea, inferior cartilaginea sit.

De
lopio, in
Institu-
t. 5. par fa-

faciei, at in observat. 6. par. quod non membraneum, sed carneum videtur, nec a malorum osse tantum oritur, sed etiam a lata cavitate, vel canale osseo, qui circa nares est: Platero certius nasi musculus; Varolio superiore maxilla exorti in anteriorem alarum partem inferuntur; & de his Gal. egit. Verum Columb. asserit portionem musculorum labii esse, qui narium pinnae adhaereat, quam aliqui nasum dilatare velint, & sic quatuor fore musculos nasum dilatantes.

z Varolius.
a Columb. horum inventionem sibi tribuit, quos solos recenser: addendo eos, quos alii descripserint, portiones esse musculorum, qui in superiore labro siti sint. At Fallop. pro sexti paris parte altera in observ. descripsit; addens, posse pro pari musculorum recenseri, vel alterius paris partem asserere. Laur. duos dilatantes vocat: b A nullo musculo nasus contrahitur, sed cum musculi duo aperiunt ab actione cessant, mediam tunc ipse acquirit constitutionem, deorsum trahitur nasus, quod labra per appensione consequatur, Gal. diff. musc. 3. c Fallop. in observ. septimum par: in Instit. vero octavum par, quod a Vesal. praetermissum scribit. Plat. narium secundus musculus, qui addit, Vesalium frontis musculum eo pertingere existimasse. d Vesalio sextum par buccarum: at 6. par faciei Fallop. in Institut. Galenus & alii duorum musculorum nasum dilatantium meminerunt, quos cum labii superioris musculus confundere: praeter hos Vesalium duos alios nasum elaudentes describit: quos imaginatione tantum intuitus est, cum nusquam sint, Columbus: at Fallop. in observ. hos aliquando adesse vidi, aliquando non, & Columbus figmentum esse asserit, ego non audeo ita aperte id negare, quia in aliquot nasutis cadaveribus mihi visus sum videri: octavum par est, quod Vesalio sextum facit: Plat. primus narium, qui in historia nasi ait formatum nasum nullos fere musculos constituisse, sed obiter latera tangere; hos qui labia movent: nisti adfit, qui in naribus inveniri putabantur. Laurent. sic in profunda narium cavitate musculi non reperiuntur.

CAPUT LXV.

Ossa Narium cavitatem constituentia duplicia sunt; alia, quæ naribus propria dici possunt, licet maxillæ superioris ossa sint: alia communia. Propria tria sunt, externa duo, & tertium internum, quæ ad nasi medium tantum feruntur, reliqua parte cartilaginea existente; duo quidem, quæ nasi partem eminentiorem osseam constituunt, utrinque unum, parvum, quadrangulum, sed altera parte longius, tenuè^a admodum & solidum, exiguis & communibus foraminibus præditum, quod ossis quinti maxillæ superioris [tab. 3. f. 8. 33.] portio, quæ superne cum osse frontis inter supercilia, sutura communi tertia, brevi ductu, committitur. [tab. 3. fig. 8. Z. T.] Ad latera vero cum osse quarto^b maxillæ [tab. 3. f. 8. B. fig. 9. S. A.] quod narium latera & foraminum inferiorem sedem, eorumque amplitudinem magna ex parte constituit, sutura^c propria secundum nasi latus delata [tab. 3. f. 8. ab e. versus T.] junguntur. Inferius vero cartilaginibus uniuntur: quare ad finem aspera sunt, & inæqualia, quo ossibus melius hæcant. Intrinsecus vero alia linea communi junguntur, & cribrosi ossis septo adherent.

Tertium intrinsecus, in narium amplitudine, quod latum est, in radice tenuè, anteriore & superiore sede crassum, quod sursum ad ossæctus foramina, tum deorsum ad palatum tendit: hoc duo priora intercedit, & processui ossis^d cribrosi seu capitis octavi^d adheret [tab. 4. f. 10. sub x.] & unitur, quod septum dicitur, & narium cavitatem distinguit [tab. 3. f. 8. O. f. 9.] Et hic duobus prioribus, seu ossi quinto maxillæ, sutura interna prima [tab. 3. f. 8. sub f.] jungitur: anterius vero in cartilagineam mediam terminatur, & cum ea unitur. Ad hoc os intra nasi fauces ad os sphænoïdes, ubi ab eo dirimitur, secundum totam longitudinem rimula lata^e dividitur, & per nasum fertur, & basi latiore & crassiore bifurcatum ossi sphænoïdi incumbit, & forma aratri vomer refert [tab. 3. fig. 9. c. 3.] & acie sinuosa & inæquali existit; quarto etiam & sexto ossi maxillæ intrinsecus, sutura interna secunda [tab. 3. fig. 8. g.] committitur.

Communia præter hæc ad nasi summam radicem intus os fixum hæret, quod ab Hippocrate & Galeno^f *σφαιροειδές* dici, supra monuimus, ob partem spongiosam in narium cavitate contentam. Quare in interno naso ad hoc os, duo & adhuc alia fungosa & spongiosa observantur, narium cavitatem supernam opplentia, vocis odorisque causa exstructa, quæ varia sunt, & squammas mutuo connatas nonnihil referunt: uniuntur autem cum osse cribroso, à cuius lateribus externis prodeunt, ita, ut ab illo oriri, & ipsius partes effecrediderim, quamvis cum septo non concrecant; dein ossi frontis in lateribus spatio insigni uniuntur, sic & maxillæ tertio intrinsecus

^a Malarum ossa crassissima sunt, nasi tenuissima, reliqua vero durissima: Si enim nasi ossa laesa fuerint, minimam animam adferunt noxam, quod sit,

ut multum à principalioribus duritie ac crassitie vincantur, II. us. part. 19.

^b Vesal. Plat. at 3. Columb.

^c Cum mamilla superiore harmonia copulantur, Piccolh.

^d Processum hunc in nares descendere & septum constituere volunt, Vesal. Columb.

^e Cribrosi ossis longitudinis medio enascitur, Plat. ab ethmoide exortum, Laur.

^f Duo fecerunt Col. & Fallop.

^g p. undecim

num os maxillæ, quod vomeris figura constat, vocantes: at Volcherus (secutus est Plat.) unum os maxillæ, quod narium cavitates dividit, unde septum seu diaphragma narium: & à similitudine, quam cum vomere obtinet, vomer à nonnullis dicitur. F. 8. us. part. 6. & 7. 9. ejusdem 3. g. 12. & 13. os maxillæ superioris Columb. fungosa narium ossa, Plat. non proprie maxillæ ossa, sed ossis spongiosi seu ethmoidis partes, Fallop.

cus ita junguntur, ut Fallopius hoc os maxillæ ad cribrosi ossis additamenta non male retulerit. In his aer cum odoribus inspiratus alteratur: hæc inæqualia sunt, aspera, ne mucus assiduo destillet, & hæc in lue venerea facile eroduntur. Sic inferne ad palatum cum ^h quarto [tab. 3. fig. 9. A.] sextum ⁱ maxillæ os [tab. 3. fig. 9. II.] cum suo pari ^h Quartum & quintum, Plat. 1 Sextum Vesal. quartum, Columb.

Quare tota hæc narium cavitas ossea, ab ossibus efformatur & extrinsecus & intrinsecus: Extrinsecus & antierius, superne quidem maxillæ osse quarto [tab. 3. f. 8. B.] & quinto [E] quibus cartilagine junguntur; inferne vero ad palatum, quarto [tab. 3. f. 9. A.] & sexto [II.] Intrinsecus vero osse spongioide capitis [tab. 4. f. 10. K.] & duobus narium ossibus spongiosis septoque narium [O.] Ad latera vero secundum [tab. 3. f. 8. A.] tertium [O.] & quartum [x. ad B.] maxillæ superioris os. Verum cartilaginibus discissis, intra narium cavitates occurrunt carnes spongiose subrubræ, quibus nasi ossa spongiose replemur: ex quibus tumefactis polypus narium generatur: hæc quandoque ad imas nares producuntur: interdum supra palati cavitates geminas, juxta gargarconem in ^{*} fauces propendent, & voci & deglutioni incommodant.

Cartilagine ^k narium quinque sunt, quarum tres antierius ossium circumferentiis connectuntur, duæ vero alas constituunt. Harum duæ superiores latiores sunt, & nasi ossibus [tab. 3. f. 8. ab f. ad e.] ubi latiora & aspera sunt, adhærent, indeque propendent, & una cum ossibus narium cavitatem anteriorem & inferiorem regionem efformant: hæc deorsum latæ invicem connexæ ad nasi apicem vergunt, & quo longius deferuntur, eo molliores redduntur, & in nasi extremo ^l veluti in cartilagineum ligamentum degenerant: tertia inter illas media septum est cartilaginofum, osseo ^m septo connatum, quod antrorsum procedens cartilaginibus prædictis regione interna secundum longitudinem adnascitur. Hoc mediante Nasus ex facie plana exporrectus in nares dividitur, ubi & osseum septum supra palati regionem, ipsa foramina discernit, ubi a naso ad fauces ducuntur. ⁿ Cartilaginibus his tribus aliæ duæ apponuntur, alas seu pinnas constituentes [tab. 26. f. L.] sic dictæ; quod alarum modo nares occludant & recludant, quæ membranosis ligamentis cæteris cartilaginibus, lateribus internis, aliarum extrema integritis, colligantur: harum singulæ orbiculatim nasi foramen constituunt, & ligamenti naturam sapiunt: hu solæ motu voluntario prædictæ sunt sursum & deorsum, introrsum & extrorsum propriis musculis trahuntur, & in inspiratione magna aliquantum elevantur, & in expiratione rursus subsident. Sitæ sunt parte inferiore, cum pars superior ossea sit, quo inferioris fundamentum existat: nasi enim partem inferiorem cartilagineam esse oportuit; partim, quo cavitates illæ ab ossibus efformatæ, semper apertæ retineantur, & spiritus in pulmones & cerebrum commodius attrahantur; partim, ut molles sint, quo nares occludendo fœtores arceamus: partim etiam, quo nares commodius emungamus, & quo propter flexionem injuriis melius cedere possit, cum ictibus ^o & casibus expositus sit. Quod si vero abscindatur, ex cute ex brachio traducta restitui potest, ut Taliacotius libro peculiari docuit.

M m m

Vasa

ⁿ Cujus extremitati duæ aliæ cartilagine parvissima membrana nares succingentis interventu appensæ, ut non solum nasi pars inferior externa, verum etiam interna mobilis evaderet, Piccolb. ^o Cartilaginosa fuerunt, quod ea substantia non facile excutundatur, nec rumpatur. 31. usq. pars. 17.

p Nervi à cere-
bro exiles distri-
buuntur, de
instr. olfactus
2. à nervis, qui
per maxillam
superiorem fe-
runtur, propa-
gines quadam
exigua ad mu-
sculos derivan-
tur, 11. us par.
17.
q Gal. de instr.
olfact. 1. modo
membranam,
modo tunicam
vocat: de qua
cap. 2. exanguis
tunica crassior
quam membra-
na, & tunica oris,
& continua
tunica Vesal.
& Columb.
membrana os
succingens, Pla-
membrana,
Piccol. & Lau-
r Propagines
minoris tertii
paris radices in
narium tuni-
cam degenerat,
Vesal. dura ma-
tris portio, Col-
l De instr. odo-
ratus 2. & 3.
& Sicli. 10. prob.
querit cur sa-
crum habeatur
cur homo om-
nium maxime
sternutet: cur
fere semper vi-
gilantibus con-

Vasa nasus habet: Venas à jugularibus externis, quæ sanguinem pro nutritione advehunt, & quas inter duas alas interdum in nasi affectibus secare solent. Arterias, à carotidibus, quæ sanguinem vitalem cum calore & vita adferunt. Nervos p à ter-
tio pari medullæ cerebri utrinque unum, qui per foramina, quæ cum oculis nasus cõ-
munia habet, ad majorem angulum in tunicam, quæ nasi meatus sublinat, ramulis plu-
rimis & ad musculos disseminatur, & ad palatum progreditur.

Tunica narium amplitudinem succingens, à crassi meninge per foramina ethmoidis erumpente oritur, & tunica oris, palati, linguæ, laryngis, œsophagi & vetriculi communis est, quæ licet totam oris circumferentiam, & partes in faucibus contentas ambiat, una & continua sit, & eandem substantiæ speciem habere cernatur, nõ tamen æqualem crassitudinem habet, sed in naribus tenuior est: ea vero parte, qua os-
sibus spongiosis substernitur crassior, minutis foraminibus trajecta, per quæ crassio-
ra cerebri excrementa transmittuntur, quæ dum deorsum feruntur ad nares, pars eo-
rum in os per ea foramina, quæ à naribus in ipsum transeunt, interdum delabuntur; pars vero per nares excernitur, imo & screatu ex via narium attrahitur. Exquisito sensu ta-
ctus donata est hæc tunica, ita, ut irritata sternutatio fiat, propter tunicæ hujus cū tho-
race, cui se insinuat, consensum. Est autem sternutatio secundum Philosophum, flatus universi eruptio; signum augurale, & unum ex omnium spirituum generibus. san-
ctum & sacrum, cujus subjectum est cerebrum, meatus vero per quem repugatur, sunt foramina in osse ethmoide per nasum: nam quando vapor acris, vel humori acri permixtus est, sua acrimonia tenuem meningem ventriculos succingentem vellicans, expultricem facultatem excitat: quamvis & res mordaces nares subeuntes, earum tu-
nicam exquisitissimi sensus, & nares, & os ethmoides, & ventriculos succingentem, vellicantes, per accidens sternutationem excitant, ubi simul excrementum in ventri-
culis collectum expellitur. Quare sternutatio est motus pravus cerebri cum sono, de-
pendens à facultate expultrice stimulata, ab aere per nares & os subito attracti, thora-
cis motu adjuvante, quo sibi molesta expellere nititur, qua per meatus narium flatuosa substantia cum spiritu confertim eliditur. At sonus qui exauditur, fit ab aere intus col-
lecto, extra & confertim per angustam viam erumpente, adjuvante spiritu qui è pul-
monibus cõfertim sursum fertur, cum thorax cerebri motum sequatur propter respi-
rationis necessitatem, ne altera alterius motum inturbet, quare sternutamenta, & capitis gravedinem emendant & aliquando pulmones, repurgant. Hac nares donan-
tur, quo perpetuo pateant (adjuvantibus tamen & cartilaginibus) ne caro in nari-
bus excrefcens eas angustiores reddat, quod in polypo fieri solet: dein, ut lubricæ sint ad faciliorem mucus delapsus; tum ut sensus particeps sit.

Ufus nali externi: primus, ut respirationi inserviat, quo per eum, tanquam cana-
lem

tingat: cur senes laboriosius sternutent: cur bis sternuere magna ex parte solemus, non semel aut sapius. Et libr. 33. cur sternutamentum pro numine habeatur: cur singultus sternutamento finiatur & retentione spiritus, cur post sternuta-
tionem membra nostra inhorrescant &c. 1. hist. an. 11. u Duplex usus: prior, cujusmodi est illius tunica, qua laryngem & asperam arteriam totam intus succingit: posterior, ut instrumentum omne sensus sit particeps. Gal. 11. us. part. 17. x Pic-
collo. & Laur. y Meatus prabet spiritui: aerem enim ea parte reddimus & accipimus, ut in sternutatione: tum etiam spiritum trahi in pectus, & inde reddi necesse est, quod fieri non potest, nisi naribus spiremus: olfactus namque, id est, sen-
sus odoris hac eadem parte administratur, Arist. 1. hist. an. 11. Nasus facultati & odorandi & respirandi subservit 1. caus-
sympt. 4. Elephantis prolixa, validaq; naris augetur, ejusq; usus idem qui manus, ea namq; cibos, tam siccos, quam humi-
dos capiunt, & in os animo vent soli animalium 1. hist. an. 11. idem 2. par. an. 16. addens, arbores etiam cõplectendo evellere.

lem aer intromittatur, qui inspiratione in narium cavitatem attractus, partim sursum cerebro pro spiritus animalis recreatione, partim deorsum pulmonibus ac cordi proprius refrigerio communicetur. Hic primus & præcipuus usus est: nam licet ore etiam respiremus, non tamen propter respirationem os creatum est: nam, si foraminibus ossis spongiosi seu naribus obstructis, & ore aperto dormientes respiremus, lingua arida fit, os exsiccat (aliquando etiam amarescit) ut etiam salivæ deglutitio impediatur: quare & foramina in palatum de sinentia, per quæ dormientes & ore clauso aerem attrahimus & reddimus, operculi instar nasus tegit. Secundus, ² ut odorandi facultati inserviat, qui odores cum aere rerum odorabilium speciebus informatus per ossis ethmoidis foramina ad processus mamillares, tanquam prima olfactus organa, indeque ad cerebrum deferat: quibus enim nasus ad radices usque dissectus est, vel non olfaciunt, vel saltem male olfaciunt. Tertius, ut excrementa ^a cerebri, quæ in amplitudinem narium sensim destillant, per eas efflatu vehementi ^b emungantur: quemadmodum ex ore per secretum excernitur. Tandem & vocis formationi inservit, faciemque ornare creditur.

² Olfacit cerebrum humidum existens aridorum odorem una cum aere per corpora cartilaginea ipsum trahens. Hipp. de carn. a Intus foras per narium

meatus excrementa feruntur: foris autem intro facultatis olfaciendi sensibilia: duabus his utilitatibus instrumentum unicum subservit, alteri quidem ad vitam necessariæ, alteri vero ad vitam commodiorem, Gal. 8. us. part. 6. Cloaca alijus instar, quæ adibus extrinsecus affixa est, duoque sedilia habet, è facie aliquonjque educitur, Plat. b Gal. de instrument. odorat. 2.

De Naso interno, & olfaciendi ^a modo.

CAPUT LXVI.

Vide Aristotelem de modo olfaciendi 2. de anim. 9. de sensu & sensibili 4. & 5. sic gen. an. 2. item 12. & 13. Problem. Galenum libro de olfact. instrum. & 8. usu part. 6.

^a Odorandi facultas, unde & ubi fiat, sic docuit Hipp. cerebrum odorandi facultatem habet, cum humidum existat, aridorum odorem cum aere per cartilaginea corpora, quæ sicca sunt, attrahens. Cerebrum enim ad nasi cavitatem progreditur, hacque parte nullum os ei obconditur, sed molli cartila-

Nasum odoratus esse instrumentum in confesso est, sed cum ex variis partibus constituitur, cui parti tanquam principi odorandi actio tribuenda sit, ambigitur: & cum partes, quas nasum externum constituere diximus, examinaverimus, nunc Nasi interni partes perpendamus. Nasus internus partibus duabus constat, ossis nimirum ethmoidei, seu rectius, spongiosi, quod partim in narium summitate, partim in cranio locatum est: quod processuum mammillariorum ^b operimentum est foraminulentum simul & rarum, ut ad cerebrum aerem quidem respirationis causa celeriter deducat, vaporem autem dignotionis odorum: tum etiam excrementorum copiam vacuet. Altera pars nasi interni, processus sunt mamillares à cerebro prode-

Mmm 2

untes

go spongie instar, quam neque carnem, neque os appellare queas, & cum quidem narium cava sicca fuerint, ipsum per se exquisito magis rerum siccarum odorem percipit. Neque enim aquam olfacit, cum cerebro sit humidior, nisi computruerit. At cum pîvis seu naves humide fuerint olfacere nequit, cum ad se cerebrum aerem non attrahat. Hipp. de carn. Ad naves foramen quidem non tendit, sed laxum quiddam, veluti spongia, eamque ob causam per longius intervallum audit, quam olfacit: longe enim ab olfactu odor dispergitur, Hipp. de loc. in hom. b Gal. 8. us. part. 6. c Cerebrum germen duo oblonga & concava ex anterioribus cerebri ventriculis ortum habentia, ad calvaria partem, unde nasus oritur demittit, ubi ossa ethmoidea posita sunt, Gal. de inst. olfac. 2.

antes, qui intra cranium supra sinus ossis ethmoidis sedem habent. At de offe, supra capite septimo, & de processibus mammillaribus, capite de nervis cerebri egimus. Quare colectorem remittentes, ad olfaciendi modum nunc veniamus.

d De sensu &
sensili 4.
e ibid. cap. 5.

f 2. de anima 9.

g 4. simplic. 22.

h Gal. de instr.
olfact. 5.

i De sensu &
sensili 5.

Ad quemlibet sensum tria requiri, supra ex Philosopho ostendimus; objectum, medium & instrumentum. Objectum odores sunt (seu vapores naturæ ignei) quid autem odor sit, non ita patet, quemadmodum quid sonus, vel lumen, vel color: idcirco hunc sensum pluribus animalibus inferiorem habemus, & d omnium sensuum, qui in nobis est stupidissimus, quemadmodum tactum omnium exactissimum habemus. Imo sensus olfactus, medius esse videtur, cum sensus numero impari concludantur, & numerus impar medium obtineat: medius, inquam, esse videtur, inter eos, qui tangendo munere suo funguntur, quales sunt tactus & gustus; & eos qui intercedente aliquo sentiunt, cujusmodi sunt visus & auditus. Quare homo remisse olfacit, & nihil odorabilem absque dolore vel voluptate percipit, propterea, quod sensus instrumentum perfectum non est. Et cum odores non sunt manifesti, ut sapores, id est odororum nomina per similitudinem rerum à saporibus deducta sunt, ita ut alius dicatur dulcis, ut croci & mellis; alius acer, ut thymi, ac ejusmodi rerum: sic & acerbius odor & acutus & pinguis est. Quare Galenus odores gustatum movere, ut sapores docuit: nam si quæ edulia boni odoris putrilagine corrupta, odore suo nos offendant, protinus ea abjicimus, haud gustare dignati, fereque in omnibus odoratus & gustus mutuo consentiunt; diximus fere, quia in iis, quæ odore sunt suavissima, veluti rosæ, plurimum odoratus & gustatus dissident: siquidem odore rosæ odoratus delectatur, rosæ vero sapore gustus perturbatur. Verum sicut auditus faudibilis est, & inaudibilis; & visus, visibilis atque invisibilis; sic & odoratus est, odorabilis atque inodorabilis inodorabile, vel id, quod omnino odore caret, nec unquam odorem habere potest: vel id, quod exiguum habet, vel etiam, quod malum terumque odorem habet.

Medium autem per quod olfactus fit, aer est, aut aqua: animalia enim, quæ in aquis degunt, sive sanguinem habeant, sive non habeant, odorem sentiunt, quemadmodum & ea quæ in aere versantur, cum horum nonnulla, piscium & animalium testaceorum & insectorum alimenti odorem eminus percipiant, & ad id pergunt, tanquam ad cibum sibi peculiarem, & propter alimentariam odoris speciem, ut mel, apes, &c. At homo, cum solum respirans (quod ei proprium est) olfaciat, spirans autem spiritumve detinens, neque eminus, neque oominus, etiam si rem olentem naribus indiderit, olfaciat; quia instrumentum odoratus non in summa superficie tunicæ narium, sed multo interius locatum sit, sic ut foramina quædam ad ipsum pertinentia habeat: dein, quia inspiratione ipsa instrumenta dilatantur, quæ nisi dilatentur, aer poros subire non poterit, qui cum aere pleni sint, nec ad cerebri processus ejusque ventriculos feretur. Ipsa vero animalia, etiam ea quæ sanguine carent, licet non respirent, olfaciunt, cum odorem percipiant. Percipere autem ex eo constat, quod & ipsa ab odoribus vehementibus corrumpuntur, à quibus & homo corrumpitur: quemadmodum enim homines prunarum halitu gravedinem capitis contrahunt, & plerumque suffocantur; ita & illa vi sulphuris, bituminosarumque rerum fugantur, quod male his afficiantur, & interdum extingui soleant. Hinc sequitur ex Philosophi decreto, hujus sensus instrumentum in homine à talium animalium instrumento differre, quemadmodum & hominis oculi differunt, ab eorum animalium oculis, quæ oculos duros habent.

Animalia.

Animalia enim, quæ oculos molles habent, palpebras veluti tegumentum obtinent, quas nisi moverint & aperverint non vident; at ea quæ sunt duris oculis, nihil tale habent, sed illico res eas, quæ in perspicuo sunt, vident. Sic, inquit Philosophus, in animalibus, quæ non respirant, τὸ δὲ φαντασθὲν αἰσθητήριον, seu olfactus sensorium, velut eorum oculus, velamine caret. Quæ vero aerem suscipiunt, velamen habent; quod cum respirant venis meatibusque distentis, detegitur, vel spiritus id quod (ὡς ἀπὸ πῶ- μόν) instar operculi cuiusdam, superpositum aufert, unde fit, ut quando non respirant, nullum odorem sentiant: non respirantibus autem natura hoc denegavit. Idcirco, quæ respirant, in aqua non olfaciunt; necesse enim, ut olfacientes respirent: hoc vero in aqua fieri non potest.

Verum hanc de operculis foraminum nasi sententiam à Philosopho positam k Galenus refutavit, rem pronuntians esse & incertam & demonstratione carentem, & quæ nulla evidens fides testificetur, imo nullius utilitatis causa extitisse: sed demus, in profundis naribus operculum esse, quod inspiratione aperiatur, ut aeri & vaporibus ingressus pateat, & quod inspiratione cessante claudatur: hujus operculi motus, Galeno monente, aut animalis, aut naturalis, aut violentus erit. Voluntarium esse, nemo dixerit, quia ad animalem motum operculo seu valvula opus non est, & animalis motus voluntati nostræ obsequitur: at hoc operculum nunquam aperiatur, nisi aerem ducamus. Dein motus voluntarii instrumentum musculus est; at in summitate narium interna nulli muscoli sunt: nec naturalis erit hic motus, ut valvularum cordis, quia perpetuus est cordis motus, & non voluntate nostra perficitur. Violentum esse dicere non possumus: nam ut idem Galenus monet ab aeris irruentis impetu etiā sine spiritus attractione opercula aperiuntur. Hoc autem non fieri experimur, si in cubiculo odore vehementi repleto aeris motum moliamur, aut nares vento objiciamus, aut instrumenta cava seu fistulas admoveamus, per quæ aliquis insufflet: aer licet his impellatur (à quo, si opercula adessent, foramina referari possent) nullus tamen odoris sensus excitatur, nisi spiritum attrahamus. Sed qui plura volet, Galeni caput diligenter perlegat.

Instrumentum olfactus nunc inquiremus quale n. Philosophus censuerit esse, iam perlegat. M m 3 dictum
 aeris & humoris est in odorandi sensum cadit: quod neque ita tenue est, ut aer, neque ita crassum, ut humor. Id enim, quod à rerum corporibus exhalat, odoris subtilitatis est, quod ex rosis maxime, similibusque, quæ sic tenera sunt, cognoscere licet; & Gal. instr. ofa. 2. & 3. odoratus instrumentum quod sit, omni antiquitati incompertum videtur. Piccol. Olfactus instrumentum quod sit, opiniones variae. I. Hipp. de carnib. Cerebrum, ait, odorandi facultatem habet, aridorum odorem cum aere attrahens: vide in principio hujus capituli in margine a. II. Arist. 2. par. an. 10. Nasus τῆς αἰσθητικῆς instrumentum est: efficit enim sensum olfaciendi per spirationem in nares habentibus, cui in animalibus quæ respirant (2. de anim. 9. de sensu & sensib.) quid operculi instar adpositum est, quod in respirantibus spiritus aufert. Contra quam de operculis sententiam, Gal. de instr. olfact. 5. disputat. At libro de sensu & sensibilia 5. olfactibilis sensorium in capite dicit, & 2. par. an. 6. & φησὶ αἰσθητικῶν in animalibus quadrupedibus, & vituperari non multum variare scribit. At iudicium exquisitum differentiarum tum soni, tum odoris in sinceritate sensorii summaque membrana positum est, 5. gen. an. 2. & quæ ante sua sensoria partes productiores habent, hac procul sentire possunt: quare, quorum nares longius porrectæ sunt, ut catellorum Laconicorum, olfactu valent. Idem. III. Gal. 1. sympt. caus. 4. ventriculi anteriores cerebri odoratus sensorium non cerebrum, quod commune est sensorium, seu instrumentum omnium sensuum, & 8. us. part. 6. Olfactus sensorium in ipsis cerebri anterioribus ventriculis, qui etiam vaporosum quendam spiritum continent; quod libro de instrumento odoratus & docet, historia de nigella in nares attracta, & cerebri ventriculis vellicatis; recitatur eodem loco odoratus proprium instrumentum vaporis quodammodo simile esse oportet. IV. Processus mammillares vulgo à Medicis statuuntur. Quare sic Varol. duo ductus nervi à media cerebri magnitudine, & in substantia ejus, vel-

k Aristoteles non tentavit querere locum in quo primus odoris sensus positus sit, Gal. de instr. olfact. 5. De instr. olfact. 5. & ex eo Laur.

m Cernendi instrumentum

Natura lucidissimum fecit, ut quod luce & splendore sentire debebat:

quod autem auditum attinet, aeri similem constituit

siquidem ad sonoros, qui veniunt, aere recipiendos dicuntur: sic &

quod sapores distinguat, quod linguam appellamus, ea humidiore corporis substantia molita est: ali-

quid vero, quod dictum inter naturam

uti in sculpi proficiscuntur, qui ad anteriora producti in superiorem narium partem desinunt, & sensorium olfactus constitunt, & ubi exhalationes odorata eo perveniunt, sensorium percipit speciem odoris sine materia, in eamque mutatur. Illa autem exhalatio per amplitudinem cerebri expanditur. Processus mammillares, aut dua crassiuscula partes his processibus (quos nervos odoratus vocat) appositæ Piccolli, princeps odoratus organum, Laur. At Auerhues contradiit: si, ait, processus hi odoratus organa essent, obstructis naribus, eorum quæ ore comminuuntur, odor perciperetur, cum ab ore & palato ad eos processus aëri aditus manifestus pateat. De inciborum in ventriculo contentorum, odor percipiretur, vaporibus ad cerebrum exspirantibus. Tum animalia quæ his processibus carent, non olfacerent. Respondet Laur. ad 1. Odores primo naribus offerri debere, ibique preparari: ad 2. Odor ille humere nimio ventriculi & oris perfusus, se exorere non potest: Ad 3. De perfectis animalibus loquitur, non de imperfectis, quæ, ut sine ossibus stant, sine pulmonibus vivunt, ita sine naribus & his processibus respirare & olfacere nihil prohibet.

dictum est. Quemadmodum visus instrumentum oculus est, auditus auris, quæ ex multis partibus componuntur: sic & olfactus instrumentum nasus est; sed cum in quolibet sensu pars aliqua principalissima sit, quodnam præcipuum hic sit instrumentum, per quod facultas propria sensibilia dignoscit, controversitur. Alii quidem nasum esse credidere, eo quod, si spiritum naribus oclusis ore attrahamus, odorem nullum sentiamus: si vero si apertis naribus attrahamus, odor sensum protinus movet. Sed cum sint, qui etiam sine naso olfaciant, sequitur nasum præcipuum in-

in Gal. de instru-

ment. olfact. 1.

o Gal. instru-

ment. olfact. 3.

ostendit, nec os

nasi, nec inte-

riorem tunicâ,

nec palati tu-

nicam nec fau-

ces, nec asperam

arteriam odora-

tus instrumen-

tum esse.

q De instrum.

olfact.

q Tenuis me-

ningis interven-

tu cerebro jun-

guntur, Piccol-

li meninge utra-

que non velati,

Laur.

q Quia nervo-

rum naturam,

edolent, qualitatē perceptam interno-

scunt, Laur. Processus hi magnitudine parvum vermem holo-

sem referunt: principium habere videntur à nervis odoratoriis, qui in hos processus degenerare videntur. Nervi e-

nim odoratorii visus subjecti à medulla cerebri parte posteriore, ubi quartus ventriculus est, oriuntur, & antèius

progressi inter cerebrum & os sphenoides in processus mammillares intruduntur: qui dati, ut sint canales, per quos odo-

randi facultas in spiritu animali hausto à quarto ventriculo insidens evehatur in processus mammillares, seu odoran-

di organa: sicuti per nervos opticos videndi vis in oculos. Horum nervorum origo & progressio Vesalio, Realdo, cate-

risque incomperita, quia forte cerebra putrida dissectuerunt, Piccolli hom.

l Gal. 6. de plac. Sic & Carolus.

strumentum non esse, sed perfectiorem olfactum adjuvare, & in subsidium præcipui organi datum esse. Alia ergo quærenda est pars in naso. Os esse non potest; ° cum os nullo modo sentiat, ergo nec odores sentiet. Non est nasi tunica, quæ odores dignoscit; nam si nares odoratis ° rebus repleas, odorem non perceperis, antequam spiritum attrahas: dein tunica hæc membranæ capitis partem extimam involventi similis est, quæ cum non sentiat, neque hæc sentiet. Non est palati ° tunica, vel faucium, vel asperæ arteriæ; nam si obstructis naribus, aut digito compressis, spiritum ore adducas, nullius odoris sensus movebitur, nec circa palatum, nec fauces, nec asperam arteriam odoratus. Quare p nasus semita quidem est rerum odorabilium, quamvis respirationis potius gratia, quam olfactus causa creatus sit. Corpus ergo, quod odores sentit, altius ° locatum erit: hoc autem, vel erit os spongoides, seu ethmoides; at cum os non sentiat, hoc statui non potest; vel erunt processus, qui mammillares à forma dicuntur, qui ex cerebri basi prodeuntes, tenui meninge ° cerebro junguntur, & ossis ethmoidis eminentiori parte intra cranium reponuntur, & cum duo sint, ab ossis productione, quæ calcaris effigiem refert, distinguuntur, & nervorum ° naturam obtinent; quemadmodum supra ostensum fuit. Hi enim cum naturam, figuram & compositionem ° peculiarem habeant, præcipua odoratus instrumenta esse creduntur: maxime, cum nulla pars in naso sit, quæ tam facile ab odoribus alterari queat; nam cum spiritu plena & vaporosa facile odorum species recipiunt. Nam cum odores ° in quadam

dam exhalatione consistant: (eouſque enim corpora odorem ſpirant, quouſque exhalant; quare æſtate magis, quam hyeme odorem unumquemque percipimus) & exhalatio natura ſua ſicca ſit, debuit olfactus ſenſorium à principio humido prodire, ut ratione contrarietatis, actionibus neceſſario requiſitæ, ab exhalatione pati & moveri poſſet: & quo ipſa exhalatio ad ipſum perveniens, commodè expandi & dilatari poſſit, hoc ſenſorium ſeu inſtrumentum, non à ſpinali medulla, nec à partibus eidem in anguſto circumpoſitis oritur, ſed à media cerebri magnitudine, & in ſubſtantia ejus veluti inſculpti, qui ad anteriora producuntur, in ſupremam narium partem deſi-
nunt, & olfactus ſenſorium conſtituunt.

Concludentes, dicimus olfactum ſic fieri: aer odoribus vel ſpirituofa exhalatione rerum odorabilem alteratus, à naſo extra facièm prominente, veluti camino quodam inferius lato, ſuperius anguſto excipitur; at cum imbecilli ſuo motu impreſſionem ſufficientem efficere non poſſit, tractu aliquo excitari debuit: quare orè clauſo, & peſtore dilatato (ſine enim peſtoris dilatatione, florem vel quodvis odorem in ſe porrectum nemo olfaciet) exhalatio per aerem diſperſa, inſpiratione intra nares at-
trahitur: & cum foramina duo ad palatum quoque accedant, major pars pulmonem ingreditur, ſed ſine odorum dignotione: altera pars ſurſum fertur ad olfactus in-
ſtrumenta, ſed hic in ſpongioſis oſſibus alteratur; quemadmodum in auris cavitati-
bus aer auditorius præparatur: hic in anſractibus alteratur cum odoris ſpecie per fo-
ramina oſſis ethmoidis tranſiens, in proceſſus mammillares fertur, ſeu ab iis recipi-
tur, & inde ad communem ſenſum, qui in cerebro eſt, ut de eo judicium ferat, defer-
tur. Cerebrum enim commune eſt ſenſorium, ſeu inſtrumentum omnium ſenſuum:
ſive inſtrumentum eſt, per quod anima ſenſitiva ſentit ſenſibiles qualitates omnes,
eaſque internoscit & dijudicat.

u quomodo ſine
inſpiratione odo-
rari nullus poſ-
ſit & quomodo
inſpiratio ſa-
ciat odoratum,
vide ſup. l. 3.
c 15.

De partibus, quæ inter Naſum, aures & mentum ſunt.

CAPUT LXVII.

FAciei partes, quibus ſolus homo donatur, & quæ ſub oculis ſunt, & inter Naſum
& aures uſque ad mentum ſeſe extendunt, priſcis ^a Genæ, quod in his pili ^b gigne-
rentur, dicebantur. Dividuntur ^c in partem ſuperiorem & inferiorem: ſuperior ſub
oculis inter naſum & aurem leviter eminens ac rubens, & quæ pudoris ſedes Plinio
cenſetur, eo quod rubor ea in parte maxime per pudorem cernatur, κυκλὸς πρὸς ὤπῃ, ^b Quos in mu-
faciei circulus Hippocrati & ^d μῆλον, ^d malum ſeu pomum faciei nominatur, à ſimili-
tudine cum malis, quoad formam & colorem, & quod in vere ætatis floreant. Infe-
rior pars laxior extra maxillas clauſas ſita, & à mento ad oculos ſerz extenſa eſt, quæ dicto antiqui
ſpiritu à pulmone revocato, & labiis oppreſſis retento inflari poteſt, γνάθος, bucca veteraverunt.
^e proprie. At pars à naribus ad labrum uſque ſuperius, myſtax ^f nominatur. Cavitas Hinc Cicero li-
vero labrum ſuperius ſindens, valliculæ inſtar impreſſa & φάλαξον, quaſi amatorium vel
ama-
nas ne radun-
to.

^c Εἰς τὴν ἡγῆται καὶ ἡ ἀναγνώστης, Hipp. nominatur. ^d Polluci. ^e Horatio & Perſo. ^f Introduc. Polluci & Eufſta-
thio. ^g Polluci & Ruſſo, lacuna; Laſtanzio, Veſalio, Sulculus.

in Labra Cice. amabile dixeris. Labia^h autem duo sunt, superius & inferius, quæ oris musculosa ex-
 roni de Div. & tremitates existunt, quæⁱ χείλα, ὅσον ἐχέλη, quasi ipsum osteneant, & sint ἔργος ὁδόν-
 Persio: labia à τῶν, ^k septum dentium, quo dentium deformitatem tegant: horum partes exte-
 lambendo dicta prominentes προχέλα, ^l prolabia, & quæ in complicatione & commissura propter
 licet canes, fe- sanguinis affluxum rubent, προσημία^m nominantur. Foramen vero seu rima, quæ à
 les & alia ani- labiis constituitur, cum mutuo dividuntur, σῆμα, ⁿ os vocatur. Inferior denique
 malia lingua sub labro inferiori pars faciei ima in acutum tendens, γένειον, ^o mentum P à memoran-
 magis, quam do quibusdam dicitur quod ejus inter recordandum aliquis usus esse videatur: fovea,
 labiis lambant: quæ ornatus causa ejus medio impressa est, ῥυμφή: ^q menti acuta pars in maxilla infe-
 Contra homi- riore eminens δὲ γένος; ^r carnosa sub mento pars, ἐνχαλία, ^r buccula, forsan à similitu-
 nes labiis ma- dine cum Suetonio dici posset. Tandem & pili in malis, labio utroque & mento pro-
 gis lambunt, rumpentes barbam constituunt, de quorum nominibus quemadmodum & partium
 Piccolb. faciei, diligenter & fuse egimus in libro nostro, qui partes externas proponit capiti-
 i Arist. i. hist. bus 6. & 7. quorum solum gustum aliquem, in hoc opere, ubi locus requirit, exhibe-
 an. 11. mus.
^k Homero.
^l Ruffo.
^m Polluci &
ⁿ Ruffo.
^o Aristoteli & introductorio. ^p Introductorio & Xenophonti. ^q Ciceroni. Plinius homini tantum tribuit, & s. rō-
 tundum sit juxta Pythagoram, animi effeminati indicium esse solet.
^r Ruffo. ^s Polluci.

De Ore.

CAPUT LXVIII.

Aristoteles de Ore ejus 2. part. 3. 3. part. 1 sic 1. hist. anim. 11. & 4. ejusdem 3.

^a Inter maxil-
 las & labra de-
 scribitur, 1. hist.
¹¹ in crustaceis
 oculis subdi-
 zum, 4. hist. 3.
 Galeno duplex
 significatio: 1. de
 labiorum fissu-
 ra, quæ cutis
 inter cisa fue-
 rit, dein totum
 spatium, quod
 diductis labris
 ad fauces exten-
 ditur.
^{* 11. n. s. part. 9.}
^b Cuius ad
 oris generatio-
 nem hoc loco,
 non vero alia
 corporis parte,
 divisat 11. n. s.
 part. 7.

O S quod forte ab O literæ figura, nomen habet, siquidem dum cœscitamus, hanc
 formam acquirit: σῆμα Græcis, dicitur & de rima, quæ in medio buccarum^a ex
 labiis constituitur, & de lata cavitate seu inanitate, quæ ore aperto usque ad fauces
 conspicitur: in anteriore & media faciei parte locatur, quo cibus æqualiter à mani-
 bus ei porrigatur: statim sub naribus, quo in ciborum assumptione non solum ori
 sapores, sed etiam naso odores offerantur, cum ea quæ assumuntur, non solo gustu,
 sed & odore cognosci debeant. Hoc homini exiguum datum, propter caninorum
 dentium paucitatem, Galeno^{*} monente. Hujus partes duplices sunt, alia quæ
 os constituunt, alia quæ intus in oris spacio continentur. Constituentes duplices sunt,
 carnosæ & ossæ; Carnosæ sunt Labia & muscoli buccarum, labiorum & maxillæ in-
 ferioris: antè enim os labiis circumdatur, quo os melius claudi, & liquida sorberi
 possint: utrinque vero buccæ protuberant. Hæc integuntur cute cum subiecta pin-
 guedine, quæ per^b transversum in medio scissa est (ad modum palpebrarum) quan-
 tum pro cibo assumendo sufficit. Ossa vero sunt maxilla superior & inferior, cum
 dentibus utrique infixis. Quæ omnia, ut & tota oris capacitas in rinescus succin-
 guntur membrana crassa, quæ in palato non nihil rugosa, & dentium gingivas ambit,
 labiorum parte^v superiorem obducit, & reduplicata Gargareonem constituit: de
 quibus singulis ordine.

II. us

Uſus oris primarius duplex eſt: primus, ut ſit meatus ad cibum & potum aſſu-
mendum, quo in eo primum prægoſterur, ſiquidem guſtus qualitatem eorum quæ
nos commodè nutrire poſſunt, percipit; quare oris ſtatim ingreſſu, lingua tanquam
propriū guſtus instrumentum occurrit, ita ut nihil intra os admittatur, quod non
prius ſuas qualitates contactu linguæ manifeſter: dein, ut in eo veluti culina alimen-
ta antequam deglutiantur, ſcindantur, comminuantur & miſceantur, quo præparata
in ventriculum deferantur. Alter^d ad uſum ſpirationis, inſpirationis & exſpirationis,
quo aer naribus etiam ocluſis intro miſſus, & ſuſum ad nares, & deorſum ad pulmo-
nes feratur, ad ſpiritus vitalis nutritionem, ejuſdemque expurgationem: præſertim
ad vocem edendam, cum per os ſermo fiat. Secundarius uſus, quo per id thoracis &
pulmonum excrementa ſcreatu, quemadmodum ipſius ventriculi, quandoque vom-
itu reſiciantur.

Proinde oris quoque officium omnibus commune, cibus conſciendus eſt: robur nonnullorum peculiare eſt: ſermo alio-
rum. At vero noſtra hæc omnia eodem conſecit, adhibita differentia ejus partis, pro actionis diſcrimine: Sunt enim alia
ore comprefſiori, alia ampliori: quibus enim cibi conſciendi, & ſpirandi, & loquendi gratia os datum eſt, iis compref-
ſius eſt: quibus auxiliandi gratia, iis ſi dentibus ſint ſerratis, reſciſſum. Quum enim tota eorum vis in mordendo ſit,
hiatum oris ampliorem eſſe necesse eſt, eo namque pluribus & plenius morſum inſigent, quo amplius reſciſſum os ſit, &c.
Ariſt. 3. part. 1.

De Buccarum & labiorum muſculis communibus.

CAPUT LXIX.

De lato muſculo Galenus de diſſect. muſc. 1. & 4. adm. ant. 1. 2. & 3. egir: at 11. uſ. part. 15. muſcu-
loſam quandam ſubſtantiam, ac tenuem cuti faciei ſubjectam vocat, cui cutis ſit unita: ſe-
quenti vero cap. quemadmodum & cap. 4. muſculum latum ac tenuem in genis unum in parte
utraque ad coll. ſpinam, &c.

Muſculi buccis & labiis communes quatuor ſunt, utrinque duo, Quadratus &
Buccinator dictus.

Quadratus [tab. 27. fig. 1. Γ δ ε ζ η θ. circumſcriptus.] ſive, ut Galenus^a vocat μυωδης a Diſſect. muſc.
μυωδης muſculofa dilatatio (ſive μυες πλεονες b η α λεπτοι, muſculi lati actenues, i.
cum membranei ſint, & admodum ampli.) Hic ſub colli cute^a latitat, & per totam b 4. ad. an. 1.
faciei inferiorem regionem ſub ore expaunditur: membrana eſt c fibris carnoſis, a nul-
lo tamen oſſe pronatis, adaucta, quæ à ſpinarum vertebrarum cervicis regionibus, ignorarunt,
colli parte externa, ubi extumefcit, ſcapularum, calvicularum, & pectoris oſſis ſedi-
bus, ſant, à ſpina ve-
ro colli incipi-
unt: primum par buccarum & labiorum, Veſ. Fallop. inſtit. muſculi lati in collo poſti labiis ancillantes, Columb. Mu-
ſculus cutaneus oris labia & buccas movens primus, Plat. muſculi duo labris communes, Piccolhom. muſculus latus,
Laur. quem ita deſcripſit: Carnoſa faciei totius membrana, muſculus latus Galeo dicitur, qui ſimilis eſt equitantium
capucio, ſi tantum ejus demas, quantum pileolo regitur, quare ſolius faciei cutis in homine & equo, & morvetur.
c Incipit hic muſculus in priori parte labiorum & buccarum: in poſteriore vero ex ſpina regionibus, toti cuti, qua cir-
ca collum eſt, in orbem ſubtenſus, tenuis & membranofus exiſtit, ac latet, an membrana potius quam muſculus eſſe vi-
deatur: ſed ſi à cute ſeparetur, manifeſtus evadit: qui deorſum fertur, anteriſ ad clavicular, poſterius juxta ſcapula-
rum ſpinas ad dorſi principium, quod vero medium eſt, & membranofum, per mediam ſpinam, qua in collo eſt, exten-
ditur, quod corpus diſſectionis Profeſſores cum male animal excoriarent, ignorarunt, Gal. diſſ. muſc. 1.

Dissect. musc.

2.

4. ad. an. &

dissect. musc. 1.

11. us. part. 16.

f Nervorum

vini immen-

sam ex omni-

bis propemo-

dum colli par-

tibus recipit

musculus hic

latus ab Ana-

tomis ignotus

Est, ubi eum

descripsit 11. us.

part. 16. ar. Ve-

salii hac sunt,

primo utrius-

que lateris mu-

sculo. Galenus,

qui ipsum cum

libris de us. var.

conscriberet,

latuit quem-

que tandem à

se inventum

fuisse, non se-

mel in libris de

adm. anat. in-

culcat, adeo fa-

cit, illumque,

ut veterum

oscitantiam

magis argueret

zani momenti

esse tradidit,

Est.

Recta, obli-

qua, transver-

sa, Vesal. par-

tim recta, par-

tim oblique ascen-

dunt, Piccolhom.

h In labrum inferius

& buccam inferius,

Plat. i pene quadratus,

Columb. &

Piccolb. k Ab hoc musculo nullus articulus detinetur,

cum in articulum non inseratur, sed buccas, ac cusim, cui co-

alescit, solus movet: huius motus ante dissectionem evidens est, cum buccas à seipsis ad latera citra inferioris maxilla mo-

tionem, & oris apertionem abducere volumus, de dissect. musc. 1. & 11. us. part. 16. hac ipsius actio, utilitas vero, quod ad ser-

monem ac masticandum valde confert. 11. us. part. 16. l Totas buccas in latera deducere idonei: si enim dentes utrius-

que maxilla invicem firmiter commiseris, utrinque buccas in adversum colli latera, distorquere poteris 4. ad. an. 2. hi

cum contrahuntur, eos motus efficiunt, quo immota inferiore maxilla, inferiore labro deorsum tracto, obire possumus

Fall. Insuper fuerunt veterum & juniorum, qui solius musculi lati opera moveri, utrumque labrum volvere, & propter

fibras varios & contrarios motus edi, Laur. buccas & inferius labrum totum deorsum retrahunt, & ad latera simul

cum superiore labro abducunt, opitulanti sequenti, Ves. m Gal. dissect. musc. 1. n 4. ad. an. 10.

bus, sensim vario ductu sursum ad faciei medium ascendunt, & musculum latum ac tenuem efficiunt: quare si quis^d musculum appellare nolit, sed musculosam naturam vel substantiam, vel quomodocunque quis voluerit, id faciat licet: & hæc forte causa fuit, cur veteres à cute non distinxerint, sed cum ea amoventes in musculorum numerum minime reposuerint, quem Galenus^e primus descripsit. Cum enim ad hanc membranam^f nervorum furculi plures à cervicis nervis mittantur, qui fibris his etiam porriguntur, idcirco membrana hoc loci validus (quam in reliquo fere corpore) partibus unitur, & fibrarum varium ductum causat. Ab osse siquidem pectoris & claviculæ regione fere media, fibræ secundum colli longitudinem recto ductu feruntur [à d. ad g.] & quæ ex claviculæ sede reliqua humero summo, & cæteris nominatis partibus incipiunt, oblique sursum tendunt, [à b. ad o. & h.] & quo cervicis spinis propinquiore, eo obliquiores conspiciuntur, ita, ut ubi occipitio viciniore sunt, pene transversæ existant: harum tamen fibrarum in collo intersectio nulla conspicitur. Hæ, ubi ad mentum pervenere, ubi labrum superius cum inferiore^h jungitur [inter h. & g.] potissimum ad labrum inferius, ita inter se confunduntur, ut amplius distingui nequeant. Quadratum vocavimus, quia ab clatiore cervicis parte secundum ossis occipitii latera versus aurem fertur, & nonnunquam in ipsius radicem fibris carnosissimis implantatur, beneficio quarum in hominibus, qui talem musculi ductum habent, aures moveri diximus: nonnunquam sub ipsius radice [o.] in faciem ducitur, maxillæque musculum masseterem integit: simul & ossi malarum validius, quam alibi connascitur: ita ut hanc partem maxillæ musculum quintum aliqui censuerint; hinc nasi radici inseritur. Alterum latus est per transversum [ab o. h. ad g.] tertium vero à summo humero ad os pectoris [à b. ad d. g.] inæquale ac varium: quarum à summo mento ad os pectoris [g. ad d.] Hi musculi faciei cutim, quæ à musculosa frontis, occipitis, aurium & nasi substantia, eorundemve, ut & palpebrarum musculis non movetur, movent; ^k vel potius, sicut dexter labrum tam superius, quam inferius ^l in dextram partem trahit, & movet, sic sinister ambo labia in sinistram oblique deorsum trahit, & quia cum mento plurimum coherent, idcirco oris apertioni auxilium ferre videntur. Hic est, qui primus^m omnium in iis, qui spasmo corripiendi sunt, intenditur, unde spasmiⁿ cuncti sunt, cum homines ex horum contractione carum rictus imitentur. Hujus autem fibræ Chirurgus noscendæ, propter incisiones, quæ aliquando fieri debent: harum enim naturam ignorantes nonnulli, ampliore sectione transversa ipsas dividentes, buccas ad alteram partem avulsas, ⁿ effecerunt.

o Buc-

tim oblique ascen-

o Buccinator seu buccas efformans [tab. 23. f. 2. X. tab. 27. f. 2. M. tab. 28. f. 3. M.] prædi-
 cto subjacet, & totam buccarum sedem, quam inflamus, amplectitur; & rotundus
 p est: hic à maxillâ & superioris lōgitudine fere tota exortus, in inferioris maxillæ lon-
 gitudinem ad gingivarum radices inseritur: vel, si mavis, à summis gingivis in sum-
 mas gingivas circuli instar terminatur; nam cum circulum æmuletur, & in circulo
 quicquid sumatur, illud idem & principium & medium & finis sit, parum refert, an
 a superis in inferas, an ab inferis in superas progredi dicas. Tenuis est, membranæus,
 & variis fibris intertextus, unde variæ ipsius actiones promanant, quas intra extraq; &
 supra infraque obimus. Et hic cū circulum æmuletur variisq; fibris intertextus sit, ali-
 qua sui portione, in quibusdam ridentibus foveam quæ in genis apparet, efficit. Huic
 intrinsecus oris tunica succingens connascitur, ita ut integre avelli nunquam possit.
 Hic licet maxilla quiescente, buccas cum labiis moveat, ejus tamen officium, cibum
 ab ore in buccas elapsum, tanquam manus dentibus ministrare, nunc huc, nunc illuc
 propellere, quo alimentorum à dentibus accurata fiat confectio, comminutio, &
 ad chylum in ventriculo concoquendum, præparatio. Buccarum vero earumve ca-
 vitatum^t usus duplex est: primus, ut si quid inter mandendum à dentibus foras exci-
 dat, non disperdatur, sed intra buccas retentum asservetur. Alter, ut sint veluti re-
 ceptacula cibi continendi, quod in simiis videmus, quæ ipsas cibis distendunt,
 quos postea sensim conficiunt. At in homine etiam ad loquelam conferunt, maxime
 is qui buccina vel tuba modulate canunt, inserviunt: si namque buccas inflatas in
 oris amplitudinem volueris, nunc extrorsum, nunc sursum, nunc deorsum, nunc an-
 trorsum, nunc retrorsum, hujus musculi motus varios videbis. In hujus centro, Pla-
 centinus observavit vinculum quoddam robustum exterius enatum & os genarum
 perreptans, ubi in musculum quendam parvum & gracilem buccæ directe opposi-
 tum terminatur. Sunt qui musculos labiis & buccis communes quinque proprios
 vero octo faciant.

o Gal. II. us.
 part. 4. hujus
 sic meminit,
 masticatorius
 musculi maxi-
 mo auxilio sunt
 fines buccarum
 inferiores, qui
 cutanei sunt,
 spectantes ad
 labia, ad quos
 perveniunt, te-
 nues ac lati
 musculi, &c. 2.
 par buccarum
 & labiorum,
 Vesal. musculi
 buccarum duo,
 quos quidam
 in magno vo-
 lumine descri-
 bere oblitus est,
 Columb. 2. par
 faciei buccas
 formans, Fal-
 lop. instit. 2.
 musc. cutaneus
 oris labia &
 buccas movens
 Plat. musculi
 buccinatorii,
 seu buccarum

musculi, Piccolhom Musculus sphincteris modo buccas circumdans, buccinator dictus, quem plerique maxilla inferio-
 ris musculum esse putant, sed male, Laur. p. Latus & quodammodo orbicularis, Vesal. q. Sic & Vesalius.
 r Columb. Piccolh. Laur. t. Hic 2. buccarum musculus vix aliud est, quam carnosarum fibrarum implexus, admodum
 tenuis, & quodammodo membranæus, Vesal. t. Sic & Piccolhom.

De Labiis & eorum musculis propriis.

CAPUT LXX.

De his consule Galen. libro de dissection. musculor. 2. & II. us. part. 15. & 16. sic 4. admin. ana-
 tom. 3.

LAbia, oris opercula, duo^a sunt, superius & inferius; quorum substantia^b carno-^a Arist. 26.
 sa & fungosa est, permobilis, ^c cui cutis cum musculis per totum miro artificio
 Nnn 2 exacte
 16.

^b Tota labiorum natura ex fungosa substantia mixtione, cute & tribus latissimis musculi terminis invicem concretis, con-
 flata est 4. ad. an. 3. c Arist. I. hist. an. II.

a Diss. mu-
scul. 2.

e II. us. part. 15.

Ex eo Laur.

f Vesal. muscu-

los buccarum,

labiorum, &

nasi alarum si-

mul recenset,

Ex paria facie

sex, vel muscu-

los duodecim,

duos latos ex

carnea mem-

brana constan-

tes: duos va-

rios ex una qua

si maxilla in

aliam pronatos

(intellige eos,

quos preceden-

ti capite propo-

suimus) hos

quatuor com-

munes dicit;

quatuor labris

propriis, duos

superioris, duos

inferioris; qua-

tuor alarum

nasi nisi dos ex

carnea membrana unum

facere velis: vel etiam

navium primum par

externum, quod labrum

superius

& alam simul adit, duos

facere velis: hac Vesal.

At Fallop. in Instit. musculos

buccarum & labiorum, & nasi utrinque

novem constituit, 1. par à

membrana carnea, 2. qui

buccas formant, 3. labii

superioris, 4. labii

partem freni nomine

donatam, 5. in alam

navium & labium

superius, 6. in naribus,

7. inter tertium &

quintum in frenum,

8. in radice

pinnae navium,

9. carnea moles

labia efformans: Plat.

labiorum & buccarum

sex paria sunt: navium

vero tria: Piccolh.

nasi musculi duo: lambitorii

sex, quatuor proprii, duo

superioris, duo inferioris,

duo communes (intelligit

quadratos) habet &

duos buccinatores: Laur.

Labiorum musculi 8.

duo superius sursum,

2. deorsum, 2. inferius

sursum, 2. deorsum

agentes, quibus buccina-

tores addit, quatuor

navium, duo dilantes &

duo occludentes. g

Gal. diss. musc. 2.

Gal. diss. musc. 2.

Gal. diss. musc. 2.

Gal. diss. musc. 2.

exacte commiscetur, ita ut recte Galenus e illorum substantiam sic conformatam dixerit, ut cutim musculosam, aut musculum cutaneum appellare liceat. Et quemadmodum extrinsecus cute, sic intrinsecus membrana ventriculo & ori communi conreguntur: unde in vomiturientibus inferius labrum tremit. Data autem sunt omnibus animalibus propter edendi & bibendi commoditatem: homini insuper propter loquelam & vocum formationem, tum ut dentes orisque spatium, dum os claudunt, ab aere frigidiore & externis injuriis tucantur: quarto ut in ore salivam retineant, ne continuo effluat, ut in decrepitis & pueris quibus labia mollia sunt & resoluta, contingit: verum & sputi rejectionem adjuvant: tandem quatenus os regunt ad faciei ornatum quoque faciunt: unde quibus labia curta sunt deformes existunt. Ad quæ præstanda motu voluntario moveri debuerunt, quare musculos obtinuerunt. quorum alii communes sunt labiis cum buccis, de quibus jam dictum fuit: alii proprii sunt octo.

Superioris primum par [tab. 27. fig. 1. G. H.] & ab ossis jugalis sutura extrema, & ea, quæ primum os maxillæ superioris à tertio separat, & ab ossè malæ, principio lato & carnoso enascitur, deorsum oblique in priora fertur, & in labii latum se infert, & labrum superius, & sursum & deorsum, & introrsum & extrorsum movere potest, idque propter fibras varias, ac varie inter se commistas, & cum cute intertextas: à qua tamē, si corpus musculosum quod pingue non sit, detur, & se cilio diligens instituat, aliquo pacto separari possunt. Hoc aliqui pro duplici pari recensent.

Secundum i par [tab. 27. fig. 1. sub H.] à cavitare malis subiecta, carnosum, gracile, teres, pinguedine multa obvolutum, in frenum, ubi labia conveniunt, inseritur, & labrum deorsum vertere voluit.

Inf-

nasi nisi dos ex carnea membrana unum facere velis: vel etiam navium primum par externum, quod labrum superius & alam simul adit, duos facere velis: hac Vesal. At Fallop. in Instit. musculos buccarum & labiorum, & nasi utrinque novem constituit, 1. par à membrana carnea, 2. qui buccas formant, 3. labii superioris, 4. labii partem freni nomine donatam, 5. in alam navium & labium superius, 6. in naribus, 7. inter tertium & quintum in frenum, 8. in radice pinnae navium, 9. carnea moles labia efformans: Plat. labiorum & buccarum sex paria sunt: navium vero tria: Piccolh. nasi musculi duo: lambitorii sex, quatuor proprii, duo superioris, duo inferioris, duo communes (intelligit quadratos) habet & duos buccinatores: Laur. Labiorum musculi 8. duo superius sursum, 2. deorsum, 2. inferius sursum, 2. deorsum agentes, quibus buccinatores addit, quatuor navium, duo dilantes & duo occludentes. g Gal. diss. musc. 2. quatuor sunt, utrinque unus à malis oblique descendentes, & duo ex inferioribus ab extrema maxilla, ubi mentium, alter à dextra, alter à sinistra: hac Gal. vide & II. us. part. 16. & 4. ad. am. 3. Vesalius tamen ait, Galenum nullam feres uti decebat, aliorum musculorum præter lati (quem quadratum vocavimus) fecisse mentionem, at Eector consulat II. us. part. 4. & 10. cap. præsertim 16. ubi de labiorum musculis toto capite egit: Columbo, labiorum musculi quatuor, duo in superiori, duo in inferiori. h Superioris labii musculus, cui origo quadruplex, Colum. & Piccolh. hicque vult sursum, deorsum, introrsum & extrorsum movere: Labrum superius sursum moventes duo à mala arti, Laur. Labio superiori peculiare duo, à maxilla superioris ossè enati, utrinque insit labii latum inferuntur, Vesal. tertium par buccarum & labiorum à mala ossè oblique in labii superiora latera ad superiora oblique trahens. Fallop. Instit. vel 3. par musculorum faciei, 3. par musculorum cutaneorum, à mala ossè, Plat. i 7. par musculi faciei (cum quo ejusdem 4. par idem videtur) Fallop. Instit. at in obs. ad quarum par musculorum faciei à Vesal. prætermissum, in omnibus cada veribus à me repertum: 4. musculus cutaneus, Plat. Verum Laur. duos quidem habet, deorsum moventes sed à mento in idem labrum delatos. k Duo labrum inferius constituentes, Gal. diss. musc. 2. Vesal. Columb. labii inferioris duo proprii, Piccolh. 5. Muscul. cutaneus, Plat. At Laur. quatuor sunt, duo qui sursum movent, ab osseo ambitu oculi, & malo oris in labrum inferius oblique inferuntur: deorsum movent totidem à mento in idem labrum inferit.

Inferioris par, ^k unum est [*tab. 23. fig. 2. Z. & tab. 27. fig. 2. N.*] aliis duplex: quod à maxillæ inferioris humiliori parte, ubi asperitas quædam insculpta est, ad menti, quasi latera, carneum exortum, oblique sursum protensum, latumque permanens: (latius enim & brevius est superiore) in labii medium implantatur, ejusque cuti, quemadmodum & prædicta ita miscetur, ut fibræ decussatim se interfecerint: quarum fibrarum beneficio labiorum motus diversi fiunt. Quare Galenus ^l notavit, per hos musculos (quos tamen quatuor tantum esse voluit) motus octo effici, quatuor quidem obliquos, in utroque labio duos; præter eos autem alios rectos quatuor, duos quidem omnino rectos, cum labia plurimum à sese distant, alterum quidem sursum ad nasum protensum, alterum deorsum ad mentum detractum: tum, quando inter se committuntur, superno scilicet deorsum, inferno autem sursum tracto. Quemadmodum enim in capto ac brachio ex obliquis motibus recti fiunt, sic & in labiis accidit: si enim musculus solus utriusvis labii agat, motus sit ad obliquum: si vero tensi utrique fuerint, eo modo jam totum simul labrum sursum quidem à musculis superioribus trahitur: deorsum autem ab inferioribus. Atque etiam tensis fibris externis, labia foras deflectere, intro autem cedere ac complicari ab internis ^l accidit; at si duos hos motus, iis, qui plane sunt recti, adnumeres, quatuor quidem ex abundanti accedentes octo omnino labiorum motus reperias: quatuor enim sunt obliqui: Hæc Galenus. Sunt tamen qui labio inferiori paria duo adscribunt: alterum quod ab ossis malarum parte inferna educitur & in labrum inferius quo id sursum trahat inseratur. Alterum qui à mento in medium labium hoc deorsum movens infigatur.

Musculus utriusque labio communis & orbicularis, is est qui labiorum [*t. 28. f. 3. C.*] substantiam propriam constituit, & labium utrumque in oris circuitu efformat: cujus substantia fungosa est, quare & intumescere & inaniri potest, & ab aliis, fibris ⁿ orbicularibus & carnis colore purpureo distinguitur: quem colorem in morbis diligenter observandum Hippocrates scribit. Hic à nonnullis musculorum faciei par ^m penas & interculiare constituitur: in musculos enim duos dividunt, quorum alter superius, alter inferius labrum efformet: suosque motus aliorum musculorum instar habeant, & carnem labiorum, quando os parvum formatur, in sese colligere ac corrugare.

Nervorum quoque propagines ^o *t. 28. f. 3. ad C.*] ad utrumque labium mittuntur, quare sensu exquisitissimo prædita sunt. Venæ item & arteriæ à propinquis ^p locis inter cutim & carnosam membranam disperguntur.

Cum labiorum operis fiat, de eo paucis. Ritus est motus ex labiorum contractione & expiratione intercisus, eaque sonora constans, hilaritatem denotans: qui à facultate ^j *superius* proficiscitur. Nam cum hilaritatis nota sit, eaque inter animi affectus censeretur, hique ad facultatem vitalem pertineant, certe & ipse ritus ejusdem facultatis actio erit, modo contrariorum eadem sit ratio: tristitia namque quæ hilaritati contraria est, ad facultatem vitalem refertur. Verum affectum animi ea est conditio, ut protinus atque in corde concepti fuerint, reliquas facultates simul afficiant, & in iis affectionis suæ notas exiunt. Nam quemadmodum timentes, totius corporis tremore corripiuntur: ita gaudentes gestiunt: irati extra se sunt & mentis impetores, qui jam non vitalis sed animalis facultatis motus existit. Hinc fit quod ea symptomata qui animi affectus consequuntur, non omnia ejus facultatis sint ad quam ij

primo & per se pertinent, sed eorum signa etiam in aliis corporis partibus manifeste appareant.

Quare cum in corde hilaritas concepta est, mox indicibili modo movetur & veluti gestit & spirituum copia luxuriat, qui in pulmonem effusi expirationem intercisam & honoram, quæ Risus dicitur faciunt. At cum omnium facultatum consensus inter se mutuus & promptissimus sit, Cerebrum quoque voluptatis quæ cordi inest particeps, eam quasi cordi congratulans, labiorum contractione, motu sibi proprio testatur: quo motu natura hilaritatem in cuiusque animo conceptam palam facere voluit.

Est autem ea labiorum contractio & compressio æqualis, & in moderato quidem risu modica, in profusiore autem ut cachinno amplior: aliquando tanta, ut dentes denudet, deformitatemque inducat. At quia hic labiorum motus, plane naturalis est, risu sedato, labia orisque habitus protinus ad se redit: dissimilis plane ab ea contractione quam aliqua causa præter naturam expressit, quæ à Sardæ herbæ crocive potu aut diaphragmatis inflammatione contingit, & non nisi abusive risus nomen accepit.

Sonus vero qui ridendo editur, is in vocalibus instrumentis perficitur, cuius materia est spiritus multus, tenuis calidus & corde in pulmones effusus: hinc iis quibus spiritus ejusmodi suppetit ad risum promptissimi sunt: contra quibus spiritus paucus, crassior & frigidior est, ut plurimum ridere non possunt. Sic qui frigido siccoque temperamento præditi sunt, ut senes, melancholici & ægrotantes, nunquam aut certe raro ridere solent. Similiter qui literis assidue incumbunt, pene ἀγέλαστοι redduntur, cum iis non sit ejusmodi spirituum copia, qui confertim & corde erumpere & ejusmodi expirationem concitare possint, quæ intercisè prodiens singulis sui partibus atque sectionibus sonum edat. Siquidem in risu spiritus ille non confertim, sed divisim erumpit, ut non una, sed quodammodo multiplex exspiratio videatur, quæ sæpe tanta est, ut nimia spirituum exhalatione syncopes & vitæ periculum provocetur: tantos enim motus in corde hilaritas concitat. Quare ad risum duo requiruntur, labiorum contractio & sonus, quæ in aliis moderatius, in aliis profusus concurrunt: at si horum alterum desit, deest autem aliquando sonus, præsertim in modestioribus naturis, tunc is non plene vereque ridere, sed potius subridere dicitur.

De maxilla inferioris musculis.

CAPUT LXXI.

De his egit Galenus lib. de dissect. muscul. 6. & 4. adm. anat. 4. & de musculo ori aperiendo præfatio 4. adm. anat. 11. 11. us. part. à cap. 1. ad 8. & com. in libr. de arte, Hippocr.

Maxilla duplex est: superior quæ in homine immobilis, inferior altera, quæ mobilis existit, & voluntarie movetur: cuius motus duplices sunt, simplices sex, & compositus unus. Simples sursum & deorsum, dextrorsum & sinistrorsum, antrosum & retrorsum: Compositus vero ex dextro & sinistro, & eo qui antrosum & retrorsum fit, quo maxilla circumduci videtur: motum sursum, temporalem; deorsum, digita-

digastricus; ad dextram & sinistram, manforius primus: retrorsum vero, manforius alter, sive in ore latitans: antrorsum autem quantum par absolvit. Movetur sursum & deorsum mordendi secandique gratia; ad latera, dextrorsum, sinistrorsum, antrorsum, retrorsum, molendi gratia; nam in maxillam inferiorem dentibus instructam, tanquam in molam quandam movendam, insinuantur. Quemadmodum enim in mola, à fixi mole frumenta & legumina teruntur, ita eibus intra dentes superiores, tanquam molæ partem firmam, & dentes inferiores, maxillamque inferiorem, tanquam mole partem mobilem & incitatem teritur, comminuitur atque conficitur. Quare muscoli hi molares, & quia actus hic masticatio dicitur, masticatorii quoque & manforii dicuntur. Verum, non solum masticationis gratia, sed etiam ad vocis articulationem necessario moveri debuit, quemadmodum in brutis etiam ad defensionem: quare os aperitur, clauditur, & in circulum agitur musculis utrinque quinque.^a

1. Temporalis *υποταφικος* [tab. 27. f. 1. & 2. B. tab. 23. fig. 2. eius circumferentia NNN. ^a Maxilla inferior, quas uor pars carnosa Q Q Q. pericranio adhuc intectus O. membrana retracta P.] quia situm nomen obtinuit, ut qui capitis partem lateralem obideat, usque ad auris partem posteriorem & superiorem, ossium temporum cavitatem totam implens, & omnium maxillæ, validus & robustus: hic à maxillæ superioris ossis primo, frontis, syncipitis, temporum & sphænoide, initio lato carnoso & semicirculari oritur [tab. 27. fig. 2. α, β, γ.] sursum trahunt crotaphita, & qui intra os siti sunt; ad latera adducunt, qui in buccis locati, quos masseteres appellant: deorsum trahunt reliqui duo. Gal. dissect. musc. 6. de horum musculorum magnitudine differentia 11. us. part. 6. maxilla mota, sursum cum os clauditur.

mus, dein manducantibus prorsum ac retrorsum, & in latera circumfertur, & cum os aperimus, nunc recta, nunc paululum in alterutrum latus declinans deorsum agitur, quatuor utrinque musculis, Vescal. utrinque quatuor, temporales, in ore latitans, masseter, & os aperiens, qui duos ventres obtinet, Columb. quatuor tantum paria adscribunt, quatuor minus ignorantes, cum intersecandum perspicuus sit, & proprius usus eum etiam prodatur, Fallop. observat. at in Instit. quarum nominat: quatuor vel quinque paribus movetur, Plat. Octo musculi motorii, manforii & masticatorii, quatuor qui sursum, duo qui deorsum, duo qui in latera movent. Piccolh. moventes sursum seu claudentes quatuor sunt, duo qui sursum, duo aperientes, & duo ad latera utrinque unus, Laur.

b Crotaphita Gal. dissect. musc. 6. dissect. nervorum 5. & 4. ad an. 4. quos non iuniores tantum Medici, sed & antiquiores etiam, veluti Hippocrates *υποταφικες* vocant, de dissect. musc. 6. & 4. ad an. 2. temporalis & primus maxilla, Vescal. Columb. Plat. Piccolh. 1. par. Laur. 2. par maxilla, Fallop. Instit. c De dissect. muscul. 16. 11. us. part. 3. d In extremis maxilla coronas, & in maxillam ipsam pertingunt, circa coronam cephalis in validis aponeurosis inseritur: idem desinit in magnam tendinem, qui maxilla inferioris curvo acuminis infigitur. 11. us. part. 4. de huius tendinis magnitudine & usu 11. us. part. 5. e Columb. (aditus usu amoto, vita deficeret) Piccol. f Masonius p. 15. lib. de arte. g Reliquos omnes,

Laur. mirari nequeo quid sit in hoc musculo tantopere à Galeno 11. us. par. 5. decantatum, cum in huius tendinis productione nil rarum, nec ab illorum musculorum qui gibbum & cavum scapulae implent, & qui ex illius osse pronati feroris motibus famulantur, diversum sit, &c. Vesal. Verum Gal. 11. us. par. 2. Natura solerter miratur, quemadmodum Hippocrates admirans, assidue iustitiam nominabat propter musculi temporalis in magnitudine ratione diversarum animalium eorundemque maxillam & usum, differentiam, quod divina iustitia proprium, non modo invenire, quae oportet, verum etiam tribuere cuique pro merito ac dignitate, &c.

h Natura miratur diligenter in temporum musculis zuendis explicat 11. us. par. 3. ubi ostendit, quomodo & cur inter omnes musculos eos potissimum, si lassifuerint convulsiones, febres, soporem & deliria inferre, & Hippocrates lethales plagas & sopores in temporibus fieri dixerit.

quam h cum cerebro habet, cum solum os intercedat, & propter nervos insignes, superat. Nervi enim utrinque tres huic musculo inseruntur: duo quidem à tertia conjugatione: tertius autem durior ex quinta vulgo dicta conjugatione, & id roboris gratia, cum musculis, ex nervorum multitudine robur ad actionem accedat. Non mirum ergo, si hoc laeso & contuso, convulsio, imo mors succedat: hinc etiam Hippocrates maxillae inferioris luxationem saepe lethalem, ob musculi huius distensionem existimavit; & libro de articulis ait, nisi inferioris maxillae ossa reponantur, periculum vitae imminere, ob febres continuas & soporem torpidum, hos enim musculos, si praeter naturam alterentur & intenduntur, soporiferos esse. Et Aristoteles * refert ex vulnere temporum caecitatem ortam esse: nam musculi huius temporalis cum oculo admirabilis sympathia est, propter communionem nervi oculum moventis, ita ut temporali † laeso, oculus laedatur & contra. Quare tutelae h causa natura adposuit, primo membranam crassam ac duram, pericranium, cuius nomine musculus exterior h livet: nam interior musculi pars, quae ossi adharet, tota carnea est: os enim ea parte, perostio † non tegitur, & propter hanc pericranei portionem, aliqui huius musculi tendines duos, internum & externum describunt. Deinde partem inferiorem nervosam ossi jugali, ne nervi m laedantur, vallavit, ita ut hoc os musculi huius solius gratia constructum videatur. Tum huius tendinem infra supraque carne munivit, quo minus ab externis offendatur. Et hi in hominibus n respectu aliorum animalium, quemadmodum & in simiis, minimi sunt, ac minimum nervosi; maximi vero, ac nervosissimi n leonibus, lupis, canibus, & omnibus animalibus, quae καρχαρόδοντα, id est, dentes serratos habentia, appellant; in aliis animalibus, n ut porcis & asinis sunt maximi, non tamen aequae nervosi: magni autem effecti n ob actionis in mordendo robur, & maxillae inferioris magnitudinem: at homo omnium animalium minimum habet, quod & maxillam inferiorem, respectu aliorum, minimam, & ad actiones imbecillam, utpote dentes ad solum esum idoneos; cum hominis n fortitudo non in morsu consistat, neque eo cetera animantia coerceat, sed ratione ac manibus. Inter maxillae tamen musculos o maximi sunt, quia totam maxillam inferiorem, velut à se pendentem, attollunt ac sustinent.

i De Nervis ad musculos faciei 11. us. par. 7.

* lib. de sensu & sensili.

† Columb.

k Extérieure tanzum sede propter propria membrana crassitiem, per quam lividus, Vesal.

l Sic & Laur. reprehendens eos, qui duos tendines describunt. Et Col.

tendo alter in

acutum maxilla processum, alter tendo membranosis, musculus exterior lividus reddens, sub osse jugali deferitur. m 9. us. par. 8. de diff. ner. 5. Os jugale adpositum securitatis gratia 11. us. par. 5. n 11. us. par. 2. ubi plura animalia recenset, & differentiam musculi huius. o 11. us. par. 6. p Masseteres, nomine ab utilitate imposito, i. Masticatorii, qui in buccis sunt locati diff. musc. 2. diff. nerv. 5. 11. us. par. 4. 4. ad. an. 4. etiam mandibulares: Fallop. in Instit. 1. qui ab osse jugali in maxilla partem inferiorem inferantur, & ad latera circumagunt: Vesal. & Plat. 2. Colum. 3. Piccol. molaris; 3. Laurent. quartum par ad latera moventis.

II. p Mansorius primus μασσητήρ & molitor, quia propria ejus actio est μάσσησις, mandu-

manducatio, & in buccis locatus est [tab. 27. f. 2. & tab. 28. f. 3. I. tab. 23. fig. 2. V.] duplici
 ¶ est capite, unde & Biceps dici posset, altero nervoso à mala [tab. 27. f. 2. A.] prodicens q Sic & Laur.
 ad futuram, ubi maxillæ os, ossis jugalis portionem educit, & in maxillæ angulum ex- At Vesal. Co-
 tremum, seu ipsius processum acutum fertur: altero carnofo ab osse jugali [tab. 27. fig. lomb. & Pic-
 2. x. & tab. 28. f. 3. ad G.] versus mentum fertur & toti maxillæ inferioris amplitudini colb. tendinosæ
 validissime & latissima infertione implantatur, [tab. 27. f. 2. µ.] ita ut obtusi trianguli gine nati à ju-
 alicujus angulum exprimat, veluti verticem quendam trianguli juxta malam habens gali & à primo
 [Δ.] hinc unum trianguli latus versus ossis jugalis extremitatem porrigitur [à λ. ad x.] maxilla super.
 aliud versus maxillam inferiorem [à x. ad µ.] reliquum vero ac tertium, velut basis osse, & in maxil-
 quædam prædictum utrumque latus omnibus maxillæ inferioris partibus conjun- lam inferiorem
 gens secundum ipsius longitudinem extenditur, & horum capitum fibræ sese in- inferuntur, non
 modum X. intersecant, quare & in latera, & antrosum retrosumque maxillam autem (addit
 movent, (cum in mandendo & cibo molendo motus varius requiratur) & circum- Columb.) à 3.
 agunt: quemadmodum enim temporalium actio fuit, dentes inter se vehementer & 4. vertebra
 committere, & id quod inter eos est, comminuere, sic cibum lævigare, in partes mi- colli, quemad-
 nimas conterere masticatorum musculorum actio est: hi enim tensi & contracti, & modum Gale-
 cibos mutant, & qui à dentibus exciderunt, rursus iisdem adducunt, temporalibus nus voluit.
 musculis nihil ad id conferentibus. At lingua ad hanc actionem non minimum con- Hunc ait Gal.
 fert, ut quæ instar manus cujusdam cibos in ore assidue transfert, ac voluit, quo om- II. us. part. 4.
 nes partes ipsius conterantur, & linguæ masticator musculus, velut secunda quæ nonnullos u-
 dam manus adjutor comparatus est: Verum & buccarum musculi maximo auxi- trisque tripli-
 lio sunt. cem existima-
 re, quod tres
 ipsorum sint
 d. p. v. s. g. d. o. r. e. s. aut
 tendines, aut in
 maxillas inser-
 tiones instar
 principiorum
 quorundam,
 sed inter se non
 conveniunt, si-
 quidem hic tria
 utrique muscu-
 lo principia tri-
 buit: ille vero
 caudas aut apa-
 tum, neuroses, aut
 tendines aut

III. Par quod pterigoideum appellare licet [tab. 28. f. 4. juxta B.] sub temporali
 musculo, in ossis temporum cavitate humiliore sede, situm est, & partim à supernis
 processuum aliformium partibus externis, asperis & inæqualibus, & partim ab ossis principiorum
 sphænoideis elatiore apice aspero & acuto, qui in temporum cavitate ex adverso os quorundam,
 jugale respicit, ubi rimam amplissimam, quæ ab eodem sphænoide & malorum osse sed inter se non
 maximo formata est, imminet, ortum ducit, & quidem principio partim nervoso, & conveniunt, si-
 partim carnofo, quod satis carnosum redditum retrosum oblique ducitur, & in ma- quidem hic tria
 xillæ inferioris cervicem & illius capitis internam sedem inseritur, & hoc maxillam utrique muscu-
 antrosum, movet & exerit. Hujus actionem adjuvat aliud par * Fallopio propo- lo principia tri-
 tum, buccarum musculi maximo auxilio sunt. buit: ille vero
 caudas aut apa-
 tum, neuroses, aut
 tendines aut

Ooo

infortiones: sed nulla est in re controversia, sed in docendi ratione: triangularis enim quodammodo musculorum uter-
 que est. I. us. part. 4. ¶ Vesalius censuit temporali musculo, masseteri & in ore latitanti cum suis in altero latere
 conjugibus conceditum, ut maxillam inferiorem nobis mordentibus simul sursum ducant, & contrahant: nulli enim
 privatum hoc commissum. At Fallop. censuit Masseterem hoc secundario facere, primo maxillam ad latera ducere,
 Vesal. masseterem & in ore delitescientium opera circumducere voluit, dextro massetere, & sinistro in ore latitante si-
 mul contractis maxillam in dextrum latus agi, sinistro massetere & dextro in ore latitante, una contractis manducan-
 tibus maxillam in sinistrum latus circumferri, molam denique versus priora & posteriora in manducantibus à masse-
 teribus præcipue confici.
 ¶ Fines buccarum inferiores, qui cutacei sunt, & ad labia spectant, ad quos perveniunt tenues & latissimi musculi, utraque
 parte unus toti collo circumjecti: moventur enim ab his buccæ cum labiis, etiam si maxilla omnino immobilis fuerit, II.
 us. part. 4. u. Temporalis musculi pars, Vesalio; musculus maxillam antrosum produens, Fallop. observ. at in Instit.
 meminit: s. musculus seu brevis, Plat. Musculus à Fallopio additus, Laur. cum actio exerenda maxilla, tum masseteri,
 tum in ore latitanti propter fibras eorum obliquas accepta referenda sit, non est, cur numerum augeamus, sed Vesalii
 examini subscribamus, Arantius Obs. cap. 30. * Ves. in exam. portionem temporalis esse statuit, Arantius vero rejicit.

tum, quod ab externa ala processus aliformis prodiens, ei spatio quod maxilla capit & processui acuto interjectum inseritur: & hic dum intumescit, maxillam antrorsum leviter propellit, quando videlicet dentes inferiores superioribus prominent.

IV. *Manforius* alter, seu in ore latitans, à Galeno dictus [tab. 28. f. 4. D.] quia in maxilla internæ sinu maximo latitat: hic crassus ac brevis est, & à cavitate interna, vel canali y processuum ossis sphænoidei alas referentium valde nervosus exortus, carneus, amplius & crassus redditus, rectis fibris descendens maxillæ inferioris parti internæ, & posteriori, ubi asperitates notantur, & ubi sinus insculptus, ne fauces nimium occupet, tendine satis valido, nerveo & lato inseritur, & hic temporalem musculum, cui juxta tendinis sui productionem & inscriptionem admodum connascitur, adjuvat, maxillam introrsum & sursum trahendo, & ore claudendo, cum rem gravem sursum trahere, & res duras perfringere & comminueret, laboriosum sit: sed etiam maxillam productam retrorsum revocat.

V. *b* Graphioides seu Digastricus [tab. 28. f. 3. O. P. & fig. 3. N. O. tab. 27. fig. 2. O.] tenuis est & parvus à styloide appendice (hinc graphioides dicitur) rarissime à mammillari membraneus & latiusculus exortus, statim carnosus & teres redditus, sub maxillæ superioris humiliore sede & aure delatus, in medio, ubi ad maxillæ inferioris flexionem curvatur, carnosus substantia denudatus, nervosus redditus, sursumque carnosus in maxillæ medium juxta menti partem inferiorem, ubi os interius insertionis gratia aliquantulum exasperatum est, & ubi ambo utriusque lateris musculi concurrunt, inseritur; quamvis media sua parte hyoëdis ossi adhæreat. Sed & trochleæ quæ dâ imago occurrit; alias enim, cum hi musculi à colli inferioribus partibus non oriantur, sed potius à superioribus, maxillam deorsum movere non possent, nisi ad inferioris maxillæ angulum inferiorem, veluti ad trochleam obvolverentur. Hujus partis usus, maxillam deorsum trahendo os aperire, & quodam conseqüo linguam in fauces retrahere: si vero alteruter solus agat, oblique ad suum latus maxillam deducet. Dicitur fuit digastricus, quod duos ventres habeat, quia initio & fine carnosus existit, in medio vero [tab. 28. fig. 3. inter O. & P. f. 4. inter N. & O.] nervosus seu tendinosus (quod huic & secundo pari hyoëdis [tab. 28. fig. 3. VV.] & laryngis quinto pari proprio, peculiare est) partim roboris gratia, partim ne majus spatium occupet: cum locus angustus sit, in quo multa organa collocanda erant, maxime linguæ & hyoëdis musculi: quare etiam

existimant ut Marinus; privatim separant. *Ælianus* & *Pelops*; *Lycus* prorsus ignoravit: quare reprehendit eos, qui quatuor temporales musculos dicunt: Idem temporali multo partibus coheret, adeo, ut si partem temporalem esse dixeris, haud aberrasse videaris, 4. ad. an. 4.

a Dicunt (ait Fallop. in Instit.) maxillam supra trahere, antrorsum retrorsumq; agere. b 11. n. f. part. 4. & 5. tot sunt, quot temporales, duo scilicet, utrinque superioribus oppositi, vocari possent *zygoëdæ*, aut *zygoëdæ*, quia à styloide processu oriuntur. 4. par maxill. deorsum trahens, & cum tenduntur, aperiens, diss. musc. 6. at 4. ad. an. 11. ori aperiendo perfectum, 4. musc. maxilla inferioris, Vesal. Col. Fall. obser. & Inst. Plat. (cui & longus) Piccolb. 3. part. Laur.

c Innuere videntur Vesal. & Laur.

d Hi soli inter omnes musculos ambas partes extremas carnosas habent, media vero tendinem exquisitum, Galen. diss. musc. 6. hic peculiariter accidit, ut medio inuere pars ipsarum carnosas aboleatur, 4. ad. an. 11. vide & 11. n. f. part. 5. e 11. n. f. part. 5. Multa recensentur, sic Col. & Laur. sed negat Vesal. propter organa ibi posita in medio tendinem obtinere, sed potius propter reflexum hujus musculi secundum maxillæ inferioris angulum, quem ibi molitur, quando maxillam detrahit; tunc enim in collectione insigniter & valide contrahi.

etiam parvi ac stennes, rotundi ac oblongi constructi, maxime cum motus hic facilis sit: siquidem maxilla suo pondere deorsum vergens, nullo valido retrahente opus habebat, sed veluti res gravis minimo negotio deorsum ducatur. ⁸

Et tandem, cum musculi quadrati, (quem cum Galeno inter buccarum musculos recensuimus,) portio maxillæ inferioris ossi insigniter infigatur, ^h dextro & sinistro ad menti medium convenientibus, ut eidem deorsum trahendæ inserviat, idcirco Arantius (qui tertium par propositum non agnoscit) quintū par maxillæ fecit: & hanc portionem una cum quarto pari (scilicet Digastrico) ore patefacto maxillam deorsum trahere, ita tamen, ut à quarto magis secundum rectitudinem, & sine buccarum motu: ab hoc vero, si alter tantum in actione versetur, oblique simul cum buccis inferiorioremque labio ad latus distorqueri: cæteris vero agentibus, in neutram partem inclinando ad laryngem duci.

Ligamentum quoque utrinque conspicitur membraneum, aliorum articulorum ligamentis correspondens, quod maxillam inferiorem processu suo latiore ossi temporum alligat. Verum etiam sub maxilla inferiore utrinque glandula insignis refidet, quam in primorum musculorum administratione auferre convenit.

De Oscitatione quadam aspergenda, cum maxillæ inferioris motus depravatus sit. Oscitatio vel Oscedo *χάσκειν* vel *χασκιδέσθαι*, hoc à *χαίρω* hisco, quod inter oscitandum ore diducto hiatus fiat: illud vero ab *ὄσ* & *κείο* compositum, & proprie os commoveo & os totum aperio significat. Est autem Aristoteli *ἡ χάσκειν μέμνηται ὅτι ὁ ἀνθρώπος*: cum ore aperto admodumque diducto, aerem primum affatim haurientes, mox halituosum iterum copiose cum sono lamentabili efflant: causatur vero ab humiditate statiosa, vel spiritu vaporoso maxillæ inferioris musculis inf. rectos ex cuius sensu molesto animalis potentia excitata exurgit ad id quod illis partibus molestum inhæret expellendi. At frigiditatem etiam causam esse, aliqui ex eo probant, quod & per initia accessionum febrilium & somno maxime appetente oscitationes crebra fiunt, quas & vinum & magnæ raræque spirationes discutunt. Verum etiam à vaporibus ex cibo elatis fieri hæc Hippocrates ^k testatur: Si iis quibus prandere non conceditur pransi fuerint, ii continuo graves, totoque corpore & mente segnes evadunt, cum oscitatione, somnolentia, multaque siti: Quamvis & imaginatio ^l causat, dum vel alium oscitantem quis videt, vel de ea cogitat, ad oscitandum velut incitatur, facilius tamen in pigris & somnolentis, quam aliis. Sic & oscitantes minus audire possunt: nam cum in maxillarum diductu ⁿ auditus instrumentum comprimitur & spiritus interpellatur, strepitus sonori in auribus gignuntur: & aeris externi ingressu intercluso, aures in sono excipiendo, suo munere fungi nequeunt: vel clarius, oscitantes sonos acute non exaudiunt, quia oscitatione tympanum ita distenditur & inflatur, ut sonos excipere nequeat. Fit etiam alia sine voce clara, alia cum voce lamentabili: posterior veteribus indicium fuit vagi animi & apertæ securitatis, ut A. Gellius ^o monet.

Ooo 2

De his meminimus. Homini-

bus quia sensu præditi sunt facilius, statim ubi viderunt evenit ut moveantur, reminiscanturque. ^m Arist. II. prob. 29 hanc questionem movet & respondet: quemadmodum & 5. gen. an. 2. n. Cassius prob. 20. idem quaerit & ita respondet. ^o L. 4. c. 20. deliberatum inquit de nota ejus qui ad Censores ab amico advocatus est & injure stans, clare nimis & sonore oscitavit, atque prope ut plecteretur fuit, tanquam illud vagi animi foret & hallucinantis & fluxa atque aperta securitatis. Sed cum ille decessisset, in vitiosum sese & repugnantem oscitatione victum, tenerique eo visio quod oscedo appellatur, tum nota jam destinata exemptus est.

[Fallop. Piccol. g. Addis Fallo-
pius, Vesalium,
omississe hunc
musculum, cui
ad mentum de-
venerit ante
injectionem.
portionem quæ
dam carneam
oblique ductam
à se emittere,
qua ab unoquo-
que musculo
deducta fibræ
inter seimple-
xus, atque trans-
versis junctæ,
partim hyoidi,
partim mento
copuletur.
h. Paulo vali-
dius ossi in ma-
la, quam alibi
in reliquo ipsius
progressu con-
nascitur, Ves-
simul & in ossa
malorum pri-
mum par buc-
carum & labio-
rum, inferitur.
Fallop. Instit.
i Gal. com. in 7.
aph.

de prisea Me-
dicina.
Arist. 7. prob.
6. quaerit cur
oscitanti sape
oscitando re-
spondeamus?
An propter me-
moriam: move-
mur enim ea
ipsa parte, quo-
de his meminere-

De Osse iugali.

CAPUT LXXII.

De hoc Galenus lib. de ossib. 2. egit.

^a Male interpres Galeni habet transversum, cum in Græco legatur λίσσω non κλισίαν.

^b Uterque processus jugale os constituens, medulla est expers & solidus, Vesalius, Gorraus: non caret medulla, ut Vesalius existimavit: effractum enim cavernosum apparet, Columb. ^c Et oculorum sedem in angusta calvaria hac sede admodum protuberantem egregie firmat, Plat. & Laur.

OS jugale [tab. 2. f. 6. V. X.] σύνωμα aut συζυγῶδες, quasi conjugale, & ex duobus conjugatum, in faciei latere, sub oculi orbita situm est, non quidem os peculiare, sed ex duorum ossium processibus, altero ossis temporum, altero maxillæ primo compositum: qui duo processus in medio per futuram ^a obliquam [tab. 2. f. 6. I. t. 3. f. 8. p.] committuntur, & os unum iugo simile efformant, quamvis & ponti assimilari possit. Foris gibbum, intus cavum, radicibus quidem crassis utrinque, sed in medio processus à temporum osse prodeunte, gracilescens.

Substantia dura, ac pene solida (cum non omni cavitate destituatur, quo medullam ^b pro nutritione contineat) quo ab injuriis externis musculum temporalem, cui præponitur, potissimum ejus tendinem tueatur, & ut ab eo musculus manforius originem ducat; sic & calvariam ibi tenuem ^c firmat.

^c solidus, Vesalius, Gorraus: non caret medulla, ut Vesalius existimavit: effractum enim cavernosum apparet, Columb. ^c Et oculorum sedem in angusta calvaria hac sede admodum protuberantem egregie firmat, Plat. & Laur.

De Maxilla superioris suturis.

CAPUT LXXIII.

De hac Galenus de ossibus 5. II. usq. part. 18. 19. & 20. Aristot. I. hist. 11. 3. ejusdem 7. & 4. part. anim. 11.

^a Arist. I. hist. an. 11.

^b In Physiogn. cui & σύνωμον 3. hist. 7. 3. part. 11.

^c De ossib. qui com. 2. in lib. de arte scribit, σύνωμον & γένος ab Hipp. confundi.

^d Osseum opificium, quod caput nominatur, à natura in tres partes distributum, scilicet calvariam, maxillam superiorem & inferiorem, Piccolh. ^e Duplex est: cujus pars prior γένος superioris mentum; posterior γένος, mandibula est, I. hist. an. 11.

Maxilla, σύνωμον ^a (quod maxillas clausas continentes silentia agant, quod σύνωμον dicunt) & γένος Græcis: duplex ^e est, superior & inferior, σύνωμον καὶ κατὰ γένος Hippoc. Aristoteli ^b & Galeno. ^c Superior faciei pars est ossea, ^d quæ oculorum orbitæ partem inferiorem & laterales, narium cavitatem, malas, & oris amplitudinem superiorem, seu palatum constituit, & dentium superiorum seriem complectitur. Hæc vel tota, vel secundum partes, ex quibus componitur, considerari debet: si tota, tum vel ipsius conformationem, vel connexionem, quæ per suturas sit, perpendemus: si partes, tum ipsa ossa, ex quibus componitur, examinabimus. Totius maxillæ figura varia est, superius latior, inferius angustior, idque ob prominentias, foramina & cavitates, quibus donatur.

Prominentias etenim obtinuit, superius quidem in faciei medio, qua nasum efformat [tab. 3. fig. 8. f.] quod soli homini peculiare est, cum ei soli nasus emineat: ad latera, utrinque ad tempora propter oculorum & malatum marginem inferiorem [supra f.] quam.

^e Duplex est: cujus pars prior γένος superioris mentum; posterior γένος, mandibula est, I. hist. an. 11.

quamvis etiam oculorum cavitationem inferiorē efficiat. Inferius vero & exterius, ubi dentium radices situm habent, utrinque extuberans circulariter prominet [sub Δ] at interiorius, palati anteriorem maioremque partem asperat constituit [tab. 3. f. 9. t. y. z.] & in circumferentia propter dentium alveolos protuberat [f. 9. u. u.]

Foramina partim exigua, quo venæ, arteriæ & nervi transmitti possint, exsculpta, ut in singulis ossibus dicitur, partim magna, & quidem duo in oculi cavitate, inferiore, ut in secundo osse [f. 8. C.] per quod pituita & nervulus ad nares mittitur, & in quarto, per quod nervulus ad malarum exteriora fertur: sic in palato anteriorius & in medio unum, venulam & arteriolam transmittens [f. 9. z.] in eodem posteriorius utrinque duo ad narium latera delata [ad v.]

Cavitates proprias & communes obtinent: proprias, ipsi ossi quarto, in quo antitrum ad latera narium ossi inclusum [f. 8. sub B. A.] & alveoli, quasi locelli, dentium gratia insculpti, de quibus in quarto osse. Communis est narium cavitas septo distincta, ossibus fungolis repleta, quæ & foris in naso [f. 8. O. O.] & intus in ore [fig. 9. ad q. q.] semper patet, quo & aerem respirationis causa retrorsum, & odoris gratia sursum intramittat, & aerem in expiratione & voce, & pituitam emittat.

Immobilis est in omnibus animalibus, Crocodilo fluviatili excepto, cui superior maxilla mobilis, inferiore cum ossibus temporum adeo unita, ut ne tantillum moveri queat, & superior capitulis utrinque singulis & latis, inferior duobus sinubus inarticulatur: at Psittaco utraque mobilis existit, qui eodem tempore utramque & alterutram separatim, prout vult, movet: huius homini immobilis est, primum, quia ipsius motus oculis maiore circulo inspecturis impedimento foret: dein naribus odores excipientibus aeremque inspirantibus; tum & ciborum duriorum exquisitam comminutionem impediret; nam ut in mola molendinaria ad triticum in farinam comminuendum, pars una molæ lapidea immobilis persistit, altera vero quoque lapidea mobilis; ita in molendis conterendisque cibis, tale instrumentum condendum fuit, cuius pars una immobilis, qualis est maxilla superior, altera mobilis, qualis est maxilla inferior. Quamvis etiam ad venustatem faciat: si enim moveretur, tota necessario contraheretur & corrugaretur, & sic elegantia & forma humana faciei adimeretur: cum in humana fabrica, potissimum in facie ornamenti rationem Deus Opt. Maxim. cum animæ imago sit, habuerit. Quare nec ut in brutis prominet: sed brevior facta est, & rotundior, quo facies rotundior & elegantior existat.

Connectitur maxilla superior, vel cum ossibus circumjectis, vel cum ossibus propriis, ex quibus composita est, & quidem commissuris immobilibus, partim per suturas, partim per harmoniam. Sunt autem harum suturarum vel commissurarum alię

Ooo 3

com-

causa, quod pedes alii capiendum & retinendum inutiles habet: parvi enim admodum sunt. Ad hunc usum natura pro pedibus os utile ei condidit. At Piccolh. ait, rationem propriam asferri non posse, communem vero, quia Arist. scribat, corpus esse animæ instrumentum: quare naturam accommodasse animæ humana corpus tot partibus instructum, quibus vires insitas expromere posset, equo item bovineque, ita & crocodilo, cuius anima vim aliquam habet nobis incognitam & incomperiam, quam exprimit motu superioris maxillæ. h. Hoc primus, quod sciam, observavi, Col. Piccolh. Laur. ratio Piccolh. quia ei tale corpus & instrumentum attributum fuit, quale efflagitabat Psittaci anima. i. Impe- dimentum asferret & odoratum & visui. Piccol. Laur. k. Colum. Piccolh. Laur. l. Gal. in præm. de ossibus nonnulla maxillæ superioris ossa per harmoniam seu simplicem lineam junguntur: Colum. reprehendit Gal. quod lib. de ossibus maxillæ superioris ossa per harmoniam conjungi dixerit cum Inrod. sub symphyti posuerit & ipsi, lib. de ossibus harmonia psittaci species sit. Resp. librum Introductorii Galeni non esse. m. Cum harmonia ista magna ex parte, si

f. Nam sole, ut scribit Hipp. ex ossibus maxillæ ipse in seipsis venas, & ob id alimen- tum a m- plus in ip- quam in alia ossa trahitur, Laur. g. Arist. 1. hist. 11. 3. hist. 7. Gal. 4. ad. an. 2. sic Arist. homo & vivipara quadrupedes maxillam sursum, deorsum & in latera agitant. Pisces vero & aves, & ovipara quadrupedes sursum deorsumque non movent; causa est, quod ejusmodi motus utilis ad mordendum secundumque est: qui autem in lateris agitur, ad cibum molendum conficiendumque accommodatur: cetera omnia maxillam inferiorem movent: Crocodilus fluviatilis vero solus superiorem, cuius

do effringantur, intus mutuum quendam contextum referant, quem sutura quodammodo comparare queas, illa suturarum etiam nomine in sup. madil historia donantur, Vesal. per symphysin eamque speciem, qua harmonia nominatur, quæ veluti linea apparet, ossa maxilla inter se colligantur, Piccolhom.

n Maxilla superior à calva discriminatur lineis atque suturis tribus, duabus communibus, & ea, quæ in osse jugali est, Col. Piccol. Laur. *o* Suturas à Galeno positas aliquas canib. & simiis, aliquas, ne his quidem recte tribui statuit Ves. Suturarum enumeratione ratio à Galeno proposita, falsa est, non solum in hominib. sed etiam in simiis, canibus, & brutis fere omnib. quæ ego videre potui: ab aliis quot tamen Anatomici falsa in hominib. at in simiis & canib. vera creditur, Fall. obser. *p* Sutura maxill. super. Secunda tripartito scissa, Gal. de ossib. 3. verum prima hujus sutura parte prope magnam oculi angulum exterius ad medium superciliorum, homines destituuntur, quæ in canibus & simiis caudatis manifestissima est, Vesal. sed de his vide Gal. Ves. & Ingrassiam. *q* Linea per palati longitudinem deducta, & e.

communes calvariae cum *n* maxillæ superioris ossibus, quinque videlicet, de quibus supra, cap. 5. egimus: alia propria maxillæ ossibus novem numero, quæ duo decim maxillæ ossa inter se committunt: quarum alia, u pote duæ in narium amplitudine, alia in superficie septem numero conspiciuntur: rursu harum septem, quinque duobus maxillæ ossibus mutuo coeuntibus communes sunt, duæ vero uni ossi peculiares existunt.

o Suturarum internarum prima, in faciei interna sede, in narium amplitudine occurrit, quæ septo cum quinto osse communis est, & deorsum oblique brevi ductu fertur. [tab. 3. f. 8. sub f.] Secunda ibidem reperitur, quæ septo narium cum osse quarto & sexto maxillæ communis est, & transversim longiore ductu antrorsum fertur [tab. 3. fig. 8. g.]

Suturarum externarum prima, ad os malæ oblique ducitur & quidem tertio: *p* primum per temporum cava extorsum & deorsum ad malæ inferiora; dein per malæ anteriora sursum & inrorsum ad oculi sedem mediam [tab. 3. f. 8. ab à ad D. inferius] tum in oculi antro retrorsum & extorsum fertur [à D. inferiore ad Q.] & ad suturam secundam calvariae communem finit: hæc primo ossi cum quarto communis est. Secunda in oculi orbita per ossis ambitum circulariter ducitur, à sutura communi tertia deorsum, mox antrorsum, inde rursu sursum: hæc communis est secundo ossi cum tertio parte posteriore, & cum quarto anteriore & inferiore sede [tab. 3. f. 8. ab V. ad i. inde ad C. d.] Tertia in oculi quoque orbita, quæ ab ossis sphæroidis sutura communi secunda, recta extorsum abit, & in sutura secunda definit: hæc ossi tertio cum quarto communis est [tab. 3. f. 8. ab à ad c.] Quarta ad nasi latera exteriora, à sutura communi tertia recta deorsum secundum ossis quinti longitudinem ad cartilaginem ducitur: hæc communis est quarto ossi cum quinto [tab. 3. f. 8. à z. ad e.] Quinta in palato est, & per palati partem posteriorem transversim abit, & communis est quarto ossi cum sexto [tab. 3. f. 9. t. u.] Sexta in nasi elatiore parte existit, & à superciliorum medio à sutura communi tertia recta per nasi longitudinem fertur, & quintum os per medium distinguit [tab. 3. f. 8. f.] Septima in palato est, linea potius quam sutura, non secus, quam sexta dicenda; quæ per totam ipsius longitudinem recta fertur, & foris & in narium amplitudine conspicitur, & quartum os, quemadmodum & sextum à suo conjugate per medium dividit, [tab. 3. f. 9. y. t. x.] Sic etiam in maxillæ anteriore sede à nasi amplitudine per dentium incisiorum medium recta deorsum ad palatum usque, ubi conveniunt, fertur. [t. 3. f. 8. b.] Verum in canibus, simiis, porcis, & quibus canini dentes validi exertique sunt, duæ occurrunt suturæ vel harmoniæ conspicuæ, quibus homo caret: quare & peculiaria habent ossa, quibus incisarii dentes infinguntur.

Spuriæ etiam suturæ dantur, quæ os non penitus dividunt, quæ potius lineæ sunt seu rimæ, & in quarto osse tantum conspiciuntur; & quidem primo in oculi orbitæ humiliori sede, quæ à primo foramine oblique ad oculi ambitum tantum ducitur, &

quarta

quarti ossis partem inter primi foraminis sedem superiorem & oculi ambitum dividit. [tab. 3. f. 8. i.] Dein in palati sede anteriore nonnunquam ^a à quarti ossis foramine ^c Sape oblitteratur, secundo ad dentes caninos ^u oblique ducitur, & partem eam, quæ ad dentium incisio-
riorum regionem est, dividit, [tab. 3. f. 9. a.] nusquam tamen adeo penetrat, ut totum ^u Sutura alia
dividat, ut in canibus & simiis, porcisque, in quibus non solum in palato futura quar-
tum os dividit, verum exterius in maxillæ anteriore sede. ^u sub palato trans-
versim datur, ^c ad utrum-
que dentem ca-

minum in pueris terminatur. Hæc in pueris conspicua est, in adultis sic oblitteratur, ut nullum sui vestigium relinquat, Columbi Dissentio ab iis, qui restantur, reperiri suturam sub palato per transversum ad utrumque caninum pertinentem, quæ in pueris pateat, in adultis oblitteratur: nam reperio, hanc divisionem vel rimam potius esse, quam suturam, cum os ab osse non s. paret, neque in exterioribus apparet, vel cum os cum osse non jungatur, quod suturarum munus est, si sub articulo contineri debeant: nec mihi videtur hæc divisio magis conspicua in pueris, quam adultis, in quibus paucissimis, atque iisdem senioribus, vidi hanc esse oblitteratam, Fallop. b. serv.

De ossibus Maxillæ.

CAPUT LXXIV.

Maxilla non ex uno osse, sed pluribus constat, nō tam ut injuriis pellendis prom-
prior reddatur, quam ut ex eorum commissuris ligamenta musculorum con-
structionem ingredientia prodeant, quo firmitus principiis suis, tanquam osseis parti-
bus alligentur, & validiores fiant. Dein etiam, quia maxillæ ossa non vndique pariter,
aut densa aut dura, aut crassa aut mollia requirunt. Sunt autem duplicia, ^a communia a Maxilla su-
& propria. Communia sunt os sphænoïdes, seu septimum & octavum capitis: ab
hoc prodeunt duo ossa spongiosa in naso interno sita (quibus junguntur duo, quæ
oculi orbitam internam perficiunt, quæ pro tertio maxillæ ex aliorum sententia re-
tengebimus) & processus narium superiorem partem distinguunt. Sed de his partim
inter capitis ossa, partim inter ossa nasi dictum fuit: quare ad propria veniamus: pro-
pria ossa ^b duodecim sunt, quæ ad faciei constructionem tantum faciunt.

^c Primum [tab. 3. f. 8. ff.] quod maxillæ non minimam partem, & oculi orbitam in-
feriorem verius tempora, & rotundam eam extuberantiam, quæ Hippocrates κύκλον
περὶ σόπις, alii κύκλον appellant & ossis jugalis partem alteram, non nihil temporis & oculi
angulum externum constituit: forma quasi ^d triangulum, ex medio lato extuberantias
tres emittens, ad oculi angulum, ad dentes & præsertim processum ad os jugale cum
temporum processu efformandum, [t. 3. f. 9. r. cum r.] foramen unum vel alterum exi-
guum ^e constituunt: a-
lia, quæ in oculi
lorum orbita

adulescunt, quatuor ut duo ossicula ad angulum majorem, duo minima illis connexa. Communia quinque cū calvaria,
hec intus latitant, duo spongiosa, quæ velut appendices ossis frontis, duo ad posteriorem palati partem, quæ sunt sphænoï-
des, unum quod est ossis ischmoidis nasum dividens, Piccolb.

^b Gal de ossibus 4. monet alios 15. ossa maxillæ superioris recensere, quibus sphænoïdes addant: alios octo tantum enume-
rare, consule locum. At 11. usque part. 18. & 20. novem: In Introd. Herophil. 12. posuit, huic posteriora Vesal. subscripsit &
Plat. Sic Col. ego 13. semper observavi, quinque in utraque parte, undecimum aratro simile, 12. & 13. duo spongiosa in
interno naso. Fall. undecim tantum malarum ossa 1. 2. 3. 4. 5. & 6. Vesalii, quæ ingeminata decem sunt: illud quod vome-
ni figura constat, ut undecim fiant: hunc sequitur Laur. c. 1. maxill. super. & maximum Gal. de ossibus 3. 1. Vesal. Co-
lumb. Plat. Laur. d. Figura varium, Columb.

3 Ossa sutu-
ra, Colum.

f Sutura sexta
beneficio, Co-
lumb. futura

huic & ossi cu-
neiformi com-
muni, Vesal.

g 3. minimum
Gal. de ossib. 3.

2. Vesal. Col.
Plat. Laur.

h Quod, ut Ga-
lenus compro-
bat: addit me-
dicamenta in

oculos immissa
per nares efflue-
re solere: id

quod hactenus
mihi experiri
minime licuit:

& mirum est,
quomodo mē-
branam, qua

ibi assistit, ocu-
laria hac me-
dicamenta pe-
netrare possint,

Columb.

i Sutura 2. 3.

& 4. ossiculo
communis, Ve-
sal.

k Hoc alterum
Galeni vide-
tur, de ossibus

3. at Vesal. Plat.

3. sic vero Fal-
lopius (quem
Laur. sequitur)

Vesalius ter-
tiam addit in

utroque latere positum in oculi orbita, quod pars oculi seu ethmoidis est, quare his demptis, decem tantum

erant descripta ossa ab ipso, alii sunt, qui ut numerum augeant, ac 13. numerent, spongiosa duo addunt, quorum mentio

facta est in cribro: verum decipiuntur, cum illa sint communis ossis partes, non autem propria malorum ossa, hac Fallop.

in obser. fungosorum ossium, & per consequens cribrosi ossis partem Fallop. facit cum simul continentur, verum cum &

frontis ossi continentur ossa fungosa, vix assentire ausim, Plat. 1. Quartum os insigni magnitudine, cuius os mali den-

triumque omnium exceptis incisivi alveoli partes sunt, Gal. de ossibus 3. quare sequen. cap. (quod tamen non separandum

erat à priori capite in maxilla superioris extremo ait, os unum, in quo dentium incisivorum radices & alveoli conti-

nentur, quod plerumque simplex esse videtur, quod ossa, ex quibus structum est, exactissime committantur. Et addit in-

terdum suturam in cadaveribus admodum exsiccatis, manifeste apparere, quae per totum palatum porrigatur: at Vesal.

hominem destitui asserit, in canibus simius porci que duas suturas admodum perspicuas occurrere. Verum Galenus non

omnibus locis, incisivi dentibus os privatum tribuit. 4. os Vesal. & Plat. 3. Columb. & Laur.

guum habens: hoc quatuor ossibus committitur: superius frontis ossi, ubi supercilii extremum habetur sutura communi [tab. 3. f. 8. R.] prima [t. 2. f. 6. & 7. g.] posterius sphæroidi sutura communi secunda [t. 3. f. 8. ab S. ad Q.] ad latera processu suo, tem-
porum processui sutura obliqua communi quarta [t. 3. f. 8. P.] inferius vero maxillæ superioris quarto juxta malam, & in oculi sedis inferiore parte [t. 3. f. 8. à D. inferius per D. superius ad Q.]

§ Secundum [tab. 3. fig. 8. Δ.] quod in oculi angulo majore juxta nasum consistit, & statim ad anguli initium, ubi foramen in nares est [tab. 3. f. 8. C.] se offert & caruncula, glandulæ instar pituitam à cerebro ad oculum manantem, ne in genas defluat, excipit, ut ad nares h exprimat: est autem minimum squammæ modo tenue & pellucidum, quod quia laxè hæret, & quarto ossi antè harmonia verius, quam sutura jungatur, facile frangitur vel deperditur, & in calvariis è terra effossis raro occurrit: cum enim tenue sit, & humido loco positum, facile putrescit: in coctis vero calvariis absque ne-
gocio servatur. Jungitur autem tribus ossibus superius cum ossè frontis, sutura com-
muni tertia [iuxta v.] posterius cum maxillæ tertio, i sutura externa secunda [ab V. ad v.] antè & inferius cum maxillæ quarto: eadem sutura [à C. versus x.] nonnun-
quam & nasi ossib. fungosis committitur; hic locus est, ubi abscessus fiunt, quos Græ-
ci *αἰγίλιον* nominant; quia si negligantur, ad os penetrant, & in fistulas lacrymales
definunt. Foramina habet, superne quidem exigua communia: at unum insigne,
quod illi cum quarto commune est [tab. 3. f. 8. C.] quod ex oculi angulo interno recta
deorsum in narium cavitatem fertur, ut per id, non tam nervorum tertii paris minoris
dicti radices portiunculam demittat, quam ut pituitam transmittat.

Tertium, k quod quartam partem ossis spongiosæ esse diximus [tab. 3. f. 8. Θ.] ple-
rique tamen tertium maxillæ faciunt, in oculi interno latere repositum est, & interius
narium ossibus fungosis continuum: hoc secundo latius existit, paulo minus toto
quadrangulum, oblongum tamen, tenue & instar squammæ pellucidum, læve foris,
intus ob squammas adhærentes asperum, & si effringatur, intus sinus ampli, aere op-
pleti conspiciuntur: committitur quatuor ossibus, superius quidem frontis ossi su-
tura communi tertia intervallo longiore [tab. 3. fig. 8. à versus V.] posterius sphæroidi
eadem sutura [iuxta E.] sed ductu brevior: antè cum secundo maxillæ ossè futu-
ra secunda [ab V. ad c.] inferius cum quarto ossè maxillæ sutura tertia [à c. ad b.]

Quartum l [tab. 3. f. 8. ΔΔ.] narium & oris partem anteriorem, cui dentes superio-
res omnes infixi sunt, & palati & narium foraminum latera, & inferiorem sedem ma-
xina ex parte constituit (& à Galeno os malæ m & proprie maxilla superior dici mere-
tur)

tur: imo & oculi camera inferiorem partem versus nasum efformat: quare ceteris longe majus est, & variis futuris circumscribitur, siquidem septendecim ossibus (si dentes addas) conterminum sit. Jungitur superius juxta nasum ossi frontis, sed brevi portione futura communiteria [tab. 3. f. 8. 1. r.] inferius cum sphenoides futura communiteria [tab. 3. f. 8. a. d. ad H. fig. 9. a. d. e.] ubi etiam superius os sphenoides & maxilla in oculorum cavitatem dehiscunt; committitur etiam cum maxilla superioris ossibus, ut primo, futura prima obliqua [tab. 2. f. 6. 1. b. Q.] in mala, oculi cavitate & temporum cavis: anterieus cum secundo in oculi angulo interno futura secunda [tab. 3. f. 8. a. C. versus X.] posterius cum tertio futura tertia [b. a. d. e.] cum ossi quinto in nasi summitate exterius futura quarta [a. r.] cum sexto in palato, futura quinta [tab. 3. f. 9. r. u.] & tandem cum suo conjugate futura septima vel potius linea partim in maxilla sede anteriore [tab. 3. f. 8. h.] ubi labri superioris sulculus consistit, partim in palato. [tab. 3. f. 9. x. y.] Huic & dentes superiores per gomphos infiguntur, & cum nasi cartilaginibus unitur.

Foraminibus & antris donatur: foraminibus communibus & propriis: commune parvum habet, juxta oculi angulum internum; propria vero tria. Duo in oculi sede inferiore, utrinque unum, quod squamma ossis tantum integitur, & ex oculi sede inferiore, versus anteriora ducitur, quod nervorum tertii paris minoris radices vulgo dicti sobolem ex oculi sede in faciem transmittit [tab. 3. f. 8. ad B.] Tertium foramen in palato est, juxta dentium incisivorum partem posteriorem, ubi utrumque os maxilla convenit [tab. 3. f. 9. z.] quod ex palato in narium amplitudinem fertur & venulam arteriolam ad nasum transmittit; & ad cujus latera futura in pueris apparet. Antra & cavitates duplices habet. Antrum utrinque unum ad narium cavitatis latera inferiora sub oculorum sedibus situm, insigniter cavum & ita amplum aliquando, ut in illo articulus pollicis manus ultimus delitescere possit: quare imaginibus cavis, ex certa fusis & pulvere assimilaveris; sed ab osse veluti ampuloso & attenuato oblectu ingit, transire, ut in vicem con-feriant, vult Vesal. at cum posteriore sede amplo spatio invicem continuentur, quid in hac angustia opus sit, non video, Plat. Superior maxilla omnino medulla experta, quod prorsus non moveatur

Quintum [tab. 3. f. 8. 3. 3.] quod cum suo pari nasi partem eminentiorem osseam constituit, parvum est & pene quadrangulare, oblongum tamen (in homine longe brevius, quam in canibus & similibus) durum, solidum, latum & tenue, foraminibus communibus exiguis donatum: committitur autem superius cum osse frontis futura propria tertia [tab. 3. f. 8. 1. z.] sic in lateribus cum maxilla primo utrinque & extrinsecus cum quarto futura propria tertia [f. 8. ab e. versus 1.] & in medio cum conjugata

Ppp

ge su-

11. u. par. 18.

Galeno non assensendum, qui superiorem maxillam medulla expertam duris ossibus, nec levitate indigentibus efformatam dicit: quod hac non, ut inferior moveatur, cum hac illa multo sit validior, & osse confectus injuriis propellendus longe promptior, Vesal. Vesal. Plat. Laur. cui (Plat.) ad totius gena levitatem constructi: fortasse dicit Columb. Producentia voci miris modis opportuna, Ves. Sic & Fallop. Cavitas insignis medulla plena, qua ipsa ossa dentes continentia & superiores omnes dentes aluntur, Piccolb. u. Nasi ossa duo, Gal. de ossib. 4. s. Vesal. Columb. Plat. Laur. x. Quadrangulo petius, quam triangulo simile, Vesal.

ge futura sexta [f. 8. à Z. ad f.] harmoniæ non admodum dissimili, quæ à futura frontis secundum ossium nasi longitudinē recta fertur, inferius vero futuram non habet, sed asperum & inæquale existit, quo cartilaginee re & ius jungantur. At parte interna, ubi hæc duo ossicula junguntur, adhærent septo osseo & subiecto, quod ossi spongioso cohæret.

y Ossis cribri speciem referentis pars est, Columb.

a Duo alia exigua ossa maxilla superioris qua narium foramina ad palatum tendunt, Gal. de ossibus 3.

6. Ves. Plat. 4. Col. & Laur.

b Separantur ab osse maxime futura trans-

versa, à sphænoide ea linea, qua inter extremos dentes & apophysin pterygoide fertur, à se invicem palati futura media, Laur. c Undecimum addit os aratro simile, Columb. Fall. p. & Laur. quod supra medium intimumque palatum, cuius formam aratri vomer imitatur, narium imam partem septi more discludens: At Vesal. scribit, ad posse 12. & 13. duo scilicet ossa spongiosa in interno nasofissa, satis inæqualia, ubi mucosa retinetur: Columb. præter tenuia, fungosa, & quodammodo membranæa, cartilagineaque ossi ula in narium cavitatis summo occurrentia, duodecim maxilla ossa sunt, Vesal.

Sextum [tab. 3. f. 9. II.] ad palati extremum, ubi nares in fauces desinunt, reponitur, & cum suo pari palati & narium amplitudinis posteriorem partem constituit, latum est, tenue, solidum, semicirculum in fine (ubi asperum est) referens [f. 9. supra q.] committitur b posterius cum osse sphænoide ad ipsius processus alas referentes, inferius & exterius futuræ communis secundæ portione [q.] dein interius narium septo futura interna secunda [tab. 3. f. 8. g.] & maxillæ quarto futura quinta transversa [f. 9. t.] & cum socio in posteriore palati parte futura sexta per palati longitudinem ducta [tab. 3. f. 9. à t. ad x.] Foramina duo habet utrinque, alterum amplum, quod sursum in posteriora ad sphænoideis ossis foramen commune nonum fertur [t. 3. f. 9. paulo infra p.] alterum exiguum, quod aliquando in prædictum, interdum in futuram communem secundam terminatur, [supra q. ubi.] c

De inferiore maxilla.

CAPUT LXXV.

Galenus 11. us. part. 18. & 20. libro de ossibus 6. de hac egit.

a Haliabatis interpres, famcem appellat.

b Movent animalia omnia maxillam inferiorem (Haliabatis, at 3. hist. 7. & 3. part. 11. crocodilo fluviatili excepto, is enim superioris solus movet, 1. hist. 11. 3. hist. 7. c 4. ad an. 3. d Vesal. Col. Plat. Piccolb. e Colum. furcam quandam refert, Plat.

Inferior a maxilla [tab. 29. f. 1. & 2.] quæ oris amplitudinis inferiorem partem, cui dentes infiguntur, efficit, & calvaria articulatur, in homine b mobilis est, quo cibi masticari possint: nam cum dentes & cibos secare & conterere debuerint, superiores ab inferiores recedere debuerint: & tanquam forcipes rursus accedere; ideo hæc maxilla à superiore mobilis facta est; quæ cum in descensu nullo robore indigeat, at in ascensu maximo ob ciborum fractionem, propterea musculis imbecillibus deprimitur, robustissimis vero attollitur, ut supra monuimus. In crocodilo fluviatili unico, immobilis existit; & homini inter omnia animalia pro totius corporis mole brevis sima est, ac pene orbicularis ob faciei rotunditatem, quæ elegantior & venustior est; c cæteris enim animalibus (simia excepta, cum non multum ab humana facie recedat, & manibus quodammodo utatur) maxillæ oblongæ sunt ac prominentes, cum iis loco manuum utantur, & ad cibum d ab humo capiendum inclinari debuerint.

Figura e arcum refert, sinumque amplum relinquit, quo levior sit, & musculis eam moventibus minus incommodet. Anterior in summo mento lata est & crassa, in reli-

quis animantibus angustata prominet: posterius diducta, partim, ut ciborum transitus non impediatur; partim, quo commodius utrinque calvariae ad motum articulari possit.

Processus enim utrinque duos habet sede posteriore (aliquibus ^e cornua dicuntur) qui sursum feruntur: alterum antrorsum diductum [f. 1. & 2. C.] latum, tenuem, in mucronem desinentem ^{κροτώνην} dictū, qui muscoli temporalis tendinem excipit, a cuius tendine totus ambitur, & in illum validissime implantatur; hinc forte Hippocrates maxillae inferioris luxationem plerunque lethalem dixit, propter muscoli temporalis distensionem & alterationem. Alter vero & posterior processus ^{κονδυλώδης} nominatur, & tuberculum refert, quod retrorsum fertur, qui capitulum habet prominens transversim oblongum [f. 1. & 2. A.] sub quo cervix insignis [B.] est: hoc capitulo utrinque sinui sibi respondentī, & in osse temporum insculpto, inter jugalis ossis radicem & foramen auditorium inarticularur, quo maxilla ad calvariam sursum & deorsum, & nonnihil ad latera moveatur; huic capitulo, quemadmodum & sinui cartilago ^h crusta modo obducitur: praeter hanc omnibus articulis communem, inter sinum & capitulum cartilago alia reponitur, laevis, tenuis & mollis, quae non modo ligamenti munere fungitur, ut processum in suo sinu contineat, sed etiam articulationis motum lubricum magis reddit; tum etiam, cum praedictis cartilaginibus impedit, quo minus in validis assiduisque maxillae motibus, ex mutuo affricu ossa vel rumpantur, vel saltem atterantur. Ligamentum quoque commune membraneum articulum maxillae inferioris cum ossibus temporum obvoluit.

At posterius utrinque, ubi processus educit [f. 1. & 2. EE.] prominentiis aliquot, veluti monticulis parvis exasperatur, potissimum juxta posteriorem & latissimam regionem inferiorem. Anterius vero & interius in menti medio [f. 2. H.] tuberculo exasperatur, idque propter musculorum propriorum, quorum ope deorsum trahitur, validiorem insertionem (cum asperis inaequalibus locis promptius aliquid adhæreat, quam planis) & quo undam linguae musculorum commodiorem exortum: Sic etiam exterius ad summi menti regionem [f. 1. sub G.] quo labri inferioris muscoli commodius illinc pronascantur.

Sinus etiam superficiarios ad processuum latera obtinet, ita tamen, ut intus magis, quam foris sinuetur; extrinsecus quidem utrinque unum & amplum [fig. 1. inter B. & C.] interius geminum, tubere quodam distinctum: [fig. 2. juxta D. B.] horum anterior ad radices dentium, forte gingivis cedit. Posterior & amplior, musculo in ore latitante locum praebet, quo minus sua crassitie ac mole faucium angustiam infarciat.

Ex ossibus duobus composita est, siquidem in infantibus ex duabus ^k partibus os-

Ppp 2

seus, tum, sed articulus duntaxat,

qua motum liberum & expeditum cardinis modo maxilla inferiori permittant, ut hac una sit mobilis ex omnibus capitulis ossibus. i Et Plat. quare Gal. 1. us. part. 20. ait, ac habet articulatio fortia quadam ligamenta, ac praeterea cartilaginem multam in orbem sibi circumfusam.

k Gal. ex duobus ossibus 4. ad an. 4. & 11. us. part. 18. inferioris maxilla os simplex non est, ut alicui fortasse videbitur: siquidem coctum in menti summa extremitate, dissolvatur, ut ipsa coaluisse plane appareat, Oribas. 25. col. 7. amba maxilla juxta summum mentum, qua parte etiam coalescunt, &c. Aegin. l. 6. c. 92. & 112. unicam habet divisionem & eam non plane perspicuam in extremo mento, Celsus, Vesal. Columb. at Piccolhom. duobus linea conspicua discretis: Hipp. & Gal.

Gal. duob. constat ossibus, ait Laur. in parvulis in medio per coactum divisa, Pla. Quamvis in pueris ex duob. ossib. per unionem commissis efformentur, non tamen simpliciter duplici osse maxillam constare recte dicemus, nisi etiam occipitis os, vertebrae & ossa, quae sacri ossis lateribus coarctantur pluribus ossibus effingi dicamus: cum haec in pueris ex pluribus ossibus extruantur, Vesalius Respondet Fallopius si dicatur, non docere de imperfectis partibus dogmata assumere, sed de perfectis: cum omnes Anatomicos errasse, qui de appendicibus ita diffuse locuti sunt, cum illa in imperfectis tantum ossibus, non autem in adultis reperiuntur.

feus, cartilagine copiosa in medio mento conjunctis constet, ita ut in aliquot, qui septuaginta sunt, etiam vestigia quaedam appareant; at in adultis continua est cartilagine in ossis naturam mutata adeo stricte agglutinantur, ut linea nullum vestigium appareat: quare nec coctione, nec putredine, aut vi ulla, ut duo esse videantur, in adultis separari potest, idcirco unum os esse, plerique volunt. At linea, quae in puerorum maxilla conspicitur, futurae rationem obtinet, quo ex ea ligamenta producantur, quae musculos ibi existentes ingrediuntur. Canum vero, boum, asinorum & plurimorum adhuc animalium, etiam citra coctionem parvo conatu interdum divelluntur.

Est autem os durissimum, & magna ex parte solidum, quo validior sit, non quia sola mobilis, sed quia varios & fortissimos motus in mordendo, mandendoque sustinere debuit: intus tamen excavatum, ne suo pondere musculis moventibus incommodo sit. Cavitates etiam habet, quo medullam nutrimentum contineant; quae non, ut in quadrupedibus in maxillae parte posteriore exsculptae sunt, sed parte magis anteriore versus menti regionem & maxillae latera, sub dentium alveolis; quare circa haec loca crassa est, quemadmodum circa posteriora tenuior.

Alveolorum enim gratia inferiorem maxillam crassiorem evasisse hinc constat, quod in vetulis, & illis, quibus dentes eruti sunt, & in quibus dentium alveoli succreverunt, maxilla ab imo sursum multo tenuior & angustior efficitur. In circuitu quoque alveolos, quibus dentes infiguntur, habet.

Foramina utrinque duo obtinet, quae canalis modo per maxillam feruntur: nam si maxillae exsiccatae foramini interno setam indideris, ab hoc ad externum foramen facile protrudes, & si maxillam frigeris, iter continuum ab uno foramine in alterum canalis modo caelatum observabis, qui canalis cum vasis continendis dicatus sit, superior est, & a cavitate medullam conservante separatus. Alterum interius & posterius ad sinum internum, non longe a processibus (utrinque unum) quod majus est altero, & inaequale seu asperum squammæ modo incipiens [f. 2. F.] per quod nervorum tertii paris portio ad dentium radices dispersa, una cum venula & arteria, quae dentibus & maxillae, surculos intromittit. Alterum parvum & rotundum exterius ad latera menti insculptum est [fig. 1. ad G. utrinque,] per quod nervuli di-

cti ingressi sobolem rursum ex maxilla extrosum in humilius labrum emittit, & interiore longe minus est.

DE

m. Maxilla inferior medullam habet, cuius substantia superior expers est. u. s. par. 18. intus cava & medullosa ad dentium nutritionem, accretionem & novam generationem. Laur. n. Vesal. Col. Plat. Laur. o hac forte causatur Hipp. de nat. ossium scripsit. solam maxillam inferiorem ex omnibus ossibus vnas habere.

De alveolis^a Dentium.

CAPUT LXXVI.

Vide II. us. part. 8. lib. de ossib. 5.

IN maxilla utriusque circuitu & margine (quam regionem Galenus^b φατρίαν vocavit) cavitates seu sinus occurrunt, quos βόθρια^b Galenus, at Ruffus^c ὀλπίστρος & φατρία vocari scribit: Latinis ab imagine, quam cum brutorum præsepibus habent, præsepiola, locelli, & à fovearum specie, alveoli, & fossulæ, mortariola. Sunt autem alveoli satis profunde insculpti, quo iis dentes per gomphosin, ne prompte vacillent, instar clavorum infiguntur; quare radices alveolis ad amussim respondent, nam si latiores essent, harmonia laxior evaderet: si angustiores, tum dentium radices ad imum non pervaderent, at hoc modo se habentes, validissime continent. Horum certus numerus vix assignari potest, cum pro radicū ratione, nunc simplices nunc duplices, nunc triplices existant. Et licet ossei sint, cerea tamen propemodū videntur, cum nullam stabilem formam aut numerum habeant: cum ex his quidam renascantur, quidam pereant & obliterentur: dente enim evulso, nisi novus succedat, alveolus ita constringitur, ut ipsius vestigium pereat: imo si dens cadat, & ipsi novus subrogetur, alveolo priore oblitterato, novum sibi excavat.

Hinc colligit Fallopius, vivificam vim formatricem in dentibus ad extremum senium remanere, qua crescant, & formam capiant. Sic in malis & maxilla, cum circa septuagesimum annum, aliquando erumpentibus genuinis dentibus alveoli noviformentur, & in ultimo senio cadentibus occæcentur, maxilla ea parte adeo comprimitur, ut os undique cohæreat, constipetur, & tandem uniatur: nam alveoli non modo ossea substantia impentur, & obcæcantur, sed utraque maxillarum squamma invicem occurrente, extremæ partes conjunguntur, acuta acies efficitur. Et hæc pars propter duritiem & figuram, dum cibus manditur, in senibus dentium munere recte fungitur.

ca 8. cavea, Gal. de anat. vivorum. f. 11. us. part. 3.

De partibus in ore contentis.

IN ore partes plures, ut eo aperto patet, continentur, utpote dentes cum suis gingivis, palatum, gargarion, tonsillæ, lingua, os hyoides, larynx, earumque partium musculi, & œsophagi principium.

a De his Gal. in epit. Anatomica ex Marcano conscripto libro secundo abunde tractasse.

b Galenus dicit, dentes contineri in his

c Apud Ruffum etiam quas legimus: apud Pollucem & φατρία & φατρία.

e Frena sunt dentium alveoli, Aretæo lib. 1. cap. 9. de causis & sign. acut.

dentes completos, Gal. 5. compos. medica. secundum lo-

De dentibus, de eorum nomine, definitione, figura, magnitudine, numero, situ, & articulatione.

CAPUT LXXVII.

Consule Hippocr. lib. de carnibus, & de Dentitione: Aristotelem 2. hist. 1. 3. 5. 3. hist. 7. 9. 3. par. 1. de eorum generat. & augmentatione 2. gen. an. 4. & 5. ejusdem 8. Galen. lib. de ossib. 5. 11. us. part. 8. & 9. de dentium utilitate, numero, & varietate in animalibus, 5. compos. medic. secundum loca, 8. & 9. lib. de anat. vivor. & in introduct. 12.

^a Dicitur etiā dens de secunda cervicis verebra & ejus apophysi ab Hipp. & Gal. 6. epid. com. 7. loc. aff. 3. 4. ad an. 8.

^b Dicuntur etiam a nonnullis Crantores, Russ. lib. 1. c. 8.

^c Negant aliqui ossa esse. 1. quia ossa insensilia sunt, dentes sentiant: verum sensus de natura ossis non est. 2. ossa certos auditionis terminos habent, nec unquam renascuntur, contra sit in dentibus. Respon. accrescere, quia attritu consumuntur. 3. Reliquis ossibus duriores sunt. Respon. magis & minus speciem non immutare, alias os ethmoides non esset os. 4. Ossa aeri exposita nigrescunt, non autem dentes. Respon. dentes aeri externo assuetos, & perostio denudatos esse, & a consuetis secundum Philos. non sit passio. 5. Hipp. dentes ab ossibus secludit 5. aph. 18. frigida inimica ossibus, dentibus, nervis, &c. Respon. diverso modo hac a frigido affici, ossa patiēdo tantum, dentes patiēdo & sentiēdo simul. 6. Lapidem sarcophagum intra 40. dies totum corpus exceptis dentibus absumere. Respon. forte, quia dentes reliquis ossibus duriores sunt: hac etiam Laur. habet.

^d De ossib. 5. ad commune genus ossium refert, & ejusdem natura dicit: Sic Arist. 2. gen. an. 4. eandem quam ossa habent naturam. ^e Partes esse aliqui negant, quamvis partis definitio competat. 1. Partes ex semine procreantur, quae semel abscisse non regenerantur: at dentes exempti regenerantur. 2. Partes incrementi definitum tempus habent: at dentes cum aetate grandescunt. Respon. Piccolh. distinctione Aristotelica 2. gen. an. 4. partes alias in prima corporis constitutione, alias post primam constitutionem, ut dentes gigni: de illis argumenta intelligenda esse, non de his. ^f Gal. 5. comp. secundum loca 8. dentes ex nutrimento fere per omnem animantis aetatem incrementum accipiunt, quod apparet in dentibus qui exempti oppositi sunt: qui semper augescunt: sic & Arist. tota vita crescere 2. gen. an. 4. asserit: addens, si decies millies annis vita servaretur. & praegraves primos oriri oporteret & sapius renasci: sic Piccolh. dentes semper augentur & increscunt. ^g 5. comp. secundum loca 8. ^h 3. hist. an. 9. naturam ossium amulantur: sic 3. hist. 7. in maxillis sunt dentes

Dentes ^a Graecis ὀδόντες, ^b quasi ὀδόντες ab ὀδῶ, comedo, & latinis dentes, quasi edentes dicti. Ossa sunt omnium durissima, intus cava, venulis, arterioliis, nervisque praedita, ipsarum maxillarum alveolis per gomphosin articulata, membranis & carne ceu vinculis alligata, & ad cibos comminuendos primario creata.

Ossa esse Hippocrates, Aristot. & Gale. censuere: Gal. enim enumeratione partium similarium ^d probat, siquidem ad similarium ^e partium nullam, quam ad ossa referri possint: quare in communi ossium genere secundum materiae qualitates dentes collocavit: quod etiam eorundem durities, soliditas, laevor, candorque comprobant. Quare sui generis esse, differentiae, quibus a ceteris ossibus evariant, ostendunt. Nam soli inter ossa exquisitae sentiunt, cum soli inter ossa nervos intra eorum cavitatem admittant soli omnium longiore tempore vitae augentur, quo proprium minus ^f sine detrimento obire possint: nam cum in cibis mandendis atterantur, tantum augescunt ^g quantum atteruntur, alias prorsus deficerent: reliquis ossibus non sentientibus, nisi forte obscure: nec semper crescentibus, sed ad statum ubi pervenerunt, consistentibus cum in muniis suis obeundis non imminuantur. Differunt etiam, quod nudi sunt, nulloque perostio vestiti, quia attererentur, dolorque causaretur. Quare Aristoteles ^h saepe dentes inter ossa non numerat, sed nunc osses vocat, nunc ossium naturam eos aemulari scribit. Et sane duritie ac densitate seu soliditate alia ossa superant, imo lapidibus vix ⁱ cedunt, & circa extremitates alii lapidis molaris instar lapidei

dentes genus ossium & solum inter ossa quod impossibile sit sculpi (velut Gaza verius solam ferri aciem respuit.) i Lapidea & dura substantia Gal. s. comp. secundum loca 8. ossa duriores, Celsi lib. 8. cap. 1.

lapidei, alii sicuti cultorum acies chalybeati. Durissimi vero ^k esse debuerunt, ne prius conterantur quam cibos ^l comminuant, neve mutuo rerum duriorum mandendum & frangendum occursum frangantur, cum nec adipe, nec cartilagine, ut reliqui articuli ad attritionem præpediendam, superlinantur: quare ^m ossa frangunt, soli ⁿ aciei ferri resistunt, igne ac flamma haud facile cum reliquo corpore cremantur.

Superficie externa natura albi sunt, nitidi & politi: at senio, incuria ac morbo lividi & obscuri sæpe fiunt: sic adherente etiam materia tophacea, & corrupti & scabri & asperi redduntur, exceptis equis, in quibus per senectutem candidiores reddi Philopphus ^o scribit.

Forma sunt antèrius nonnihil rotundi, posterius impressi; ubi mutuo junguntur, plani & in extremitate nunc tenues, nunc acuti, nunc plani, sed inæquales.

Differunt inter se figura, magnitudine & numero: figura, in homine sunt dissimiles pro ratione officiorum, quæ masticando absolvuntur: cum in piscibus ^p acuta tantum figura præditi sint: in ruminantibus duplicis formæ, cum incisores ac molares habeant. Homini vero secundum tres ^q speciales ciborum divisiones, tres species sunt, incisores, canini ac molares: verum exteros ^r non habent, ut apri, sed intra os conclusos: nec serratos ^r ut canes, cum his animalibus pro armis quoque dati sint.

Magnitudine humani dentes multis animalibus cedunt; os enim angustum habet, & dentes exiguos, nam pro oris ^t magnitudine, dentium quoque robur, quod in figura, duritie ac mole consistit: imo humani dentes inter se collati æquales non sunt, sed alii magni, alii parvi: molares enim ceteris majores sunt.

Numerus ^x omnibus hominibus unus & similis non est, cum modo plures, modo pauciores reperiantur, licet major numerus minori præferatur, cum illos longævus Hippocrates ^y, hos vero brevioris vitæ Aristoteles ^x pronunciarit: quia dentium paucitas & raritas, aut materiæ spermaticæ inopiam, aut facultatis formatricis imbecillitatem notat. Dein, quia ⁱⁱ, qui dentes pauciores habent, cibos non recte mandunt, nec ventriculo præparant: unde chylus minus recte conficitur, & per consequens, nec sanguis, cum primæ coctionis errorem quæ in ventriculo, secundæ quæ in venis hepatis fit, corrigere non possit. Sed non semper, verum ut plurimum & maxima ^{*} ex calido exsiccaturum exurit, & sunt dentes reliqui ossibus duriores, quia nihil frigidi in-

k Cur duriores
effecerit ceteris
ossibus: Aristoteli
rationem referunt in causam
preparandam materiam,
ex qua tum
dentes tum ossa
procreantur:
nam cetera ossa
ex semine, materia
a vasis
spermaticis in
testibus preparata:
at dentes ex alimento & materia a maxillis
preparata, quæ durissima
sunt. Hippo-
de carnibus.
rationem refert
in qualitate
materie ex qua
dentes pro-
gignuntur: dum
scribit, ex ossibus
capitis & maxillarum sit
incrementum
glutinosi, & quod
expinguum in eo
glutinoso delapsum
in alveolos a
ex calido exsiccatum
exurit, & sunt
dentes reliqui
ossibus duriores, quia
nihil frigidi in-

est. l. 11. u. s. part. 8. m. Ossa non sunt ideo omnia ossa confringunt, Gal. de nat. & ord. corp. n. Soli ignibus ac flammis indomiti cum reliquo corpore non cremantur, & cum sarcophago lapide totum corpus intra 40 dies absumatur, soli dentes in viciis manent, Laur. soli igne in viciis, iidem flammis indomiti, rabe cavantur piruitave, Plin. lib. 7. cap. 16. o 2. hist. an. 3. p 2. hist. an. 13. q. Ut oves, boves, equi & alia multa, Gal. anat. vivor. l. 2. hist. 1. 3. part. 1. Gal. 1. u. s. part. 2. x. u. s. 1. o. d. r. u. s. vocat. l. 2. hist. an. 1. x. u. s. 1. o. d. r. u. s. vocat, Gal. 11. u. s. par. 9. 6. ad. an. 1. t. Vide 11. u. s. part. 9. u 11. u. s. part. 8. x. Maribus dentes plures sunt, quam foeminis (hoc falsum scribit esse Ves.) ut in genere hominum, ovium suum caprarum pater: quibus plures vivaciore magna ex parte sunt: quibus pauciores & variores: hac magna ex parte vitæ sunt brevioris. 2. hist. an. 3. & in probl. 47. Gal. lib. de nat. & ord. corp. viris 32. mulieribus 30. tribuit. y 2. Epid. sect. 6. longævi plurimos dentes habent. * Scalig. exer. 27. contra Cardan.

dentem ^z in superiori maxilla habuerint, ita ut ^{providentes} appellari mereantur: alii item quibus ordo dentium ^a duplex, alii, quibus ^a triplex fuit: ut plurimum tamen unicus dentium ordo ^b (^{Φαρυγος}, septum, quod linguam sepiat, dictum) existit, & in utraque maxilla in adultis ^c trigintaduo sunt, in quibus ^d sedecim: in paucis triginta, & quidem in superiori sedecim, in inferiori quatuordecim: in nonnullis viginiocto (qui numerus minimus est) quatuor ultimis deficientibus, qui non in omnibus, nec eodem tempore erumpunt, saepe intra alveolos imperfecti latitant, interdum à natura non formantur.

Et sane molares in causa sunt, cur inter auctores de dentium numero non conveniat, cum horum numerus frequenter mutetur (incisoriorum vero & caninorum in homine rarissime variat) interdum enim in unoquoque latere quinque, interdum quatuor, nonnunquam quatuor à sinistris, quinque vero à dextris, vel contra: vel infra quatuor & supra quinque, quam varietatem postremi genuini dicti patiunt. Tor vero dentes potius, quam unum fieri expediebat, ut variis officiis in cibis incidendis, frangendis & comminuendis satisfacere possint; dein, ne uno aut dolente aut vi vel vitio pereunte, affectio aliis communis fiat.

Siti sunt humani dentes in utraque oris parte, in maxilla utriusque ^d extremo ambitu sicut piscibus ^e in palato & lingua, cancris etiam ^f in ventriculo: sic qui ruminant dentium ^g ordinem inferiorem habent, scilicet ad labrum pertinentem: at sic disponuntur, ut continui sint & fere æquales, choream ^h belle imitentur, & instar claviculi ⁱ lyrae extraggingivas nudi ^k prominent, & inferiores superioribus, dextri sinistris respondant. Recti sunt, & in neutram partem inclinant & parte anteriore ^l Incisores, proximi Canini, hos Molares sequuntur, qui interiores sunt, ita tamen ut decenti & usui consentaneo intervallo ^m designantur, quod ^{ἀπὸ τοῦ} Græci nominant: sic enim connectuntur ut proximi sint & sese tangant, ne id, quod ab eis frangitur & manditur, in spatii mediis detineatur & putrescat. Radicibus suis maxillarum foramina seu alveolos (de quibus jam dictum) subeunt, quibus ita ad amissum respondent, ut clavi ligno infixi videantur, ut ne tantillum quidem moveri possint. Singulis enim dentibus tenues maxillarum processus ⁿ circumdati eos undique validissime constringunt ac continent, ne facile excidant vel concutiantur. Nervus singulis adjunctus, ut Galenus ^o asserit, ad stabilitatem quoque facit: nervo enim à nimia humiditate laxato mobiles

dentium seriem in utraque maxilla habet, & aculeos in cauda extremitate, quibus se comminus tueri & eminus ejaculari queat, referente Pausania & ex eo Heresbachio in theautes compendio. ^b Animantes aut unum tantum ordinem habent, ut cornigera, quorum dentes in maxilla inferiore ordinatim infixi, in superiore primoribus carent: aut duos, in superiore & inferiore, ut homo; aut tres: vipera, in aqua duplici serie in superiore maxilla interiore & exteriori, at in inferiore simplici, qui inter geminos super inseritur: aut quatuor, ut pisces quidam, aut sex, ut Mantichora bellua apud Indos, utrinque triplici ordine dentium, monente Arist. 2. hist. 1. ^c Hipp. de hom. struct. Gal. 11. us. part. 8. de oss. 5. de anat. viv. & introduct. 11. ^d Uno ordine in utraque maxilla humani dentes 11. us. par. 8. in Hipp. de art. com. 2. ^e Arist. 2. hist. 13. & 3. part. 1. in hominis palato quandoque generari Alex. Benedictus testatur, & Eustachius in muliere Romana dentem enatum vidit, quem scalpello incidi & igne exur curavit: meminit etiam monialis, cui dens in medio palato, anno 18 crevit. ^f Crustatorum & locustaceorum & cancrorum stomachum excipit ventris, in quo locusta & cancrorum nonnulli dentes alios habent, quoniam superiores illi secare non sat queunt 4. part. an. 5. ^g Vide 2. hist. an. 1. Gal. in Hipp. de artic. 6. 1. & 6. ad an. 3. Gal. in Hipp. de artic. 16. 1. 6. ad an. 3. ^h Gal. 11. us. part. 8. laudanda natura, qua dentium choream tam belle exornavit. ⁱ Democritus in epist. ad Hipp. k 16. us. part. 2. 11. us. part. 8. ^m continui sunt equo & bovi 2. hist. 1. ⁿ 5. compos. medic. s. l. 8.

biles & prominentiores fiunt (hac ratione, per synneurosin junctos esse dici posset.)
 Vinculis præterea fortissimis radicibus adhaerentibus præsepulis sive locellis suis ar-
 tissime colligantur. Sic & multífida oris compago à Gingivis facta dentes quam-
 primum alveolis emegunt, undique comprehendit: quare Gingivæ ad dentium fir-
 mitatem quoque faciunt, quæ ob exactam compagis ipsorum conglutinationem
 contingit. Hæc commissura, quemadmodum & maxillarum colligatio à Rufo Pha-
 bena dicitur, & quemadmodum cutis unguium radices complectitur & adhærescit,
 ita gingivæ dentibus iunctæ sunt: hac ratione per eam symphyseos speciem, quæ sy-
 sarcosis dicitur, dentes junctos esse, dici posset, nisi vinculis fortissimis colligarentur.
 Quare uniuntur nervorum, membranarum & carnis interjectu: nervus cavitati in-
 sertus, dentes firmat: membranarum fibræ dentium radicibus hærentes, eos colligant;
 caro eos circumdat, quæ excelsa aut vacillant, aut excidunt.

Caro hæc Gingivas constituit (Græci $\delta\lambda\omicron\nu$ vocant, $\delta\omicron\lambda\epsilon\upsilon$ quod est, invol-
 vere) quæ dura atque immobilis est, ceu vallum, cui dentes infixi sunt, & eis adna-
 scitur, quo dentes in alveolis firmentur, & quasi ligamentis fortibus alligentur, inque
 sedentulis etiam cibaria conterunt: ad quam carnem etiam nervi mittuntur.

Articulatio ex dictis facile colligitur, quæ gomphosis dicitur, quæ synarthroseos
 species est, non tamen exquisitè synarthrosis dici meretur; quare & Galenus ambiguit
 gere & prope ad symphyisin accedere pronuntiavit: siquidem dentes suis alveolis
 haud profus adhærent, quod percipitur, quando veleruntur, vel sponte deci-
 dunt: nam quamprimum alimenti inopia aridiores & macriores, alimentumque
 non sentientes & ob id tenuiores redditi, compages latior fit; quare & dentes laxan-
 tur & vacillant: qua affectione senes laborant: alii quidem citius, alii serius: aliqui-
 bus non modo propter ætatem senilem exsiccati moventur, sed etiam, quia nervus
 radicibus subditus humore copioso irrigatur. Infiguntur autem suis radicibus: alii
 simplici, alii duplici, alii triplici, alii etiam quadruplici mucrone.

runeula circa dentes. Rufo lib. 1. cap. 8. t. Vel quod cicatricem servant ex vulnere in osse dentium accepto, quæ $\epsilon\lambda\lambda\alpha$
 dicitur, ex Meletio de nat. hum. Eustach. & Laur. u Gal. in procem. de ossib. & cap. 5. at 11. us. part. 8. syntaxin den-
 tium harmoniam vocat: quemadmodum 5. comp. secundum loca 8. dentium compagem. At Arist. 2. part. 9. gomphosis
 est, duorum ossium concavorum conjunctio, qua medio quasi clavo conjunguntur, ut flecti extendique possint: at Ga-
 leno cum ossa natura vi, quasi cunei aut clavi infiguntur. x Procem. de ossibus. y Dentes tangunt ossa, cum continu-
 antur. 2. gen. an. 4. z Gal. 5. comp. s. l. 8. a 5. comp. med. s. l. 9.

De dentium speciebus, & quidem de Incisoris & caninis.

CAPUT LXXVIII.

Arist. 2. hist. anim. 1. 3. par. 1. Gal. 11. us. part. 8. lib. de ossibus 5. & alibi.

TRiplices a in homine dentes sunt, pro ratione triplicis figuræ, situs & officii, Inci-
 forii, Canini & Molares: in ruminantibus duplices, incisores & molares: in pisci-
 bus acuti omnes sunt.

visiones ciborum, Galen. de anat. vivor.

Q99

Inci-

a Tres sunt spe-
 cies dentium,
 secundum tres
 speciales di-

Incisorii [tab. 29. fig. 3. D. 1. 2.] in anteriore ^b maxillæ parte siti: primi sunt, quare ^{πρῶτοι} primores ab Hippocrate ^c & Aristotele ^d dicti, non modo quod cæteris prius prodeant, sed etiam, quia primi nobis ^e occurrunt: hi ad cultri similitudinem acie sunt tenui (quare ^{ὀξεῖς} acuti) & lati ^f quo morsu cibum oblatum cultri modo, cum in sibi oppositos & in eundem usum fabricatos impingunt, incidere possint; quare ^{τομεῖς} ^{τὸν τὸν τὸν} ^{τὸν τὸν τὸν} vel Celsus ^h ^{τομῆς}, ab officio dicuntur, quemadmodum & ^{διχῶς} ^{ὑπὲρ} nonnunquam res forcipis instar abscindunt, quando in morsu inferiores non ad superiorum acuticiem sed elatius ad ipsorum corpora impelluntur; & quia inter ridendum primi deteguntur, ^{καὶ ἀσιν} nuncupantur. Quatuor sunt, ⁱ horumque duo caninis proximi aliis minores sunt, caninis etiam breviores [tab. 29. f. 3. ch. 2.] semel in quodam Theologiæ Doctore in maxilla inferiore anteriores duos geminos observavimus; nam cum exteriores duo fere absumpti essent, circa annum ætatis quadragesimum, duo alii intro prorupere; rarissimum duos tantum esse qui latitudinem quatuor habent. Horum pars extra gingivas à basi ad latera angustior, ante vero ac retro crassior est, & sensim latior & tenuior ad extremum evadit: præsertim in superioribus duobus, qui duales ^k nominantur, & palæ, ^k à forma palatum dici possunt: superficie foris aliquantum gibba, intus vero sima. Altera vero pars maxillæ infixa à lateribus compressa, acutè apice terminatur: singulas enim ⁱ radices habent, quibus majori ex parte cæterorum radices magnitudine superant, aut æquant, & cum simplici sunt radice, facilius excidunt, præsertim superiores. In harum extremitatibus in adultis vel nullum, vel obscurissimum foramen conspicitur.

Canini succedunt [tab. 29. f. 3. ch. 3.] ^{κυνόδοντες} Aristoteli & Galeno dicti ^m, non tam à figura, quam usu: nam in canibus post incisores, dentium acutorum duplex genus occurrit: alii exerti, alii triangulari forma, at ab utrisque hominum canini discrepant. Duo ⁿ tantum sunt in qualibet maxilla, quia homo animal mansuetum ^o est, & civile cujus robur & vires magis in sapientia quam corporis fortitudine ^o consistit; quare ejus os minime caninis dentibus uti ferocium animantium implevit: quare ad dura frangenda ^o duo satis erant. Hi planos ^p ab acutis, sive maxillares ab incisoriis determinant, & inferius ^q ad gingivas lati, crassi, superius acuti ^r & supra reliquorum dentium ordinem aliquantum prominentes: ab incisoriis in hoc differentes, quod mole crassiore sint, & line angultiore magisque obtuso, (ita, ut mediam ^p inter utroque formam habeant) quare & duriores, ut si quid propter duritiem ^q ab incisoriis scindi.

ⁱ Aliqui pro his quatuor sive supernis, sive infernis, duos tantum habent, sed fere tam lates, ut usum spatiumque quatuor dentium comprehendant: alii vero pro quatuor incisoriis, sex, octo, atque etiam plures, nullo sæpe ordine collocati, sed partim recti, partim foris exerti, partim intro in oris capacitatem irrumpentes, & manducationem & pronunciationem sæpe vitiant, ut frequenter eos vel evellere, vel urere, vel lima tenui minuere oporteat, Gorrhaus: sciurus gemini, canibus seni, arietibus octoni.

^k Sic & Plat. 1. De ossib. 5. & lib. de nat. & ord. cujus corp. m. Quod canum dentibus quatuor similibus sint, Gal. de ossib. exertis canum dentibus similibus, qui hos habeat multos, & hac fere sedē insignes, Vesal. Col. si de propria similitudine loquamur, falsum esse in speculo coarguit, gravius autem errant, qui exertis dentibus similes asseverant, quam priores, qui ferecibus animantibus os acutis dentibus refertissimum esse scribentes, triangularibus, ut conjicio, caninos comparant, Eustachius. n. Duo tantum in homine, cum leones, lupi ac canes multos utrinque habeant, quod ipsorum utriusque latius pateat, 11. us. part. 9. o. 11. us. part. 9. vide & caput 2. & 18. p. Arist. 2. hist. 3. & 3. part. 1. de variis formis acutorum dentium vide Plin. lib. 11. c. 37. q. 11. us. part. 8. Arabes pinum nucleum forma imitari existimant: & lib. anat. urvor. canini pineale habent acumen.

scindi minus potuit, id frangere ipsi queant: siquidem ut incisores cibos potissimum ^{Etiam acutos} molles secant, ita hi duos validissime confringunt. Radices, quemadmodum & in- ^{subinde vocat} ciso- ^{Galenus, non} res singulas habent, altius tamen infixas & robustiores & ex anteriore parte ^{secus ac incisores, ut 11. us.} minus, quam à posteriore pressas & angustas: quæ proceritate singulas alias cætero- ^{par. 8.} rum dentium superant, ita tamen, ut superioribus longiores & acutiores sint, quam ^{De ossib. 5.} inferioribus. Hos oculares quoque vocant, non quod ita producantur, ut oculorum ^{Inferiorem} ambitum fere attingant, cum vix alarum nasi oram inferiorem transcendunt; sed ^{q. oculi ambi-} quod nervi oculos moventis portiuncula ^{tum ac fora-} in hos feratur; quare eorum extractio ^{men, per quod} periculosa censetur.

tertiis parvis nervis ad faciei partem emittitur, tangit, Fallop. non tamen veluti multi scribunt, producantur, ut oculo- ^{Eustach.} rum fere ambium attingant, Plat. x. Esculapius dentium evulsionem primus invenit, Cic. 3. de nat. ^{u Sic & Laur. non sine periculo vi evelluntur, Plat. x. Esculapius dentium evulsionem primus invenit, Cic. 3. de nat.} Deorum, quam Galenus etiam veterum inventu multa adiciens persecutus est.

De dentibus molaribus.

CAPUT LXXIX.

Molares^a dentes [tab. 29. fig. 3. ch. 4. 5. 6. 7. 8. & C.] qui ^{a Maxillares} ^{& molares, Ve-} ^{sal. Col. Eu-} ^{stach. Piccol.} ^{attinentes &} ^{molars, Para-} ^{lio. Cic. 2. de} ^{nat. Deor. mo-} ^{lars omnes ge-} ^{nuinos vocat.} ^{b 11. us. par. 8.} ^{Clavales ver-} ^{tunt aliqui,} ^{q. & h. etiam} ^{appellati, cum} ^{musciantes} ^{pueri onitenti-} ^{buis fari so-} ^{leant, Laur.} ^{c De ossib. 5. &} ^{de anat. vivo.} ^{d Lib 1. cap. 8.} ^{e Sic & Eusta-} ^{chius.} ^{f Durissimi} ^{omnium ossium} ^{vesal.} ^{g Arist. 5. gen.} ^{an. 8. 3. par.} ^{an. 1.} ^{h Arist. 2. hist.} ^{1. & 3.} ^{i 11. us. part. 8.} ^{k Arist. 3. par.} ^{an. 1. molendi} Græcis & à si- ^{ura} & ab usu dicuntur; quod iis cibis, veluti molis^c, conteratur; in oris parte interiore locantur & buccis occultantur: Vnde Germanis, Buccarum^d dentes nominantur. Nam cum incisores & canini parte anteriore locari debuerint, quo cibum capiant, mox incidant, tum frangant, quem cum molares comminuere debuerint, in interiore oris parte, quæ tecta est, sedem recte obtinuerunt, ne dum cibum comminuunt & lingua adjuvante, huc & illuc impellunt, aliquid effluat. For- ^{b 11. us. par. 8.} ^{Clavales ver-} ^{tunt aliqui,} ^{q. & h. etiam} ^{appellati, cum} ^{musciantes} ^{pueri onitenti-} ^{buis fari so-} ^{leant, Laur.} ^{c De ossib. 5. &} ^{de anat. vivo.} ^{d Lib 1. cap. 8.} ^{e Sic & Eusta-} ^{chius.} ^{f Durissimi} ^{omnium ossium} ^{vesal.} ^{g Arist. 5. gen.} ^{an. 8. 3. par.} ^{an. 1.} ^{h Arist. 2. hist.} ^{1. & 3.} ^{i 11. us. part. 8.} ^{k Arist. 3. par.} ^{an. 1. molendi} ma & u. u. molis^e, quibus cereales fruges tenuantur & atteruntur, persimiles: sunt enim inæquales asperi^f, duri, lati, & magni: asperi & inæquales, quo cibis comminuendis apti sint; quod exemplo molarum declarari potest: si enim molis asperitas desit, vel eam molendo deposuerint, malleis ferreis incidi^g & exasperari solent: verum dentes tandem attritione æquantur, ut in senibus videmus, in quibus etiam ob continuum usum, cæteris facilius eroduntur & franguntur.

Quare horum pars extragivam prominens quadrata est, in tribus tamén posterioribus perfectior, & licet eorum summæ partes valde amplæ sint, ita ut ^{απεζου} mensæ, à Ruffo^d dicantur, non tamen laves sunt, sed quilibet^e foveam habet unam vel alteram in medio, sed loco haud certo: quare ipsorum partes extremæ eminent: duo quidem caninis proximi, interiore parte & extrinsecus elati sunt, licet primus, & præcipue inferior, apice interno quandoque careat: tertius in quatuor angulis extuberat: quartus & quintus plerumque eminentias extrinsecus duas, intrinsecus vero unam tantum habet. His sinubus & tuberibus mutuo convenientibus, cibi commodius apprehenduntur, & ne effluant vel dilabantur, continentur. Duri^f quoque sunt, ut cibis conficiendis sufficient: lati (quare ^{αλ. & π. & aliis} propter magnitudinem & plani^h propter superficiem, ut cibosⁱ ab incisoriis incisos, à caninis effractos molere, ^k lavigare^j ac conterere (quod proprie mandere est) queant: quando eos optime ^{an. 1.} ^{h Arist. 2. hist.} ^{1. & 3.} ^{i 11. us. part. 8.} ^{k Arist. 3. par.} ^{an. 1. molendi} officio delegati sunt molares. 5. Gen. an. 8. quare elephas dentibus conficit cibum & in farina speciem molis. 2. hist. an. 5.

contritos homini deglutire expedit; cibis namque hoc pacto comminutis, oris calore accedente & humore immutatis coctionis initium rude in ore fit. Dicuntur etiam $\chi\omicron\mu\phi\iota\sigma\iota$, ^m non quidem ab insertione clavorum simili, hoc enim ⁿ omnibus dentibus aequae convenit, sed $\delta\omicron\tau\omicron\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \chi\omicron\mu\phi\iota\delta\alpha\tau\omicron\varsigma$, ⁿ hoc est ab aspera molarum superficie, cujus figuram & usum molarum dentium partes superiores eleganter imitantur.

In ore cibi fit alteratio: mutat id in alteram speciem manifeste, non

tamen ad perfectionem transmutatur: discas id ex iis, quae ex cibo in dentium intervallis relicta per rotam

noctem haserunt & paulo post: ciborum

alterationem magnam in ore fieri patet, si

mansum tritum, crudis frumculis applicaveris, cernes

id ocyssime hos mutare & co-

quere: & paulo post: qui man-

si sunt cibi primum pituita

hac imbuuntur & cum ea

commiscuntur: dein carnem

oris omnes contrahunt,

Gab. 3. nat. facul. 7.

m De ossib. 5. n Sic & Eustachius; vel ut

alii $\Delta\iota\gamma\ \tau\eta\varsigma\ \kappa\omicron\lambda\upsilon\varsigma$ propter inflexionem, quod in curvis maxillarum partibus sedem habeant, Meletius de natura

o II. us. par. 9. p In Introd. 12. Russus lib. I. cap. 8. q Maxillarium numerus non est definitus, sed qui longiores habent

maxillas, iis quinque sunt utrinque: qui vero minores, quatuor: maximatamen ex parte sunt quatuor, II us. par. 9. r De ossib. 5. f

Tantum ternos in quodam Cardinali observavi, qui numerus omnium minimus est, etiam in puerulis. Eustachius. t

Alii sunt dentes ignorantiae, ut qui pueris nascuntur: alii sapientiae, qui nascuntur, quando homo vel sapiens vel sapere incipit, Piccolh. u De carnibus.

x post pubertatem venerique usum, quod nonnulli male observantes, aut alios dentes evellunt, aut humorum vitio infestari sibi persuadentes, egros pilulis molestant, cum levi gingivarum ad postremum dentem scarificatione, ac interdum

ossis pertusione, praesentius remedium adferri non possit. Vesal. y Russus lib. I. cap. 8. vel ut Meletius, quia in ortu suo prudentia percipienda tempora pueris adducant. z Novissimos maxillares genuinos vocamus, qui viris & mulieribus nascuntur. 2. hist. 4. dentes omnes cranterios vocari Russus testatur.

a Quia post pubertatem primum fere deteguntur potius, quam erumpunt, genuini dicuntur, Plat. Prater 32. aliquibus

Magnitudine variant. cum medii ^l majores sint; qui vero utrinque sunt, minores, tertius omnium maximus (at in simia quartus & quintus major est) non enim conveniebat ⁱ oris internam capacitatem quae eo modo, quo anterior angustior est, dentes aequae magnos habere, ac mediam, quae est ad buccas, quaeque est amplissima. Nunquam in quarto aut quinto, sed superiore potius, quam inferiore dimidius pene dens adjungitur, quando Natura plures molares efficere contendens ob loci angustiam nequit, necessario simul jungit.

Numero communiter tam ex superiore, quam inferiore parte, utrinque ^o quinque sunt conjuncti in scilicet viginti p: plures n. homini molares, quam incisorii dati sunt, siquidem Natura pro fissurae oris amplitudine angustiae, animalibus plures paucioresve tribuit: homini quidem cui os angustissimum, cuique dentes ad mandandum praecipue usui sunt, multo plures, quam incisorios aut caninos tribuit: contra in ferocibus molares aut nullos aut pauciores, sed incisorios, cum iis ad pugnam utantur. Hinc incisoriorum & caninorum numerus in homine vix variat, at molarium q cum interdum quini ^r, interdum quaterni aut seni sint (rarissime terni) forte propter maxillarum q breviteriam. Quam varietatem Galenus aperte scripsit, quae in simia vix unquam conspicitur: quare cum Eustachio dicimus, & hoc ipso quoque probari posse, Galenum non tantum simias, sed etiam homines secuisse Recte ergo Aristoteles, omnes homines totidem dentes non habere scripsit, quod & Galenus innuere videtur.

Molarium duo posteriores tum situ, tum generatione ultimi $\sigma\omega\phi\omicron\nu\iota\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \tau\epsilon\tau\epsilon\tau\epsilon\varsigma$ Hippocrati, ⁿ sapientiae dentes vocantur, eo quod dum nascuntur, homo ^o $\sigma\omega\phi\omicron\nu\iota\varsigma\ \tau\epsilon\tau\epsilon\tau\epsilon\varsigma$ id est, sapere incipiat, siquidem circa quartum septenarium ^x, quo tempore y moderatos temporatosque nos esse convenit, & quidem subinde cum maximis cruciatibus, erumpant, quare dentes sensus & intellectus Avicenna appellat. Hi quandoque etiam in summa senecta prodeunt, idcirco $\kappa\omicron\pi\omicron\nu\ \tau\eta\varsigma\ \tau\epsilon\tau\epsilon\tau\epsilon\varsigma$ Aristoteli ^z, Latini Genuinos ^a nominant: quibus hoc proprium, ut aliis jam pridem absolutis erumpant: saepe etiam

jam

alii prodeunt, quos Plin. genuinos appellat ab anno 18. ad 26. vel ut Plinius ait etiam 80. aliquando indolenter, sæpe cum magno cruciatu, Gorrans: circa 20. annum, aliis 40. aliis 80. Piccolhom.

jam vel perforatis tantum gingivis vix prominent, vel eis integris in suis alveolis latitant, vel etiam nulla ex parte creantur.

Radibus in homine non eadem perpetuo sunt forma, sicut in simia, nam in simia molares maxillæ superioris tres radices habent, inferioris vero duas, quinto tamen aliquando excepto; quartus ut maximus sic etiam radices maximas obtinuit. In homine non raro plures radices habent, quæ unius speciem præ se ferunt; aliquando in quinto (in secundo etiam observavit Eustachius) maxillæ inferioris, qui ob magnitudinem multipliciter findi debuit, simplex^b radix est, crassa, & uno foramine, eo-
^b Hipp. 4. epid. septimus dens radicem unam crassam eandemque acutam habere scribit.
 que latiore pervia. Sic aliæ radices vel æquali vel inæquali superficie sunt quæ nihilominus intrinsicè duo tria vel foramina, tenuissimis squamis discretæ elegantissime incisa habent, favo mellis quam simillima, ut in quinto molari tria, in pluribus aliis duo foramina habentur: sæpe radices aut connatæ, aut vix inchoatæ, alias rudiores lineæ, alias nullis lineis discretæ. Figura^c quoque variant, cum aliæ teretes, acutæ rectæ-
^c Hipp. 4. epid. in Hegesistrato planas observavit: inflexas seu hamatas in quodam alio: plures incurvatas, aut cuspidatas, aut occurrentes, aut adverso tramine inclinatæ, aut instar S. literæ hinc inde dupliciter flexas, notavit Eustachius.
 ve sint: aliæ obtusæ, planæ & curvæ. Magnitudo eadem non est, alteri nunc crassissimæ, nunc angustissimæ; alteri breves, alteri longæ: nonnullis latissimæ & tenues: plerumque tamen superiores longiores sunt, inferiores breviores: situ variant, cum aliæ se mutuo tangant, aliæ vicinæ sint; aliæ longo intervallo disjungantur: aliæ distant, quidem, sed incurvæ sunt, & sibi invicem ita occurrunt, ut extremis vel se mutuo tangant, vel via adversa euntes, magis magisque disjungantur: & hæc, si dentes ferro eruantur, mediæ franguntur, & hominem maximè cruciant. Quod si tres sint, & præcipue in maxilla superiore, una ad interiorem duæ ad exteriorem partem vergunt. Concludentes dicimus; communiter molares duos superiores caninis proximos, binis radicibus, tres reliquos ternis, nonnunquam & quintum quaternis (quod^d rarum est, infigi: quemadmodum duo inferiores ad caninos singulis, tres reliqui duabus. At postremi genuini, radices brevissimas obtinent, partim, quia illa maxilla portio insertionem profundior non admittit: partim, quia in cibis lævigandis, cæteris minus exercentur.

Quare molarium maxillæ inferioris, quam superioris, radices & pauciores & breviores existunt, quoniam maxillæ inferioris substantia durior densiorque, dentes etiam sua gravitate incumbentes, firmiter continere potest, quam maxilla superior, quæ rara molliorque, pendulos & velut in casum ob suam gravitatem proclives; idcirco radicibus longioribus quo tenacius & altius infigantur, quo firmiter & validius hæreant pluribus quasi vinculis indigere; & cum radices breviores sint, minori periculo, sed majore labore, cum plures habeant, præsertim, si radices alveolis adnatæ sint, evelluntur. Radices dentium omnes perforatæ sunt usque ad earum cavitates internas, foramine^e tamen in absolutis dentibus valde exiguo, in acutiore summaque radicis parte, quo venam, arteriam & nervum admittant.

Q99 3

De f Absoluta den-

tium radices plerumque ita coactæ sunt, ut nullum pro se in ea foraminis vestigium, aut profecto maxime obscurum appareat, Eustachius.

a Galeni de va-
sis & nervis
dentium sermo
11. us. part. 8.
ita concisus est,
ut nihil inde
colligatur, quā
in ipsorum dis-
pensatione sum-
mam Naturae
aquitatem ap-
parere esseque
ex ossibus solos
dentes mollium
nervorum ce-
rebro partici-
pes, eosque vix
conspicuos ex
terio pari cere-
bri, Eustach.
Nervulos, ve-
nulas & arte-
riolas ad radi-
ces dentium
pervenire, non
est negandum,
Fallop. & Lau-
r. b. Expulsi saepe
renascuntur:
prodidit Mutia-
nus, visum à
se Samothra-
cenum civem,
cui renati es-

sent dentes post centum & quatuor annos, & Aristoteles, mulieribus quibusdam maxillares dentes post 80 annum de-
nuo erupisse scribit, Laur. c. Arist. 2. gen. an. 4. Gal. 5. compos. medic. s. l. 8. Vesal. Col. Laur. non credo verum esse, quod
dentes avulsis oppositi, quoniam mutuum contactum in occurso declinant, semper & in omnibus augeantur; quando-
quidem in me ipso contrarium experior, Eustach.
d. 5. comp. med. secundum loca 8. & ex eo Vesal. Columb. Eustach. Laur.
e. 5. comp. med. secundum loca 9. si in intima cavitate dentes videntur pulsare, dum inflammationem patiuntur, id ac-
cidit, quia ad dentis radicem arteriola pertingit, quae fortassis minima cavitationem ingreditur, quamvis hoc oculis non
a sequamur, Fallop.
f. Gal. 9. us. part. 14. & 15. & lib. 11. ejus. 7. solis dentibus ex ossibus molle genus nervorum inest, 16. us. par. 2. de ossibus.
applantantur radicibus dentium molles nervi: quare hi duntaxat inter ossa evidentem sentiunt, Vesal. inferuntur &
per cavitationem disseminantur, Col. & Laur. in radices dentium nervuli membranulis suis convestiti penetrant, Piccolb.
† Fracast. de symph. & antiph. c. 14. videtur velle nervulos ab auditorio ad dentes ferri, dum ait: si acutus valde sit so-
nus

Vasa^a per foramina radicum dentium ad interiorem cavitatem feruntur & divan-
cantur. Venae quidem, quo uberius & copiosius alimentum adfluat: hinc dente
perforato sanguis aliquando effluit. Debuerunt enim dentes perpetuo ac rescere
b, cum mansione attritu mutuo alterantur; quod ostenditur^c, si dens aut decidat, aut
avellatur, is qui exempto aut elapso ex opposito respondet, aliis qui eadem sunt se-
rie prominentiorem exertumque magis fieri, quia contrario dente non amplius attri-
ritur, ceteri mutuo congressu & attritu in ciborum confectioe, tantum augentur,
quantum laevigandis cibis comminuuntur.

Arteriae ad caloris nativi custodiam dentes quoque subeunt: hinc fit, quod dolor
pulsatorius per inflammationes sentiat; quemadmodum & carnosae partes inflam-
matione vexatae patiuntur, quod Galenus^d primus deprehendit; qui in seipso, non
solum dentem dolere, sed etiam pulsare advertit; quare alium dolorem in gingivis,
alium in ipsius dentis substantia esse, clare^d se scire asserit; Et citra gingivarum inflam-
mationem^e aliquando in ipso proprio dentium corpore, aliquando in nervo dolorem
fieri contingit: Et nisi arteria subiret, quomodo à perforato dente tantum sanguinis
lucidi aliquando emanare posset? quod Eustachius notavit in quodam, qui ejusmodi
haemorrhagia laborans, vitam pene cum sanguine effudit.

Nervi^f molles a ctenues a tertia[†] conjugatione vulgo dicta (nobis vero quarta)
feruntur [tab. 9. fig. 1. Q. ad dentium super alveolos TT. ad dentes inferiores] & per ipsorum
radices in ipsa dentium prima conformatione in cavitatē feruntur, & per interna den-
tium disseminantur, & surculis minutissimis cum eorum substantia mucosa commis-
centur: qua magna ex parte in os firmata, causa est, ut dentes cum nervis facilius con-
sentiant, & sic sensus participes fiant, cum ad cetera ossa nulla nervi propago pertin-
gat, per eorum cavitatem transfundenda; hanc ob causam ossa nervis carere dicun-
tur, quamvis membrana, quae periostrium dicitur, sensu praedita sit, & nervos habeat,
& quemadmodum partes cicatrici vicinae & hepatis ejus membrana sensum tribuit, sic
& per-

nus & stridulus, applicatio vim patitur quasi in angusto facta, cum & membrana auditus quasi ita offenditur, unde contrahitur repente, ac cum ea simul & Nervuli quidam usque ad radices dentium, in quem locum subito incidens, novus aer horrorem quendam circa dentes facit.

& periostium illis impertiri potest, h cum exquisitissimi sensus sit, ita ut quando male habet, ipsius affectio ossium dolor censeatur. Nisi lubeat dicere, ossa, cum per animam sentientem existant, ipsius beneficio sentire, obscure tamen, cum ossium durities sensui non mediocriter advesetur, quo sic ossa à plantis distinguantur, & animalis particulæ sint. Equidem Vesalii & aliorum tabulas imitati, nervos majores longe delineatos proposuimus, quam in sectione ostendi possint. Verum, qua ratione vasa & nervos demonstrare soleamus, subjiciamus.

Cum in majoris alicujus animalis maxilla, ut bovis vel arietis rectius hæc, quam in hominis demonstrari possint, bovis maxillam inferiorem (cum in hac, quam in superiore administratio facilius est) accipimus, latere interiore aperimus: qua aperta cavitas medulla plena, una cum nervo membrana involuto occurrit; medulla remota & membrana secundum longitudinem scissa, nervus ex pluribus quasi funiculis conflatus conspicitur, inter quos venarum & articularum propagines feruntur. At ubi membrana hæc cum nervorum & vasorum furculis ab osse remota sensim sublevatur, fibræ nonnullæ araneis similes, ab ea distributæ conspiciuntur; sic in maxilla arietis, fibræ ossium interstitium, quod tenue & rarum, & inter nervum & dentes positum est, ad dentium molarium radices penetrant. A molaribus vero ad dentes caninos & incisivos, nervus, arteria comite delatus, bipartito dividitur, cujus pars una per foramen eo loco exsculptum ad labrum inferius emergit; altera ad dentium incisivorum radices tendit, cuiuslibet furculum largitur, & altera portione cum radicem pariter exteriore jungitur; altera autem eaque tenuissima dentium sinum penetrat, quod etiam in homine non difficulter videri potest.

Et sane mirum est, incisivos & caninos dentes, qui minores unaque radice infixi sunt, nervorum ac vasorum furculos magnos & conspicuos via patente ad insertionem accedentes obtinere: molares vero, qui majores & tribus, interdum etiam quatuor radicibus præditi sunt, eosdem furculos, qui bifariam, trifariam, ac etiam quadrifariam scindi debent, capillorum modo tenues & itinere obscurissimo incedentes, habere. Quod si vero molarem vel incisivum è proprio alveolo sensim extrahas, fibras gracillimas è maxillæ concavitate emergere, & dentium radicibus conjungi videbis: simul etiam interstitii ossi partes substantia mucosa referas observabis, quæ ei substantiæ, ex qua dentes ejusque folliculi generantur, non absimilis est.

Dentibus evulsis, in radicum extremitatibus, materia partim mucosa, partim fibrosa, quæ nervi atque utriusque vasis speciem, obscure tamen præ se fert, occurrit. At dentem medium, si divides, substantia mucosa vasis, & nonnullis aliis fibris intertexta se exhibet. Hæc in bovina & arietina maxilla & dentibus demonstrari possint; quæ etiam in humana, licet non ita perspicua sint, ex parte observari possunt. Quis ergo negabit internam dentium partem dolorè cum pulsu experiri, quod cum Galeno & Eustachio asserimus) cum illa arteria cum nervo subeat; Sic & venas in homine sinu ingredi quis dubitabit? cum sanguine aspersus conspiciatur, & in bobus manifeste demonstrari possit: nam licet in homine non ita aperte conspiciantur, negari tamen non

g. Reprehendendi, qui obscurissimi foraminis in dentis radice nulla ratione habita, nervorum vasorumque continuum ductum, distributionem & insertionem in eandem cavitatem, veluti facile pingunt, ita sese ostensuros recipiunt, Eustach.

h. In ossa nervos inseri asserit Actuarius 4. meth. 14. obsecro sentire cognovit Gal. cum Hipp. quare 2. de fract. 12. ossa, quæ cruri junguntur, dolore affici scribit.

non possunt; quemadmodum in oculi tunica adnata, quamdiu homo valet, vena nullæ apparent, quæ inflammatione accedente conspiciantur.

De sensu dentium. Alii sentire negant, quia ossa sint, & circa dolorem lima afficiantur, referent Galeno 5. comp. medic. secund. loca 8. alii sentire volunt, sed sensu per se, ut & reliqua ossa sine nervis, unde dolor, qui dentibus inesse creditur, esse extra dentem in membranula alveolos succingente, Plat. per ingenitum calorem vivere & sentire censet Aretæus lib. 2. de sig. & causis dunt. morb. 12. dolore afficitur adit Hipp. 5. epid. frigidum

amplius quam calidum sentire statuit Arist. 3.4. probl. 2. & 3. dolere & pulsare, & nervos molles recipere, Gal. l.c. Sed quæ pars sentit? alii dunt corpus, sed solum secundum partem internam, Varolius: alii totus dens sentit, sed non totus dolere: Sentit primas & secundas qualitates, sed prima tantum dolore afficiunt, quia vires effundunt in radices dentium, in quas nervuli penetrant, Piccolhom. Sic Laur. totus sentit, sed exquisitius interna, minus externa. Unde sensus quod doleant? alii tum propter nervos, tum propter substantiam propriam, Aëtianus 6. meth. 7. alii propter membranam tenuissimam internam caritatem succingentem, Fallop. alii propter nervum & propter membranam, quæ caritatem subit: alii propter nervum, qui vicinis partibus, & tantum dentium radicibus cohereat: alii à nervo subeunte, & à membrana, quæ tantum radici instar periosii adhæreat: alii à nervo substantiam subeunte, Varolius. Dentes & eorum substantiam sentire, probatur auctoritatibus Hipp. l.c. qui dentes dolore affici tradit, Arist. cui & calorem & frigus sentiunt. Gal. l.c. cui dentes dolent & pulsat, & 5. ad. an. 3. ab iisdem nervis & gingivæ, & dentes & membrana sensum accipiunt. Experientia, si ferrum frigidissimum vel glaciem admoveas, statim obriescunt: Sic & rem calidam sentiunt. Sentiunt & secundas qualitates duritiem, molliem, asperitatem, Sed primas qualitates vehementer sentientes, dolore afficiuntur, quia vires effundunt in radices dentium, in quas nervuli penetrant; at secundas qualitates, ut duritiem, asperitatem, limantes & frangentes sentiunt quidem, sed dolorem non adferunt, quoniam vires non effundunt in dentium radices, in quibus sedes est tactus, Piccol. cum periosio careant, debebant sensu aliquo donari, ut saltem primas ciborum qualitates actuales perciperent: at per osseam substantiam durissimam sentire non poterant: ergo quemadmodum in ense sub cortice chalybis durissimo latitat, medulla ferrea longe minus dura, ita sub cortice dentium ossea, adeest substantia quadam mollior, ad quam nervi perveniunt, sensumque illi impertiuntur, & sicut cutis sentit per cuticulam non sentientem, ita dentis medulla sentit qualitates tangibiles per partem osseam omni sensu privatam, Varolius. k. 1. causis sympt. 5. l. 2. loc. affect. 6. m. Frigidum amplius, quam calidum sentiunt, caro contrario, quia semper frigidi sunt, & meatus habent tenues, quibus calor inditus exiguus est, Arist. 3.4. probl. 3.

cum in propriam cavitatem nervos molles recipiant, & eorum substantia interna, quæ à sensibilibus immutatur, non nihil rata sit) & per eorum substantiam diffusi sunt, alterantur, dum ad eos undique penetrant, & simul cum ipsorum substantia spiritum animale, & successione quadam membranam & nervum afficiunt & immutant. Dolor autem hic, qui in dente percipitur, distingui debet ab eo, qui gingivis^a vel ex intemperie quapiam, vel humorum quorundam defluxu, & nervo ad radicem sub-

^a Gal. 5. comp. med. se. undum loca 9. Trallianus lib. 3. c. 9.

dolores sunt cum pituita radices dentium subiorit. H. pp. lib. de affect. o 16. ff. part. 2. in dentibus gustandi. n. g. n. dique sensus

strato contingit. Sentire autem debuerit, melioris usus gratia, cum perioestio non cingantur, & injuriis externis expositi sint, quo ea, quæ nocitura aut profutura erant, percipiant. Dein & sapores (si Galeno^c credimus) aliquo pacto, quemadmodum & reliquæ oris partes discernere debuerit, cujus nomine nervos molles recepere: nam sicut cutis sentit per cuticulam non sentientem, ita dentis medulla sentit qualitates tangibiles per partem osseam, non secus ac membrana nervea sub unguibus locata sentit caliditatem & frigiditatem per ipsos nullo sensu præditos.

in esse videtur, Gal. 6. epid. com. 6. sensu donari debuerit, ut saltem primas ciborum qualitates actuales perciperent, V. volius, non subscribimus, alioqui fateri cogeremur, & dentes esse gustandi instrumenta, Piccolb.

De Cavitate dentium interna & membrana.

CAPUT LXXXI.

Vasa cum nervis dentium cavitatem subire, dictum fuit; qualis ergo cavitas sit, explicare convenit. Dentes omnes intrinsecus cavi^a sunt [tab. 29. fig. 3. E.] verum cavitas magna vel parva est, prout ratione magnitudinis, ac figuræ dentium, quod etiam Aristoteles^b agnovit, dum dentes ossa dixit, partim concava, partim solida. Hæc in pueris ad septennium^c & plures etiam annos insigniter ampla est, & squamam tenui circumscripta, cereis fabricis, aut apum potius favis valde similis: humore albo (non vero^d medulla) plena, quod in vitulorum dente ultimo, in maxilla latitante, quem lacteum dentem nostri vocant, in mensa conspiciere facile est: humor hic procedente ætate exsiccat, durior redditur, ossis formam majori ex parte fuscipit: sicque concavitas, dum dentes absolvuntur, indies imminuitur, ita tamen, ut in medio

^a Recentiores aliqui, quascavitate invenerint, palmam injuria poscunt cum veteres Anatomei scriberent, dentes os esse, partim concavum, partim solidum. Galenus in libris, qui extant

R r r

ipsum

cavitatem hanc, qualis & quanta sit, & quid in se contineat, non explicat: at cum caverna dentium sæpe meminere, vix verisimile ipsum ignorasse: nam si nihil concavitatis initio ortus dentes sortitos esse credidisset, frustra docuisset, in vehementissimo dolore, eorum substantiam prorsus solidam terebello tenui perforari, s. compos. med. secundum loca 9. Dein apud Hipp. 4. epid. legitur, puero ab ulcere phagadenico erosi dentes emergebant, qui cavitatem habebant: huius erosionem substantia, & naturalem simul dentium cavitatem non obscure innuit. Imo nervos ac vasa peculiari dentium sedi insita, sensus alimenti & vita causa excogitata, & admirabili Opificis diligentia procurata scribit: Hæc Eustach. b. 3. hist. an. 7. c. Dentes exiguas, sed notatu dignas, cavitates intrus obtinent, quo leviores sint, & commodius nutrantur, Vesalius, non ut leviores sint: hæc enim mihi ratio in ipsis ineptissima videtur, sed ut commodius nutrir ac senti-re possint, Eustachius. Sinus totum dentem occupat, ea parte excepta, qua gingivis denudata est, qua solidior, &c. Fallopius. In dente perfecto in medio cavitas, quibus & fibra quadam inesse videntur, Plat. ex pingui in se habente aliquid frigidi, os cavernosum sit; at cum pingue id, ex quo dentes fiunt, nihil in se frigidi habeat, ideo nulla cavernula & laxitates fiunt in ipsis, ideoque dentes densissimi, & ceteris ossibus duriores evadunt, Piccol. Eustach. Laur. d. Dentes nostri

Pro ossa non sunt, nec medullam habent, Gal. lib. de nat. & ord. cujus corp. neutiquam medulla plena, ut nonnulli hodie Galenum insimulantes scribunt, Eustachius.

ipsius crassitie ad radicem sinus quidam remaneat, qui partem illam, quæ extra gingivas est, vix attingit. Nam cum vasa inferantur, & arteria, quo libere distendatur, spatium requirit, quamvis aliqui sensum hunc pulsationi non absimilem, non ab arteria excitari velint, sed à spiritu varie concitato, quemadmodum in auribus experimur & baculum percussum, si particulam sensu præditam contingat, concuti & resonare videmus.

Hæc clarius in molaribus bovinis fractis conspiciuntur, cum in vitulo & agno quilibet molaris cavitatem triplicem habeat, anteriorem, posteriorem & mediam, quarum media foramine instar literæ C. curvo etiam pervia est, quod ad extremum usque dentis gingivas egrediendi pertingit, & in duabus reliquis materia mucosa continetur, quæ majori ex parte, dum dens perficitur, in os transit: & cum in his animalibus plerumque duo molares, ac etiam tres, & non raro quatuor conjuncti occurrant, quo mutuo consentirent, natura foramine transverso osseum interstitium incidit, per quod materia, quæ membranulam æmulatur, seu furculi ab altera cavitate in proximam trajicit, Eustachio notante.

Substantia mucosa dura, superficie lubrica cuticula simili, quæ concretionis speciem magis, membrana texturam dum eruitur, præ se fert: nominet tamen eam quisque arbitrio suo, aut membranam, aut concretionem: siquidem negandum non est, hanc substantiam in umbra exsiccatam, tunica haud absimilem videri, Eustach.

Cavitas hæc succingitur substantia membranulam æmulante, quam alii membranulam tenuissimam^f vocant: exactissimi sensus esse, & propterea caloris & frigoris sensum dentes percipere, eam sæpe humorem à cerebro defluentem imbibere: unde dolores vehementissimi causentur, qui tamdiu permanent, quamdiu humor in membranula detineatur, vel usque dum cerebro purgato fluxionis causa tollatur. Hujus cavitatis causa, si dentibus & ex humorum acrium affluxu foramina oboriuntur, quæ ad eam cavitatem pertingunt, dentes citissime ad radicis extrema eroduntur: in hac erosio præcipue & putredo dentium incipit: in hac caries dolorosa subnascitur, vermesque aliquando colliguntur, qui hominem mirum in modum excruciant. Utus hujus cavitatis, ut dentes commodius nutriantur ac sentiant.

Fallop. Laur. at Gorraus dicit, nervum cum meningetenui subire: membranula ex venarum, arteriarum & nervorum complicatione in cavitate gignitur, quæ materiam defluentem imbibit, unde dentium dolores ingentissimi, Col. sunt qui asserant, ex arteria vena, & nervulo simul mixtis constare, quæ opinio similis ei, quæ antiquiores asseriebant, ex nervo, cute, carne & ossibus simul mixtis unguis constare, ut testatur Gal. 2. ad. an. 11. hæc Fallop. Sed non ita recte improbat: quia multa de vasorum nervorumque in dentes distributione scribunt, quæ etsi sensu perfecte percipi nequeant: quia tamen verisimilia sunt, non contemnuntur, Eustach. alveoli membranula succinguntur exquisitissimi sensus, quæ si afficiatur, dolorem illum, quem dentibus ob vicinitatem inesse putant, causat, Plat. g. Vesal.

De Dentium generatione & usu.

CAPUT LXXXII.

Hippocrates lib. de carnib. de septimestri partu; Aristoteles 2. gen. animal. 4.

Den-

Dentium ^a generatio in utero est, cum ceteris ossibus, cum quibus simul delineantur, sed sensim formantur & absolvuntur: quare in maxillis aliquandiu imperfecti latitant, nec omnes simul è propriis alveolis erumpunt, sed alii citius: alii tardius absolvi, prout necessitas requirit, exeunt: hæc causa est, cur duplex generationis tempus constituatur, aliud in vtero materno, aliud extra vterum.

In vtero post maxillarum generationem, in qualibet dentes ^b duodecim formantur: ex quibus incisarii quatuor sunt, canini duo & maxillares ^c sex, qui omnes radicibus carentes, in alveolis undique vallati sub gingivis integris latitant (pauci enim exertis dentibus ^d nati sunt, ut M. Curtius Dentatus cognominatus & Cn. Papyrius Carbo) quod maxilla alicujus crudæ abortus, ^e aut recens nati puelli apertio docet, ex cuius alveolis exigui dentes eruuntur. Horum dentium adhuc imperfectorum substantia est, partim mucosa, partim ossea: posteaquam enim folliculus, (qui singulis dentibus albus, mucosus ac tenax, quasi membraneus ^f obducitur, & quo dens mollior & recentior est, eo mucosior existit) & parte superiore nonnihil perforatus, ut dentis mucronem emittat, existit, detractus est, cum denti subiecto nusquam coalescat, tunc dens partim osseus, partim mucosus conspicitur: pars enim, quæ extraggingivas eruptura est, in squamam candidam, tenuem & excavatam instar favicæ mellis formatur, sicque pars superior ossea est, dura & cava.

Altera dentis pars maxillæ infixæ, mollis est & humida & mucosa, ut in pennarum generatione apparet, quæ substantia fibras & stamina habere videtur; quare veluti pellicula quadam tenui vestita, cum superficiem lubricæ cuticulæ similem obtineat, quæ substantiæ quam continet, agglutinata & juncta est: quod etiam in origine pennarum, dum adhuc teneræ sunt, apparet: nam pars extra cutim prominens, cornea & dura est, quæ vero in alis latitat, mollis, humida, & veluti sanguis, vel pituita cōcreta existit. Mollis hæc pars, dentibus erumpentibus sensim obdurefcit, sensim & ossea fit, & quandoque intus excavata in radices formatur. At folliculus osseam partem tegens, dentis vinculum fit, eo enim firmiore reddito, dens ipsis alveolis & gingivis veluti glutino quodam adhærescit.

Rrr 2

Hlin

zum ad dentes firmandos subjici pinguedine, qua in hac, quam in ossium materia copiosior est, caloris vi exsiccata. Sic Laur. ut triplex hoc alimenti genus differt crassitie, ita non est eadem dentium soliditas, durities & crassities: qui enim ex sortus in utero & editi puelli lactantis alimento gignuntur, molliores sunt & facile decidunt: qui ex solidioribus duriores & firmiores: tales enim septimo & 14. erumpere solent: decidunt enim dentes 4. 5. & 6. anno &c. Aristoteli 2. gen. an. 4. post ossa nascuntur, quare cum deciderint, oriri denuo posse, cum ossa tangerent, non continentur: & quidem ex alimento, quod in ossa administratur: beneficio enim caloris, qui in lacte est (ut habetur 5. gen. an. 8.) dentes primi oriuntur: siquidem infantes lactantes, qui calidiore lacte utuntur, ocyus dentiunt: calor enim vim augendi obtinet. Gale-nus ex alimento eos creari simpliciter scribit: Sunt qui dentes post alia ossa produci, & contra ossium morem toto vitæ curriculo augeripuerunt, quare ossium & dentium materiam longe diversam esse asserunt.

^b Incisores canini, ac tres molares, nimirum 2. 3. & 4. Eustach. & Semel aut bis in maxilla superiore quatuor tantum maxillares reperi, Fallop.

^d Homo dentibus carens, venit in lucem, nisi quid præter naturam intervenerit. 2. gen. an. 4.

^e In recens editis in lucem animalibus dentes intus in gingivis adhuc latitant, qua in abortus dissectione aperte perspicies, Gal. 2. de sem. 5. Col. Fall. Eustach. Laur. dentes in utero gigni diligenter perquisivi, quod de his plerique, ne verbum quidem, Col.

^f Folliculus albus subobscurus, potius mucosus ac tenax, quam membraneus, sicut lobus frugibus obducitur, Eustach. & Fallop.

Hi in gingivis latitant, ne papillam nutriceis, dum sugunt, perforent; at septimo
 h Hipp. de car-
 nibus post septi-
 mum mensem.
 & lib. de septi-
 mest. partu.
 i Qui cum tus-
 sicula dentium
 tardius dentes
 producunt.
 Hipp. de denti-
 tione.
 k 3. aphorif.
 25.
 l Statim cum
 natus est Ele-
 phas, dentes ha-
 bet, 2. hist. 5.
 m 2. gen. an. 4.
 n 15. us. par. 7.
 o Gal. lib. an.
 omnes partes
 simul fiant: at
 Eustach. cen-
 sos, non a quo
 necessarium,
 quia uterus ini-
 tio generatio-
 nis creatur, &
 ante dentes ab-
 solvitur, quam
 vis femina, eo
 posterius, quam
 dentibus indi-
 geat. P 5. gen. an. 8. contra Eustachius ait, non sequi, quia homo nihil prius illorum, quam horum opera egeat, vel u-
 tatur. Addit Aristoteles, rem minorem, si simul inchoetur, celerius perfici quam major: at priores minores esse maxil-
 larios. At Eustachius hoc negat, siquidem carpi tar sique ossa, qua minora sunt, absolutis jam humeri & femoris ossi-
 bus, adhuc cartilaginis naturam retinere.
 q Ubi ad annos primi alimentum pervenerint, quibusdam prius, si à morbido alimento nati fuerint: renascuntur autem
 ad decimum quartum, Hipp. de carnib. r Secundum Democritum vero, quoniam properant, & ante tempus oriun-
 tur, quod Arist. reprehendit, 5. gen. an. 8. t Sic & Fallop. t Ves. lib. 1. cap. 3. & 11 puerorum dentes imperfecti & mol-
 libus, & quasi medullis constant radicibus & eorundem parte extra gingivas conspicua, dentis radici appendicis moda-
 quansi committitur: quare septennies pueri vacillantes dentes, praesertim incisores, unguibus, aut filo denti circumdato-
 excimere consueverunt: quod acurate perpendendum, ne pueris reliquum effracti alicuius ex casu dentis portionem im-
 quam eruiamus, sed duntaxat appendicem, in cuius locum alia prompte succrescit, modo radix asservetur. Hae Vesal.
 idem Columb. qui addit, in radice etiam, veluti in semine quodam dentis regenerandi spem residere. Sic vero Varolius.
 Intra maxillas appendices quadam ossis, acutissimis mucronibus praedita, fabricata sunt: qua appendices ante perfe-
 ctum dentium ad gingivas propelluntur, quo ita ad cibaria atferenda utatur, & per multos menses & annos vices den-
 tium gerunt, qui ubi dentes ad complementum pervenerunt, à maxilla profluunt, & cum ambitu gingivarum non am-
 plius continentur per se ipsi decidunt: Eustachius, posteriores, ut arbitror, decepti, quasdam commentitias appendices
 excogitarunt. & Laurentius reprehendit. u Cels. lib. 3. cap. 1. Alexander Benedict Vesal. Columb. quia crederent den-
 te lacerato partem mollem cum pellicula in alveolo relictam esse.

qui circa septimum erumpunt, nullam esse conjunctionem, Anatome doceat; imo ne quidem seipso tangere posse, propter interstitium, quod inter ipsos medium est, quo perforato dens novus erumpit.

Alterum generationis dentium tempus est extra uterum, circa annum septimum, eorum, qui renasci creduntur: qui tamen eo tempore minime nascuntur, aut renascuntur proprie loquendo, sed cum primis dentibus in initio generationis ex eadem materia rudem quandam formam cum aliis acceperunt, alias enim nervos, vasa vincula internaque membranas, quæ spermaticæ partes sunt, & dentium constitutionem absolvent, eodem tempore contra naturæ legem extra uterum produci, concedendum foret. Verum hi dentes sero absolventur, & quemadmodum illi communiter septimo mense, ita hi septimo anno extra gingivas erumpunt.

Septenario enim annorum circulo inter alia multa, quæ animantibus accidunt, dentes pueris excidere, ac alios nasci Hippocrates * tradit. Nisi forte lubeat cum Fal-
 lopio pronuntiare, hos posteriores dentes post priores nasci, non quidem ex diversa materia, sed eadem, seminariis generationis in maxillis adhuc latitantibus; siquidem detracto & remoto interstitio tenuissimo, vix offeo, quod illos & hos dentes intercedit, incisivos & caninos illis minores observantur; primorum molarium vero & genuinorum: qui circa septimum annum & longe etiam postea oriuntur, nullum vestigium occurrit. ^z

*x Lib. de septi-
 mest. partu &
 lib. de carnib.
 pueri septem an-
 nis præteritis
 dentes expleant.
 y Seminariam
 facultatem, qua
 dentes fingit in
 maxillis ossibus
 ad extremum
 vita tempus re-
 servari recen-
 tiores Anato-
 mici asserunt,
 & Aristoteles
 innuere vide-
 tur, dum scri-
 bit, dentes id-
 circo regenera-
 ri posse: quia in
 osse adhuc cres-
 cente oriuntur.
 5 gen. an. 8. quo
 nam initio non
 oriuntur, sed ex
 alimento os-
 sum producun-
 tur 2. gen. an.
 4. hæc Eusia-
 chius facultas
 conformatrix*

Sunt autem dentes decem, qui in qualibet maxilla circa annum septimum prorumpunt, vel ut alii, renovantur: Incisores quatuor, Canini duo & maxillares quatuor: duo nimirum caninis proximi, & duo, qui genuini dicuntur. Verum ex his incisores erumpentes, primos extradunt, & inter duos primos secundumque & caninum sibi proximum, & propriis præsepaliis emergunt: quod si forte primores non excidant, vel non evellantur, vel si protrudantur antequam primi cadant, nihilominus posteriores per alveolos novos, in superiori quidem, ut plurimum extra, in inferiore intro erumpunt, ita ut novus dentium ordo videatur. Canini etiam excidunt, & succedentium sedes elata est, sub canini prioris extrema radice & aliquantulum obliqua. Quod enim dentes ^b circa quartum, quintum, sextum, & etiam septimum vacillent (qui postmodum vel excidunt, vel evellantur) causa est, quod alveoli continuo crescunt, & dentes adhuc molles sunt, qui ob durioris & idcirco inepti alimenti ad pulsus tabe quasi conficiuntur; qui vero post septimum erumpunt, non item. Ex maxillaribus ^c duo priores aliquando primores expellunt, si frequentius tamen ad latera exorti numerum augent: duo vero genuini, alios nunquam expellunt, cum etiam ^d in summa senectate in maxillarum extremis finibus prædeant, ita ut post octuagesimum annum, prædiisse non sine dolore Philosophus testis ^e sit, quod tamen rarius viris, quam mulieribus usquevenire scribit. Et hoc secundo loco genitos seu renovatos simul consensescere, divi-

Rer 3

*in dentibus nunquam otiosa est, cum horum figuram semper servet, nec in eo assiduo incremento finit incisivos mutari in caninos, aut hos in molares, Piccolb. 2. Verisimile tamen est, eos perinde ac secundos incisores, ac caninos, rude quidam initium ortus in utero sumere, & sensim postea formari, & absolvi, Eustachius.
 a Qui historicos sæpe & Anatomicos decepit, Fallop. b Et Laur. c Homini primores dentes mutantur, maxillares nullum animal mutat: suis nullum emmino dentem amittit. Aristo. 2. hist. 1. vide & 5. gen. an. 8. d Quarto septenario dentes enascuntur, plerisque hominibus duo, qui sapientia dentes appellantur. Hipp. de carnibus circa tertiam annorum septimanam, & alterius etiam usque ad decimam exoriuntur, Fallop. e 3. hist. 4. 5. gen. an. 8.*

f De carnibus. nirus Senex ^fvoluit, nisi morbo confecti, vel perforentur aut atterantur, aut macie imminuantur, aut laxati ante senectutem eruantur, vel sponte decident.

Modum generationis horum dentium Fallopius sic expressit: A facultate vivifica, spiritu agente os excavatur, folliculus membraneus simul gignitur, qui apicem geminum possidet, alterum posteriorem, cui nervulus, arteriola & venula applicantur: alterum vero priorem, à quo nervea veluti cauda pendet, quæ per ossis foramen angustissimum ad dentis illius latus, cui novus successurus est, usque ad gingivas egreditur. In folliculo dicto, materia quædam alba & tenax conrescit, & dentis pars prior ossæ redditur, posteriori adhuc molli existente; quod etiam iis, qui in utero geniti sunt, accidere diximus. Erumpit autem unusquisque dens per foramen id dilatatum, per quod folliculi cauda transmittebatur: folliculus mox distrumpitur (qui postmodum dentis vinculum, ut supra diximus, existit) dens nudus & durus prodit; verum & temporis successu in partibus exterioribus materia indurata perficitur.

2 Cicer. 2. de nat. Deor. dentib. in ore constructis manditur, extenuatur ac molitur cibis: eorum adversi acuti dividunt escas, intimi autem consciunt, qui genuini vocantur. Dentes aliis rem unam tantum expediunt cibi confectio: aliis non solum ad hoc usus sunt, sed etiam ad pugnandum, ut iis omnibus, quibus aut serrati, aut exerti sunt, 2. part. 9. vide 3. part. 1. aliis ad cibum, aliis ad

Uusus dentium primarius cibos ²dividere, frangere, comminuere, & ventriculo præparare. Alter vocis formationi inservire: ad literas ⁱenim exprimendas incisores dentes plurimum conferunt, quod in edentulis apparet, qui literas aliquas pronuntiare non possunt, ut R S X Z. Et homo solos incisores orationis gratia habuit, licet non facile prius loquatur, quam triplex genus dentium extra gingivas promineat. Infans ^kenim dum dentes non habet, vagit: dum vero duos vel quatuor dentes habuerit, mullat, dum os dentes repleverint, loquitur. Et quamvis incisores non parum usus ad loquendum linguæ præbeant, non tamen omnem verborum prolationem æque adjuvant, sed quandam claram & facilem reddunt: his enim amissis, sermo tardior ^lminusque facilis efficitur: aliorum vero, quæ ex T. & R. literis composita sunt, quasi organa sunt, & ad articulos eorum plurimum conferre, in balbis ^mexperimur: quorum lingua eas voces exquisitè dearticulare nequit, quæ per T. & R. proferuntur, ut traulus & trepidus, quæ linguam se ampliantem ⁿ& prioribus dentibus innitentem exigunt. Sunt, qui dentes etiam ⁿad ornatum, & ad garrulitatem ^ocompescendam homini datos esse putant. Natura enim oris pulchritudini & dentium saluti consulens, gingivis, ne horriduli essent, munivit: Labiis vero, tanquam clypeo texit, ut septi instar aeris frigidiore ingressum prohibeant, frangant & immutent.

At brutis, quæ cornibus, ut boves, & ungulis solidis, ut equi, se tueri possunt, solius cibi gratia dati sunt; iis quæ serratos & exertos dentes habent, & ad cibum comminuendum, & ad pugnam tributi sunt, pro armis ad vim faciendam & repellendam: homini vero manus datæ sunt, quibus se tueri possit.

De

nem, 5. gen. an. 8. Os & dentes cibum extenuant & molunt, in introduct. 11. cibum dividunt atque consciunt dentes, ne nihil ad vocis articulationem conferunt, lib. definition. Medicarum. Homo dentes habet ad solum esum idoneos 11. us. part. 2. quibus verbis humanis dentes armorum munere privare voluit, & communem usum cum Aristotele tribuere. h. Vide 3. facul. nat. 7. & lib. de Anat. vivorum. i. Arist. 3. part. 1. k. Gal. lib. de nat. & ord. cujus. corp. l. Amissio dentium incisiorum in causa est, ut manducatio, atque una sermonis explicatio ledatur, Gal. de diff. morb. 8. m. Gal. in com. 6. aph. 32. n. Turpe enim est, edentulum conspiciere, qualem Pherecratem Poetam fuisse tradunt, Laur. o. Homer. sensus.

De palato & gargarone.

CAPUT LXXXIII.

De Gargarone egit Aristoteles 1. hist. animal. 11. 2. part. 17. Galenus 11. usu part. 11. & lib. de voce
ipsomet artestante.

Palatum superior oris pars est, quare Græcis ὑπερώα^a, aliis ὑπερώς καὶ ὑπερίον[ⓐ] a Hipp. 6. epid.
^c, quasi oris cælum & Latinis palatum^d, quod dentibus ceu palis vallatum sit, di-
citur [tab. 28. fig. 4. *] Hoc à faucibus ad dentes usque extenditur, & in fornix mo-
dum convexum est, sed leviter, non vero supra modum, ut iis accidit, qui capite acu-
to sunt, quemadmodum Hippocrates^a annotavit: & est veluti cerebri basis osse
sphænoide, quod propterea Galenus^c τὸ κατὰ τὴν ὑπερώαν ὀστέον, aliquando appel-
lat, firmata.

Constat autem partim osse, partim carne glandosa: osse duro & denso, ne ab ex-
crementis delabentibus facile computrescat, quod ipsi in lue venerea^f accidit: hoc
os utrinque geminum est, siquidem ex maxillæ superioris osse quarto, cui dentes in-
figuntur, quod palati maximam regionem constituit, & osse sexto, quod ejusdem po-
sterio- em amplitudinem efformat, componitur [tab. 3. fig. 9. ΑΠ.] & per medium su-
tura dividitur [tab. 3. fig. 9. x. y.] in cujus extremo superne cavitates duæ sive foramina
duo inania, vomeris osse divisa conspiciuntur, per quæ cerebrum in os purgatur, ha-
bentur, sicque narium & palati maxima fit societas: quare per hæc ore clauso inspirare
& expirare licet, & viis narium obstructis, excrementa in ventriculis cerebri collecta
per os rejiciuntur. Verum posterior pars palati fere dimidia in fauces desinens, à latere
in latus tensa, carne glandulosa & satis crassa eaque rubicunda constat, & margines
processuum pterigoideum, qui ossis sphænoideis sunt cartilagine munitæ: & in cu-
jusque processu basi ad latus internum foramen ad aurem tendens conspicitur.

Membrana investitur crassa à dura matre pronata, quæ calvariam egressa amplifi-
catur, crassiorq; redditur, & universum palatum & os interne succingit, & cum gula &
ventriculo communis est: hinc palati & ventriculi consensus: palati enim tunica gu-
stum habere debuit, quo tanquam prægustatore ventriculo inserviat. Quare sensu
& exactiore prædita est, cum nervuli à quarto pari, quod etiam ad linguam distribui-
tur, ad ejus partem posteriorem mittantur. Hæc causa etiam est, cur caput masticato-
riis euacuare non possimus, quin simul & ventriculus per palatum evacuetur: expur-
gatur autem caput per palatum, qui ex capite venarum capillamenta descendunt,
quæ in palatum desinunt. Tunica hæc palati in quibusdam locis rugosa^h & aspera, corruptio glan-
dularum in
quo cibi rectius masticentur & quibusdam foraminulis pertusa ad humoris pituitosi
a centro descendens effluvium. Convexum est, ut aere reverberato, vox acutior
reddatur, & aer attractus tanquam in sinu tepefiat, ne frigidus membrana vitalia of-
fendat.

Garga- sensu exactio-
re indigebant.

Gal 16. us. part. 3. h Plinius crenas appellat; asperitatem scabrum Piccolh. Plinius scribit saporum intellectum esse
ceteris in prima lingua, homini & in palato.

^a Gargan gurgu-
lio, gargarion,
sibilus ac tin-
tinnabulum à
voce & sonitu,
Vesal. uva, u-
vula, columel-
la, & gargare-
on, Columb. co-
lumna, uvula
seu gurgulio,
Fallop. in Inf.
columella seu
gargareo, Plat.
Uvula, gurgu-
lio, plestrum
Laur. columel-
la Piccol.
b 2. de morb. in
prognost. ubi
curationem in-
flammat. ten-
tati & ipsius
precisionem do-
cet.
c 1. hist. 11. pe-
nitus veropar-
ticula alia & a-
phulphorion κίων
ἐπίφλεγμα,
uvigera, colu-
mella vene ap-
plicata.
d De tumori-
bus & 6. comp.
med. f. l. 11. us.

part. 17. Ruffo. & Aretaeo 1. de sign. acut. e Ut ex Aretaeo lib. 1. de caus. & sig. acutor. morb. 8. & lib. 1. cur. acut. 2. Aegineta lib. 6. cap. 31. Aetio terrab. 2. lib. 4. cap. 43. Erotiano in lexic. Hipp. colligere est. f πνεῦμα τὸ πρὸς τὴν γάρ-
λαστον τὴν τρυφήν ἐξ αὐτῆς ἀγεμεῖα, id est. At titillatione, quem asperae arteriae adfert, Erotianus. g αἰσθητικὸς ἐν τῇ
καρτερῶς Ruffo. h Natura sua nervus est, sed humidus, Aretaeus 1. fig. ac 8 fungosa & carnea, Ves. & Plat. glandosum
non autem carneum corpus, Fallopp. glandula, Varolio glandulosa caruncula, Piccolb. caruncula fungosa, Laur. carnum
potius crediderim, cum ab extremitate musculorum, qui ad id corpus feruntur, exurgat; magnitudine aequalis esse debet
epiglottidi, Rioli. i Columb. k Gal. 6. comp. med. f. l. 1 Sic ait Ves. & addit, nervus non admodum participare.
† Pteristaphylinus internus & externus, Rioli. †† author Anat. vivor. Galsmach appellat. m Confundunt au-
tēores haec tria nomina, γάρ-γαριον, κίων & σαφυλή γάρ-γαριον proprie quidem ipsam particulam significat, Hipp. 2. de
morb. Gal. 11. us. part. 11. attamen Hipp. lib. de affectibus ait, si σαφυλή, propendeat & suffocet, effectum hunc quidam
γάρ-γαριον vocant. κίων de ipsa particula dicitur, Arist. Gal. 11. us. part. 11. Ruffo Aretaeo Piccolb. dicitur tamen etiam
de particula aequaliter oblongata. Aretaeo lib. 1. fig. acutor. 8. σαφυλή dicitur quidem de morbo, Hipp. 3. pran. Arist. A-
retaeo 1. fig. acutor. 8. Aegineta l. 6. cap. 31. at Hipp. ipsam particulam sic appellasse videtur, in lib. de dentitione dum ait
infantes, quos inter sugendum tussis premit, ii σαφυλὴν majorem habent; & ibidem ait, serpentina circa σαφυλὴν ulcera.
Gal. 3. comp. med. f. l. Archigenem reprehendit, quod columella inflammationem cum vulgo σαφυλὴν vocet, cum tamen
lib. de Tumori. idem faciat: imo ipse Arist. 1. hist. 11. si columella immodice humefacta inflammetur, σαφυλή vocatur,
& suffocatur. n Dicitur & κίων; Aretaeo lib. 1. cur. acut. 8. Afluar. 2. dign. affect. 18. o Aretaeus lib. 1. fig. acut. 8.

Gargareon^a seu Curgulio, γάρ-γαριον Hippocrati^b, κίων Aristoteli^c, veteribus Me-
dicis κίων καὶ γάρ-γαριον, Galeno^d monente dicitur; propria tamen hujus partis ap-
pellatio est γάρ-γαριον; κίων vero columna, & σαφυλή uvula, ipsius male affecti^e no-
mina sunt. Nomen effectum videtur à sono, qui gargarizatu editur, aut à gargarismis,
qui in ejus affectibus usurpantur; ubi & titillatio^f quaedam fit, quae γάρ-γαλ & γάρ-
γλην dicitur. Particula oris est, seu processus quidam [tab. 28. fig. 4. E.] à palati parte
penitior, juxta narium meatus in fauces spectantes; in oris amplitudinem inter a-
mygdalas [FF.] supra laryngis rimam [infra E.] è directo propendens, quemadmo-
dum ore toto aperto linguaue depressa conspicitur.

Substantia est glandosa^h, rubra, fungosa, quae ex glandosa palati fere media
parte propendet, nonnullisⁱ ex palati tunica ad oris extremitatem reduplicata, & ali-
quantulum oblongata enascitur: ex rotunditate longiuscula, crassiuscula superne,
ubi palato continuatur lata; inferius^j pyramidis inversae instar obtuse^k acuta (quare
fundibulum^l nonnulli vocant) quae pellicula quadam laxa ac mollissima vestitur, &
venulas, à venis palati tunicam nutrientibus in ipsius medium recipit.

Sunt qui musculos duos[†] ei adscribant, ad suspensionem levemque motum:
quorum alter externus, à maxilla superiore infra ultimum dentem molarem prodeat
& in tendinem gracilem desinat, qui per rimam in suprema pterigoidis sede exscul-
ptam transiens, veluti per trochleam reflexus, ad latera Gargareonis inferitur. Alter
internus, ab inferiore parte alae internae pterigoidis prodiens (cujus origini cartilago
mobilis dicata) & secundum longitudinem alae internae pterigoidis ascendens in
Gargareonem desinit. Præterea gurguleonis[†] ateriibus ligamenta lata^{††} alis expansis
similia accumbunt, quae cum connectant.

Quod si morbo afficiatur ab humoribus delabentibus, non amplius γάρ-γαριον,
sed κίων & κίων; & σαφυλή & ἰμάς & ἰμάντων appellatur: nam si aequaliter à basi ad
extremum crassescat, & in longitudinem protendatur & rubeat κίων, columna dici-
tur: si vero superior tenuis gracilisque reddatur & inferior tantum rotunda evadat
& cum magnitudine liveat & subnigricet, σαφυλή^o, uva nominatur, quia ei figura
(superiore parte pediculum referente) colore & magnitudine similis est: dicitur &
κίων;

κίονι: hinc, qui gargareonis vitio laborant, κίονιγί à Galeno ^p nominantur. Et Hippocrates * non tantum gurgulionis relaxationem, verum etiam contractionem notavit: cuius relaxatio tollitur quando pipere & sale tangitur, & quia tunc subito contrahitur, hinc aliqui ejus motum probare conantur. Quare Galenus ^q eos reprehendit, qui γάργαραν ^q nomine σαφύλης, Atticos imitati, donant.

Ufus ipsius est, aeris ^r inspirati frigiditatem temperare, ne subito in pulmones irruat, & sic ^f sanguis frigidi inspiratu, densetur, crassescat, pulmones ad motum tardiores efficiantur: sicque ex valido conatu ^f ad motum, vasa disrumpantur, tabesque sequatur: nam plerumque pulmone refrigerato, aut acrioribus fluxionibus exulcerato, quibus postea obnoxii sunt, tabe consumuntur. Idcirco Galenus monet, gargareonem non temere abscindendum, ** sed basis partem aliquam relinquentem esse. Dein ad ^r vocis modulationem, cum soli ^u homines & pauca quadam aves obtinuerint; quare ^u πλῆκτρον ^x, plectrum vocis dicitur. Hoc enim dum ad palati cavum pendet, inter laryngem & narium cavitatem, aeris percussio fit. Hinc ad pronunciationem non parum ^y conferre asserunt, & exemplis ^y eorum, quibus lues venerea exedit, vel quibus praefectum est, qui rauci admodum fiunt, probare nituntur. Verum exemplum habemus cujusdam mercatoris, cui ab aliquot annis gargareon ab acrium humorum de fluxu absumptus est, qui tamen nullum detrimentum persensit; sed corpus tabidum redditum. Quare in iis, in quibus ex lue venerea vox depravatur, ulcera non solum gargareonem, sed magnam ^z etiam illius glandosi corporis (quod inter os palati ejusque tunicam positum est & palati extremum complete diximus) partem exedit; aut ubi palati os & membrana fuerint perforata. Tertius usus ^a ad aeris expurgationem non nihil conducere; pulverem enim qui alioqui cum aere in laryngem deferretur ^b, sibi applicat. Quare liquidorum dum deglutiuntur refluxum in nares impedit: quod saepe in puerulis lactantibus observatum, qui cum eo carerent, lactare non potuere, lacte quod exugebant, ad nares remeante.

S f f

De imitatus Alex-

andrum Aphrodisium, refert cantoribus gargareonem extirpari, ut vocem crassiores edant Respondent, amputato gargareone vocem ladi in duratione & modulatione, non in altitudine & clangosa soni vehementia, qua potius augeatur: quod si alta & clangosa vox fuerit, non erit magna, ut voluit Aphrod. nec crassa, ut placuit Florentino.

^r Voci ad magnitudinem & elegantiam confert, Gal. qui pro primo usu recenset; sic & Vesal. 2. usus Columb. vocem modulatur, Plat. voci ad suavitatem & modulationem veluti plectrum confert, Piccolb. ^u Solius hominis propria Gorgaeo. ^x Aliquod vocis plectrum subinde de stillationem à capite recipit, Aegines. lib. 6. cap. 31. ^y Columb. asserit: & quibus exesa crocitare potius, quam humano more loqui: hac reprehendit Fallop. siquidem plurima habeat exempla, eorum quibus gurgulio exesus est, nullum tamen vocis detrimentum ipsis supervenisse. ^z Sic & Fallop.

^a Tertius usus Gal. 11. us par. 11. Vesal. & Columb. qui usus parvi faciendus, cum cetera animalia ad terram magis spirantia, quam homo, gargareone destituantur, Vesal. ^b Humiditatem quoque à cerebro precipitantem desinet, & partes illas, quarum motus pene perpetuus est, humectat, Columb. cui primus usus est: gurgulio pendens supra epiglottida ac laryngem mediam, aliquid quod limpidissimum sit semper instillans humectat, talis est huius usus, non ille, quem ad temperandum aerem, aut commodandam vocem adscribunt; hac Fallop. qua ratione receptaculum sit excrementorum à cerebro descendendum, cum nullam cavitatem nanciscatur, imo quoties imbuitur, laxatur, propender, aut alio vitio conflatur, Vesal. Uvula excrementum cerebri per infundibulum ad conarium delatum excipit, ad palatum linguam & alia vocis instrumenta humectanda dispergit, quod superabundat, spuito ac screatu ejicitur: quemadmodum enim in fistulis artificialibus commode sonus non fit, nisi aliqua ratione irrorentur: idcirco uvula humidum cerebri ad palatum destillans supra laryngis rimam è directo locata est, ut guttur & aspera arteria leviter humectentur, Varolius.

^p 3. Euporist.
^q 3. epid. sect. 2.
Euryne filia
ab initio mor-
bi, fauces dole-
bant, cum ru-
bore & garga-
lio retractsus est.
^q 6. compos.
mod. s. l. 3.

^r Secundus u-
sus Gal. & Ves-
al. hunc unicum
usum ponit
Laur.

^f Aphrodisium
in Problem.

^{**} Rufus E-
phesus hanc
partem velut
inutilem negle-
xit, eaque refe-
cit nullam cor-
poris actionem
vitiari. Fall. p.

ejus erosionem
vel amputatio-
ne vocem de-
pravari negat:
imo Nicolau
Florentinus

E T si Faucium nomen ^a quandoque totam capacitatem, quæ hiant ore percipitur, denotet: communiter tamen oris posteriorem & inferiorem ^b partem seu spatium ubi lingua & asperæ arteriæ ^c extrema cōcurrunt, quod duobus canalibus interiectum & in brutis magis quam homine ore aperto & lingua depressa conspicitur, significat [t. 28. f. 4. inter F. & L.] Græcis Φάρυξ ^d & Φάρυγξ ^e & Φάρυγξ ^f sed porro dicitur. Quamvis Φάρυξ varia significet & s fauces & laryngem ^h propter partium vicinitatem, & quidem vel asperæ arteriæ caput tantum, aut ipsam quoque arteriam: quidam pharyngem pro corpore membranoso hunc locum ambiente accipiunt, quod œsophagi principium est. Sic apud Aristotelem ⁱ collum seu potius gula sic appellatur: optavit, inquit, quidam Philoxenus Erixius, quod heluo esset, pharyngem sibi esse grue majorem. Aliis glandulosa corpora omnia circa fauces notat: ubi vero apud Hippocratem simpliciter Φάρυγξ positum est, faucium affectus significat, ut eorum ^k asperitatem, vel ^l inflammationem. Dicitur quoque locus hic ^m Galeno & Ισχυρον ⁿ Hippocrati propter loci angustiam per metaphoram: siquidem isthmus ^o proprie terræ angustum tractum inter duo maria significat; cum in corpore universo nulla regio sit æque angusta, & interim tor instrumenta contineat. Nam in faucibus considerantur narium foramina per palatum in os descendentia [tab. 28. fig. 4. post E.] de quibus in nasi historia; faucium musculi, os hyoidei linguae radicis subjectum, lingua, larynx cum epiglottide & œsophagi principium, ac illarum partium musculi, & nonnulli maxillæ inferioris: nervorum tertii, sexti & septimi paris propagines: venæ jugulares, arteriæ carotides, & glandulæ, de quibus nunc.

^a Uni-versum spatium ab inferiore maxilla intus circumscriptum, Ves. Laur. forte ex Galeno, qui de diss. muscul. 15. corpus isthmum ambiens, pharynga nuncupari tradit. ^b Gal. com. 3. in Progn. & 4. aph. 34. ^c 4. loc. affect. ^d Hipp. 4. aph. 34. 2. Progn. ^e 4. epid. part. 3. lib. de flatibus Aristoteli 1. hist. 11. oris partes τὸ πρὸ τῆς γλῶττις τὸ ἴσχυρον τὸ ἴσχυρον τὸ ἴσχυρον Gal. in com. & Homero. ^f Hipp. de resect. corp. Ruffo lib. 1. f. Galen. in Usag. aut Medico, etsi alias os hyoidei sic dici scribat. At Helychius & Farino Φάρυγξ & porro. ^g In conc. aph. 276. & Prog. fauces ulcerata cum febre &c. at precedent. aph. collum intelligere videtur per fauces graciles. ^h Hipp. de corde bibit & in guttur: & lib. de ossium nas. porus per fauces & gulam. Gal 2. plac. & 8. ut part. sic & Praxagora, ut Homeri Scholiastes testatur. Suidas (& Grammatici) masculini generis vocem, laryngi accommodat, samini vero faucibus, sed parum hac curanda, cum Aristoteles mascul. genere pro Oesophago posuerit, ubi Athenæus samini utitur, in Philoxeni Pharyngo. ⁱ 28. probl. 7. 3. Ethic. Eudem. 2. & 3. Nicomach. 13. Athenæus lib. 1. at Oribas. vult apud Hippocratem 2. aph. 15. labia, palatum & uvam significare. ^k 3. aph. 5. ut Galenus explicat. ^l 6. epid. sect. 7. aph. 1. m de muscul. diss. 15. hac regio, quia angusta & oblonga est, isthmum appellant, corpus vero totum ambiens pharynx nuncupatur: nonnunquam tamen partem inter os & gulam mediam sic appellat, ut 3. aph. 26. ⁿ Hipp. de dentitione, ulcera cō iō ptois periculi plena. ^o 3. aph. 26. Gal.

Glandulæ plures in collo continentur, & primo occurrunt foris sub aurium ^a radice Parotides dictæ, cum aliis sub maxilla inferiore collocatis, quæ cerebri excrementa suscipiunt: de quibus post aurium tractationem egimus. Dein in colli lateribus, secundum venæ jugularis internæ ductum, glandulæ exiguæ huc & illuc dispositæ sunt, in quas etiam cerebrum sese exonerat, quæ in pueris tumefactæ, capitis plenitudinem indicant. Intrinsecus vero duæ sunt ^b superioris ad linguæ radicem, Tonsillæ dictæ, quin etiam plurimæ sub lingua, circa ejus frenum occurrunt, de quibus nunc; duæ aliæ ^c inferiores ad laryngem: ejus cartilagini thyroïdi incumbentes, de quibus in laryngis historia: duo etiam circa œsophagi principium (de quibus in œsophagi descriptione reperiuntur.

Tonsillæ [tab. 28 f. 4. F.] quæ à Celso ^d simpliciter glandulæ appellantur: sunt glandulæ in utroque oris latere, ad linguæ radicem inter narium foramina & laryngem, seu inter œsophagi & asperæ arteriæ principium: utrinque ^e una, utcunque insignis, oblonga, amygdalis assimilata: quare Latinobarbaris, & à nostratibus Amygdalæ dicuntur. Græcis *περίθμια* ^e, aliis *ωρὴ τῶ ωρὴν ἐπὶ τῶ ἰσθμῷ*, quod in isthmo ^f sitæ fauce quoque, Cœsunt. aliis, quod gargareonis latera respiciat: si enim oris aperti cavitatem inspicias, & narium foramina & gargareonem intuearis, foramina veluti duo maria, ipse gargareon veluti angustus tractus inter illa deductus apparebit: quo nomine & pars faucium & ejusdem inflammatio, imo & glandularum & earum affectus significatur, ubi vel inflammantur, vel supra naturalem modum augentur & veluti resiccantur, ubi & fessoribus depotus & spiritus iter, ut Paulus ^h loquitur impediunt. Interdum tamen *περίθμια* ⁱ nomine ⁱ solius tunicæ, quæ faucibus, toti ori & ventriculo communis est; interdum musculorum ^j tunicæ subjectorum, interdum ^k corporum, quæ in faucibus sunt, inflammationem significatur. Dicuntur etiam ^l *ἀντιάδες*, *ὅτι τὸ ἀντικείμενον ἀπὸ τοῦ στόματος*, quod ^m regione sibi invicem opponantur, quod præsertim tum cum inflammata sunt apparent, verum & hoc nomen, non solum glandulis, sed etiam earum morbo ⁿ tribuitur: nonnulli tamen inter *ἀντιάδες* & *περίθμια* distinguunt; volentes proprie *ἀντιάδες* inflammationem ipsarum tonsillarum, *περίθμια* vero inflammationem partium ^o tonsillis circumjectarum esse. Denique ab usu, qui est os saliva perfundere *σάλωχοι* ^p dicuntur. Et si quis accurate glandulas hæc inspexerit, unamquamque in duas dirimi posse deprehendet.

Sff 2

In.

utraq; lingua parte affixa sunt paristhmia, numero sex, corpora glandulosa, figura subrotunda, natura facile mutabilia, atque dissipabilia. membranulis quibusdam altius insertis convoluta: ex his quatuor, ab utroque latere cernuntur, duo vero vix spectari queunt. c Hipp. de dentitione: bifida oris compago *περίθμια*, Arist. 1. hist. 11. f Si ad loci angustiam & instrumentorum hac sede frequentiam respicias, glandes asperæ arteriæ adnata, cum in majoribus angustius reponantur, quam hæc tonsillæ dictæ potius *περίθμια* vocitanda fuerint, Vesal. g 3. apb. 26. h lib. 10. c. 30. i Gal. in com. 3. apb. 16. k Gal. lib. de Tumorib. l Hipp. 2. de morbis sic ait: si antiades oriantur, sub maxillis ab utraque parte tumor fit, qui ad contrarium foris durus est, & totus gargareon inflammatione laborat: cum sic habuerit, digito immis-

^a Tertium genus glandularum in faucibus, cui aliqui duo genera ignorant, & tonsillarum & amygdalarum nomina tribuisse videntur, Vesal.

^b Secundum genus quod nunc oscitanter alii enarrant, Vesal. dicuntur paristhmia, tonsillæ, amygdalæ, & lumb.

^c Primum genus glandularum quod ab Anatomes præscriptum fuisse hæcenus non observari, Vesal.

^d lib. 2. cap. 1. 3. apb. 26.

^e Gal. in 1. sag.

^f glandulas duas

^g ad radicem lin-

^h gue, & duas ad

ⁱ laryngem sic

^j & nomine di-

^k stinxit. At

^l Ruffo Ephes. l.

^m 2. c. 8. in peni-

ⁿ tioribus ab u-

misso antiades protrudisse profuerit, &c. in Celsus antidotes, consillas quæ post inflammationes induere à Græci vocari scribit.

nEt Columb.
qui addit hanc
tunicā à dura
matre pronatam,
nares intus,
palatum & linguam
circumdare & duplicatam,
uvulam constitueret,
eam descendere,
œsophagi, ventriculi & intestinorum
internam tunicam
constituere, & post
linguam delatam,
epiglottida, laryngem,
asperam arteriam
ad extremos ramos
per pulmonem delatos
ambire.
o 4. epid. par. 3.
& Gal. in exegesi
scribit: αὐτοὶ οἱ νεκροὶ
τῶν φέροντων
ἀδένες, in 4. Epidem.
p Hipp. de glandis
dicuntur glandula
colli, quæ fluxionem à ca-
pite decumbentem
recipiunt: usui
fauces humectare, ait
Col.
q. 11. u. s. part.
10.

Integuntur tunicæ oris communi, quæ nervosa est, variisque in locis foraminibus satis amplis perforata, ita ut à nonnullis fungosa dicatur: quæ, ut recte Fallopius monet, si glandulæ aliquando modè intumeant, Chirurgis imponere solent, ita ut ulcera esse credant, & partem ipsam tanquam ulceratam curant, cum tamen revera ulcera non sint, siquidem glandularum tumore residente secundum naturam penitus se habeant. Venulas etiam à jugularibus recipere.

Substantia quidem sunt glandulis simili, sed rariore, magis spongiosa & valde fungosa, quare Hippocrati ὀσφύοι, spongiæ dicuntur (quæ tamen voce etiam earum tumores expressit) eo quod spongiarum more humorem combibant.

Ufus harum est humiditatem cerebri suscipere, in salivam convertere. Est autem Saliva, quæ σελ. Hippocrati, & πύελ. Aristoteli quæ nec qualitate nec quantitate materiæ excedit, pituita naturalis excrementitia, sed utilis, quam glandulæ ad radicem linguæ utrinque sitæ, Tonsillæ dictæ, perpetuo effundunt, ut os totum humectet. Hæc si secundum naturam se habeat, hoc est, si nec fluida valde & aquosa sit, (quæ πύελισμον ἢ σελυσμόν, id est copiosam salivæ rejectionem causare solet) nec nimium lenta ac sicca, nec aliena qualitate prædita, similis est, ejusque qualitas naturalis eadem est cum aqua, quæ ἁπλοῖ est: cum ea quæ aliena est, acris sit acida & salsa, ab humoris alieni admixtione proveniens, & naturalis differt ab ea quæ vel secreta, vel vomitu, vel emunctione quotidie educitur, cum spiritu vaporoso plena sit, dissimilis sit, ita ut ne sensum quidem latere possit.

Hæc Galeno nihil aliud est, quam alimenti illarum partium residuum, aut linguæ à qua simile producitur. Hoc enim commune est omnibus partibus, quæ vel aliis partibus humores utiles, vel ad generis propagationem, vel conceptus nutritioni accommodatos conficiendi vim habent, ut talis humor sit alimenti partis ipsum generantis residuum, quales in ossium cavernulis & in unitatibus reliquis: in jecore, sanguis: in pulmonis carne humidas spumosa. Sic etiam lingua & tonsillæ, & oris partes, constitutionem fungosam & albam habentes, cum id quod affluit vim sibi assimilandi sortitæ sint, humorem familiarem & proprium talem efficiunt, qualis saliva ex naturæ præscripto est: cui tamen aliquid humoris supervacui, qui à cerebro in palatum stillare solet, admiscetur.

Hujus usus est, tum ut fauces & lingua & palatum & larynx perpetuo madescant, quo vox deglutitio & respiratio recte perficiantur: tum ut ejus perfusione, ciborum in ore præparatio & quasi prima coctio exactius conficiatur. Siquidem gustatio sine calore non perficiatur (ut neque coctio in ventriculo sine elixatione) quod ii, qui linguam aridam siccamque habent, experiuntur.

De

6. epid. sect. 5. aph. 3. 1. 9. hist. 29. 1. Rond. 2. morb. 7. 1. Hipp. victu acut. Actius.

*Quartum par lingua, quod aequae inter faucium musculos ac inter linguam motores enumerare possumus, Fallop. quartum par lingua Fallopii, commune faucibus cum lingua, Plat. At Laur. quartum par addit, quod fere omnes laryngis esse putant, & communem vocant, qui a cartilagine thyroideae lateribus exortum Oesophagum fibris circularibus & transversis amplexatur, & ita deglutioni inservit: hac ille. * Hujus affectus meminere Aet. l. 6. c. 33. Halyabbas, thes. c. 24. hunc affectum se vidisse Zerbis in sua anat. cap. de gala restatur: item Thom. à Vega com. in Gal. de loc. aff.*

Quartum^e par (Scylopharyngæum appellare liceret) à styloidis appendicis facie interna gracile admodum exoritur, ad anteriora declinat, & teq. dine membraneo laryngis cartilagini primæ, hyocidæ ossis lateribus & linguæ extremo inseritur; quare faucibus & linguæ par commune dici posset; siquidem linguam & partes dictas retrorsum ac sursum attrahat, & fauces deglutiendo constringat. Hæc duo paria fauces constringunt, & guttur propter deglutionem sublevant. Et sane his musculis refo-

lutis, plures subito interiere * aliis facultatibus integris. Oesophagios his jungimus [tab. 32. fig. 7. ll.] qui toti carnei & ampli oesophagi parti superiori & posticæ incumbentes, orbiculatim sphincteris modo cingunt, qui a thyroideae cartilaginis laryngis latere uno enatu in alterum latus implantatur, & sphincteris modo oesophagi principium constringendo, voluntariam deglutionem adjuvant. Hos plenius inter laryngis musculos, sub communium tertio pari (communem sententiam secuti) descripsimus: quamvis oesophagi potius quam laryngis, ei per accidens famulando esse censeamus.

De Osse Hyoide, seu osse gutturis.

CAPUT LXXXVII.

a Galenus for. De hoc Galenus egit lib. de dissect. muscul. 13. de diff. nervor. 10. 7. us. part. 19. at lib. de ossib. a in fine re ejus descriptionem parum necessariam ar-

buriatus est: Col. non descripta, quia sceleris historiæ proposuit: hujus autem nulla enim aliis ossibus articulatione est: quare in sceleris non demonstratur. b Dissect. muscul.

OS, quod à similitudine, quam cum ^b & A literis Græcis, cum subvertitur, obtinet, ὡς ἡ οὐδὲς, & succinctius ὡς οὐδὲς ^c & λαμβδοειδὲς ^d dicitur [t. 2. f. 4. & 5.] Os est in faucibus sub maxilla inferiore collocatum & laryngis ^e parti eminētissimæ propositum: quare & os gutturis ^f dicitur, & linguæ basi fundamenti vice subiectum quod secundum colli longitudinem recta extenditur, & longe aliter in homine, quam in brutis extructum est.

Figura rectius ^h quam A refert, cum sinu, non angulo acuto terminetur, ita ut maxillæ inferioris imagini ^b comparari possit, cum non modo in arcum curvetur, sed etiam in processum duos definat. Figuram autem talem ⁱ obtinuit, quo spiritu & alimentis liber transitus relinquatur, cum faucibus & laryngi præponatur.

Hoc

13.

c 7. us. part. 19.

hac voce dissectionum rudes delusi, os suum referens, verterunt, Vesal. d Lambdoeides & hyoideides, diff. nervor. 10. Interpretes Galeni etiam decepti suturam capitis A litera similem vertere consueverunt, Vesal. os lambdoeides, Oribasio 25. Col. lect. 8. & hyoideides, cap. 36. os v referens, Vesal. os hyoideides, Columb. Fallop. Plat. Piccolh. Laur. os Ioida, Varolio, os gutturis, Ingrass.

e Oscapiti gutturis incumbens, diff. muscul. 13. quare Herophylus πνευματοειδὲς, intellige, στυλοειδὲς appellabat; Gal. Vesal. Gorrha. Ingrass. forte quod lingua, laryngi aut faucibus assistat. f Οὐδὲς, os gutturis, Galeno, quod sit portio maxima pharyngis, Vesal. Gorrh. Laur. & lib. de ossib. Gal. ὡς ἔν ἐν λαμβδοειδὲς. g Vesal. Gorrh. h Sic & Columb. i Columb. & Laur.

Hoc licet unitatis nomine exprimat^r, ^k unicum & simplex non est, sed ex ossibus ^k Piccol. qu^d aliquot componitur, quorum minimus ^l numerus trium est; maximus tredecim, non descripsi^r, magna tamen ex parte ex undecim in viris ætate provectioribus constat: at in mu- in ossium ta-
lieribus gracilius, tenuius & ex paucioribus ossiculis constat, quorum vicem ligamen- men catalogo
ta suspensoria productiora supplēt: etenim aliquando à basi ossis unum solum utrin- pro uno recen-
que processum deprehendimus, quæ laxo connexu cartilagine interveniente, quo ^l Sic & Ingras-
in motu cedere possint, inter se junguntur. Extrema autem, aliorum ossium extrema ^l fias.
non tangunt: quare recte Aristoteles, ⁿ ossa omnia aut continua, aut contigua esse ^m Ex quinque
voluit: hoc autem os, quod pensile est, & ab aliis separatim cum vicinis partibus al- ossibus, Vesal.
ligari debuit: alias enim huic tanquam basi lingua hære non posset: quare muscu- & Col. variis
lorum & ligamentorum opera continuitatem habet: siquidem maxillæ ^o inferiori ossiculis, Plat.
circa mentum, sterno, scapulis, occipitis appendici styloidi continuatur, & quidem ^l multi particu-
per eam ^o *συνφύσεις* speciem, quam Galenus *συνάφισιν* vocat. ^l *Laur. ex un-*
Verum, ut idem [†] monet non solum syllarcofi vultur, sed etiam syneurosi ne mu- ^l *decim ossiculis*
sculo uno resoluta musculorum æqualitas dissolvatur, sicque os vel ad alterum latus ^l *in viris, non-*
contorqueatur, vel deorsum prolatur, magno & vocis & deglutitionis incommo- ^l *nunquam ex*
do: idcirco per ligamenta quatuor & appendici styloidi & laryngis cartilagini thyroi- ^l *13. aliquando*
di connectitur. ^l *ex 9. aut 7. vet*
^l *etiam pauciori-*
^l *bus, præsertim*
^l *in pueris & ma-*
^l *xime semellis.*
^l *Ingras.*

Inter quæ ossi alium primum, quod medium existit, cæteris majus & latius ^p & cæterorum basis quædam [tab. 29. fig. 4. ABCD] quibusdam basis linguae dicitur, quia hujus basis lateri superno lingua immittitur, hyoidis cavitate solum epiglottidem ex- ⁿ 3. hist. an. 7.
cipiente, anteriore & exteriore sede, qua os respicit, convexum, & in obtusum angu- ^o Gal. diff.
lum desinit (quod supra laryngem tactu deprehenditur, ipsius processibus penitus la- ^l *musc. 13. 7. us-*
tantibus) partim, quo ab injuriis extrinsecis securius sit; partim, ut musculi aliqui ^l *par. 19. & V-*
implantentur: interiore seu posteriore sede, qua fauces spectat, cavum [fig. 4. D. 5. P.] [†] 7. us. part. 19.
propter duorum musculorum linguae exortum, & ut ^q epiglottidi se aperiendi & at- ^l *Leniter la-*
tollenti cedat. ^l *ram, dissect.*
^l *musc. 13.*

Sinus tres obrinuit, superne quidem sinum transversim depressum [C] quo se- ^q Posterior in-
cundum par musculorum sibi peculiare admittat, in medio extuberat [*] in ejus la- ^l *feriorque ossicu-*
teribus dextro, scilicet & sinistro, alii duo sinus existunt, quo ad ejus latera, primum ^l *li porrio caru-*
par musculorum implantetur. ^l *in sinum*

Processus ^t habet utrinque binos à basi eductos [EFIK.] cornua seu costas ^t voca- ^l *adducta, ut ce-*
tos, quibus ossibus vicinis jungitur. Duo inferiores ^t qui secundum & tertium os cõ- ^l *deret aperiendi*
stituant [EF.] utrinque unico osse constant, & superioribus breviores & latiores sunt ^l *ac sese attollen-*
& ipsius ossis primi seu medii lateribus humilior [tab. 24. fig. 4. G.] cartilaginis & liga- ^l *ti lingua, Co-*
menti cartilaginei satis lati interveni, valide nectuntur: at extremis suis [HH] cum ^l *lum.*
ipsis nullum aliud os nectatur, cum processibus ^u cartilaginis scutiformis laryngis ^l *Est autem re-*
[†. 33. f. 2. & 3. IK.] copulantur: & hi processus cum ossiculo medio imaginem ^u refe- ^l *cta hujus ossis*
runt. ^l *linea, secun-*
^l *dum colli lon-*
^l *gitudinem exte-*
^l *sa, os leniter la-*

Verum

tum, quatuor vero reliquæ lineæ obliquæ sunt & à prædicto osse lato secundum duas conjugationes exoriantur, de diff. ^l *musc. 13. latera vocat*
musc. 13. latera vocat Avicennas & Vesal. alterum humilior, alterum superius: processus elatior & humilior, Plat. ad- ^l *documenta, Fall. processus quatuor cornua vocat Laur. l Gal. diff. musc. 13. t Ab inferioribus altera conjugatio, qua*
mediocriter latorum ossium est, Gal. l. c. u Alii processus non sunt ita prolixi, ut alii, & per hos processus, os hyoides pro- ^l *cessus stylum referenti insigni ligamento connectitur, Col. cum aryanoide cartilagine duo vincula valide copulant, Gal.*
diff. musc. 13. at cæteri Anatomici cartilagini scutiformi jungunt.

Verum cum hoc os veluti penſile exiſtat, ſatis roboris habiturum non erat, ſi tantum cum laryngis cartilagine jungeretur: quare duos adhuc alios proceſſus addidit, quo ſtyloidi* appendici, quæ temporum oſſi affigitur, connectatur & firmetur, quo in medio facile conſiſtat. Quare duo ꝑ proceſſus ſuperiores, qui quartum & quintum os conſtituunt [IK.] graciliores veluti ſtyloidis extrema teretes ² longiſſimi ad laus primi ſeu medii oſſis ſede elatiore committuntur, quibus ſæpe utrinque tria oſſicula addi ſolent, quæ 6. 7. 8. 9. 10. & 11. oſſiculum conſtituunt, & ligamenti teretibus ac tenuibus ſtyloidis appendicis extremitatibus alligantur. [tab. 2. fig. 6. & 7. i.] & quemadmodum duo inferiores proceſſus, ſeu ſecundum & tertium os cum primo literam ꝑ referebant; ſic & hi duo proceſſus ſuperiores, ſive cum primo quartum & quintum, alique utrinque aliud ꝑ efformant, ita ut duplex litera ꝑ figura ex huiusmodi oſſibus reſultet.

x Columb.
vult à prædictis
proceſſibus non
ab his fieri.

y A ſuperiori-
bus partibus
altera oſſium
conjugatio qua
tenuium ac
graciliu eſt,
veluti ſtyloidis

extrema & pro-
ceſſuum ſtyloi-
dis extremis
junguntur, diſſi-
muſcul. 13. ſu-
periora oſſicu-
la ſeu latera,
Veſal. duo pro-
ceſſus, qui ex-
tremas appen-
dices habent,
qui cum ſupe-
rioribus laryn-
gis lateribus
ſua ligamentis
neſtuntur, Co-
lumb.

z Ex oſſiculis
ternis, aut qua-
ternis invicem
junctis compo-
ſiti, Veſal. Plat.
Laur. addita-
menta ſuperio-
ra, quibus cum
proceſſu ſtyloide
junguntur, qua
nunc tribus

nunc quatuor oſſiculis, & quaſi intermediis conſtare dicunt, quorum utrumque nunquam videre poſui, ſed ſere ſemper
reperi unico oſſe brevi ac gracili conſtare, quod ad ſtyloidem proceſſum nequaquam pertingeret, ſed per ligamentum ner-
veum ſatu longum admittebatur, Fallop.

a Ex quinque oſſibus conſtruitur, aliquando tamen proceſſibus privatum invenitur, nunc vero altero tantum, quo-
rum locum ligamenta ſubeunt, à mediis oſſiculis ſinib. ad proceſſus ſtyliſiformes, Col. ſæpe. & ſæpius etiam reperi corpora mol-
lia, qualia ſunt ſæminarum, os hyoides habere ſine additamentis ſuperioribus &c. Fallop. b Sic & Ingraſſ.

c Veſal. Fallop. Plat. Ingraſſ. de ſunt hæc aliquando, tum eorum vicem gerit vinculum validiſſ. Laur.

d A ſtyloide oſſe exordiens in primi oſſis ſuperius latus inferitur, ut os vides in ſuperiore parte firmaret, Ingraſſ.

e 7 uſ. part. 11. f Lingua peculiare os, illique uni deſeruit, Columb. in gratiam extollende laryngis factum, proceſſibus
ſtyloidis calvaria connexum, ut lingua radix innitatur, & guttur muſculis alligatur, quibus contraſtus ſurſum extolli-
tur & remiſſis deorſum deſcendit, Varolius, ſolius lingua & laryngis gratia conſtructum, Laur. g Anguilla & mure-
na in medium, Laur. h 1. & 2. par. Veſal. & Ingraſſ.

Aliquando proceſſus ſuperior utrinque unico oſſe & ſatis brevi ac gracili conſtat, & per ligamentum nerveum ſatis longum ſtyloidi proceſſui adneſcit. Aliquando ꝑ proceſſibus inferioribus tantum donatur, & ſuperiora oſſa quartum ^b & quintum cum aliis ad undecimum uſque annexis, præſertim in ^c mulieribus deſunt (quemadmodum figura quinta, tab. 28. expreſſimus) tumque illorum locorum ligamenta ^c oblonga, teretia, valida & nervoſa ſubeunt, quæ à medio ſeu primo oſſiculo ad ſtyloidem ^d utrumque abeunt, & tunc tria tantum oſſa ſunt: ſæpe quartum ^d & quintum indurata reperiuntur, reliquis deficientibus tum oſſa quinque erunt: procedente ^d autem ætate reliqua, quæ tanquam additamenta ſunt, quo magis ſicceſcendo indureſcunt, eo magis numerus augetur, ut ſeptem, dein novem, poſtea undecim, & nonnunquam, quamvis rariſſime ad tredecim quoque perveniant.

Tandem, ne os hyocides ^e à medio laryngis loco devolveretur, & ad obliquum plurimum circumageretur, non ſolum muſculis æquabilitatem & velut æquilibrium Natura commiſi, ſed fortia quædam ligamenta in duobus ^u oſſibus lateribus etiam cōſtruxit; imo & alia cartilaginosa ac rotunda produxit & utrique lateri inferuit, & etiam per ^e membranas quaſdam non modo ad laryngem ac epiglottidem, verum etiam ad œſophagum ſtabilimenti quoque cauſa connectit.

Uſus: et ſi hoc os parvum ſit: ^e maximas tamē & plures utilitates habet, f & lingua ac laryngis gratia cōſtructum eſt: primo, ut lingua baſis ſit, ſupra q̄ variis & expeditis motib. ^g moveatur: dein ut larynx extollatur: r̄u ut ab eo plures muſculi ortū ducant, lingue muſculi quatuor ^h ſive par quartum & quintum [1. 30 f. 1. & 2. DDE.] exoriantur;

tur; quartum quidem ab osse primo, quintum à quarto & quinto osse, ubi adsunt; ubi vero desunt, tum à secundo & tertio osse prodeunt. Laryngis item anteriores, utpote communium quatuor musculorum primi & quarti paris principia, ab ossis primi parte inferiore: quare hoc os linguae & laryngis gratia constructum, ut eorum musculorum firmamentum sit.

Ex hoc osse musculorum linguae bona pars habet originem & musc. laryngis anterior conjugatio, alique nonnulli, qui ad amplexas feruntur, angustii, ac longi, alique &c. 7. us. part. 19.

De Musculis ossis hyoidis.

CAPUT LXXXVIII.

De his Galen. lib. de diff. muscul. 13. 7. us. part. 19.

Cum cibis ab utraque maxilla & dentibus infixis, ope musculorum buccarum, maxillae inferioris & linguae comminutus, deglutiri & in ventriculum demitti debuerit, & deglutitio motus sit voluntarius ad hanc actionem obeundam musculis opus fuit, à linguae musculis distinctis, siquidem deglutitio, lingua etiam immota, fieri possit, & linguae musculi alios motus absoluant. Ac deglutitioni inferuientes ossi hyoidi proprios faciunt, cum ei & annectantur, & id moveant, & sursum & deorsum, & in latera: nam cum hoc os transglutitioni utile fuerit, mobile esse debuit. Verum musculi ossi hyoidi commissi duplices sunt: alii namque ab hoc osse originem ducunt, sed aliis partibus subserviunt, ut sunt ii, qui linguae & laryngi inferiunt: alii vero, qui ab aliis ossibus principium sumunt, & ossi hyoidi inferuntur, ipsi quoque proprii sunt, de quibus nunc: & horum musculorum paria quatuor recensere videmus, licet sint, qui sex adscribant. Duo enim paria linguae adnumeramus, cum hyoidis & linguae motus germani sint; quare musculos plurimum commistos & connexos habere, mirum non est.

I. Par^b, sterno hyocideos constituit [t. 27. f. 2. QR.] qui anterieus sub cute occurrunt, aliarum partium asperae arteriae & laryngis cartilagini thyroecidi incumbentes, qui lato & carneo principio, à sterni elatiore & interiore sede recta sursum delati, in ossis hyocidis basim & sedem anteriorem carnosam implantantur, rotoque ductu carnei & latiusculi sunt, inque medio secundum longitudinem linea divisi: hi os deorsum recta, simulque retrorsum trahunt, & per accedens arteriam asperam & cartilaginem thyroecidem muniunt.

Ttt

II. f Par:

rum paria agnoscunt, Ves. Col. Piccolh. Laur. at Fallop. sex recenset paria, ex secundo pari Vesalii secundum & quintum par faciens: quod vero pro sexto pari enumerat, videtur Vesalius pro primo pari linguae proposuisse: At Plat. quatuor paria Ves. proponit, duoque Fallopii addit: Arantius nit[ex] potius esse quam paria quatuor, eo quod totidem in hyoidem inferantur ac desinant. b 1. par. Ves. Col. Fall. Plat. Piccolh. Arantio) qui deglutitioni cum 4. pari praeipue infertrahit, Vesal. Columb. Piccolh.

c An de hoc Galen. diff. muscul. 13. ultra hos reliquos faucibus infidet, siue quis ipsum unicum, siue bifidum appellare velit, siue duos sibi mutuo adhaerens, quod & mihi satius esse videtur: hi asperam arteriam adstringunt & os lambdoides retrahunt.

a Gal. diff. muscul. 13. res dicit, conjugationes ossi lambdoidi proprias, brevibus motionibus os moventes: duo lateri os hyoides inferiori maxilla conjungentes: duo alii in extremam maxillam mutuo inter se colligant: duo alii à radice ossis styloidei, ceteri ab ossi hyoide exortuntur, aliarum partium causa facti sunt: hi in scapulas, alii in linguam, & ultra hos reliquos faucibus extrinsecus infidet, &c. Quatuor musculorum

II. ^f Par: Geniohyoeidei [tab. 27. f. 2. S.] sub mento sunt, & quinto maxillæ inferioris pari subjiuntur [tab. 27. f. 2. O.] ampli sunt, & breves, omnique ex parte & carnei, & à maxillæ inferioris parte interna vario fibrarum ductu exoriuntur, & in ossis hyoeidis sedem mediam, in quam & primum par infigebatur, eadem pene latitudine inferuntur: hie recta ^h sursum & modice antrorsum trahunt.

III. ⁱ Par: Styloceratoeidei [tab. 28. f. 2. T.] similiter sub mento situ obliquo quinto maxillæ pari ex ^k attensi, graciles, teretes, à styloidis appendicis radice supra quinti maxillæ musculi exortum prodeunt, & in hyoeidis cornua vel laterales partes definunt, & aliquando in medio ^l perforantur, ut musculo maxillam aperiendi aditum præbeant; hi os ^m in latera & nonnihil sursum movent.

IV. ⁿ Par: Coracohyoeidei [tab. 27. f. 2. VV. t. 28. f. 3. VV.] hi sub scapulæ musculo ^o quarto latitant, graciles ^p & longi sunt, & ex scapulæ elatiore sede juxta ejus cervicem ex processu coracoeide exoriuntur, (aliis à costa superna scapulæ prope angulum superiorem) & oblique sursum sub capitis musculo septimo delati, in hyoeidis inferioris processus principium, ubi & tertium par, implantantur: & hi ^q in latera deorsum trahunt. Hoc par longum est, utrinque carneum, duplicique ventre donatum (quare Digastricus Galeno dictus) at in medio non secus, quam quartus maxillæ musculus, & quintus laryngis proprius, gracile ac nerveum ^r est, tendinis modo extenuatum, forte, ut capitis musculo septimo [K.] qui hic illi insertitur, quasi digniori cedat.

V. Par: Mylohyoideos aliqui addunt, quod Genio hyoideos subjiat & ab inferiore maxillæ parte, quæ dentes molares sunt prodeat & ab basin hyoeidis feratur.

De usu horum musculorum quædam adhuc lubet addere: sunt qui non motioni, sed tensioni potius dicatos censent, & os ^t hyoideos nec tere, stabilire, & velut suspendere. Alii ^u deglutitioni inservire, & hyoeidis proprios esse. Alii vero ^v cum hoc os lingue

Col. Fallop. sursum & modice in exteriora, Vesal. sursum simul & antrorsum, Piccolhom. linguam partim recte partim oblique producit, Arant. ⁱ 3 par. Gal. à radice ossis styloidi incipiens in recta ossis lambdoidei linea inferno termino utrinque unus inferitur: hæc Gal. Vesal. Col. Fallop. Plat. Arant. Piccol. ⁱ 1. par Sylvio. ⁴ par Laur. ^k Gracilis & teres Ves. subtilis & parvus, Col. tenues & parvi, Piccolb. ^l Fallop. Plat. Laur. ^m Hi ne os aut in dextrum aut in sinistrum revellatur, prohibent, & nonnihil sursum & introrsum contrahunt, Vesal. sursum attrahit, Columb. in latera idque sursum, Piccolb. sursum & magis introrsum trahit, Fallop. ad latera movet, Arantio.

ⁿ 4. Par Vesal. Columb. Fallop. Plat. Arant. Piccolhom. ³ par, Laur. ² par Sylvio, Gal. ⁴ ad an. scapulæ proprium, eam sursum adguttur agens: at ¹¹ Ves. par. ossi hyoeidi adscribit: rursus ¹³ Ves. par. inter scapulæ motores recenset: ideo à Vesalio, Columb. & Laur. arguitur. ^o 3. Vesal. Plat. ^p Nullus univ. corp. hu. simul & gracilior & longior occurrit, Vesal. subtilis & longus est, tamen neque prolixior est, neque gracilior aliis musculis, ut Fuchso visum est, Columb. ^q Deorsum ac utrinque ad latera os detrahit, Vesal. deorsum oblique trahit motu opposito, Col. retrahit deorsum recta, utrisque agentibus, deorsum oblique, si alteruter, Plat. eidem ^u sui, quo ³ par famulatur, Arantio. ^r Enervationem vocat Vesal. tendo in medio, Columb. in medio exangues & nervei, Laur. non meminit Piccolhom. ^t Laur. ^t Piccol. qui deglutienti instrumentum ponit, glandulosam illam substantiam ossi hyoeideis implicatam & connexam, quæ musculorum deglutitoriorum sive devoratoriorum paria quatuor habent, qui motus illos edant.

^u Musculi ossis hyoeidis ad lingue motum destinati. Novem musculorum paria lingua motibus destinata sunt; sex quidem hyoeidi inserta, quæ insignioribus ejusdem actionibus præstant, ut primum, tertium & quartum: Communia vero, secundum, quintum & sextum, quæ cum propriis lingue musculis connexionem habent, mutuamque inter se & complicatam operam, mento vix perceptibilem, præstant. Arant.

linguæ basis sit, & rei cuiusque basis nulla ratione loco moveri possit, quin simul moveatur & illud, quod basi stabilitur, statuunt hos musculos linguam ipsam pro arbitrio movere, & quidem eo magis, quod linguæ adeo frequentes motus vix à tam paucis atque exiguis in linguæ substantiam desinentibus musculis perfici posse videatur: quare hos communes linguæ & hyoeidi musculos appellare licet; in quos nervi sextæ conjugatione distribuuntur. His musculis, vel ob refrigerationem, vel tenuis humoris in eos defluxum, resolutis, aphonia sequitur ex linguæ sympathia, ut Rondeletius de quodam nobile notavit.

De Lingua.

CAPUT LXXXIX.

Aristot. 1. hist. anim. 11. 2. ejusdem 17. præferim vero 2. part. an. 17. (ubi de varietate in quibusvis animalibus tractat) egit. Galen. vero 8. us. part. 5. 9. ejusdem 8. 11. ejusdem 4. & 10. 16. ejusdem 3. & de dissect. musc. 14.

Lingua vulgo à lingendo ^a γλῶσσα & γλῶττα Græcis, loquelæ (quare animi interpres) & gustus instrumentum est, quod in ore palato ^b subjacet [tab. 28. f. 4. l.] ea a Varro, parte, ^c qua esculentis & poculentis natura iter fecit, & basi sua ossi hyoeidi, supra quod cibum liget, vel quod dentium septis, quod movetur, incumbit, juxtaque epiglottidem angulum constituit, indeque in ore libere vagatur. Debuit enim prope cerebri ^d collocari, sicut & reliqua sensoria, quasi muro circumvallata ac cum gustus præcipuum instrumentum sit: ideo natura ipsius gratia os imprimis ad caput efformavit, in quo tanquam antro resideret, ubi & gustus & loquelæ instrumentum foret, & masticationis atque transglutitionis officium melius adjuvaret. ^b Arist. 2. part. 17.

Figura non omnibus anim. I bus eadem, cum aliis trifida, ut serpentibus, bifida, ut lacertis, duplex vitulis marinis: piscibus tota adhærens; leonibus ac pardis, asperitatis imbricata: at homini oblonga, ^e in radice, crassa, ^f roboris gratia, lata, ut ad statum habitus utrumque officium commoda sit, hoc est, ad sapores percipiendos, & ad literas exprimendas, quæ ^g γλῶσσις dicitur; & in extremitatem (περὶ γλῶσσις) tenuem & minus ^h poculentis ⁱ iter natura fecit. ^d Os capiti adiacere erat necessesse, aut potius linguam ipsam continere: neque enim nudam ipsam & penitus sine o- perimento esse melius fuit, neque alio potius quo vis, quam ore regi. Etenim sapores, ibi locata, melius erant dijudicatura loquendique instrumentum melius futura, ciborumque masticationi ac transglutitioni non mediocriter opitulatura, Gal. 8. us. part. 5. c. Pyramidem refert. Piccolb. f. Sedis ac firmitudinis gratia magna ad basin ac fortis fuit: celeris motus causa, ad extremitatem tenuis, 11. us. part. 10. g. 2. part. an. 17. h. Quæ causa, ut lingua hæsitantes aliqui fiant, quarit Arist. dein cur homo solus ex omnium animalium numero lingua hæsitans oriatur, 11. prob. 54. & 55.

Ttt 2

Ma-

Magnitudo hujus in omnibus animalibus eadem non est, sed tanta, quanta quæque species requirebat; nec in ipsis hominibus eadem est, longa tamen magis, quam lata, & lata magis, quam profunda; at tamen tanta dici consuevit, quanta oris amplitudini congruat (quo in omnem ejus partem pertingat) & quæ ciborum ingestionem minime impediat. Verum^k non solum magnitudine, sed & substantia una cum musculis sæpe peccat, nam si justo major sit, oris fauciumque spacia repleat, cum expedite moveri nequeat, blasi & balbutientes efficiuntur; maxime, si nimia quoque^l molliet (quod ut plurimum fit) adsit, quare & infantes, & qui præ cæteris humidiores sunt ob linguæ ejusdemque musculorum molliem, articulas voces seclerius proferunt, quousque ætate caloreque simul augefcente, humiditas nimia absumatur. Brevitate etiam interdum peccat, ob funiculum ejus non satis resectum, quo impeditur, quo minus se ori undique applicare possit; vel quod ob minores musculos celerius agitata, sermonem implicat, orationemque præcipitem reddit.

Connectitur posterius, tum lai yngi, tum ossi hyocidi, cui radice sua, quasi basi nititur & sustentatur, tum faucibus, utrinque vero tonsillis; at inferius ligamento.

Componitur autem lingua ex carne propria, tunica, nervis, venis, arteriis, musculis & ligamento.

i Lingua moles
ori ad amussim
adaptata esse
debuisset, quo in
omnem ejus par
tem pertingat:
quod si minor
esset, haudqua
quam potuisset
nusquam au
tem à loci an
gustia impedi
tur, quod facil
lime ei accide
ret ab immode
rata magnitu
dine, u. us. par.

io.
k Arantius
l Hac aut lata
est, aut angu
sta, aut medio
cris, quæ qui
dem optima &
exploratissima
est: item aut
absoluta, aut
constrieta, qua
lis tortorum,
balborumque
aff. i. hist. an. ii.
m De hoc liga
mento u. us.
par. 10.
n Facit, ut lin
gua exorta me
lius sic retra
hatur, Plat.
o Ligamentum
cui fibre mu
sculorum fir
mantur, lin
guæ ossis vice
dat u. est, Ves.
p Arantius.
Laur.

q Piccolh. &

Laur. r

Tunica Col. Fall. Piccolh. membrana

binas dicit Ves. una musculus communis, quæ est interior: altera ejus tunica pars censetur, quæ os univ. sum succingit Plat. Laur.

f Crassa & dura Plat. prætenuis, Piccolh. tenuissima Laur.

hanc ex nervis sensificis amplificatis contexti aliqui censuerunt.

m Ligamentum [tab. 30. fig. 3. II] enim validissimum membraneum & latum corpori ipsius medio subijcitur, quo lingua basi hyoidis innixa, molliter constringitur, ut laxitate sua linguam libere moveri permittat: & hoc sua soliditate & robore ei at tollendæⁿ & exerendæ prodest: sine hoc enim lingua aliquando nimium in se retrorsum colligeretur, nec facile exerta intro traheretur, nec si undique soluta esset, sedem stabilem & tutam obtineret: hoc enim munere fungi, quoties id præscinditur, aut propter nimiam humiditatem laxam resiccamus, experimur. Propriorum etiam musculorum insertioni^o excipiendæ præcipue factum est, alias facile aut laxati aut divulsi fuissent. Ligamenti hujus extremo, versus linguæ mucronem sub lingua funiculus adnascitur, quem linguæ frænulum^p vocant: hominis enim lingua, in infantibus modonatis ad extremum usque vinculo connexa sæpe reperitur, quod tunc obstetrices ungue divellunt: aliquando vero inciditur, eo quod locutioni impedimento sit, imo & suctioni: sed in hac sectione studiose cavendum, à nervorum linguæ, qui vicini sunt sectione, quibus seotis linguæ convulsio repentina supervenire solet. Nam, cum incitata^q & volubilis natura sua esset, ne forte indomita plus à quo in loquacitatem solveretur, eo tanquam fræno cohibetur. Quare & ligamenti & frænuli beneficio, & musculis plurimis simul agentibus, & ad suam originem contractis, lingua angusta & acuminata efficitur, eadem attollitur, & varie agitur, & ne plus justo ad omnem regionem moveri possit, impedit.

Tunica^r ex crassa meninge producta ori, palato, œsophago & laryngi communi investitur [tab. 30. f. i. AA. BB. C.] ne linguæ substantia laxior dissiliat: quæ tenuis, quo sapores eam facile penetrantes in linguæ pulpam & substantiam expedite subeant, in quam, ut & carnem ipsius nervi sensifici disseminantur.

Sub-

Substantia est carnosa molli, & spongiæ instar rara, laxa, ut humore, saporum ve-
tore, facile imbuatur, & saporibus discernendis idonea sit, cum omnium saporum
differentias agnoscat, & in morbis varie afficitur, & quando humorem aliquem
imbibit, ut in ictericis & febricitantibus contingit, depravati sensus causa esse solet: in-
de etiam sit, Hippocrate t notante, quod si lingua vapores humorum in corpore do-
minantium imbibat, ejus superficies concolor fit. Est autem caro peculiaris, qualis in
reliquo corpore non reperitur, ad glandosam naturam, præsertim ab basin, potius
accedens, quam ad musculosam substantiam, qua multo mollior est, omni fibrarum
genere donata, quæ adeo intertexta, ut à se invicem seungi nequeant, quod tamen in
musculis fieri potest: per quos etiam secundum longitudinem fibræ feruntur, non
vero per linguæ longitudinem: nullæ enim fibræ ligamentales ad robur (præter me-
dium illud, quod sub lingua fertur) ut in musculis: nulli denique nervi à cerebro, qui
motivam facultatem tribuant: per ipsas substantiam interiorem discunt: quare
musculosa dici nequit. Hujus radices præter musculos in eam insertos, & adeps duru-
sculus copiosus adhæret.

Nervorum duplex genus a lingua recipit, alterum molle, sensificos nimirum
tertio quatuorque pari, ita tamen, ut ramus unus in tunicam linguam investientem
disseminetur, tanquam tactus instrumentum, cum ipsa lingua tangibiles qualitates,
ut calorem, frigus & cæteras percipiat. Alter vero nervus in linguæ carnem, quæ gu-
stus instrumentum est, spargitur, & ita lingua sapores apprehendit. [tabul. 9. lib. 2. fig. 1. coloribus evan-
y.] Alterum durum, motorios puta, septimum videlicet par, quod multis furculis
in musculos disseminatur, quo lingua motu voluntario moveatur, & cum in inferio-
re parte collocetur.

Ttt 3

Ve-

Principalissimum gustandi instrumentum, Piccolli: musculosa dici nequit, cum per eam fibræ excurrant nullæ, sed pecu-
liaris caro, qualem in reliquo corpore nullam reperias, Laur. Musculos duos aliqui ex hac substantia faciunt: sic enim
Kelsal. alii in vicem mixti raro corporis partem efformant, duorum veluti oblongorum musculorum concursus, qui in
ipsorum medio ligamentum adipiscuntur, & hi omne fibrarum genus obtinent, quid ipsis peculiare, cum cæteri corporis
musculi unicum fere fibrarum genus obtineant: hæc Vesal. Novem sunt muscoli præter ipsius substantiam peculiarem,
quæ cum caro confusa sit, inter musculos adnumeranda non videtur, etsi alia ratione, quod voluntate jubente movea-
tur, non videatur à musculorum numero sejungenda, quod si fiat, duo muscoli novem musculis addendi sunt: nam vi-
dentur esse duo muscoli, cum lineam candidam in medio habeat: igitur duo prædicti muscoli à basi ossis hyoëidis emer-
gunt, & in summam linguam desinunt, & hoc primum par erit, Col. addunt aliqui duos musculos, qui lingua pulpa-
ræ substantiam constituunt, media linea usque ad linguam extremam divisos. Sed si muscoli essent, eorum munus dux-
taxat esset movere & non gustare, nullus enim musculus gustat: hæc enim pulpa proprium gustus instrumentum est.
Piccolli: Lingua musculus non est, quod ejus definitionem minime subeat, & ad ejus constructionem particula arbitra-
rii mæus organum constituentes minime concurrant, Arant.

Cum nullius animalis lingua pinguis est: an quoniam pingue unumquodque densum est, lingua autem rara sua
nature propterea est, ut percipere possit genera saporum, 10. prob. 21. 2. Denervus egit 9. us. part. 8. & 12. 16. ejusd. 3. de
dissect. nerv. cap. 5. & 8.

Tertia nervorum conjugatio gustatoria est, Gal. de dissect. nerv. 5. Tunicæ privativæ tertiæ paræ nervorum cerebri præ-
cipuas portiones sibi vendicat, quarum beneficio lingua gustus organum efficitur: at à septimo præcipuo pari & à sexto,
lingua musculis motus præbatur, Vesal. Nervorum quartum par in tunicam inseritur gustus causa, quorum pars
ad palatum, at septima conjugatio duos nervos genuit, qui motus gratia huic parti additi, Columb.
Nervi duo, alter gustativus tertiæ paræ præcipua portio: motivus septimæ conjugationis portio, Plater. duo gene-
ra alii gustatorii, qui sunt quæ, paræ, à quo ramus unus in membranam linguæ, ut tactus sit instrumentum, ramus al-
ter in linguæ carnem gustatus instrumentum disseminatur: alii lingua motores sexti paræ (intelligit aliorum septi-
mum par.) qui per musculos disseminantur, verum & à octava conjugatione ad musculos linguæ, hyoëidis, laryngis

Carne soluta,

rara, fungosa

constat. i. hist.

11. musculosa

& cordis instar

fibrosa, Vesal.

Plac.

u Lingua hu-

morum præstan-

tiam colore re-

fert, adeoque

per hanc ad hu-

morum digno-

tationem pervie-

nimus, Hipp. 6.

epid. sect. 5. aph.

15. lingua re-

rum plurima-

rum iudex cur-

possit esse: cur

amara, salia,

acida, fieri pos-

sis, non autem

dulcis: cur tot

coloribus evan-

tis: 34. probl. 4.

5. & 6.

† 6. epid.

x Substantia

& caro linguæ

et maxilla inferior perveniunt. Piccolb. Nervorum tria paria, duo per tunicam ad gustum, postremum in lingua musculos ad motum & locutionem, Laur. à cerebro nervi multi disseminantur, Fallop.

Venæ etiam binæ satis insignes, à colore magis, quam figura ranarum, Raninæ dictæ, à jugularium externarum ramo interiore [tab. 7. lib. 2. T. y.] pronatæ sub lingua, ut ea sublevata conspicuum sit, feruntur, quæ in affectibus oris, faucium ardore & angina, post sanguinis evacuationem & revulsionem, humeraria secta, ad derivationem inciduntur.

^b Multa et re- ^b Arteriæ etiam duo majusculæ, utrinque una, à carotidibus venas comitantur
nues vene ad [tab. 12. lib. 2. h.] quæ linguæ concessæ ad vitam, quemadmodum venæ ad nutritio-
linguam proce-
dunt, præter
eam, quæ sub
lingua est, aut
sub maxillares
dentes fertur,
Hipp. de oss. nat.
linguas duas
habuit in seipsâ
insertas arte-
rias, utrinque
unam, duas
etiam venas,
ac nervorum
conjugationes
duas, alteram
mollem, alte-
ram duram:
illam quidem
in extremam
ipsius tunicam
distributam;
hanc autem in
musculos disper-
sam; quod illa
quidem conju-
gatione sapes
discernere, hac
autem motu
voluntario mo-
verit ipsam apor-
tebat. 10. us.

Corpus linguæ, etsi continuum sit, nulloque septo^c divisum, propter gustandi commoditatem & cibos conterendi, & loquendi in homine, dividitur tamen mediane lineæ candida, quam primus Hippocrates^d διχρῆν, medianam vocavit, quæ ipsam medianam superficiem tenus percurrit, in dextram & sinistram quasi dividens (non tamen, ut^e in serpentibus) geminam facit, quemadmodum omnia reliqua sensuum instrumenta: quare Galenus duplex membrum^e esse pronuntiavit: eo quod neque à dextris ad sinistram musculus ullus, aut vena, aut arteria, aut nervus transeat, neque vicissim à sinistris ad dextra. Verum linguæ divisio manifeste ex ejus læsione^{*} cognoscitur: siquidem in hemiplegia sive paralyti, linguæ partem alterutram resolvi videmus.

^f Usus linguæ: etsi lingua pusillum membrum sit, magni tamen usus est, cum omnes animi conceptus exprimat: quare Summus Opifex eam multis munivit dentibus & labiis, frænoque firmavit, quo sic custodita mentem non præcurrat, sed prius deliberet, quam proferat. Cujus usus alius primarius, alius secundarius. Primarius, ut sit instrumentum gustus & vocis articulatæ. Gustus (qui usus homini cum cæteris animalibus communis est) ut gustet, & saporum differentias omnes internoscatur: quare Aristoteles^h dixit, ori inesse τὸ αἰσθῆναι τὸν χυμὸν γλῶττιαν, sentiens saporem linguam. Quem tunica os succingens, præcipua, quæ linguam investit, efficit, eoque commodius, quod lingua in masticatione, dum cibis undique se applicat, gustum ipsorum melius percipiat, & cum illi exeri possit: illorum etiam quæ extra os posita sunt saporem, quibus admoveatur, deprehendat; maxime apice suo cum sensus hic in prima lingua, ut Plinius se. utus Aristotelem^h asserit, subtilior sit. Vocisⁱ vero (hinc Aristoteles^k naturam linguæ ad locutionem & gustum utriusque scriptum) ut sit vocis articulatæ & dandæ

part. 10. idem 16. us. par. 3. c. 9. us. par. 8. & 10. d. In Coacis. e. Summa eorum lingua bifida est, ut in lacertis. & vi-
culo marino. 2. hist. an. 17. & 2. part. 17. quibusdam animalibus ut serpentibus lingua divisa est. 11. us. part. 10. * Alex.
Benedictus in uvula malis, alteram partem alteram illa nigrescentem continuis diebus observavit. f. Edendo, bi-
bendo, loquendo nobis præsto est, & gustandus saporibus opportuna. Col. usus alius primarius, ut sit organum gustus & vo-
cis articulatæ: secundarius ad ciborum ingestionem, in ore agitationem, ut & ad lambendum & fistulandum, Plat. usus
quadruplex, duo communes omnibus animalibus 1. ut gustet, & sapes internoscatur 2. ut esculenta versus dentes move-
antur & comminuantur. & ut ejus motu deglutiantur. 3. in quibusdam animalibus ut vocis distincta fictrix sit. 4. ut so-
lus homini proprius sit mentis intellectus & voluntatis munitio, Piccolb. Gustus & locutionis organum ad sapes
percipiendos, trudendos & transmittendos in gulam cibos, & literas exprimendas, Laur. g. 1. hist. an. 11. h. Ori inest
pars

pars sentiens saporem, lingua vim istam sentiendi obtinens, præcipue parte sui primore, nam si interiore tangat, minus sentiet, 1. hist. 11. lingua non quævis sua parte sensum saporis obtinet, sed extrema potissimum, ideo piscibus particula hæc tantummodo discreta habetur, 2. part. an. 17. i. Lingua in voce formanda quid conferat, Hipp. de carnibus; k. 2. de anima, cap. 8.

dendæ organum (quare ἀγγελον λόγων, sermonis nuntiam Euripides nominavit) quam solus homo, cum linguam absolutam habeat, in loquela perficit: quamvis etiam in quibusdam animalibus vocis distinctæ fictrix & moderatrix sit, ut in psittaco, merula & aliis quibusdam animalibus, quæ voces distinctas proferunt, ita ut tanquam homines loqui videantur: idcirco Tyreus cum Philomelæ vocem adimere voluit, vocis explanandæ instrumentum linguam abscidit. At in homine intellectus & voluntatis nuntia est: in brutis vero mentis sensitivæ tantum, non intellectus, ster cerebri, quam Galenus rationem delitescentem nominare videtur, & in omnibus animalibus etiam rationis expertibus collocat. Lingua enim exprimentur quædam, quæ solum sub sensum, quædam quæ sub mentem & intellectum cadunt.

Secundarius usus ad masticandum & deglutendum; quo ejus motu alimenta assumpta deglutantur, si animalia dentibus caeant: at si habeant, res omnes esculentæ in ore versus dentes moveantur, utiis atterantur, comminuantur, & ad felicioris ventriculi coctionem, præparentur, ne quid non molitum deglutatur: ideo Varro putavit linguæ nomen impositum esse a cibo ligando, quamvis alii à dicendo veteribus linguam dictam fuisse censuerint. Verum & ejus ope cibi in œsophagum protruduntur. Denique ad lambendum quoque & fistulandum ore collectæ & lingua dentibus inferioribus affixa, facit. Quæ omnia in homine lingua præstat, at in multis animalibus, vel unum vel plura efficit. Ex his usibus primus præcipuusque & ad vitam necessarius videtur, siquidem gustus secundo adjungatur, cum natura plantis ad animal perficiendum gradatim incedat.

ut quæ instar manus cujusdam cibos in ore assiduò transfert ac voluit, quo pars ipsorum omnis ibidem conteratur, Gal. 11. us. part. 4. p. Gal. 2. de sem. 5. sic habet, ita sit, ut quasi gradus quosdam habere videatur natura, primum cum parum a plantis recedens, tactus, hoc est, uno tantum prædictum sensu animal fingit: secundum, cum gustatum: tertium, cum tactum adjungit: quarto gradu postmodum progressa auditum, quinto visum addit.

De lingue musculis.

CAPUT XC.

Vide Galen. de dissect. musc. 14. & 11. us. part. 10.

Cum lingua in tres potissimum fines comparata sit, ut loquatur, gustet, cibumque revoluat, & ab hisque motu absolvi nequeant, Natura musculos tribuit, qui à

a Bubula linguis sedecim esse musculos,

dicit Præceptor noster Pelops, nobis vero octo sunt: qui à processibus acum referentibus prodeunt, τὰ ἀκροῦ, transversis seu laterales vocantur, qui ab obliquis ossis lambdoidei partibus λοξοῖ, i. obliqui, sicuti, qui à superiore ejusdem lambdoidei ossis termino enascuntur, ἐκ τοῦ ῥεθροῦ, recti appellantur: subjiciuntur illi, qui fibras ὀρθοῦ, id est, transversas habent, à tota lingua exorti, & in maxilla feretotum, præterquam in mentum inserti, Gal. de dissect. musc. 14. Vesalio, novem

funt musculi, quibus addit musculosam linguæ corporis substantiam: sic & Columb. Valverda & Laur. decem faciunt. Fallop. in observ. veltaria vel quatuor paria, quia quartum par vel ad fauces, vel ad linguam referri potest: at in Instit. paria quatuor, sic & Plat. qui alios dicit communes, primum Fallopii, seu 9. Vesalii, & 4. Fallopii (quod inter faucium musculos recensuimus) proprios vero 2. 3. & 4. par Vesalii, & Piccol. qui gustatorios, locutorios & cibi revolutores vocat: Arantio paria tria tantum linguæ propria sunt.

tribus hisce actionib. & locutorii & gustatorii & cibi revolutores dici possunt. Nam in homine locutionis potissimum causa movetur: in brutis vero gustus gratia: cum enim hæc manibus careant, linguam ad res gustabiles tangendas exerunt: quare eam moveant oportet: at homo citra ejus motum gustare potest, cum manibus res gustabiles linguæ imponere possit. Verum in utrisque, cibum in oris capacitatem à dentibus lapsum, sub eos remittit & revoluit. Ad hæc ergo munia obeunda mobilis esse debuit, idcirco & musculos obrinuit: & facilis motus gratia eandem crassitiem non habuit, & ne plus justo in omnem regionem commoveri possit, Natura ligamento prospexit: sic & substantia ipsius ex fibris diversis contexta, quo ad varias obvolutiones & implicationes apta fiat: de quibus omnibus, musculis exceptis, dictum fuit.

Sunt autem duplices, alii communes, alii proprii: communes celsentur illi, qui sub osse hyoide enarrati fuere, ad quos forte & tertium par nunc recensendum, referri potest. Proprii, qui alium de exortu in linguæ substantiam definunt.

I. Par: Styloglossi [tab. 30. f. 1. & 2. F. at sculptor insertionem male expressit] à styloidis appendicis externa facie (quemadmodum faucium quartum par ab interna ejus facie) graciles in homine, in bobus carnosissimi & crassissimi, fibris transversis in linguæ utrumque latus circa medium implantantur: imo ulterius progredientes, quasi ad linguæ summum apicem vergunt, & linguam foras extertam, introsum ducunt. Verum propter fibras adeo intertextas, cum ambo simul versus originem suam contrahantur, linguam quoque sursum recta elewant: cum vero alter duntaxat agit, tum linguam sursum ad alterum latus ducit.

II. Par: Myloglossi [tab. 30. f. 1. & 2. G.] à maxillæ inferioris lateribus, juxta dentium molarium radices principio lato & inverso, fibrisque transversis, exoriantur, & sub linguæ basi in ligamentum, quod in frænum degenerat secundum longitudinem, quæ linguæ faucibus alligatur, ad latera utrinque inferuntur. Horum altero agente: lingua subversa sursum oblique ducitur, utrisque vero agentibus, mucrone recta ad palatum & dentes superiores attollitur. Aliquando quasi duplicatam & canalis in modum sinuatam reddit, & ad palatum hinc in deligamenti frænuli rigidi sculi effecti beneficio, arcus in modum sustinet. Si vero hyoideis secundum par cooperetur, tum lingua ligamenti auxilio acutior, solidior & angustior reddita, extra labia longe producit, maxime si sequens par simul agat.

III. Par: Genioglossi [tab. 30. fig. 1. & 2. H.] at sculptor principium nimis latum ad-

*b. m. a. 201, trans-
versi seu later-
ales Gal. diff.
musc. 14. 1. par
sursum movens
Laur. 2. par lin-
guam intro re-
vocans Piccol.
3. par (quod car-
nosum & cras-
sim) Vesal. Col.
Fallop. instit. at
hic addit, se-
cus quam in bo-
bus inferi in me-
dia insertione
secundi, non in
fine, ut in bo-
bus, quod par à
Vesalio ignora-
tum videntur.
Verum in obser-
vatis tertio pari
Vesalii respon-
dere: 3. par gra-
cilis, Plat. 3.
par introsum
ducens, Aran-
tio.*

*c. Lingua quartum par, Fallop. d. Lingua lateribus, Vesal. in latera radices, Columb. & Piccol. etiam ad linguæ sum-
mum apicem, Fallop. e. Columb. & Piccol. f. qui fibras hyoglossas transversas habent, Gal. l. c. 1. par attollens linguam
Arantio 2. par deorsum movens, Laur. 4. par ad inferiora contrahens, & ad latera involvens, Vesal. 4. par in latera
trahens, Piccol. 4. par Vesalii, Plat. 5. par, nunc huc, nunc illuc impellens, cum mandimus, aut deglutimus, Col. quartum
par Vesalii non reperitur, sed pro eo videtur, 2. par hyoideis rursus repetere, Fallop. g. 1. par linguam exerens, Fallop.
Instit.*

Instit. & Piccolhom. 1. par Fallopij sen 9. Vesalii, Plat. 2. par ceteris Anatomicis ignotum, linguam exerens, Columb. 3. par antrorsum aut extrorsum movens, Laur. Nonus musculus, carnea moles sursum & retrorsum ad fauces ducta, in lingua radicem inseritur, & linguam ad mentum contrahit, nunc exquirite ad labrum medium, nunc autem ad latius, prout has vel illas fibras laxat, & intendit, Vesal. videtur primum hoc par illa moles carnea, qua pro 9. musculo à Vesalio numerata est, Fallop. observ. hyoidis proprium est, & cum lingua nullam connexionem habet, Fallop. Instit. 5. par hyoidis, quod una cum 6. pari hyoidis subiecto, lingua ad mentum contracta, ejusdem propriis concurrentibus efficiunt, ut eadem vinculi beneficio acuminata longe producat, Arantius. Hunc nonum Vesalii musculum contrarium motuum opificem esse, ut scilicet linguam, tum producere, tum revocare queat, credidit Fernellius: quod si esset sequeretur, eundem musculum, tum duplici actione praeditum, tum eodem tempore simul agere & pati, quod rationi & Galeno, 1. mot. muscul. 4. adversatur. Arant.

junxit] ab asperitate quadam in interno, ac medio mento principio satis angusto exorti, mox latiores redditi, rectisquæ fibris præditi, in mediam fere linguam inferius implantantur, & quidem in homine (in brutis enim corpus unum refert) parte maxima versus linguæ radicem, minima vero versus linguæ apicem feruntur: ita ut ejusdem musculi partes, actiones contrarias edant: maxima namque fibrarum parte ad exor-

h Avernhoes non musculo- rum ope, sed proprio motu linguam exerens censuit, quod Columbus reprehendit.

IV. Par, Basiglossi vel Ypsiloglossi [tab. 30. f. 1. & 2. D. D.] ex ossis hyoeidis superiore & media sede carnei & recti, aliquot locis obscure à se invicem, ac si plures essent divisi, & secundum linguæ longitudinem producti, ipsius medio inseruntur: hi contracti eam intro recta & velut ad posteriora, trahunt.

i Osseis, rectis, Gal. l. c. primi,

V. Part: Ceratoglossi [tab. 30. f. 1. & 2. E.] à cornubus superioribus ossis hyoeidis, si adsint, exorti, & aliquantum oblique procedentes, in linguæ latera, juxta ipsius radicem inseruntur: interdum ab humilioribus prodeunt, quando superiora desunt, vel non plane ossæ, sed ligamentorum naturam referunt, quod potissimum in mulieribus fieri diximus. Horum si alter solum contrahatur, lingua potissimum sua radice in latus deorsum trahitur, sicque in latus movere dextrorsum sinistrorsumve dici potest: Si vero ambo contrahuntur, tum recta deorsum versus interiora movetur. Hoc par in bobus geminum est, at in homine simplex existit. Horum musculorum munus, munus, linguam sursum, deorsum, antrorsum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum, sive in latera movere: qui si successive agant, linguam in orbem torquent atque convertunt, quos motus ossis hyoeidis musculi non parum juvant; quod nonnulli ipsius linguæ substantiæ in fibrosæ, quæ triplici fibrarum genere donatur, adscribunt.ⁿ

par intro trahens, Vesal. hoc illud est, quod pro sexto pari ossis hyoeidis Fallopius numerat, Plat. 2. par ab hyoeidis lateribus in lingua latera productum retrahens, Arantius. 4. par retrorsum movens, Laur.

VIII

Ad

k Aōōi obliqui Gal. l. c. 2. par,

Vesal. Fallop. observ. & Instit. Plat. 3. par, Piccolh. 4. par, Columb. qui omnes volunt, hoc linguam deorsum trahi. 5. par in latera movens, Laur. 1. Ab ossis hyoeidis lateribus in homine simplex, Fallop. obser. quamvis in homine ingeminari possit, tamen pro uno recensetur, Fallop. Instit. m Musculorum, qui ad linguam porriguntur, plurimi circa ipsorum fines invicem confunduntur, ac duo musculosa linguæ corpora constituunt, quæ triplex fibrarum genus adeo confusum permixtumque obtinent, ut fibras inter noscere sit difficillimum: reliquorum tamen omnium obliqua transversaque in corporum medio plurima reperiuntur, quæ utrinque in lingua ligamentum, tanquam ipsorum firmamentum hominibus, canibus & similibus, secus quam in bobus, ovibus propemodum desinere videntur: recta vero pauciores, omnes propemodum in corporum illorum externa superficie excurrentes: transversorum beneficio lingua corpus in se contrahitur, in crassatur & rursum egeri tenuarique arbitror: rectis fibris in semicirculum ad palatum & fauces convolvitur, pro superioribus aut inferiores collectæ fuerint: obliquæ vero linguam in latera agi omnino conector: ita tamen, ut alii int-

rim

rim musculi linguae radicem, alii lingua corpus moveant, Vesal. n. Præter hos duo adhuc sunt lingua corpus constitutiva, &c. Vesal. duos adhuc addunt lingua pulpam constituentes, sed musculi non sunt, sed proprium gustus instrumentum, Piccolb. caro linguae, musculosa dici nequit, cum per eam nulla fibra excurrant, Laur.

Ad linguae radicem, musculis his remotis adhuc caro ex glandulis compluribus & pinguedine commixtis conspicitur, quæ musculi nomen non meretur; cum musculus non ex glandulis, sed ex fibris carnosus constet [tab. 30 f. 1. & 2. H.] Nam præter duas glandulas oblongas & rotundas, circa œsophagi principium huic parti vicinum, qui sub musculo ceratoglossa siti sunt, plurimæ glandulæ carnosæ, sub lingua circa ejus frenum occurrunt, quæ interdum valde humidæ redditæ, minus exercitatis elephantiasis suspicionem causare solent. Hæc glandularum congeries linguae radici innascitur, quo lingua perpetuo madeat, cum gustatio sine madore perfici nequeat; ut neque concoctio in ventriculo elixatione facta: quare pancreas glandulosum ventriculo contiguum, ut perpetuo vapores humidi eruantur, quo ventriculi concoctio elixatione fiat. Præterea, quo ad motum expeditor sit: exsiccata enim ad motus tardior efficitur, ut constat ex iis, qui siti immodica infestantur; & iis, quibus in febribus ardentibus linguae humor omnis exhaustus est. Verum & consillæ, ut supra monuimus, perpetuo humectando, linguae motum promovent, eamque humectant.

• Undecimus musculus, quæ carnis, pinguedinis, glandulaeque confusam, miscellam rectius dicemus, quam vero musculum: posteaquam autem ceteri, qui ante nos scripsere, inter musculos descripsere, nos quoque musculum appellabimus, ne confusio locus relinquatur, ductusque ipsius est ab hyoideis ossibus, quæ particula in humano corpore perexigua est, & nullius fere pretii, Columb. Musculus non est, quem ponunt ad radicem mediam linguae glandulis compluribus constitutum gustatui, & dentibus gratissimum, Piccolb. p. Gal. II. usque part. 10.

De sensu Gustus.

CAPUT XCI.

De hoc egit Plato in Timæo, Aristot. 2. de anim. cap. 10. Theoph. 6. de caus. plantar. quædam habet. Galen. 7. de Plac. 5. & 6. quemadmodum ex Platonis sententia, 1. facult. simpl. 37. & cap. sequenti de propriis linguae sensibilibus & differentiis gustabilibus.

Tria ad quemlibet sensum requiri, supra ostendimus, instrumentum, medium & objectum, quæ tria in quarto sensu, ipso nimirum gustu, breviter, quantum ex Anatome colligere possumus, ostendemus.

a Gal. lib. de instr. odorat. lingua gustus instrumentum
est, ac 7. plac. 5. gustatus instrumentum humidum.

Instrumentum ipsa lingua esse, Medicorum est sententia, quæ ita se ad sapores habet, quemadmodum oculus ad colores: verum quemadmodum in oculo pars una est, quæ videndi principalissimum instrumentum dicitur, reliquæ vero illud adiuvant; sic in lingua una pars similis est, quæ gustandi principalissimum instrumentum existit, ipsius nimirum substantia rara & laxa, quo humore saporum vectore facile imbuatur: reliquæ vero partes in subsidium contributæ sunt. Hæc cum omnes sapores recipere debuerit, omni sapore denudatam esse oportuit, quare insipida est, talem esse, expectantur illi, qui linguas animalium sine sale elixatas, aut sine condimentis coctas comederint. Verum saporum natura subiecta humida est hinc Galehus
b gusta-

gustatus instrumentum humidum, quemadmodum visus lucidum, auditus aereum, b 7 plac. 5. Gu-
 olfactus vaporosum, tactus terreum esse pronunciauit) cum nihil absque humiditate *standi facultas*
 saporis sensum, Philosopho c monente, efficiat, & omne quod ipsum sensum efficit, *Theophrast. 6.*
 humiditatem vel actu vel potentia habet; & quanto magis humidum, tanto magis sa- *de caus. plant.*
 porosum, cum unumquodq; saporem suum magis sub forma molli & humida, quam *Aristoteli &*
 dura & solida imprimat: quare quæ dura sunt, nisi earum partes superficiales lique- *Mnesitheo Me-*
 cant, suas qualitates gustatiles non exerunt: sic Sacchari dulcedinem, ubi liquatum *dic. xupis nun*
 est, melius percipimus: sic salsum, ait Philosophus, potentia humiditatem habet; *cupatur. i. sim-*
 quod & ipsum liquefcere facile potest, & linguam, cum liquefcit, humidiores effice- *pl. 38.*
 re: sic Rhabbarbari infusionem, ipsa substantia amariorem esse, constat. Cum ergo sa- *c 2. de Anim.*
 pores non percipiuntur, nisi quatenus natura humidis aut liquidis inhaerent (liqui- *cap. 10.*
 dem corpus, secundum Philosophum, in quo tanquam in materia, sapor est, qui gustu
 percipitur, humidum est) necesse est, instrumentum ipsius sensus neque humidum
 esse actu, neque etiam tale, ut humectari non possit, humidumque evadere; sed po-
 tentia humidum sit, necesse est, & actu humectari, ita tamen, ut cum humectatur,
 ejus ratio conservetur: cujus rei signum est, quod lingua, neque cum valde sicca est,
 neque cum humida nimium est, sentit; quare gustus humidi primi beneficio fit. Ex-
 empligratia, c si quis vehementem acremve saporem prægustarit, dein alium gustet,
 non recte posteriorem discernere poterit, quia lingua tali humore acri imbuta est;
 quod etiam in ægrotantibus accidit, quibus sæpe cuncta amara videntur. Idcirco
 lingua ex substantia terrestri & arida constructa fuit: licet enim humida credatur, ex
 mollitie quam habet, tamen humiditas hæc insita non est, sed adventitia, à cerebro
 perpetuo destillans, quæ linguæ se insinuat, quemadmodum aqua spongiæ: hoc ve-
 rum esse, exinde probatur, quod capitis destillatione cessante statim exsiccat, & ex
 vaporibus calidis ab hepate, ventriculo, pulmonibus elevatis, adeo exsiccat, ut
 aspera reddatur; imo in febribus sæpe findatur, cujus fissuræ vestigia in multos annos
 persistunt, quod mihi contigit, cui ante annos triginta ex febre, per medium fissa est,
 & vestigia adhuc manifestissima conspiciuntur. Recte ergo Galenus d gustandi instru- *d De instrum.*
 mentum ex humida substantia constatum esse docuit; dum qualitates instrumento- *odoratus 2.*
 rum singulis sensibus inservientium explicat. Unde si lingua nimis exsiccata fuerit, *sapores dignos-*
 saporum etiam dignotio interit. Quare & tonsillæ additæ, ne assiduo aeris per respi- *cit, quod lin-*
 rationem ingressu & egressu, nimium exsiccentur. *guam appella-*
 Medium ipsius, linguæ tunicam censem (quemadmodum in instrumento ta- *mus, ex humi-*
 ctus cuticulam esse, libro primo, cap. 2. ostendimus) siquidem ex Philosophi senten- *dioris corporis*
 tia c, omnia quæ sentimus, per medium sentiamus, & nulla fiat sensatio per immedia- *substantia mo-*
 tū contactum sensibilis & sensorii; quamvis postmodum ipsi gustui, tanquam & tactui *lita est; & 7.*
 medium denegat. Gustabile, inquit, est quoddā tangibile, & hæc causa est, ut ipsum *plac. 6. gustan-*
 non sit sensibile per medium corpus externum; quia nec tactus tali medio percipit: *di instrumen-*
 quare, addit, etsi in aqua essemus, dulce tamē sentiremus in ipsa positum, quia permi- *statuit, quem-*
 stum illud esset cum humido, quemadmodum in porione fieri solet. Hanc quoque *admodum, ait,*
 ob causam gustum & exactiorem nos habere asserit, ipso odoratu, ex eo, quod gustus *sensus tactus*
 tactus quidam sit, quem sensum homo exactissimum habet. *sensilia per con-*
cursum, ita gu-
stus objecta
per humidita-
tem, saporos-

Vuu 2

Ob-

que in cognitionem veniunt. c 2. de anim. tex. 114. membrana exilis omni sensu gustus & tactus carente obvolvitur,
 Varolius. f 2. de anima cap. 10. g 2. de anima cap. 9.

Objectum, res sunt gustabiles & quidem duplices, aliæ propriæ ipsius gustus, ut sapores: quemadmodum enim visibile est color, sic est gustabile sapor, sed nihil absque humiditate saporis sensum efficit: aliæ communes sensuum omnium, rerum gustatilium magnitudo, numerus, situs: quare lingua vini saporem gustat, non vinum, ex quo mens colligit & cognoscit, vinum esse. Vinum enim, ut vinum, & saccharum ut saccharum non sunt objecta facultati gustandi, sed quatenus saporibus & gustabilibus qualitatibus prædita sunt: nam mens ratiocinando, gustu tamen intercedente, saporem acrem & amarum cognoscit: siquidem qualitates sensibiles ipsarum rerum facultates sentientes moveant & afficiant. Quo vero sapor exacte apprehendatur, corpus in quo est, inter palatum & linguam conteri debet; quare palatum & lingua eadem tunica suæcinguntur; quamvis & palatum aliquid ad gustum conferre videatur, cum eo modo, quo & lingua nervorum propagines ab eodem pari recipiat. Sicut autem visus visibilis & invisibilis est, & auditus similiter, sic & gustus gustabilis & ingustabilis est; quod quidem aut exiguum habet aut pravam aut corruptentem gustum saporem: videtur autem potabile & impotabile esse principium: utrumque enim gustu percipitur: at alterum pravam est, gustumque devastat; alterum naturæ amicum est. Saporum vero species ex Philosophi sententia se habent, quemadmodum & colorum, dulce namque & amarum contraria simplicia sunt. Hæret autem dulce quidem pingue, amaro autem salsum, & inter hæc collocantur acre, acerbum, acidum atque acutum: hæ enim videntur saporum esse differentia ipsi Philosopho: plura qui vult, Galenum lib. 1. de facult. simpl. consulat.

h Plato in Timæo gustabiles differentias exponens sic ait, etiam Gal. 1. simpl. 27. referente: tenditur à lingua venule ad cor, saporum nuncia, in quas si quæ ita inciderint, ut rariorem mollioremque carnis partem penetrantia terrestri sua

natura liquefacta, venulas contrahant atque desiccant, siquidem asperiora sint, acerbiora minus aspera, austera nuncupantur: &c. Sapores, qui tum in unoquoque animali ac planta, tum in terra inveniuntur, plurimi sunt, nec facile specierum numero comprehensibiles: ceterum differentias gustabiles aliis octo creduntur, aliis septem, nonnullis autem pauciores. At Plato primum duos sapores numerat ejusdem speciei, sed in ratione majoris ac minoris differentes, eorum alterum austerrum (quem adstringentem voco) alterum acerbum nominat. Altera est eorum, quæ illis opposita sunt, nitrosorum videlicet, salis eorum & amarorum, & in his quoque amarus ex nitrosi intentione provenit; salis vero aut nitroso imbecillior, aut adstrictionis assumens quoque aliquid. Deinde à Platone acris expositus est, mox acidus, postremo dulcis: at à Theophr. additus est unctuosus sive pinguis à Platone præteritus, ut qui ad gustum nihil attineret. 1. simpl. facult. 38.

1 Ex in Theæteto. k 7. plac. 6.

De

De Larynge, vocis organo.

CAPUT XCII.

Consule Galenum 7. us. part. 2. cap. 11. ad 19. libr. de vocal. instrumen. dissect. libr. de diff. muscul. 10. & 11.

Asperam arteriam supra libro secundo, divisimus in fistulam, quæ ex cartilaginibus semicircularibus & membrana constet, (de qua eo loci egimus) & in caput ipsius, quod laryngem vocamus. Dicitur Græcis ^a λαρυγξ à λαρυγγίζω, quod significat, gutture latius diducto vociferari; vel ex λα ^b particula, quæ per se sola nihil, sed in compositione magnum quid significat & ἀρώ, haurio, quod ad vocem formandam spiritum è profundo trahamus: nonnullis, sed improprie, φάρυξ ^c, cum proprie de faucibus intelligi debeat; pharynx enim ante laryngem consistit.

Est ergo larynx aspera ^d arteriæ vel ^e bronchii caput, finisve ^f superior faucibus continuus, ex cartilaginibus ^g magnis ^h, figura & magnitudine, ab iis quæ in fistula reperiuntur, dissimilibus, musculis, membranis, & organis communibus composita, ut sit primum, ac ^g principalissimum vocis modulandæ instrumentum, cum in ea primum vox fiat.

Situs est in collo, cum via sit aeris, & in arteriæ asperæ summitate ^h, quo spiritus vocis materia à pulmonibus ad vocis formationem exiliat: prope fauces, os & linguam, ut statim vox in sermonem abeat. Et cum perpetuo una cum respirationis organis dilateri & constringi debuerit, extrinsecus situs est, & ipsi œsophago incumbit, ne ab ulla re comprimatur: qui tamen situs etiam deglutitioni confert: dum enim adsumpta deglutimus ⁱ, œsophagus quidem deorsum trahitur, larynx vero sursum recurrit, & deglutitioni famulatur, quatenus & locum liberiores relinquit, & videlicet pressoria adjuvat. In colli medio locatur, cum unus sit larynx sicut cætera instrumenta, quæ unica sunt, in medio posita sunt, quo corpus in æquilibrio sit. Unicus autem factus, ut una vox edatur, ne duæ voces uno tempore editæ, duos animi affectus simul confundant.

Figura est rotunda & circulari, sed imperfecta, antè extuberante, quo minus ab externis afficiatur; postè depressa, quo œsophago cedat, & deglutitioni locus sit; deinde, ut cõcavus sit, quo vocem perfectam edat, spiritum à pulmonibus eo delato: at orificium inferius ^k superiore amplius est, quo aer expiratus copiosior ad laryngem feratur, sicque vox gravis causetur; & tandem fistulæ instar oblongatur.

Vuu 3.

Magni-

que ex eius sententia 8. us. part. 1. statuit. Hipp. de nat. off. φάρυξ ipsa est fistula. Et lib. de corde, bibit quoque is φάρυξ: at in Introduct. 11. unde initium capit arteria. Et ubi aperitur, φάρυξ fauces, vel λαρυγξ Græci vocant; Avicenna Augena; Halliabbati jugulum; Hejych δαρύγγον vocat.

d Gal. 4. aph. 34. e 7. us. part. 1. bronchii principium, Polluci, aliis nodus gutturis. f 6. us. part. 21. & 8. ejusdem 1. g 8. us. part. 1. at 7. us. part. 1. spiritus instrumentum: vocis vehiculum, seu meatus, Aristophani: caput aspera arteria, larynx potius, quam guttur appellandum, Vesal. h Est veluti fistula epistomium, Plat. arteria aspera operculum & caput, Laur. i 4. us. part. 8. & 7. ejusdem 18. k 7. us. part. 2.

Magnitudine pro ætatis & sexus (in mulieribus enim minor est) ratione variatur quare & vox ipsa: nam in minori ætate, ubi larynx adhuc angustus est, vox acuta fit, quia ex angusto paucus aer volociter motus egreditur: e contra in grandiori ætate, latiore larynge¹, aer copiosior profluit, motus tardior fit, & vox gravis redditur: ad quod & longitudo & brevitudo non parum conferunt.

Latitudinem ad vocem magnam conferre ostendit Gal. in arte Med. 67. & 7. epi- dem 25.

Ex innumeris propemodum sectionibus observari humanam laryngem in pro- vectioris ætatis corporibus, laryngem osseam esse, non cartilagineam, quam à teneris annis, cum non dum ad suam duritiem soliditatemque reducta est, ex cartilaginea substantia constructa esse videatur; non possum non opinari, eam magis ex ossa natura, quam ex cartilagine consistere: mox: ossa esse color ac durities, ac præter ea medullosa substantia (qualem sæpe deprehendi, quo uno potissimum car-

Connectitur cum aspera arteria musculorum & membranarum ope, cum œsophago, thorace, ossæ hyocidæ & beneficio organorum communium cum partibus principibus.

Partes laryngem constituentes sunt^m cartilaginee, musculi, membranæ, venæ, arteriæ & nervi una cum glandulis adnatis. Ex substantia enim tali componi debuit; cartilaginosa quidem, quo durior sit, densior ac crassior, quo minus ab injuriis externis lædi possit: dein cum via sit spiritus, ut cavitas, quæ necessaria est, non solum ex duro corpore constituitur, sed etiam quo ingredienti & egredienti aeri perpetuo pateat: nam si ex carne constaret, vel membrana, meatus concideret, spirituum transitus ita liber non esset, & sic non solum voce, sed respiratione quoque privatum, corpus^m mortuum redderetur. Musculi quoque propria actione privarentur, quippe qui nihil solidi trahere contrahereque suis ipsorum ansis possent. Quod si ossa foret, duritiæ suæ œsophagum comprimendo, deglutitioni impedimento foret: pondere linguam & os hyoides detraheret, eorumque actiones læderet, musculis majoribus, utpote gravius corpus moturis indigeret, qui majus spatium requirerent. Quod si ex tenuibus ossibus constructa foret, facile tanquam fragilia & externis expolita frangerentur, & non, ut cartilaginee cederent.

Tum quia vocis instrumentum est, ut proportio sit inter aerem percussum & corpus percutiens, quo ad vocem edendam resonet: cum vox aeris^o percussio sit; quare nulla substantia ipsa cartilaginea aptior est: ossæ enim duram percussione in ærea faceret; & licet sonus à corporibus duris, non autem à mollibus, ut lana, spongia, oriri possit, cum aer non frangatur, nisi ad solidum, durum & læve allidat, atramen non penitus durum esse debet: tale enim aerem prompte tum secut, tum evertit: neque nimium molle, cum enim penitus cedat, vocem edere non potest: quare corpus, quod moderate cedit, & spiritum blande pulsât, id vocis causa efficitur: tale autem est cartilagineum corpus. Tandem ut sint veluti fundamenta reliquorum corporum ipsam laryngem constituentium, & ut inde musculi vel oriantur vel implantentur.

Verum non ex una cartilagine creari debuit (quo non solum meatus esset, sed etiam instrumentum voluntati inserviens) & quæ nullam articulationem haberet, quæve immobilis esset, sic enim nec clauderetur, nec aperiretur, nec omnino dilata-

retur,

ostendunt, Col idem accusat Galenum, quod simias disseccandas curavit, & quod in iis laryngis substantiam osseam non adverterit, reprehendit Vesalium, quod laryngem bruti secare semper solitus sit theatris publicis, quibus per sæpe interfuerit. At Fallopius sic: primam & secundam reperi aliquando in valde senib. ossæ factas, neque solum in decrepitis, sed etiam in primo senio constitutis: tertiam vero & quartam osseam nunquam vidi, nec possum illorum opinionem probare, qui laryngem osseam, non autem cartilagineam esse volunt. Quod si cartilaginea reperiatur, imperfectam tunc esse asserunt, quia Natura, ut ossæ hac pars esset, destinavit: hoc si verum, tunc homines vocis organum integrum, usque ad consistentem ætatem non habebunt, quod minime concedi potest. Sic Laur. errat; Columbus dum ossibus adscribit, licet in senibus quibusdam ossæ appareant, reliquo vita tempore sunt cartilagineæ.

a De instrum. vocalium diff. 6. o De vocal. instr. diff. 2. p De instr. vocal. diff. 4. q 7. usque part. 11. de vocal. instr. diff. 6.

retur, nec comprimeretur, sed ex pluribus simul & sibi mutuo applicatis; & quidem quibus motus esset, non quidem naturalis, ut arteriarum, sed qui ab animalis voluntate penderet. Nam cum ipsius usus sit in inspirationibus & expirationibus, utriusque respirationis inhibitionibus. Præterea efflationibus, ac vocibus, cum instrumentum sit, per quod spiritum admittimus, eundemque reddimus, & in quo primo vox effingitur, satius fuit, hæc omnia à voluntate nostra proficisci: quare ad hos motus præstandos à Natura musculi instituti sunt, ad quos nervi transmissi pro motu: venæ, pro nutritione, arteriæ, pro vita, & membranæ circumdantur tutelæ gratia, & glandulæ humectationis causæ additæ fuere.

Ex tribus autem cartilaginibus secundum Galeni^r mentē larynx compositus est, ex quibus duæ solum mobiles sunt, thyroides & arytenoides, cricoidi prorsus immobili, cum motus super aliquo quiescente fieri debeat. Dupliciter autem movetur, nam dilatatur & constringitur, item clauditur & aperitur, idcirco duabus de articulationibus opus fuit, quarum singulæ singulis motibus inserviunt: ita ut dilatatio & constrictio ab ea articulatione thyroididis cum cricoide, sive primæ ad secundam fiat: clausio vero & apertio, ab arytenoidis cum circoide articulatione. Quare Galenus voluit^f musculos dilatantes & constringentes, thyroididi: aperientes & claudentes arytenoidi implantari.

De musculis Laryngis.

CAPIT. XCIII.

De his egit Galenus lib. de diff. muscul. 10. & 11. lib. de vocal. instr. dissect. 5. eorum dissectionem, actionem cap. 7. proponit. 7. usque part. 11. 12. 14.

Cum Laryngis actiones motu voluntario absolvantur, musculos obtinuit, qui per suam actionem, quæ contractio est, cartilaginum articulos flectunt & extendunt, & ad latera movent, quo glottis mobilis efficiatur, ejusque rimula latior & angustior reddatur: sic enim decebat; cum vocem ex arbitrio edere debuerimus, sicut & loquelam: etenim nisi lingua mobilis ex voluntate nostra facta foret, profecto neque ex arbitrio loqui potuissimus. Habet ergo Larynx necessario musculos, qui^a duplices sunt alii communes, alii proprii. Communium sex erūt, seu paria tria, si his Oesophagus^a Movetur à musculis propriis quidem sua compositione.

ne, duodecim: quatenus vero communionem habet cum partib. vicinis, ab aliis octo, Gal. 7. usque part. 11. & 12. at de dissect. muscul. 10. & 11. Musculos aspera arteria quatuor proponit, prout in simiis reperiantur, qui eam contrahant & arctent, cum extensæ fuerint, & os hyoideis & guttur revellant: subjungit laryngis musculos proprios duodecim, & his in quibusdam animalibus circa arytenoidis basin musculum unum bifidum, vel duos connatos reperiri, qui guttur claudant. Sic lib. de vocal. instr. diff. 5. tria paria communia facit, in quorum numero transversum gula musculum recenset: Vesalius & Fuchsius sunt 20. communes 8. sex primæ cartilaginis duo epiglottidi inserti, proprii 12. Plac. tria paria communia omnibus in confesso sunt, quareum addit Vesalius, quod solum ruminantibus concedit Fallopius, contra Vesalius etiam in porco; propriorum paria sex, Avicenna & Sylvio. 18. Columb. 14. communes 5. proprii 9. Fall. 14. communes 6. proprii 8. Piccolh. 14. communes 4. proprii 10. & horum primus & ultimus simplex est, vocat musculos vocales vocemve edentes: Laur. 14. communes 4. proprii 10. quinque utrinque Aqua: 16. com. 6. proprii 10. Plac. 13. in homine, communes 4. qui per se degluntioni, secundario laryngi inserviunt; proprii vero 9. addit aliquos 32. recensere.

phagæos jungas, qui tamen laryngi non nisi per accidens famulantur, proprie vero deglutitioni inservire & ad faucium musculos referendos esse, supra monuimus: qui communes dicuntur, quod non à larynge sed ab aliis partibus enati, in eam inferantur & totam laryngem manifeste moveant: de his primo^b, cum primi sub aspectum cadant, & primo demonstrandi veniant.

^b Sic & Gal. de vocal. instr. 5. Col. Fallo. Piccolb. Laur. Aquap. Placent. at contra Vesal. & Plat. Gal. de diss. musc. 10. musculos aspera arteria vocat. c. 1. par. Colum. Piccolb. Laur. & Placent. hic & inferioris laryngis, musculos vocat. 2. par. Vesal. Fallop. Plat. Aquapend. d. Carnei, sed non lato principio, Vesal. carnes, & acuto principio, Plat. carnosus, Colum. Piccolb. Aquapend. membranosus, Placent. e. Plat. secundum arteriam, Vesal. super arteriam, Columb. Piccolb. Placent. fere supra Aquap. per latera. Laur. f. Galeno à

I. ^c Par communium [tab. 32. f. 7. xx.] in anteriore laryngis parte situm est, utrinque unus quos Bronchios vocamus, eo quod arteriæ asperæ perpetuo adhæreant, cujus longitudinem etiam adæquant; siquidem à pectoris ossis parte superiore & interna ad jugulum, principio lato^d & carnoso exorti, fibrisque rectis præditi sursum secundum^e asperam arteriam carnosius pauloque latiores redditi, producuntur, & in thyroeidis^f cartilaginibus latera inferne juxta glandulas sine lato carneo, in homine quidem uno, inferuntur: at in quadrupedibus circa medium bifidi & in plerisque portione una in laryngem, altera in os hyoeidis insuntur: longissimi sunt, quia non solum thyroides, sed & p^g totus larynx movetur: imo in gravioribus vocibus totus larynx deorsum movetur & aspera arteria in membranosis spatiis contrahitur, quare ipsi fistulæ adhærent. Sunt tenuissimi, cum magnum robur non requirant, larynge ob pondus facile descendente: nihilominus tamen in eorum corpore inscriptiones^h nervosæ conspiciuntur, quales in rectis abdominis musculis reperiri diximus, à quibus robur accipiunt, cum longi sint, & ob tenuitatem debiles: Horum usus, thyroideum deorsum trahere, infra constringere, & sic rimulam in gravi voce dilatareⁱ & una non nihil asperam arteriam contrahere, ne quicquam, cum homo vocem edit, reduplicetur, & larynx superne plurimum dilatetur.

II. Par^k communium [tab. 32. f. 3. h.] quod in anteriore laryngis sede locatum est, Hyoeideos, vel rectius Hyothyroideos constituit, qui prioribus opponuntur & longæ breviores sunt: hi ab ossis hyoeidis tota pene inferiore^l sede sive basi lati carnosique exorti, internisque lateribus quasi continui, fibris rectis à deorsum sensum progredientes & lateribus internis mutuo abscedentes, singuli in thyroeidis partem inferiorem sive mediam & externam lato & aliquantum obliquo sine, ipsam fere totam contegentes, implantantur. Horum usus thyroidis partem inferiorem dilatare, superiorem constringere, & laryngem sursum trahendo rimulam^m breviorē & angustiorē reddere: hinc in voce acuta larynx sursum recurrit: quod si oblique posterius musculus progrediatur, tum sursum & antèrè thyroideum movet. An breviores, idcirco, quia os hyoeides ab aliis musculis sursum motum, laryngem quoque totum sursum impensius trahit, sic quæ larynx non solum ab his sursum trahatur?

III. ⁿ Par

thyraide incipiunt & in os pectoris inferuntur. ^g Gal. de de vocal. instr. 7. ^h Plat. quia laryngem, os hyoeides & linguam corpora magna movent. ⁱ Vesal. Col. Plat. Piccolb. Laur. Aquap. contra Fallop. in Instit. ipsam deorsum trahendo, rimam laryngis coarctare, creduntur. Gal. de vocal. Instr. 7. dilatare dicit: at 7. us. part. 12. contrarium statuit: Placent. deglutitioni per se inserviunt, secundario laryngi, ubi larynx deorsum fertur, thyroides paulatim inferne trahitur, cui rimula angustia succedit, quæ voci acutæ auxiliatur. ^k 2. par. Col. Piccolb. Laur. Placent. cui & superiores laryngis musculi: 1. par. Vesal. Fallop. Plat. Aquap. ^l Vesal. Plat. Placent. à lateribus hyoeidis, Col. Piccolb. Laur. ab hyoeidis humilibus lateribus, Aquap. ^m Vesal. Col. Plat. Piccolb. Laur. Aquap. contra dilatare voluit Gal. 7. us. part. 12. thyroidei sursum tracta, ligulam dilatare videtur, Fall. Instit. deglutitioni inserviunt, & ubi sursum fertur larynx contractus & scutiformi paulatim mota rimula dilatatur, & vocibus gravioribus sit accommodata, Placent.

III. ¶ Par communium sive Oesophagiarum [tab. 32. f. 7. h.] quod in posteriore laryngis sede oesophagiarum constituit, hi toti carnei & amplius oesophagi parti superiori incumbunt, quem Sphincteris modo, ut Galenus loquitur, transversim & quidem latitudine trium digitorum amplexantur, & fere adherent: à lateribus ° thyrocidis secundum eorum longitudinem, ubi linea asperior occurrit, prorumpunt & fibris fere transversis supra oesophagum feruntur & extremis coeunt, ita tamen, ut linea candida per longum ducta distinguantur, maxime in brutis, cum saepe in homine non conspicitur, & fibræ perpetuæ, non divisæ, reperiantur, ita ut unus musculus videri possit. Horum usus, quatenus thyrocidis latera contrahunt, eam comprimere, rimulam constringere & angustare; quatenus vero oesophagum in orbem cingunt, & in seipsos contrahuntur, motu quodam voluntario deglutitionem adjuvant, & facultati naturaliauxilio sunt, quemadmodum libro secundo monuimus, & supra inter musculos faucium, quo referendos censuimus. Nunc ad proprios.

Propriorum P decem sunt (seu paria quinque) quorum sex dilatant, quatuor constringunt: proprii, dicti, quia & à larynge, cui adnascuntur, oriuntur, & in eam desinunt, huicque uni serviunt, rimulam aperiendo in inspirationibus, & claudendo in expirationibus, cartilagineas duas simul committendo, qui vocis formationi primo & per se auxiliantur: horumque alii antèrius, alii postèrius, alii exterius, alii interiorius positi sunt.

I. Par 9 propriorum [tab. 32. f. 4. f. at fig. 6. alter separatus, alter in sua sede] quod antèriores & exteriores constituit, Cricothyroideos anticos nominamus: hi in inferiore & antèriore laryngis parte positi, à ° Cricoidis is parte antica & externa carnosì (sed exigui, fibris obliquis donati) exorti oblique, delati in thyrocidis latera interiorius (media parte excepta) toti carnei latique implantantur; & si thyrocidis processum infimum à cricoide separe, & sectione prosequaris, unum in parte qualibet esse videbis.

XXX

Horum

Piccolh. oesophagi potius quam laryngis musculi, Laur. unicum esse, nec inter communes laryngis recensendum, cum deglutitionis musculus sit, & laryngi, non nisi per accidens, famuletur, dicit Plac. o Vesal. ex stomachi postica parte orti, lateribus prima cartilag. implantantur: sic & Plac. qui addit, forte à ligamenti potius illius loci pronasci: Laur. ab oesophago nati in thyrocidis latera: Col. à scutiformis lateribus oritur, quare Galenum & Vesal. reprehendit, quod ab oesophago oriri voluerint: Fallop. Instit. à 1. cartilag. ortum gulam amplexatur, & ab ipso rima constringitur: Piccolh. à latere dextro scutiformis supra oesophagum progrediens simili sine in latus sinistrum terminatur: cuius officium partes laterales laryngis ossium vescutiformium perstringere, qui laxatus easdem dilatarisinit. P. Proprii gutturis seu laryngis musculi, Gal. dissect. musc. 11. facit 12. Gal. Ves. Fuchsius, Gorreus, Plac. at Piccolh. Laur. Aquapend. 10. Col. Plac. 9. Fallopius 8. q Gal. 7. us. part. 11. de vocal. inst. diff. 5. duo facit paria: secuti sunt Vesal. Sylv. Fuch. volentes alteros alteris superpositos & se fibris ad X. litera similitudinem intersecare: par externum à prima cartilag. ortum deorsum procedere: par internum à secunda cartilag. prodire & prima cartilag. implantari (hoc ita falsum, ait Colum. ut nec in homine, nec in brutis reperitur, idem Fallop.) aliquando tamen unicum utrinque reperisse asserit Vesal. utrumque par Vesalii proponit Plac. 1. par & unum Col. Fallop. Laur. Aquap. Plac. 2. & 3. musc. propriorum Piccolh. Fallop. in Instit. scribit se Vesalii alterum par nullibi adhuc invenisse, sed forsan doceptum à fibris musculi interioris, quem 5. numerat, cuius fibra ablato priore musculo, apparent, eo modo, quo musculus thoracis interior, tanquam pars musculorum intercostalium foret, decepit. At Vesal. in Apolog. se alium à spina prima cartilag. oblique ductum comperisse affirmat. Gale- nus videtur excusandus, ut qui in lib. de diss. muscul. pro uno tantum paria numeravit, & sic tacite seipsum castigavit, quod in secunda editione minime fecere Vesalium, nec Valverda. 1. Ab innominata, sive cricoide in thyroideam, Col. Fall. Piccolhom. Laur. Aquap. & Colum. reprehendit Vesalium, quod velit, à scutali oriri, & in innominatâ desinere, cum innominata motu careat, & omnis musculus ad suum principium trahat. Verum Plac. à thyroide in cricoideam tendit, quare Thyrocricoideus rectius vocari.

n 2. par musc.
laryngis à poste-
rioribus thyro-
cidis extremi-
tatibus gula in-
seruntur, ipsam
perinde ac sphin-
cteres compre-
hendentes, diff.
musc. 11. 3. par
thyrocidis pro-
prium musculi
transversi ex
obliquis thyroci-
dis partibus oriri
in orbem sto-
machum com-
plectentes simul
inter se coeunt.
7. us. part. 11. 3.
par. Vesal. Fal-
lop. Plac. Aquap.
pend. quigula
potius quam
laryngi adnu-
merandum cen-
set. 5. Musculus
oesophagi cõ-
plectens, qui in-
nicus & deglu-
titioni opem
præstat, Colum.
1. propriorum,
qui unicus,

inferiores laryngis partes adstringere, inferiorem meatum claudere, primam cartilaginem secundam applicare, Galenus asserit: Vesal. & Plat. primam & secundam cartilaginem invicem adducunt, laryngis rimulam clausuri: Aquap. de horum usu hucusque anceps fuit: Piccolh. inferiorem glottidis partem recte constringunt, ut superior amplifictur: Laur. thyroidem constringunt, superiorem laryngis partem dilatant: Plac. seu-

inferiores laryngis partes adstringere, inferiorem meatum claudere, primam cartilaginem secundam applicare, Galenus asserit: Vesal. & Plat. primam & secundam cartilaginem invicem adducunt, laryngis rimulam clausuri: Aquap. de horum usu hucusque anceps fuit: Piccolh. inferiorem glottidis partem recte constringunt, ut superior amplifictur: Laur. thyroidem constringunt, superiorem laryngis partem dilatant: Plac. seu-

Horum munus, thyroidem ^csuperne deorsum movere cricoidei jungere, thyroididis partem inferiorem constringere, superiorem dilatare, & sic laryngis rimulam aperire.

II. Par ^cCricothyrenoideos posticos constituit [tab. 32. f. 4. & 5. f.] hi in posteriore sede cricoidei locati, à cricoideis ^apartibus infimis & posterioribus, angusti & carnosi exorti, sursumque delati [tab. 32. fig. 5. f.] cavitatem levem in postica cricoidei facie œsophagum respiciente musculorum gratia factam, opplet, & tandem amplius validique fibris quodammodo ^xobliquis à cricoidei linea aspera extuberante seu spina, in inferiorem arytenoidis partem, qua cricoidei articulatur utcumque nervosi inferuntur. Horum munus, tertiam cartilaginem ad exteriora laryngis retrorsum vertere, rimulam aperire, & versus latera dilatare, & ad vocem gravem conferre. At quatenus fibras rectas & obliquas habent, eatenus moribus mixtis interserviunt; rectis rimulam retrorsum revellendo aperiunt; obliquis vero, motui ad latera conferunt, ut tum in longitudinem, tum in latitudinem rimulam ^yaperiant.

III. ^zPar seu Cricothyrenoidei laterales [tab. 32. f. 4. r.] hi à cricoide ^acartilagine, ubilior est, carnosi exoriuntur, dein sursum recta progressi, ampliores carnosioresque redditi ad arytenoidis latera ad articulum inferuntur, & sedem totam radices tertie cartilaginis, quæ non tangitur à priori pari, occupat. Horum munus arytenoiden utramque, quantum quintum par ad mutuum contactum traxit, tantundem exterius diducere & alteram ab altera separare, sicque ^brimulam in latus distendere & laryngem aperire. Verum, cum hi partim extra, partim intra capacitatem sui sint, forte parte exteriori aperiunt, interiore vero adstringunt.

IV. ^cPar, seu Thyroidei interni, sive Thyroarythnoidei [ta. 32. f. 4. e. & 32. f. i. e.] in laryngis capacitatem transversi positi, carnei, lati, variis fibris iisque invicem unitis donati, inscriptionibus quibusdam in principio, ac fides ^dessent musculi, notati: hi

princi-

sum movent, ex quo laryngis rimula thyroide aliquo modo arytenoiden comprimente paululum constringitur & ad a-cumen vocis efficiendum aptior evadit. ^c 2. par. Col. Fallop. Laur. Aquap. cui & posteriores primi: Plac. cui etiam à forma Cucullares, & quia dorso cricoidei incumbunt pectorales seu Thoracei dici possunt, & à figura divisi & elevatos inspicimus, avium alii similes conspiciuntur, quare Alati vocentur. 3. par. Vesal. & Plat. 4. & 5. proprius, Piccolh. ^u A 2. cartilagine in tertia radice. Ves. Plat. Col. Fall. instit. Piccolh. Laur. Aquap. dens, at Plac. ab arytenoide membranosi enati in cricoideum inferuntur.

^x Recta parum procedunt, Plat. fibris rectis præditi Piccolh. recta ascendens, Laur. ^y Fallop. instit. Plat. Piccolh. glottida aperire creduntur, Laur. ^z par. Col. Fallop. Laur. & Plac. 4. par. Ves. Plat. Aquap. cui & interiorum primum: 6. & 7. proprius, Piccolh.

^a A 2. cartilag. tertia inseritur, Ves. Fallop. instit. Plat. Aquap. ab annulari emergunt & in 4. & 5. ostervantur: (non autem in scutalem, ut voluit Ves. ait Col.) Col. Piccolh. ex arytenoide in annularem cartilaginem desinunt, pyramidalis figura induta, quare Arytenothyroidei seu laterales dicendi, Plac. ^b Rimulam aperire etiam Galenus statuit, Aquap. Glottidis anteriora adstringunt, posteriora dilatant, Col. Piccolh. Laur.

^c 4. Col. Fallop. Laur. Plac. 8. & 9. proprius Piccolh. 5. par. Ves. Plat. quod Valverda in opere Hispanico nunquam in conspectum venisse asserit: Aquap. cui & interiorum par alterum.

^d Vesal. Plat. Fallop. instit. triplex exortus assignari potest, superior, inferior & medius: superior ab epiglottidis radice interna & c. glottida magna ex parte constituunt, Aquap. varietate fibrarum rectarum obliquarum tum ascendentium, tum descendentium non pauci decepti, plures, quam duos describere: aliqui fabrica non recte inspecta, particulam huius superiorem ad epiglottidis basin ascendere existimarunt, quod non est, Placen. Hos alii unum constituunt, alii duos, ut Gal. qui interdum bifidos esse, interdum duos connatos dicit, de dissect. musc. II. unicus est musculus, quia unico motui substituitur, quamvis in capreolo in tres dividatur propter sui latitudinem, Aquap.

principiis contiguus à thyroidis parte interiore sima & media (cujus cavitatem internam opplent) secundum totam longitudinem prodeuntes, fibrarum ductu obliquo sursum ascendentes & angustati, in latera arytenoidis, quæ glottida efformant, rimulæ ductum sequentes, inferuntur. Hi propriorum maximi sunt & robustissimi, ita ut fere omnes alios laryngis musculos simul sumptos æquent, & id, quia in spiritus cohibitione omnibus thoracis musculis resistere debuerunt: nam hi arytenoidis partes ad thyroidem trahendo, easque constringendo, & glottidem in anteriorem partem comprimendo eam claudunt; quare & laryngem claudere dicuntur. His musculis, si inflammatio accedat, Angina exitialis invchitur, nihil ruboris, neque in faucibus, nec ore, nec cervice exhibens: nam in angina aliquando sternon^e & cervice rubent. Rubet sternum propter musculi bronchii continuitatem: rubent cervicis latera, propter œsophagios: & colli anterior superiorque pars propter musculorum hyothyroidæorum continuitatem.

V. f Par seu Arytenoidæi [tab. 32. f. 4. & 5. g.] exterius & posterius supra cartilaginem, ubi arytenæi vasis effigiem refert, siti sunt, & ubi œsophagus laryngi committitur & tertia cartilago secundæ articulat: à postica arytenoidis linea exorti fibris oblique ascendentes ad medium ejusdem progrediuntur, ac ubi duæ cartilaginis partes invicem colligantur, simul conjunguntur & inferuntur. Hi breves^h sunt & exteri^{us} pyrifformes, intus vero cartilagini connati; at in medio, ubi se conjungunt latiores & crassiores, ubi etiam linea alba occurrit, & tendine quasi communi uniri videntur, cum nervoli evadant, idque roboris gratia, ne in perenni motu, maxime in cohibita respiratione periclitentur: quare ab aliis pro uno, ab aliis pro duobus musculis recensentur: & cum utrinque^e carnosus sint, inter eos connumerandi sunt, qui tendinem in suo medio habent, quemadmodum musculus maxillæ inferioris quintus Digastricus dictus, & ossis hyoidis quartum par. Horum usus arytenoidem ad latera seu ad dextram sinistramque movere: imo arytenoidis basim^k constringere, duas ejus partes adducere, invicem comprimere, & rimulam claudere & arcere; quo ostenditur, Cartilaginem tertiam necessario geminam esse: nam si simplex esset, ab his constringi non posset, nec à præcedenti pari occludi, nec à secundo & tertio pari aperi potuisset. Et musculis his^m internis inflammatis, angina acutissima generatur: his enim tumentibus, ob materiæ copiam, spiritus exitus prohibetur, ita ut homo citissime suffocetur.

Ufusⁿ musculorum laryngis tam communium, quam propriorum, laryngis cartilaginebus motu voluntario ad vocum modulationes pene infinitas, movere, ut dum

Xxx 2

pars

duos esse voluerit: Fallop. unus videtur, qui lingula partem dilatat; at in inst. 5. par fecit, quemadmodum & Laur. 10. proprius solivagus, Piccolb. Unicus musculus est, Placent. 3. par seu posteriores duo, Aquapendens. g Basim arytenoidis Gal. vocat, & simia deesse, 7. us. pars. 11. censuit, hoc negat Aquap. h Minor in universo corpore non reperitur, Columb. Piccolb. Placent. cui & semicircularis. Riol. unicus musculus orbicularis, circumdans arythenoidem. i Etsi duos perobscuros ventres obtineat, quibus quintum par efficere videtur, unde vulgo 10. musculi numerantur, fabrica tamen & usus unitatem illius perspicue testatur: Si geminus est, actionem duplicem & oppositam edet: si ad suum principium contractus moveatur, sed cum simplici motu solum agat, unicus tantum erit, nisi contra natura præscriptum illum operari existimes, Placent. k Ves. Fallop. inst. at Plat. lingulam aperit, Piccolb. glottidis pars adstringitur, anterior vero diducitur; Laur. aperit fistulam. l Sic & Vesal. m Fall. in inst. n De musculorum laryngis actione, lib. de vocal. instr. diss. 7.

c Hipp. 3. Prog.
20. & Coacis
aphor. 365. qui-
bus una rubent

Er fauces &
cervix & pe-
dus, longiores
quidem sunt il-
la angina, sed
maxime ex iis
evadunt quare
respon. ex 6.
aph. 25. & ex
coacis aph. 366.
Erysipelas ab

interioribus ad
exteriora ferri
bonum: contra
2. epid. sect. 2. &
5. epid.

f 6. par Vesal.
Fuchsi, Plat.
(cui ex radice
tertia oriuntur
& ad ejus me-
dium finiunt)
qui duos faci-
unt; at Col. 9.

musculus est
& unicus ob fi-
bras continuas,
etsi Vesalius

6 *Piscollom.*

pars ipsius, potissimum superior apte dilatatur & constringitur, seu aperitur & clauditur, rimula ipsius, quod proprium vocis instrumentum, vel dilatetur in voce gravi, vel constringatur in voce acuta edenda, quod sane muscoli communes manifestius, proprii obscurius agunt. Hi à musculis ° hyoidis & linguæ diversi sunt: nam si his quiescentibus manu laryngi admota canere velis, in vocibus gravibus edendis, laryngem deorsum, quasi præcipitari, in acutis vero eam sursum ferri percipies.

De Cartilaginibus Laryngis.

CAPUT XCIV.

De harum dissectione Galenus lib. de vocali instrum. diff. 4. 7. us. part. II. & 12. 17. & 18.

Cartilagines laryngis ^a quatuor sunt, thyroeides, cricoeides, & arytenoides ^b gemina, quæ musculis extrinsecus remotis, asperæ aliquantulum sunt, quo musculis principium & insertionem largiantur: interius vero, cum membrana succinguntur, læves sunt, & humore quasi mucore suffunduntur: ex his tres moventur ad vocis modulationem, sola cricoeides immobilis est: & harum prima & secunda in senescentibus ita duræ, ut ossæ videantur. Verum larynx ex cartilaginibus, non ossibus ^b constare debuit, propter rationes antea explicatas.

Prima quæ maxima & anterior, *Jupoειδης*, ^c aliis *αανδοειδης* (*ααν* enim clypeum significat) scutiformis, seu clypealis à ^d forma dicitur [tab. 33. f. 2. & 3. tota.] Figura enim scuto antiquorum prælongo similis & veluti scutum ventre concavo, dorso gibboso aliis præponitur. Etenim ossi hyoidi subiecta partem anteriorem tegit, eamque tangimus maxime in virorum gutture, in quorum magis, quam in mulierum proni-
net, & tuberculum obtinet, quod pomum Adami ^e dicitur, eo quod Adamo Dei mandatum altius rimanti & paventi, fatalis pomi buccella ipsius gutturi hæserit, à muliere credula jam deglutita: imo potius, quod in femina glandulæ ad laryngem positæ, earum collum exæquent. Quadrilatera est, propter processus ^f quatuor quos parte posteriore obtinet, cum posterius lateribus non uniatur. Unica est, sicut in ejus medio

^a Ex tribus tota fere antiquitas constare voluit & Gal. 7. us. part. II. & 12. & 1. loc. aff. 6. thyroide, cricoide & arytenoide, & c. Ves. Fallop. Plat. Laur. Aquap. Placent. ex qua tuor, thyroide, cricoide, & arytenoide duplicis Colum. ex quin que ossibus, & Picco. ex 5. ossib. siue durioribus cartilaginibus, quorum duo scutum referunt, tertium innominatum, duo unica tunica cincta, arytena formam referente, Aquap. pennatorum larynx ex duobus tantum arytenoide & innominata constat, deest scutiformis cum hujus usum alia suppleant: deest quoque epiglottis & tota glottis ab arytenoide perficitur & musculos tres habent. ^b Ossæam observavit, Col. duo exempla habet Cardan. libr. 2. contradi. tractat. 2. Bonania suspensi, qui ut mortuus paribulo solutus, vivus inventus est, alterum lib. 14. de varietate rerum, cap. 76. qui suspensus miraculi speciebus servatus, tertio judicii solertia perit: Cartilaginea est larynx usque ad primum senium. postmodum ossæ fere evadit, Aquap. ^c Diff. muscul. 10. & 11. vocal. instr. 4. & Jupoειδης; Avicen. Clypealis, peltalis, scutalis; Alliabbati modo umbro, modo ab anteriore ejus prominentia, malum granatum. Anticam etiam dici à situ, monet Laur. ^d 7. us. part. II. cui & 1. cartilago, quæ scuto non rotundo undique, sed prælongo, quod proprie scutum appellamus, diff. vocal. instr. 4. Vesal. adhuc Turcarum aliqui in navibus præsertim utuntur. ^e In viris ut plurimum, in feminis raro conspicua, Placent. ^f In bove superne duo evidentissima foramina. ut per ea nervorum recurrentium propagines ferantur ad musculos laryngis proprios, Placent. ^g Subinde gemina, & potissimum in viris & hominibus peculiare est, Vesal. duplex est, & testudinis ritu per acutum angulum anteriori unitur, Col. & Picco. interdum per medium in duas partes divisa, plerumque integra & conjunctionis linea tantum apparente, Plat. interdum gemina præsertim in mulieribus Laur. Unica tota censuit antiquitas & fere semper ita est, Aquap. sola imaginaria distinctione separata invenitur, Plat.

medio crebro linea conspiciatur [tab. 33. fig. 2. & 3. inier G. & H.] cæteratum ^h maxima ^h Gal. de vo-
 & latissima, cum dimidium totius ^h capacitatis laryngis comprehendat; quare aliis ^{cal. instr. diff.}
 triplo major, quo laryngem & glottidem undique ambiat, & in homine sede superio- ^{4. maxima, ac}
 ri, quam inferiori amplior est. Connectitur cum osse hyoide, processibus superiori- ^{7. de us. par. 12.}
 bus: cum cartilagine secunda, processibus inferioribus. ^{reliquis major-}

Substantia est cartilaginea, tenuissima, dura tamen, quo glottidem tueatur, & pro ⁱ ^{Hæc quibus-}
 voce efformanda auxilio sit: quæ in senibus aliquando adeo dura, ut ob insignem sic- ^{dam imponere}
 citatem naturæ ossæ particeps sit; & quando ossæ sit, ad latera indurescere incipit, ^{posset, ut istam}
 remanente linea media, angulum cartilagineum referente, quæ tandem quoque os- ^{cartilaginem}
 fescit. Superficies exterior ⁱ convexa, ad parietum extrema utrinque latera, aspera ^{geminam esse}
 conspiciuntur, quo musculorum laryngis communibus pari primo insertionem præ- ^{crederent, non}
 bear, item tertio pari communi œsophagum cingenti exortum. Interior ^{autem unam,}
 laryngis cavitatem oblongam efformet, & quo plenior & elegantior sonus edatur, ^{Fallop.}
 quod à concavis, quam à planis rectius perfici campanæ demonstrant.

Processus ^k quatuor habet [t. 33. f. 2. & 3. IKLM.] supra infraque binos, utrinque in ^k ^{Membranis}
 lateribus singulos: duobus superioribus [t. 33. f. 1. IK.] per ligamentum ^k oblongum ^{vinculis, Ves.}
 ossis hyoidis humilioribus lateribus [t. 33. f. 1. BB.] jungitur, quæ per intervalla ^{Col.}
 puscula oblonga, rotunda ac cartilaginea obtrinet [tab. 33. f. 1. supra K. & I.] quo robu- ^l ^{Mones & de}
 stius reddatur, maxime cum lingua exeritur ac retrahitur. Duobus inferioribus ^{quapend.}
 [tabul. 33. figur. 2. & 3. LM.] qui in homine superioribus breviores sunt (contra
 vero in ovibus) secundæ cartilaginis sinui leviter cavo, capitulo depresso per arthro-
 dian articulat [t. 33. f. 1. L. ad I.] quo thyroides sursum ac deorsum moveatur. Juxta
 processus utrinque; cavitates ^l quasdam recurvas seu arcus obtrinet, quarum superior [t. 33.
 f. 2. & 3. G.] in medio posita minor est, quæ propter epiglottida facta, quo facile & cito at-
 tollatur: inferiores vero [utrinque, ad H.] utrinque una, quo musculi anteriores implanten-
 tur [t. 32. f. 6. f.] Est denique mobilis partim articulatione, partim flexione, articulatione,
 quæ arthrodia dici potest, tum in longitudinem sursum & deorsum articulis innixa trahi-
 tur, qui articuli inferiores sunt ad processus qui cartilagini secundæ necluntur, & id mu-
 sculorum communium pari primo & secundo: tum in longitudinem compressa à
 tertio pari, & laxata à cartilaginis flexibilitate sine musculo. Flexione, propter sui e-
 nim tenuitatem flexibilis est, in latitudinem movetur, in profundum cedit, & iterum
 recurrit, sicque laryngis cavitas attollitur & deprimitur, vel comprimitur & laxatur.
 Uti hujus cartilaginis quadruplex, ad cavitatem laryngis parandam, ad glottida sta-
 biliendam, ad musculis sedem præbendam, ad articulationes propter motum consti-
 tuendas.

Secunda ^m & inferior ^{apertus} annularis [tab. 33. fig. 4. & 5. & 6.] ab annuli forma ^m ^{7. us. par.}
 Galeno ⁿ & Oribasio: similis namque annulo osseo, quem Turcæ ^o sagittas ejacula- ^{ii.}
 turi pollicis dextro imponunt, ut ejus annuli beneficio arcus nervum robustius tra- ^o ^{De vocal.}
 hant: vulgo innominata, ^p quia ab antiquis ante Galenum sine nomine relicta fuit; ^{instr. diff. 4.}
^o ^{Vesal. Col.}

X x x 3

for-
Laur. Aquap.
Placent.

^p Gal. diff. musc. 11. causam dicit lib. de vocal. instr. diff. 4. quod haud facile alicui rei, quæ in mundo nomen sortita est,
 assimilari possit; quare nominis defectu vocatam esse: ut Alher. Magno, quod oculis conspici non possit: Vesal. huic nul-
 lura

lum nomen est inditum, idcirco peculiari quodam modo nomine innominatam vocari potest: Columb. tertium os innominatum, quod annulare voco, & Piccol. cui & circulare: Fallop. altera ab annuli similitudine cricoides dici potest, quamvis ab Anatomicis sine nomine sit dimissa: Plat. & Laur. annulariu.

q postrema car-
tilagini incum-
bit, Gal voc.
in fr. dis. 4.

r De vocal. inf.
dis. 7.

f De vocal. inf.
dis. 4.

f 7. n. part. II.

forte, quia laryngis actiones cum motu fiant, & alia motum praestent: haec vero quasi aliarum fundamentum se habeat, immobilis ac veluti otiosa sit. Scutiformi & subjacet & reliquarum cartilaginum, quas sustinet, basis est: haec enim fistula cartilaginibus infirmis inniti minime potuissent: arteria aspera cartilagini primae & incumbit, cui vinculo jungitur, & maxima sui portione, in posteriore laryngis sede reponitur; & totam laryngem annuli modo ambit, quo sua duritie ejus firmamentum existat. Annulum & circulum perfectum refert debuit; partim, quo laryngis fistula semper pateat, & aeri liber ingressus & egressus concedatur, & ne in laryngis motu fistulae cartilagine semicirculares comprimantur; partim etiam, quo impediatur, ne ab oesophago inter deglutendum rem aliquam crassam vel duram dilatato, fistula, quae respirationis via est, arctius comprimatur, & suffocatio sequatur. Exterius & anterius gibba est, angusta, tenuis & teres, reliquarum fistulae cartilaginum modo [tab. 33. fig. 4. & 5. R.] gibba, ad sui tutelam, & quo cavitatem cum scutiformi pariet, ad sonum faciliorem & gratiorem reddendum; tenuis, ne aerem in thyroidem impellendum impediatur, quod si hac parte latior foret, tum thyroidi locus pro motu defuisset. At posterius, cum partem eam thyroidis non ambiat, latior esse potuit & debuit [tab. 33. f. 4. 5. 6. S.] latior, inquam, annuli palam referens, & depressa, alias sua rotunditate, accedente etiam duritie, deglutitionem impediasset; imo & crassior, maxime versus superiora articuli causa, utque undique rimula muniatur, quo duritie sua glottida stabiliet & tueatur; & inde muscoli aliqui prodeant. In latissima enim & media parte linea aspera eminet [tab. 33. f. 6. T.] quam spinam innominatam cartilaginis Galenus¹ nominat: cujus beneficio cavitas utrinque laevis constituitur [tab. 33. f. 6. V. X.] quo musculorum propriorum secundum par commodius situeretur. At sede superiore & posteriore tuberculum oblongum, utrinque unum obtinet [tab. 33. f. 6. T. Z.] seu processus extuberantes, quos Galenus¹ humeros appellavit, quibus arytenoides [t. 23. fig. 9. ee.] inarticulatur, quo loci semper durior & crassior est, ita, ut quae in puerili aetate cartilaginea fuit, in media & adulta aetate ossea esse videatur. Sede vero media modice quoque extuberat utrinque, crassiorque est [tab. 33. f. 6. N. O.] sinusque occurrit, quo thyroides processibus inferioribus, quibus capita valde depressa sunt, articulatione fere plana ipsi validissime jungatur. Sede denique infima [tab. 33. f. 4. 5. 6. S.] velut processus quidam deorsum dicitur, quo inde musculorum propriorum tertium par exoritur.

¹ Haec quanto prima est minor, tanto tertia major existit, est etiam strictior, quam fistulae inferna basis sit, quare totius laryngis pars inferior amplior est superiore orificio, quod in faucibus est: omnium durissima & crassissima (licet eandem crassitiem undique non habeat) cum alia huic tanquam basi innitantur; quare & immobilis, quo supra hanc reliquae & moveantur & articulentur, & in eam aliarum muscoli firmentur. Connectitur etiam thyroidi membranarum ceu vinculorum opera a prima ad secundum productorum, quae gemina sunt, quemadmodum & ea, quae secundam cum

cum tertia copulant, docente Galeno^u illæque membranæ non modo mediam cricoidis partem, sed etiam universam thyroididis basin, obducunt.

Tertia^a in lateribus est, [tab. 33. f. 7. 8. 9.] priori, sed intra thyroidem insistent & *αριστερὴ*, seu guttalis dicitur, quod gutturnii^y formam representet, si duo processus superiores, membrana adhuc obducti perpendantur, vel quod illi collarum parti, qua manus lavaturis aqua affunditur, similis sit, quam *ἀριστερὴ*^z Græce, Guttur-nium Latinorum aliqui appellant. Hæc communiter pro una^a cartilagine recensetur, eo quod ex toto invicem separatæ non sint, & simul sumptæ, & non seorsim actionem absolvant, & pro diversitate subjecti, ut plurimum figura variat; quare deum tu-nicis adhuc recta est, triangulo imperfecto assimilari potest. Quod si vero membranis, quibus obtegatur, liberes, ex duabus cartilaginibus compositam conspicies [tab. 33. f. 7. 8. 9. 10. 11.] siquidem duntaxat ligamentorum & membranæ laryngem succingentis beneficio infra supraque laxè committantur, in medio vero dehiscant. Hæc in sui medio, ubi crassior est, articulum adepta est, quo cricoidis summitati cesophagum spectantis applicetur, & cum cartilago duplex sit, duplex quoque articulatio est, quæ cavitate sua, seu sinu utrinque [tab. 33. f. 8. 9. 10.] cricoidis extuberantias [tab. 33. f. 6. 7. 8.] excipiant, quo commode coarctari & dilatari possit. Substantia est ab aliis diversa, reliquis mollior, quo ad motum musculus majoribus non indigeat; tenuior, pinguior, humidior, ne ab aere calidiore exsicceetur, aliusque multo minor, ne meatus angustior fiat.

Processus habet superiores & inferiores: Superiores [tab. 33. f. 7. 8. 9. 10.] qui simul juncti vasis aquarii seu gutturnii figuram exprimunt, exterius recurvantur, ne interius propendeant, sicque cavitatem implendo spirituum transitum liberum impediunt: laxi sunt, molles, pingues, flexibiles, quo totius glottidis motum sequantur; hi ex toto invicem separati non sunt, ne forte una ab altera distrahatur: quare in homine superne membrana junguntur; in porcis vero una esse videtur. Hæc pars adeo mollis & flexilis est, ut in vomitibus antrosum in laryngem reclinetur, quo arteriam exquiesceat, ne ex vomitu arteriæ aliquid illabatur, & ad pulmones deferatur.

Inferiores vero processus, *γλωττιδα*, seu rimulam modulandæ voci accommodam constituunt, qua parte ex toto divisi sunt [tab. 33. fig. 7. & 9. 10.] cum rimulam mobilem liberamque esse oportuerit; nisi enim transitus angustus sit, vox fieri nequit, cui præcipuum vocis articulatæ tribuitur. Hi quoque in laryngis cavitate media, membrana pingui obducuntur, quo rimulam firmiorem efficiant. Mobilis est arytenoidis, cum larynx citra motum angustari & dilatari rursus non possit; quare utrinque ad partem inferiorem musculus inferitur.

Articulationis vero arytenoidis cum cricoide motus quadruplex est, flexio, extensio & ad latera motio, sicque sursum deorsum, dextrorsum & sinistrorsum movetur; per flexionem arytenoides in cavitatem pellitur, à quarto pari proprio musculorum ad rimulam occludendam: per extensionem, extrorsum revellitur, à secundo par-

Piccol. ex duplici cartilagine, Fallop. Gorrao, Aquap. utrinque una arytena dicta, Plat. Anatomicis fere omnibus simplex, nobis semper gemina visa, Laur. interdum unica, ut in homine, interdum duplex, ut in quibusdam aliis reperitur, quod primus Fall. notavit, Plat. in suilla unica videtur, quam Galenum descripsisse constat, ac forte etiam priscos, Aquapend. b Vide 7. us. par. 16. Vesal. Columb.

u Lib. de voc.

αριστερὴ.

7. us. part.

11.

x 3. Cartilago

Gal. de vocal.

instr. diff. 4. 7.

us. part. 17.

quartum &

quintum laryn-

gis, ut Col.

y Guttur-nii in-

fundibili for-

mam representa-

tar, Gal. diff.

mus. 11.

z De vocal. in-

str. diff. 4. Theo-

philus ligneum

vasculum dixit

quo Nauta a-

quam ex navis

exhauriunt, &

Olitores ad hor-

tos irrigandos

utuntur; quod

Vesalio non pla-

cet: inter vasa

balneariorum

numerat Pol-

lux lib. 10. oris

vasis olearii

assimilis, Gor-

rao, Laur. cui

& postica dicitur

à sinu, quod

posterius sita

est.

a Terriam car-

tilaginem om-

nes pro una de-

scribere, cum

membris

suis liberata,

ex duabus com-

stituatur, Ve-

sal. ex binis of-

do pa-

sibus 4. & 5.

constat. Col. &

do pari priorum, ad rimulam aperiendam: rursus per motum ad latera, à quinto pari ad eam coarctandam conjunguntur, quemadmodum à tertio pari ad rimulam dilatandam separantur. Differt autem arytenoidis flexio & extensio, ab aliorum articulorum extensione & flexione, quod in cæteris unus motus alterius gratia fiat: at in arytenoide ambo per se utiles sunt: flexio quidem, ad rimulam constringendam, quo spiritus cohibitio & consequenter vox fiat. Extensio vero, ad ipsam dilatandam, quo spiritus copiose recipiatur.

Sinus inter arytenoidem & thyroidem ad latera glottidis à membranis cartilagineis alligantibus efformantur, in quos si epiglottide propter risum aut loquelam inter comedendum aut bibendum aperta, aliquid cibi vel potus illabatur, quia subito contra respirationem feruntur, tussim excitat, ubi natura summo conatu ea expellere nititur: horum sinuum usus aerem attractum, ne impetu illabatur alterare, quemadmodum ab auriculis cordis fieri solet; qui sinus in canibus ventriculis similes sunt.

Ubi minor cartilago, quæ intus est, desinit, duæ superjacent parvæ convexitates, 7. us. part. 11. vide & cap. 13. de laryngis duplici sinu nihil penitus scripserint, quod scimus, quot quot à Galeni temporibus auctores extiterunt, præter Casparum Bauhinum, &c. Hæc Severinus Pinus in præfatione opusculi sui Anatomici: inter ligulam & epiglottida sinus membranosos à veteribus non descripti, qui aeris sunt conceptacula, Laur. Hos ventriculos à Galeno inventos Vesalius fictitios asserit, sed experientia Vesalium confutat. Verum cuncta animalia his meatibus haud sunt prædita, cum soli porcis, evidentius equis & quibusdam aliis, canibus præsertim id tantum commune ac familiare sit, Placent carvitates in porcis ventriculis similes, partim à scutiformi, partim à musculo interno scutiformi proximo, qui tanti sunt, ut possint non difficile digitum deorsum in eos immittere: quos ventriculos non modo in porcis, sed etiam in equis observari; omnia terrestria animalia obtinent ante rimam & ad rimam, sed alia exiguos, alia majores, alia maximos: equi & sues maximos, homines habet, sed non ita profundos: simia media est, qui ad spiritus cohibitionem faciunt, dum ex toto glottis clauditur, & omnibus thoracis musculus resistit, Aquapendens.

De Glottide & Laryngis rimula.

CAPIT. XCV.

Galen. 7. us. part. 13. & lib. de voce.

a Arist. corpus, quod in larynge, γλῶττις dicitur, non agnovit, imo præter vocem totius instrumenti & epiglottidem nil aliud in larynge novit, Aquap. b 7. us. part. 13. apud Gal. tum interpretum, tum Græci exemplaris vitio, sæpe γλῶττις pro ἐπιγλῶττις, (præsertim in 8. us. part.) ac rursus de verso ordine legitur, Vesal. c Dioscoridi l. i. c. 114 in arundinum genere quædam rufos dicitur, ex qua sagitta fieri solent: alia femina, qua tibiæ ligulas efficiunt: eadem ligula hodie tibiis adhibentur, sine quibus sonus ediri non posset. Ab ea ligularum similitudine, quas ex duabus arundinum laminis compactas, tibiis accommodamus, Ves. Col.

QUOD γλῶττις dicitur, corpus est rimam seu fissuram in larynge constituens, quod vocis edendæ ac confirmandæ instrumentum ^b præcipuum est [tab. 31. fig. 1. d. f. 2. q. tab. 32. f. 4. d.] Sic autem nominatur, quod figura & usus linguae ^b fistulae alicujus similis sit, quare lingula & parva lingua Latinis dicitur (quamvis naturalia artificialibus assimilari non debeant, ex Galeni ^b mente, tum quod natura prior sit arte, tum quod in operibus sapientior sit arte.) Quemadmodum enim vox à fistulae ^c lingula, ita etiam à laryngis lingua vox fit: & quemadmodum homo per linguam loquitur, sic fistula per hanc tanquam per linguam loqui dicitur, siquidem lingua non solum loquelæ, sed etiam vocis instrumentum sit. Intus collocata est, intra arytenoidem

*h. Avicenna
ait, quemad-
modum lingua
dilaturatur ac
constringitur,
ita percussio
vox.*

spirationi famulatur; quatenus movetur, vocis instrumentum est, ad quam forma-
dam duplici motu concurret, ^h dilatationis & constrictionis; dilatatio vocum magna-
rum & gravium causa est: at constriction duplex est, vel ut rimulam angustiorē red-
dit, sic vox acuta & parva; vel omnino occludit, quo spiritum violentius intus cohi-
beat, ad pondera magna attollenda, ad foetus exclusionem & alia. Quare, quatenus
musculosa motum dilatationis ac compressionis praestat: Quatenus cartilaginea, de-
articulationes ad motum praestandum obtinet, & robur ad motum acquirit, ne à
spiritu evertatur, & ad arytenoidis motum & glottis movetur: quatenus membra-
nosa, facile dilaturatur & comprimatur, rima perfecte conformatur, & musculum
tuetur.

*i. Arant. huius
meminit, &
hanc interio-
rem rimulam
praeipuum esse
modulanda vo-
cis sedem existi-
mat, cui glotti-
dis divisio sub-
serviat.*

Verum ⁱ praeter rimam illam ab arytenoide constitutam in interiore cavitate ex
membranarum duarum concursu alia rima in homine tantum efformatur, fistularum
scissuris appositae respondens: nam ab anteriore & media parte cartilaginis thyroei-
dis, membrana qua interius succingitur, in medio è directo glottidis duplex ac soli-
dior efficitur, & per diametrum ad posteriorem laryngis partem perveniens, interiori
annularis cartilaginis sedi non longe ab arytenoide connectitur, ita ut tensa satis
conferretur: inter has membranas duplicatas, rima oblonga à posteriore in anterio-
rem partem ducta [tab. 33 f. 7. 8. 9.] relinquitur, quae thyroide, musculorum benefi-
cio dilatata, latior fit, vox gravis efformatur, contra acuta si angusta reddatur, cui glot-
tidis divisio auxilio est, cum utraque rima eodem momento & dilatari & constringi
videatur.

*k. Plerique pra-
cipuum vocis
organum puta-
runt laryngis
operculum, id
temere ylar-
du & iarylar-
luda vocitan-
tes, cum hac no-
mina diversas
prorsus partes
veteribus si-
gnificent, Ve-
sal.*

Ufus ^k glottidis; Galeno ut sit vocis opifex praecipuus, vel pars praecipua in laryn-
ge, quae actionem, id est, vocem, quae propria huius instrumenti actio, efficiat; cum
aer pertransiens compressus & elusus vocem producat, & vox ^m fieri non potest, nisi
transitus sit angustior: (recte ergo Galenus ⁱ laryngem, sine glottide ad vocem for-
mandam prorsus ineptam dixit, & crystallino in oculo assimilavit) talis autem est,
quatenus movetur, hoc est, dilaturatur & contrahitur: in nostra enim potestate ⁿ est,
osculum laryngis, cum volumus, aperire & claudere, & prout vel arctamus vel laxa-
mus, vocem nunc gravem, nunc levem reddimus nam si leviter ac molliter spiritus
efferatur, exspiratio sine sono fit; si vero repente, simul ac vehementer spiritus effan-
datur, tunc vox vere efficitur. ^o Verum vocis modulanda potius instrumentum vi-
detur probatur ex eo, quod etiam animalia ruminantia licet glottide careant, vocem
tamen edant, sed simplicem & uniformem.

De

17. n. part. II.

*m 7. n. part. 13. & de voce. n 8. de plac. 9. o Vocem acutam & gravem praecipue facit, adjuncta tamen epiglottide, ary-
tenoiden magis minusve claudente, Laur.*

De^a Epiglottide, ejusque musculis.

CAPUT XCVI.

De Epiglottide egit Hippoc. lib. de corde, Arist. 3. par. anim. 3. & 2. hist. an. 12. Gal. 7. us. par. 13. & 16. de vocal. instr. diff. 4.

Επιγλωττις^b & Πηγλωττις Græcis, quasi supra glottida positum, exigua aut minor^d lingua Latinis dicitur. Cartilago est & operculum rimulæ, ne quid inter deglutendum facile in arteriam asperam delabatur [tab. 31. inter fig. 1. & 2. posita est, sed inversa & à fig. 1. ubi aa absècta fuit: at tab. 32. fig. 4. 5. 6. b.] Sita est inter laryngem & linguam; & si membrana linguam obvolvens superficiem inspicias, quæ cum epiglottide continua est, quasi linguæ pars censeretur; quare aliqui, ex linguæ radice or- riginem trahere voluerunt, cum à thyroide potius ortiri videatur. Nam basi ampla & antrosum recurvata à thyroidis parte interiore & elatiore assurgit [tab. 32. fig. 4. * fig. 5. †] modice latefcit, & mox arcuata rotunda fit; at in brutis sensim angustatur & velut in cuspidem acutam definit; basi sua thyroidei annectitur, reliqua parte undique libera est.

Forma folium hederæ, ex divini senis sententia s refert, cum ex lata basi antrosum arcuata rotunda fiat, vel exiguam minoremque linguam, secundum Plinium & Celsum: parte superiore quæ dorsum dicitur, & qua palatum respicit, aliquatenus convexa & extrorsum eminens: interiore vero, qua rimulam, lima & nonnihil cava: latitudine sua non solum rimulam tegit, sed etiam aliquantulum excedit.

Rigida quoque & erecta est natura sua: nam propter firmiorem atque strictiorem connexum in ossis hyoidis cavo, crassioris ligamenti interventu semper erecta detinetur, propter respirationis necessitatem, cum in ea vita consistat: quo arteria asperæ fistula aperta maneat, ne cor suffocetur; flexibilis tamen, quo rimulam, supra quam recurvatur, perfecte claudat, ubi cibus potusque deglutuntur, à quorum pondere deprimitur, ne quid bibendo aut edendo laryngi incidat: hisque deglutitis subito virgæ ritu attollitur & recurrit. Quare substantia ipsius cartilaginea est, & tenuis, cætera cartilagine mollior, ita tamen, ut parte exteriori, qua palatum respicit, mollior, tenuior ac flexibilior sit, & qua laryngem respicit: maxime vero in extremo ad œsophagum insigniter mollis est, & membrana pingui obducta. Nam dum animal respirat, sponte attollitur, ut viam acri faciat: cum autem transgluttit, laryngi

Yyy 2

lyngi

αλίστην claustrum. Erassistrato ab usu claustrum mutuum. d Plin. l. 11. cap. 37. Cels. lib. 4. c. 1. canna pulmonum operculum, Cic. de nat. deor. alius lingula fistula. Gaza linguulam & minorem linguam vertit. hist. 15. & 2. ejusd. 12. apud Arist. Celsi errore delusus, qui permuta, quæ ad Anatomem spectant perperam intellexit, Vesal. e Vocal. instr. diff. 4. quæ ipsius bronchii non est propria. Introd. 11. lingua basi ejusdam musculi interventu circa partem superiorem ossis hyoidis in quadrupedibus cohaeret, & cum laryngis cartilaginibus membranarum nexu, Placen. f Columb. ipsius exortus vel cum ea connexus, Vesal. prodis interius à scutiformi, Plac. firmiter annectitur, Aquap. potius eam contingit quam ei connectitur, idem.

g 4. de Morb. trianguli imaginem exprimit, Ves. modice curvati scuticuli formam imitatur & sensim arctatur in mucronem, Col. in mucronem non valde acutum definit, Laur. trianguli curva quadantenus habentia latera, Aquapend.

a Epiglottide co-
rent ovipara:
sic enim Arist.
linguam illam

minorem ope-
riendi mini-
stram, nullum
ex his qua ova

pariunt super-
impositam sua
arteria conti-
nent: sed modi-

rum ipsum mo-
do trahunt, me-
do laxant pro-

sui commodi
desiderio: at qua
ita efficitur, ne

quid ponderis
in pulmonem
delabatur. 2.

hist. an. 12. na-
tura molita est
minorem lin-

guam qua arte-
riam operiret,
non omnia vi-

vipara eam
obtinere, sed ea
tantum quib.

pulmo, & cutis
pilo infecta, non
cortex non pen-

na operimento
est &c. 3. part.
an. 3. vide & 1.

hist. 16. Ranas
etiam carere di-
cit Plac.

b Aristoteli,
Galeno.

c Hipp. de cord.
at. 2. de morb.

h 7. *us par. 16.*
Et Intrad. 11.
addit: quare
non solum os
claudit arteria,
sed etiam ci-
bum à lingua
veluti ventila-
bro purgatum
Et arteria ori-
ficio impostum
ad stomachum
potius modo de-
jicitur.

i *Voluntarium*
est totius epi-
glottidis opus
aperiendi clau-
dendique arte-
riam Et perfe-
ctio claudendi
efficitur in mu-
sculum referri
debet. Aqua-
pend.

k *Musculus*
tam in homine
quam in brutis
necessarius,
membranosus
Et. Aquap.

vide cap. seq. in

margin. I *Vesal. 4. par communium laryngis qui Galeno incogniti sint: huius pari duos alios qui opposito munere fun-*
gantur se nullo observasse: nec mirum, cum cibus Et potus suo pondere facile comprimant: imo Et illi, qui rectum in-
testinum, Et testes sursum alliciunt, opposita destituuntur, Ves. ex Ves. sententia proponit Plat. addens in bob. duntaxat Et
ruminantibus ipsorum epiglottida valde reflectere cum ruminant, Et voces magnas edant, subiungit, quid si in homi-
nibus, qui facile vomunt, quoque inveniretur, Plat. in bove, bubulo Et ejusmodi invenire poteris, in homine nequaquam
Columb. nulli in homine reperiuntur, Laur. Musculos habet epiglottis, sed quot sint, Et num homines habeant, incer-
tum est. Gal non meminit, quamvis nec simia iis destituatur: in brutis duo muscoli epiglottidi versus basin inserti: in
homine Et brutis unus membranosus versus summitatem insertus: duo adhuc alii bobus evidentissimè claudentes Et. Epi-
glottidis motus sursum per musculos absolvitur, nequaquam sua tantum natura recursum committitur, Aquap. Hi in
homine non reperiuntur, sed bobus, suis, quadrupedibus omnibus: Epiglottidis motui muscoli quatuor destinantur,
duo ab osse hyoide, duo à prima cartilagine prodeuntes, at in superiorem epiglottidis basin ut attollant, implantari, qua
sententia nihil excogitari potest absurdum, Plac.

m *Geminus non est, licet ab osse hyoide principio duplici lato carneo Et ab invicem separato exurgere videatur: at cum*
divisio non multo post originem obliteretur Et ante sui medium uniatur Et unus simplex ad finem progrediatur, satari
cogimur simplicem Et singularem esse musculum, Placen.

n *Hipp. de corde operculum ne ampliore potum transmittat, Aristoteles arteria operculum dum cibi potusque deglu-*
tiuntur. In Intrad. 11. ne quid ex firmioribus humidis in arteriam delabatur: ne quid cibi potusve in laryngem defluat,
Vesal. (addit accurate prohibere) Col. Plac. ne quid de assumptis in illam illabatur, Plat. eorum laryngis claudit, cum es-
culenta Et poculenta deglutiuntur, Piccolh. addit: qui ad moderandam vocem conditum censent, parum rei naturam
inspexerunt, cum glottis non epiglottis ad praesent.

ryngi accumbit, ne id in pulmones decidat: quod enim^h transglutitur ipsius radicⁱ
 primum incidens, post dorso in vectum, inclinare ipsam cogit & collabi: quos motus
 non praestitisse, si fuisset vel membranosa vel carnosà, quoniam vel semper depresso
 jaceret, vel semel depresso difficulter attolleretur, nec unquam erigeretur: vel ossèa,
 quoniam semper erecta atque elevata persisteret, nec delabentibus cibus & potibus
 deprimeretur. Quare cum Galeno epiglottidis motumⁱ in homine naturalem cense-
 mus, & rimulam non musculorum beneficio, sed assumptorum pondere, tegi atque
 retegì censemus. In brutis vero ruminantibus muscoli reperiuntur, ^k quos breviter
 attingemus (ejus nomine, quod in bovis larynge saepius Studiosi exerceantur, in hu-
 mani defectu, cujus nomine in toto hoc opere saepius brutorum, maxime eorum, in
 quibus juvenes exerceri consuevere, ut simiarum, porcorum, ovium, potissimum au-
 tem canum partes, in quibus ab humanis differunt, recensuimus, quo juvenes ab et-
 rore liberemus) si prius monuerimus, epiglottidem quoque membrana obduci piur-
 gui, ligamenti naturam referente, quæ ad cartilaginem thyroideam adipe multa abun-
 dat.

Musculi reperiuntur duplices Hyoglotti & Arytanoglotti dicti: ^l Hyoglotti in
 dorso epiglottidis positi, ab ossis hyoidis parte interiore media^m enati, utrinque in
 epiglottidis basin prope ejus medium inferuntur: qui epiglottidem in cibi potusque
 deglutitione depressam, rursus attollunt, ne exspiratio impediatur.

Arytanoglossi, qui in bobus propter laryngis magnitudinem evidentissimi sunt:
 hi carnosì ab arytaenoide superna ad articulum videlicet exoriuntur, qui ad originem
 contigui & per longum spatium fere uniti & commisti, & per internam thyroideam,
 simili fere crassitie longissime producti, tandem in internam epiglottida ad basin u-
 trinque mutuo sese contingentes inferuntur. Nunc ad usum epiglottidis.

Uusus epiglottidis, glottidem operculi modoⁿ dum super eam recurvatur, in cibi &
 potus

potus assumpti deglutione tegere, ne cibus potusve copia confertim delabatur: nam si quid cibi aut potus in arteriam^o imprudenter delabatur, strangulationes & o Introd. 11. sic tussiles statim excitantur, donec à spiritus impetu excussa efferantur, quia eares descen- Anacreon poe- ta acino uve- passa suffocatus & Fabius se- nator in la- tis haustupilo po- strangulatus fertur. Refert Alexan. Bene- dicti. Brixien- sem matronam ent valde bibendam dederit, maxime porco, hoc enim pecus non est curiosum, ne- filio pilulam que munditiei deditum: dein ubi bibit, ipsius guttur resecat, hoc colore ipsum tin- assumere nolen- ti, digito in ar- teriam impu- lisse, tuncque protinus exani- matum. & absumantur, quo earum portio in laryngem feratur, imitantes Galenum, ^{p Gal. 7. us. par. 17. 2. simpl. 4. Meth. med. 7. q De corde, re- petis Galenus 8. de plac. 9. r 4. Meth. 7. 5. ejusd. 12. Plato, Philo- stenes, Loerus, Dioxyppus Hip- pocraticus, Pla- tarch. 7. sym- pos. quest. 1. quos & Gellius lib. 17. cap. 11. citat. t 4. de morbis. vide Galenum. 8. de plac. ult.} qui ul- cus internæ tunice arteriæ asperæ cura- urus jubet cubanti supino humidum medica- mentum, quod ad ejusmodi ulcus faciat, exhibere, in ore diutissime continere, ac om- nes, qui illic sunt, musculos relaxare & remittere: sic enim sensim & paulatim de me- dicamento aliquid sensibilibiter & manifeste in ipsam arteriam influere.

Quod vero aqua ἀνεδέξεται γυναικός, sive acervatim irruens, ut cum Hippocrate⁹ loqua- mur turbationem, ac tussim multam exhibet, sit propter ea, quod contra respiratio- nem fertur: quod enim per rimam illabitur, tanquam juxta parietem delabens, aeris elationi non obstat, sed le vem ac lubricam viam humectatio ipsi præbet. Exinde se- quitur, male^r veteres statuisse potum per asperam arteriam in pulmones, cibum ve- ro per œsophagum in ventriculum ferri: & licet Hippocrates alio loco^t multis ra- tionibus disputet contra eos, qui potum in pulmones ferri voluerunt, non tamen de omni potu loquitur. Hoc ostenditur his divini senis verbis: Homo maximam par- tem in ventrem bibit, cum œsophagus sit velut infundibulum potus copiam & quæ- cunque volumus, excipiens: bibit autem & in guttur ac arteriam; minus vero & quæ- tum latere possit per rimam illapsam: operculum enim exactum epiglossis, ne permi- scrit quidem aliquid amplioris potus penetrare, hæc Hippocrates. Quare sic Galenus, ^{q 3. part. an. 3.} si potum omnem in pulmonem ferri existimet Plato, merito accusandus est, quippe qui apertissimam rem ignorat: si vero portionem aliquam potus per asperam arte- riam in pulmonem derivare arbitratur, probabile quippiam dicit; & subjungit: si mul- ta potio ἀνέπαυος seu confertim in pulmones influat, ut spirationis vias occupet, tussim excitabit, vocem intercipient, & difficilem spirationem pariet: quod si sensim per late- ra arteriæ asperæ in pulmonem feratur, nec tussim, nec ullum irritationis sensum ex- citabit. Sic de Aristotele statuimus, qui refert, ^u errorem esse, potum meare per arte- riam, quia nullus sit meatus à pulmone ad ventrem, sicut ex ore gulam tendere cer- nimus; si de omni potu loquitur, fallitur. Sed de hac questione satis. Alter

*Alter usus
Laur. cibum
quoque à lin-
gua veluti ventila-
bro purgatum &
laryngis orificio
superpositum ad
æso-phagum, pontis
modo detrudit,
Galen. in 1. seg.
muctore.*

epiglottidis forte usus, aerem vi & impetu à pulmonibus pulsam ad vocis modulationem percutere.

De Membrana laryngis, quæ ejusdem ligamentum existit.

CAPUT XCVII.

*Oritur ex cõ-
muni carnosã
membrana col-
li, quæ in mu-
sculos laryngis
& totum cor-
pus cartilagi-
nosum progres-
sa, undique
sparsa intus de-
lata arytaenoi-
den amplexa,
 tandem ad glo-
tidem pertin-
gens, illi adha-
rescit, Plac.
Placent.*

Larynx succingitur a membrana, quæ cum oris membrana communis est, tam extrinsecus, quam intrinsecus, tutelæ gratia: & quo aer blande percussus vocem suavem ac moderatam reddat. Intrinsecus quidem, cavitatis tota succingitur & laryngis superiori sedi transversim obducitur, & in medio longitudinis divisa, rimulam acquirit. Extrinsecus vero, partim externam superficiem obvoluit, partim & cartilagineas & musculos interius cingit.

Perfunduntur autem humiditate quadam lenta, partim ne respiratio calida, fumosa, siccaque has partes duras reddat; partim, ut epiglottidis glottidi exacte applicetur, & ejus quoque exsiccatio impediatur, quæ humiditas interius copiosior existit, ita tamen, ut in recte habentibus, nec copiosior sit, nec paucior, quam vocis instrumentum requirat, quo perpolita sit, sicque vox jucunda & æquabilis reddatur: humiditate siquidem aliqua imbuta spiritum blande pulsât, unde vocis suavitas dependet. Probatur hoc tubicinum exemplo, qui fistulas seu tubas longiores, sive æneas, sive ligneas inflaturi, illas paululum humectare solent, quo sonus suavis edatur, alias ob nimiam siccitatem, sonus non modo ingratus & durus, sed etiam difficulter redditur: quemadmodum si plus justo humectetur, sonus obtusus causatur: quare & supra monuimus, ab humoribus à capite in fauces delapsis, vocem raucam effici.

Sunt vero aliis membranis fere omnibus crassiores & firmiores: exterior crassissima & laxissima & velut aspera & rugosa. Supra enim epiglottidem laxa & crassa est, qua cartilaginis tertie lateribus colligatur, & inter eam & cartilagineam, potissimum ad basin, pinguedo occurrit. Laxa est, quo facile incurvari & everti supra laryngem possit, & in deglutione, voce acuta & gravi, sursum deorsumque moveri: crassa vero & duriuscula, densaque, cum per eam viam cibi aliquando minus masticari, duri & magni transire debuerint. Hanc carnis fibræ adaugeri & membranam musculosam, tam in homine, quam in brutis evadere, ad epiglottidem attollendam, sunt qui velint: quas fibras pellicula quædam exterius superiusque, ne in ciborum transitu lædatur, obvoluit.

Interior vero tunica, quæ in laryngis cavitate crassior est, quam in ipsius arteriæ fistula, mollis, distenta & lubrica, quia cavitatis per politate paranda erat: at ubi laryngis rima connivet, membræ hæc utrinque ad latera durior, callosaque, à frequenti, dum spiritum retinemus, compressu redditur, & cum substantia etiam colorem mutat, magisque candicat; sed de hac membrana vide supra in arteriæ asperæ historia libro 2. c. 7.

*Aquapend.
Musculus tam
in homine, quã
in brutis neces-
sarius, mem-
branosus, ex
membrana cras-
sissima & laxis-
sima supra epi-
glottida consti-
tente conflatus
fibræ carnis
intrinsecus po-
sit adnatus,
quæ recta ab of-
se hyoide per epi-
glottidis dor-
sum excurrunt, &
versus epiglottidis
summitatem inseruntur,
ipsamque attollunt;
quæ membranam musculosam si
retrotrahas, lingua ligamento similis
videbitur, Aquapend.*

De

Larynx venas recipit à vena jugulari externa [t. venarum V] & quidem ab ejus in-
 teriore portione [in venar. tab. V ad latus interius lit. V] quæ oris interiora subjicit: ab
 hac enim furculi notatū d. g. in laryngem & glandulas ipsi proxime adnatas, & fau-
 cium universam sedem pro nutritione distribuuntur.

Arterias quoque habet: nam ab arteriæ carotidis majore & interiore ramo [tab. an-
 terior. a] fauces subeunte [c.] furculi laryngi & linguæ communicantur, ut vitam calo-
 remque devehant.

^a Nervos recipit, non à spinali medulla in vertebis existente, eo quod obliqui es-
 sent futuri, sed à sexto pari à medulla ^b cerebri prodeunte, qui secundum asperam ar-
 teriam recti deorsum utrinque fertur, & quidem ab ejus propagine majore à qua ner-
 vos inferne sursum recurrit, à dextris quidem, sub arteria axillari ad jugulum: à fini-
 stris vero, sub arteriæ magnæ trunco circa cordis ventriculum sinistram, qui sursum
 proxime ad asperæ arteriæ latera p. grediuntur, & ad laryngē in ramos finduntur, & in
 laryngis musculos, qui capita deorsum habent, distribuuntur: & quidē vel ad principiū
 vel ad medium, oēs tamen ab infernis partib. sursum porriguntur, quo muscoli deor-
 sum trahant, ob quam causam recursus factus est (hinc recurrentes, seu reversivi di-
 cti) quem recursum glossocomium motumque metapleticum seu transumptivum
 æmulari Galenus ^c voluit: vel si mavis: motus hic ei motui persimilis, qui in archite-
 cturæ machinis troclearum op. ^d absolvitur, & hac ratione nervi sicciores & validio-
 res sunt. Et hi vocales sunt nervi Galeno, ^e quod voci efformandæ maxime conferant;
 de quibus lib. 2. dictum fuit [exprimuntur ab. quant. t. 32. fig. 3. & 7.] At à recurrenti-
 bus ad quatuor paria propriorum, tanquam ad musculos internos rami distribuun-
 tur: communes vero cum exteriores sunt, aliunde nervos accipiant, ut primum & ter-
 tium par, à nervis cervicis: secundum vero par, duplicem suscipit: quemadmodum
 quintum par proprium, à sexto nervorum pariarum recipit.

Glandularum duo paria laryngi adjacent, aliud quidem ad laryngis sedem elatio-
 rem, ad gargareonis latera, quæ Amygdalæ & tonsillæ dicuntur, de quibus supra, cap.
 85. Aliæ utrinque ad laryngis ^d humiliorem sedem thyroïdi cartilagini accumbentes,
 arteriæ asperæ lateribus adnatæ & à quibusdam Paristhymia nominatæ, quia juxta isth-
 mum positæ sunt: utrinque una satis magna & admodum fungosa, cæteris crassior &
 spissior & veluti carnea in homine; at in ^e mulieribus magis conspicua, in quibus atti-
 pliores sunt, ut collum æqualius reddant, quo nodus in cartilagine thyroïde, quem
 pomum Adami vocant, minus appareat, per quas à vena jugulari externa rami satis
 conspicui disseminantur. In bove substantia carnea est, ita ut musculum æmuletur,
 quæ ad cricoidis cartilaginis latera reposita est.

Ufus harum duplex est: alter quatenus ad ipsas humidæ, ut fauces & laryngem sua
 humiditate non fluida sed viscosa & pingui, irrigent. Alter, quatenus spongiosæ & hu-
 miditate affluente imbibunt, quam humiditas laryngi c. omunicant, quo cartilagi-
 nes foveantur, ad motū aptiores reddantur, & vox suavior efformetur: q. nobis liqui
 fistulas oleo inungunt, ostēdunt. Uilis tamē quoq; est humoris hujus effusio, ad ^f mu-
 tuam laryngis & stomachi elevationē & detractionē quæ in deglutientib. & respi. ā-
 tib. accidit: quemadmodū & saliva in amygdalis contenta, in hunc quoq; usum facit.

De

De his Gall.

7. us. part. 14.

8. 15. de diff.

nerv. 10.

b Equum eras:

naturam non

ab ignobiliore

nervorum prin-

cipio, sed à di-

gniore laryngi

voci organo

principalissimo

nervos imper-

turi, quare à ce-

rebro, Placent.

c 7. us. part. 14.

horum Gale-

nus invenit

est, ubi condi-

toris anima-

lium, poten-

tiam, sapien-

tiam, provi-

dentiam & vir-

tutem prædi-

cat.

d 7. us. part. 17.

alris glandulis

laxiores & fun-

gosiores.

e Aquap.

f Vesal.

Consule Hippocr. de Carnib. Aristot. 2. de anim. cap. 8. sic 4. hist. anim. 9. quæ animalia vocem, quæ sonum, quæ murmur edant, quæ item loquantur, ostendit. Gal. de vocal. instr. diss. lib. de voce 7. us part. 5. & 13. sic 16. ejusd. 4. de partib. voci servientib. agit 2. de decretis 4. 5. & 6.

^a Larynx primum ac principalissimum vocis instrumentum 7. us part. 5. & 13. 16. us part. 4. primum ac proprium vocis instrumentum 2. de cr. 4. b 2. de anim. 8. c Vocem ex pulmone edimus, quod carnis sit, prætereaque ejus fistula: vocem aut labia & lingua articulata reddunt, Hipp. 4. de Morb. in fine.

^d Vox sine aere fieri non potest, & quicquid supervacaneum & inutile erat exspirandum, id in vocis materiam convertitur 6. us part. 2. e Cum spiritum reddimus non quando capimus, vocem formamus 11. pro bl. 14.

^f Hipp. de caribus.

^g De vocal. instr. dissect. 2.

^h 2. plac. 4. Hipp. de carnib.

EX his, quæ proposuimus, liquido constat, laryngis actionem vocem esse, & vocis instrumentum laryngem, primam item & immediatam vocis ^a causam glottida esse, idque ex Galeni sententia, quare de voce per pauca subijciamus.

Vox sonus quidam est animantis significativus Aristoteli ^d; vel vox est aer percussus Galeno finiente. Sonus vero ^b percussio est alicujus ad aliquid & in aliquo: quare ad sonum efficiendum tria requiruntur, utpote duo corpora, quæ se mutuo percutiant, & aer, in quo percussio fiat, inter utraque corpora percussus & fractus. Quo vero corpora mutuo se contudentia sonum edant, primo tensa esse debent, ob quam tensionem quodammodo obdurantur, quare dura esse oportere Aristoteles censuit: siquidem spongia aut lana, etsi se inuicem percutiant, sonum tamen nullum reddunt. Sed dicas à duris quidem frequentius sonum edi, verum & à quibusdam mollibus: nam si labia duo jungas, sibilus auditur, sed ex eorum tensione, qua aerem comprimendo extrudunt: dein superficie lata & plana: duæ enim acus acie se ^b ferientes, sonum non reddunt: tum vehemens & celer percussio: nam si manum rei alicui placide admoveas, nullus sonus exaudietur. Quod si etiam polita & concava sint, & ex materia solida & aerea, quale est æs, aut vitrum, conflatæ, tum sonus major, clarius graviorque editur; quod campanis musicisque instrumentis ostendi potest: quia talia multum aeris in se continent, qui communis exitum quærens, huc ac illuc ad latera offendit, & variis modis resonat.

Iam cum vox animalis sonus sit, seu soni species quædam, tot in voce requiruntur, quot in sono, tria nimirum, aer ^d tanquam materia; corpora, quæ aerem comprimendo elidunt, velut efficiens; adde & locum asperæ arteriæ caput.

Aer, qui ad vocem formandam requiritur is est, quem exspirando reddimus & hic vocis generandæ materia est: cum is qui inspiratur ad cordis & caloris innati refrigerium & pabulum comparatus sit. Quare tam diu vox editur, quam diu exspirato ^f perdurat, eaque deficiente, simul vox definit. Hic autem aer exspiratus, à spiritalibus instrumentis eliditur, tum enim vox formatur, ubi aer eliditur, & ubi eliditur, protinus percussio sequitur. Quodnam vero ex spiritalibus instrumentis, spiritum percutere & comprimere potest. Thorax & pulmo vocem non faciunt, quia eorum motiones sunt diastole & systole, sive dilatio & contractio, quæ vocem non efficiunt; non asperæ arteriæ fistula, seu maxima s bronchii portio, cum musculis careat; quare vocem, quæ voluntarium opus est, perficere haud potest: dein si fistulam infra ^h caput incidas, animal libere exspirabit, sed vocale non erit; & si sectionem constringas, tum vox redibit, non nates, quia tantum meatus sunt; non os, quia tantum receptaculum est, non ^f lingua, quia ii qui aphonia laborant, linguam & respirationem sanas habent sic

ficii, quibus lingua abscisa, i vocem aliquam edunt. Remanet ergo ex spiritalibus instrumentis tantum larynx, qui vocis officina, in quo percussio fit: quod & constructio ipsius comprobatur.

Habet enim musculos, qui ad vocem edendam, quæ voluntaria actio est, requiruntur, & nervos, qui motum suppeditant: habet^k cartilagineas, corpora dura, lata, perpolita & concava, in quæ aer illidi, compri & constringi facile, sicque simul resonare possit. Habet & rimulam, quæ ad aerem elidendum, ut sonus fiat, requiritur. Aeris enim elisio fieri non potest, nisi per angustam viam transiens exiliat: quare cum sibilum emittere volumus, salva primum constringimus & tendimus quo aer per viam angustam elidatur. Elisio fit per rimulam, dum angustatur & constringitur per arytanoidis dearticulationem & per musculos: quare Galenus vocem fieri non posse scribit^l nisi transitus sit angustior, nec simpliciter angustior, sed qui paulatim ex amplio ad strictius redat, paulatim rursus ex strictiore amplifietur. Hanc elisionem protinus percussio sequitur, vel ad aerem, vel ad corpus solidum; idcirco Galenus voluit, gargareonem esse veluti^m plectrum in voce efformanda, cum ad id aer exsufflatus impellatur.

Verum ad vocem non solum rimulæ angustia necessaria est, ut aeris angustus sit transitus, sed etiam vehemens spiritus impulsus, ut simul repente & affatimⁿ foras erumpat, alterutro enim deficiente vox non fiet; quam subitam & vehementem expirationem, *ἐκπύσησιν* seu efflationem^o Galenus vocat: quare altera vocis causa efflatio est, sine qua vox fieri nequit, at efflatio sine voce.

Efficiunt autem hanc exsufflationem muscoli p thoracem & abdomen constringentes, ex qua constrictione pulmones deprimuntur & constringuntur, septum transversum versus cavitatem thoracis incurvatur, quo ejus cavitas angustior redditur, & spiritus ex pulmonibus sursum per asperam arteriam feratur (quare in aspera arteria præparari vocem Galenus dixit, q cum aer ibi conclusus & compressus, quodammodo statum solidi corporis adipiscatur, antequam rimulam angustam cum impetu & violentia extrusus, vox formetur.

Vocis usum Galenus^r expressit, dicens, cogitationum mentis nunciam esse, merito ergo omnium animæ actionum principalissima censetur.

^m 7. us. part. 5. n Nam si leviter ac molliter spiritus efferatur, exspiratio fit sine sono 7. us. part. 13. ^o 4. loc. aff. 6. 2. ^{plac. 4. & 2. de mot. muscul. ultimo.} p Non simpliciter expirantibus vox efficitur, sed propria vocis materia efflatio est, quam musculus thoracis efficiunt, 7. us. part. 5. efflatio spiritus latius extra qua per musculorum intercostalium actionem fit. 2. Motu muscul. 9. ^q Arteria prius vocem concinnata ac præparat laryngi, qua cum in ipsam facta fuerit, adauget eam & palatum velut ^{larynx} quoddam præpositum & *παρεγχείων* quasi plectrum, 7. us. part. 5. vide & 2. plac. 4. x 16. us. part. 3.

i Fama est. Te-
reum, cum Phi-
lomela vocem

adimere vellet,
vocis instrumentum

linguam,
inquam, absci-

disse, quod Ga-
lenus recitat & reprehendit, de

diff. vocal. inst.
lingua non vo-

cis, sed loquela
instrumentum

est 2. plac. 4. lin-
gua in fauci-

bus interseptum
suo appulso for-

mat & ad pala-
tum ac dentes

impingens, cla-
ram reddit,

quod nisi lin-
gua suo semper

appulso forma-
ret, non distin-

cte homo loque-
retur, sed singu-

la unam natu-
ra vocem ede-

rent. Hipp. lib.
de carnibus.

k Laryngis car-
tilagineas vocis

sunt instrumen-
ta 7. us. part. 5.

l 7. us. part. 13.
o 4. loc. aff. 6. 2.

FINIS LIBRI III.

Z Z Z

De

DE ARTV BVVS,

LIBER IV.

a de in aq. in-
temp. 1. 7. usq.
part. 21.



Orpus humanum cum Galeno^a in ventres ac artus divisi-
mus. Ventres tres constituimus, primum & infimum, qui
partes naturales continet, secundum & medium, cui partes
vitales inhabitant: tertium & supremum partium anima-
lium domicilium, de quibus præcedentibus libris tribus, ea qua fieri
potuit, brevitate & perspicuitate egimus: quare superest, ut Artuum
historiam prosequamur.

Artus seu *ἄρτα*, membra sunt ex corporis trunco explantata, quo-
modo rami ex arborum caudicibus prodeunt: dividuntur autem in su-
periores & inferiores, sive Manus & Pedes, de Manu primo sermo
erit.

Verum Lector candidus hic monendus, cur libro hoc de Musculis
capitis, cervicis, thoracis & dorsi agamus, cum ad artuum historiam
minime pertineant: causa hujus rei est, quod toto hoc opere Anatomicam
Methodum, quanta fieri potuit diligentia, observavimus: quare &
hic ab ea recedendum non fuit: cum ergo prædicti musculi, si unius
tantum cadaveris copia sit, demonstrari non possint, nisi prius brachii &
scapulæ musculi separati sint: horum historia commodiore loco propo-
ni non poterat, sed ad rem.

De Manu.

CAPUT I.

De manu Galenus totis duobus primis de usu partium libris egit.

CUM Deus ter Opt. terque Max. Hominem solum inter creata animalia nudum
& inermem creasset (cujus nomine Epicurus, Plinius, alique Ethnici Deum
imperfectiōis & injustitiæ ethnice accusant) ad sui tamen imaginem clementer for-
masset, ne brutis animalibus inferior foret, Rationem & Manum ei dedit, quæ cate-
ris animantibus denegavit. Rationem cerebro indidit, quæ omnium artium officina,
& ars ante artes. Manus vero corporis trunco adnasci voluit, quæ ὄργανον est ὄργανον
ut Philosophus^a loquitur, sive instrumentum ante omnia instrumenta, data autem
homini tanquam animalium^b sapientissimo, cum organum sit animalium sapientissi-
mo con-

a 4. part. an. 10.
Gal. 1. usq. part.

4.

b 1. usq. part. 3. ex Aristot. Anaxagoras referente Plutarcho, ἐν ταῖς ἡγεῖν τὴν αἰτίαν τῆς αἰσθητικῆς τοῦ σώματος: manus

Etus adscripsit sapientia humana ortum & causam, quod Gal. l. c. reprehendit, quia non ideo homo animal sapientissimum, quia manus habuit, sed quia animal sapientissimum, ideo manibus instructus fuit: manus enim hominem artibus non instituerunt, sed ratio: manus enim rationis ministra sunt.

mo conveniens, & id^e pro corporis nuditate, ne inermis^d esset, sed manu sibi varia ^{ci. us. part. 4.} tum instrumenta, tum arma pro necessitate & sui^d defensione pararet, & pro tempo- ^{d 1 us. part. 2.} ris occasione & arripere & deponere posset, sicque foret instrumentum ad omnes ^{ci. us. part. 8. 9.} artes necessarium; paci non minus quam bello idoneum. Cujus actio est^e appre- ^{10. & 16.} hensio, quare Galeno^f ὁ ἅπλουν ἀντιληπτικὸν dicitur. ^{f 3. de us. part.} ^{g 1. us. part. 5.}

Quo vero multiformes figuras comprehenderet, multiformiter dividenda^s fuit, ejusque nomine figuram oblongam obtinuit, imo quo majora corpora & qualiter apprehenderet, a se invicem diduci debuit: quare in digitos^s divisa: indivisa enim, minima, quæ duobus etiam digitis, pollice & indice comprehendit; paulo majora, tribus pollice, indice & medio; quæ his majora, quatuor; adhuc majora, quinque totaque manu. Ast cum non pauca corpora mole^s & majora sint, quam ut manu una comprehendendi possint, duæ^h creatae sunt, quo altera^s alteri auxilio sit: idcirco ad se invicem inclinatae & æquales productæ sunt. Sunt autem in manu qualibet digiti quinque, & tot esse debueret, quo perfecta apprehensio fieret: si enim pollex adimatur, aliorum robur minuitur: si minimum demas, difficulter, ne dicam, vix ea complecteris, quæ circulo apprehendi debent. Jam vero non omnes digiti unius longitudinis esse debueret, sed quatuor^s unus opponi debuit, quo id, quod quatuor fideliter apprehenderunt, quintus sua^s parva flexione curvatus, actionem perficiat, qui ab aliis distat, quo situ contrario iis opponatur. Quomodo vero singuli digiti appellentur, fuse in libro de partibus externis pertractavimus.

Verum cum manus actio sitⁱ apprehensio: apprehensio autem absque motu fieri ^{i Ex Hipp. 1. us.} non possit, musculisⁱ tanquam motus voluntarii instrumentis opus habuit, quare ^{par. 9.} primaria manus pars, quæ primo & per se actionē edit, musculus est; qui sane hoc loci ^{i 1. us. part. 10.} carnem paucam, sed tendines multos obtinere, quia manum extremam levem & tenuem esse oportebat. Cum vero facultas motiva a cerebro deferatur per nervos, idcirco nervus hic pars est sine qua apprehensio non fit. Quo autem actio hæc perfectior sit, ossa ad robur & ^k firmitudinem actionum obtinuit, sine quibus digiti flexi quidem & extendi potuissent, sed ob molliem tremuli semper forent; neque quod comprehenderent, arte continerent, quæ per articulos^k ad actionem omnem prom- ^{k 1. us. part. 12.} pte figurandam, connexa sunt; ungues quoque firmamento sunt.

Digitorum namque summitates^l ex carne & vngue componuntur, quo inter ni- ^{l 1. us. part. 7.} mis^m mollia & dura naturam mediam sortiantur, sicque firmior^m apprehensio fiat. Si ^{13. 18.} namque extremitas ipsorum non esset carnosa, sed ossea^m, spinas, pilos non apprehenderent; nec etiam si humidior aut molliore carne constarent, cum ei quod^m apprehendens circumplicari debeat.

Vngues his extrinsecus apppositi, non solumⁿ munimenti gratia, verum^l firma- ^{n Ut voluit A-} menti, ut melius^o fiat apprehensio; quos nec^l superiores, nec inferiores esse digito- ^{rifi. monente} rum summitatibus convenit: eosdem etiam non conveniebat^p duriores esse, ne rum- ^{Galenol. us.} perentur, sed tales^p qui in apprehensione flexi possent. ^{par. 8.}

Ossa vero cuilibet digito tria^q esse debueret, quo multiformiter moveantur & pa- ^{o 1. us. part. 11.} tiendi ^{p 1. us. part. 11.} ^{q 1. us. part. 14.}

tiendi promptitudinem effugiant: non plura 9, alias extensionem laxissent, eam minus firmam efficiendo: non pauciora, 9 tum enim digiti figuras diversas non haberent. Horum primum majus altero, cum illud vehat, hoc vehatur. Sunt quoque parte superiore latiora & extrinsecus majora, ut libere intus flecti possint, & unumquodque eminentiam cavitati immixtam habet. Quælibet cavitas iusto amplior non est, nec strictior, ne articulus infirmior sit, vel motus difficulter fiat: sic & utrinque os cartilagine subjunctum, quibus humorem unctuosum ad mobilitatem & attritus contumaciam, superfudit.

Denique actionem manus conservant venæ, quæ sanguinem pro nutritione deferunt: Arteriæ, quæ vitali spiritu & calore perfundunt. Cutis & pinguedo, quæ partes prædictas & investiunt & conjungunt.

Uusus manus triplex statui potest, primus usus propriaque actio est apprehensio: alter, ut sensus tactus iudex sit; etsi enim tactus per totum corpus diffusus sit, exquisitius tamen manu extrema sentimus, tum quando cutis ipsius polita est, depilis & minime callosa reddita, quod in remigibus & fossoribus fieri consuevit: tertius, ut his injurias propellamus, & ab adversariis tueamur. Hæc de manu in genere.

Dividitur autem manus sive ea pars, quæ est à summo humero usque ad digitorum extremos apices, quæ antiquissima significatione χεῖρ sive manus (ab Aristot. βραχίων) dicebatur, in humerum, seu βραχίονα in specie sumptum, seu partem eam, quæ est à summo humero ad proximum usque articulum, cubitivæ flexuram. Dein cubitum πήχυς, seu partem, quæ est à cubiti flexura ad proximum articulum carpi. Tum eam, quæ à cubito extremo incipit, & in aciem digitorum terminatur, quæ pars manus extrema sive ἀκροχεῖρ dicitur. Hæc rursum in tres partes subdividitur, primo in brachiale καρπὸν, seu partem eam, quæ flexuræ cubiti proxima est, & ubi palma cubito jungitur; dein in postbrachiale, μετὰκαρπον, seu partem eam, quæ est inter carpum & digitorum principium, cujus pars interior ἑνὰς, vola & palmæ; exterior vero, quæ averfa manus pars est, dorsum manus dicitur. Tertia pars est, quæ digitos δακτύλους, complectitur: quæ omnia tanquam externa in historia externarum partium exposuimus.

Partes totius manus duplices sunt, continentes alia, aliæ contentæ; Continentes communes, cuticula, cutis, pinguedo cum sua membrana, panniculus carnosus, de quibus lib. 1. sermo fuit: propria statui forte posset, membrana, quæ musculos investit & separat. Contentæ sunt, muscoli, vasa & ossa.

Musculi totius manus quinquaginta quinque sunt, si scapulæ musculos huc referamus, quorum brachium septem, scapulas quatuor, cubitum quatuor, radium quatuor, carpum quatuor, digitos viginti novem, inter quos metacarpum octo recensemus, in vola manus tres vel quatuor, movent. Vasa sunt venæ, arteriæ & nervi. Ossa

in qualibet manu quadraginta duo sunt: Humeri unum, cubiti duo, carpi octo, metacarpi quinque, digitorum quatuordecim, & denique sesaminorum duodecim: de his ordine à musculis humeri principio factum.

De

x. l. 1. par. 15.

Uti Homerus
et Plutarch.
et l. hist. an. 15.
et Gal. de inaq.
intemp. 2.

x. ἀκροχεῖρ
Hipp. χεῖρ ἀκρο
Gal. de Fract.

y Cap. 14.

ANATOM. LIB. III.

De Musculis ^a Humeri, seu brachii.

CAPUT II.

De his Gal. de diff. muscul. 18. & 19. 13. us. part. 13. & 14. 5. adm. anat. 1. & 2. item 1. adm. anat. 11.

Humerus prima totius manus pars est, quæ à summo humero ad proximum ul-
que articulum, cubitivæ flexuram extenditur, & Græcis *ἄνω*, Latinis hume-
rus dicitur: ejus vero sub humeri articulo cavitas, ala vulgo nominatur. Quo vero in
omnes partes moveri possit, per enarthrosin cum scapula articulatur, musculisq; agi-
tatur. Movetur autem quinque motibus voluntariis: antrorsum ad pectus, retror-
sum versus dorsum, sursum ad cervicem & caput: deorsum ad thoracis latera, & in gy-
rum quodammodo agitur, vel circumvertitur, quibus motibus absolvendis musculi
septem ^b constituti sunt, quorum alii thoraci inserti primus & tertius; alii scapulæ ad-
nati, quos dissectionis ordine enumerabimus.

^c Pectoralis [tab. 1. 1. 8. f. 1. L.] à situ sic dictus, cum thoracis anteriorem partem oc-
cupet: magnus est & carnosus, inæqualibus lateribus propter exortum constans: hic
ex pectoris ossæ pene toto & cartilaginibus ipsi annexis, clavicula media, qua pecto-
ræ ossi proxima est, & sexta, ^d septimæ & octavæ costæ cartilaginibus, tanquam ex plu-
ribus musculis compositus enascitur [tab. 1. 2. 3. 7. circumscibitur. & tab. 8. f. 1.] Quare
Galenus (propter diversos exortus & fibras, quæ contraria serie productæ in mo-
dum chylismi se interfecant) ^e in tres vel quatuor dividi posse censuit. Exoritur enim
à claviculæ principio carnosus, ab ossis vero pectoris medio, & costarum cartilagini-
bus membranoso & nervoso; mox paulatim crassior carnosiorque redditus, sensim
quoque coarctatur, & superius carneam naturam propter fibrarum ductum brevio-
rem, reservat: inferius vero multo ante insertionem lividus & nervosus conspicitur, &
secundum profundum superiore parte multo tenuior est: tandem tendine brevi, sed
lato nervo & robusto [tab. 1. & tab. 8. f. 1. & 2. 8. e.] humeri ossi secundum longitudi-
nem, paulo infra ipsius caput interius nonnihil in priora vergens (quasi reduplicato
tendine) inter deltoideum & bicipitem implantatur [tab. 1. & tab. 8. f. 1. M. A.] Sic non-
nunquam ^f in quibusdam hominibus portio quædam in acutum tendens reperitur,
quæ quasi peculiarem musculum æmulatur, cum tamen hujus pars sit. Hic propter
exortum diversum fibris variat, aliis ex superioribus deorsum oblique productis, aliis
oblique sursum protensis, ita ut paulo ante tendinis productionem sese pene decussa-
tim interfecant, quæ tamen omnes demum in unum angulum concurrentes tendi-
nem efformant. Ob hanc fibrarum varietatem differentes quoque motus præstantur.

Zzz 3

^g Hu-

vens sive pectoralis, aut pentagonus, quodammodo quinquelaterus, Ves. quinque latera habet, Col. Laur. d. Ex 7. & 8.
Ves. Col. Fall. Piccol. ex 6. 7. & 8. Laur. e. Tres à pectore in brachium, sive tres, sive quatuor ipsos dicere velis, diff. muscul.
18. 13. us. part. 13. hoc Col. reprehendit; at Vesal. nihil obstitit geminum pronuntiare ac duorum muscul. loco enumerare.
f. Meminit etiam Col. an hoc intellexit Gal. diff. muscul. 18. dum musculum secundum mammam situ exiguum describit,
qui ad humeri articulum ascendit, & ad costas spurias brachium adigat, quem Ves. in homine dari negat, in simiis vero
sub primo situ esse: quem admodum & alterum adhuc describit, qui altioris brachii ad pectus ductionis auctor sit, qui
movenente Vesal. scapulam ad pectus ducit: intellige Serratum minorem.

SSI

a Musculi hu-
meri articuli
movenes Gal.
diff. muscul. 18.
musculos hume-
ri vocant, Ves.
Col. Plat. Bra-
chii Fallop. &
Laur. Ample-
xorios hume-
rarios, id est, in
plexu hume-
rum cientes,
Piccol.
b Undecim sunt
tres à pectore in
brachium ascen-
dentes, duo ab
iliis regioni-
bus, quinque à
scapula prode-
unt, undecimus
post hos epomi-
da occupat, diff.
muscul. 18. At
Vesal. Col. Pic-
col. Fallop. in
inst. septem sunt
Fall. in obs. &
Laur. octo, Plat.
7. qui & Fallo-
pii octavum re-
censet: Scapula
musculos præ-
mittunt Gal.
diff. muscul. 18.
(non autem 13.
us. part.) Col.
Piccol. & Laur.
c Vesal. Col. Fal-
lop. Plat. (cui
mamillaris
& clypeiformis)
Piccol.

1. est Laur. an-
trorsum mo-

Si omnes à pe- Hujus munus est, dum fibras omnes potissimum medias omni sui parte æqualiter contrahit brachium antrorsum recta in neutram partem inclinans, æqualiter movere & pectori adducere: sicut vel ad superiora magis, vel inferiora, prout fibræ contrahuntur, oblique adducere, & pectori admoveere.

II. Deltoides à forma literæ Δ. [tab. 1. 2. 3. tab. 8. f. 1. 2. 4. M.] quibusdam vero è πω-
carnosus est, & triangularis: hic ex claviculæ media parte scapulam spectante, sum-
mo humero, qua claviculæ jungitur, totaque scapulæ spina oritur [tab. 3. & tab. 8. fig. 1.
& 4.] non quidem ex horum ossium amplitudine, sed prominentiore sede, tanquam
crassiore linea, initio lato (ex variis, continuis tamen principiis composito, quasi ex
musculis diversis conflatus esset) nerveo, quod statim carnosum crassumque redditur:
musculus hic carnosus permanet, & sensum velut in trianguli verticem angustatur,
donec in validum partim carnosum (extrinsecus) partim nervosum (intrinsecus)
modiceque transversum tendinem qui humeri mediam crassitiem amplectitur, de-
sinat, inque humeri medio sub ipsius cervice inseritur [tab. 8. f. 2. 9.] Hic etiam fibras
aliquantum diversas obtinet: partis enim anterioris oblique deorsum in posteriora,
posterioris vero, oblique in priora feruntur: harumque nonnullæ parum implicari
conspiciuntur: mediæ vero recta deorsum vergunt. Quare fibris anterioribus in se
collectis, brachium sursum ad anteriora versus faciem attollitur: posterioribus ad
posteriora versus occiput: mediis vero æqualiter contractis brachium recta sursum
attollitur.

III. Latissimus & Aniscalptor [tab. 2. 3. N. tab. 4. separatus] totum fere dorsum
cum suo pari integit, quare dorsalis maximus dici posset: hic à vertebrarum spinæ a-
picibus, quæ inter sextam thoracis vertebrae & ossis sacri medium sunt [tab. 3. S. 14.]
principio membranoso & latissimo, nec non à superiore ilii ossis parte, oritur: dein
ascendens, ubi ad eam dorsi regionem, ubi costæ versus posteriora extuberant, carno-
sior redditus, scapulæ basis angulo inferiori supervectus, angustior redditus, tendine
valido, brevi, lato tamen & quasi reflexo infra humeri caput superius, secundum
ipsius longitudinem intrinsecus inter pectoralem & rotundum inseritur: inter ho-
rum enim tendines ejus nomine intervallum existit, ubi quoque Axillæ cavitas est ab
hoc & pectorali efformata. Hic trianguli figuram refert, cum angulis tribus inæquali-
bus præditus sit, duobus longis, & altero brevi, quorum acutissimus est is, qua parte
ab osse

Musculus su-
perior hume-

ri partem amplexus imitanda, de quo etiam Hippoc scripsit nonnulli etiam δελτοειδῆ, quasi dicas Δ. imitantē nominant,
Gal. 3. ad. an. 3. Sed de hoc egit 1. ad. an. 11. Musculus qui ad epomida duo habens capita, quæ primo loco describit dis. musc.
18. Ves. Col. Fallop. Plat. Piccolhom. 2. at brachium sursum movens primus sive deltoides; Laur. Gracis δελτοειδῆς &
ἐπωμίδας Vesal. Columb. aliis ἐπωμίδας & humeralis Laur. omnes recentiores in hac sunt sententia δελτοειδῆς à Gracis ἐπω-
μίδα vocatum esse, quod falsum est Hipp. Galeni, Russi & Oribasi. autoritate &c. nam ἐπωμίδας significat externum &
minus caput humeri, vel tuberculum acutum in humeri capite, totaque etiam regio, qua ab ipsa usurpatur, hoc à deltoide
de musculo occupatur, Fallop. observ. k. Terragonam fereformam sortitus, Piccolh. 1. Initio lato & tendinoso, Col.
m. Non ad amissim transversum, sed modice obliquo, qui ab anterioribus deorsum in posteriora nonnihil vergit, nihilque
minus quam declivis rectave occurrit, etsi Galenus secus attestetur, Vesal.

n. Brachium sursum per rectam præcipue lineam attollit, de dis. musc. 18. o Gal. dis. musc. 18. magnum imo maximum
ab imis regionib. ascendente vocat: & dicit, duos sursum ferri, alterum crassissimum & longissimum omnium musc.
bra-

brachium moventium; alterum gracillimum esse, longitudine tamen ab altero non separat, qui ab Anatom. ignoratus fuerit, ut qui dum cutis male exoriatur, obscuretur & corrumpatur: Vesal. Colum. Fallop. Plat. Piccol. 4. ac Laur. deorsum movens primus seu latissimus. p. A spinis ossis sacri lumborum & novem thoracis, Laur.

ab osse sacro enascitur: alter juxta thoracem, quæ à vertebrarum apicibus prodit: tertius ad humerum in tendinem desinens. Musculus hic, cum ad scapulæ angulum inferiori pervenit, aliquando inde fibras carnosas plurimas recipit, ut recte Galenus docuit, & quasi novo, sed minimo principio donatur. Sic & scapulæ basi fibræ quibusdam adnascitur, ne scapula dum movetur, musculum transcendat, cum iis tanquam ligamenti impediatur, ne musculus à scapula decidat: & hujus adhaerentiæ beneficio scapulam quoque ab hoc musculo moveri Gal. prodidit. Hujus musculi fibræ pro costarum inæqualitate quoque differunt, siquidem aliæ longæ & minus obliquæ, aliæ breviores sunt & magis transversæ: quare prout fibræ hæ in se colliguntur, brachium retro deorsum magis vel minus trahitur, & nunc ad superiora, nunc ad inferiora versus deorsum deprimitur. q. Vesal. ac Val. verda & alii hoc pratermiserunt, quod in quamplurimis observavit, Fallop. 13. ad. an. & 13. us. part. 12. Ves. hoc negat, volens scapula ossis non nisi musculorum, qui ab illo pronascuntur, intervenire, tu consuevit esse, eo modo, quo & dorsus musculi, quibus insertitur: nentiam ossi con-

IV. Rotundus [tab. 1. 2. 3. 4. 5. 6. tab. 7. f. 4. O.] qui parte posteriore sub axilla oblique situs est, carnosus, crassius, & inter ceteros utcumque rotundus vel teres est; hic principio carneo à scapulæ costa inferiore, ea parte, quæ basi magis propinqua est, majore parte ejusque angulo, modico principio, continua tamen origine sumpto progrediuntur, & ubi ad ipsius costæ medium pervenit, à scapulæ osse abscedit, & modice sursum delatus, tendine brevi, sed lato, valido membranoso & nervoso in humeri superiore & anteriore partem inseritur, ubi & pectoralis, cujus etiam tendini correspondet. Hujus munus brachii retro deorsum trahere; sicque deltoide contrarius fit. Instit. eum reprehendit, asserens hucusque apparuisse in quibuscunque.

Ad hujus musculi partem inferiorem, sive à scapulæ costa inferiore, portio distincta observatur, nervoso sine prope quinti musculi insertionem implantata, quam Octavius brachii musculum Fallopius fecit.

V. Superfascularis inferior [tab. 2. 3. 4. P. 1. 8. f. 4. P.] quibusdam infra spinatus scapulae 13. us. part. 5. ad. an. ac Vesal. ait, cum in scapulam non inseratur proprio motu una cum brachio nequaquam deorsum velle; quare Fallop. instit. an. scapulam quoque moveat, non ausim affirmare, ut certissimum, etsi ad scapula motum, motum aliquem conferre videri possit. c. Gal. diss. musc. 13. addit parvum musculum in humeri dearticulatione occultatum, qui sub brachii caput in media regione inseratur, quem quis vel magni portionem, vel etiam ipsum privatim per se statuere possit, cum nonnihil obliqua extensioni conducatur. u. Vesal. Col. Fallop. Plat. (cui & transversus musculus longior) Piccol. 3. ac Laur. deorsum movens alter sive rotundus major. x. Super gibbam anterioremque scapula partem progreditur, Col. Piccol. y. In posteriore humeri partem, Colum. in exteriorem, Piccol. in brachii cervicem, Laur. z. Gal. inter brachium circumvertentes recensuit, qui ad exteriora circumvertat: quod Vesal. reprehendit, & brachium recta ad dorsum agere vult; at Piccol. & re Ba & extrorsum & aliquantulum introrsum movet: Laur. oblique tamen. a. Aliquis omnibus manifeste se junctus, quem in omnibus hominibus reperi quem magni momenti musculum praterierunt, cum tamen à Galeno non fuerit pratermissus in simio, in lib. de diss. musc. 18. & 5. ad. an. 1. hac Fall. qui pro octavo recenset & cum suo septimo ejusdem motus auctorem facit. Transversus musculus brevior, qui octavus Fallopii, Plat. Rotundus minor est retrorsum movens alter in brachii cervicem & interiorem humerum fertur, Laur. b. Gal. 5. ad. an. inter brachium attollentes recenset: at 13. us. part. brachium retrorsum ad dorsum ab hoc agi credidit: Vesal. (cui & triangularis) Fallop. Plat. cui & humilior) septimus: Colum. & Piccol. sextus: Laur. infra spinatus, seu retrorsum movens primus: ac Vesal. & Col. volunt, hunc cum duobus sequentibus brachium circumagere.

pulæ exteriorem & gibbosam partem totam, quæ sub ipsius spina est, tegit, ipsiusque formam refert: hic à scapulæ basi infra spinam carnosus enatus, & ad scapulæ formam angustior redditus tendine lato brevique humeri ligamento articulum continente, extrinsecus veluti in semicirculum ^e obscure inseritur. Hujus munus brachium ad exteriora circumagere ^d.

^e In caput humeri versus posteriora, Col. in exteriorem partem capitis humeri Piccolb. in brachii caput & cervicem, Laur.

^d Humerum sursum simulque retrorsum adducit, Piccolb. brachium retrorsum movet, Laur.

^e Hujus Galenus non meminisse opinor, nisi forte inter brachium attollentes reponat: dein de scriptio nulla congruit etsi quendam scapula eminentiori costa expor-

V I. ^e Superfascularis superior seu rotundus minor [tab. 3. 4. 5. 6. Q.] quibusdam supra spinatus supra axillam est, ut cavitatem omnem quæ inter scapulæ costam superiorem & ejusdem spinam est (à qua enascitur) carnosus, oblongus, fibris oblongis donatus implet: procedit n. ab ea scapulæ basi cui valide enascitur, & ubi ad scapulæ cervicis sedem superiorem pervenit, sub ligamento transverso humerum scapulæ processu interiori copulanti, delatus, tendine lato & valido articulum superante, ad articuli ligamentum oblique ^f cervici inseritur: hujus munus cum priore & sequenti brachium circumducere: alii ^g tamen volunt hanc cum Deltoidæ brachium sursum movere.

V II. ^h Subscapularis seu immerfus [tab. 1. R.] inter scapulam & costas situs, carnosus admodum & latere superiore cum præcedenti continuus, scapulæ partem internam simam, unde enascitur, occupat, & ad scapulæ formam triangulum imitatur, sensimque arctatur ad articuli regionem internam, tendine lato in humerum interiore ⁱ quasi in semicirculum inseritur, ita ut trium musculorum humerum circumagentium tendines articuli ligamentum totum quasi in orbem complectantur: hujus munus ^k brachium introrsum circumagere. His insignem illam musculosam portionem à scapulæ processu anchoræ simili, exortam & humero insertâ nonnulli humeri ^l musculum octavum esse censent (alii Bicipitis sive primi cubiti musculi portionem faciunt) cujus munus sit brachium, una cum pectorali antrorsum movere, vel scapulæ processui adducere: humeri enim & cubiti germanos motus esse, flexo namque cubito, humerum plerumque attolli corporis actionibus obeundis ex usu esse.

^f In superiorem faciem capitis humeri, Piccolb. in brachii cervicem, Laur. ^g Humerum sursum simulque retrorsum ducit, Piccolb. retrorsum movet Laur. ^h Musculus à sinist. scapula enatus, diff. musc. 18. Ves. Fallop. Plat. 6. Col. & Piccol. 7. Laur. subscapularis seu immerfus, vel retrorsum moventium tertius. ⁱ In humeri cervicem & caput Laur. ^k Brachii caput ad posteriora circumvertit, Gal. diff. musc. 18. brachium sursum simulque introrsum ciet. his tribus aliisque successive agentibus humerum in orbem circumque ducunt, Piccolb. hic cum infra spinato & rotundo minore brachium retrorsum movent & semicircularem motum edere videtur: circularis vero perfectus, quia ex rectis omnibus & obliquis componitur à peculiari nullo perficitur, sed ab omnibus successive agentibus, Laur. ^l Arant. in observ. anat. at sic Plat. humeri musculi utrinque septem octavum addit Fallop. excepto interiori initio musculi cubiti flexentis, quod etiam humero validiss. adnascitur. Riol. Coracoidæus,

De Musculis omoplata, seu ^a scapula.

CAPUT III.

De his egit Galenus de diff. musc. 7. & 8. 13. usq. part. 13. 4. adm. anat. 10.

^a Scapula musculi vocant Anatomici; at Piccolb. Amplexorios scapule, id est, in complexu scapulam moventes.

Cum scapula quæ cum humero per arthrodiam interventu ligamenti crassissimi & nervi totam articulationem orbiculatim amplexantis, articulatur, quatuor moti.

b Galeno se
premunt; Syl-
vio s. Ves. Fall.
Col. Plat Pic-
colh. & Laur.
4.

c Vesal. Fall. &
Plat. I. (hic ad-
dit forte ad tho-
racem moven-
tes commodius
referetur) Col.
& Piccolth. 2.

Laur. 3. & fer-
vatus minor.
ad 2. 3. 4. 5. in-
terdum 6. Ves.
Columb. Fal-
lop. ad 2. 3. 4. 5.
Piccollo. à quin-
que superiori-
bus, Laur.
c Gal. humero
inservire &
pectoris altius
adducere cen-
suit.
De hoc Gal. de
diff. musc. 7.
musculus ex
fesse capitis ad
capulas hunc
ad. an. voca-
tis Trapezium

mediis

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
726/D

mediis denique sive etiam transversis attractis [tab. 2. ad 7] scapula recta ad dorsum ducitur¹.

¹ Sub hac infimius caudatus tres adhuc reperiuntur à Gal. 4. ad. an. propositi, quorum medius etiam in homine reperitur. m Vesal. Col. Fall. Plat. Piccolh. 4. Laur. 4. & Rhomboides qui in duos scari possit.

ⁿ Nimium latum initium Gal. 4. ad. an. 10. adscripsisse Vesalius mo-

net, qui à 4. 5. 6. & 7. cervicis & à quatuor aut quinque thoracis prodire vult: sic & Plat. o Ves. (cui scapulam attollentium alter) Col. Fall. Plat. Piccolh. 3. at Laur. Levatores musculi quatuor cum diversis eorum sit exortus, diversis inferio, & propriis membranis discreti sint, estque ei in ordine 2. quos sursum movere una cum Trapezii portione asserit. p A transverso processu 2. 3. 4. & 5. Columb. Piccolh. à 1. 2. & 3. Laur. à 1. dein 3. 4. & 5. Fallop. interdum etiam à 2. Vesal.

^q Geminio principio ex transversis processibus vertebrae prima & trium sequentium enatus, Plat. r Gal. huic addit 4. ad. an. 10. de diss. musc. 8. 12. & 13. alium quem 2. par ossis hyoidis sive Digastricum enumeravimus, quo censuit scapulam in anteriora colli attolli. Sylvius his quatuor serratum majorem addit, eo quod scapula adnascatur, qui tamen thoracis secundus est: Fallop. & Plat. censent, scapula potius, quam thoracis musculum esse.

III. ^m Rhomboides à figura dictus [tab. 3. V] sub cucullari situs, tenuis est, latus, quadrangularis, à spina vertebrarum trium inferiorum colli, & trium superiorum thoracis carnosus ⁿ enatus, fibris obliquis à dorso ad scapulæ basin de latis, dictæ basi juxta ejus longitudinem carneus quoque latusque, ut in exortu, inferitur, eamque sursum nonnihil ad posteriora trahit, ac dorso applicat.

IV. ^o Levator [1. 3. 6. 7. X] supra claviculam situs est, qui à vertebrarum colli p (& quidem communiter 1. 3. 4. & 5. rarius à 2.) transversis processibus variisque q principiis enascitur, ita ut usque ad medietatem in tres vel quatuor scari possit, qui coeuntes & descendentes, validum carnosumque musculum efformant: & scapulæ angulo elatiori & interiori, tendine lato & carneso, fibris fere omnibus rectis, per paucis obliquis, inferitur; hicque scapulam sursum versus anteriora & cervicis latera trahit. His musculis scapula per se & brachium simul per accidens movetur: quemadmodum & scapula à brachii musculis latissimo & cucullari, per accidens movetur, quidum brachium trahunt, simul & scapulam illi adnexam consecutione quadam ducunt: hac ratione communes & scapulæ & brachio dici possunt.

De Ligamentis in genere.

CAPUT IV.

a Hipp. & Gal. plerisque in locis. à σῶν cum; & δὲν ligo: plerique post Hippocratem ὀστέον, nervum & δὲν σῶν. δὲν σῶν nervum colligantem vocant: qua voce & Hipp. lib. de Arte & ib. de locis in hom. usus & Arist. 3. hist. an. 5. Gal. in prote. libr. de ossib. b 1. plac. 9. 1. ad. an. 10. 1. de motu musc. 1. & 16. us. part. 2. vide lib. de partib. similarib. parte ult. c 16. d 1. de plac. 9.

Cum ligamenta plurima in artuum historia occurrant, eaque non secus, quam ceteræ partes explicandæ sint, pauca quædam de ligamentis in genere præmittimus, cum de iis libro de partibus similaribus capitibus quinque ex professo egerimus. Ligamentum, οὐδὲν σῶν & a seu vinculum, corpus est inter cartilagineam & membranam medium: quare prout ad hujus vel illius naturam accedunt, vel ligamenta membranæ, vel ligamenta cartilaginea dicuntur. Hæc autem ipsas partes vel continent^b vel continent. Connectunt ossa duo vel plura simul in articulatione, ne facile loco moveantur: quæ vel omnibus articulis communia sunt, quæ nexu laxo, ne motus impediatur, conjungunt, & sunt membranæ d: hæcque vel tenuiora, ut in ginglymo, vel crassiora roboris gratia, ubi articulus magnis motibus subjicitur, ut in diarthrosi: vel ob cavitatem superficiariam invalidus est, ut in articulo humeri cum scapula, cui ligamentum validum, ne facile luxetur, contigit.

At hæc

At hæc articulum totum ambiunt, si nihil impediât (ut in genu articulo propter patellam totus articulus non cingitur) quo in nullam partem luxatio facile fiat, & adnascuntur vel ossibus articulum constituentibus & cavitarum superciliis capitumve circumferentiis, vel cartilagini articulum intercedenti: si vero plures articuli conveniant, tum extrinsecus pluribus simul obducitur, ut in dorso fit.

Præter hæc communia articulis quibusdam, qui nexum validiorem requirunt, peculiariora contingere, quorum alia sub communibus reponuntur, parte ea, in quam facile articulus declinaret, quæ crassa sunt, alia teretia, alia lara, quæ ab uno osse in aliud, nunc recta, ut in vertebræ secundæ cervicis dente, nunc oblique, nunc transversim, quemadmodum humerum priuata sua ligamenta habere, capite seq. ostensuri sumus. Alia vero sunt, quæ articulum intercedunt, & ligamenta cartilaginea dicuntur, quorum aliqua teretia sunt, quæ ab unius ossis capite in sinum alterius feruntur: aliqua vero lara, ut quæ vertebrarum corpora intercedunt: item ea, quæ commissuris partim obducuntur, partim iis se inferunt, ut ea validius nectant: & sic commissurarum spatia replent, si ea dehiscant, ut in ossis sacri cum coxa interstitio; vel si plura ossi inæqualiter juncta sint, quemadmodum in brachialis ossibus fit: hæc de connectentibus, nunc de continentibus.

Ligamenta partes in sua sede continentia (quorum nonnulla per accidens quoque colligant) alia viscera, quæ suspendunt continent, ut Hepatis & vesicæ ligamenta: alia ossa, alia musculos; ossa quidem quæ eorum vel processibus articulo vicinis, vel sinibus connascuntur: illa, ut articuli laxationem impendant, ut in humeri articulo nunc ostensuri sumus: hæc ut sinuum vel rotunditatem, quemadmodum secundæ vertebræ ligamentum, vel profunditatem augeant, hæcque cartilaginea sunt, superciliis in ambitu adnata, ut in coxæ acetabulo.

Quæ vero musculos vel totos vel eorum partes quasdam in sede sua continent, ne in partis motu declinent, ejusmodi sunt, quæ tendines musculorum manuum & pedum orbiculatim ambiunt, ut sunt digitorum ligamenta, brachialis transversum ligamentum eorumque ossibus adnata: sic in brachialis sede externa ligamenta quinque annularia, ulnæ & radio affixa. Sic alia sunt, quæ musculos sua sede continent, & ne ossium duritie lædantur, sinus succingunt, ut in iis femoris musculis, quorum tendines per pubis os feruntur. sic denique quædam membranosa sunt, quæ ossa intercedunt, & eorum spatia replent & connectunt, ut sunt ea, quæ cubiti & tibiæ ossa intercedunt: vel etiam ossis foramen opplent, ut ossis pubis foramen. Plura qui volet, lib. de partibus similaribus nostrum consulat.

De ligamentis humeri os cum scapula cervice jungentibus.

CAPUT V.

De his egit Galenus 13. us. part. 12.

Cum deligamentis humeri ad scapulam superius meminerimus, nunc ablatis humeri & scapulæ musculis, de iis sermo recte instituetur, nisi lubeat prius cubitum flexentes musculos demonstrare.

Aaaa 2

Hume-

a 13. us. part. 12.

Humerus cum capite sit rotundo, quo manus^a tota, quæ ad varios motus comparata est, celeriter moveatur, scapulæ cui cavitas superficiali, vel acetabulum leviter profundum, neque in^a supercilia magna definit (quemadmodum superius libro secundo monuimus) ne in variis motibus facile articulo excidat, & assiduo^a humeri caput luxetur, cum cavitate adeo exigua vehatur, ut pars ipsius maxima extra sit. Natura partim ligamenti, partim scapulæ^a processibus duobus recurvis articulum munientibus & ex horum utraque parte^a musculis magnis ipsum constringentibus, ut paulo ante ostensum fuit, prospexit.

b Tria valida
ligamenta præter
commune
omnium arti-
culorum rotun-
dum Natura
machinata est,
13 us. part. 12.
c Latum liga-
mentum vo-
cat. Gal. l.c.

Ligamenta autem^b quinque obtinuit: primum^c latum est & membranosum^b, quali & ceteri articuli donantur, quod ex cervicis scapulæ superciliis principium orbiculatim assumit, totum articulum in orbem complectitur, & in humeri capitis initium inferne infigitur, & capitis amplitudini exteriori & cervici utriusque implantatur.

d Enascitur pri-
mum ex sine
apophyseos, quæ
ab anchora si-
militudine
αγκυραειδου
nominant, Gal.
l.c.

Alterum^d quod cum sequenti prorsus rotundū^b nervi instar existit [t. 8. f. 3. d] ex scapulæ processus interioris, apice enatum, humeri capitis exterioris partibus internis circumtenditur, & validissime adnascitur.

e Alterū quod
majus ex scapu-
la cervicis ea
maxime parte
qua cavitas
qua ipsi inest
supercilium est
altissimū, Gal.
l.c.

Tertium, quod prædicto crassius & majus^e [tab. 8. f. 3. e.] ex scapulæ cervicis parte superiore ortum, humeri caput superans, capite exteriori^e, ubi ad ejus sinus latus externum extuberat, inseritur: ita ut hæc duo ligamenta simul velut unum ligamentum transversum efformet [tab. 8. f. 3. f.]

f Tertium ex eodem loco, quo secundum exoritur & leviter latum est, obliquum autem sub eo inseritur & ipsum
in primum capitis brachii initium, quo modo latum ligamentum, quod totum in orbem articulum complectitur: est e-
nim ipsum quodammodo ipsius articuli pars, Gal. l.c.

Quartum^f, quod leviter latum est [tab. 11. f. 1. inter 2 q] ex eodem, quo tertium, locoprodens, & quidem principio amplo, oblique deferitur, in humeri capitis exterioris sedem posteriorem infigitur, & articuli partem posteriorem eo modo, quo & primum ambit.

Quintum à scapulæ processu interiori prodit, & oblique sursum ad summum humerum porrigitur [tab. 8. f. 3. e.]

Ulus horum ligamentorum; primi quidem, cum ceteris articulis communis est: trium sequentium, humerum, ne deorsum & extrorsum ex sua sede excidat, custodire: quinti vero, ne humeris in anteriora luxetur impedire, cui musculi bicipitis caput externum auxilio est.

De Musculis Thoracis, seu Respirationis.

CAPUT VI.

De his Gal. lib. de diff. muscul. 23. 5. adm. anat. 3. 16. us. part. 7.

Thorax cum vitalia instrumenta contineat, & vita sine respiratione persistere nequeat; respiratio autem sine motu fieri non possit, idcirco respirationis gratia tho-

thorax moveri debuit. Requiritur autem respiratio, propter cordis calorem maximum, ut is ab aere, respiratione attracto, refrigeretur, & ab eo, tanquam flabello conservetur. Moveretur autem vel per se, vel per accidens, cum spinæ motum sequitur; si quidem dorso flexo aut erecto, & thorax flectatur, aut erigatur. Per se, & quidem motu proprio, respirationis causa, quæ duplici thoracis motu absolvitur: vel enim dilatatur, quando inspiratio fit, & aer in pulmones attrahitur, cordisque focus refocillatur: vel contrahitur, quando expiratio fit, & aer ex pulmonibus per asperam arteriam pro vocis generatione exprimitur, & fuligines, ne ab his cor suffocetur, excernantur: ita tamen, ut dum inspiramus, thoracis partes inferiores dilantur, superiores vero angustentur; & contra cum expiramus, interiora constringantur, & superiora dilatentur. Hæc causa est, cur thorax non ex osse uno^a, quemadmodum calvaria conformari debuerit, sed ex pluribus, quæ ut motui magis obediant, cartilaginibus coarticulata sunt. Verum quemadmodum cor motu naturali movetur, sic ipse thorax partim motu^b naturali, cum in somno naturaliter non ex voluntate moveatur: partim voluntario, cum quosdam spiritus retentione sibi mortem intulisse legamus, movetur: quemadmodum pulmo thoracis motum vacui potissimum fuga, tam in vigilantibus, quam dormientibus sequitur. Ergo thorax musculis indiguit propter respirationem, quæ ipsius diastole sive dilatione in inspiratione, & systole, sive contractione in expiratione absolvitur.

Sunt autem sexaginta^c quinque: utrinque triginta duo: utpote intercostales viginti duo, interni undecim, externi totidem, unus utriusque lateri communis, ipsum septum transversum, de quibus lib. 2. cap. 7. & 11. egimus. Dein abdominis (præter pyramidales) utrinque quatuor, de quibus vide lib. 1. cap. 8. & tandem thoracis proprii, utrinque sex, nisi lubeat adhuc tres ex Fallopii sententia addere (& sic forent sexaginta & unum) de quibus in præsens. At horum omnium alii communes sunt, ut musculi abdominis, qui non ad solam respirationem, sed alios etiam usus comparati sunt: alii proprii, qui soli respirationi inserviunt. At cum respiratio duplex sit, alia libera seu naturalis, alia coacta seu violenta. Libera, quæ placide fit, hoc est, ubi in inspiratione sine vi tantum aeris attrahitur, quantum ad spiritus vitalis generationem nem sufficiebat, & in expiratione, ubi aeris attracti pars rursus placide ad vocis generationem redditur: utrumque à solius Septi transversii motu efficitur: illa quidem ex septi contractione, in qua notharum costarum fines sursum nonnihil colliguntur, thoracis parte anteriore & inferiore coangustata, posteriore vero ad vertebra deducuntur.

Aaa. 3.

Eta. 3.

monis, & thoracis motum naturalem esse proficitur. An Hippocrates hac de re in hanc vel illam sententiam scripserit, manifeste & ex professo, ignoro. Vel alio motu thoracis arbitrarius est: non autem naturalis probat exemplo eorum, qui se ex spiritus retentione interfecerunt. Columbo in electione, cum natura movetur. Respirationem non ex nostro arbitrio pendere ut Galenus censuit, sed animalibus tam rationalibus quam irrationalibus à Natura ingentiam esse, perculiari libro Thaddæus Duntius contra Galenum ostendit.

c Cum octo abdominis musculi in universum 89 sunt, utrinque 44. & unus utriusque lateri communis: at canes & similia utrinque duobus abundant, ut simul habeant 93. Vel Thoraci musculi proprii 81. sunt & 8. communes in abdomine positi. Columbo Thoracis musculi 65. exceptis 8: abdominis, Plat. Musculi respirationis dicati 65. Laur. Musculi respiratorii sunt 93 alii sunt supra thoracem quales sunt nali 2. alii in thorace, & horum alii sunt super costas, qui dicuntur musculi thoracem moventes, 12. alii inter costas & sunt inter costales 68. alii infra seu subter costas, & sunt diaphragma & sextus Thoracis: alii sub thorace & sunt musculi abdominis 10. Piscoll.

cta, & costis inferioribus septem diremptis, thorace dilatato: hæc vero ex septo laxato, tum enim thorax pondere suo facile concidit. Coacta vero, ubi thoracis dilatatio & contractio evidens est; hoc est ubi in inspiratione cum vehementia spiritus attrahitur, quemadmodum in corde nimium calefacto fit: in expiratione vero, cum aer vi efflatur vel propellitur, ut pro voce, clamore edendo, ad iussim & sternutationem efficiendam: vel propulsus retinetur, ad conatum pro facibus excludendis intendendum: hæc respiratio à musculis sexaginta quatuor (adjuvante tamen & septo) absolvitur: ita tamen, ut in inspiratione pauciores, quam in expiratione laborent. In

3. Inspirationi coacta, in servit musculi 32. in qualibet parte 16. qui costas diducunt, subclavius, serratus major, serratus posticus anterior & tres Fallopiiani: at ipsi intercostales per accidens aliquid conferunt, de quare stemus, quam inspiremus. Sunt autem sacrolumbus, triangularis, intercostales omnes, quorum exteriores costas inferiores sursum adducunt: interiores, costas superiores deorsum adducunt: Abdominis musculi octo: & forte in magna necessitate, humeri & scapularum musculi in subsidium veniunt.

4. Inspiratione quidem subclavius, serratus major, serratus posticus superior & inferior & tres Fallopiiani: at ipsi intercostales per accidens aliquid conferunt, de quare stemus, quam inspiremus. Sunt autem sacrolumbus, triangularis, intercostales omnes, quorum exteriores costas inferiores sursum adducunt: interiores, costas superiores deorsum adducunt: Abdominis musculi octo: & forte in magna necessitate, humeri & scapularum musculi in subsidium veniunt.

Proprii thoracis musculi, qui thoraci adnati sunt, sex utrinque communiter recensentur, quibus tres adhuc Fallopius addidit; quorum duo parte anteriore, subclavius & triangularis; unus latera occupat, serratus major; cæteri parti posteriori incumbunt, tres quidem dorso, serratus posticus uterque & sacrolumbus: tres vero in cervice, à Fallopio propositi.

I. ^f Subclavius [tab. 1. 1. tab. 8. f. 3. r.] quod sub clavicula situs sit, dicitur, & spatium quod inter claviculam & primam costam est replet, hic à claviculæ parte anteriore ac inferiore costam respiciente carnosus enatus, oblique antrosum defertur, & in primæ costæ partem superiorem, quæ sterno jungitur, carnosus implantatur; fibras obliquet impense obliquas & propemodum transversas: huius beneficio costa prima sursum & extrorsum trahitur, sicque thoracis cavitas dilatatur.

II. ^h Serratus major [tab. 1. 4. 5. 22] in thoracis latere situs magnus est, latus, undique carneus, ex scapulæ basi interiore tota carnosus ampliusque enatus, carnosus, versus costas expanditur, iis incumbit, fibris connectitur, & octo superioribusⁱ quandoque & nonaⁱ, antequam in cartilagine finiant, insertionibus acutis, propter tendines oblique descendentes, tanquam digitis divisus inseritur, & cum abdominis obliquo inferior. Hic fibris collectis in maximis conatibus costas octo extrorsum trahendo, thoracem dilatat. At in canibus & simiis non solum costas octo inseritur, sed etiam vertebrarum cervicis 4. 5. 6. & 7. processibus transversis implantatur, vel, si mavis, inde exoritur. Tertium^k quoque canes habent, quo homines destituuntur, qui ab interiore

unus quem Vesal. pro 2. pari dorsi musculorum recenset. Plat. & eos quos Vesal. & quos Fall. proposuere, recenset: sed Fallop. exortum posuit, ubi Vesalius insertionem & sic usum illius immutavit. f. Musculi sub claviculis, de diss. muscul. 12. Ves. Coll. Fall. Piccolh. 1. par: Plat. inter intercostales recensuit: Laur. dissendentium thoracem primus. g. Cum à jugulo oriatur, jugulum vero ipsum sterno atque acromio, quod thoraci innititur, copulatum sit, non potest valide omnium costarum elevationi inservire, Fallop. observ. h. Gal. dissect. muscul. 17. Ves. Col. Fall. Plat. Arch. 2. Laur. dissendentium 2. scapula potius musculum esse voluit Sylvius. Fallop. at cum scapula moventium primo ortu & in serzione respondeat, dubium est, an scapulas potius cum illo moveat vel aliud simul cum isto thoracem, Plat. Hunc scapulam movere existimant quidam, sed falso, Lau. i. Ves. Col. Plat. Arch. ad octo superiores: Fal. in 6. vel 7. superiores costas, Lau. k. Ves. ex Gal.

fiore parte processus transversus secundæ vertebræ cervicis, & aliquot subsequens
 carnes enascitur & primæ costæ committitur: hic lator & tenuior redditus, qua-
 tuor costis superioribus carnosus incumbit, firmiterque adnascitur, & post quartam
 vel etiam quintam costam in tendinem membranoseum nervosumque definit, & ad
 septimam vel octavam, ut eas attollat, exporrigitur.

III. ¹ Serratus posticus superior [tab. 4. A] in dorso sub Rhombocide sive scapulæ
 tertio inter utramque scapulam & supra musculorum capitis primum parum situs est,
 parvusque existit: hic à spinis vertebrarum trium inferiorem colli ac primæ thoracis,
 latus & membranoseus enatus, ac nonnihil sub scapula oblique ductus, carnosus eva-
 dens, costarum quatuor superiorum tribus intervallis tripartitus inseritur: hic con-
 tractis fibris, costas, in quibus implantatur, sursum trahit: sicque thorax dilatur, e-
 jusque cavitas posterior, amplior redditur. In canibus variat, cum nonnihil altius exo-
 riatur & longius descendat.

Habent autem canes & simia & quintum, quo modo caret, qui supra thoracem si-
 tus est, & musculi recti abdominis portio videtur, quemadmodum lib. 1. c. 8. ostendi-
 mus (vel saltem ipsi firmissime connatus) qui supra cartilaginem ensiformem in mem-
 braneum tendinem definit, & sine carnosæ costæ primæ inseritur, & costarum vera-
 rum fines comprimendo, thoracem coarctat.

IV. ² Serratus posticus inferior [tab. 4. B] in dorso fere medio, sub latissimo, seu
 humeri musculo tertio situs est. hic membranoseus nervosus, latus & pene quadrangu-
 laris, quemadmodum & præcedens (quo major est) pectinem referens, ex spinis ver-
 tebrarum duarum, nonnunquam trium, inferiorum dorso, aliquando etiam superio-
 ribus ³ lumborum enatus, transversim delatus, dorsalibus incumbens, & fibris car-
 neis adactus ad costarum inferiorum quatuor intervalla ipsis costis, antequam in
 cartilagine desinant, veluti in digitos divisus, inseritur, estque in homine multo la-
 tius, quam in simiis & canibus; & in his insignior, quam in simiis. Hic costas tres vel
 quatuor inferiores extra trahendo, thoracis partem inferiorem dilatat. quemadmo-
 dum secundum octo vel novem superiores attollere & superiorem partem dilatare di-
 ximus.

V. ⁴ Sacrolumbus [tab. 5. F] qui thoraci ac dorso communis censei potest, & præ-
 cedenti subternitur, ex sacri ossis sede posteriore, & superiore illius ossis parte interna
 carnosus prodit, vertebrarum ⁵ lumborum processibus transversis innixis sursum abit,
 & usque ad thoracis vertebram infimam dorso musculo longissimo [tab. 5. ad C] com-
 miscetur, ut difficillime ab ipso sectione separari possit, quare illius portio esse vide-
 tur. [tab. 5. ad B] mox supra infimam thoracis vertebram ab aliis musculis, quibus con-
 nascebatur, secedens sensim tenuior redditus oblique costarum ⁶ inferiorum sex tu-
 berculis, quæ ad radices sunt, tendinibus fere teretibus, non tamen penitus carno-
 sis, externo latere productis [tabul. 5. γ γ] singulis costis duplicem tendinem tri-
 buens inseritur: inde vero (ut recte Fallopius) sex novi quasi musculi carnei produ-
 cuntur, qui tam ortu, quam insertione nervei sunt, & in superiores costas sex im-
 plan- & spinis lumbo-
 rum nascitur. Laur. r. Omnibus costis inseritur, Col. Fall. in inst. Piccolli. decem superiorum costarum, Ves. Non in om-
 nes costas inseruntur, sed tantum in sex inferiores, à quib. singulis tendo in superiores mittitur, Fall. obs. in costas fere om-
 nes inseritur, & singulis costis duplici tendine eoque validissimo alligatur, quorum alter deorsum, alter sursum fertur.
 ut videantur quasi sese intersecare, & eo motu costas arcuare & constringere, Lau. Interdum etiam cervicis vertebra septi-
 ma processu transverso tendinem quoque offert, Ves. ad primam usque vertebram & sæpe ultimam cervicis quoque attingit, Plat.

1 Ves. 3. homini.

2 & simiarum

ac canum 4.

Col. Fall. Plat.

Arch. 3. Laur.

discedentium

4.

in Quamvis co-

stas attollat, ta-

men quia par-

vus & obli-

quus debilem

insertionem ha-

bet, solus hanc

functionem in-

tegre obire non

potest. Fall. ob-

servo.

5. Vesal. 5. ho-

minis, quisi-

miarum & ca-

num 7. Fal-

lop. Plat. 5.

Columb. &

Arch. 4.

Laur. di-

stendentium

5.

6. Nonnun-

quam etiam

à prima lum-

borum Colum.

Arch. ali-

quot etiam pri-

morum lum-

borum, Ve-

sal. Laur. à spi-

nis postremis

thoracis & pri-

mis lumberum

Plat.

7. Ves. 4. homi-

nis, simiarum

6. Fall. Plat. 4.

Col. & Arch.

5. Laur. 13. ex-

pirationi dica-

tus.

8. Ab osse sacro

plan-

& spinis lumbo-

plantatur; ut à duodecima costa, ubi hic musculus inseritur, tendo quidam oriatur, qui carnosus redditus & ascendens iterum excarnis factus in sextam costam infigitur, & musculum gracilem æmulatur: sic ab undecima costa similiter alius tendo prodit, qui in quintam costam inseritur; à decima quoque unus, qui in quartam, & à nona alius, qui in tertiam, denique ab octava & septima gemini, qui in secundam & primam implantantur: omnesque hi tendines musculos distinctos referunt, ita tamen invicem & cum Sacro lumbis in superficie commisti, ut ipsius partes esse videantur. Quare dum Sacro lumbus costas inferiores sex retrorsum, simulque deorsum trahit: sex etiam superiores prædictorum additamentorum (quæ ansulæ vocantur) movet, sicque thoracem constringit.

f Cum revera non sint, Fall. observ. Ves. 6. hominis, 8. canum & simiarum, Col.

Fall. Plat. Piccolh. 6. Laur. 12. expirationi dicatus.

u Totus carnosus per universum pectoris ossis latus sub tota verarum costarum cartilaginum regione, Vesal. Col.

carnosi sed exiles ab extremis claviculis oriuntur, & deorsum supra os sterni utrinque unus decurrit, & terminatur in infimum sterni os, Piccol.

Vesalius canini muscul. fructu ram pro humana proposuit, nam in homine, neque totus carnosus est, neque omnes integerrum costarum

cartilagineas

occupat, Fall. observ. & inst.

x Huius fibra decepto veteres, & neotericos fere omnes, ita ut inter cartilagineos addiderint externos & internos 24. Fallop. Laur.

y In suis observ. at in Instir. prætermisit, forte, quia Vesalius scripsit, se vereri, ne musculi cervicis & dorsi, à Fallopio in sectione dilacerati, illi plures statuendi occasionem præbuerint.

z Hic à nemine descriptus, ait Fallop. in observ. a 2. par dorsaliū Ves. verum ex insertione à Vesalio ei tributa, illius exortum & ex principio insertionem Fallop. facit, & sic usum immutat.

VI. ¹ Triangularis, à forma dicitur, cum ex duobus longissimis lateribus, unoque brevi constructus sit; hic intra thoracis cavitatem sub sterno situs, parvus est ac subtilis, & in quibusdam, præsertim macilentis, vix carneum quid ostendit, & in aliquibus partibus nervosam membranam carne infarctam refert: hic à sterni parte inferiore enatus oblique sursum versus exteriora cartilaginibus costarum verarum ad secundam usque innatus procedit, hicque in causa est, quod musculi intercostales & intercartilaginei diversi, ob fibras x diversas, appareant. Huius munus costarum cartilagine in vicem adducendo thoracem constringere, sive thoracis partem anteriorem, quantum ad respirationem satis est, deprimere. An forte instar tomenti, sterni partem internam sublevit, ut cordis basin mollius excipiat? In canibus vero, totum sterni latus, carnosus totus occupat.

Fallopius primum & tertium musculum imbecilliores existimavit, quam ut thoracis elevationi sufficere possint, ut qui secundum potius scapulæ motorem iudicet, idcirco tres alios y statuit qui hanc actionem obire possint, quos in cervice collocat, hosque Vesalius partes musculorum cervicem & dorsum occupantium in sua Apologia existimavit, alii Scalenum in tres partes divisum volunt.

VII. ² Nervoso principio ab interna facie processuum transversalium tertiæ, quartæ, quintæ & sextæ vertebræ cervicis enatus, carnosiorque factus in costam primam infigitur, ut illam, ac totum simul thoracem attollat.

VIII. ^a Scalenus [tab. 7. 2. tab. 15. lib. 2. CC.] ob triangularem figuram, eamque inæqualem sic dictus: hic ab omnium vertebrarum cervicis transversis processibus) aliquando tamen prima & secunda excepta) nervosus oritur, & in costam primam, aliquando etiam secundam carnosus inseritur: hic attollendo thoraci inservit.

IX. A processibus transversis vertebræ cervicis quartæ & quintæ, in secundam, nonnunquam in tertiam costam sine carnosio implantatur, eamque attollit. Ab his ergo tribus & à Serrato postico superiore, thoracem elevari, Fallopius censuit.

De

De Musculis ^a capitis.

CAPUT VII.

De his Galenus de diff. musc. 9. 4. adm. anat. 6. 7. & 8. 12. us. part. 8. 9. quemadmodum de duplici motu capitis egit lib. de ossib. 8. quorum alter annuendo, abnuendoque fit: alter in latera instar choricæ circumagendo: illum vertebra secunda cervicis processus potissimum præstat: hunc vero summa vertebra: vido & 12. us. part. 6. & 7.

Caput dupliciter movetur, primario & secundario: primario quidem supra secundam colli vertebra[m] antrosum flectendo & retrorsum extendendo: supra primam ^b vero velut ad axim circumducitur: qui motus à septem, ^c vel potius novem musculorum paribus propriis absolvuntur, quorum septem extendentes & circumagentes parte posteriore in cervice sui sunt: duo vero flectentes in colli anteriore parte locantur: secundario vero & per accidens, cum cervicis motum sequitur, à cervicis musculis, sed ad latera movetur: immota enim cervice, caput proprio motu ne minimum humeris adducemus.

I. ^d par; Splenii [tab. 5. ΔΔ. initium char. 8. insertionem ch. 9. indicat.] qui oblongi sunt & crassii, utrinque vertebra inlatri, & licet satis carnosii sint, nervoli tamen à spinis ^b utrum utriusque sit obliquum motum ad primam vertebra[m], vel contra moveri, 12. us. part. 6. & 7. inquiritur: sic de motu primæ & secundæ vertebra, 4. ad an. 8. caput proprio motu, quiescente etiam cervice, flectitur & extenditur seu antrosum & retrorsum super primam cervicis vertebra[m] fertur: dein alio peculiari motu supra secundam vertebra[m] velut ad axim circumducitur. si flexu siue extensum cum cervice aut citrà cervicem existat: at in latera non nisi cervicis beneficio, ac velut secundario inclinatur, Vesal. Plat. primario cum prima & secunda vertebra, secundario cum toto collo: proprii tres videntur, unus ante, retro: alter ad latera: tertius cum circumagitur: motus recti super primam vertebra[m] fiunt, obliqui super secundam, quidquid Galenus in hoc asserat, qui neque mathematicam, neque anatomen in hoc calluisse videri possit, Columb. De Motu capitis eleganter pro Galeo scripsit Bartholomeus Eustachius libello proprio.

^e Septem paria partim caput partim primam vertebra[m] cervicis agunt, Vesal. 7. paria propriis capitis motibus famulantur, Columb. Et Piccol. qui musculos cephalicos, id est, capitales, seu caput moventes vocat: decem paria proponit Fallop. in observ. at in Inst. tantum septem: paria 7. Vesalii & 9. Fallopii recenset Plat. capitis musculi 14. sunt, flectentes duo, extendentes octo, semicircularem motum edentes quatuor, Laur. d. 1. par musculor. capit. Vesal. Columb. Fallop. in observ. & in Instit. Plat. Piccolb. extendentium magnorum primi duo Splenii, Laur. ^c A quarta thoracis vertebra spina usque ad tertiam cervicis spinam Fallop. inst. à sexta thoracis ad tertiam cervicis, Plat. ^f Fallop. observ. à ligamenti cervicis enatis putat Fallopius, Plat. ^g A quinque sed nimis quam leviter, Vesal. à colli vertebra ad tertiam usque, Col. à quinque vertebra thoracis & ab inferius quatuor cervicis orti, Laur. à quinque superiorum dorsi & trium inferiorum colli, Piccolb. ^h In transversos secundæ vertebra processus portione altera, altera in occiput inseruntur, Laur. ⁱ Nexum exiguum in vertebra[m] transversos processus molitur, Ves. ^k Fibra ab origine sua donec dividantur, recte sunt, dein obliqua, Col. Piccolb. hic vult inter posteriorem occipitii partem & aures in caput desinere.

^a Musculi qui caput movent, numero sunt octo. & viginii, aut eo plures, iustam in orbem ipsum circumstantes, quarum alius aliam habet actionem, quorum octo paribus anterioribus, quatuor de posterioribus ex diametro sibi ipsis oppositi & 12. us. part. 8.

^b Utrum utriusque sit obliquum motum ad primam vertebra[m], vel contra moveri, 12. us. part. 6. & 7. inquiritur: sic de motu primæ & secundæ vertebra, 4. ad an. 8. caput proprio

Bbb

obli- 8. caput proprio

oblique sursum à vertebrarum spinis, quasi ad vertebrarum superiorum processus transversos ducuntur, dum oēs simul in occipitio finiant. At ubi ex thoracis vertebra prodeunt, angulum acutum referunt, & sursum ascendentes sensim dilatantur, & circa tertiæ vertebræ colli spinam sensim, dexter à sinistro extrorsum ad occiput notabili spatio jungitur [t. 5. ch. 12.] ita ut horum musculorum recessus triangulum æmuletur [t. 5. ch. 9. 10. 12.] & tandem lato carneoque sine oblique^k in occiput implantantur [tab. 5. à ch. 11. ad 9.] & sic latera tria habent; unum ab initio, usque quo à socio dividitur, alterum inde ad occiput, tertium ab occipitio ad exortum usque. Nonnunquam etiam nervosa particula in processum mammillarem inseruntur. Horum usus, cum ambo agunt, caput ad posteriorem partem recta trahere & extendere: at cum^m alter duntaxat agit, caput in latus circulariter vertere.

^k Transversa
linea, Vesal.
transversum,
Plat.

^l Fallop. observ.
^m Tum dexter
caput retror-
sum simulque
evidenter dex-
trorsum, contra
si sinister, sini-
strorsum ducit,
Piccolh.

ⁿ 2. par Vesal.
Col. Fallop. in
observ. & inst.
qui capiti &
cervici commu-
nes dicit, Plat.

(qui addit à
Vesalio in unū
Fallopio in duo
distingui pa-
ria) Piccolh.
extendentes cō-
plexi seu impli-
cati, Laur.

^o Gal. refert,
quosdam non
duos tantum,
verum quos-
dam 4. quos-
dam 6. recensu-
isse: verum ait
Vesal. hanc con-

jugationem in homine multo aliter compararam esse, quam Galenus descripserit: ex quatuor veluti musculis, Vesal. plures, quam quinque musculi videntur, Col. triplici oritur principio, Fall. observ. ex quatuor veluti musculis utrobique constans, quorum alii à processu transverso quartæ & quintæ vertebræ thoracis; alii à spina vertebrae cervicis, alii à transversis processibus primæ & secundæ thoracis; alii ab omnibus istarum vertebrarum transversis processibus molemque carneam efformantes per eam occipitio adnascuntur, Fall. insit tribus utrinque partibus constitutum est, Plat. principio multiplici à spina 1. & 2. thorac. vertebræ & transversis processibus quinque inferiorum cervicis & varie permixtum corpus efformantes in medium fere occiput desinunt, Laur. à transverso processu 4. & 5. dorso vertebræ oriuntur, Piccolh. p. A spinis primæ, secundæ & septimæ cervicis interdum oriuntur, Plat. q. à thoracis 1. & 2. & quinque inferiorum cervicis, Plat.

^r Si solus dexter, retrorsum simul, sed leviter ac paulatim dextrorsum, & contra Piccolh. Vesal. pro quarta parte secundum musculi recensuit: at Fall. in obsequium facit exacte distinctum musculum: addens Vesalio errandi causam præbuisse.

buiffe, quod fibras aliquot cuiusdam dorsalis musculi cum principio huius connasci videantur. Idem duos ad huc addit, admodum parvos, qui à processu transverso primæ vertebræ orti, graciles valde ad caput ascendunt, & prope mammillarem processum in illud inseruntur, quæ tamen tertii musculi particula videantur: quorum Gal. diff. musc. videtur meminisse, dum de undecimo musculo, vel pari caput movente loquitur: 8. Fallopio carnea moles quarta pars secundæ musculi Vesalio, Plas.

quoque nervoso in processus mammillaris radicem posteriorem, juxta insertionem duabus portionibus à processu transverso primæ vertebræ exortis, ad auctum, inferitur. Huius usus, si ambo agant, caput retrorsum leviter ducere; si alteruter, caput retrorsum ad latus trahere.

IV^r par: Recti majores [tab. 7. AB] parvi sunt, carnosus & graciles, qui ab apice spinæ secundæ vertebræ cervicis [E] in exortu contigui prodeunt, & statim invicem abscedentes, ambo sursum porrecti, teretes in occipitium medium desinunt.

V^a par: Recti minores [tab. 7. FG] sub illis siti sunt, illisque substantia, forma, duratione similes sunt, qui à primæ vertebræ parte posteriore, ubi vertebra in spinam desinere debebat (deficit autem spina, quia hi musculi læsi fuissent) in exortu quoque contigui prodeunt, mox invicem diducti, sursumque porrecti, teretes occipitio medio utrinque infinguntur. Hæc duo paria^x si simul agant, caput ad posteriora trahendo recta extendunt: si vero horum alter solus agat, in latus circulariter movet. Quod autem tot fuerint musculi caput retrahentes, causa est, quia anterior pars propter faciem & maxillam inferiorem ponderosa est.

VI^y par: Obliqui superiores [tab. 7. HI] sub rectis siti sunt, iisque forma & substantia respondent, parvi sunt, qui è medio occipitio juxta externum latus quarti parvis orti deorsum^z descendentes in apicem [D] processus transversus primæ vertebræ cervicis transversum, dexter in dextrum, sinister vero in sinistram processum^a inferitur. Horum munus, si ambo^b agant, ut recta leviter abnuamus: si alter tantum, caput retrorsum in illam partem inclinat.

VII^e par: Obliqui inferiores [tab. 7. KL] à spina secundæ cervicis vertebræ prodeunt [ab E ad D] & oblique sursum procedentes processui transverso primæ quoque vertebræ implantantur. Hi cum obliquis superioribus oblongi sunt, carnei & pene teretes (in cane & similibus multo quam in homine crassiores & insigniores) triangulum & qui laterum constituunt. Huius septimi paris munus^d caput cum secunda vertebra supra primam circulariter; vel si mavis, semicirculariter cum perfectus circularis motus capitis non detur, circumagere quando^e unus agit: si ambo^e, aut sistet caput, aut illud retrorsum vix trahet ad motum, sed ad quietem vertebræ, cum hæc capiti ob ipsam vertebra maccidant.

Bbbb 2

VIII. a Hinc oriri in caput desinere

videtur potius statuere Fallopius, Plas. b Gal. diff. musc. 9. caput in gyrum movere voluit Ves. verum cum non oblique declinet, ut in motu circulari requiritur, in gyrum non movebit, Fall. obser. semicircularem capitis motum edunt, Laur. Plurimum valent cum precedenti pari ad facilitandum motum capitis in orbem factum, Piccolh. c 5. par Col. 6. par Ves. Fall. inst. Plat. 7. par Fallop. obser. obliqui musculi posteriores, Laur. d Primam vertebra cum capite supra secundam circumvertunt duo posteriora paria, Ves. at sic Fall. quod caput in gyrum moveant, mihi à veritate penitus alienum quoad sextum par, cum capitis dearticulatio cum prima vertebra tali motui inepta sit: at de septimo verum apparet: sic Laur. ad obliquos motus peculiare musculi non sunt, sed dum alterius partis flexor cum extensore opposito, simul agunt, obliquum edunt motum: & hac duo paria semicircularem capitis motum edunt. Caput in orbem una cum prima vertebra trahunt, à primis tamen atque extremis adiuti, Col. c Fall. obser.

t 3. par. Vesal.
Columb. Fall.
inst. Plat. Piccolh. 4. musc.
Fall. obser. extendentes parvi re
Hi, Laur.
u 4. par Vesal.
Col. Fall. inst.
Plat. Piccolh. 5.
musc. Fall. obser.
extendentes par
virescentes
res, Laur.
x Horum usus,
ut & secundo-
rum Piccolh.
y 5. par Vesal.
Fall. inst. Plat.
6. par Col. Fall.
obser. obliqui
musculi primi
Laur.
z Oblique de-
scendentes, Ves.
oblique recta
fere descendunt
Plat. quasi re-
sta, non autem
oblique, ut Ves.
voluit, Fallop.
obser.

57. par Vesal.
Col. Fall. inst.
Plat. (cui &
elatus par) Pic
colb. 8. par Fal-
lop. inst. fle-
tentes duo,
Laur.
g In processum
mamillarem
inferi voluit
Ves. Col. Plat.
Laur. Piccolb.
addit Vesalius,
se in quibus-
dam quadrupe-
dibus in medio

ductu biparti-
tum invenisse,
nam parte mam-
millari proces-
sus, altera ad
auris radicem
calvariae inser-
tum; tres autem
fines in nullo
comperisse, nec
principium in
duas tresve partes manifesto distinctum, quamvis hi muscoli utrinque ab aliquibus tres aliquando & duo, enumerati
fuerint, hic numerus pro musculi finium ratione in simis & canibus inter Anatomicos variat: licet plerique hos à capite
ratos pectoris ossi & claviculis inferi, thoraci que motibus praefici contenderint, Vesal.
h Columb. in duos & tres secant plurimi: sunt enim distincta eorum principia inter qua cavitas sensibus conspicua
Laur. imo Galenus unumquemque in duos dirimit: Sylvius in tres dividuum scribit.
19. par Fallop. in obfer. as in inferi. praetermissum: par profundius & 9. par Fallopii, Plas.

VIII. f par: Mastoidei [tab. 26. f. 2 K. posterius. tab. 27. fig. 3. K] parte anteriore siti sunt, membraneo latoque musculo in collo occurrente [tab. 26. f. 1. T] proxime subiecti validi, longi, ac teretes, qui etiam nondum excoriato cadavere in macilentis apparent, imo in viuentibus conspiciuntur, & ii sunt, qui ab antiquis in numismatibus tanta diligentia observati suere. Hi à summi sterni [p] regione media & parte claviculae, qua sterni [σ] coarticulatur, nervosi latique, sed à sterni nervosiores exorti, oblique sursum procedunt, carnosique densique redduntur, & sine carnosio crassoque in processum & mamillarem, quem sua amplitudine complectitur, & occipitis partem posteriorem oblique inseritur [r. 26. f. 2. T. superius.] & hunc propter duo principia, inter quae h cavitas aliqua, cum in duos dividi possit [tab. 26. f. 2. p. σ] aliquoties plures secant. Hi si simul agunt, caput anterius in primum flexum, quod annuendo fit, sive rigida, sive inclinata cervice: si alteruter solus caput ad anteriora in latus dextro quidem agente sinistrorsum, sinistro dextrorsum circumagat, quod in equorum habentis animadvertitur. Hoc par cum hyoidis pari secundo [tabul. 26. fig. 2. VV] in collo crucem, efficiunt.

IX. i par: [tab. 15. lib. 2. ad latus AB] à Fallopio additum, aliqua ex parte à Galeno descriptum, sub oesophago in anteriore colli parte situm, & à primo cervicis pari, [tab. 1. DE. tab. 15. lib. 2. AB] cui tamen adjacet, diversum, principio nervoso à chordis vertebrarum cervicis oritur, quae chordae à processibus transversis vertebrarum cervicis fere omnium, praesertim septimae, sextae, quintae, quartae & tertiae oriuntur, quod carnosum aliquantum redditum ascendens, sine carneo in capitis basin inter utrumque processum, quo cum prima vertebra articulatur, inseritur, & caput manifeste ad anteriora, dum annuimus, flexit.

De Musculis a cervicis seu Colli.

CAPUT VIII.

De his consule Galenum de diff. musc. 16.

a cervicis, dorsi
& lumborum
musculos dorsi-
sales vocat Vesal. (& Plat.)
quos nimis frigide & nequaquam omnes
Galenus descripsit, Fall. in
obs. dorsi musculos indigestam molem & confusum chaos musculorum appellat, cum sint veluti plurimorum piarum
Labyrinthus: Columb. & Laur. muscoli cervicis, à quibus secundo caput movetur: Piccolb. muscoli cervicales, id
est cervicem moventes.
b Sui & sex: cum, octo nimirum paribus compl. xi, quorum octo primi, cervicis potissimumulantur motibus (de quibus hic
agi-

Musculi cervicem seu collum primario, secundario vero caput moventes, utrinque b tres sunt, vel quatuor, si Scaleni, quos inter Thoracis musculos recensimus,

agimus) ac inter musculos caput agentes subinde recensentur, Vesparia octo sunt Vesalio, sex tantum Fall. ait Plac. octo sunt muscoli, Col. Piccolb. Laur. & hic, quatuor flectere, quatuor extendere, motum ad latera ex altero extensore & flexore simul agentibus perfici assersit: Fallop. observ. totam molem carnem in dorso (intelligit & cervicis & dorsi musculos) satis commode in sex paria dividi potest.

mus, addantur, qui sub capitis musculis locati sunt: quorum alii parte anteriore, & ad cervicis latera: alii parte posteriore siti sunt, quibus cervix antrosum flectitur, retrorsum extenditur, & in latera, pro diversa eorum actione, reliquo corpore immoto persistente, movetur, & his successive agentibus, cervicis motus, qui circularem amulatur, efficitur. Plures autem sunt, qui eam retrorsum, quam qui antrosum ducunt, cum illud propter cervicis capitisque pondus opere suo sit.

I par^c: Longi duo [tab. 1. D. Et. tab. 15. lib. 2. AB] qui parte anteriore^d duo oesophago^c Musculi spinam flectentes, Hi principio carneo, diff. muscul. 25. 1. par dorsi, Ves. Fallop. obser. thoracis & cervicis omnium, latiores redditi & adnati ascendunt, utriusque lateris Plac. 1. par cervicis, Col. Piccolb. flectentium prim. par. Laur. ex Galeni sententia nonnulli putio ad magnum ipsius foramen, obscure tamen inseruntur, ita ut ab iis etiam occiput flecti videatur, hocq; par una cum Mastoideis caput antrosum inflectit. Hi proprio motu cervicem^e recta anteriora versus flectunt, & una caput inclinant: si vero alteruter solus agat, in contracti lateris antrosum cervix inclinabitur.

II par^f: parafacientes eos, quos Scalenos vocavimus [tab. 15. lib. 2. CC. tab. 7. A] & thoracis musculum octavum fecimus, qui latera magis occupant, quos a costa prima carnosos amplosque oriri & in omnes transversos processus & vertebrarum colli, prima & secunda nonnunquam excepta (unde eos prodire diximus) inferi volunt, & cervicem^h anteriora versus flectere, quemadmodum & primum par faciat. His peculiareⁱ quod foramen habeant, quo venae & arteriae in brachium excurrentes transire possint.

III par^k: Transversales duo [tab. 6. E] in dorso siti sunt, & a radicibus transversorum processus sex^l thoracis vertebrarum superiorum orti, sensim crassiores validioresque redditi, in omnes transversos^m processus vertebrarum cervicis sede externa inferuntur, rarius in primae vertebrae processum implantantur: aliquando duo alia principia acquirunt, unum a secundo pari dorsi, alterum a quinto pari thoracis, quae simul musculos hos efformant. Hi si simulⁿ agant, recta in posteriora extendunt, si alteruter agat oblique movet: inter hos, nervi spinalis medulla e vertebris colli exeuntes, feruntur.

Bbbb 3

IV. m par: ad septem cer-

vici relatis, quare satius unum numerare aut decem, quamvis prae rationem, Ves. d 5. ad. an. 9. diff. muscul. 16. & 25. e. Gal. 13. us. part. caput relevar. & sursum ducere docuit parum recte: alii non solum cervicem flectere creduntur, at etiam thoracis vertebrae superiores, Ves. f. 2. par dorsi, Ves. Plac. 2. par cervicis, Col. Piccolb. flectentium cervicem 2. par, Laur. 8. par thoracis, Fall. obs. g. hic Vesalini insertione, Fall. exortum posuit. h. Cervicem retrorsum recta contorque, Piccolb. 1. Vesal. Plac. k. 3. par dorsi, Ves. Plac. 3. par cervicis Col. Piccolb. 1. par extendentium cervicem, Laur. 2. par dorsi triplici principio ortum, Fall. obs. 1. Sexta dorsi vertebra Piccolb. m. Tum dorsi tum cervicis inter spinam & transversos processus secunda vertebra terminantur, Piccolb. n. Horum ut secundorum collum recta ad capulas flectere sive ad latera, Col.

¶ 4. par dorsi
Ves. Plat. 3. par
dorsi Fallop. ob-
serv. 4. par cer-
vicis, Col. Pic-
colh. 2. par ex-
surgentium,
Laur.
p. à processibus
transversis ver-
tebrarum tho-
racis incipiens
à 9. vel 8. ad
primam, &
omnibus processibus transversis vertebrarum cervicis usque ad secundam, ubi inseritur, Fall. obser. q. In spinas cer-
vicis definit, Laur.

IV^m par: Spinati duo [tab. 7. II] inter spinas siti, totam cervicem occupant: hi à radicibus spinarum septum superiorum vertebrarum thoracis exoriuntur, qui ubi cervicis vertebram infimam contingere, ampliore sede ab illa enascuntur, & fibris à thoracis vertebris enatis, obscuram insertionem in illius vertebræ spinam moluntur; reliquis cervicis vertebrarum spinis valide innascuntur, & ab eorundem transversorum processuum radice usque ad secundam, initia nova educunt, enatas fibras spinæ superioris vertebræ inferentes, donec in totam inferiorem spinæ secundæ 9 vertebræ cervicis sedem implantantur, & dexter cum sinistro jungatur, & toto per cervicem progressu mutuo accumbunt, & duntaxat spinis vertebrarum distinguuntur: horum quoque fibræ ab exterioribus sursum modice inferuntur.

Quod si omnes simul agant cervicem recta ad posteriora trahendo, extendunt, eamque firmam, erectam & rigidam, ut in Tetano, conservant. Si alteruter solus agat, obliquos motus perficit: nam colli motus lateralis nullis peculiaribus musculus peragitur, sed ab altero flexore & extensore simul agentibus, perficitur.

De Musculis dorsi.

CAPUT IX.

De his Galen. lib. de diff. muscul. 24. *οὗτοι οὖν οὗτοι*, spinales dicuntur, & 25. 5. *admin. anat.* 9. & 10.

a. diff. muscul. 24.

Dorsi musculi, quemadmodum & universæ spinæ, adeo varii, misti & connexi sunt; ita, ut alii in plures, alii in pauciores musculos dividerint, idque ob infinitam fibrarum & originem & insertionum multitudinem: At singulari naturæ artificio, ut recte Arantius, invicem adeo connexi, & intertexti sunt imo potius continuas indivisibilesque particulas habent, quo actiones validas quibus præsumt, facilius sustineant, ac perficiant, dum omnes simul in unum motum conveniunt: siquidem una cum vertebris omnibus requeam corporis molem, quæ osse sacro, tanquam basi stabilitur, erigere ac retinere destinati sint. Quare cum Galeno^a dicimus, cum vere se jungi nulla ratione queant, vel totidem quot sint vertebræ paria numeranda videri, vel unum tantummodo par tendinosas distributiones vertebris omnibus offerens, statuentum; cujus quidem partis altero agente, si in a extensa in illud latus inclinat: utriusque vero æqualem actionem obeuntibus, pro eorundem intensione aut remissione in neutram partem vergens, retrorsum recurvatur. Cum autem musculis pene omnibus actionis contrariæ opifices dati sint, qui mutuam actionem & passionem experiantur, quiete per mediam figuram interposita, his tamen spinæ dirigendæ dicatis, si cervicem flectentes excipias, musculi contrarii dati non sunt: nam cum interna regio thoracis ac lumborum, visceribus nobilissimis respiratori ac nutritioni intervenientibus dicata fuerit, nulla instrumenta voluntarii motus, quæ eorum actionibus impedimento forent, adhibenda fuere: unde musculi hi in senibus cum ob corporis pondus

pondus & imbecillitatem, tum quod pituitosis succis abundant, laxiores redditi, corpus erectum minime continere possunt. At motus hic lumbis potius q̄ dorso adscribendus, cum dorsum, sive ea pars quæ inter cervicem & lumbos media est immota videatur: siquidem motus in ultima dorsi vertebra quæ libera est fiat, quæ undique excipitur & non excipit.

Verum Anatomici, cum dorsum antrosum, retrorsum, ad latera & fere semicirculariter (quos motus in saltatoribus observare licet) moveri animadvertissent, ad hos motus obeundos, quatuor b utrinque musculos constituere.

I. c par: Quadrati [tab. 1. lib. 2. r. t. 1. lib. 4. ΣΣ. t. 6. & 7. Σ.] ab ossis ilii cavitate posteriore & superiore & ossis sacri superiore & interiore, lati, crassi, carnosique exoritur, & quasi quadrati d supra lumborum vertebra in abdominis parte interiore ascendentes, modice angustantur, & processibus transversis vertebrarum lumborum adherentes, costæ duodecimæ parte inferiore carnosæ inseruntur. Hujus fibræ ab exterioribus introsum oblique ad superiora ascendunt, & quæ à sacro osse prodeunt, sensim in lumborum vertebra infimæ inseruntur, quæ has versus ilium os succedunt, sensim in vertebra superiores desinunt, ita ut toto ductu processibus transversis vertebrarum lumborum, ipsorumque lateribus inserantur. Hi lumborum e vertebra, seu dorsi partem inferiorem recto motu in anteriora flectunt: si vero alteruter solus operetur, tum oblique flectendo ad latus simulque antrosum trahit. Verum forma in canibus & simis f longe ab hominis varians.

II. par: g Longissimi [tab. 4. s. 6. 7. Φ.] omnium musculorum corporis nostri, siquidem ab ossis sacri extremo ad primam vertebra thoracis, aliquando ad ossis temporum processum mammillarem exorrigantur: thoracis musculorum quinto pari sacrolumbo dicto similes [tab. 5. Γ.] cui in exortu & per lumbos progressu connascuntur, quasi illius paris pars foret, suntque dorsaliū omnium maximi. Hi ex ossis sacri spinæ summo [tab. 6. L.] secundum ipsius longitudinem, & ex spinis quinque vertebrarum lumborum, nervoso admodum, valido & acuto [tab. 7. b.] principio exorti, & ossis ilium h sede [tab. 7. Φ.] interna, qua sacro jungitur principium i nervosum e ducunt, sub quo principio nervoso, tanquam sub tegumento quodam, aliud summe carneum principium latitat: hinc ascendentes, ad externum latus carnosiores k rediunt, processibus transversis vertebrarum lumborum inseruntur, k ac omnibus processibus transversis vertebrarum thoracis, sensim ab undecima ad primam angustiores redditi, unum nervosum tendinem interna sede, instar ansulæ cujusdam nervosæ [tab. 6. MM.] oblique versus exteriora sursum expansos largitur, quemadmodum sacro lumbi ab exteriori sede costis singulis tendinem offerebant; & aliquando

b Dors. musculi octo sunt, quatuor utrinque Col. musculi dorsales & lumbales, hoc est, dorsum & lumbus moventes octo sunt, Piccolh. dorsi musculi decem sunt, Laur. Lumborum musculorum vocat & sex constituit, Sylvius.

e s. par dorsi, & secundus musculus lumborum Ves. (qui censuit quemadmodum Col.) in eorum musculorum numero haberi, qui s. par dorsi dicuntur, quævis Clearchus exteriores quoque sextum & septimum par sic appellaverit, quæ in re reprehendit Fallopius Vesalium.

quia vera musculi s. par dorsi ab Hipp. & Galeno dicti, duo sint femur moventes musculi, quos pro sexto pari Vesalium recensuit, & quævis Clearchus, auctore Polluce, vel Clitarchus auctore Russo, dorsales musculos exteriores his nominibus vocari dixerit, in errore tamen fuit, eodem Russo esse: at Plat. s. par dorsi cum sexto musculo femoris efficere asserit, s. par dorsi Plat. 6. par dorsi, Fall. 1. par dorsi Col. Piccolh. (cui & lumborum interior) Laur. 1. par lumborum, Sylv. d. Quadrangulū constituit, Ves. figura quadrilatera, Col. alius triangularis. Hi ambo dūtaxat lumborum vertebrarum motus auctores sunt, Ves. f. Galen. s. ad. an. 9. descriptio simia nō admodū quadrat, & longè minus homini, Ves. g. De his Gal. s. ad. an. 9. 6. par dorsi Ves. Plat. s. par dorsi, Fall. obs. 2. par dorsi Col. Piccolh. (cui & lumbares, & dorsales) Laur. 2. par lumborum seu extendentium primum, Sylvio semispinati quibusdā, h. Ves. Fall. non meminit Col. 1. Carnorum Ves. nervosum, Fall. k Triplex

De Ligamentis capitis, & vertebrarum & thoracis.

CAPUT X.

De ligamentis vertebrarum agitur 13. usq. part. 4. & 8.

Cum capiti cervicis vertebrarum primam [tab. 27 fig. 5 lib. 2. ABC.] committi necessum fuerit, idcirco natura ligamentum membraneum, quod totum articulum ambit, robustum & crassum [EEE] creavit, quod capiti primam vertebra utrinque^a in occipito nequit, à cuius basi exoritur; & quo firmius stabiliusque sit, Natura in pueris occiput multifidum creavit: hoc autem validissimum esse debuit, cum articulatio hæc nullam luxationem patiatur, siquidem talis lethalis sit: quare hic ligamenta validiora, quam cætera corporis nostri, quibus arte continetur, ut harum luxatio difficillima sit; idcirco prima & secunda vertebra frangi facilius, quam luxari potest. Alterum vero est, quod vertebra secundam capiti copulat, validissimum & teres [I] cartilaginem æmulans, quod ex dentis vertice [H] enatum occipitis ossi ad magnum ipsius foramen infigitur, quo vertebra occipitis colligit, & una cum dente velut axem efformat, secundum quam caput in gyrum agitur. Tertium ligamentum est transversum [K] ipsi denti obductum, ipsiusque posteriorem sedem ambiens, quod ex latere interno vertebræ primæ prodiens, alteri ejusdem vertebræ lateri validissime implantatur, quod robustum est, & cartilagineæ naturæ, ne in capitis motibus vehementioribus dens ex sinu suo luxetur, sicque spinalem medullam, quæ illac transit, comprimatur aut frangat. Quartum ligamentum [EF] est quod primam vertebra [ABC.] secundæ [D] jungit, membraneum quoque est, & ejusdem cum aliorum articulorum ligamentis membraneis naturæ & usus. De ligamento maxillæ inferioris cum ossibus capitis, quemadmodum de ossis hyoidis, suo loco diximus.

^a Inter primam & secundam vertebra non figitur, ut nonnulli sunt opinati, sed orbiculare vinculum est, & utrique circumquaque validissime adhæret, ante, retro, & ad latera, Columnæ.

Vertebrarum quoque corpora inter se ligamentis colligantur, ita ut duarum corpora, anteriore potissimum parte, & in lateribus jungantur, & quidem primum ligamentis communibus validis & mucosis: humiditas^b enim crassa ac viscosa circumfusa, similis ei quæ per alios propemodum omnes articulos dispersa est, quo expeditius partes moveantur: hæc ligamenta vertebra ambiunt, & per totam longitudinem dorsum valide connectunt, ne dum dorsum curvatur, periculo subiectum sit, vel gibbus generetur [tab. 16 lib. 2 f. 6.]

^b 13. usq. part. 8.

Alterum ligamentum^c cartilaginofum est, quod corpora ipsarum, ubi conjunguntur, intercedit, eaque validissime connectit [tab. 16 lib. 2 fig. 6. ch. 5.] quod cartilagineum, fibrosum, & mucosum est, extrinsecus crassum, versus medium attenuatum, & corporis vertebræ figuram refert, illiusque amplitudini respondet, & cartilaginem inter vertebra mediam desinet. Sic etiam processuum vertebrarum articulos ascendentes cum descendentes, ligamenta membranea communia colligant.

^c Gal. de ossib. 3. cartilaginem vocat, & quæ vertebra invicem hand colligari contra anatomicorum.

Cccc

Muscu-

serant, sententiam asserit: voluit enim ipsas committi tertia spinalis medulla tunica, quæ inter vertebrarum corpora se insinuat, quæ membrana est vertebrarum foramina omnia succingens, & quæ à periostrio sola crassitie differt, Ves. Idem & Columb. habet, Galenumque reprehendens addit, quo pacto illi verisimile videri poterat, Vertebra ossa non parva, à tam exigua membrana contineri posse.

Musculos quoque, qui vertebra adnascuntur, sustinent, & intervallis processuum vertebrarum inferuntur, tam transverforum, quæ membranea sunt, quam posteriorum inter ipsorum spinas & radices, quæ in spinarum apicibus adeo crassescunt, ut ad apices simul coeunt, velut unum ligamentum per spinarum longitudinem ductum forment.

Insuper ligamentum quoddam privatum, subflavum ex vertebræ foramine sede interna, ad radicem processus posterioris, inter duos ascendentes aut descendentes processus exoritur, quod in vertebræ subsequenti sedem eandem inferitur.

a Bruxellenses.

a robore vast.

nuncupant: qui

hujus esumpu-

ellis ad comam

prolixiorum con-

ciliandam com-

mendant: hinc

epinor ipsas ri-

dentis, quod ve-

lur in flavam

pallidamque

comam promp-

te dissolvatur.

Vesal.

c Quale Gale-

nus hominibus

fere in lib. us.

par tribuit Ves.

Verum in canum cervicæ ligamentum occurrit, rarum, robustum tamen & flavum, quod in fibras nullas dissolvi potest, quod ex apice spinæ septimæ vertebræ cervicis enascitur, & ascendens nullique connatu secundæ cervicis spinæ apici infigitur, in ovibus vero occipiti connascitur. Quod in animalibus onera dorso ferentibus crassissimum^d est: ad dorsi firmitudinem, & solum inter corporis ligamenta, tanquam esui ineptum rejicitur, & a nostris Waldenwachs dicitur. Hoc prompte in fibras dissolvitur, ne vertebræ cervicis suo loco excidant, cum laxè admodum articulentur, & processus oblique agantur: in quibusdam^e animalibus secundum dorsi longitudinem utrinque unum secundum spinas inter musculos dorsum moventes, occultatum.

Thorax quoque sua ligamenta habet, cujus articuli omnes junguntur ligamentis membraneis communibus eos ambientibus; sic costæ cum vertebra colligantur, validis & cartilagineis fere ligamentis, potissimum in prima & secunda costâ, propter onus, quod sustinere debent; sic & duodecima, cum hæc processu transverso non sustineatur. Eadem costæ, cum sterni ossi cartilaginibus intercedentibus, ligamentis junguntur: ipsa vero sterni ossa, cartilagine tenui & pertinacissima intercedente duplicique periosio obducta, connectuntur.

De Musculis^a Cubiti.

CAPUT XI.

De his Galenus 2. usu partium 5. I. adm. anat. II. & lib. de diffet. muscul. 203.

a Musculi am-

plexatorii, &

cubitorii in am-

plexu cubiti

cientis: facit

autem ample-

xatorios tripli-

ces, scapularios,

humerarios &

cubitarios, Pic-

colh.

b Galenus mo-

tum quoque ob-

liquum tribuit

quem nunquã

in homine re-

periri asserit

Columb. Non

enim cubitus

recta primum, dein in alterum latus inclinans flectitur, ac dein utrisque simul recta flexio & in super singulis privata ad

latera flexio tribui debet, Ves. c 4. Sylv. Columb. Fall. Piccolh. Laur. 5. Ves. Plat. d Tres extendentes Gal. Ves. Plat. ad-

dit Vesal. si ad minimum numerum referantur, aut duo aut unus erunt: at in capibus & simis caudatis tres extenden-

as necessario recensentur.

Cubitus, qui secundam manus partem constituit, & ossibus duobus, cubito seu ulna & radio constat, diversos motus habet, quare alii cubiti, alii radii musculi sunt. Cubitus motibus duobus agitur, flectitur & extenditur^b recta. Radius vero motus, manum vel pronam vel supinam reddit, sed de cubiti motu primo, qui musculorum quatuor^c beneficio absolvitur, qui cubiti dicuntur, non quod in cubito siti sunt, sed quod eum moveant. Hi enim ab humero & scapula exorti, humeri sedem occupant: duo quidem flectentes sedem internam seu anteriorem: duo^d extendentes externam seu posteriorem: at qui in cubito locati sunt, partim radio, partim brachiali, partim digitis movendis inserviunt.

I. e. Fle-

I. ° *Flectentium* Biceps dicitur [*tab. 8. fig. 1. 2. 3. & tab. 9. fig. 1. & 2. A.*] quod principio gemino & validissimo invicem tamen distante, (ut nervum brachii & musculorum in humerum insertionem transmittat) à scapula oritur, quæ tamen à Deltoide teguntur, [*tab. 8. fig. 1. M. at fig. 3. N. deteguntur*] hicque in humeri parte interiore situs est, & in musculosis etiam ante sectionem sub cute conspicitur: horum principiorum alterum exterius est [*tab. 9. figur. 1. n.*] nerveum ac teres, à superiori supercilio acetabuli ipsius scapulæ pronatum, quod sub ligamenti articuli humeri, & supra humeri caput per ejus fissuram, hujus tendinis gratia exsculptam, defertur; alterum [*tab. 9. fig. 1. o.*] partim nerveum, partim carneum illo latius, à scapulæ processu anchoræ simili supra humeri caput delatum, paulo infra ejus caput cum altero unitur [*t. 9. f. 1. & 2. p.*] & musculum crassum, validum, lividum ac fere teretem, fibrisque rectis donatum constituunt. Verum & portio carnosæ in humeri medium, ubi os asperitatem privatam nascitur, ad ejus elevationem inseritur: quam portionem aliqui octavum humeri musculum faciunt, & humerum cum Pectorali antrosum trahere volunt: tandem ab humero abscedens, aliumque musculum conscendens, teretis carnosique musculi effigiem præ se ferens paulo supra cubiti articulum nervosior redditus, in tendinem robustum, crassum, teretem, nervosum finit, & in radii^h eminentiam anteriorem hujus insertionis causa creatam, modice dilatatus inseritur, & articuli ligamento nonnihil adnascitur [*t. 9. f. 1. q.*] hic, quemadmodum & secundus fibras rectas obtinet, quare cubitum cum sequenti rectissime flectit.

II. ° *Flectentium* seu *Brachia* [*t. 8. f. 2. 3. 4. t. 9. f. 1. 2. 3. B.*] prædicto subjacet, quo brevior est, totusque carnosus existit, & mediam inferiorem humeri longitudinis sedem, proxime amplexatur, illique adnascitur: hic ab osse humeri ea sede, ubi humeri musculi inseruntur, prope medium longitudinis humeri latere exteriore principio carnosio, latoque quod^m bicornæ est [*t. 11. f. 2. 3. V.*] & in medio angulum obtusum exprimit, enascitur; mox crassior redditus, humeroque validissime adnatus, deorsumque latus, cubiti articulum antè carneus integit, montis speciem refert, & amplius carnosusque in cubiti ac radii partem (qua parte ambo colligantur) anteriorem & articuli ligamentum validissime infigitur [*tab. 11. fig. 2. G. f. 3. o.*] ut cubitumⁿ rectissime flectat.

III. ° Seu *Extendentium* primus sive Longus [*tab. 8. fig. 2. 3. 4. tab. 9. f. 1. 2. 3. & in a. fig. C.*] per humeri posteriora carnosus, fibris rectis donatus, defertur: hic principio P valido latoque partim carnosio, partim nervoso ex humiliore scapula costa nonnihil sub illius cervicæ, ubi sinum peculiarem obtinet, exortus, carnosus recta deorsum ad humeri latus internum descendens ei connascitur; vel potius 9 portione car-

Cccc 2

nosa
recta flectit sursum, Piccolb.

^k Cubitum flect. 2. seu posterior, Vesal. cubit. flectent. 2. Columb. Piccolhom. cubiti muscul. interior, profundior, Plat. Brachia. Laur. 1. Ab interiore parte humeri, Piccolb.
^m Mihi unius principii loco haberi finito ne omnibus laterum musculorum exortibus præter morem plura principia assigner tribuere, Vesal. duobus exortibus, Plat.
ⁿ Gal. 1. ad. an. cubiti flexionis in exteriora inclinantis autorem esse censuit; at Piccol. cubitum recta flectit introrsum. 1. & 2. successive agentibus cubitum introrsum flectunt in dimidiatum orbem. o Extendentium primus, Vesal. (quem cum Galeno divisi extendentium 1. & 2. constituendo.) Fallop. Piccolb. Laur. cui & longus. 3. cubiti musculus Col. & Plat. p Nerveo prorsus principio, Vesal. Plat. Piccolb. q Hujus meminit Vesal. extendentium 2. faciens, Fallop. non autem Col. Piccolb. Laur.

^e Cubitum flectentium 1. & anterior, Vesal. cubitum flectentes 1. Col. Fallop. Piccolb. interior & elatior 1. Plat. biceps Laur. ille pescerto Italus. Col. 1.

^f Etsi Galeno 3. ad. an. secus videatur, Vesal. Videtur con-
niventibus distinctus musculus, qui humero opem præstet, illum versus pectus trahens, Columb. hujus portionis meminit, Vesal. Columb. Laur. At ab Arantio pro octavo humeri musculo proponitur.

^h Vesal. Columb. Laur. hic addit, non cubiti, ut sentit vulgus, in cubiti oblongam cavitate, Piccolb.

ⁱ Sive ambo unam, sive seorsim singuli contrahant, Vesal. cubitum recta flectit sursum, Piccolb.

r In radii exte-
riorem partem
ubi cavitas
quadam veluti
inusta apparet.
Piccolh.
f. Recta simul-
que sursum ex-
tendit, Piccol.
t. Extenditum
2. Fallop. Picco.
Laur. cui & bre-
vis. Extenden-
tium 3. Ves. 4.
cubiti muscul.
Col. Plat.
u. Duobus in-
itiis à cervice
humeri, Col.
x. Unius loco
recenseri pos-
sunt, qui extri-
bus principiis
conformatus
sit, aut duorum, si primum & secundum unius loco habueris, Ves. pro uno numerare & rursus in plures dividere possu-
mus, Fallop. insit. quare duos adhuc extendentes addit Riol. Brachia unum externum, quia brachio externo instratus, duo-
bus prioribus subicitur: quartum Angoneum, in posterioris cubiti flexura quæ dicitur situm, qui Popliteo re-
sponderet & à brachii parte inferiore ac postica exortus, tendine nervoso in cubiti partem lateralem infra olecranon in-
seritur.

y In exteriorem tum radii, tum cubiti partem, ubi oblonga quadam cavitas est impressa Piccolh. 2. Cubitum exten-
dunt, recta simulque deorsum, Piccolh. 3. & 4. minus cubitum recte flectendi, Columb. a. à Galeno prætermisum. Ves.
fal.

nosa [tab. 11. fig. 1. a.] ex humero enata, veluti altero principio augetur, ipsique robur
addens miscetur: (quam portionem pro extendentium secundo aliqui recensent) qua
adauctus, recta deorsum fertur (portione carnea ad finem usque humero adnata) &
partim nervosus foris, partim carnosus intus, in posterioris ^r cubiti processus (sive
olecrani) latus internum inseritur, hic cum sequenti ^r recta extendit.

IV. ^r Seu extendentium secundus sive brevis tab. 8. fig. 4. tab. 10. f. 1. & 2. D.] qui ex-
ternam sedem posterioris humeri regionis occupat; hic à cervicis humeri sede poste-
riore principio nervoso exoritur, qui ^u carnosus redditus, priusquam humeri longi-
tudinem mediam superarit, cum prædicto ita miscetur, ut ad insertionem nullo modo
separari possit, sicque unus ^x videatur, seu unum corpus ex tribus musculis compa-
ctum, cum tamen duo revera sint, hic tamen in processus ^y posterioris ulnæ latus ex-
ternum, partim carneus, partim nerveus potissimum pariter ca cui innititur, validissime
inserirur [t. 8. f. 4. x. t. 10. f. 1. & 2. x.] Hic quoque cū tertio fibras rectas obtinet, quare &
cubitum recta extendunt. ^z Verum in canib. & similib. caudatis & aliis, quæ anteriori-
bus cruribus innituntur, tres musculi extendentes valde conspicui, præter unum
gracillimum ^a in similib. caudatis à scapula ad ulnam porrectum.

Sic ergo in his cubiti musculis ipsorum actio primaria evidens est, quæ est contra-
ctio, & secundaria, quæ est relaxatio: flectentibus enim contractis, extendentes re-
laxantur, quo cubiti inflexio fiat. Sic extendentibus contractis, flectentes laxantur,
quo cubiti extensio sequatur, quæ motu solum recto perficiuntur, ut per accidens ad
humeri motum. Cubitus etiam in latera & in gyrum movetur.

De Musculis manus extremæ.

CAPUT XII.

De his vide lib. 1. & 2. de usu part. apud Galenum.

a Gal. manus
admirandam
compagem per-
pendens, &
quod sit instru-
mentum instru-
mentorum, de
manu primum
egit in libris de usu partium. Columbus de musculis manus summam moventibus postremo egit, quia
illarum (ait) compago miraculis instar esse videtur, ut sic memoria magis inhaereat: suaderet etiam, ut in scholis dum se-
cantur corpora hic ordo servetur, tum quia hi musculi diutius incorrupti servantur, tum quod dum vivimus, hos mu-
sculos magis exercemus, tum quod minus pinguedinis contineant.

Cum manus actio ^a propria sit apprehensio, apprehensio autem motus sit, à vo-
luntate nostra dependens, idcirco musculis, motus voluntarii instrumentis, in-
dignit, qui & manum totam, & digitos moverent. Quare manum moventes muscu-
li duplices sunt; alii qui totius manus motui præfunt; alii qui digitos solum movent;
illi

illi duplices sunt, alii enim carpum seu brachiale, vel extendunt vel flectunt; eodemque motu & manum agunt: alii radium moventes simul & manum vel pronam vel supinam reddunt: hique musculi cubitum occupant, partim ejus partem internam, partim externam. Huc referri potest is, qui cutim volæ manus movet. Qui vero digitos movet, eos vel extendunt, vel flectunt, vel in latera movent, scilicet abducendo, adducendo. At quia pollex solus toti manui æqui pollere debuit, idcirco inflexione & extensione peculiare quid à cæteris digitis quatuor, qui motum similem habent, obtinet; quare musculos peculiare obtinuit, quemadmodum & cæteri suos habent, quorum alii in cubito siti sunt, alii in metacarpo, alii in vola manus. Rursus cum alia sit articulatio in primis articulis digitorum quinque, & in secundo pollicis, quam in secundo & tertio quatuor digitorum, & tertio pollicis, cum illa per ginglymon jungantur, superiore ossis in sinum suum inferioris ossis tuberculum excipiente, & ossis inferiore suis sinibus ossis superioris capitula recipiente; hinc articuli hi motum simplicem tantum obtinent, qui sola extensione & flexione, sine declinatione in latus absolvitur: at quatuor digitorum prima ossa & pollicis primum cum ossibus illis, quibus sustententur articulatione coarctentur, non solum flectuntur & extenduntur, sed etiam ad latera inclinantur, dum ad pollicem adducuntur, aut ab eo abducuntur.

In summa manus moventes musculi quadraginta sunt: carpi quatuor, radii quatuor, volæ manus tres aliquando quatuor: digitorum viginti novem, & horum alii in cubito siti sunt quia magni esse debuerent, horumque tendines tantum ad digitos mittuntur, quod si in manulo locati forent, eâ infarciendo ejus motum impediret. Alii vero in manu siti sunt. Horum novem flectunt, duo quidem digitos quatuor, septem vero ipsum pollicem: alii extendunt viginti numero, sedecim quidem digitos quatuor, inter quos lumbricales quatuor & interossei octo recensentur: quatuor vero pollicem extendunt, idque vel simpliciter extendendo, vel adducendo, vel abducendo, quorum tendines in ossibus movendi articulum infiguntur. Sed de musculo palmari, cum is inter secundum primo occurrat, agamus.

Cccc 3

De
carpum exten-

dentes & duos radium supinantes. His addit in extrema manu positos 21. aliquando tamen pauciores 19. quorum 7. pollicis, quatuor minimo digito, reliquorum unicuique tres operant, unusque lato tendini. Vesalius brachialis 4. radii 4. digitorum moventes 28. flectentes nimirum 20. extendentes 8. At Fallopio totidem brachialis, radii & digitorum, sed octo tantum flectentes & 20. extendentes dicit, nam lumbricales 4. & metacarpi 8. quos Vesalius flectere voluit, extendere dicit Fallopius. Piccolh. musculos manuum moventes apprehensorios vocat & dividit in interiores octo & exteriores novem, qui omnes à partibus, qui manus compositionem non ingrediuntur oriuntur, & alios natos à partibus manuum componentibus, & in eam terminantibus, qui ut plurimum sunt 21. Sequitur enim Columbum. Laurentio radii 4. carpi 4. digiti 26. Alii flectentes tres, palmaris, sublimis, profundus: alii extendentes quam plurimi, quos Sylvius pro unico numerat, & digitum tensorem vocat, qui in partes quatuor dividi potest: alii adducunt digitos, lumbricales quatuor, alii abducunt interossei sex non octo. Sic pollicem flectit unus, extendunt duo, adducunt tres, abducunt totidem & minimi digiti tres aut quatuor. c. 1. u. par. 17.

b Galenus 1. ad an. 5. & 6. hos musculos in internos & externos divisi, quem Columbus imitatus, internos manus fecit octo: palmaris, carpum flectentes duos. 1. & 2. flectentes quatuor digitos 1. flectentem pollicem, & duos radium internum agentes, Externos novem, scilicet 6. & 7. digitos quatuor. 1. & 2. pollicem extendentes, duos carpum exten-

De Musculo palmari, cum duobus aut tribus à panniculo carnosio prodeuntibus.

CAPUT XIII

Vide apud Galen. 2. usu part. 6.

MUSCULUS Palmaris omnibus summæ ^a manus musculis interioribus superstratus [tab. 8. f. 1. & 2. tab. 9. f. 1. E.] & in cubito situs nervosus est ac teres, ab humeri tuberculi interni apice acuto, nerveoque principio prodiens, & medio ^b duorum musculorum carpi flexentium [1. 8. f. 1. A. & B.] & ex eodē tuberculo prodeuntium, incumbens & adnatus, illico carnosus ventre tamen exiguo redditus, antequam ad cubiti medium deveniat, nonnihil oblique delatus, denuo attenuatus gracilisque redditus, in tendinem rotundum, angustum primum & longum [1. 9. f. 1. M.] definit, qui carpi ligamentum internum supergressus sub cute transit, & tendo in vola ^d dilatatur, attenuatur, & cuti subnascitur; ita tamen ut cuti, quæ musculum in pollicis monte [1. 8. f. 3. sub p.] & qui parvum digitum à cæteris abducunt [tab. 8. f. 1. & 3. S.] integrit, non subtendatur, tandem ad digitorum extremam aciem nexibus adeo fibrosis & validis jungitur, ut cutim manus, à tendinis nervosa tenuitate, licet ^e pinguedo vel substantia similis intercedat, liberare vix possis.

Hujus usus cutim ^f volæ in apprehensione rerum firmiter corrugare, ne cutis facile moveatur, & sic minus exacta, tutaque rerum comprehensio fiat: forte etiam quocute reliqua totius corporis sensu exactiore prædita sit, non quod sensus hujus tendinis beneficio manui contingat, sed nervorum quatuor qui ad singulos digitos feruntur.

Musculum hunc geminum ^g in utroque brachio ab eodem loco exortum, ter aut quater Fallopius observavit, quorum unus in tendinē latum definebat: alter in ligamentum transversum carpi inferebatur, Contra Vesalius ^h non semel, quo ad partem carnosa-

^a Non in illorum capitum medio repositus, ut alii scribunt, Vesalius. ^c Non decuit magnum esse, cum nullius ossis motui illum præfici credamus, Vesalius.

^d Gal. toti depili manus cuti subnasci arbitratus est: verum tendo media vola cuti in palma tantum subnascitur, non autem cutim contingit obductam musculo parvum digitum abducenti, nec musculo primo pollicis articulo incumbenti, nulla etiam portiones in digitorum latera excurrunt, Ves. per volam extenditur relictis duobus montibus majoribus detectis, postremo in quatuor digitos inseritur, Columb. & Piccol. ad extremos digitos obnascitur pertinaciter, Fallop. in fissu vola media tantum & digitorum interna regioni nonnihil, Plat. sub omnem cutem manus internam ad primum ossis articulum tendinem diffundit, Laur. ^e Non citra alicujus intervallum, ut ex Galeni locis nonnullis colligi potest, nam adeps plurimus continetur, imo & canes plurimum obtinent, Ves. ^f Vesalius: hac ipsius utilitas fertur, Fallop. in fissu. usus digitis flectendis auxiliari, & ut acuto sint sensu, Columb. ad flexionem manus opitulatur maxime ad cavam manum efficiendam, cum post brachialis ossa cutem ipsis adhaerentem trahendo simul colligat, cujus munus ipso absente brachialis musculi, qui hac tendines mittunt, obeunt, Plat. digitorum, 4. prima ossa flectit, Piccolhom. Galenus usum censuit, ut vola depilis esset, quod Vesal. & Columb. reprehendunt: at Laur. non solius flexionis gratia, sed ad firmiorem apprehensionem & ut sensu acutiore, manus polleat.

^g Geminus à Vesalio repertus Plat.

^h In quibusdam furibus ac latronibus, licet tendo adesse à ligamento brachialis interno exortus, Columb. inter alium abesse, Plat.

carnosam defuisse ostendit, ac portionem tendinum carpum flectentium [tab. 8. f. 1. Δ ⊙] priusquam carpum ascendat in tendinem latum abiisse: nonnunquam à ligamento transverso [tab. 9. f. 1. V.] interno, tendinibus carpi obducto, tendo produci-
tur.

Præter palmarem musculum in principio manus internæ parte inferiore montis, quem Lunæ i vocant, ubi carpi ossiculum octavum situm est, caro quædam reperitur, i Ab Antiocho Tiburtio Lu-
à panniculo carnosio per pinguedinem disperse, vel à membrana musculi lunæ mon- na mons voca-
tem formantis prodit; quæ musculorum tenuium ac brevium effigiem, duorum fre- tur, Fallopius:
quenter aliquando etiam trium refert: quæ fibræ transversis in volam internam & at Piccolhom.
mediam deferuntur, & ad musculi palmaris tendinem latum implantatur, & panniculo Martis nomi-
carnoso ac pingui complicatur. Huius carnis munus in volæ magnis contractioni- nat. Columb.
bus lunæ montem ad manum mediam, cum illam apprime cavam reddere volumus, & Plas. Vene-
ac corylen vel cyphum Diogenianum exquisitè efformare, contrahere, vel duos mō- ris.
tes ad pollicem & auricularem sitos, leviter astringere: sed de monticulis & lincis in k Horum men-
manu, in libro nostro de partibus externis inscripto, egimus. tionem nulli ex
antiquis ana-
tomis fecere.

Fallop. insit. horum inventor, Ioan. Bapt. Cananus: primus autem Valvorda publicis scriptis commendavit, sed uni-
tantum musculum esse & ad extensionem factum dicit, cum potius cutim illius partis corrugeret, quam quod extenderet,
Fallop. observat. Primus externa manus musculus, parvus transversus, supra veneris montem positus, à membrana
carnosa exoritur, fibræ carnosæ refertus in tendinem latum inferitur, quem dilatat, quem neque ex veteribus quis-
quam, nec Ves. novit, Columb. idem fere, Piccolh. qui primum muscul. à manu ortum nominat, & duos montes Martis
& Veneris leviter astringere statuit. Caro quædam ex musculis confans, monticulum Veneris efficiens, Plat.

De Substantia cutim volæ manus & digitorum, eorumque tendines intercedente.

CAPUT XIV.

Galenus i. usup. par. 7. carnem vocat: vide & 13. & 18.

Cum inter tendinem & cutim volæ manus & digitorum regionem internam sub-
stantia quædam carnea adipi similis reposita sit, pauca de ea dicere convenit.
Hæc ad carnis genus referri debet, siquidem per eam & fibræ nervosæ frequentes &
venæ capillorum modo tenues disseminantur, & etiam in extreme emaciatæ huius
portio aliqua semper reperitur: quare Galenus carnem vocat; colore tamen sub- Arabes hanc
stantiam ex
trā musculi cor-
pus carnem sim-
plicem esse affir-
marunt, illo-
rum modo qui
nescio quam
simplicem car-
nem in gingi-
vis ac pene col-
locant, Vesal.
tur aut externis contundantur: quare & cuti plantæ pedis copiosè apponitur: pau-
cioramen est circa articulos, ne eorum motum impediat, maxime eorum in an-
gulos acutos flexionem. Sic & digitorum lateribus aliqua appositæ est, quo spatia
media, quæ ob articulorum tubercula vacua mansissent, repleat; non tam or-
natus

natus causa, quam ut manus digitis adductis ab hac substantia oppleatur, ut si quid si-
quidi manu continere velimus, cyphumque Diogenianum efformare, id non elaba-
tur. Denique substantia hæc digiris summis utilis est ad commodiorem appren-
sionem, quemadmodum cap. 1. hujus libri monuimus: ossium enim extremis si nihil
appositum foret, quod in apprehensione cederet, facile fracta fuissent, plurima et-
jam apprehendere nequiremus, quæ hujus substantiæ & unguum retineatium bene-
ficio absolvimus.

De Musculis digitorum quatuor flectentibus.

CAPUT XV.

*De his & sequentibus egit Galenus libr. de diff. muscul. 21. & 22. item 2. usu part. à cap. 2. ad 6. 1.
adm. anat. 5. 6. & 9. 2. de mot. muscul. 2. & 3.*

MUSCULI digitorum quatuor phalanges flectentes duo sunt. *x.* Flectentium ^a si-
ve sublimis [*tab. 8. f. 4. F*] ab humeri tuberculo interno, principio [*n*] tereti ^b &
magno, ex carnea nerveaque substantia mixto, sub muscoli palmaris [*tab. 8. fig. 1. & 2.*
E] & duorum carpum flectentium capitibus [*tab. 8. fig. 1. A. & B.*] enatus, mox latior
redditus, per ulnæ & radii anteriorem partem mediam delatus, carnosus & teres red-
ditus, antequam ad carpi radicem perveniat, venter ipsius angustatus [*tab. 8. fig. 3. o.*]
in partes quatuor carnosas dividitur, quæ singulæ in tendines exquisitè rotundos,
nerveos & pellucidos cessant: qui simul membrana communi, tenui mucosa, quo tu-
tiores progrediantur involuti, sub ligamento annulari [*tab. 9. f. 1. V.*] quod in carpo
transversim situm est, delati, ad digitorum quatuor os secundum juxta articuli partem
mediam longa sectione divisus, quo Musculi subsequenti & subiecti tendines, qui ad
tertium articulum ferri debuerent, transmittantur & quo facilius moveant & appre-
hendant, latiores redditi, paulo post divisionem in digitorum quatuor ossa secunda
inferuntur: quæ sane res admiranda spectatuque digna, quod à natura prudente fa-
ctum, quo digiti ordine quodam sese consequantur, & digitorum recta inflexio effi-
ciatur. Dum vero digitorum ossa prima perreptant, transversò quoque ligamento
obvolvuntur, quod ex ossis parte interna enatum canalem efformat, quo musculi hu-
jus tendo una cum alterius subiecti musculi, secundum digiti longitudinem securissi-
me deducatur, & ne sua sede à digito declinet complectitur, ne contractus elevecur,
potissimum quando secundum aut tertium digitorum internodium flectimus, alias
tendines non incurvati, tanquam funiculi recti exurgerent, cutim attollerent, volans
que impleant: quare ligamenta hæc, etsi tendines contrahantur, eos tamen ossibus
quibus non infiguntur adjacere cogunt, & iter liberum per ligamentum velut annu-
lum lubricum & lævem canali pingui & oleoso humore juncto, relinquit. Hic inter-
nodium secundum ^c primario flectit, & secundario simul & primum, dum in transitu
membrarum & villorum intervallu ita firmiter alligantur movet: cum huic pri-
mo articulo musculus alius ^d datus non sit.

a 1. digitorum
vens, Ves. Fall.
Plat. Arantio:
2. digitorum fle-
ctens siue subli-
mis, Laur. 4.
manus interior
musculus, Col.
Piccolb.
b Exortum ha-
bet admirabi-
lem, nervus
et quoniam acutus
que nascitur,
Columb.
c Tertium Ves.
secundario etia
primum quic-
quid vellet con-
tra Galenum
Vesalius, qui
huic musculus
in metacarpo
sitos ascribit,
qui tamē hunc
articulum non
flectunt, sed po-
tius secundum
& tertium ex-
tendunt, Fall.
in instir. simul
& primum.
d 1. ut primam
digitorum phalangem cum secunda flectit, Arantius. *d* Vesalius interosses dictos in metacarpo, primo internodio tri-
buit: at Piccolb. à palmari quatuor digitorum prima ossa flectuntur.

II. e Flectentium sive [tab. 9. f. 2. 4. G.] priori subicitur & toto ductu corpore & tendinibus ipsis ad insertionem usque subternitur, hic paulo humilior ab ulna^e processu parte ejus anteriore exoritur [tab. 9. f. 2. u.] illoque validior est, siquidem huic motus major majorisque momenti futurus erat, exacte carnosus est & latus, cubiti partem mediam occupans, tum ulnae (à qua etiam robur acquirit) tum ligamento, quod ulnam cum radio jungit, & interiores musculos ab exterioribus separat, adnascitur; ubi vero ultra cubiti medium descendit, angustior redditus [tab. 9. f. 2. x. f. 4. B.] in partes carnosas quatuor dividit, quæ tunica nervosa teguntur, & sensum colligunt tendines nervosos teretes, superioris musculi tendines perforantes, proferunt: qui per ligamentum membranofum transversum ipsius carpi delati, in vola singuli membranulis propriis vestiuntur, quæ ipsis tendinibus fibrosis nexibus junguntur: mox digitorum ligamenta singula subeunt & foramina seu divisionem tendinum primi musculi [1. 9. f. 2. yd.] transeunt, quo tertio internodio, & latiores tamen redditi, implantari possunt: & paulo ante insertionem in senibus ossiculum sesamoides reperitur, quod patellæ in genu usum, formamque refert: quemadmodum enim primi musculi tendinibus ossicula sesamina innascuntur, sic alia secundi musculi tendinibus antequam tertiis ossibus inserantur.

Hujus munus tertium articulum flectere: verum & duodecim articulationes contrahere videtur, quatenus in transitu tendines primæ & secundæ articulationi membranosis eorum ligamentis affiguntur. Si enim tertium internodium flectere velimus, etiam invitis nobis reliquis curvare cogimur; nam tertia & secunda extensis & immotis primis, flecti possunt.

in similibus, in hominibus nequaquam, Colum. a. 1. u. f. part. secundi tendines primo quatuor digitorum ossi implantatos asserit.

^h Galenus & omnes Anatomici opinantur hunc 1. & 3. os flectere, cum tamen duntaxat tertii flexionis opifex, quemadmodum primus musculus secundi: cum nullus musculus primario os movere possit, nisi eidem inseratur, secundum Galeni axiomata: at secundi musculi tendines primis ossibus ne obscurissime quidem inseruntur, Vesal. 4. digitorum tertium articulum flectit & optime constringit, non quinque, ut Gal. lib. de usu part. 1. ad. an. & lib. de muscul. voluit, Colum. tertium articulum flectunt, Fallop. insit. Piccol. Laur. etiam 12. articulationes insigniter contrahunt, Arantius.

De Musculis pollicem flectentibus.

CAPUT XVI.

Pollex qui à pollendo nomen habuit, & solus reliquis* quatuor digitis æquipollet, ut esset robustus & validus, tria quoque ossa obtinuit, & ut motus manifestos & robustos ederet, peculiare musculos etiam primo ossi annexos habuit: quare & flectitur & extenditur.

I. e Flectentium pollicem [tab. 9. f. 2. & 4. I.] incubito quoque situs est, & secundo quatuor digitorum musculo [tab. 9. G.] adjacet, cui ad cubiti cum humero articulo

D d d d

* Athenienses, cum amulos suos Æginetas, rei bellicæ & navali prorsus inutiles reddere vellent, pollice privarunt: tales Polletrones.

cos, aliqui antiqui Murcos dicere. i. tertium Digitum movens, Vesal. Fallop. Plag. Arant. 6. manus interior musculus, Colum. & Piccol. flexor pollicis qui unicus est, Laur.

k Oritur à ra-
dio & ligamen-
to illi adhæret
c. Col. Piccol.

Gal. c. ceteri

2. & 3. pollicis

offis flexum mo-

livi opinantur,

cum tamen dū-

taxat 3. flexio-

nis opifex, Ves.

cum secundo

tertium etiam

flectit, Aran-

tius.

m Qualem ha-

beant ostendit,

Ves.

a 12. digit. seu

primus polli-

cem flectens, qui

eum sequenti

primo offi famu-

latur, Ves. 9.

extrema ma-

nus musc. Col.

9. à manu pro-

diens seu polli-

cis 3. Piccolb.

4. Fall. pollicis

musc. obliquus

in vola elatior,

Plat.

13. digit. seu 2. pollicis, Ves. 8. extrema manus musc. Col. 8. à manu prodiens seu pollicis 2. Piccolb. 5. Fall. pollicis mu-

sculus obliquus minor, Plat. p Primus articulus in flexione ociosus, ideo nullus interna parte tendo applicatur, 1. us-

art. 17. Galenus unicum musculum putavit, qui pollicem ab indice abduceret, eique validiorem motum & tenacem

crassiores quam musculo tertio articulum flectente, perperam ascribit, Ves. hi tres montem Martis constituentes, ver-

us originem pollicem trahunt, eundem extendunt & procul ab aliis abducunt, Col. Piccolb. monticulum veneris consti-

tuunt tres adducentes ex offe carpi prodeuntes, Laur. q. 14. digit. Ves. 6. Fallop. in insit. 2. pollicem movens, Fallop. obs.

10. extrema manus musculus Columb. 10. à manu prodiens seu 4. pollicis, Piccolb. pollicis musculi tres obliqui in ma-

nus vola profundiores scilicet 4. 5. & 6. Plat. r 15. digit. Ves. 7. Fall. in insit. 3. pollicem movens, Fallop. obs. 11. extrema

manus musc. Col. 11. à manu prodiens seu 5. pollicis, Piccolb. 16. Ves. qui hos tres secundo pollicis offi famulari statuit

qui licet in simiis observentur, Galenum ignorasse, at Arabes agnovisse & duos qui primi pollicis offi flexioni præstant

neglexisse, undecim digitos flectentes recensuisse, octo ad digitos quatuor, tres ad pollicem referentes: forte casu 11. loco 10.

enumerantes, cum musculos Oribasii more enumerent, Ves. 12. extrema manus, Col. 12. à manu ortus seu 6. pollicis, Pic-

colb. 4. pollicis, Fall. obs. 8. Fallop. in insit. 1. Fallop. obs.

lo aliquantum continuus, totoque progressu coherens: hic principio carnosio ac-
reti ex ulnæ sede juxta cubitum ubi radii capitulum recipit, pronatus, perque radium
delatus cui universa propemodum longitudine adnascitur, & ab ipso continue prin-
cipium ducit, quemadmodum etiam ab ipso ligamento k membranoso [tab. 9. fig.
4. *] portionem acquirens, simul delatus ad carpum in tendinem teretem & ner-
veum definit, qui sub ligamento annulari carpi, cujus lateri attenditur, cum duobus
præcedentibus delatus, peculiarique membrana mucosa tectus, per sinum ossis car-
pi pollicem sustentis & hujus tendinis causa insculpti, inter musculos primum &
secundum pollicis os flectentes occultatus, ligamento transverso, secundi ossis pol-
licis exceptus, in ejus tertium articulum dilatatus, valide inseritur l eumque flectit. Et
hic musculus, secundi digiti flectentis crassitiem vincit, cum & pollex robore & mo-
le ceteros superet: hicque musculus in simiis m caudatis non reperitur.

II. n Flectentium pollicem [tab. 9. f. 1. 2. K] à ligamenti annularis seu transversi
quod in carpo est [tab. 9. f. 1. V.] sede superiore carnosus enascitur, & pollicis ossis pri-
mi toti internæ regioni annectitur, carnosusque inseritur & secundum obscure attin-
git.

III. c Flectentium [t. 9. f. 2. & 4. L] prædicto subjicitur eo que longe minor est: hic
partim ex eodem loco, partim vero ab offe carpi pollicis subiecto exortus, in radicem
primi ossis pollicis usque ad medium inseritur. Hi duo p primum pollicis interno-
dium flectunt, & una cum extendentium pollicem tertio caracem molem ad pollicis
radicem repositam constituunt.

IV. q Flectentium [tab. 9. f. 4. char. 1. 2. 3. hic musculus cum duobus sequentibus notatur]
ab offe metacarpi indici præposito origine tenui lataque exoritur: hinc car-
sus pro-
grediens & nonnihil angustior redditus, tendine membræneo in latus ossis secundi
pollicis versus indicem inseritur.

V. r Flectentium prædicto contiguus, similis est origine & carnosus, ex media se-
de ossis metacarpi, quod medio præponitur, prodit & parte aliqua os, quod annulari
subjicitur, tangit, & carnosus redditus, tendine exiguo in medium secundi ossis pol-
licis parte interna inseritur.

VI. t Flectentium à metacarpi offe annularem fulciente, latiusculus oritur, & eo-
dem loco ubi prior inseritur: nonnunquam etiam t nervoso principio ab offe metar-
carpi, minimo digito subiecto, ubi cum carpo jangitur, prodit. Hi tres musculi sub li-
nea

mea vitali siti, principio sunt semicirculari & distincto, verū in unum & eundem tendinem definiunt, qui sesamino officulo interno, & inter eos qui circa manus digitos sunt maximo, artensus in latus secundi ossis, ejusdē digiti inseritur. Et quemadmodum illi quos interosseos vocabimus, qui in metacarpo siti sunt, recta feruntur: sic qui pollicis primum os flectunt, non nihil oblique ducuntur: sic qui secundum pollicis articulum flectunt, quodammodo transversim feruntur. Hi si simul contrahantur, pollicis internodium secundum volam versus flectunt; primo autem trium solum agente, pollex sursum indicem versus movetur: si secundus ad medios digitos: si tertius, pollex deorsum & versus minimum flectitur.

VII. * Flectentium, his tribus subjectus carnosus ab osse metacarpi, quod indici subditur oritur infra medium usque ad juncturam cum carpo, qui eodem modo quod tres dicti pollicis ossi secundo, jungitur, situm transversum obtinens, spatiumq; quod inter pollicem & indicem est occupat. Hujus munus pollicem versus indicem trahere & indici superponere, vel etiam pollicem ad indicem trahere.

beant, pollicem in eandem partem trahere & istorum motus per magis & minus differre, posse pro uno, aut pro quatuor recenseri: Columbus pro 7. pollicis musculo recenset: Piccolb. 13. a manu ortus seu pollicis, 7.

u Insigniter oblique progrediuntur, Piccolb. x 5. pollicis musc. Fallop. obser. quem anatomici praetermisserunt: & addit, cum quatuor hi unicum tendinem habeant, pollicem in eandem partem trahere & istorum motus per magis & minus differre, posse pro uno, aut pro quatuor recenseri: Columbus pro 7. pollicis musculo recenset: Piccolb. 13. a manu ortus seu pollicis, 7.

De Musculis extendentibus digitos quatuor.

CAPUT XVII.

Musculi qui digitos extendunt, duplices sunt, communes & proprii: communes, qui digitis quatuor conveniunt, ut sunt extendentes, aliosque motus edentes, quatuor lumbricales dicti, magnus digitorum extensor, Interossei, qui digitos adducendo & abducendo ad latera movent: proprii vero, qui digitis tantum quibusdam ascribuntur, ut est extensor indicis & extensor auricularis.

Extendentium ^a I. II. III. & IV. [tab. 9. f. 2. n. n] qui lumbricales seu vermiculares a Quatuor ultimi digitorum musculi sive 25. 26. 27. & 28. qui digitos ad pollicem adducunt, Ves. quatuor extremae manus musculi qui a tendinibus musculi qui tertium articulum

Extendentium ^a I. II. III. & IV. [tab. 9. f. 2. n. n] qui lumbricales seu vermiculares a Quatuor ultimi digitorum musculi sive 25. 26. 27. & 28. qui digitos ad pollicem adducunt, Ves. quatuor extremae manus musculi qui a tendinibus musculi qui tertium articulum

Dddd 2

maxi- sculi qui tertium articulum

lum quatuor digitorum flectit, egrediuntur, Col. 2. 3. 4. & 5. musculus a manu exortus, Piccolb. quatuor musculi parvi in vola haerentes, Fall. adducentes digitos lumbrici 4. Laur. digitorum manus musculi recti quatuor, tendinibus secundum musculi adnati, Plat. b Ad digitorum 4. primum internodium ejusque latus internum quo 4. digitos in latus ad pollicem inclinent, Ves. Plat. In tertium articulum immittuntur, non in primum quemadmodum Gal. & Ves. voluerunt, qui horum insertionem & usum ignorarunt, qui digitos pollicem aersus adduci voluerunt, cum tamen quatuor digitos extendant, Col. primum insertionem veram & usum ostendi, quamvis Valverda in opere suo meminerit, in eo deceptus, dum vult musculos hos digitos extendere, cum potius aliter & postremos articulos erigant, Fall. obs. ad digitorum partem superiorem perveniunt & terminantur prope ungues, quorum usus digitos 4. extendere, Piccolb. oblique ad externam tertii articuli partem inseruntur & digitos adducunt, Laur.

maximo labore obliquis motibus conferre possint, extendantur. Nam quatenus horum tendines in transitu ad digitorum exteriorem regionem cum ligamento laterali primi articuli colligantur, possunt etiam primum internodium levi motu ad pollicem adducere: & cum sequentis ^e musculi tendines exterius siti sint, sicque periculo obnoxii, natura hos interius collocavit, quo exterioribus tendinibus incisus digiti horum ope extendantur.

^e Columb. & Piccolh.

d 17. digit. mo-

tor vel exten-

dentium, pri-

mus, Ves. 1. ma-

nus exterior

musculus Col.

Picco 9. Fall. 4.

digitorum ma-

nus musc. Plat.

digitorum ten-

for qui in par-

tes quatuor di-

vidi potest,

Laur.

^e Galeno ante-

quam carpum

conscendat in

4. tendines scin-

ditur, horum

unum parvo di-

gito quoque tri-

buenscum tan-

tum in tres dis-

secetur: dein

tantum ad ar-

ticuli compa-

gem conasci,

cum toti ossium

longitudini ad-

nascatur, Vesal.

nunc in qua-

tuor, nunc in

tres, sed fre-

quentius in 4.

Columb. Piccolh.

plerumque in tres Fallop. insit.

^f Per sinum transversumque ligamentum fertur qui radio & ulna

commune est Galeno, cum id sequenti musculo serviat, Vesal.

^g Fallop. radici primi ossis insunt, & per totam digiti

longitudinem ascendentes, medio exterioris trium ossium regionis adnascuntur, Vesal. finiuntur à primo usque ad ter-

tium articulum 4. digitorum: cum vero 3. tendinibus tantum præditus est, auricularem digitum dimittit, Columb. &

Piccolh.

^h Hoc à nobis primo fuit animadversum, Col. i Gal. 1. us. part. 17.

^k Cum primum os auricularis, annularis & me-

dio attigerint, bipartito scinduntur, fortissimo ligamento suffulti, excurrunt per latera horum trium digitorum in ex-

tremum usque & 4. digitos extendunt & posteriores tres in latera contorquent, Piccolh. l. 18. digit. Vesal. 2. manus ex-

terior musc. Columb. & Piccolh. 10. Fallop. 5. digitorum manus musc. Plat.

^m Gal. duos tribuit, qui annularem & parvum à pollice abducant, Vesal. in duos tendines plerumque. Fall.

ⁿ In unum tendinem ad parvum digitum, nonnihil cum tendine precedentis annularem adeuntis, portione ad parvi

digiti radicem commixtus & illi quodammodo tendini portionem una offert, Vesal. in tendinem qui nonnunquam bifidus

est in minimū digitū, Col. in tendinem qui in brachiali bipartito scinditur & in auricularis ambo latera excurrit. o Ex-

sen-

V. ^d Extendentium, sive digitorum extensor magnus [tab. 10. f. 1. & 2. P. inferius, qui in fig. 2. propendet.] ab humeri tuberculo exteriori, principio ex carnea nerveaque substantia mixto [b] enatus, mox carnosior redditus, & parte posteriore inter cubitum & radius descendens, prope carpum [supra b] angustior redditus, plerumque in tres, ^e rarius in quatuor partes carnosas scinditur & statim in tendines nerveos rotundos exquirite, quo difficile et patiantur, abeunt, qui tamen ligamento membraneo, à radii appendice pronato, colligantur, & una per sinum ^f in radii parte externa exsculptum ad carpum feruntur: ne vero tendines hi aliquando sinu excidant, neve contracto musculo in altum exsurgant, ligamento annulari [tab. 8. f. 2. & 4. char. 3.] obvolvuntur: mox sub ^h carpo à se invicem recedentes, non amplius rotundi sed latiores redditici, cum os exterius nimis rotundum sit, unus ad indicis, alter medii, tertius annularis internodium secundum & tertium petunt & ad extremos digitos sub ipsis unguitibus ^h feruntur: hinc tantus dolor, si quid ungues & carnem intercedat: aliquando in duos tendines tantum dividitur, qui indicis & medio inferuntur. Hujus munus trium illorum digitorum secundum & tertium articulum ⁱ extendere. Et hujus tendines ^k longi sunt, nec musculorum ventres ad carpum produuntur, quia manus levem simul & tenuem esse præstabat, quo omnia prompte agat.

VI. ^l Extendentium [tab. 10. f. 1. & 2. Q.] ab eodem tuberculo principio acuto & nerveo, gracilis longusque exortus, mox carnosus redditus, cum priore ad medium ventrem commiscetur, ita ut ad exortum unus videatur: hic secundum cubiti longitudinem per sinum ulnæ & radio communem & sub ligamento transversio delatus, in tendines nerveos rotundos modo ^m duos, modo ⁿ unum dividitur, quorum alter ad annularem, alter ad digitum minimum latior redditus trium ossium regioni posteriori implantantur, quo digitos hos extendant, & nonnihil ad exteriora, potissimum minimum, ^o abducant.

Ethic

Columb. Piccolh. plerumque in tres Fallop. insit. ^f Per sinum transversumque ligamentum fertur qui radio & ulna commune est Galeno, cum id sequenti musculo serviat, Vesal. ^g Fallop. radici primi ossis insunt, & per totam digiti longitudinem ascendentes, medio exterioris trium ossium regionis adnascuntur, Vesal. finiuntur à primo usque ad tertium articulum 4. digitorum: cum vero 3. tendinibus tantum præditus est, auricularem digitum dimittit, Columb. & Piccolh.

^h Hoc à nobis primo fuit animadversum, Col. i Gal. 1. us. part. 17. ^k Cum primum os auricularis, annularis & medio attigerint, bipartito scinduntur, fortissimo ligamento suffulti, excurrunt per latera horum trium digitorum in extremum usque & 4. digitos extendunt & posteriores tres in latera contorquent, Piccolh. l. 18. digit. Vesal. 2. manus exterior musc. Columb. & Piccolh. 10. Fallop. 5. digitorum manus musc. Plat.

^m Gal. duos tribuit, qui annularem & parvum à pollice abducant, Vesal. in duos tendines plerumque. Fall. ⁿ In unum tendinem ad parvum digitum, nonnihil cum tendine precedentis annularem adeuntis, portione ad parvi digiti radicem commixtus & illi quodammodo tendini portionem una offert, Vesal. in tendinem qui nonnunquam bifidus est in minimū digitū, Col. in tendinem qui in brachiali bipartito scinditur & in auricularis ambo latera excurrit. o Ex-

tenfionem potius quam à cæteris abductionem moliri, rectus ipſius per cubitum incefſus, ipſusque ſeſus arguit, Veſ. minimi digiti abducit, & ad palmam gignendam uſui eſt, Col. & Piccolb.

Et hic à quibuſdam auriculari digito velut ejus extenſor proprius tribuitur, & Auricularis extenſor nominatur, qui altero tendine in auricularem digiti externe implantatur, altero vero cum extendentium quinti tendine miſcetur.

VII. Extendentium ſive Indicatorius [tab. 10. f. 2. & 3. R.] prædictis duobus ſubjicitur, & à cubito medio (ubilinea oblonga & alpera pro muſculi exortu occurrit) p 19. digit. Veſ. 11. Fallop. 3. manus exterior muſculus (cujus tendo in indicem inferitur, ut indicet, ſive oblique extendat, qui in nonnullis bifidus eſt) Col. & Piccolb. inferior ſeu 3. muſculus, Plat. Indicatorius qui circa diſſectionem conſpicuus eſt 18. loco recensendus, A-rant.

VIII. Extendentium [tab. 8. f. 1. t. & tab. 10. fig. 1. S.] in manu poſitus eſt, brevis & validus à carpi oſſe quarto carneus enatus, & per metacarpi partem inferiorem delatus, ad minimi digiti radicem aſcendit, ejusque oſſis primi lateri externo gracilis & nerveus inferitur, ipſumque digiti extendendo à reliquis digitis * abducit, quod figuras rotundas manu comprehendimus. Et hic muris formam refert, cum in exortu & ſine tenuis, in mediotes craſſusque ſit. Ad extendentes, interoſſei muſculi quoque pertinent, de quibus propter ſectionis methodum paulo poſt agemus.

q Intendinem qui in indicem ſe inſinuat, Piccolb. r Tribus pollicis oſſibus inferior verſus indicem ac medium à pollice abducere creditur, eſſe poſſimum indicem adent, Veſ. f Fallop. t 20. digit. Veſ. 12. Fall. 6. extrema manus, Col. 6. à manu exortus, Piccolb. minimi digiti muſc. craſſior in vola, Plat.

u à ligamento brachialis & quarto oſſe ejusdem exit, venetique montem conſtituit, Col. & Piccolb.

x Sunt muſculi in minimo digito qui in tres aut quatuor ſecari poſſunt, qui auricularem digiti ab aliis abducunt, monticulum eſſormant, Mercurio dicatum, hac Laur.

De Muſculis pollicem extendentibus.

CAPUT XIX.

^a Extendentium pollicem [tab. 10. fig. 1. T. inferius] à cubiti exteriori ſede ad li- a 21. digit. Veſ. 13. Fallop. 4. manus exterior, Columb. & Piccolb. 7. pollicis muſculus, Plat. 1. extendentium, duo tantum ſunt, Laur.

vet.

Dddd 3

II. Ex-

b Veſ. à membrana illa media, Fall. principio carneo à cubito egreditur, Columb.

c. 22. digit. Ves. II. c Extendentium [tab. 10. f. 2. & 3. V.] ab eadem cubiti linea secundum ipsius lon-
 Plat. 14. Fallop. gitudinem carnea nascitur & oblique supra radium conscendens in partes duas
 5. manus exte- impares sibi mutuo hærentes, dividitur, & sinu proprio in radii appendice inciso in-
 rior qui varias fidet, & ligamento peculiari [tab. 8. f. 2. & 4. char. 6.] obducitur: parsque superior ali-
 habet inscriptio nes & intendi- quando carnea in tendinem pene tetetem definit, & in carpi ossis pollicis subje[cti] [K]
 nes quatuor (4. sedem exteriorem implantatur: inferior vero [L] in portiones duas carneas subdivi-
 Piccolh.) quan- ditur, quæ singulæ in tendinem finiunt, quarum altera radici primi pollicis inter-
 doque quinque nodii [m] altera membranoso nexu, secundo & tertio pollicis ossi pertinaciter ad-
 definit, qua- nascitur [n] ejus usus, pollicem introrsum versus extendere.

terium pollicis III. d Extendentium [tab. 8. f. 4. P. tab. 9. f. 1. X.] à carpi ossis pollicem sustentis par-
 articulum, al- te e interiore nervoso principio, quod statim carnosum fit, oritur & deorsum latus in-
 ter ad secun- pollicis internodium primum f tendine membranoso inferitur, eumque ab indice
 dum, alius ad abducit. Hic cum secundo & tertio pollicem flectente, volæ carnosam partem ad
 primum, quar- pollicis radicem efformat.

tus ad os bra- IV. g Extendentium [tab. 10. f. 1. 2. 3. 4. Z.] spatium quod inter pollicem & indicem
 chiale cui pol- est occupat, hicque ab ossis metacarpi indici subje[cto], interna & quasi posteriore par-
 lex innititur te, h carnea, partim etiam nervus oritur, & in pollicis, internodium i primum toto
 Piccolh. addit externo lateri carnosus inferitur, & tendinem membraneum k secundo transmit-
 Columb. & tit: pollicis lateralibus motibus servit, eum indici adducit, & superimponit.

nonnunquam alii adhuc duo
 præter prædictos
 inveniuntur, ita ut possis ex hoc uno tres aut quatuor efficere cum unicus sit: 2. extendentium bifido est tendine, Laur.
 d 23. digit. Ves. 7. manus extrema, Col. 7. à manu exortus seu pollicis primus, Piccolh. 15. Fallop. pollicis musculus in later-
 re externo, Plat. abducunt pollicem tres musculi, propriis carentes nominibus, hæc Laur. c Carnosus erumpit & carno-
 sus in os secundum pollicis os flectentes præsens: musculi partes arbitratus est, Ves. g 24. digitorum, Ves.
 inseri scripsit, non admodum vere, cum vera insertione ipsi non adnascatur sed duntaxat fibrosis nexibus invalide hæ-
 reat, imo duos musculos primum pollicis os flectentes præsens: musculi partes arbitratus est, Ves. g 24. digitorum, Ves.
 13. extrema manus, Col. 13. à manu exortus, sive 7. pollicis Piccolh. 16. Fall. instit. i pollicem movens, Fallop. obser. pollicis
 musculus rectus, Plat. h Carnosus, Ves. Columb. Piccolh. partim etiam nervosus, Fallop. i Os pollicis secundum Piccolh.
 in os pollicis inferitur, Col. k Nunquam invenire potuit, Fall. obser. at in instit. agnoscit, ceteri non meminere.

De Musculis Metacarpi, seu Interossæis.

CAPUT XIX.

2 Gal. 1. ad. an. 9. fatetur se
 ignorasse: 4. 5.
 6. 7. 8. 9. 10. &
 11. digitorum
 primum inter-
 nodium, cui inferuntur flectentes (quod Fallopius reprehendit) recta quidem si utrinque musculi fibra contrahantur:
 si exterior interiore quiescente flectitur extrorsum parum inclinans: interiore agente ad interiora flectitur, Vesalio.
 Plat. Octo postremi extrema manus, quorum duo si simul agant, primum articulum in quem inferuntur recta flectunt:
 si unus solus agat, motum obliquum flectendo efficit, Col. Piccolh. cui 14. ad 20. usque à manu orti. Fallop. metacarpi
 musculi: at Plat. digitorum musculi recti ossium post brachialis intervallis quatuor innati interossæales dicti: Laur.
 interossæi.
 b Octo dicit, tria tantum intervalla constituendo, Vesal. octo, qui duos unicuique digito contigisse præter pollicem, scri-
 bit

*huius Columbus, sic & Piccolh. octo Fallopius obs. interossei sex non octo digitos abducentes, quamvis & extensioni inservi-
ant, Laur.*

ex parte carnei sunt, & secundum osium longitudinem recta feruntur, per digitorum posteriora repunt, ipsorumque tendines, cum lumbricalium quatuor tendinibus, aliquando etiam ante insertionem miscuntur, ita ut videantur lumbricales, & interossei tendinem unicum, eumque latum efformare, & ligamento primi articuli aliquantisper colligantur, & per latera ad exteriores tendines musculi quinti digitos extendentis feruntur; & in illos inseruntur, & cum illis extensionis c. secundi & tertii articuli omnium digitorum auctores sunt, & quatenus digitorum lateribus haerent, digitos procul invicem diducere & adducere videntur. Quare ubi vulnus metacarpio exterius inflictum est, digitorum articuli primi extendi non possunt, idque propter musculum digitum extendentem factum, cum articuli secundi & tertii exiguis his remanentibus cito & valide extendantur. Verum hi musculi d. cavitatem intro flexam in metacarpio (quemadmodum alii in pedio) ita aequalem & planam reddunt, ut musculorum horum tendines singuli ad munera sua recte obeunda plano ac molli strato insidentes, recto itinere perveniant, & ne ossium subiectorum duritie collidantur, prohibeatur, & eisdem cum pinguedine supposita per exsiccari minime permittatur. *primus Gal. 1. us. par. 18. an. mad. vertit, pot. stremas digito- rum phalanges ab interossei extendi: idcirco digitorum tensore absciso, digitorum extensio non aboletur, quin interossei simul*

agentes extensionem perficiant. At Fallop. in obs. & inst. lumbricales & interossei potissimum extensioni digitorum inserviunt, obliquis motibus per accedens tantum conferendo. d. Sic & Arantius.

De Musculis carpi, seu brachialis.

CAPUT XXI.

De his egit Galenus lib. de diff. muscul. 21. & 2. us. part. 4. item 1. adm. anat. 5.

Carpus seu brachiale pars est ea, quae inter cubitum & metacarpum a seu post brachiale media est. Carpus autem potissimum flectitur, & extenditur, & in utrunque latus agitur, cum quo & manus pari motu agitur, idque beneficio musculorum quatuor, quorum duo flectentes intrinsecus, duo vero extendentes extrinsecus locati sunt.

I. b. Flectentium & inferiorum qui Culiteus internus à situ nominari posset [tab. 8. fig. 1. 3. 4. & tab. 9. f. 1. & tab. 10. f. 1. & 2. Δ] ab humeri tuberculo interno seu inferiori, principio acuto ex carnea c. nerveaque substantia mixto oritur, & carnosus per ulnae longitudinem, cui adhæret, & in progressu ab ipsa ad carpum usque, exortus sui rotatur assinit, & cubito pulvinaris loco est, cui, dum scribimus, innitimur: mox ad carpum in tendinem carnosum nervosumque degenerat, qui in carpi os quartum, primi ordinis quod cartilagosum à Galeno dicitur, implantatur, & ligamenti illius articuli connectitur, & membrana communi obvolvitur [ejus principium, & insertio.]

II. d. Flectentium seu superior sive Radius internus [t. 8. f. 1. 2. & t. 9. f. 1. Θ] ab eodem tuberculo enatus, oblique juxta radii longitudinem descendit & ante carpi radicem, in tendinem teretē & validū desinit, qui à carpo liberatus, ejusque sedem internā prætergressus, Felle insit. 3.

a Musculi brachiale morventium 4. Tef. carpi seu brachialis 4. Fall. Laur. musculi manus 4. Col. & Piccol. manum intergram morventes in brachiale & post brachiale inserti 4. Plati morvens. Ves. Fall. inst. 2. manus interior musc. Col. Piccol. Plati 1. Carpi flexor. Laur. Ves. Col. Piccol. 2. Brachiale morvens. Ves. Felle insit. 3.

Manus interior, Columbus. & Piccolh. 2. Manus musc. Plati 2. Carpi flexor seu superior, Laur.

Brachiale & postbrachiale
fleunt, Piccolhom.

f. 3. Brachiale
movens, Vesal.

Fallop. instit. 6.
musc. exterior

manus, Colum.
Piccolh. 3.

Manus muscu-
lus, Plat. 2. Car-

pum extendens
seu inferior,

Laur.
g. Annulari,

Piccolh.
h. 4. brachiale

movens, Vesal.
Fallop. instit.

7. musculus ex-
terior manus,

Columb. &
Piccolh. 4. ma-

nus musculus,
Plat. 1. carpum

extendens sive
supernus, Laur.

i. Quare bicor-
nis nomen im-

positum, Col.
Piccolhom.

qui bicornis bipartitus
statim ab ortu spectatur, Ves.

k. Hunc bicornem non raro geminum inveni, id est, duos
musculos unum majorem principio nervoso, qui tendine infra humeri articulum in quatuor digitos definit; alterum
minorem principio nervoso, qui tendine in radium medium definit: tendines primo lati sunt, postea rotundi fiunt, Pic-

colhom.
I Brachiale & postbrachiale extendunt Piccolh Gal. 2. usupart. carpo motus proprios in proum & supinum ascribit,
quorum authores facit quatuor hos musculos, prout hic illos contrahatur, aut quiescat: Vesalius Galenum hac su-

xisse asserit.

a Radium muscu-
li quatuor, Ve-
sal. Col. Fallop.
instit. Plat.
Piccolh. Laur.

his, latiorque redditus, in radicem ossis metacarpii, quod indici præponitur, interi-
tur, & ligamento transverso quoque adnascitur. Hi duo ^e si simnlagant, carpum an-
trorsum fleunt, secundo & manum: alterutro vero agente, oblique nunc sursum,
nunc deorsum movet, eam carpi partem in quam infigitur, duobus tamen musculis,
qui exterius sui sunt, opem ferens.

I. f. Extendentium seu inferior sive Cubiteus externus [tab. 8. f. 4. & tab. 10. f. 1. &
2. A] inter primum carpi, & quintum digitos extendentis situs, cum ab humeri tu-
berculi externi seu superioris [tab. 10. f. 1. c] radice principio sumpto, tum à summo
cubito quem amplexatur, & per ejus longitudinem fertur, & cum ad carpum perve-
nit, tendine tereti, nerveo & valido supra cubiti appendicem in sinum juxta styloidea
in os metacarpii, quod minimo & digito subjicitur, & non procul à carpo infigitur,
& nonnunquam ante insertionem ossiculum sesaminum innatum habet.

II. h. Extendentium seu superior vel Bicornis sive Radieus externus tab. 8. f. 2. 4. b
& tab. 10. f. 2. 3. E] ab acie ossæ, quæ in humero est, supra tuberculum exterius [tab.
10. f. 3. I] carnosus latiusculo principio pronatus, radio insertitur, & supra radii
medium excurrans in tendinem crassum robustum ac bicornem i finit, & ubi supra
carpum recto tramite progressus est, alter in metacarpi os primum, quod indicem
sustinet, & in radii extremum: alter vero in secundum, cui medius innititur inseri-
tur: k.

Hic cum aliquando circa exortum & insertionem omnino distinctus reperiatur, id
circo aliqui musculum geminum faciunt.

Hi si simul agunt^l carpum extrorsum fleunt, & extendunt, & secundo manum,
quibus portio musculi tertii pollicem extendentis simul auxilio est: secundo quo-
que carpum vel manum extremam circumagunt, quando unus alium in agendo
immediate subsequitur: alterutro vero agente varii motus efficiuntur, nam si aut se-
orsum operentur, aut flectentium unus cum extensore simul agat, carpum oblique, &
ad latera movet.

De Musculis a radii.

CAPUT XXI.

De quibus Galenus lib. de diff. musc. 21. 2. usupart. 7. & 1. adm. anat. 8. egit.

Cubitus ex ossibus duobus constat, altero inferiore, quod cubitus seu ulna [tab.
11. fig. 1. 2. 3. N.] altero superiore, quod radius dicitur [tab. 11. f. 1. 2. 3. O.] & quod-
libet

libet musculos peculiares obtineat. Radii motus duplex est, vel enim movetur per se, ulna immota propter ipsum articulum, tum superiorem cum humero, tum inferiorem cum carpo, tum utrinque supra & infra cum ulnæ articulatione, & sic manus tota, vel in primum, vel in supinum movetur: manus enim tota, cum eam radius fere solus excipiat, eisdem motus obtinet: quare musculorum duorum externorum ope supina, duorum vero internorum prona redditur, simulque circumagitur: vel movetur per accidens, una cum ulna in rectum, ubi totus cubitus flectitur & extenditur.

I. ^b Supinatorum seu longior [tab. 9. fig. 1. 2. 3. & tab. 10. fig. 1. 2. 4. 11] omnium eorum, qui cubitum perreptant, quoad ventrem ^c longissimus, ab humeri tuberculi externi, & superioris acie, carnosus oritur [tab. 9. fig. 2. & tab. 10. fig. 4. a] mox expansus radio oblique insertitur, & tendine latefcere membraneo radii appendici versus interiora insertitur [tab. 9. fig. 2. t. & tab. 10. fig. 4. b] Hic radii partem inferiorem convellit, manumque supinam reddit.

b 2. Radii, Ves.
(cui & exterior)
Fall. Plat.
cui & supinator primus 8.
exterior manus
longissimus nū-
cupatus Col. &
Piccolh. 1. Supi-
natorum lon-
gior. Laur.
c 1. ad. an. 8.
longi.

II. ^d Supinatorum brevior tab. 10. fig. 1. 3. 4. & tab. 11. fig. 1. 2] ab articulatione ^e quæ cubitum humero connectit, & ab ulnæ processu [tab. 10. fig. 4. a] posteriore sive olecrano carnosus erumpit, oblique progreditur, & in radium fere medium quem revolutus arcte comprehendit eique adhæret, implantatur [tab. 10. fig. 4. y] estque foris membranofus, intus vero carnosus. Hic radii partem superiorem oblique extrorsum convellit, & manum posteriori in parte supinam reddit.

d 4. radii Ves.
(sive exterior)
Fall. Plat. sive
supinator secundus 9. exterior
manus, Colum.
Piccolh. 2. supi-
natorum, Lau-
c à ligamento
valido, quod
cubitus hume-
ro constringit,
& superiore ra-

I. ^f Pronatorum seu quadratus [tab. 9. fig. 3. 4. & tab. 11. fig. 3. 4] ab ulnæ parte inferiore & inferiore prope carpum carnosus latus, & quadratus exoritur, & anteriore parte transversus, (fibris transversis ex ulnæ in radium transversim conscendētibz) in radii internā & imam partē, tendine ^h membranoso inseritur. Hic n. secundū cubiti interiorem amplitudinem totam radii ulnæque sedem complectitur: quadratus est cum ipsius longitudo tanta sit, quanta est cubiti interior regio, ab ulna & radio constituta, estque omni ex parte carneus, qui in medio extuberat crassusque est, quo pulvinaris instar tendinibus ad digitos excurrentibus subternatur. Hic dum radii partem inferiorem carpo proximam, introrsum trahit, radium & manum radio adstrictam in primum adigit.

& superiore ra-
di parte, Ves.
Plat. Piccolh.
f 1. radii, Ves.
(cui & inter-
rior) Fall. Plat.
cui & pronator
primus, 8. inter-
rior manus mu-
scul. Col. Piccolh.

II. ⁱ Pronatorum seu rotundus [tab. 8. fig. 1. 2. 3. & tab. 9. fig. 1. 2. 3. 4. & tab. 11. fig. 1. 2. 3] ex humeri tuberculo interiore ^k & ex ulnæ latere interiore superioreque, qua humero articulatur, carnosus enascitur, & obliqui radii sedem internam conscendens, circa ejus medium carnea insertionē implantatur [tab. 10. fig. 4. y] à qua insertionē nervosus ad radii medium usque educitur, ejusque superiori regioni asperæ tendine nervoso valide infigitur [tab. 11. fig. 1. 4.] Hic quoties contrahitur, radii superiorem partem introducens, radium & totam manum in primum contorquet.

Eeee

De 2. Pronatorum

seu quadratus, Laur. g Gal. 1. ad. an. radium ulnamque intercedere voluit. h Carnosus in radium inseritur, Colum. Piccolh. 1. 3. radii Ves. (cui & interior) Fall. Plat. cui & pronator secundus. 7. interior musc. manus, Colum. Piccolh. 1. pronatorum seu rotundus, Laur. k & à ligamento illius articuli interno, Fallop. l Partim carneo, partim nervoso, Colum. Plat. Piccolh. membranoso, Laur. propter duæ brevitatē, hic quemadmodum & quartus & primus carpi. exacto tendine destituitur, Ves.

De ligamentis musculorum cubiti, & summe manus egit Galenus i. adm. anat. 10.

Etsi per cubiti longitudinem universam, musculis omnibus membrana valida circumdetur, quæ musculos invicem committit, in sua sede continet, & instar ligamenti alicujus transversi continet, quibus etiam pertinaciter propriae musculorum membranae modo adnascitur, sunt tamen ligamenta alia quæ ossa invicem committunt.

Quare cubitum ex radio & ulna compositum, ligamenta & humero & carpo & inter se connectunt. Humero quidem ligamenta communia, quæ ulnam humero & radium humeri tuberculo exteriore ligamenti validis, sed membraneis, sicuti & ceteros articulos jungunt [tab. 10. f. 2. i.] At carpo committitur ligamento membraneo reliquorum articularum communi, & duobus privatis terebibus, quorum aliud ulnâ jungit, quod à processu styloide in carpi os quartum dicitur, & ceteris magis est cartilaginofum: aliud radium carpo necit, quod ex radii apice educitur, & in carpum fertur. Inter se vero ulna & Radius uniuntur, tum communi infra supraque, tum privato membraneo validoque, quod per totam longitudinem utriusque ossis ducitur, & inter ossium horum intervalla situm est, & ab acutiore ulnæ linea, in radii lineam inseritur, [tab. 9. fig. 4. tab. 10. fig. 3. & 4.*] & fibris obliquis constat, quæ à radio depressum in ulnam oblique praeponunt. Hujus usus ossa hæc conjungere & vincere, musculos exteriores ab interioribus distinguere & musculis quibusdam, vel principium præbere, vel principiis robur addere & ad motus æqualitatem conferre, ut ambo simul & semel flectantur & extendantur. Radius quoque & carpus, ligamento membranoso nerveo, articulationi circumjecto, inter se junguntur.

Carpi ossa ligamenta communia obtinere, quibus obducuntur & alicubi etiam ossa intercedunt & cartilaginea fiunt [tab. 9. fig. 1. V. tab. 10. fig. 4. 3.] At ligamentum hoc ab ulnæ & radii appendice inferiore prodit, validum certe & officula sic colligat, ut motibus propriis edendis (obscuris licet) idonea sint, quod in ossis metacarpi appendicem tandem implintatur. Et hoc ligamentum est annulare, quod omnes tendines carpi interni & externi complectitur, per quod etiam plurimi tendines digitorum, intra cavum carpi interni deferuntur: cujus cavitatis eminentiæ ab ossis carpi pollicem sustentis apophysi & quarto osse primi ordinis, efformantur.

Metacarpi etiam ossa ligamenti communibus invicem committuntur, quæ non tantum ossa orbiculatim ambiunt, verum etiam juxta extremitates in ipsorum medio, quæ ossa se invicem respiciunt, se non nihil insinuant & cartilaginis naturam referunt; verum hisce per exteriora ductis, & carpi ossibus junguntur.

Digitorum denique inter nodia etiam ligamenti communibus vinciuntur, & in manus vola, ligamento transverso, phalanges digitorum cum ossibus metacarpi junguntur. Præter hæc ligamenta adsunt in manu adhuc alia, quæ ossibus articulationis non, serviunt, sed tantum tendines ad digitos abeuntes obvolvunt ac conti-

ment, ne dum moventur loco excident, hocque duplex est.

Ligamentum annulare primum est, quod ad carpum parte interna [tab. 9. fig. 1. V.] transversum, latum & cæteris hujus generis robustius, quod armillæ instar in carpo situm est & sinum carpi succingit, omnes tendines huc prorepentes simul continet, & ab hoc aliquando & tendo palmaris musculi procedit: hocque nec metacarpo, nec cubito commune est. Alterum parte externa, qua carpus cubito articulatur, à prædictis duabus appendicibus ortum ducens per totius cubiti latitudinem expansum, quod primo intuitu unum esse videtur, cum tamen dissectum, sex^a ostendat ligamenta transversa, tendinibus musculorum digitos extendentium annulorum instar obducta, eosque continentia [tab. 8. fig. 2. 4. char. 1. 2. 3. 4. 5. 6.] primum ex ulna in radius procedit, & ad sinum communem ulnæ & radio refertur, & sexto^b digitos extendenti peculiare est: secundus ulnæ proprius & primo carpum extendenti: tertius radio proprius & tendinibus indicem medium & annularem extendentibus: quartus angustissimus annulus est, tendinis gracilis musculi indicem & medium à pollice abducentis: quintus carpum extendenti secundo, & ei qui pollicem indicem versus evertit, viam præbet, nonnunquam pollicis tendinem, ligamentum peculiare obducit: sextus tres tendines [tab. 10. f. 2. 3. l. m. n.] musculi secundi pollicem extendentis [tab. 10. f. 2. V. transmittit.

Digitique quoque singuli secundum eorum longitudinem, ligamenta habent, ab internis ossibus digitorum ad latera pronata, quæ longa sunt, & canalem imitantur, quæ tendines digitos flectentes in suis sinibus veluti annuli retinent, ne in flexione extrasedem attollantur, & vel vagentur.

Tandem ligamenta dantur membranæ, vel potius membranæ mucosæ, de quibus in tendinum musculorum manus enumeratione) quæ tamen cæteris tendinum membranæ rubicundiores sunt, & tendinibus ad manum & digitos transmissis, ligamentorum ritu obducuntur, eosque quo tutius procedant, involvunt: & ab his aliquando & musculi ortum acquirunt.

a Galenum i.
ad an. ad mini-
mum duo la-
tuere, Vesal.
b Galenus ex-
tendentium
quinto tribuit.
Vesal.

c Quare Gal.
lib. 1. f. 2. aje-
bat, ope tendi-
num quinti
musculi ter-
tium interno-
dium flecten-
tium, primum
quoque flecti-
at rei verita-
tem, i. ad an.
agnovis, Col.

De Venis totius manus.

CAPUT XXIII.

De hujus vide Gal. lib. de dissect. venarum, 3. 4. 3. ad anat. 5. 6. 7. & de ratione vicius acutorum, tex. 10. & lib. de curat. per sang. mis. & alibi.

VENÆ CAVÆ truncus sub osse pectoris ad jugulum [tab. venarum, & tab. 12. figur. 1. H.] in duos^a insignes [II] ramos dividitur, quorum alter dextram, alter sinistram partem petit, & quamdiu in thorace est Subclavius dicitur, ubi vero thoracis

Eccc 2

a Vena cava
thymo suffulta
in duos truncos
dividitur & a
cavi-

sinistro, quemadmodum à dextro gravis vena oritur, quæ prima costæ innixa sub clavícula in axillam prorepit, ab hujus vena medio fere ductu humeraria oritur, Ves. vena cava ad jugulum duas magnas emittit venas axillares, Colum. in duos grandes ramos, quorum alter dextram, alter sinistram partem petit, & ad latera deducti quilibet in tres ramos partitur, alter qui ad axillam per brachium disseminatur: duo alii per cervicem ascendunt, jugularis exterior & in-

terior; juxta eandem regionem, alia producit, non magna, qua cervicis vertebrae permeat, & nutrit, nec calvariam, ut Vesalius voluit, ingreditur, Fallopius institution.

cavita m egressus est, cum ad axillas feratur mutato nomine Axillaris dicitur, a qui-
us vari prodeunt rami, de quibus in thoracis & colli historia egimus. Verum b Axil-
laris in duos abit ramos, superiorem seu venam Cephalicam [a] & inferiorem seu Ba-
sili-
cam [m] ita ut utriusque idem c exortus sit, de quibus sermo erit.

Cephalica [a] axillaris ramus c superior est in homine, f quæ in plerisque quadru-
pedibus à jugulari externa promanat, sic dicta, quod in capitis affectibus incidi so-
leat, eo quod censuerint, Cephalicam à ramo Superclavio capiti proximior, & Basi-
licam à ramo subclavio hepatis vicinior prodeire, cum tamen utraque à ramo Axillari
ortum ducat: aliquando tamen Cephalica, ramulum à Jugulari externa, acquirit, ob
quem Cephalica sectionem capiti laboranti magis conferre censent. Humeralis et-
iam nuncupatur, quod per humerum in manum feratur: & cubiti exterior, quod cu-
biti latus exterius perreptet. Hæc enim per humeri summum & exteriora deducta,
ad cubitum summamque manum superficietenus inter membranam carnosam &
musculorum tunicam descendit, & antequam sub humerum se abdat, modo unum,
modo duos ramos emittit [dd] qui per muscolum brachii deltoidem & cutim, qua
tegitur, distribuuntur. Dein exterius cubitum adit (hic nonnulli cephalicæ princi-
pium statuunt, partem altiorum humerariam vocantes:) etiam citra sectionem con-
spicua, nisi forte homo vel obesior sit, vel venas graciliores obtineat: ac in descensu
ad cubiti articulum usque venulas tenues in brachii musculos, & ad cutim exterius
[ee] partim recta, partim oblique prorepunt, ita ut aliquando cum Basilicæ ramo in
cute distributo [f] coire videatur: aliquando ramus ad musculos internos cubiti [g]
mittitur, qui in hominibus frequentissime deest, ubi vero ad cubiti articulum sive fle-
xuram pervenit [f] juxta brachii tuberculum externum, in ramum s interiorum &
exteriorem dividitur.

Laur.

c Venarum dua

rum à carva in

brachium, una

eademque ra-

dix à jugulo ex-

tra thoracem

usque exiit,

Vesal.

d Humeralis,

Gal. de ven.

sect. 2. quæ. 1.

ad. an. 11. hume

rarum. & cubiti

exterior, Vesal. & Plat. humeralis Cephalica & capitalis, Columb. Galenus pereleganter vereque eas enarravit ve-

nas, quæ citra sectionem in nudato brachio, ut in vena sectione sit plurimum & frequenter illæ occurrerunt, quas cum si-

milis convenire vidit, Vesal.

e Superior & gracilior, Vesal. de huius positis differentia & crassitudine, vide de dissect. ven. 3.

f Exterior & grandior supra jugulum facta divisionis ramus, sive jugularis exterior ex Galeni sententia venam infi-

gnem profert, quæ humerariam nobis nuncupatam venam constituit, cum tamen propter Aristotelem, qui humeraria

ortum sub aure esse falso tradiderat, & Galeni obscuritate locorum studiosius humeraria originem indagatus sum, ve-

nam hanc, non ut Galenus censet ab externa jugulari enatam vidi, verum ab ea vena, quæ transversim supra primam

costam in axillam tendit, Vesal. Humeraria axillaris propago est in hominibus & omnibus, quæ jugulum habent: in iis

vero quæ jugulum non habent, vena jugularis externa ramus est, quam rationem exortus in homine invenire nun-

quam potui, Fallopius observat. haud verum est, quod Vesalius dixit humerariam à jugularis exterioris lasere exter-

no produci, sed axillari vocata propago est (idem & Laur.) deceptus in canibus & simiis, Fallop. instituit. Sylvius in

ramum subclavium, à quo Basilica & ramum superclavium à quo Cephalica prodeat, divisit: quemadmodum etiam

Vesalius & Plat. pinxere, & lib. 2. tab. 6. fig. 1. à dextris falsitatem, à sinistris veritatem proposuimus. At Ves. errorem

agnovit, quare tab. ult. lib. 3. & veram & falsam proposuit originem: sed Valverde primus totius curæ veram deline-

ationem exhibuit.

g Humerariam in tres ramos dividit, 1. qui g. notatur. 2. notatus. h. & 3. funem brachii. i. Vesal. in internum secatur,

Columb.

Inte-

Interior^h quidem [h] obliqueⁱ ad medium flexuræ cubiti sedem sub cute dedu-
ctus, cum Basilicæ venæ ramo tribus digitis infra flexum cubiti [t] coiens, venam me-
dianam dictam constituit [a] verum aliquando ramus hic vix conspicitur, opposito ex
Basilica prodeunte manifesto: nonnunquam vice versa fit, & quæ prope flexum cubi-
ti oblique productæ inciduntur, rami sunt Cephalicæ aut Basilicæ concurrentes ad
veram Medianam constituendam.

^k Mediana: vena mediana [c] à situ nominata, communis etiam, quia ex Cephali-
cæ & Basilicæ ramis in unum concurrentibus [t.h] generetur, & quidem sub cubiti
flexu, aliquando multo humilius tribus digitis infra cubiti flexuram, nō procul à me-
dio longitudinis cubiti, & ab Avicennâ nigra vocata: hæc oblique deorsum per me-
diam brachii regionem ducitur, & supra radium hinc inde surculos diffundit: non-
nunquam etiam ab iis, quæ cubiti sedem internam perreptant, alios assumit: at supra
radium [infra β] in duos ramos [γ] finditur, quorum exterior [γ] surculum [δ] ad
carpi sedem interiorem pollicem versus mittit, & cum aliis [qz] commiscetur, reli-
quum versus pollicis & indicis regionem^l exporrigitur, quam alii Salvatellam, com-
muniter tamen à chirurgis cephalica, ab aliis ocularia dicitur. Alter vero interior [ε]
inter indicem & medium, & aliquousque annularis sedem in varios surculos absu-
mitur, & à quibusdam Syele Avicennæ censetur: sed adeo varia est venarum manus
cutim implicantium distributio (imo etiam in cubito) ita ut hominis ejusdem dextra
cum sinistra raro conveniat: imo inter quam plurimos homines, vix duos venarum
æquali in ramos distributione invenias, quare horum ductum explicare difficile
est.

Verum vena communis profunda ex Basilicæ profunda, & Humeraliæ ramo e-
nata, in ramostres dividitur: quorum ramus humilior [tab. 10. appen. fig. 1. & 2. t.] jux-
ta ulnam incedens non semper unus, sed interdum geminus †† in medio arteriam
complectens, musculis vicinis surculos affert, & in manum internam distributus, di-
gitis surculos aliquot largitur. Alter ramus elatior [tab. 10. appen. 1. & 2. u] juxta me-
dium incedens (& similiter non raro sicut humilior geminus est) & sub musculo
pollicem flectente deorsum procedens, musculis vicinis propagines offerens, in pol-
licis vel indicis sedem internam distribuitur.

Tertius ramus** qui medius est [tab. 10. appen. fig. 1. & 2. x] & inter musculos di-
gitorum secundum & tertium internodium flectentes delatus, totam longitudinem
ligamenti membranæ, quod ulnam & radium intercedit, perreptat, musculis in-
cumbentibus surculos tribuit, & interdum geminus existens Arteriam hinc inde cō-
prehendit. Ab hoc ramo circa quartam ulnæ propago ††† orta [tab. 10. appen. fig. 1. &
2. y] ligamentum membranæ ulnæ & radii perforans, ad posteriora transit, & in
musculos ab ulnâ procedentes, aliosque eidem incumbentes, distribuitur: & hæc in-
terdum gemina est, & Arteriam mediam comprehendit.

Exterior^m cephalicæ ramus seu funis brachii Avicennæ [i] oblique per radium in
cubiti longitudinem externam venulis in cutim [k] passim dispersis, abit: at ubi ad
carpi

Ecce 3

carpi

†† quod Vesalius non animadvertit, Eustachio monente ** qui à Vesalio nec describitur nec pingitur. ††† & hæc
propago ut Eustachius scribit, oscitanter à Vesalio prætermittitur. m. Tertius humeralis ramus, Vesal.

Alteri com-
mifcetur vena,
qua ab axilla-
ramo pendet,
Vef. cum alio
communi ramo
commifcetur,
conftituens fal-
vatellam, Fall.
inf.

Tralliano,
Ægineta: vide
hanc quaftio-
nem apud Ve-
falium l. 7. con-
trov. & Augu-
stinum in epiſt.
medicin.

* Aretæus 2.
morb. acut. 2.
hoc remedium
ut inutile & fu-
perſitioſum re-
prehendit, cum
Salvatella ſit
venarum cubi-
ti Soboles: qua-
re Gal. lib. de
Vena ſect. ſta-
uit lieni affe-
cto non aque
conferre ve-
nam incifam
quæ inter an-
nulare digi-
tum & mini-
mum ſita eſt.

atque ſi venæ cubiti interna ſecetur. o non infrequenter, Vef. p Vena interior, Gal. de ven. ſect. Axillarium vena-
rum tres ſunt, una baſilica, jecoraria, & Hipp. cubiti interna dicitur, Col. Axillaris, Vef. Pla. cui & interior cubiti & he-
patica, Axillaris ſeu jecoraria, Fall. Baſilica & hepatica, Laur. b Axillaris à cava divaricatione ubi prodiit thoracem
egreſſa & ſub clavicula deducta, ad axillam devenit priuſquam eo pertingat, multos ramos ad mufculos cervicis &
ſcapula enutriendos de ſe promit: prætereà ramum præcipuum, qui ad humeri ſuperiora ductus, humeralem facit ve-
nam, Fallop. inf.

1 Hipp. τὴν εἰς φλέβαν lib. de viſus ratione, Col. Laur. at φλέβαι αἱ εἰς, vena interiores dicuntur & de venis brachii-
rum intelliguntur, 2 Epid. qua diſtione etiam vena ſecundum reſtitutionem ſignificantur & vena poplitis, 6 Aph. 36.
& 7 aph. 48. Fœſius. f Fallop. inſtit. at Laur. obſervatio nova & pulchra eſt, quod ignoravit Veſalius, quare bre-
vior à ſiniſtro latere ad ſiniſtram baſilicam quam ad dextram eſt via: quare Veſal. ſententia de perpetuo dextra cubiti
vena ſecunda explodenda & ab eodem latere venam ſecemus, Græcorum veſtigii inſiſtentes, non omnem quidem ſed
Baſilicam tantum ex mandato Hipp. lib. de ratione viſ. in acutis, idque vacationis, reſuſſionis & derivationis ergo:
Laur.

1 Axillaris vena ſub primo mufculo cubiti ſteſcente tres in venas inſignes dividitur, quarum una Baſilica hepatica
ſeu, altera axillariam profunde ſubit: alia medio humero plus minus reſectitur ad poſterioſiorem partem, Columb.

carpi medium parte interiore juxta ulnam pervenit [l] ei Baſilicæ ramulus [x] con-
jungitur, quo ad auctus externam carpi ſedem conſtendens, regionem, quæ ante au-
ricularem & annularem digitum habetur, ramulis implicat, & venam ab Arabibus
Sycle, vulgo Salvatellam dictam conſtituit, quæ exterior palmarum parte ante digitos
conſtitit, cujus ſectio in ſiniſtra manu in melancholicis affectibus tantopere ab Ara-
bibus etiam Græcis & poſterioribus & practicis cōmendatur * qui affi-
mant quantum
lumenque ſanguinis è Salvatella detrahatur plurimum lieni conferre. Interdum hic ce-
phalicæ ramus deficit o & tunc vices ejus Baſilicæ ramus [x] toti ulnæ longitudini ex-
porrectus, ſupplet; nonnunquam vero ramuli à vena mediana in cutem excurrentes.

Baſilica p [mm] ramus alter eſt & quidem inferior & interior ab Axillari prodiens,
qui major & amplior eſt cephalica, & etiam infrequētioreſ ſurculos dividitur,
quæ multis Axillaris, aliis cubiti interior quod per cubiti interiora deſcendat dici-
tur, & ratione brachii apud Practicos nomen mutat: dextri enim, Hepatica, quod in
hepatis affectibus ſecetur: ſiniſtri vero Lienaris, quod in lienis morbis incidatur, no-
minatur. Hæc per brachii interiora comite Arteria & Nervis adjunctis, inter muſcu-
los brachii os amplexantes lata, ad axillam à multis glandulis excipitur, ibique in plu-
res propagines dividitur: quarum præcipuæ ad mufculos thoraci inſtratos diſſemi-
nantur: & harum inſignior Thoracica inferior [k] quæ juxta coſtas diducta, vena-
rum illarum quibus coſtarum intervalla nutiri diximus, oſcula quæ extra thoracem
prodeunt excipit; ſive oſcula venæ ſine pari, cum oſculis Thoracicæ inferioris, ab u-
troque latere tribus, interdum quatuor ramis coeunt [tab. 8. lib. 2. xxx. cum yyy.]
hinc cuilibet pater, ex quonam latere in pleuriticis ſanguis mittendus ſit, an ſcilicet
ab eodem, an contrario inflammationi latere, quæ de re ſupralib. 2. cap. 18. diximus:
atramen conjunctionem venæ hujus Thoracicæ, cum Venæ ſine pari ramis patere
arbitror Baſilicæ ſectionem in affectibus pleuriticis longe utiliorem eſſe, quam alte-
rius brachii venæ. Verum ramulum quoque ad mufculos cubiti extendentes [n]
mittit, cui ex oppoſito venula in glandulas diſpergitur. Ex eadem regione poſte-
riore, vena alia [o] ad eodem mufculos mittitur, à qua nonnulli ſurculi in cutim bra-
chii ſede externa ſparguntur. Sub hac propago inſignis [p] oblique deorſum
ſub

sub humeri osse versus tuberculum exte- rius cum nervo quarto brachii fertur.

Mox Basilica non procul ab egressu è thoracis cavitate, in duos " truncos [*tab. 12. u. Aliqui osci-*
fig. 1. q. r. at in venarum omnium tab. 7. & q.] pene pares dividitur, quorum alter profun- *tanter hume-*
 dus, alter subcutaneus dicitur. Ille cum roto ductu in profundo latiter, profundus *rariam cum*
 [*q.*] vel truncus in alto latitans * dicitur, qui arteriæ axillari in brachium exporrec- *carnea mem-*
 [*tab. 12. f. 2. N.*] attensus, cum qua eadem fere serie distribuitur, simul & nervi tertii ra- *brana auferen-*
 mo quarto [*tab. 15. & 16. lib. 3. T.*] ad brachium delato, comitatus, per medium bra- *tes, postmodum*
 chium sub mediana descendit, & ubi cubiti articulum superavit [*] in ramum exte- *alteram Basi-*
 riorem & interiorem dividitur, qui nonnihil à se invicem recedentes & furculis in *lica partem (q)*
 musculos parvis cum tendinibus musculorum digitorum per ligamentum transver- *notatam hume-*
 sum descendunt, & per digitorum sedem internam distribuuntur. Exterior enim qui *scribunt; & si-*
 secundum radium descendit, pollicis & indicis duos, medio vero digito ramulum unū *mul cum axil-*
 exhibet. Interior vero ramus cubiti ossi attensus, in duos quoque dividitur & ab his *lari vena hu-*
 digito medio similiter unum, medico vero & minimo ramulos duos largitur, ille qui *merariam por-*
 dem musculis manus externæ, hic vero internæ. *rige se adver-*
riffe scribunt,
Vesal. que divi-

Alter Basilicæ truncus [*r at tab. venarum univerf. 1.*] Subcutaneus dicitur, quod sub *sio Galenum 3.*
 cute excurrat, qui per brachii longitudinem inferiorem ad cutem ramulis variis di- *ad. an. latuit;*
 spersis, fertur: dein paulo supra brachii tuberculum internum: (ubi non minus quā *vel quam jux-*
 Cephalica supra cubitum, ante sectionem conspicitur) in ramum anteriorem [*t.*] & *ta cubitum, at-*
 posteriore [*paulo supra u.*] dividitur. Anterior ramus per cubiti flexum medium ob- *que adeo in bra-*
 lique delatus, cum Cephalicæ ramo interiore [*b.*] sub cubiti flexa venam commu- *chii extremo*
 nem [*a.*] efficit, aliquando tamen ramus hic, qui ad communem fertur, Cephalicæ ra- *fieri scripsit.*
 mo longe aut graecior aut amplior est, & interdum hic vel ille geminus conspicitur. *Idem*
 Posterior vero subcutaneæ ramus [*u.*] juxta humeri tuberculum interius [*sub u.*] bi- *x Ductum ve-*
 partitur & horum exterior & major [*xx.*] secundum ulnæ sedem ad carpum descen- *narum, qua*
 dens, ramura deorsum [*xx.*] prope carpum juxta digitum minimum mittit; & iterum descen- *per manus pro-*
 dum altero cephalicæ ramo [*i.*] illuc abeunte [*l.*] coit, hæcque perinde ac prius dixi- *fundum porri-*
 mus in externam manum distribuitur: ab eodem ramo furculus ad cutim [*γ.*] & par- *guntur, Gal. de*
 tes posteriores disseminatur. Sunt & alii rami [*z inferius*] ab hac propagine [*u.*] pro- *diff. ven. 4. & 3.*
 deutes in cubiti cutim partē interiore disseminati, qui diversimode permiscuntur, & *ad. an. 7.*
 modo coeunt, modo recedunt, furculos à propagine * notata assumentes, aliosque ei- *y Vesal.*
 dem communicantes. *z etiam Gal. 3.*
ad. an. 6. & lib.
de ven. f. 16.
hunc curiosum
delectum ne-

Tandem à Basilicæ ramo [*t.*] medianam constituyente, sede humiliore & media, a- *glexit: quem*
 lia vena insignis satis [*z superius*] profluit, quæ interdum recta, interdum vario ducto *Oribasius 7.*
 ad carpum descendit & aliis venis vicinis varie unitur (quare y nonnunquam sedes *coll. 5. securus*
 cubiti interna quemadmodum & sura varicibus molestatur) & hujus furculi modo *est Esculapii*
 recta, modo transversim, modo oblique & quidem modo uniti, modo divisi manus *nostri ridicule*
 cuti internæ conascuntur. *contendunt,*
num humera-
ria, aut commu-

Et hac venarum cōjunctione adeo varia, maxime vero cum tam Cephalicæ quam *nia, aut axilla-*
 Basilicæ exortus idem sit [*in ex l.*] facile colligere possumus, inutilem esse * adeo cu- *ri in manu di-*
 riosum delectum venarū unius vel alterius venæ in eodem latere: quare si constet ve- *nam*
videnda sit: hu-
merariam ape-
re ve-

sive existimantes, quando venam inter pollicis & indicis radicem aperiunt: & Axillarem si venam ad annularem &
 minimum incidunt: imo in cubito prope nullam præter axillarem ramum ad communē exporrecum dividunt: etiam an-

se venarum sectionem, quod parum Anatomicum de aperienda vena non secus contendunt, quam si specularis quapiam vena à singulis partibus affectis in brachium duceretur & non ab uno trunco ex magna cava in jugulo partitione educito, omnes vena pullulent: cui ridicula vulgi Medicorum opinioni Hipp. vel ejus qui de morbu scripsit auctoritas satis congruit, qua hepatis vel splenitis ipsi vocatarum venarum ductus, imaginatione tantum traditur, V. Gal. His ita se habentibus patet, quo in pelago versentur medici anatomia imperiti, qui in secunda vena in affectibus capitis, tam magnum ponunt discrimen inter humerariam & axillarem, ac si non ab eodem prodirent ramo &c. Fallop. insit. in cubito atque summa manu axillaris & humeraria ita simul junguntur ut aliquando nil referat, aut hanc aut illam secamus, idem in observ.

nam secandam esse, & quidem brachii, & etiam constet ex quo latere sanguis educendus sit, præstabit eam quæ ligato brachio magis conspicitur, magisque turgere tunde- re: nisi forsan eorū sententiam sequaris, qui propter ramū quem aliquando à Jugulari externa prodeunt & Cephalicæ insertū notarūt, in affectib. capitis, Cephalicæ sectionem pbes. Tres n. sunt loci sanguinem ex cubito mittendi, interior, exterior, medius Galeno^a docēte: quare dum ad venam secandā accedimus, vel tres æquales videre licet, vel duas tantū, vel inæquales oēs, nonnunquam etiam occultatur una ex iis, aut etiam duæ eodem^b monente. Interioris^a sectionem utilem censuit quibus inferiores colli partes patiantur; exterioris quibus superiores, ut facies aut caput: medii vero utrisque communicare, cum venas utrinque diductas ac coeuntes habeat. Et ut re-
^a De Cur. per sang. miss. Ori-
^b diss. ven. 3. at
 quomodo cubi-
 ti vena super-
 ficiei secan-
 da sint ostendit
 3. ad. an. 6.

te Oribasius^c sanguinis missio quæ in brachio fit, recte quidem administrata, nihil magni in se habet: at si in ea peccatum sit, triplex error consequitur, ut in media, ner-
 vus exiguus: in humerali, nerveus capitis musculus: in interiore vero, arteria venæ
 subiecta simul etiam incidatur. Quare magis conspicuam incidere jubemus. Sunt &
 valvulæ in Cephalica & Basilica de quibus in historia pedis agemus.

De Arteria manus.

CAPIT. XXIV.

Vide Gal. 3. adm. anat. 8. & lib. de dissect. venarum & arter. 9. & 16. us. part. 11.

^a ab Axillari, Thoracica & Basilica prodeunt: Thoracica duplex alia in anticos, alia in posticos tho-
 racis musculos fertur. Basilicam etiam dup-
 licem observa-
 mus, profun-
 dam & subcu-
 taneam, utrin-
 que varios ex se diffundit ramos, est tamen subcutanea furculus quidam in carpo conspicuus, quo loco pulsuum diffi-
 rentias adnota manu explorare solemus, &c. Laur.

Arteria magna postquam extra thoracem ab Axillari^a utrinque ramos distri-
 buit quatuor, primum ex sede posteriore ad musculos in scapulæ sede locatos,
 [tab. 12. fig. 2. l.] alterum ex superiori sede ad humeri cum scapula articulum (quem hu-
 meralis vena aliquo usque comitatur) [K] tertium ad musculos thoracis parti ante-
 riori instratos: [L] quartum qui secundum thoracis latera deorsum fertur, [M] & ra-
 mulos exiguos inter tertium & quartum ramū glandulis sub ala sitis, communicat,
 de quibus in thoracis historia dictum fuit, reliquum in manum [ab N] mittit.
 Hæc [N] enim Axillaris arteria, per brachii partem internam cum Basilica venæ
 [tab. 12. fig. 1. m.] cum nulla sit Arteria Cephalica, inter musculum bicipitem descen-
 dens, utrinque furculos graciles ad musculos humeri sedem internam amplexantes,
 distri-

distribuit: [sub M] mox secundum brachii partem posteriorem una cum vena ^b profunda [tab. 12. f. 1. g] seu Basilicæ ramo interno, cui toto ductu attensa est, & nervo ^b Interior axillaris truncus, brachii quarto [tab. 16. lib. 3. Φ] in cubiti sedem externam, sub musculorum inde natorum capitibus aliquo usque abit, & ramulos graciles supra infraque [O] profert & juxta cubiti flexuram utrinque ramulos duos [PP] articulo largitur, ubi sæpe pulsus evidenter perferitur.

Diximus Arteriam cum vena ferri, certum enim est το συναναστουσαν α' τη λαια ταίς φλεβί καθ' όλον το σώμα ut Galenus loquitur: arteriæ enim spiritum, calorem que vitalem sanguini impertunt, & vicissim eadem ex venis sanguinem tanquam spirituum, imo & arteriarum nutrimentum exhauriunt; & hæ valorum conjunctiones, quæ per oscula fiunt, præsertim in brachiis. & cruribus reperiuntur, idcirco aliquando evenit, ut vena una duntaxat sauciata, non modo naturalis sanguis universus, sed una vitalis quoque effluat, ita ut vulneratus intereat: quod Galenus etiam inavisse videtur. Ostensus enim valorum uniones, asserit venis majoribus sectis si totus sanguis effluere permittatur, consecutione & arterias evacuari: & hoc ex eo constare, quod aperto cadavere, non solum venæ, sed etiam arteriæ sanguine vacuæ reperiuntur. Sed redeo unde digressus sum.

Arteria axillaris sub cubiti flexura, ubi cubiti sedē internā nonnihil perrepsit, in musculos duos digitorū flexores descendēs, in ramos duos insignes dividitur. Horū superior secundū radium delatus [Q] recta carpū adit, quo loci arteriæ motum seu pulsum ipsum Medici digitis explorare consuevere, ex ejus dilatione & contractione & intermedia quiete, cordis constitutionem conjectantes, & antequam ad digitos abeat, surculum versus manus exteriora [R] inter primum pollicis os & Metacarpi quo index suffulcitur deducit, & in musculos ejus loci distribuit. Tandem sub ligamento annulari & musculi palmaris tendine progrediens (quemadmodum & vena & nervus illi quoque attensus) in ramos tres secatur, horumque primus pollicis, alter indicis internæ sedi surculos duos offert, at tertius, indivisus medium accedit [inter R & T.]

Inferior vero ramus [S] ulnam recta percurrēs, carpum quoque adit, quo loci etiam tangentes Arteriæ motum perferimus, præsertim si homo aut macilentus fuerit, aut pulsum magnum habuerit; quare prædictum ramum potius, quam hunc tangimus, cum is minus à tendinibus occultetur, idcirco etiam melius exploretur: quare in introductorio seu synopsi nostra de pulsibus egimus. Hic ramus sub ligamento quoque transiens, manus volam subit, & antequam digitos adeat, ramulum [*] musculis juxta minimum digitum sitis largitur, reliquum (vena & nervo

Ffff

comi-

atque anterioribus potissimum; quod partes hæ positionem habeant, minus præcipuam quam interna. Quare s. us. part. 2. ubique natura inquit, nisi maius quid obstat, cum venis Arterias simul dividit: & lib. de diff. venar. ultimo, non omnes conjunctiones habere arterias simul dividit: & lib. de diff. venar. ultimo, non omnes conjunctiones habere arterias ostendit.

d Cum flexuram cubiti præterit, in duas sæpe tres arterias secatur, Columb. c Alii profundius delitescunt, alii superficialiter deducti exterioribus partibus vitam præstant, Fallop. f Ramus hic in aliquibus non parte interna locatus, sed foras versus fertur, unde si quis Medicus rei Anatomæ ignarus, hujus pulsum præsertim, dum agrotat loco consueto duntaxat quarat, nec inveniat, hunc morti proximum esse falso judicabit, & prædicet falso, Columb. g non meminit.

h mos inolevit: comitibus) digitis communicat, medio quidem surculum unum, at medicoⁿ duos & minimo totidem impertit. At externa manus utⁱ musculis, sic & Arteriis^k caret, excepto ramo illo quem R notavimus.

apud veteres, ne medius digitus auro insigniretur potius quam caseri, quod tenuis quidam Arteria, non nervi, ductus à corde ad hunc digitum porrigitur. cuius motus in parturientibus ne delassatis, omnibusque cordis affectibus indicis artatu manifeste percipitur: ne id cuiquam absurdum videri debet, cum animi defectu collapsos erigere soleam, vellicato hoc articulo, aurique cum momento croci attritu: per hunc enim vis quadam resocillatrix qua illi insita est, ad cor dimanat, utraque fontem cuius digitus connexus est, recreat, Lemnius de ocul. l. 2. c. 11.

1. 3. ad. an. 4. k. 16. us. part. ult.

De Nervis manus.

CAPUT. XXV.

De his egit Gal. 3. ad. an. 3. & 4. at 16. us. part. 8. ostendit quare natura missiones fecerit in nervis, & quomodo ad extremam manum ferantur, & obiter lib. de nervorum diff. 15. & 16.

MANUS cum instrumentum sit instrumentorum, hoc est instrumentum ipsius mentis in efficiendis instrumentis omnibus ex aliqua materia constantibus, ad aliquam hominis commoditatem & utilitatem spectantibus; quo actiones suas liberior obire possit, non solum Musculos motus voluntarii instrumenta, & Venas quae sanguinem & alimentum, & Arterias quae vitam deferunt, obtinuit: sed etiam Nervos, & quo vim motivam ad musculos deferrent; & sensum tactus acerrimum tribuerent. Quare Nervorum paria^a modo quinque, modo si ad manum mittuntur, quae à spinali medulla, in cervicis & thoracis vertebri contenta ortum ducunt, & quidem ex^b quinta, sexta & septima colli, prima & secunda dorsii vertebra. Hi per vertebra: rum dictarum foramina communia egrediuntur, qui statim post egressum ad latera vertebra: rum uniantur, mox denuo separantur, denuo coeunt, & postremo separantur, ita ut videantur rete quoddam constituere [vider. tab. 18. lib. 3. & huius lib. 1. a. 13. f. 3.] vel quid simile cordulis^c quae in cardinalium galeris cernuntur: qui sane implexus securitatis gratia^d factus est, quo nervi qui longius ducendi sunt duriores & ad injurias pellendas fortiores reddantur. Hi nervi sub clavicula feruntur, ad scapulae processum internū, ubi & vena Basilica & Arteria axillaris transeunt: unde non mirum si vulnera hac in parte accepta, periculosissima sint: sic etiam ex luxatione humeri facile tabes sequatur. A dicto ergo Nervorum implexu manus seu brachii nervi exoriantur, qui inter

a Gal. 3. ad. an. 3. sex nervi brachii qui de spinali medulla in brachium propriant, quorum duo ramorum sobole, manuum cutim adeunt; quatuor alii per profundiora in membris membris musculis

disseminantur

ac propagines quasdam tenues cuti transmittunt. b à 5. 6. 7. cervicis, 1. & 2. thoracis sex nervi digeruntur, Ves. nervorum manus paria quinque, tria ad extremos digitos, duo ad extremam usque manum, Columb. brachii nervi sex. Plas per brachium & manum totam sex paria disseminantur, Eaur. Sexta conjugatio nervorum medulla spina, inter quintam & sextam vertebra: emittitur & derivatur ad scapula: portio illius insignis. Septima inter sextam & septimam, cuius portio maxima in brachium porrigitur: reliqua ramulorum portione in caput, cervicem & diaphragma diffusa. Othava cuius distributio potissimum fit in cubitum & ulnam nec ultra pergit. Nona in manus extremas tota properans, cum ad cubiti flexum caride quidem nudum se appulerit, ne forte periclitaretur, inter osium tumores atque nodos se abdidit, illincque tuto triplici propagine in manum diffunditur: una quidem intus ad minores digitos, altera in majores fissa, tertia in summa manus externam regionem inflexa, Piccolth. c. Vesal. Columbi. d. 16. us. part. 8.

intercutim & membranam carnosam prorepunt, in homine multa pinguedine im-
mersi, à quibus membrana cuti pertinacissime committitur, nec eandem semper ma-
gnitudinem, situm & numerum retinent: in plures tamen ramos posteriores nervi
ipso primo distribuntur: majores vero nervos, manus internis partibus natura me-
rito distribuit, siquidem manus actiones omnes per eas obeat.

^f Primus, soboles est rami quinti nervi cervicis [tab. 15. lib. 3. ch. 5. & t. 13. huius libri] qui per humeri sedem superiorem & externam [t. 13. f. 1.2. f.] fertur, & in ramos
duos dividitur, altero elatiore, qui ad deltoideum musculum mittitur [tab. 13. f. 1.2. b.] à
quo & cuti illi instrato ramulus [tab. 13. fig. 1.2. g.] vena humeraria comitatus commu-
nicatur. Altero qui ad scapulae sinum, vena & arteria comite, ad ossis hyoidis muscu-
lum coracohyoideum seu secundum, scapulae sedem elatiorem occupantem abit, &
in deltoidis partem & cutim medii brachii parte superiore [tab. 13. fig. 1.2. i.] & bra-
chii nervum primum [tab. 13. fig. 1. π π] constituit, qui paulo sub medio brachii lon-
gitudinis cessat.

Secundus ^g [tab. 13. fig. 1. g.] crassior est, & ab implexu ^h quem nervi brachium in-
gressuri ad vertebrarum latera efformant, principium ducit, per cubiti anteriorem &
mediam partem delatus, primum musculo bicipiti, qui cubiti primus est, [t. 13. f. 1.55] sub bicipite
dein cum tertio ⁱ nervo [tab. 13. f. 1.2. x] post conjunctionem deorsum repens [tab. 13. f. 1. ω] cubiti flexu-
ram vena com-
municat: ubi vero ad cubiti flexum pervenit, in ramos tres (aliquando ^k duos, muni associa-
tur & una ad
inferiorem rursus bipartito) dividitur: unum superiorem ^l & graciliorem [t. 13. f. 1. ab E] extremam ma-
superius ad E inferius repens] qui per brachii sedem externam, cum venae humeralis tra-
mo aliquotusque delatus, ad pollicis internodii modo primi, modo secundi sedem ex-
ternam fertur, eamque ramulis tenuibus intertexit. Alter ^m vero [tab. 13. f. 1. θ] & me-
dius qui aliquantum crassior & venae praedictae ad medianae exortum succumbit, se-
cundum cubitum super panniculum carnosum ad carpum usque obliquo ductu def-
cendit [tab. 13. f. 1. Δ supra 44.] Tertius ⁿ inferior [tab. 13. f. 1. ε] qui venae Basilicae ra-
mo interiori, cum oblique magis progrediarur, attenuatus, in cubiti regione in ramos
duos scinditur [tab. 13. f. 1. Π Σ] tandem carpum superans in manus internae cutim sur-
culos distribuit: & ab his aliquando soboles ad pollicis sedem externam, furculis ra-
mi posterioris commixti, pertingunt.

Ffff 2

Ter-

minit: ab hoc mitti nervos ad musculos humero famulantes, digitos quinque flectentes, musculum radii quadratum &
ubi sub ligamento transit musculus pollicis & qui à quinti musculi tendinibus oriuntur & ad partem illorum qui à
postbrachiali exoriuntur: tum in vola manus ut plurimum in nervos quinque, quandoque in septem secari: quorum
duo per pollicis latera, duo ad indicem, quintus per medium digitum parte interna: at in quibus septem sunt, sextus per
externam regionem medii, septimus per internam auricularis iter habere interim ab his ad cutim furculus pullulare,
Columb. h. Unde nemo hunc ramum altero pari vere ascribet, cum non uno sed pluribus nervorum paribus textus ille
constituatur, Vesal. i. Si ve tertius secundo propaginem impertiat, si ve à secundo quod verius duco, ad tertium pro-
pago pertineat, si ve etiam nullus secundi cum tertio congressus fiat, secundus perpetuo deorsum contendit, &c. Vesal.
kin duos crassitie impares ramos secatur superiorem & humiliorem, hic in elatiorem & humiliorem, Vesal. in duos sa-
sat ramos, Laur. l. superior & gracilior, Ves. m. humilior & crassior, Ves. n. rami humilioris propago humilior,
Ves. o. Gal. 3. ad. an. ab hac propago diffunditur, arteria adhaerescens, cuius pulsum tangimus, at Ves. non agnoscit, quia
hac arteria profunde incedit, nervi huius propagines per cubiti superficiem: dein, quia illa arteria, nervum (qui prae-
cipua tertii nervi portio est) alium adhaerescens (44.) habeat.

^c In majoribus
vasis & nervis
neque nume-
rus, neque situs
neque magni-
tudo exaequan-
tibus, & ad an. 3.
f. Primum par
nervum mit-
tit ad muscu-
lum 1. thoracis,
alii ad 2. scapu-
la, alii ad 1. &
2. cubitum fle-
xentem, inde
sub bicipite
transit, & post
cubiti flexu-
ram vena com-
muni associa-
tur & una ad
extremam ma-
nium deducitur
variis ramulis
ad cutim mis-
sis: Col.

^g Columbus
subsecundo pa-
ri recensuit, id
quod pro secun-
do & tertio enu-
meramus, qua-
re conjunctionis
secundi cum
tertio & cum
quinto non me-

Tertius [tab. 13. f. 2. r.] per cubiti sedem anteriorem & inferiorem fertur & sub bi-
cipiti in humero secundi P nervi ramo [tab. 13. f. 1. v.] adauctus, mox divisus ramu-
los duos cuti brachii parte anteriore largitur [tab. 13. f. 1. v. inter r. & x.] mox ubi ad cu-
biti flexuram pervenit, cum quinto pari miscetur [tab. 13. f. 1. ch. 43.] & ad musculos ab
humero tuberculo interno enatos, ramulos mittit: hinc ramum insignem oblique ra-
dio exportigit [tab. 13. f. 1. ch. 44.] qui comite vena & arteria ad manus sedem inter-
nam tripartitus fertur, furculis duobus pollici, duobus indici & unum medio elatio-
re latere communicans: quando vero medius à quinto nervo furculum non recipit,
tum medio duos & interdum annulari unum tribuit.

Quartus 9 [tab. 13. f. 1. 2. p.] qui omnium qui in brachium feruntur crassissimus est,
& à nervorum plexu reticulari principium ducēs, per cubiti sedem posteriorem, ejus-
que partem superiorem humeri tuberculo externo insidens & cum vena profunda &
arteria axillari progrediens, ad brachii partem anteriorem & posteriorem se infle-
ctens, musculis cubitum extendentibus [tab. 13. f. 2. v.] & cuti ad ejus articulum ra-
mos duos distribuit, alterum ad partem posteriorem, alterum ad anteriorem [tab. 13.
f. 2. o. & ch. 32.] Tandem juxta cubiti articulum ad humeri tuberculum externum
[tab. 13. fig. 2. ch. 34.] modo in duos truncos scinditur, in profundum, ut & ipsorum ra-
dix reconditos [ch. 35. 37.] modo in tres ramos dividitur [ch. 33. 35. & 37.] quorum
exterior [tab. 13. f. 2. ch. 33.] per cubiti sedem externam eam ramulis implicans; obli-
que ad carpum descendit, à quibus cutis cubiti sedem externam obtegens intertexti-
tur. Alter vero elatior [tab. 13. f. 2. ch. 35.] secundum radii longitudinem ad manus par-
tem externam delatus [tab. 13. f. 2. ch. 36.] furculis duobus in pollicem, duobus in in-
dicem, & uno in medium absumitur. Tertius [37.] secundum ulnæ longitudinem
descendens, musculis digitos extendentibus furculos imperit [ch. 38. 39. 40. 41.] &
in carpi partem anteriorem ad ejus radicem [ch. 42.] furculis aliquot articulum carpi
cum cubito implicans, absumitur.

Quintus [tab. 13. f. 1. 2. *] à dicto plexu principium obtinens, quartoque atten-
sus, inter musculos cubitum extendentes & flectentes, nullis furculis radio distribu-
tis, delatus, per cubiti sedem posteriorem & inferiorem, ubi ad humeri tuberculi si-
num internum pervenit (hic aliquando impingentes vel nervum comprimentes, stu-
porem in digitis perfertimus) ad cubiti anteriorem sedem non nihil reflectitur, &
musculis ab humeri tuberculo interno & ab ipsa ulna radioque enatis, qui à nervo
tertio furculos non acceperunt, soboles largitur, [tab. 13. f. 1. ch. 43.] tum progrediens
ramo insigni, vena & arteria comitatus, ulnæ attenditur & in cubiti medio in ramos
duos dividitur [tab. 13. f. 1. ch. 45. & 46.] quorum alter internus [45.] per ulnæ sedem
inter-

nuntur, majus existit &c. Columb. 1. Tertium par nervorum qui manui additi sunt, &c. furculos per primum mu-
sculum à quo fit latitudo distribuit &c. ad dimidium cubiti in duos ramos in aequales scinditur, alter major qui intro-
um, alter minor qui extrorsum fertur, ab interno furculi ad musculos palmarem, minimum digitum abducentem, ad
eos qui à quinti musculi tendinibus oriuntur, ad eos qui ossibus postbrachialis adherent: dein in tres nervos dissectur,
nonnunquam in quinque, qui per latera auricularis deferuntur, in quibusdam in medio digiti medii sistit, mittit ad
cutim & ad volam ipsam, quare pars interna manus, adeo acuto & exquisito sensu tactus prædita est. Minor ramus
supra brachiale reflectitur, in tres ramos scinditur & nonnunquam in quinque per superiora postbrachialis, & per late-
ra auricularis & annularis & medii digiti medietatem, ad quorum extremum deferuntur, Columb.

internam, inter musculos digitos flectentes deductus, vena & arteria comitatus ad carpum ducitur, & per transversum carpi ligamentum ad volam tendit, furculos duos minimo, duos medio & unum medico sede interna largitur. Alter externus [46.] ad ulnæ medium, ab externo ipsius latere, inter musculos carpum flectentem & extendentem propaginem educit, quæ secundum ulnam in cubiti sedem externam porrigitur, & ad carpum sede externa minimo duos, medico duos & medio unum imperit. Verum interni, externis majores sunt, cum externa internis facilius lædi possint. Nonnunquam tamen ab hoc furculi in manus sedem internam non distribuuntur: aliquando etiam à tertio nervo, externum latus interioris sedis medii digiti, & internum latus annularis, furculos acquirit, quinto, duas tantum propagines, minimi digiti & unam annularis internæ sedi, porrigente.

^f *Veteres Græcos & Romanos annulum in digito sinistro manus qui minimo proximis est habuisse, accepimus: causam hujus rei Appon. in libris Ægyptiacis hanc dicit, quod apertis humanis corporibus*

^t Sextus [tab. 13. f. 1. 2. 8.] qui crassitie secundo ubi cubitum accedit respondet, per humeri & cubiti internam & inferiorem sedem ad manum usque perrepat [tab. 13. f. 1. ch. 47.] & juxta humeri tuberculum internum, furculos frequentes hinc inde in cubiti cutim distribuit [tab. 13. f. 1. ch. 48.] qui venæ Basilicæ ramis nunc subjiciuntur, nunc vero incumbunt, ejusque finis non procul à carpi cum cubito connexu existit [tab. 13. f. 1. ch. 47.]

Verum notandum cum quarto, quinto & sexto brachii manusve nervo, sæpe ^u ramulos à quinto pari nervorum capitis prodeunt (quemadmodum superius monuimus) misceri.

^b *reptus sit nervus quidam tenuissimus ab eo uno digito ad cor hominis pergere. &c. Gellius lib. 9. cap. 10.*
^t Quintum par nervorum tenuem admodum & cutaneum venam Basilicam comitatur & ad extremam manum defluit, &c. Columb.
^u non potui observare, nec verum puto quinque conjugationem comitari sextum par nervorum, & ad extremum pedem pervenire, ut refert Bauhinus.

De Ossibus Humeri & cubiti, sive radii & ulnæ.

CAPUT XXVI.

De his Galenus lib. de ossib. à cap. 16. ad 20. item 1. & 2. de us. part.

Explicatis totius manus partibus tam continentibus quam contentis, musculis: nimirum & organis communibus, ossa enumeranda supersunt. Ossa totius manus triplicia sunt & quidem vel humeri, vel cubiti, vel manus extremæ.

^a Humeri os, quod ^b *ῥαδιῶς* Græcis, unicum est [tab. 14. f. 1. & 2.] teres & inæquale, longum ac manus ossum. ^c maximum & scapulæ & cubito articulatam, utrinque ^a *De hoc Gal. de ossib. 16. & ad 2. us. part. 16. & 17.*

^b *Humerus Celsi, Columb. (qui brachium vocat eam partem, quæ ex humeri, radii & ulnæ ossibus constat) Plat. Humeri seu brachii os, Vesal. Fallop. Brachium, Laur.*
^c *Omnium totius corporis ossium femore excepto maximum, Galen. de oss. in homine tamen tibia & fibula os longius, Vesal. neque magnitudine, sacrum, neque latitudine, iliorum ossa, neque longitudine, tibiam superat, Columb.*

*An duo diri-
mitur capita,
Vesal.*

*e Caput appen-
dicis interius
latus constitu-
ens, Vesal. caput
humori supe-
rius globosa
appendice in-
structum, Picc.*

*f Caput appen-
dicis externum
latus constitu-
ens, Vesal. supra
caput rotun-
dum processus
duo eminent,
Columb. Plat.*

*g Caput inte-
rius ab exte-
rio- dividit, Ves.*

*h In capitis an-
teriore parte
scissura, caput
in duas portio-
nes dividens,
Laur.*

*i Fallop. obser-
vavit, appendice obscu-
ra in pueris do-
natur, Vesal.*

*appendice dona-
tur quicquid
sentiat, Gal &
Vesal. qui opina-
tus est appendi-
ce priva-
tum, Columb.
& Piccolb.*

*k Processus tres
superior, mi-
nor, inferior,
maior, medius,
prominentior, quod huic duo sinus, utrinque unus affligant, Piccolb. tria veluti capita inaequalia, ut distincta, qua tro-*

chlearum formam ideo effingunt, Col. caput humeri inferius nevisquam globosum sed in tres processus inaequales ex-

asperatum.
l Externum humeri tuber, Plat. m Interius humeri tuber, Vesal. Gal. de oss. 6. externo grandius esse scribit: ut Vesal. ex-

ternum multo majus interiore: Columb. caput externum majus, internum prosuberantius at processus duo ad utrumque

latus, quorum interius longe major est. n Pro tertia appendice à curioso Anatomico addi posset, Fall. obs. processus ter-

tius & medius, Piccol. o De brachii cavitatibus ad ulnam, 2. us. part. 15.

ad extremitates articuli causa protuberans: nam parte superiore, qua scapulae sinui inferitur & per eam diarthroses speciem, quae arthrodia, dicitur, in articulator, appendice^d donatur, [fig. 1. ABFH] quae humeri dictum caput^e sive *exgipus* constituit, quod in eminentiore loco, sedeque interna positum est amplum & orbiculatū, cartilagineque incrustatum [fig. 1. 2. ABC] quod ad omnes brachii motus in scapulae cavitate, quae cartilagine quoque multa amplificatur, circumverti potest. Ad huius externum latus^f processus duo collis modo prominent, asperi & inaequales, quo hinc ligamenta valida huius articuli educantur, quae humerum scapulae neunt: quorum alter parte anteriore [fig. 1. D] alter qui maior est parte posteriore [f. 1. & 2. E] situs est, & amborum portio maxima in appendice continetur.

Sinus duos^g obtinuit, alterum orbiculatum asperum ad capitis latus, ipsum à processibus distinguens [fig. 1. FG] cui ligamentum implantatur: alterum^h externum & oblongum, inter processus duos quos distinguit deorsum latus [fig. 1. HI] qui propter muscoli bicipitis cubitumⁱ & tendentis principium à scapulae acetabulo pronatum, exsculptus est, quo per sinum hunc, tanquam per trochleam feratur. Ima vero humeri pars, ad cubitum, ulnae & radio articulata quae in infantibus^j appendice adaugetur, at temporis successu ossibus ita unitur, ut appendicis vestigium nullum conspicitur, lata est, & admodum varia, partim protuberans, partim excavata existit.

Processus enim duos^k insignes utrinque, ad orbitae latera unum obtinuit, eo quod ossibus duobus articulari debuerit: quorum exterior [P] crassior in caput definit, cartilagine incrustatum, quod radii sinum superiorem subit, anterieus locatur, & rotundum est, quo radius in primum supinumque agatur: hic ad latus externum insigniter^l protuberat, quo hinc muscoli aliquot originem ducant [fig. 1. sub Q] & in lineam inaequalem definit: inter caput & tuber, posterius sinus est [fig. 2. R] qui nervi quarti manum petentis gratia sculptus est. At processus^m interior [S] qui in viventibus tactu facile deprehenditur, & introrsum admodum prominere, musculorum educendorum nomine, & incrustatus est: sinus duos juxta orbitae latus habet, unum [fig. 1. T] in anteriore sede leviter exsculptum, ut nervum tertium, qui manum petit, deducat; alterum in posteriore sede [fig. 2. V] per quem nervus quintus vehitur. Orbitaⁿ vera inter hos duos sinus conspicitur, quae & trochlea dicitur, cui ulna per *Ginglymum* articulatur, & motu recto duntaxat movetur: haec cum in medio sinum habeat [K] & utrinque tubera [LM] trochleae rotulam, ad quam funes volvantur, refert, quare humeri rotula dicitur [KLM] & sane pars cavitatis, quae trochleam imitatur, etiam primo appendix fuit, quemadmodum etiam duos processus cartilago intercessit, quae post annum septimum offescit, quae etiam ejusdem cavitatis partem & supercilium exterius perficit. In orbitae sede superiori sinus duo^o excavati sunt, quos *Saduldas* Hippocrates nominavit, qui squamam duntaxat distinguuntur: quorum alter partem anteriorem [f. 1.

[f. i. N.] alter amplior & profundior [f. x. O.] parte posteriore, qui termini sunt ad quos
ulnam moveri oportuit; est præterea hoc os per longitudinem & mediam teres [f. i. b.]
in lateribus nonnihil compressum [fig. 1. a. c.] posterius magis depressum, compres-
sionem obtinens [fig. 2. Y.] ad quam nervus quartus brachii deorsum repit: antèr-
ius vero asperitas duplex; altera [fig. 1. 2. e.] propter musculorum brachium moventium, va-
liorem implantationem & brachii exortum in senibus asperitas tanta est, ut hinc
processus quidam enasci videatur, cui deltois musculus inseritur. Asperitas vero alte-
ra [fig. 1. f.] est, cui bicipitis carnosâ pars connascitur. Foramina habet parva juxta ca-
pitum & sinuum supercilia, quo ligamenta aut educantur, aut implantentur & circa
ossis medium, parte interna, foramen habet manifestissimum deorsum vergens & in
ossis substantiam penetrans, per quod vena insignis, in ossis cavitatem sese insinuat, ut
medullam, quæ osse dissecto cruenta apparet, nutriat: est enim humeri os interius si-
nu amplexo excavatum, quo & medullam suam alimentum cõtineat, & os levius sit.

Cubitus cujus cum humeri osse articulationem, ligamentum membranosum &
nervum comprehendit & constringit, altera manus pars est, quæ inter humerum &
carpum, cum quibus utrinque articulatur, posita est: & ossibus duobus sibi invicem
incumbentibus, & ligamento membraneo commissis, constat, quæ longa sunt, sed
humero breviora & appendicibus utrinque donata. Horum inferius [fig. 3. 4. AB. 5. 6.]
& majus totius nomine sæpe donatur, & cubitus πῦξ, ulna, barbaris focile majus, di-
citur; hoc sinui [fig. 2. KLM.] in humeri rotula existente per ginglymum articulatur,
quo per eam articulationem flexio & extensio fiat.

Processus habet parte superiore duos insignes oblongos, & quasi triangulares, an-
gulis obtusis donatos, qui in fœtu una cum cavitate media quæ sigmoides dicitur, car-
tilaginei sunt, ita tamen ut anterior processus una cum cavitate citissime ossæ red-
dantur, & appendicis vestigium obliteretur: posterior vero post septimum annum
indurari incipit, & ossi reliquo agglutinati. Horum alter anterior & superior [fig. 3. 5.]
13. c.] humeri sinum [fig. 1. N.] subit & parte interiore cartilagine incrustatur: alter po-
sterior [O.] crassior & amplior (quem Hippocrates ἀγκύων, Galenus ἀλὲξ ἐγών, La-
tini gibberum vocant) humeri sinum posteriorem subintrat [fig. 2. O.] utriusque vero
processus aspera sedes est [fig. 13. CD.] quo ligamenta articulum valide ambiant, & perfectum effor-
musculi aliquot cubiti inferantur, & digitos flectentes inde prodeant, cujus nomine
juxta processus radicem etiam exasperatur [fig. 5. & 13. L.] sic & sinus circumferentia
aspera est [fig. 13. IK.] quo ligamenta inde prodeant. Nam in horum processuum
medio sinus magnus est [fig. 3. 5. E. inter CD.] humeri rotulam excipiens, qui in semi-
circuli speciem excavatur & processibus hisce protuberantibus conclusus, formam
Sigma Græcorum C refert, quare σιγμαειδὴς Galeno dicitur, & cartilagine quo-
que incrustatur; at quo humeri rotulæ ad amissum congruat, in medio obtuse
protuberat [fig. 13. inter FF.] ad latera utrinque comprimitur [fig. 13. GG.]
III.] ita ut funi ad rotulam convoluto conferri possit, quo in hoc cubitus fle-
atur cula donant,

ego totam illam
partem superiorem cubiti, cartilagineam esse observavi, dum oritur fœtus, Fall. C. Obtuso potius quam acuto angulo,
tamen si Galenus acutos eos accipiens coronas appellavit. Col. in acutum vergentes ἀγκύων, id est, rostra vel glandes vo-
cantur, Lat. Sic & Fall. obs. & Col. & Atheniensis ἀλὲξ ἐγών: Dorei ἀνέξωρ. Galenus modo ἀλὲξ ἐγών modo ἀγκύων
vocat, quæ non a habet interpretibus confunduntur, aliquando cubiti reddentes, aliquando ulnam, modo articulum hu-
meri cum radio & ulna & ejusdem articuli flexum.

Etatur & extendatur: & ab hac linea protuberante, prohibetur, ne ulna huc illucve dilabatur: hinc mutui utriusque partis ossium ingressus exoritur, quæ articulario Ginglymos dicitur. Alius adhuc sinus ad externum ipsius latus, levis & cartilagine incrustatus [f. 5. & 13. l.] qui radii caput excipit [f. 7. 8. 11. m.]

Hinc ulna descendens sensim gracilescit [fig. 3. 4. ab A versus B] & ad carpum ceruice tenui augetur [fig. 3. 4. 5. 6. 12. P] & appendice rotunda seu capitulo obruto, & ad interiora ducto [iisdem fig. Q] donatur, ad quod radius in pronum supinumque aliquotusque ducitur: definit autem in processum acutum [iisdem fig. R] ^{συλκοειδὴν} à styli scriptorii similitudine dictum, à quo ligamentum pronascitur, & articulum carpi cum ulna firmat. Huius etiam appendicis basi sinus alius inæqualis insculptus [fig. 12. S.] qui ulnæ appendicem à carpo distinguit, cui etiam cartilago jungitur, quæ articulo huic interponitur [fig. 3. 4. 7. 8. 9. 10. T] alius vero sinus oblongus latere externo inter utramque protuberantiam insculptus est [f. 4. 6. 12. V.] quo tendinem musculi primi carpi extendentis dirigit.

Est præterea ulna, qua cubito innititur, aliquo usque gibba [f. 6. XYZ.] lineæ etiam quaternæ per ulnæ longitudinem extuberant, idque propter musculos carpi, prima quidem [fig. 4. & 6. à 2. per a, & f. 1. aa] secunda, quæ ad carpum magis protuberat [f. 3. 5. bb*] ad musculi quadrati exortum: tertia quæ acutissima & asperissima [f. 3. 4. 5. cc] quo ab ea ligamentum radium ulnæ membranæ instar connectens pronascitur: quarta obtusa & modice prominens [f. 4. & 6. gg] à qua musculi tres principium ducunt. Usus ulnæ, ut manus citra periculum extrorsum moveri, & summa facilitate in adversum redire possit.

Alterum cubiti os, quod superius & brevius, & totam fere exteriorem cubiti partem occupat [f. 7. & 8.] ^{νεκρὸς} radius, barbaris facile minus: hoc respectu ulnæ obliquum est, eique supra infraque committitur, [f. 3. hi] duo enim hæcce ossi inter se ad extrema connectuntur, articulo prorsus differentes, siquidem superne ulna radium excipit, inferne vero, ulna à radio excipitur, crassitie immutata: quippe radius ad ulnam latior est, ut carpi partem maiorem excipiens, illum commodius in obliquum flectat: ulna vero ad humerum latior est, quoniam istud os solum, cum humero sive brachio articulatur.

At in medio inter se magno satis intervallo dehiscunt, [fig. 3. kk] partim quod radius prompte in supinum pronumque agatur, qui motus detractis musculis, si radius versetur ac revolvatur conspicitur: partim ut radius in motu semicirculari liberius moveatur: partim quo locus amplior sit musculis cubitum extendentibus. y Hoc ex obliqua tenuique cervice [f. 7. 8. 11. M] capitulo orbiculato depresso [f. 7. 8. 11. N.] cartilagine ad motionis agilitatem obducto, humero per diarthrosin articulatur: verum ubi humerum spectat, finem rotundum, sed superficialium [f. 11. O] obtinuit, quem humeri caput [f. 1. P.] subintrat, ad quod radius ulna quiescente in pronum supinumque agitur. Processum sive tuberculum paulo supra cervicem habet, asperum & abruptum [f. 3. 4. 7. 8. 11. q.] cui tendo musculi anterioris cubitum flectentis inferitur. Sic per ipsius longitudinem linea acuta & extuberans [fig. 3. 4. 7. 8. rr] fertur cui liga-

notavit, quam Dalechampius observavit, ut in suis in Æginetam com. testatur. y Radius duo capita habet disparia admodum, superius minus & rotundius, cervice efformatum sua appendice rotundo minutum, Col. Piccolb.

ligamentum ulnam & radium conjungens neſtitur, de quo ſupra cap. 22. ad lineam vero utrinque os compreſſum eſt [fig. 3. 7 ſſ. & f. 4. 8. 11] quo muſculis cedat, & ipſum os juxta longitudinis ſuæ medium aſperum eſt [fig. 4. 7. 8. 11] quo radii muſculi duo inferantur. ² Radius infra ad carpum dilatatur, ſinus cauſa craſſeſcit propter carpi ^a cum cubito articulationem & appendice donatur [fig. 3. 7. n] cui ſinus geminus cartilagine inſtruſtus [f. 9. 0] inſculpitur, ut in hoc ulnæ appendicis capitulum [f. 5. 12. p] cartilagine etiam obduſtum, moveatur. Sinus hic geminus eſt [f. 3. 10. xy] cum carpi oſſa duo primum & ſecundum inarticulantur [f. 15. f. 1. 2. 4. 5. ch. 1. 2.] & ubi hæc duo committuntur in medio modice protuberat [f. 3. & 10. z] qui tamen ſinus proceſſum quoque habet [f. 3. 7. 9. 10. x.] Præterea appendicis radii pars externa, quemadmodum & carpi gibba eſt, cui ſinus quatuor inſculpti ſunt [f. 4. y d e z n] quo tendines muſculorum manum petentes, certius per annulos deferantur: quorum quartus [v] leviſſime exſculptus; aſper tamen, quo ligamentum tranſverſum educat, & extuberans, quo tendo muſculi longiſſimi radii ſupinantis inſigatur: eſt & alius ſinus ibidem radio & ulnæ communis [fig. 4. 9] pro tendine muſculi parvum digitum extendentis: utrumque os ſubſtantiæ ſolidæ & duræ eſt, appendicibus exceptis & exiguis foraminulis ſparſis, & cavitare medullam continente donatur, hæc quoque contrario modo ſe habent, ſi ſuperiores inferioresque partes perpendas: ulnæ enim pars ſuperior craſſior, inferior tenuior: contra radii ſuperior tenuior, inferior craſſior exiſtit. Uſus denique radii ut manus ^a in primum & ſupinum agi & in orbem ſumma agilitate duci poſſit.

^a Inferior pars radii capite eſt majore, Col. latum magis quā rotundum, Piccolb.

^a Per epiphyſin cum carpi oſſe maximum digitum reſpiciente connectitur, Laur.

^a Manum ſuſum, deorſum & ad latera

cieri poſſit, tum præcipue ut immoto cubito ſumma agilitate in orbem circumque ducatur, Piccolb.

De Oſſibus manus extremæ, ſive Carpi, Metacarpi, & digitorum.

CAPUT XXVII.

Vide Gal. lib. de oſſ. 18. at cur carpus ex octo oſſibus, Metacarpium vero ex quatuor factum ſit, & de eorum magnitudine figura, duritie & poſitione, vide 2. uſu part. 8. de horum oſſium cauſa, cap. 10. de articulatione, cap. 11.

Manus extremæ oſſa ſuccedunt, quæ quadruplicia ſunt carpi ſeu brachialis, metacarpii ſeu poſtbrachialis, digitorum & ſeſamina.

Brachiale ^a ſeu *καρπός* ea manus pars eſt, quæ cubito & poſtbrachiali articulatur, & oſſibus octo, ^b duplici ordine diſtinctis, quo manus magis expedite moveri poſſit, conſtruitur [tab. 15. fig. 3. chart. 5. 6.] quæ magnitudine, forma, ſitu & conſiſtentia variant, nam in prima generatione cartilagine ſunt non oſſa, quæ poſtea oſſea fiunt, ita ut in adultis ſint, ſubſtantiæ ſunt ſpongioſa, uti reliqua omnia, quæ ex cartilaginibus in oſſa tranſeunt, ut ſunt appendices, pectoris oſſa & alia: medulla modica ^c ple-tilaginea ſunt, na Fall. obſ.

Gggg

^b Veſ. Col. Plat. Laur. ex ſeptem oſſibus conſtat, quoniam autem primum geminum putatur, idcirco octo ſtatuantur, Piccolb. carpi oſſa octo ſunt, rariſſimum eſt in carpo novem oſſa reperiri, Riol.

^c Non prorsus medulla experta, ut quibusdam viſum, Veſal. quamvis exigua ſint & dura, non tamen ſolida prorsus exiſtunt, Columb.

na sunt; quæ ligamentis cartilagineis & validissimis obducuntur & simul (superiora tamen magis quam inferiora) ita constringuntur, ut nisi hæc quemadmodum & membranas quis resecuerit, d unum esse videatur: duas superficies efformant, alteram exterioriorem gibbam [fig. 4.] alteram interiorem sinuatam & concavam [fig. 3.] & superius ubi cubito & inferius metacarpo e committuntur, lævia sunt & cartilagine incrustata & ubi se invicem contingunt, finibus & capitulis cartilagine lubrica in crustatis donantur: & horum inter se articulatio, ad eam quam Galenus neutram & dubiam prorsus credidat appellavit, referenda videtur: ratione enim compositionis, diarthrosis; ratione obsecuro, motus, synarthrosis dici potest. Horum quatuor * in carpi superiore ordine cubiti spectante [tab. 11. f. 1. 2. 3. 4. chart. 1. 2. 3. 4.] alii quatuor parte inferiore [ch. 5. 6. 7. 8.] repositi sunt, quæ cum propriis nominibus careant, solo numero & ordine dignoscuntur: primum vocantes, quod ordinis superioris latus internum constituit, quod oblongum est versus interiora curvatum, & radio una cum secundo posterioris articulatur, & capitulo secundi ossis sinum latere interio e subit, quemadmodum & altero capitulo maiore & inferiore, sinum à quinto & sexto osse formatum, antèius ingreditur: sinum quoque insignem habet, quo cum secundo osse, caput ossis septimi interius admittit.

Secundum prædicto, cui adjacet minus est, sinui radii appendici in sculpto posteriorius reponitur [tab. 14. f. 3. 10. xy.] cum primo parte anteriore & inferiore, eam septimo jungitur, at parte posteriore, cum tertio superficie plana necitur.

Tertium ulnæ ejusque cartilagini [tab. 14. f. 3. 4. 7. 8. T] dein secundo & quarto planis superficiebus jungitur, & inferiore latere capitulo amplo sinum ossis octavi subit.

Quartum os quod rectum f dicitur, & omnium minimum & fere rotundum cum cæteris minus vel cavetur, vel protuberet, hoc capitulo depresso ossis tertii lateri externo committitur: & octavi ossis processui nonnihil inferi videtur, reliqua serie nulli ossi contiguum: at huic superius tendo musculi carpi flexantis inferitur, quemadmodum inferius musculi duo, minimi digiti educuntur.

Quin-

id obscurus censetur ac sensus nostros omnino latet, quare brachialis ossa cum radio per diarthrosin, secum in vicem per synarthrosin, cum postbrachialis ossibus, partim per synarthrosin, partim per diarthrosin, sunt conjuncta. Col. primus ordo ossium carpi cum radio & cubito ea diarthrosios specie, qua arthrodia dicitur, astringitur: at secundi ordinis cum primis ea synarthrosios specie, qua arthrodia, id est, levis articulationi nominatur, Piccolb. * primus ordo tribus ossibus, alter quatuor constat, octavum os superest extra ordinem & seriem, sed cum Sylvio ad primum ordinem referatur, cum ossi tertio primi ordinis insideat: & tria ossa primi ordinis in vicem juncta, cavitatem efformant, recipientem duo ossa secundi ordinis, qua juncta inter se caput constituunt: inde cognosces primam aciem cum secunda moveri, eamque articulationem esse arthrodialem, reliqua carpi ossa cum metacarpo articulata, nullum vel obscurum motum edunt. Riol. f. Veteres Anatomici rectum appellarunt, & cartilagineum, non quod molle & cartilagineum esse arbitrati sint, cum omnium brachialis ossium facile duriss & solidiss sit, sed quod coctum cartilagine obductum visatur, propter musculorum principia, tendinumque fines, qui post elixationem cartilaginis molliscula speciem referunt, quod Gal. 2. us. part. pro octavo recensuisse videtur, Vesal. Octavum & Galeno positum, ultimum est, quod osseum sit, id eo à veteribus, ut opinor, cartilagineum est vocatum, Fall. obs. quartum durissimum & pene solidum est, Columb. Huic ossi, quidam, Galeno imponentes, id quod ipse nunquam somniavit, ascribunt in sinu sinum quandam, cui ulna processus styloides aptatur: verum in sinu hoc non reperitur, neque Galenus sinum hunc unquam in d. fo. osse somniavit: verum tertio primi ordinis ossi assignat, ut plane in sinu reperitur, Fall. obs. Galenus asseruit, ossiculum id sinu quodam prædictum esse, in quem immitteretur processus ille styloides ab ulna capite productus, quod in humanis locum minime habet, in sinu per belle observatur, Columb.

Quintum quod exterius versus pollicem sinu suo superiore, posterius capitulum primi excipit: quemadmodum interius sinu, sexti capitulum suscipit, sinu vero inferiore [tab. 15. f. 3. 6. G.] oblongo [fig. 6. a. b.] interius & exterius magis exsculp- [fig. 6. c. d.] capitulum primi pollicis ossis [fig. 1. 1. A.] suscipit: quemadmodum etiam portionem ossis quinti metacarpi [fig. 3. 4. 6. e.] processum quoque interna sua sede educit [fig. 1. 3. 6. O.] quo tendinibus musculorum digitos flectentium via exhibeatur, & sic cum quarto osse hanc sedem cavam efficit.

Sextum sinu suo posterius, primum excipit, & capite exteriori quinti sinum subit, & capitulo interiore septimo plana pene superficie jungitur, & primum & metacarpi os, indici præpositum [3. 4. 6. H.] magna ex parte, secundum vero obscure [fig. 3. 4. 6. f.] excipit.

Septimum, quod in secundo hoc ordine maximum est (quemadmodum sextum minimum) & ob laxum connexum prompte luxatur, capite suo rotundo, sinum primi & secundi ossis communem subit, sicque primo & secundo jungitur, quemadmodum ab interno latere ipsi sexto, & ab externo capite depressio octavo, laxa admodum articulat, hoc cartilaginei ligamenti interventu ipsi octavo quoque committitur, denique & metacarpi ossi secundo hanc nequit.

Octavum, quod ipsi tertio & septimo cuncti modo interjicitur, ad sinistram latem capite depresso ossi tertio, quemadmodum ad dextram sinu suo depresso septimo committitur: antè vero lata superficie [fig. 3. 4. 6. K.] tertio metacarpi ossi jungitur, & sinu quodam [fig. 3. 4. 6. L.] quarti ossis metacarpi rotulam suscipit. Processum quoque in Carpi sede interna educit [fig. 1. 3. 6. N.] ab externo latere versus internum inclinans ad literam C modum exsculptum, ut manum cavam efficiat, tendines musculorum digitos flectentium recte contineat, & ex apice hujus, quemadmodum in quinti ossis processu ligamentum¹ transversum carpi nascitur, cui & ossiculum sesamoidum adnascitur [fig. 1. 2. M.]

Postbrachiale² ὑποκνημιον³ Græcis, quibusdam ima palma, pars est manus à carpo ad digitorum radicem, quæ ex ossibus quatuor, Palis quinque⁴ constituitur: hi enim pollicis os primum ad postbrachialis ossa (quod non ut reliquorum digitorum ossa, nudum occurrat, sed postbrachialium ossium ritu lateat) referunt [t. 15. f. 1. 2.] at Galenum imitantes, primum pollicis os à metacarpo separamus, siquidem per diarthrosin carpo committatur, idque cum motu manifesto, cum metacarpi ossa, quæ inter carpi & digitorum ossa locantur [ch. 1. II. III. & IV.] ossibus⁵ carpi per συνάφειαν⁶ absque

Gggg 2

motu,

reperit. palma, quibusdam postbrachialis & pecten, ubi Græcorum nonnulli σφαιρική, αἰεὶς, ac κλειστή: at Piccol. postbrachiale & polli-
tiores literas sequentibus: pars secunda infimaque palma manus. o Nonnulli hac voce manum universam, brachia-
li excepto, intellexere, Columb. p Gal. Vesal. Piccol. Laur. * Si Russo & Celso credimus: quibus Plinius l. 11. c. 43. fa-
vet, dum pollicis binos tantum articulos attribuit. q Aristoteli, Eudemo, Celso, Columb. Plat. & quod primum pollicis
os tota forma metacarpi ossibus respondeat, Vesal. imo hoc statim brachiali succedit, & non minus ei committitur, quam
reliqua postbrachialis ossa, Col. Postbrachialis potius asseribimus, cum una cum reliquis brachiali jungatur, palmam con-
stituatur, nec in cissa manus parte sicuti vero digiti existit, Plat.

r Postbrachialis ossa cum brachiali junguntur per eam synarthrosin speciem, quæ arthrodia dicitur, at cum digitorum pri-
mi ossibus per diarthrosin speciem, quæ arthrodia vocatur, Piccol. inferiore parte cum carpo per dubiam articulationem, supe-
riore cum digitis per ginglymum connectuntur, Laur. superiora duo (intelligit 1. & 2. hic enarratum) carpi ossibus per
ginglymum junguntur, hac vero ut & cetera digitis quinque inarticulantur ad manifestum motum præstandum, Plat.
f Gal. quod secundum Col. & Plat. tertium longissimum est, post hac vicina duo, Plat.

g Primi produ-
ctionem susti-
net, subinde ad

tertium vergit.

Columb. com-

mittitur ossi se-

cundo, nam ter-

tium vix attin-

git, Plat.

h Tertii &

quartum postbra-

chialis ossium

portionem ful-

cit, Columb. ossi

tertio, Plat.

i De hoc vide

2. M. p. 12.

k Quarto &

quinto postbra-

chialis ossi, Co-

lumb. Plat.

l Ligamentum

ex processu ossis

vo producit, ac in

latiuscu-

lam quinti ossis

portionem inse-

ritur, Columb.

m De his Gal.

lib. de oss. 19.

n Celso & aliis

Græcorum in-

motu, seu dubiam articulationem potius, ut digitorum ossibus per *Δέσμευσις* committantur, siquidem omnia metacarpii ossa, qua digitos respiciunt, in caput rotundum desinunt, quo subsequen- tium articulorum superficiem leviter excavatam subeant: at inter se committuntur tantum extremitatibus, versus carpi ossa, ubi ligamentis cartilagineis connectuntur [fig. 2. P.] quorum duo ubi digitorum articulis junguntur immobilia, duo vero medico & annulari digito subiecta, moveri videntur.

Hæc digitorum ossibus longiora sunt, quorum primum indici præpositum longissimum & crassissimum est, cætera vero sensim breviora & tenuiora fiunt: & externa facie nonnihil quam interna, latiora sunt. Ad extremitates crassescunt, & appendices supra infraque [fig. 2. P. Q.] adnatas habent, ex quibus ligamenta fluunt, quo ossa hæc, laxiore tamen nexu, utrinque jungantur: nam superiores carpi ossibus coarctantur, appendices vero ligamenti cartilaginei interventu colligantur: at inferiores quæ grandiores sunt ossibus coalescunt, & capite rotundo & oblongo antrorsum & retrorsum, & ad latera nonnihil deducto, cartilagine obducto, sinum digitorum ossis primi subintrant. Sunt aliquatenus terecia, tribus quasi lateribus donata, interioribus duobus in lineam desinentibus, quo musculis interosseis cedant [fig. 1.] exteriore una manum planam constituyente [fig. 2.]

Intervallum quoque hæc ossa intercedit [fig. 1. 2. R.] quo musculis interossis dictis locus sit, cuilibet enim intervallo duo reponuntur, & ne vola nimia musculorum horum mole impediatur, & minus idonea ad comprehendendum reddatur, & locus his sufficiat, ossa hæc interiora versus volam spectantia curvata apparent: quemadmodum ipsorum superficies exterior, gibba existit: ad secundum longitudinem angulosa & lineis extuberantibus musculorum ibi existentium gratia, donata.

Processum quoque primum os ubi carpo articulatur, obtinet [tab. 15. fig. 1. supra char. 6. & 7.] cui musculus carpi flexentium secundus inseritur: sic & quartum os latere externo protuberat [fig. 2. supra M.] quo musculus carpi tertius inseratur: & beneficio primi pollicis, quem alii metacarpii primum faciunt, & quarti ipsius metacarpii vola potissimum cava redditur, reliquis tribus ad cavitatem parum conferentibus. Tandem fistulosa quoque sunt, quo medullam continant: horumque usus est, palmam ad commodiorem apprehensionem firmare, quo ea quæ manu apprehensa sunt, firmitus retineantur.

Quintum minimo subiectum, isdem motus generibus, quibus pollex, sed minus manifestus movetur, Plat.

De Digitorum ossibus.

CAPUT XXVIII.

De numero, magnitudine & figura ossium digitorum egit Gal. i. us. part. 14. de articulatione mirabili i. us. part. 15. & eorum usu i. eiusdem 12.

Digiti qui manus tertiam partem constituunt, ossibus ^a quindecim constant: nam a Gal. Vesal. & pollicem triplici osse constare dicimus, cum primi pollicis ossis articulatione Piccolb. Laur. laxior sit, quam reliquorum metacarpi ossium, quare & motus ^b evidentior est: dein qui pollicis primum articulum a metacarpi ossibus brevius est, nec illis confine, situm con- qui pollicis pri- trarium motumque diversum obtinet. Idcirco singuli ex ossibus ternis seriatim ac pii ossibus non veluti in acie positis constant: quare Græci seriem totam *Φελαγίας* acies & *συντέλι* distinguunt: digitorum tamen nominibus exprimuntur, ut dicatur pollicis vel indicis primum, qui metacarpi ossa quinque secundum, vel tertium. Hic autem numerus ad facilitatem & varietatem motus re- faciunt & pol- quirebatur: quod si pluribus ^c constarent, extensionem perfectam & validam vitia- licis tantum rent; si paucioribus, tum digiti in tam varias figuras moveri non possent. duo.

Forma ipsorum externa (ultimis exceptis) gibba & curva est; interna vero plana b Licet ceteris & quodammodo lima, partim quia interna manu apprehendimus, partim quia ten- manifestius mo- dines plures ad partem internam, quam externam feruntur. Præterea in interna regione veatur, cum lineæ quædam utrinque per longitudinem ducuntur, ut indel ligamenta educantur, quod minimo tamen intrinsecus obtinent, qui ^d medullam continet. subijciatur, a- parte satis quo- que moveatur, non ob id à post- brachialis ossi- bus excludi de- bet, Plat.

Magnitudine variant, nam primum digiti cuiusque os, secundo grandius & crassi- c Consule Gal. tie & longitudine & latitudine [tab. 15 fig. 1. & 2.] sic secundum tertio majus est, di- 1. & 2. de us. part. qui hac quemadmo- gitis enim crassioribus, crassiora, longioribus item longiora ossa natura dedit; & licet dum & ma- horum magnitudo eadem non sit, æqualia tamen conspiciuntur, & ad rectam lineam num nobilita- digiti omnes perducuntur, cum ad corpus rotundum apprehendendum operam cō- tem & sublimi- ferant. Sunt quoque initio latiuscula, sensimque attenuantur, angustioraque fiunt. tatem ita cele- brat, ut omnes legentes & me- ganantur: at secundum eorum longitudinem crassitie pari non sunt, ne mole vel pon- dirantes in sum- dere incommodent, eorumque tubercula *κόνδυλοι* nodi dicuntur, quemadmodum in mam admira- tionem trahat. d Non sunt me- dulla prorsus Pri- expertia, ut Gal. i. us. part.

Appendices quoque ^e supra infraque primi & secundi internodi ossa habent, propter musculorum exortum & insertionem, tertii vero tantummodo supra; nam cum caput extremum alteri non articuletur, carni aut ungui jungatur, appendice non eguit: cartilaginibus quoque incrustantur, ut quovis momento prompta & lubrica articulatione fiat.

Gggg 3

Pri- Gal. i. us. part.

arbitratur, Ves. non sunt prorsus solida, ut Gal. placuit, Col. c Col. Fallop. observ. supra infraque appendicum fere modo nonnihil fungosa sunt, Vesal.

*Hoc cum quin-
to carpi osse per
arthrodiam
diarthroscos
speciem coarti-
culatur, quam
vis huiusmodi
articulatio pro
ratione ossium
quæ parva sunt
ad enarthrosin
referri possit,
Columb.
g Non vero ca-
piris forma oc-
cassione etiam
circumverti-
tur, Vesal. cir-
culariorem mo-
tum edit, quam
quam Vesalius
minime conce-
dat, Col.
h Gal. i. us. par.
omnes digito-
rum articulos
ad mutuum fe-
re ingressum
comparavit. Et
lib. de ossib. can-
dem articuli
speciem omni-
bus ossibus tri-
bus dum feri-
bit superioris ossis caput in subsequenti sinum ingredi, Vesal. Sic articulantur ut alia suscipiant tantum, aliam
suscipiant tum suscipiantur, quare Galeni sententia vera non est: nam prima ossa cum postbrachiali per enarthro-
sin, reliqua per ginglymon junguntur, Columb. prima digitorum ossa cum postbrachialis committuntur arthro-
dia ea, quæ species est diarthroscos, reliqua vero ginglymo qui diarthroscos species est, Piccolh. hac per ginglymon arti-
culantur, Laur.*

Primum pollicis os [tab. 15. fig. 1. 2. A] supra sinum oblongum habet, antè & posterius extuberat, quo carpi ossi quinti rotule jungatur, & manifestè movetur in rectum, extorsum, introrsum, versus volam, ad latera indicem versus, & ab eo propter oblongam rotulam remouetur, & in circulum: & quod si caput carpi ossis magis retrorsum producat, alterius in rectum flectitur, quemadmodum aliqui digitos retrorsum in manus dorsum reclinare possunt, infra vero caput habet, non tamen ad amussim rotundum, quo secundi ossis sinum subit.

Secundum pollicis os, quæ tertium spectat, in capitula duo oblonga [fig. 8. GH] anteriore sede utrinque extuberantia, mediante sinu oblongo [fig. 8. L.] dividi-

tur. Tertium os sinus duos obtinet [fig. 8. IK] tuberculo oblongo [M] distinctos, quo ossis secundi capitula excipiant: & tertii ossis tuberculum, secundi sinum subeat, sicque secundum à tertio excipitur & secundum tertium excipit, & sic ginglymos fit amboque ossa ita arctantur, ut tertium os extendi flectique solum possit. Simili ratione reliquorum digitorum articuli junguntur^h & capita duo sinusque duos obtinent. Verum digitorum quatuor articuli primi, unico capite & unico sinu absolvuntur, siquidem Metacarpii ossa singula in unum caput definant, quod in manus sedem internam magis spectat & majori intervallo cartilagine incrustatur: at sinus in digitorum quatuor primo osse orbicularis est, & supra caput illud, os primum flectitur, extenditur & in latera movetur. Ipsum quoque os tertiumⁱ in apicem nonnihil cartilaginosum protuberat & capitulum asperum [fig. 9. O] obtinet, quo tendo ipsam flectens inferatur: verum & tota sede interna asperum & inæquale est, & ad extremum non ut reliqua eminet, sed unguibus cedit.

Verum in eo interstitio, ubi pollex carpo jungitur, & sinus occurrit, Arabes ustionem adhibebant: & nunc aliqui luis Venereæ curationem pollicentur, aqua mercuriali huic parti adposita, quæ cutem exulcerando tam alte penetrat, ut pyralissimum sive frequentem salivationem causet: sunt qui in dentium dolore etiam huic parti verificatoria admoveant.

D9

*h Gal. i. us. par.
omnes digito-
rum articulos
ad mutuum fe-
re ingressum
comparavit. Et
lib. de ossib. can-
dem articuli
speciem omni-
bus ossibus tri-
bus dum feri-
bit superioris ossis caput in subsequenti sinum ingredi, Vesal. Sic articulantur ut alia suscipiant tantum, aliam
suscipiant tum suscipiantur, quare Galeni sententia vera non est: nam prima ossa cum postbrachiali per enarthro-
sin, reliqua per ginglymon junguntur, Columb. prima digitorum ossa cum postbrachialis committuntur arthro-
dia ea, quæ species est diarthroscos, reliqua vero ginglymo qui diarthroscos species est, Piccolh. hac per ginglymon arti-
culantur, Laur.*

à Tertia pyramidis formam referunt, Piccolhorn.

De Ossiculis^a Sesamoeideis.

CAPUT XXIX.

Galenus 2. us. part. 12. de his egit, & in fine lib. de ossib. horum tantum meminit.

Ossicula quæ sesamo^b semini comparantur & idcirco *σισαμοειδῆ* dicuntur [tab. 15. fig. 9.] in digitorum tam manuum quam pedum internodiis sita sunt, & maxima ex parte tendinibus innascuntur & sub iis latitant, quare in demonstratione tendinū musculorum circa illa ossa sitorum, considerandi veniunt: imo & ligamenti ita impl. xa, ut nisi ossib. repurgandis accurate caveris, ea cum ligamenti auferes. Hæc cartilaginibus incrustantur, & alterius ossis sedem lubricam contingunt: solida sunt, rotunda, aliquantulum depressa, aliquando cartilaginosa, aliquando ossea; intus fungosa sunt ac poris scatent, quo succum loco medullæ contineant.

Hæc in singulis manibus^c duodecim communiter sunt, unum articuli internodio tertio, ejusque medio præpositum: duo ad secundum^d pollicis [fig. 1. & 2. S.] duo minora & cartilaginea in primis digitorum quatuor internodiis [fig. 1. T.] tendinib. innixa, ut inque ad latera unum cum tendine duplici flectantur. In reliquis vero articulis, secundo nimirum & tertio digitorum quatuor ad singulos singula cum uno tantum tendine flectantur, medio ipsorum præposita, quæ multo minora [fig. 1. V.] & quasi cartilaginea sunt, & in manibus, quam pedibus majora sunt; verum in senibus & infigniora & quodammodo plana spectantur: in pueris vero adhuc cartilaginea sunt & in ossium, quia nonnulla ita parva sunt, ut in sectionibus non observentur.

^eOssiculum his adnumerare licet [fig. 1. 2. M.] quod subinde in manum juxta connexum ossis metacarpi, parvum digitum sustententis, ad carpi os octavum conspicitur, quod sedem hic vacuam opplet.

^fUusus horum quadruplex est: primus in moribus quibusdam, duritie sua ossis impetum sustinere & excipere, cui tendo tali ossiculo munitus prætenditur, nam in digitorum extensione, dum se in articuli spatium nonnihil inferunt, tendinem retinent, hæc ab articulo extuberante in motu decidat. Alter ne os cui præponitur^b Ossicula semina, Vesal. Columb. Piccolb. ossa sesamoeidea, inter-Plac. quod parva admodum facile ex articulo suo recedat & luxetur, impedire, & sic articulis propugnaculo esse: quare horum naturam patella in genu exprimere videtur. Tertius, ^g Inter-Plac. quod parva admodum

a Nonnum carpi
os numerare al-
iquis poterit,
sed non est nu-
meratum ab
Anatomicis,
sicut nec ali-
quod eorum

qua *σισαμοειδῆ*
(sesami legu-
minis minutæ
specie) vocan-
tur, quæ multo
manum & pe-
dum articulis
natura velut
auctarium cir-
cumponit, secu-
ritatis gratia;
hæc Gal. 2. us.
part. 12. & p. 13.
τῶν δυνάμεων
τῶν σισαμοειδῶν
καλεῖσθαι, hæc
Gal. de ossibus

Ossicula se-
mina cu-
jusmodi sint, &
quibus sedibus,
quotque nu-
mero in homi-
ne aut etiam si-
mia reponan-
tur, nominem
observasse, de-
scripsisse scio.
Vesal.

na, Vesal. Co-
lumb. Piccolb.
ossa sesamoei-
da, inter-
Plac. quod par-
va admodum

sint non forma tantum ratione veteres sesami semini compararunt, Columb. c In nonnullis 20. in aliis 15. in quibus-
dam 10. in aliis plus minusve, Columb. & Piccolb. In manu interna & externa deprehenduntur, sed in interna multo
plura, numerus tamen incertus, alii 12. alii 16. alii multo plura observarunt; In manu enim interna 19 sunt, in externa
pauciora sunt & minora & minus dura Laur.
d Feno graci seminis molem vix excedunt, Vesal. e Tum quia ita parva ut sensum effugientia in ipsis dissectionibus
disperdantur: tum quia ex inopia seminis nonnulla natura omittit, tanquam ad corpora fabricam minus necessaria,
Piccolb. f Ossiculum ex illorum numero quæ sesami seminis imagini assimilantur, Vesal. g Galenus dixit, securita-
tis gratia: quatuor usus posuere, Col. & Piccolb. quæ internis manus articulis insunt, hoc introluxari prohibent, dum
manum vehementius extendimus, quæ vero exterius locata sunt, ne in flexione extrema foras luxentur, impediunt,
Laur. h Hunc veriorum usum credo, quare in omnibus tam manus quam digitorum articulis se offerunt, Plac.

intervalla quæ inter digitorum ossa vacua remanent, ad articulationis robur replere. Quartus ut manus actionem, quæ apprehensio est, firmiorem & constantiorem reddant. Et hæc de totius manus ossibus sufficiant, de quibus plenius in nostra Osteologia & in commentariis nostris in libellum Galeni de ossibus.

Ungues tandem [tab. 15. fig. 10.] digitis extrinsecus apppositi sunt, ut eorum ⁱ apprehensiones firmant, quin nec breviores nec longiores quam digitorum summitatibus ^k conveniebat, quare ubi excrescunt abscindi solent, ac apprehensioni obstaculo sint, de quorum natura alibi acturi sumus.

ⁱ 1. us. part. 9.
sed de unguibus vide 1. us. part. 7. 8. 10.

^k 1. k Galenus l. c. ex Hippocratis sententia.

De Pedis præstantia, figura & compositione ac usu.

CAPUT XXX.

De pede Galenus toto lib. 3. de usu partium scripsit.

^a 3. us. part. 1.

Manus homo animalium solus habuit, veluti organa animali sapienti convenientia, lubet enim cum Galeno, ^a qui divinissime hæc tractavit, loqui: bipes vero ipse solus inter pedestria erectus factus, quia manus habuit: animalibus vero brutis, cum prona incedant, crura anteriora, posterioribus pene similia facta sunt, quod ipsis ad velocitatem confert: at homini anteriores artus manus factæ sunt. Nam si velocitate opus sit, equo uti potest, quem sapientia & manibus domare potest: quare multo melius fuit eum organa habere, ad omnes artes necessaria, quam ut iis ad velocitatem utatur. Nam quod de Centauris ^b Pindarus refert, qui præter crura quatuor etiam manus habebant, tanquam fabulosa & ad delectationem scripta, missa facimus: talis enim homo saltem velocitate in planis uti, neutiquam vero omnes locorum difficultates superare posset: neque manibus commode uteretur, anterioribus cruribus ad omnes actiones impediens; nec ad artem qualemcunque exercendam commodus esset. Nam si quod animal manibus recte usum est, nullum impedimentum in pectore prominens, nec innatum, nec acquisitum habere debet.

^b Cur homo talis fieri non potuerit vide 3. us. part. 1.

^c 3. us. part. 2.

opinari ob id recte stare hominem ut ad cælum prompte suspiciat & discere possit re-

Jam vero ^c solus animalium homo rectus est & stare potest, quia ipsi soli secundum rectitudinem crurum spina etiam recta linea extenditur, quare & reliquum corpus cum ipsa spina velut carina quædam est; & si pedibus firmetur, tunc exacte erectus stat; si vero spinam humi reclinauerit, supinus omnino fiet; reliquorum vero animalium

spicio ad versus olympum fronte intrepida, hominum est qui nunquam viderunt piscem degredientem: hic namque vel in vitis cælum semper aspiciat: homo autem nisi collum reflexerit, cælum nunquam viderit: hic vero reflexus non solum inest huic animali, sed nihilominus & asinis, ut omitam aves longum collum habentes, quibus non solum facile est sursum, si voluerint aspicere, sed quoque versus etiam circumferre prompte oculos. Quod vero ne Platonem qui dom intellexerint dicentem id non esse sursum aspicere, cum quis supinum seipsum reclinauerit oscitans, sed quando nifallor, mente naturam rerum considerat, turpissimum est, Gal. 3. us. par. 3.

malium alia magis, alia minus prona sunt, & alia medium locum inter prona exaete & plana recta, ut equus, bos, canis obtinent. Et licet aves bipedes sint, cum tamen haec crura cum spina recta linea non habeant, recte stare non dicuntur.

Sic & solus^d homo sedere potest, quadrupedum autem nullum, quia omnia posteriorum crurum flexionem antorsum habent: anteriora enim membra scapulis eorum, quemadmodum hominibus, posteriora vero coxis committuntur; flexiones vero amborum contra quam hominibus: his enim priorum quidem retrorsum, posteriorum vero antorsum sunt: at in quadrupedibus flexiones ad se invicem, conversas esse praestabat, contra in homine melius erat manus ad se converti, crura vero flexionem in genu retrorsum habere: hoc enim solo modo sedere pulchre licebat.

Ut autem homo vel rectus staret, vel sederet necessum fuit, quia his duabus figuris egent, qui manibus opificium exercere volunt, nam aut erecti aut sedentes manibus operantur, non vero proni aut supini. Quare natura hominem solum fabricata est, qui erectus stare vel sedere possit, cum illi soli manus dederit.

Quemadmodum vero manus^e apprehensionis instrumentum est, ut supra ostendimus, ita crus ambulationis est, nec id quidem simpliciter, & ut solum gressu animali conveniens, sed ut maxime sapienti animali conveniebat: quare crura duorum tantum obtinuit, quae ita constructa esse debuerunt, ut maxime animali bipedi ratione praedito commodum futurum erat. Quare ei pedes non rotundi & duri sicut equis, quod quidem ad velocitatem & pariendi difficultatem facit, sed oblongi, lati, molles & multifidi creati sunt; talis enim constructio ad omnes locorum difficultates, & si opus, ad muros sublimes, aut arbores conscendendos opportuna est: ad quod sane praestandum rotunditas incommoda fuisset. Licet enim humani molles sint, calceamenta tamen conficere potest, & priori contrito aliud novum conficere: si vero homo ungulas contritas haberet, calceamento affecto, illico claudicaret: imo ob pondus, velocitati obstitissent: imo homo saepe etiam nudis pedibus uti debuit, quare praestitit eos prorsus detectos esse. Verum non solum oblongos & molles esse satius fuit, sed etiam eam longitudinem & latitudinem habere, & parte infera non nihil cavi, superna vero parte gibbi esse debuerunt. Nam cum ambulandi instrumentum crus sit, & quidem ita compositum, ut animali sapienti maxime conveniebat, ostendamus paucis quomodo ambulatio conveniens fiat.

Ambulatio per firmationem & motum fit: altero quidem crure in terram firmato, altero autem circumlato, illud pedis, hoc totius corporis actio est, quod non solum in ambulanti bus sed etiam currentibus fit: sic loca mutare beneficio cruris quod movetur possumus. Quod vero non cadamus, pes in terram fixus efficit: ablato enim pede, licet crura habeamus, neutiquam tamen stare, nec sine baculo ambulare possumus, non quod crurum motus baculo juvetur, sed ad firmitatem facit, quam prius ex pedibus habebamus.

Ad firmam enim stationem & amplii & oblongi pedes requiruntur: nam quibus di-

H h h h

g Testimonium
eius rei locuplet
tulerunt nobis

duo rerum exempla, qua haud ita pridem casu quodam obtigerunt: pestis saeva in summos pedes grassata, & crudelitas praedonis circa Coracisum Pamphilia: pestilentia namque putrefaciebat, prado autem abscindebat extremos pedes ut sine baculo non possent ambulare qui in huiusmodi incidissent infortunium. Stare poterant duobus mutilis innixi pedibus, ambulare vero non poterant, quod totam molem corporis uni mutilato committere cogerentur, Gal. 3. us. part. 5.

giti à nive vel frigore mortificati ex ciderunt, hi nec stando, nec ambulando, nec currendo per plana & levia à sanis vincuntur; sed si locum difficilem & maxime præcipientem perambulare oportet, non solum à sanis facile superantur, sed omnino inutiles & præ illis impotentes. At quibus non solum digiti, sed etiam planta computruit, his incessus non solum in præcipientis sed etiam in planitie fallax est. Quod si & tarsus, pars ante plantam posita corrupta fuerit, non solum tuto ambulare non possunt, sed ne quidem firmiter stare. Quare ut homo firmiter stare, & in omnibus locis recte ambulare possit, variis de articulationibus in pedibus opus habuit.

Quemadmodum enim manus, quo corpora cuiuscunque figuræ comprehendere possent, & varios artienlos obtinere & intus cavæ factæ sunt: sic & pedes manus instar articulationibus variis donantur: cavi etiam sunt, quo loca convexa calcatur recte firmari possint, ad quod etiam multiplex divisio confert, digitis in rectis & obliquis & declivibus utentes. Probavit hoc Galenus exemplo eorum, qui oblongas & tenues scalas ascendunt, pedes enim concavitate lignorum convexitatem comprehendunt, & digitis ac calcaneo; quam maxime fieri potest basim rotundam efficit, quo manus instar corpus subiectum comprehendat. Ex his patet quomodo pedes, tum tæ firmitatis gratia, tum ad talem firmitatem, prælongi, molles & lati optimi sint; tum etiam quo omnia loca pervadere possint multifidi & in medio cavi facti sint.

h. 3. us. part. 6.

Jam vero licet^h multifidos & multorum articularum fecerit, non tamè omnia manibus similia habent, alias digitorum magnum aliis opposuisset. Verum sic firmitas perierisset, quare in uno ordine omnes constituit: in cæteris vero manus constructionem imitatus: nam quod *πυγός* vocatur, carpo simile, & metacarpo *μετακαρπ*, & digitis digitos admodum similes, quæ ex pluribus ossibus tum duris tum parvis composita sunt. At pars pedis ea cui crus totum secundum rectitudinem incumbit, ex tribus ossibus composita, astragalo seu talo, calcaneo & navi formi dicto, quibus ossibus in manu nulla pars respondet, cum solius basis instrumenta sint, aliæ vero & basis & apprehensionis simul.

i. 3. us. part. 7.

Pes ergo ut apprehensorium instrumentum, quædam manui similia sortitus est, quædam ut ambulatorium: ut apprehensionis instrumentum, ex multis & variis ossibus in vicem multifariam dearticulatis, & ligamentis membranosis connexis constitutus est: quare quemadmodum in manu digitos quinque, eodem articularum numero obtinuit, sed in eo discrepat quod pedis digiti una serie positi sunt & minores sint quam in manu, cui propter apprehensionem talis longitudo conveniebat, non vero pedibus cum ambulatorium potius sit, & quatenus apprehensorium tanta longitudo, quantam nunc habent satis est. At quia ambulando alterum crus moveretur, alterum vero in terra firmatum corporis molem sustinet, interior pedis sedes altior, exterior vero humilior facta est: altior inquam & cavus, tutioris ambulationis gratia, si-utrinque foret, tum pes versus cruris partem sublimem reperet & inclinaret & cum eo totum crus, sicque ambulantes facile cecidissent: hinc ii quibus altiores non sunt, succurrant, aliquando etiam ambulantes locis inæqualibus facile cadunt. Quo vero cava esset hæc pars, calcanei ossis pars anterior tenuior est & angustior & ad digitum minimum recedere videtur, in eundem usum & basis causa, etiam reliqua ossa, eo modo quo sunt & formata & articulata & ligamentis juncta fuere.^k

*k. 3. us. part. 7.
c. 8.*

At cum

At cum pes ambulationis instrumentum sit, ambulatio autem absque motu fieri non possit, Musculos obtinuit, qui facultatem motivam à cerebro per nervos recipiunt, & ipsorum actionem conservant. Venas, quæ sanguinem pro nutritione deferunt: Arterias, quæ vitali spiritu & calore perfundunt: denique cutim & adipem quæ partes prædictas investit conjungit. Quæ sane cutis sensus particeps esse debuit, quo prompte molesta sentiens animal moneat ut aufugiat, alias sepe contusa, vulnerata & multis modis ab iis quæ conculantur vitata fuisset: hæc quoque partibus subjectis exacte adhereret, ne ulquam prompte circumvertatur: cujus etiam gratia ad ipsam quoque tædinis, qui in calcaneo est, pars, ad totam diffeminatur. Est præterea mollis & dura moderate ab utroque excessu recedens, ne nimis prompta ad patiendum, neque nimis difficulter sensibilis sit. Denique pedum maxima est, cum manibus similitudo, ita ut visi sint quidam in manibus & brachiis carentes pedibus scribentes, pennas ad præstantes, in summa manuum functiones obeuntes.

Dividitur pes sive pars ea, quæ est à coxendicis articulo ad digitorum summos apices in partes similes & dissimiles. Dissimiles sunt, Femur *μυὸς*, pars ea quæ est à coxendicis articulo ad flexuram genu usque. Tibia *κνήμη*, seu pars à genu ad calcem, & parvus pes, *πῆξ*: quæ omnia vel pedis magni, vel cruris nomine donantur. At minor pes, in *πῆξι* *μετὰ τὴν πῆξιν*, & digitos subdividitur, quemadmodum plenius in lib. de partibus externis conscripto exposuimus. Similares sunt continentes & contentæ. Continentes quatuor communes, cuticula, cutis, pinguedo cum sua membrana & panniculus carnosus de quibus cōsule librum primū: propria dici posset musculorum mōbrana, quæ pedis musculos investit & separat. Contentæ vero sunt Musculi, organa communia & ossa. Musculi totius pedis sunt quinquaginta duo, femoris scilicet undecim, tibiæ decem, pedis octo, digitorum pedis viginti tres. Organa communia sunt venæ arteriæ, & nervi. Ossa in quolibet pede quadraginta duo, femoris unum, tibiæ duo cum rotula, pedis parvi triginta octo, utpote in tali septem, pedii quinque digitorum pedis quatuordecim, sesamina duodecim. His addere possumus sesamina duo in poplite & osseam partem in senibus ad os tessaræ: de his ordine, principio ad musculis tibiæ facto.

runi & metacarpio pedion à recentioribus medicis vocatur: digitos autem ipsos digitis admodum similes: hæc igitur tres partes pedis sunt, qualis & manus, digiti, tarsus & pedion.

*De cute pedis
eiusque sensu
& natura &
de tendine 3. usq.
part. II. & 12.*

*in Manibus infe-
riores idcirco
Piccolh. nomi-
nat. & refert
historiam puel-
le Roma anno
circiter 15. na-
ta quæ brachia
& manibus præ-
vata, pedibus
loco manuum
utbatur.*

*n Gal. 3. usq. par.
6. homines,
quod tarsus vo-
catur, carpo as-
simile habue-*

De Musculis à Tibiæ.

CAPUT XXXI.

De his egit Gal. lib. de diff. muscul. 32. 2. ad. an. 5. 3. usq. part. 16. & 15. eiusdem 8.

Cum femoris musculi priusquam tibiæ remoti sint, demonstrari nequeant, de tibiæ musculis primo agemus, sectionum serie ita expostulante. Est autem tibia pedis altera pars, quæ inter genu & parvum pedem existit, & ossibus duobus (quemadmodum seculi poplitei me-
mini Ves. Fallop. novem tibia statuunt, addunt tamen & eum qui in poplite est: Columb. decem quia popliteum addit: Piccolh. decem quos musc. progressivos, tibiarios, hoc est, tibiæ cientes vocat Laur. undecim, quia Vastum infernum, ses-
aliorum cōstruunt geminum facit, Plat. novem integram tibiæ moventes & unus qui per se tibiæ solum os movet.

*a. Musculi genu
de articulatione
nem moventes
novem sunt nō
decem, diff.
musc. 32. cruris
musculos no-
vem recenset 3.
usq. part. 16. ubi
tamen & de-
cimi parvi mu-
dum seculi poplitei me-*

H h h h 2

b Gal. 3. u.
part. tibiae ex-
tendi dixit, &
flexionem tri-
plicem enume-
rare videtur:
primo retror-
sum seu in po-
steriora sursum
versus exte-
riora 2. introrsum
sursu 3. recta &
in neutrum latius
inclinando. Ve-
salio tibia qui-
escente femur
rectissima fle-
xione & exten-
sione solum agi-
tur: si enim in-
latius ducatur,
femoris benefi-
cio fit; Colum-
bo, flectitur &
extenditur se-
cundum recti-
tudinem, mo-
vetur etiam
oblique versus
exteriora, licet
obscurus motus

hic sit, quare Vesalius deceptus, qui motum hunc obliquum pernegat: Plat. perficitur hic motus cum tibia rectissime la-
tum flectendo vel extendendo, etsi Columbus oblique nonnihil etiam moveri laxi articuli causa velit: Piccolh. tibiae
in omnes loci differentias voluntarie duci constat: Laur. flectitur, extenditur, adducitur, abducitur. c. Quinque Ves.
Columb. Fall. Plat. Piccolh. at Laur. quatuor qui postici dicuntur, quorum tres à tubere ischii nascuntur, interni duo
& unus exterior. Internorum prior semineruosus, alter gracilis dicitur: quartus duo habet capita, alterum à commis-
sura ossis pubis, alterum ab exteriori femoris parte enascitur. & unico tendine in posteriorem tibiae partem inseritur,
quem flectit & adducit intro: hac tota est descriptio. d. 1. Gal. 2. ad. an. Ves. Col. Fallop. Plat. Piccolh. 9. Gal. 3. u. part.
at Lar. sic adducunt tibiae intro flectentes simul duo musculi, longus & popliteus. Longus musculorum omnium lon-
gissimus ab ilii spina exortus oblique in tibiae internam & anticam descendit: hac ille. e. Vesal. Col. Piccol. gracili ac
carnoso, Fall. 1. Col. Piccolh.

g. Qui non latus sed ad amissim teres est, quidquid Gal. 2. ad. an. suis fidens simis asserat, Ves. hic vere teres non est, ut Ves.
autumat, sed lator Col. in tendine latiore degenerat, Picc. h. Tibia sursum ad femur allicitur Galeno: qui motus non solum
ab hoc musculo, sed femur moveri & tibiae musculorum auxilio una perficitur, Ves. Galenus hunc tibiae supra tibiae
deserre voluit, quod in homine falsum in simia verum esse deprehenditur. Col. tibia flectit seu in posteriora sursum adducit,
Vesal. Columb. Plat. Piccolh. (qui addit alius musculi in id concurrentibus) tibiae extendit, Fallop. infra adducit ri-
biam intro flectens, Laur. nonnulli Sutorius, quod more sutorum, alteram alteri imponat.

i. 2. Ves. Columb. Fallop. Plat. Piccolh. 5. Gal. 3. u. part. flectendum alter gracilis è tubere ischii enatus, Laur.

k. Vesal. Fallop. Plat. initium illius latus est, Columb. lato atque carnoso, Piccolh. 1. Exactum & teretem Vesal. pone-
teretem & rursus dilatum, Col. & Piccolh.

m. Hic Gal. 3. u. part. tibiae ad latus internum ducit: at 2. ad. an. huius auxilio tibia elatius & interius attollitur: at
Anatom. cetera flectit. n. Vesal. Plat. o. 3. Ves. Col. Fall. Plat. Piccolh. 6. Gal. 3. u. part. flectendum internus prior se-
minervosus, Laur.

dum & cubitus) tibia & fibula donatur & cum Femore per ginglymū jungitur. b. Mo-
vetur autem tibia vel per se, vel per accidens: per se motibus tribus, flectitur enim &
extenditur secundum rectitudinem, quamvis & oblique versus exteriora moveri vi-
deatur: flectunt quinque, extendunt quatuor, unus solus oblique movet: per acci-
dens, femoris ratione, tibia ad femoris motum vel in latus, vel in gyrum ducitur: de
flectentibus c. primo.

I. Tibia, seu longissimus flectentiumve primus [r. 16. & seq. fig. 1. 2. 4. 7. 8. a.] qui an-
terius statim sub cute occurrit, ab ossis ilii appendice interiore principio [f. 1. 3. 7. a.]
acuto c. nerveo carnosoque exortitur, mox carnosus redditus per femoris interiora
decussatim, fasciam f. praese ferens, gracilis aliis muscularibus instratus fertur, & juxta genu
angustior redditus [f. 1. 2. 7. 8. b.] in tendinem nervosum s. finit, qui in ossis tibiae li-
neam acutam parte anteriore & interiore sub genu inseritur [tab. 7. a. insertio 1. 2. 3.]
musc. tibiae ut tibiae h. (quemadmodum & subsequentes duo) flectat introsum, si-
mulque sursum elevet.

II. seu Gracilis, flectentiumve secundus [tab. 16. & seq. fig. 1. 2. 4. 5. 7. 9. b.] qui pra-
dicto quoad ventrem introrsum adjacet, & latus internum occupat, hic ad pubis ossis
commisuram, cui adnatus est, principio [fig. 2. de.] k. nerveo amploque, quanta fere
pubis ossis commissura est enatus: mox angustior, sed carnosior redditus per femoris
interiora ad genu usque carnosus delatus, ad femoris caput internum non procul à
genu ubi teres redditus, in tendinem l. exactum & teretem definit, quo nonnihil dila-
tato, in tibiae juxta primum paulo tamen interius inseritur, & m. ejusdem cum priori
usus. Hic in mulieribus n. obesius, quando femora diducunt, instar ligamenti cujusdam,
vel nervi rigidi apparet, cum in illis nervosior sit.

III. seu Semineruosus, flectentiumve o. tertius [tab. 16. & seq. fig. 2. 3. 4. 5. 6. 7.] & po-
sterio-

steriore sede locatus est, & à coxendicis & tuberculi elatiore sede [fig. 5. 6. f.] nervosus
 1 & gracilis oritur, & supra femoris medium carneus evadens, musculum teretem
 constituit, qui per femoris posteriora & interiora oblique nonnihil descendens, ad
 ipsius caput internum reflectitur, & attenuatur [fig. 5. g.] & tendine tereti in homi-
 ne, in simiis nonnunquam lato, in tibia anteriore¹ partem (ubi & prædicti duo)
 inseritur: ² verum huius tendo ad tibia medium usque descendit.

IV. seu Biceps, flexentiumve³ quatuor [tab. 16. & seq. fig. 1. 3. 4. 5. 6. 10. 13. d] ex co-
 xendicis ossis sede infima seu tuberculo, principio nerveo acuto, illoque graciliore
 [fig. 6. b] exoritur, mox carnosus redditus & per femoris posteriora exterioraque de-
 scendens, ad ipsius medium in sede interna (ubi nerveus apparet) carneam⁴ portio-
 nem [fig. 6. k] quasi novum musculum ex femoris medio (in homine non simiis)
 pronatum recipit, quo musculus hic validior efficiatur, cum in parte externa hic uni-
 cus musculus sit, at interius quatuor adsint. Quæ portio, musculo ubi tendinem pro-
 ducturus est, ita cõmiscetur ac si alius hic oriretur [fig. 6. k cum d] unde pro uno⁵ vel
 duobus numerari potest: (quamvis aliquando duplici exortu & sine distincto, ob-
 servatus fuerit) quæ simul descendit exteriorque nervosa, in tendinem insignem
 finiunt, qui in fibula ossis processum acutum implantatur [fig. 10. i] Huius quoque
 tendinis gratia, femoris caput externum sinum oblongum obtinuit, lævi & lubrico
 ligamento incrustatum, ⁶ quo tuto vehatur, neve hac oblique flexus à via aber-
 ret.

V. sive Semimembraneus, flexentiumve quintus [tab. 16. & seq. fig. 2. 3. 4. 5. 6. 13. e] qui per femoris posteriora fertur: à coxendicis ossis tuberculo seu appendice [fig. 6. m] principio nerveo membraneo & acuto prope tertii caput [fig. 6. f] oritur, qui lon-
 go ductu nerveus præ cæteris totius corporis musculis permanet, eum ad femoris mediũ
 primo carnosus fiat, humilioreque sede crassescat, & juxta genu tendinem teretem
 definat [fig. 6. f] quo in tibia⁷ latus internum, ⁸ ubi primus secundus & tertius nonni-
 hil dilatatus inseritur. Et hic in posteriore sede etiam ultra medium impense lividus,
 Hhhh 3 sinum

cat. f. Sic Vesal. Fall. in posteriorem sed anteriorem tibia, Col. Piccolh. & Gal. 3. us. par. usus, tibia in internum
 latus inclinantem flectere: & ad. an. hoc retrorsum sursum ferri & in orbem circumvolvi assere, Ves. flectit, & hunc à
 Galeno propositum motum obimus, at non quiescente femore: Anat. cæteri flectit.

Gal. 2. ad. an. Ves. Fall. Plat. 5. Col. Piccolh. 7. Gal. 3. us. par. flectentium quartus & exterior, Laur. x Gal. perpetuo la-
 tum vocat, quia in simiis nulla à femore ossis enascens portio, quarto musculo admiscetur, Ves. notat dignam carnis
 molem adsciscit, Columb. geminus quasi Plat. ad dimidiam femoris partem insigniter crassescit, Piccolh.

y Columb. 2. Sive unius loco aut duorum enumeres, nihil interest, quamquam Galeni gratia unicum opportunius
 statuer, Ves. hic tum pro uno, tum pro duobus numerari potest, Fall. instat. forte alius quis musculum unum censeret
 (scil. portionem illam) sed profecto non est distinctus musculus, Col.

a Hic tibia extrorsum simul cum flexione abducit & quodammodo involvit Gal. uno: at 2. ad. an. simplici motu in
 externam partem agit, ubi exemplum cursoris refert, cui hunc musculum adimi iussit, quo adempto, nihilominus ve-
 locius currere poterat. At Galenum reprehendit Columbus, nam si, ait, hunc musculum demas, flexionem rectam ef-
 ficere nullo pacto poteris: at in cursu rectam fieri flexionem Gal. 2. ad. an. monuit: imo oppositum comperi, saucios in hoc
 musculo, neque magno vulnere, qui licet sanati forent, non sine labore tibia flectebant: hæc Col. cæteri, flectere di-
 cunt. b 5. Gal. 2. ad. an. Ves. Fall. p. Plat. 4. Col. Piccolh. c Origo tum carneum nervea est, Col. Piccolh. caput pro-
 prium nervum, non nisi longe sub exortu carneus, evadit & crassescit, hoc sibi præ cæteris corporis musculis rarum & pe-
 culiare vendicans, Vesal. & Plat. nerveo principio, Fall. instat. d Gal. 2. ad. an. in femoris caput & articuli genu
 liga-

p Gal. à coxen-
 dice quatuor
 musculos exori
 ri opinatur, cõ
 re ipsa (si de ho-
 mine loqua-
 tur) tres duntaxat
 exant, Col. exoritur
 ex coxa plerif-
 que duo tan-
 tum ex femoris
 superiore parte.
 Plat.
 q Nerveo prin-
 cipio longo &
 tereti, Colum.
 Piccolh. princi-
 pio angustiore
 sed nerveo.
 Plat.

x Gal. 2. ad. an.
 lato: Ves. tereti,
 in simiis fere la-
 tus occurrit, &
 Gal. nulli ma-
 gis obliquum
 duum assignat
 vit, cum tamen
 primus, quem
 admodum &
 subsequens, lon-
 ge obliquius du-

ligamenta inferiorem tribuit & tibiam sensim in exteriora circumvertit & si ad caput tendatur, cum femore etiam tibiam retrorsum & introrsum fertur: leviter & obscure genu articulum flectit: hac Galen.

et ita ut existit. finum insculptum habet [fig. 6. n] cui tertii musculi e pars anterior innititur, & toto ductu illi se applicat, ut unus quali musculus esse appareat. Hæc de flectentibus, nunc de extendentibus.

quinto, unius musculi vice à multis Anatomicis ablatum fuisse, Vesal. 6. Ves. Columb. Fallop. Plat. (cui & brevis) Piccolh. rariorem inter musculos naturam adipsi cur, quem Gal. 2. ad. an. perfunctorie descripsit & in lib. de u. part. latius arbitror, Vesal. abducitur tibia musculus unius ministerio, quem membranosum & fasciam latam vocant: oritur à spina ossis ilium & oblique in tibiam externam fertur, suoque tendine latissimo, omnes fere femoris musculos investit & ad extremum usque pedem excurrit, Laur. Carne. Columb. Piccolhom. VI. f five extendentium primus, qui Membranofus dicitur [tab. 16. & seq. fig. 1. 2. 4. 7. 8. ζ] qui femoris exteriori & mediam partem occupat, ab ossis illi spina & acutus carnosusque enatus [fig. 1. 4. 7. p] ad coxendicis articulum delatus, ad cujus regionem tantum carneus est, & angustior redditus, juxta femoris processum majorem in exteriore parte in membranam longissimam [fig. 7. † q] & latissimam tendinis h naturam referens, abit, quo in corpore major non est, & cutis instar vel ligamenti cujusdam transversu ritu (hinc Fascia lata dicitur) omnes fere femoris & tibie musculos, sed diversa crassitie i circumdat & in sede sua continet (eo modo, quo & cubitum occupantes musculi obducebantur) & genu articulum obvolvitur: hic cum musculorum sequentium tendinibus ad insertionem miscetur, & in tibie i sedem anteriorem externamque latus infigitur, ut eam recta extendat, & recta antrorsum moveat. Et propter hanc membranam, si ea humore aliquo acripungatur, dolores acerbissimi causantur, aliquando ob flatum inclusos spasmus, nonnunquam stupor, quandoque lassitudinis sensus inducitur: hacque membrana transversim incisa, musculi motus minuitur aut omnino tollitur: quod notandum, ut si forte propter materiam ibi collectam, & abscessum factum sectio requiratur ea secundum longitudinem instituat.

VII. i seu extendentium secundus, qui Vastus externus, propter molem dicitur, rotundusque lividus est [tab. 16. & seq. fig. 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 13. H] & femoris latus externum & magnum quoque anterioris & posterioris sedis partem occupat: hic à femoris externo latere principio nervo lato amploque exoritur [fig. 9. i] & ipsius processus magni radicem in orbem, cum ei adnatus sit complexus, statim ab origine crassius carnosusque redditus, & sequenti aliqua ex parte instratus, totusque carnosus paulo supra patellam [fig. 9. x] in tendinem amplum membranofumque desinit, qui cum duorum sequentium tendine commixtus, ad rotulam (quam complectitur) latus externum descendens in tibie m sedem anteriorem statim sub ipso articulo inseritur [fig. 9. u]

II. x. n seu

omnes fere femoris musculos investit & ad extremum usque pedem excurrit, Laur. Carne. Columb. Piccolhom.

g Ab ilium ossis spina acuto & carnosio principio, Vesal. à media appendice ilium ossis principio tum nervo, tum à spina ilium ad latus in lacerti morem, Fallop. inst.

h Tendo hic maxima est notabilitas, propterea chirurgi animadvertant ne illum transversim secent, Columb.

i Anteriori & posteriori sede tenuissima, externo femoris lateri, valida crassaque, Vesal. crassior circa medium, in extremitatibus tenuior, Plat.

k In anteriorem partem tibia fibulaque tandem inseritur, Columb. & Piccolhom. l 7. Vesalius Columb. Fallopium, Plat. Piccolhom. extendunt tibiam quatuor, rectus, vasti duo & crureus: vasti duo à mola nomen sortiti: externus qui dem à radice tota trochanteris magni & cruris osse subjecto, Laur.

m In superiorem & anteriorem tum tibia, tum fibula partem, quasi amplexu quodam terminatur, Piccolh.

IX. seu extendentium tertius, qui Vastus internus nominatur, [tab. 16. & seq. fig. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 6] qui ossis femoris amplitudinem pene totam parte interna circumdat: à femoris cervice, [fig. 10. 7] nerveus oritur, statimque carneus redditus, etiam à magni ejus processus radice, quasi principium o geminum habeat, portio enascitur: hacque origine ampla & obliqua exortus descendit, sensimque carnosior redditus ad femoris latus internum prope patellam in crassum & admodum carneum semicirculum extuberat, ex quo tendo validus enascitur, qui patellam quoque occupat [fig. 9. 11] & hanc portionem aliqui musculus distinctum facientes & quia toti crurii, ut Brachiius brachio adhæret, Crureum p vocant, [fig. 2. 7. 8. 9. Z] hic cum præcedenti musculo q sinum [fig. 9. char. 1.] impenselividum efficit, quo ei subsequens musculus tota longitudine incumbat.

IX. seu extendentium quartus, sive rectus [tab. 16. & seq. fig. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. x] qui flectentium primo extorsum adjacet, & in medio anterioris sedis positus est: ab ilei ossis tuberculo interno, regione anteriore supra coxendicis acerabulum posito, principio nerveo & acuto [fig. 8. char. 1.] exoritur, & per femoris longitudinem & anteriora inter duos prædictos musculos recta delatus, sensim carnea substantia auctus, supra femoris medium sensim gracilior evadit [fig. 8. char. 2.] & in tendinem longissimum & fortissimum supra molam paulo angustior & tenuis finit, at in molæ anteriore se de denuo dilatatus, & duorum prædictorum tendinibus parmixtus [fig. 8. char. 3.] tibiæ antierius statim sub ipso articulo validissime inseritur: at in simiis caudatis membraneus, quodammodo tibiæ multo inferius inseritur, quemadmodum & reliquorum tendines membranosiore & latiores quoque in simiis existunt. Ab hoc rrium musculorum tendine patellæ integitur, & imo ipsis anteriori sede adnascitur, & ipsi genu pro ligamento est. Hicque musculus est, qui lacertæ formam, vel piscis ob caudam latam refert, qui à Germanis dicitur Maus, id est mus, dicitur, & à quo corporis totius musculi nomen sortiuntur, & quo lasso necessario moriendum statuunt.

X. seu oblique movens, qui Popliteus à situ nominatur [tab. 20. & 21. fig. 14. 16. 18. 22] nam in poplite sub pedis musculo Gastrocnemio & Plantari, proxime latitat, quare non nisi his remotis occurrit: hic brevis est & tenuis, & à femoris u capite externo principio nerveo [fig. 16. char. 4.] & tereti prodit, qui fibris carnosus auctus, sub ligamento delatus, oblique tibiæ ossi supervectus, carnosus latusque in tibiæ partem posteriorem interioremque ad ejus appendicem, quam arcte complectetur, inseritur [tab. 16. char. 5.] cujus munus tibiæ oblique versus exteriora movere, & una pedem, cum tibiæ ossi præcipue inarticuletur, introrsum nonnihil versus alium pedem circumvertere; quare præcipuum tibiæ flexionis authorem esse, x Galenus statuit.

primus seu rectus à spina externa & infernali oritur, Lau. (Non ex femoris osse enascitur, ut Gal. voluit 2. ad an. & aliter 15. u. par. 8. & Præter has omnes est parvus musculus poplitis, qui flectit genu. 3. u. par. 16. 10. Col. & Picc. in poplite latitans, Ves. & Fall. musculus ossis tibiæ, per femorem, Plat. alter adductorum popliteus ab inferiore & exteriori femoris tuberculo ortus, in interiorem tibiæ partem inseritur, estq. quadratus, Lau. & Ex ligamentorum femur tibiæ connectentibus, uno, qui in extremo genu articuli latere habetur, ab hujus posteriori parte nerveum musculi principium exoritur, Ves. Plat. prope caput externum femoris enatus, Fall. origine nervea teretis, emanat ab externo femoris capite, Col. ab inferiori externo femoris capite emergit, & sub ligamento decurrens, unde à ligamento illo nasci, nonnulli sibi persuaserunt, Picc. x s. l. us poplitem flectere potest, aut maxima potentia præditus est. 2. ad an. mihi videtur nulla prorsus potentia ad tibiæ flectendam valere, cum omni modo obliquus & pene transversus recto motui præfieri nequeat. deinde adeo invalidus, ut ne tibiæ tibiæ sursū velle possit: ad hac brevissimus est, tenuissimus, nec femoris ossi, nec illi ossi cōnascitur: ad cōtinuandū aut quod munus obis, cum ea musculo superiori, qui radice in pronū movet: hac Ves. usus ut tibiā flectat, ut tradit Ga. Ves. negat

ab isto obliquo, in validoque musculo fieri posse, neque tamen ipse quem usum habeat tradit, Fallop. instit. tibiam oblique movere versus exteriora, licet hoc Vesalius inficitur, qui hunc musculum in genu articulatione minus quam recte perpendit: laxa enim est, Columb. hic eundem usum habet, quem superior radium in primum movens musculus, cui est omnino assimilis, ut pedem tibia in articulum inrorsum circumvertat, qui motus musculus pedis egregie adjuvatur, Plat. tibiam extrorsum, idque oblique movet, qui motus fere semicirculum extrorsum imitatur, Piccolh.

De Musculis a Femoris.

CAPUT XXXII.

a Coxa articuli musculi, 2.

ad. an. ubi ob-

scure & secus

quam humana

fabrica ostendat, Vesal. &

15. us. par. lon-

ge rectius de-

scribuntur.

b Numerus

musculi coxen-

dici de articu-

lationem mo-

ventes decem

sunt, de dissect.

musc. 31. & 2.

ad. an. 4. & 6.

extenditur, fle-

ctitur, inrorsum

alteri cru-

ri adducitur,

extrorsum in

latus amove-

tur & circum-

agitur, muscu-

lis 10. aut si in

maximum nu-

marum redi-

gantur 14. Ve-

sal. decem, Co-

lumb. decem

proponuntur,

sed 11. prater-

miserunt, &

pro quinto va-

riam carnis melem

proponunt, at non musculi divisionem, sed potius unionem affectare videntur, quare potius dicen-

dum tot musculos esse, quos sunt partes nimirum quatuor, cui & octavus ascribendus, cum quinti pars sit, Fal-

lop. observat. decem enumerat, idem in institut. sunt decem, vel si dividat aliquos, plures, Plat. decem

etiam plerique scribunt, sed duos orbiculari motui famulantes omittunt, quorum undecimus Fallopio debe-

tur: duodecimum ego inveni, Arantius: decem progressores femorales, hoc est femora in progressionem cientes, sursum de-

orsum, antrorsum, retrorsum, extrorsum, inrorsum, ad hos motus musculi uno motu deorsum excepto, qui per se ob se-

moris gravitatem obitur, Piccolhom. quatuordecim flectentes duo, extendentes tres, adducentes & circumagen-

tes imo tres, abducentes & circumagentes foras sex, Laur. qui cum Col. & Piccolh. femoris musc. sibia muscu-

lis pramissit.

De his vide Gal. lib. de diff. musc. 31. 2. ad. an. 4. & 6. 15. us. par. 8. & 5. adm. an. 9. & 8. expli-

Femur pars ea est, quæ inter coxendicis articulum ad genu usque inter tibiam exten-

dit, & osse uno, quemadmodum & humerus constat: quæ pars cum ex voluntate nostra occasione sui capitis rotundi moveatur, & quidem omni motus genere, idcirco musculis & quidem multis opus habuit. His autem agitur vel in rectum, vel in gy-

rationem, vel flexione. Extenditur, vel nobis stantibus, cum ad perpendiculum coxendicis offi suppositum est, & deorsum versus terram, modice versus interiora id deducen-

tibus, vel retrorsum in posteriora femur nobis sursum tollentibus, maxime versus la-

tus externum, idque musculorum quinque beneficio, qui majori ex parte, partem po-

steriorem occupant: & horum quatuor primi coxæ, quintus femori incumbunt. Fle-

ctitur vero, quando femur sursum, antrorsumque tollimus, cum spina rectum angu-

lum facientes, maxime versus latus interius (ut in extensione versus exterius) quod

musculis tribus antèius fici perficitur: quorum duo primi in vètris cavitate fici sunt,

tertius femori insidet. Circumagitur autem, quando pes totus & rectus terræ affixus

oblique movetur, & quidem vel ad interiora seu priora, cum genu ad poplitem alte-

rum ducitur & pterna foras fertur. Vel ad exteriora seu posteriora, quando genu fo-

ras, pterna intro ducitur: & hic motus tribus musculis, coxendicis sedem occupanti-

bus absolvitur: alii tamen volunt ab omnibus musculis successive agentibus circum-

actionem fieri. Quare musculos undecim esse censemus, licet plures numerari pos-

sint, si quintum in partes quatuor dividamus, & ex carneo marsupio, quod decimi

musculi tendinem complectitur, musculos duos faciamus, & duodecim Arantii ad-

damus, tunc enim cujuslibet femoris septendecim erunt: qui femur extendent, fle-

ctent,

Stent, circumagent, alterum alteri adducunt, vel ab altero abducunt, vel alteri imponent, de quibus ordine.

I. ^c Extendentium primus ^d seu Glutæus major, quia alterius lateris natem fere efformat [tab. 16. & seq. fig. 3. 4. 8. 14] & sub cute summa crassius & carnosus existit, siquidem cum duobus sequentibus natium pulvum cōstituere debuerit: hic ab ilium ossis ^e spinæ circumferentia ut plurimum tota, ossis sacri parte humiliore ubi opposito contiguus est, & coccygis principio carnosio lato & semicirculari exoritur [tab. 17. fig. 4. a b c] qui oblique nonnihil descendens coxendicis articulum supervectus (quē integens valentius firmat) gracilior & angustior redditur: & in tendinem validum & latum definit, qui partim in processus majoris radicem, partim infra ipsum in femoris ^f os extrinsecus ubi eminentia quædam apparet, oblique inseritur. Hic & quando totus agit femur refellit, & recta extendit: nam si unam tantum partem tendat, id non æqualiter agit, sed in hoc vel in illud latus extrorsum magis movet.

II. ^h Extendentium secundus seu Glutæus medius [tab. 17. & seq. f. 4. 5. 8. 9. V] primo magna ex parte substratus, reliqua parte mēbrana intectus, forma similis, sed minor & lividus admodū, quemadmodū & tertius, in corporibus ⁱ gracilib. ac in obesis, præsertim mulieribus, ^k plerumq; fibræ nerveæ per hos excurrentes pinguedine enutritæ cōspiciuntur, quo sic sedentib. strati cōmodius fiat. Hic ab ossis ilii costa ejusq; regione anteriore paulo demissior quam primus, cujus principio nonnihil cedit, illiq; dorso, principio carnosio lato ac semicirculari [tab. 17. fig. 5. h i] enascitur, totam fere ossis ilii sedem occupat, & oblique descendens sensim angustior fit, musculum prædictum subit, coxendicis articulum integit, & in tendinem latum validum & mēbraneum definit [fig. 5. k] qui in trochanteris majoris anteriorem & elatiorem partem, eam undique cingens transversim implantatur, ut femur extendat & versus anteriora in latus sursum, magis tamen quam prior trahat, & hujus cum prioris musculi fibris decussationem faciunt [fig. 5. u cum u].

III. ^l Extendentium tertius, seu Glutæus minor [tab. 17. & seq. fig. 6. 10. 8] qui totus sub secundo latitat, illoque tanto minor est, quanto secundus primo: hic ab ossis ilii dorso, ^m ejusque sede posteriore ac inferiore, ubi coxendicis os incipit, principio carnosio, crasso & semicirculari ut priores duo oritur [fig. 6. q s x] qui deorsum in priora declinans, ligamenti ipsius articuli coxendicis, fibrosis nexibus modice hæret, & angustior redditus in tendinem latum ac robustum cessat, qui trochanteri majori supervectus, ejus parti anteriori & apici, ubi is nonnihil invertitur, implantatur, [fig. 6. s] quo femur modice sursum, & in ⁿ posteriora trahendo extendat.

IV. ^o Extendentium quartus seu iliacus externus pyriformis [tab. 17. fig. 5. 6. & tab. 20. f. 13. π] eo quod ossis ilii, cavitatem inferiorem & exteriorem, quasi totus situ obliquo impleat & pyrum teretem referat, qui & lividus existit: aliis quadrigeminus primus & superior: hic à sacri ossis vertèbris tribus inferioribus, sive earum lateribus,

iiii

quasi

partem, aut si simul univ. sum colligit, Ves. femur ducit & retrorsum & extrorsum Piccolb. h 2. Vesal. Col. Fall. Plat. Piccolb. extendentium 2. seu medius, Laur. 7. Galeno. i Fall. in musculosis & non insigniter obesis admodum lividus, Vesal. k Vesal. l 3. Ves. Col. Fall. Plat. Piccol. extendentium tertius seu minimus, Laur. 8. Galeni videtur. m Vesal. Fall. inst. ab osse ilii, Col. ab appendice ilii, Piccolb. ab ossis ilii facie externa, Laur. n Ves. magis in posteriora quam sursum Fall. inst. horum trium usus femur extendere, sursum attrahere, & ad exteriora ducere, Col. trium munus femur ducere & retrorsum & extrorsum, Piccol. tres extendunt crus, Laur. o 4. Ves. Col. Fallop. Picc. Plat. 9. Galeni videtur qui in simis aliter ac in hominibus se offert, Vesal.

^c Extendant
quinque, Ves.
Col. Fall. exten
dunt tres na
tium authores,
major medius,
minor, Laur.
d 1. Ves. Col.
Fall. Plat. Picc.
6. Galeni vide
tur, 2. ad. an.
e Ves. Fall. in
sit. Plat. à di
midio ossis ilii
appendice, osse
sacro & coxen
dice, Col. Picc.
à coccyge, osse
sacro superna
ilium costa,
Laur.
f Exteriori ma
gni femoris pro
cessus parti se
cundum longi
tudinem obli
que inseritur,
Ves. in partem
exteriorem &
radicem tro
chanteris, Fall.
inst. in majorē
trochantera &
adhuc inferius
in femur, Col.
Piccolb. in fe
moris os sub tro
chantere ma
gno, Laur.
g Retrorsum ac
quasi extror
sum in latus
magis agit, pro
ut sui principii
hanc vel illam

p Carnoso &
iuro, Ves. Fall.
principio carno-
so, quod & te-
res videtur,
Col. Piccol. ro-
tundo & cras-
so, Plat. Gal.
diversum exor-
tum assignat,
forte propter li-
neam, qua in
medio conspic-
tur, nam 15. u.
par. ortum assi-
gnat ab osse sa-
cro: at 2. aut an-
teri à coccyge
asserit: sed in
hoc posteriore
loco, coccygem
vocat tres ver-
tebras ultimas
ossis sacri, Fall.
in fa.
q Vesal. Col.
Fall. Plat. ho-
rum quatuor
cum eadem sit
origo, eadem ter-
minatio, mu-
nus idem est,
Piccolh.
1 Gal. vide-
tur. 5. Ves. Fall.
8. Col. Piccolh.
hunc triplicem

quasi parte interna (ubi nonnunquam suo opposito continuus) carnoso & rotundo
p principio oritur, per transversum ad magnum rotatorem carneus deferitur, sed ante-
quam femur attingat, angustior redditur, & in tendinem teretem finit, qui in trochā-
terem majorem id est, femoris caput maximum, posterius juxta appendicem oblique
implantatur: ut femur modice sursum, & in posteriora trahendo extendat, & ejus
circumactioni foras parum (magis tamen quam tertius) auxilio est.

V. Extendentium quintus, qui Triceps, rectius Quadriceps eo quod triplici in
quadruplici sit principio [t. 16. & seq. f. 2. 4. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. pp] hic omnium totius
corporis musculorum crassissimus, mira fibrarum varietate refertus, ita ut cum hu-
jus partes inter se ortu, fibris, insertione, tunicis & aliqua ex parte usu varient, ut cum
Fallopio loquar, tot esse musculos, quot ipsius sint, partes dici posset, ad quem tamē
& octavus, qui ipsius portio videtur referri deberet, suumque principium sub tri-
bus capitibus musculorum tibiae constituentibus situm est [t. 17. f. 6. f. h m] sed ipsius
descriptionem cum Fallopio subijciamus.

Prima pars^a [t. 19. f. 12. est pars musculi v] à pubis ossis linea superiore principio
nervo oritur, ac descendens in femoris lineam asperam sub ipsius medio inseritur: à
cujus tamen tendine portio tenuis procedit, & cum quartæ partis tendine uni-
tur, & in femoris caput inferius & internum genu inseritur. Altera pars^x tabul.
19. & 20. figur. 13. & 14. chart. 6.] ab ossis pubis ima commissura, qua simul jun-
guntur oritur, quæ carnosa & lata fibris obliquis descendens, in femoris lineam parte
superiore implantatur. Tertia pars^y [t. 20. f. 13. ch. 6. f. 14. ch. 7. confer inter se f. 13. p. 50] à
coxendicis appendice, & à tota coxendice in gyrum, circa foramen latum, principio
carnoso, & aliquantum nervo oritur, & fibrarum variò genere constat, ita ut geminus
musculus esse videatur, siquidem superiores sint quasi transversæ, inferiores vero plu-
rimæ obliquæ: & pars hæc descendens in femoris posticam lineam asperam sub rota-
tore minore inseritur. Quarta pars^z [t. 20. f. 12. & 13. p. u. x. y] à coxendicis appendice
principio nervoso [f. 13. u] ac dein carneo [f. 13. x] oritur & musculum efformant, qui
in miram ventris amplitudinem dilatatur [f. 13. p] & per femoris posteriora delatus in
tendinem teretem [f. 13. sub z] definit, qui cum tenui portione tendinis primæ partis
in femoris tuberculum internum & inferius inseritur [huius musculi partes tres osten-
duntur t. 19. f. 12. p. u. qua dependent t. 20. f. 14. p. 6. 7.] Hujus^a manus licet sit femur ad-
ducentem

facit, Laur. his verbis, adducunt crura circumagunt intro tres, quos pro unico numerant anatomici, eumque triplicem
vocat. Aut unum constituit: aut si visum ambas partes duorum musculorum vice enumerato: aut anteriorem
partem in duos musculos subdividit, tres tamen enarraturus, ita tamen ut meminere in simis caudatis postero-
ram huius musculi partem, radici interioris capitis femoris carnea insertione, in homine vero tendine implantari, Ves.
mira fibrarum varietate refertus, ac si quis decipere cupiat, non docere, tres quatuorve musc. pro hoc ostendere facile pos-
sit: oritur ab osse pubis parte ejus interna, & à coxendice, minorem trochanterem amplectitur, deorsum tendit, femori
adhærescens sua illa oblonga aspera q. linea: posteriore carnosa: tandem tendinem efficit, qui in caput femoris in-
terius inseritur, Col. sic & Piccol. descripsit, at sic Laur. adducit 1. à commissura summa ossium pubis & eorum spina in-
ossis femoris lineam, sub ipsius ossis medio inseritur: adducit 2. ab ima pubis commissura sub trochantere primo inseri-
tur (videtur esse octavus) adducit 3. ab eodem enatus principio in parvi trochanteris radicem fertur, Laur.
t Fall. observ. quinque initis prodit, uti & reliquo ductu & insertione quatuor vel quinque partibus constare vidia-
tur. Octavum Vesalii musculum quoque comprehendens, Plat. u à Vesalio non descripta, Fall. obs. quarta pars, Plat.
primus adducens & circumagens intro, Laur. x Tertia pars, Plat. y Secunda pars, Plat. z Prima pars nervoso &
carneo principio, Vesal. 1. pars tribus veluti capitibus exorta, Plat. 4. pars nervoso principio, Fall. obs. a Femur erigit ac fe-
moris

maior rectitudine & brutis differunt. & hic 7. auxilium præstat, ut femur femori cum volumus superimponamus, Col. partim cruris rectum terra stabili: partim introrsum agi: femur femori superimponit, Fall. inst. femur introrsum simulque sursum movet, & quidem femora partem inferiorem, Piccolb.

ducendo erigere pro partium tamen diversitate varium est: pars enim posterior fibris rectis donata femur stabilit, ac terræ affigit, illud extendendo anterioris partis portio posterior id quoque præstat, sed modice femur ad interiora ac velut ad aliud femur adducit; sic anterioris pars prior, femur introrsum ducit, b & femur femori superimponit. Hæc de extendentibus, quibus primario femoris extensio commissa est, qui tamen femori, dum in latus movetur & circumagitur, famulantur.

VI. c Flecentium primus seu Lumbalis [tab. 16. & seq. fig. 2. 8. 10. 11. 12. 14. 16. 6.] quem *ἰσχυρὸς* d Hippocrates & Galenus vocarunt, & in abdomine aliquantulum oblique situs est, & intestinis exemptis statim in lumbis conspicitur, teres, carnosus, crassus, validus totusque lividus est; hic à transversis processibus duarum inferiorum vertebrarum dorsi & trium superiorum lumborum, carneus oritur [tab. 19. fig. 12. a] qui mox supra reliquas lumborum vertebrae, & per os ilium carnosus descendens (cui & lumbalis & interior) tendinem validum ac teretem fuit, qui rotula minoris elatiori parte antè inseritur, & ut, femur introrsum agendo, sursum valide trahat & flectat; & quo hujus tendituro deferatur, nec ab ossis duritie lædatur, vel etiam aberret, os pubis sinus insculptus est, qui ligamento membraneo lævi & lubrico ex osse pronato obducitur: & quia huic musculo renes incumbunt, ipsi vero nervus insignis, hinc fit quod calculo in renibus existente, stupor in ejusdem lateris crure perferentiatur. Aliquando huic musculi parvus incumbit, qui carnosus oblongus, gracili & piano tendine delatus, cum prædicto & iliaco terminatur, forte ut illum in sua sede firmiter contineat, hicque ad prioris differentiam Lumbalis parvus, ille vero magnus nominari posset.

VII. h Flecentium secundus seu Iliacus internus [tab. 16. fig. 2. & tab. 18. fig. 10. 11. 12. 16. T] qui prædicto musculo ad partem inferiorem contiguus est [tab. 19. fig. 11. & 12. T ipsi 6.] ossis ilii cavitatem interiorem totam occupat, à cujus regione i tota tanquam ex semicirculo carnosus latus enatus, paulatim arctior crassiorque redditus, in priora super coxendicis ossis elatiora descendens, tendine rotundo [tab. 20. fig. 14. T] in rotatorem minorem, sicut & prior, sed paulo humilior, quam sextus implantatur, & cum eo k femur sursum attollendo, flectit; sed hic minus introrsum movet. Ubi vero supra coxendicem fertur, os cavitatem seu sinum lævem & lubricum hujus musculi causa habet, & qua parte sinum contingit, lividus nevens & validus est, quo facilius ossis imperum sustineat.

Iiii 2

IIX. 1le-

e Vesal. Columb. Fallop. instit. Plat. Piccolhom. f Vesal. Columb. Plat. Piccolhom. & lumborum elatioribus, Fallop. instit. à lumborum vertebris superioribus, Laur. g Gal. 2. & 5. ad man. in lumborum musculorum seu carniū enarratione ab hominum compositione aberravit, Vesal. h 5. Galeno 6. Columb. & Piccolb. 7. Vesal. Fallop. instit. Plat. flecentium 2. seu Iliacus, Laur. i A tota illius appendice, Columb. Piccolhom. k Hi duo femur ducunt antrosum simulque sursum ac introrsum, Piccolhom.

b Et flexionis quodam modo author evadit. Vesal.

c 4. Galeno 6. Vesal. Fallop. instit. Plat. 5. Col. & Piccolb. cui & lumbalis & interior) flecentium, Laur. hic enim duos flectere scribit, psoas & iliacum.

d Revera musculi psoas Hipp. Gal. & veteribus dicti, & à quibusdam aliis adponuntur & à dō psoas appellatis, duo illi sunt, qui sexto loco à Vesalio numerantur inter femorum motores: licet Clearchus dorsales musculi extiores his nominibus vocari dixerit, in errore tamen est Ephesio teste.

13. Gal. 7. Col. Piccol. 8. & Vesal. Fallop. inst. pro secundo adducente Laur. proponere videntur.
 IIX. ¹ Flectentium tertius quibusdam pectineus [*tab. 16. & seq. fig. 1. 7. 10. 11. 12. v*] lividus quoque est, à pubis ossis linea juxta ejus cartilaginem carnosus & ^m latus, enatus, oblique inter quintum musculum, ut ejus portio ⁿ ceneri possit, fertur, & in tendinem brevem, ^o latum, amplumque cessat, qui femoris lateri interiori è regione parvi rotatoris inseritur, & ad posteriora usque progreditur, quo id flectat, sursum & introrsum valide ducat, & sic femur alterum alteri imponat. ^p Hunc motum adjuvare videntur (etiam Sylvio monente) musculi anteriores tibiae extendentes, qui ab osse pubis, illum, coxendicis exorti, portione quadam cruri inferuntur: hinc poplitis commissura extendi nequit, nisi simul & ea quæ ad inguen est, extendatur, præterquam ubi pes admodum attollitur.

m In finibus causatis minor est nec adeo lato principio enascitur, Ves.
 IX. ¹ Circumagentium primus, seu obturator externus [*tab. 19. fig. 12. 14. 16. &*] prædicto subjacet, & foramen totum quod anterius in pubis & coxendicis osse constitit extrinsecus opplet, formaque pyræ quoque refert; hic à toto ipsius externi ambitu seu foraminis circumferentia carnosus latus exoritur, aarteriusque livet, & transversim ac posterius secundum coxendicis articulum & femoris cervicem velut per trochleam revolutus fertur, sensim angustatur, in tendinem validum & amplum cessat, qui in sinum magni rotatoris sub undecimo implantatur, quo femur introrsum circumagat ^t & vertat.

n Oscitante femur cantibus femur moventium quinti portio censeatur, Ves. hic musculus ipsius quinti etiam pars est, Fall. obs. quinta pars quinti musculi, Plat. o Vesal. Fall. instit. exiguum Col. parvum Piccolb. amplum, Plat. p Femur valide introrsum vult, Ves. flectit, introrsum quo valide ducit, Fallop. instit. femur unum versus aliud trahit, & femur femori imponit, si quis recte consideret, non enim flectendi causa, quemadmodum in hoc deceptus voluit Vesalius, Col. femur ceteris sursum simulque introrsum, unde alterum alteri imponere possit. Piccolb. q. 2. Gal. videtur, quem rursus loco non recenset, 9. Ves. Col. Fall. instit. Plat. Piccolb. obturator externus, vel abductor seu circumagens 5. Laur. is enim scribit, abducere cruræ & simul circumagere foras sex musculos quadrigeminos & obturatos duos. 1. ex ossis & membrana foramen occupantis, amplitudine oritur, carnosus, Ves. à foraminis circumferentia, Plat. ab appendice ossis pubis parte externa, Piccolb. f. Circumagis foras, Laur. t. 10. Gal. Ves. Col. Fall. instit. Plat. Piccolb. obturator internus seu abductor: vel circumagens 6. Laur. u. Fall. inst. Laur. à totalinea, qua ab interna ilium ossis sede qua primi ossis sacri transversa processui committitur, Ves. ab appendice ossis pubis parte interna, Piccol. x. Velut tres teretes tendines, Ves. tribus tendinibus, Fall. inst. Plat. tribus quandoque quatuor, & etiam quinque, Col. in tres quatuorve, Piccolb. variis tendinibus auctus, Laur. y. Vesalius.
 X. ¹ Circumagentium secundus seu Obturator internus [*tab. 16. & seq. fig. 2. X. a & f. fig. 5. 6. & supra char. 9. fig. 13. 14. &*] in coxæ pelvi latitat, foraminis prædicti partem internam occupat, & priore validior est, & ab illo membrana, cui adnascitur, distinguitur; hic ab interni foraminis abitu ⁿ carnosus & latus exortus, veluti lineis tribus seu inscriptionibus insigniter lividus apparet, sensim auctatur [*tab. 16. fig. 2. a & c ad f.*] & transversim fertur, supra coxendicem extrorsum [*tab. 20. fig. 13. &*] & supra cavitatem trochleæ instar efformatum, magnum rotatorem accedens reflectitur & parte quadam circumvolvitur carnosus, qua vero sinum tangit, nervosus est, & tribus ^x tendinibus [*tab. 20. f. 14. stu*] teretibus in reflexu ad sinum adaugetur, qui à se se paululum abducti progredientes, ubi sinum præteriere sede externa seu posteriore, iterum invicem collecti, tendinem unicum nervum constituunt [*tab. 20. fig. 13. & 8. 9.*] qui transversim ducitur, & in rotatoris magni sinum posteriorem ejusque radicem cum nono musculo, ut femur extrorsum circumagat, inseritur. Hoc modo natura musculo rotaturæ addit: si enim totus carnosus fuisset, in reflexu & motu, ab ossis duritie læderetur: quare & si quilibet ligamentum membraneum validum obnascitur, quod lave & humore viscido ad faciliorem musculi circumactum oblitum est. Verum sinus hic lineas duas ^y leviter elevatas ostendit, quæ transversim ductæ, velut in sinus tres, tres prædictos

dictos tendines dividunt, quo in hoc sinu, singuli sinum peculiarem obtineant. Ne vero tendines hujus musculi ex sinu ossis elabantur, statim postquam reflectuntur, Natura providens & sapiens Marsupium ^z carneum creavit, in quo musculi hujus tendo locatur, quod musculos duos [tab. 21. fig. 16. xx] alterum superiorem, alterum inferiorem æmulatur & hos aliqui secundum & tertium Quadrigeminum vocant. Superior [tab. 17. fig. 6. ch. 8.] à coxendicis ossis processu acuto, quemadmodum & inferior [tab. 17. fig. 6. 13. 14. char. 9. fig. 16. x] ab ejusdem ossis appendice carnosæ & graciles enascuntur, qui ambo; decimum musculum ad insertionem usque comitantur, ^a & simul rotatoris majoris sinui inferuntur, & cum decimo, femoris circumactioni externæ famulantur.

XI. ^b quem aliqui Quadrigeminum quartum nominant, Marsupio subjicitur [tab. 20. fig. 14. *] à Fallopio primo explicatus, qui à coxendicis parte posteriore satis carnosus & brevis oritur, & tendine valido & tereti ad femoris exteriorem partem circumductus, rotatori majori posterius, vel in illud spacium, quod inter utrumque rotatorem est, inseritur, quo femur in gyrum ad posteriora circumagat: & hic in duos forte dividi potest.

Arantius ^c postquam undecimū à Fallopio inventum exposuisset, subjungit & duo-
decimum his verbis: reflectis à sua origine tibiæ flectendæ auctoribus, reque intimius explorata, ecce sub undecimo latitantem, alteque reconditum ac validiorem duo-
decimum reperio, qui quidem ab anteriore ossis pubis regione qua foramine per-
vium est, oppositam habet originem, ligamentali tamen membrana distinctam, car-
neoque ac pene orbiculari principio præditus, in validum & teretem tendonem de-
generat, qui per semicirculum ad exteriorem femoris partem circumductus, una cum
decimo atque undecimo, sphaerico femoris motui perficiuntur: hæc Arantius.

Iiii 3

De
lumbo, marsu-
pium carneum
in quo tendo

collocatus 10. musc. ut rursus incedat, nec ab ossis duritie ledatur: addit non deesse qui musculum peculiarem à decimo se-
junctum contendant, cum decimi musculi portio plane sit. Sic Plat. musc. 10. carnosæ partibus investitur, semper in-
fra supraque gracili una, aliquando in medio una, ac si tendo post circumactum in ipsam immitteretur: an 11. muscul.
intelligit?

^a superior ad insertionem usque adnatus, inferior ad insertionem usque exprorectus, Vesa. b Undecimum prætermisere
anatomici, &c. Fall. obs. non vero insit. 11. Fallopio acceptus referendus, Arant. in obs. c. 43.

^c Laurentius abducentes & circumactores cruris sex statuit: quadrigeminos & obturatores duos: Quadrigemini, scribit,
sibi omnino similes & parvi, sitis quasi transverso locati à tubere ischii enati, in trochantera magnum inferuntur: hæc
ille. Hunc imitatus Rioli vult femur ad latus externum à Quadrigeminis, id est, quatuor parvis musculis duci: pri-
mus velut pyriformis ab imo ossis sacro & externo oritur: secundus à tubere ossis ischii: tertius ab eadem parte nascitur,
& omnes in trochanteris cavitatem inferuntur, quarum quadratus, ceteris latior & crassior, à tertio, duorum digito-
rum latitudine distans, ab interna parte tuberi ischii nascitur. & in partem externam magni trochanteris affigi-
tur.

De Musculis Pedis.

CAPUT XXXIII.

De his consule Gal. lib. de diff. muscul. 33. & 2. ad. an. 7. & 8. 3. us. part.

PES movetur ^a dupliciter, in rectū & in latera: in rectum vel longum dupliciter, vel enim extenditur retrorsum, ex situ ipsius transverso, aliquoultque oblique versus terram ductus, idque musculorum quinque beneficio, qui parte posteriore una cum secundo & tertio digitos flectente locantur, qui motus nobis vel euntibus, vel saltantibus perficitur. Vel flectitur antrorsum à tribus musculis, quibus portio musculi, quem alii nonum faciunt, nos vero portionem musculi secundi qui digitos tendit, censemus, addi potest: & hi parte anteriore latere tamen exteriori (internum enim tibiæ latus ad suram usque excarne est) una cum primo & secundo digitos extendente locantur: qui motus non ut prior ita validus est, quare neque tam magnis musculis e-
guit. In latera quoque movetur & sic nonnihil circumducitur, ^b qui motus cum non tam validus sit, privatos musculos non obtinuit, sed in latus exterius ab anterioribus, & latus interius à posterioribus ducitur.

^a Vesal. Fall. instit. à novem musculis perficiuntur, secundum enim digitorum tensoris portionem pro 9. proponunt. Sic & Columbus qui musculi extremi pedis deservientes qui in tibia sita sunt, nominat, & 12. esse vel summum tredecim: addit enim 1. & 2. digitos flectentes, 1. & 3. digitos extendentes, quos huc restulerit, propterea quod in tibia quoque sita sunt: quare octo tantum pedis agnoscat: at Plat. pedem movent musculi octo, & pars musculi pro nono numerata: Piccolb. musculos moventes manus inferiores, qui extendant, flectant, in latera torquant, ideoque in orbem ducant, nominat, triplices facit, alios à partibus pedis componentibus, alios à partibus in pedis compositionem non ingredientibus, ut femore, tibia, fibula: & hos duplices facit, alios posteriores qui septem sint, alios anteriores qui quinque in quolibet pede, verum Columbum per omnia imitatur & quatuor digitos moventes in hanc classem retulit, Laurentio pes flectitur & extenditur, flectunt duo, extendunt quatuor, nam ex flectentium 1. & 3. unum facit & 5. extendentem omittit.

^b Vesal. existimat, si musculi anteriores cum posterioribus alternatim contrahantur, in hoc vel illud latus pedem agere. Sic Piccolb. omnibus successive agentibus, pes in orbem circumque quoad fieri potest ducitur: quod autem omnes in actione conveniant, hoc est, omnibus versus suam originem contractis, tum pes humo affigitur & stabilizatur, Columbus & Piccolb.

^c Primus, Vesal. Columb. Fallop. instit. Plat. Piccolb. extendunt quatuor gemelli duo, soleus & plantaris, Laur. d. Supragenu, Columb. ad genu, Fallop. instit. à posteriori, eaque introrsum versus femur parte, Piccolb. Vesal. Plat.

^e Gal. 2. ad an. reprehendit eos qui volunt duorum primorum musculorum tendines, tertio cuidam commisceri: neque alteri tamen connexos in calcem inseri: hoc de hominibus verè prodiderunt, Vesal.

efficiunt, qui calcaneo sive calcis principio [fig. 14 c] inseritur: & hi tres muscoli calcem pedemve sursum ad posteriora trahunt, pedemque terræ figunt, seu in posteriora deorsum reflectunt.

II. ^f Gastrocnimius externus, seu extendentium secundus [tab. 16. & seq. f. 3. 4. 10. 13. & 14. w] à femoris capite externo prodit, priorique omni ex parte similis est, nisi quod primus ulterius carnosus descendat, quod etiam in musculosis citra dissectionem conspicitur: hic cum primo, non procul ab exortu, fibris nexibus jungitur & ad tibiæ medium conascitur [fig. 13. d] quare cum mole, robore & actione pares sint, Gemellos & nonnulli vocarunt: qui ubi suræ externam partem efformavit, in tendinem desinit, qui prioris tendini ita commiscetur, ut unus musculus ^h esse videatur, cum venter unus sit, tendo unus, eademque implantatio & hi duo cum ventrem suræ, seu tibiæ pulpam constituent, idcirco Gastrocnimii dicuntur. At cum in cruris directione capita illa retro ferantur, & sic comprimantur, singulis principiis, singula officula sesamina apposita sunt, ut lavi & lubrica sua superficie, qua ex musculorum substantia eminent & capitum femoris superficiem lavem spectant, cui innituntur, impetum excipiant, & ne muscoli atterantur aut lacerentur impedian, eisque robur addant.

III. ^k Plantaris [tab. 18 & seq. fig. 7. 14. 16. II.] sub duobus prioribus in poplite latitat, gracilis est & principio carneo & angusto à femoris capite externo prope articulum prodit, & oblique à parte externa, internā versus descendens dilaturatur, sed carnosā parte exiguus est; nam mox sub genu in tendinem [fig. 14. 15. 16. p. t. 16. f. 2. 4. H] longissimum valdeque tenuem & nerveum, quo in humano corpore inter eos qui teretes sunt, longior non datur, desinit, qui sub quarto expansus & validissime illi in progressu nexus, calcis interno lateri sede posteriore ^m implantatur; aliquando latefcit & per calcis latera in totam ⁿ plantæ cutim, ut palmaris in manu absumitur. Quando vero deest, ut & palmaris, tum hujus tendo à digitorum flexore altero surrogatur. Hic ⁿ pedem introrsum vertit & contorquet.

IV. ^p Soleus [tab. 16. & seq. f. 2. 7. 14. 16. I.] inter pedis musculos maximus & crassissimus est: prædictis subjacet & qua primi duo illi incumbunt, nō secus quā illi, liver: hic à tibia superna vel à fibulæ parte posteriore, qua fibula tibiæ coarticulatur, nervus & validus oritur, crassiorque factus, latitudine fibulæ tibiæque excedit, & circa tibiæ medii sensim artatur & paulo supra calcē in tendinē crassum & robustissimū degenerat, quā in anteriore sede longius quā in posteriori, carniformi substantia enutritur, & cū primi & secundorum musculorum: hos in-

simis perpetuo reperi: in homine vero sæpe, alterum deficit, nunc internum, nunc quoque externum, Fall. obs. k 3. Vesal. Col. Fall. inst. Plat. Piccolh. extendentium plantaris qui palmari respondet, Laur. 1. Ves. nervosus & acutus emergit, Piccolh. m Non autem pedis plantam subit illius musculi modo quem in simia latum, plane tendinem educere diximus, Vesal. hic in simia latum tendinem produxit, ut Galeno placuit, at in nobis in calcem cessat, Col. calcis interno implantatur, Fall. inst. Piccolh. in tendinem per longum degenerat qui ad astragali tergum latefcit, per quod lacera pterna in planta totius cutim absumitur, Laur. non in calce terminatur, sed sub calcaneo lateraliter traductus, in plantam pedis diffunditur, Rioli.

n De tendine in cutem pedis inserto, vide 3. us. part. 11. de diss. musc. in musculo tibia 4. o Col. Fallop. inst. Piccolh. in validior videtur quam ut cum quatuor illis insignibus musculis in podis extensione conferre queat, si vero tantum opus subire quis crediderit obliquo & in internum latus motui pedis suppetias feret, Vesal. pedem extendit, Laur. p 4. Ves. Col. Fall. inst. Plat. Piccolh. extendentium tertius sive soleus à tibia & perones commissura enascitur, Laur.

& secundi musculi tendine unitus [*tab. 21. fig. 16. ♀ ω I*] calcis parti posteriori, qua ejus causa depressa & aspera est, validissime implantatur, & ut pedem extendat & terræ firmet. Verum quia calcis os extra tibiæ ossis rectitudinem prominet, tendo hic paulo ante insertionem à tibia abscedit [*fig. 15. †*] & cavitatem vacuum efformat, per quam etiam lanii baculo transmissio integra bruta in macello suspensa, proponunt: hoc enim tendine etiam in homine robustior non invenitur, & quem Hippocrates chordam magnam vocavit, quæ cum partibus principalibus societatem habet unde tendit hic contusus & sectus, febres continuas & acutissimas movet, singultus excitat, mentem perturbat, tandemque mortem accersit, & Achilles hoc tantum parte mortalis erat.

V. ^u Tibiæ posticus [*tab. 16. fig. 2. 7. 18. 19. K*] ossi proximus inter fibulam & tibiæ os sub duobus musculis digitos flectentibus situs est: hic à tibiæ osse & fibula exoritur [*f. 18. l*] statim carnosus & latus fit, & carnosus ad tibiæ (cujus ossi magna ex parte in longum incumbit) extremam appendicem descendit & ligamento, quod his duobus ossibus interjacet, adhærescit & forte exortus sui robur acquirit, & in tibiæ media regione à latere interno tantum tendinem teretem nerveum & validum, qui in musculi substantia aliquousque initium sumpsit, profert, qui per sinum tibiæ exsculptum prope malleolum internum sub ipso ligamento transverso prorepit, & oblique pedis inferiora sub musculis plantam occupantibus adit [*tab. 21. fig. 18. 19. m*] & in tarso ossis, quod cubiformi vicinum est, sedem inferiorem valide ipsius processui, hujus gratia creato inseritur, ut pedem introrsum trahat: aliquando duos tendines producit, altero ad os naviculare, altero ad primum os innominatū implantato: hic quoque primo, secundo & quarto suppetias fert, quare pedem terræ admovet, & interdum in posteriora ducit, ut summis tantum digitis inniti queamus. Hæc de tendentibus & parte posteriore satis, nunc de flectentibus seu anterioribus.

VI. ^a Tibiæ anticus (seu flectentium primus) [*tab. 16. & seq. fig. a. 7. 8. l*] siquidem antè tibiæ ossi ad latus ejus externum adhæret, & inter anteriores major exstet, & lacertam apposite exprimit, musculisque digitorum pedis instratus est; hic à tibiæ superna epiphyssi juxta fibulam ubi tibiæ articulatur, acutus prodit, illico dilata-

tur, gultuosa, paucorum dierum, denique mortifera. Et *5. epid. hist. 48.* habet exemplum adolescentis, qui quod citato cursu perviam asperam calcem offendisset, dolor cepit parte præcipue inferiore: quo loco abscessus nullus factus est qui humorem cogeret: quarto tamen die locus universus nigricabat ad astragalum usque & cavitatem illam, quæ est ad planum pedis: quod denigratum fuit, non disruptum erat, verum prius è medio sublatus est: in totum vero post cursum, viginti diebus vixit.

u Vesal. Columb. Fall. instit. Plat. Piccolhom. x Vesal. Col. adnascitur toto ductu, Plat. super ligamentum illud, de- currit, Piccolhom. y In primum tarsus inferi voluit Galenus 2. ad. an. negat Vesalius. Sub osse tarso naviculari vocato terminatur in tarsus ligamentum, Piccolh.

z Sic & Vesal. pedem versus interiora trahit, Columb. & Fallop. instit. hic introrsum pedes contorquet, Piccolh. a 6. Ves. Fallop. instit. Plat. 1. anterior seu octavus pedis musculus, Columb. 1. anterior, Piccolh. flectentium primus, Tibiæ anticus, Laur. qui flectentes duos facit tibia anticum & peronæum bicipitem.

b Ex utrisque ossibus & communi illorum ligamento, exortus portionem assumit, Vesal. à superiore tibia processu, ortus tendine unico sed ad sinem bifido, in os pedis pollicis præpositum inseritur, Laur. ab appendice tibiæ prope fibulam, Piccolhom.

tur, latere suo interno tibiæ ossis lineæ acutæ committitur, & ad tibiæ medium sensum angustatus, multo supra pedem, in tendinem teretem, nerveum & validum [fig. 2. & 18. n.] & qui aliquando sub cute attollitur definit, qui sub ligamento transverso siue annulari ab appendice inferiore tibiæ fibulæque enato, pedis interiora adit, & sinu modice patenti, per tarsum superiorem delatus, in ossis pedii pollicis præposito processui interno totus inseritur, ^c ut pedem ^d extremum flectat, & antèrursus trahat: aliquando sub ligamento pedis, in duos tendones scinditur, quorum alter in os primum innominatum inseritur: alter ad os metatarsi pollicis præposito, abit. Hic quemadmodum & præcedens ut plurimum ea ^e parte qua sub tarso & pedio reflectuntur, cartilaginem & sesamoides ossiculum à natura ob. attritionem collocatum, habent.

VII. ^f Peroneus primus, seu flectentium secundus [tab. 16. & sequent. fig. 1. 3. 8. 9. 10. 12. 16. 18. 19. M] qui præcedentis musculi lateri externo & toto progressu committitur, & in tibiæ latere externo privatim reponitur: hic à fibulæ appendice superiore parte externa carneus ^h nerveusque enatus [fig. 10. n.] carnosus redditus, per fibulam cuius lateri aliquousque connascitur, incedit; hinc abscedens latere externo lividus, interno rubicundus & carneus conspicitur, & paulo ultra fibulæ medium deductus, inter utraque latera carnea [fig. 10. p. q.] è medio fere ipsius corporis quod privatim illi accedit, tendinem validissimum [fig. 10. r.] sede interna utrinque carne nutritum producit, qui sensim excarnis redditus & oblique versus fibulæ appendicis posteriora reflexus, malleoloque externo [fig. 10. o.] nudo relicto, fistulam, malleoli externi, ligamento transverso quod à fibula in calcem talumque procedit, involutus, pedii partem pertransit, & sub planta valde reflexus [tab. 21. fig. 19. t u] in radicem ossis pedii quod è regione pollicis est, in ipsius processum, qui in latere externo est: nonnunquam ad illud cui ⁱ medius innititur, lator factus inseritur, ut pedem sursum extrorsum ducat & flectat. Verum hic tendo inter ossa & musculos plantæ pedis medius ducitur, [fig. 19. t u] ne si sub cute solum procedat, sursum contractus, musculos in planta sitos & primat & in officio impediatur: sic in ossis cubiformis sede inferiore, sinus latiusculus, nec valde profundus, humore viscido oblitus & ligamento lubrico circumdatus & quem tendo, non teres ne facile declinet, sed dilatatus [tab. 21. fig. 19. t] circumducitur, quo firmius ad sinum minime profundum revolvatur: sic & tendo ^k ibidem ita induratur, ut cartilaginem exprimat, aliquando tendo osseus ac veluti sesamino ossiculo donatus conspicitur, quo promptius ad angulum acutum flexuræ vim exolvat.

Kkkk

VIII. ^l Pe-

rior seu 11. pedis musc. Columb. 4. anterior Piccolb. flectentium secundus seu Peroneus biceps, capite altero à fibula superioris epiphyssi, altero à medioperone enatus tendinem geminum emittit, Laur. g Neque inter tibia musc. anteriores, neque posteriores recenseri deberet, sed privatim externo lateri reponi apte dicatur, Vesal. Columb. h Nerveum validumque principium, Vesal. carneo nerveoque exortu constat, Columb. Piccolb. i Sic Vesal. & Plat. pollicis aut in illud cui medius innititur, Fallop. instat: in pedii ossa immittitur, Col. Piccolb. in os pedii è regione pollicis Laur. k Vesal. Plat. Gal. 2. ad an. simiam ab homine duntaxat, in pedis digitorum diductu differre existimavit, quod scilicet simia longiores & magis discretos adipiscatur, & in super quod unico tendine tantum hominem vincat, qui ad tarsum reflectatur, cartilagineus inibi fiat, ac in pedii os pollicis præpositum inseri docet: verum in homine talem profert tendinem qualem Galenus privatim simia tribuit, Vesal.

^c Non enim ut Galenus voluit in duos tendines dividitur in homine: at in simia caudatus non solum du-

plex tendo, verum etiam duo sunt musculi, quorum anterior posteriore minor est, ambo in pedii os pollicis præpositum implanta-

ti, Vesal. d Pedium, & præcipue eam pedii partem

in quam tendo infusus est, sursum ducit, ideo que pedium flectit & per consequens digitos

pedis qui ossibus pedii innituntur, Piccolb. e Fallop. obs. at in instat. non meminit.

f 7. Vesal. Fall. instat. Plat. qui hunc cum sequenti longos

vocat: 4. anterior

VIII. ¹ Peroneus secundus seu flectentium tertius [tab. 16. & seq. fig. 3. 8. 9. 10. 18. 19. N] sub precedenti tendine ^m excepto, reconditus, ipsique simili, ab eadem fibula appendice principio oblongo prodit & carnosus fibulae attensus descendit, ut ubi fibulam mediam superavit, in tendinem teretem abit, qui versus fibulae posteriora reflectitur & praedicti musculi tendini lateri anteriori attenditur, & sinui in fibulae appendicis sede posteriori insculpto incumbens, & ligamento transverso circumdatus, in priora descendit & ad malleoli exteriorem & inferiorem partem quoque reflectitur, & ⁿ scissus & bicornis [t. 19. fig. 10. f.] ne exuberaret in pedis ossis, quod digito minimo ^o praepositur, processum, validissime duplici & lata insertione implatur [t. 21. f. 19. x] & pedem ^p extrorsum ducit & flectit. His nonnum addunt Vesalius & Fallopius, [tab. 18. fig. 8. 9. p.] qui potius pars secundi digitorum tensoris, [t. 18. f. 7. 8. 9. p.] quam peculiaris musculus existit.

¹ 8. Vesal. Fall. inst. Plat. s. anterior seu 12. pedis musculus, Col. 5. anterior Piccolb. flectentis secundi pars, Laur. m. Tendinis ipsius anteriore sede exceptam, Ves. sub septimo prorsus ocellatus, Plat. d. Ves. Fall. inst. Plat. ubi una cum quarto in tendine teretem finit qui inseritur &c. Col. Picc. o. Ves. Plat. in cubiforme os, Fall. inst. in os minimi digiti fertur, Laur. p. Exteriora versus trahit, Col. extrorsum contorquet, Piccolb. flectitur pes & ad latera agitur, Fallop. inst. s.

De Musculis digitorum pedis.

CAPUT XXXIV.

Galenus hos lib. de diff. muscul. 33. & 2. adm. anat. 9. exposuit.

Pedis digiti quatuor, iisdem pene motibus quib. & ^a manus digiti aguntur, sed pollex non eo modo quo in manu aliis digitis opposito flexu ducitur, sed ejus internodium primum, pari ratione cum reliquorum digitorum primis internodiis flectitur, cum eodem ordine situs sit. Moventur autem vel in rectum, vel in latus: si in rectum, tum vel flectuntur versus terram articulis singulis separatim motis, idq; vel recta, digitorum quatuor secundus & tertius articulus, & pollicis secundus vel recta simul & oblique, digitorum quinque articuli primi. Si extendantur sit secundum lineam rectam & quidem articuli omnes simul: si in latus agantur, sit vel extrorsum digitis quatuor ad minimum adductis & minimo a ceteris abducto: vel introrsum pollice a ceteris abducto & digitis quatuor pollicis adductis. Hi motus omnes a muscularis viginti tribus absoluntur, quorum alii in tibia ejusque parte vel anteriore, vel posteriore siti sunt, alii vero in extremo pede locantur.

I. ^b Pol-

^a Musculorum digitorum pedis simili fere series est ac in manu, & iisdem prorsus motibus aguntur, musculis, 2. 1. primi articuli flexus aut rectus est, aut in alteram partem modice inclinat, quare adducuntur & abducuntur, secundi vero pollicis & quatuor digitorum secundi & tertii flexione ac extensione, simplici & in neutrum latus vergente ducuntur, Vesal. idem Plat. musculi pedis digitis famulantes 22. sunt, quorum alii flectunt, alii extendunt, Colum. musculi moventes manus inferiores, nati a partibus pedum fabricam: ingredientibus, sunt 18. sed addere oportet, quatuor natos a partibus, quae pedis compositionem non ingrediuntur, sicque digiti 22. numerabuntur, Piccolhom musculi digitorum 19. sunt, vel si numerum adaugere lubet 22. flexioni extensionique famulantes, quamvis qui primis internodiis praepositur, etiam ad latera movere videantur, Fallop. institut. flectuntur, extenduntur, adducuntur & abducuntur, muscul. 21. flectunt duo, extendunt duo, adducunt quatuor, abducunt octo, pollicis 4. & digiti minimi abductor, Laur.

I. ^b Pollicis tensor, seu extensor primus [tab. 18. fig. 8. 9. 0] in tibiae anteriore sede cum sequenti cuius lateri interno adiacet, locatus à tibia latere externo, ubi tibia os à fibula dehiscit, principium carnosum sumit, qui descendens ligamento membraneo tibiam & fibulam intercedente toto ductu adnatus, tibiae secundam anteriorem adit, ac tendine suo tereti sub ligamento transverso seu annulari [tab. 16. fig. 1. ch. 2.] per pedis superiora prorepens, in pollicis totius longitudinem parte superiore ut cum ^d extendat, inseritur. Aliquando etiam tendo in duos dividitur, & alter in pollicis articulum ultimum, alter in os pedis, ut id flectat & inseritur: hicque posterior in quibusdam musculus ^f distinctus esse videtur.

II. ^b Digitorum tensor longus, seu extensor secundus [tab. 16. & seq. fig. 1. 3. 7. 8. 9. P] in tibiae anteriori sede locatus & sub sexto pedis musculo reconditus, à tibiae summa & extrema appendice, qua fibulae sub genu connectitur, initio acuto & recto fibulam descendens in medio versus pedem descensu carnosam portionem [tab. 16. & sequent. f. 1. 8. 9. p] à latere externo diffundit, quae deorsum protensa, pedis musculum novum ⁱ quibusdam dictum constituit; mox ulterius deorsum latus, sub ligamento transverso tibiae sedem anteriorem occupante [tab. 16. f. 1. ch. 2.] cui adheret, ad fibulae finem in tendinem degenerat [tab. 18. fig. 8. ch. 12.] qui antequam ligamentum annulare transeat in tendines teretes quatuor abigit, qui distracti & per pedis superiora delati, ad digitos quatuor (pollice excepto) pertingunt & per totam eorum longitudinem expositi latioresque redditi, parte superna inseruntur, ut digitorum quatuor articulos tres simul extendant.

III. ^b Pollicis flexor seu flectentium primus [tab. 16. & seq. f. 2. 7. 16. 27. Q] qui cum sequenti in tibiae posteriore sede sub muscularum constitutentibus, totus prope modum carnosus, situs est, à parte posteriore, ad ipsius fibulae cum tibia connexum, carnosus prodit [fig. 16. ch. 13.] & fibulae aliquandiu adnatus, tibiae extremum adit, & ab interno latere tendo (qui aliquandiu in carne pronasci [tab. 21. fig. 16. w] conspiciuntur) teres prodit [fig. 16. 17. char. 14.] qui ad calcis latus internum ubi sinus ipsius gratia exsculptus & ligamento transverso obductus, oblique sub malleolo & planta transit, & nonnunquam in planta pedis, portiunculas tendinibus tertii musculi cum quibus committitur [fig. 18. char. 19.] transmittit, eundemque praecipuo suo tendine in os pollicis ad primi ossis longitudinem ligamento transverso exceptus, in secundum os lata insertionem, ut id flectat, implantatur.

Kkkk 2

Ali-
flectitur, ideo-
que sursum at-
tollit, Piccolh.

^e Hic tendo in duos dividitur, Columb. Piccolhom. saepe in duos dividitur, Laur. f In quibusdam, rarius tamen hominum corporibus, alius musculus videtur esse, ego unum solum musculum dicerem, Columb.

^g Pedis flectendo auxilium praestat, Columb. huius munus pedum flectere, Piccolh.

^h 14. digit. Vesal. instituit. Plat. 2. anterior extremi pedis, Columb. Piccolh. extensorium primus qui à summa & externa tibia exortus in tendines quatuor dissectatur, hac Laur.

ⁱ Vesal. tendinem illum in externa parte producit, quem 9. musculum pedis diximus, Fallop. instit. ad finem fere fibulae carnosae huiusce musc. radix est Columb. nonum in progressu pedis educit musculum, Plat.

^l 2. digit. Vesal. Fallop. instit. 3. digit. Plat. 7. extremi pedis in tibia, Columb. Piccolhom. pollex peculiare habet musculos, flectitur unico à tibia prodeunte, hac Laur. pollex non privatim ut in manu movetur, Plat.

^m Vesal. Fallop. instit. nonnunquam hoc fit, Plat.

Aliquando sub planta in tendines duos dividitur, & majorem ad pollicem, minorem ad indicem transmittit, & tum flexor subsequens tantum in tendines tres dividitur. Huic tendini priusquam secundo pollicis ossi inseratur, sesaminum officulum magnum lubrica & laevi superficie præponitur.

IV. ⁿ Digitorum flexor magnus, vel longus, seu flectentium secundus [tab. 21. fig. 16. 17. 18. R.] prædicto adjacet & tibiæ ossi magis quam fibulæ innititur [tab. 21. f. 18. magis A quam B] à tibiæ carnosus sub poplite [fig. 16. ch. 16.] exoritur & descendens ferre ad calcem ab interno latere tendinem teretem producit [fig. 16. ch. 17.] qui sub malleolo interno & calcis sinu peculiari [fig. 9. D.] & ligamento transverso à tibiæ appendice enato, delatus, sub planta præcedentis musculi tendini subjectus & cum illo de cussationem faciens [fig. 17. inter ch. 17. & 15.] in pedis medio in tendines quatuor dividitur [fig. 17. ch. 18.] qui ligamenti vincti per tendinum musculi subsequenti sectionem transeuntes, in digitorum quatuor articulum tertium, secundum ossis longitudinem, latiores tamen redditi, ut eos flectant & valide astringant & inter se adducant, inseruntur.

V. P Digitorum flexor alter vel brevis, seu flectentium tertius [tab. 21. fig. 16. 17. S.] sub planta media situs est, & à calcis ossi sede inferna ejusque tuberculi parte anteriore, principio nerveo carnosoque mixto oritur, quod statim ab exortu carnosum evadens, versusque digitos incedens sensim ad pedis formam dilatatus, ad ejus medium in quatuor partes carnosas dividitur [tab. 21. fig. 16. ch. 21.] quæ diductæ singulæ tendinem teretem producant, qui ad radicem primi articuli, ligamento transverso excipiuntur, & sectione longa, quemadmodum in manu divisi, in digitorum quatuor os secundum singuli latecentes inseruntur. Hic digitorum quatuor internodium secundum flectit. Hujus etiam universæ carnosæ substantiæ tendo latus [tab. 20. fig. 15. Z.] pertinaciter subnascitur, quod 9 lati tendinis in manu vices gerit, qui aliquando musculi tertii pedis sive plantaris tendo existit: qui sensus est exquisitissimus, quo externas injurias, quam citissime perentiamus.

VI. ^a Abductor pollicis inferior [tab. 16. & seq. fig. 1. 2. 7. 11. 16. T.] hic pedis lateri interno secundum totam longitudinem muris effigiem referendo, adjacet, & à calce interius penes prædictum, nervosis prodiens, carnosus redditus, pedii ossi pollicis præposito alligatur, & in tendinem teretem degenerat, qui in pollicis os primum extrinsecus implantatur, ut eum à cæteris abducat.

VII. ^y Abductor minimi digiti inferior [tab. 16. & seq. fig. 3. 4. 15. 16. V.] in pedis parte externa situs à calcis parte exteriori, ubi tuberculo donatur nerveo ^z principio enatus,

iporum ope flecti, at transverforum ligamentorum gratia oportere ossis motum ascribi, non admodum concedimus. Ves. p. 1. digiti. musc. Ves. Col. Fall. inst. Plat. 2. flectentium seu minor & profundus, Laur. q. Tendo latus, Ves. Col. Piccol. 1. Galenus quoque censuit, de dissect. musc. tibia musculum quartum faciens. 1. Plantam indecirco depilem aliqui censent, quod falsum credo, cum lepori non desit hic tendo, cujus planta nibilo secius pilis referta est, Col. 1. 16. digiti. Ves. Fallop. inst. Plat. 2. digiti. Col. Piccolb. abductor pollicis, qui à calcis interna parte carnosus enatus principio in primum pollicis os inseritur, hac Laur. u. A ligamenti calcem talo. connectentibus principium nervum assumit, Ves. Fall. inst. carnosus ab interiore calcis parte, Piccolb. à calce exortus, Plat. x. In simis adhuc unus est à pedis osse indici præpositum pollicem pronatus, illumque indici quam proxime admovent, quem Galenus 2. ad. an. cum cæteris in pedo repositus, recenset Ves. y. 17. digiti. Ves. Fall. inst. Plat. 3. digiti. Col. Piccolb. abductor minimi digiti à calce exortus, adeo ut hi (intellige 6. & 7.) abductores tenari & hypotenari respondeant: hac Laur.

tus, quod carnosum redditum, musculi exquisiti formam exprimit & pedii ossis processui digito minimo præposito affigitur, & in tendinem teretem finit, qui primi ossis parvi digiti lateri externo infigitur, ut ab aliis digitis abducatur. Hi tres à tendine crasso & lato, uti in vola manus fiebat, integuntur.

II. IX. X. XI. ^a Sive extendentium 3. 4. 5. & 6. Lumbricales dicti [tab. 21. fig. 17. 18. x] qui sub pedis planta siti sunt, & à ligamento quatuor tendines ^b musculi perforantis seu flexentium secundi obvolvente exorti, teretes ac parvi tendinibus musculi digiti extendentis ^c implantantur, ut articulum ^d secundum & tertium extendant. Hi quoque roboris gratia carnosam portionem, prædictis tribus subjectam à calce acceptam obtinuerunt.

XII. ^e Abductor digitorum superior [tab. 16. fig. 1. 8. 9. 10. 11. T] in pedis extremi sede superiore & gibba situs, latus & gracilis est, qui à ligamentis, ^f quod ad calcem & cubiforme existit supra tarsum & pedum carnosus oritur, & oblique versus digitos porrectus in partes carnosas 8 quatuor dividitur, quas singula tendinem teretem efformant: quorum maximus pollicis lateri externo versus superiora, secundus indicis, tertius medii, quartus annularis (rarius enim minimo digito ^h exiguus exporrigitur) inferitur, ut digiti ad latera ⁱ moveantur, & ad latus externum abducantur. Quando vero tendines quatuor tantum habet, tum digiti minimi tendo à pedis musculo tertio externo oritur, quamvis abductor minimi digiti inferior, huic officio satisfacere possit.

XIII. A ligamento primi internodii minimi digiti, nonnunquam ab altero annulari principio lato & nerveo enascitur, mox carnosus redditus transversim incedens,

Kkkk 3

super
tendinibus ena-
zi, hac Laur.

^B A tendinibus musculi perforantis, Columb. Piccolhom. Laur. non à tendinum in volucris, ut in manu, sed à calcis ossis exoriantur: à ligamentis enim tarsi ossa pedis ossibus in planta colligantibus musculosum corpus enascitur, quod in musculos 4. & graciles deductum, digitorum 4. lateri interno inferitur, Ves. Plat. ^c Eadem ratione, qua in manu suis chordis implantantur, in chordas exteriores, qua extendunt, Fall. obs. exiguu tendine lateribus digitorum applicantur, ad latera quoque movent articulum, Fall. instit. terminantur in tertia ossa 4. digitorum ut ascendunt ad superiorem horum digitorum partem sub ungibus in extremos usque digitos progressi. Piccol. d. Sic Fall. observ. quatuor digitos ad latus internum versus pollicem adducunt, Ves. Plat. Gal. & Ves. 4. digitos à pollice divellere volunt, quoniam desinunt in 4. tendines, qui procedunt per externam partem 4. digitorum, & alligantur tendini superiori, quem extendere diximus: progrediuntur autem usque ad extremos digitos, nec desinunt in primo articulo, quemadmodum voluit Vesal. qui his obliquum duntaxat morum concedit: sed meum, hoc est inventum, quod non moveant obliquo motu, sed 4. digitos vere extendunt, & ab his magis extenduntur, quam ab aliis tendinibus ut sensu oculorum à quovis in secundo perito deprehendi facile potest, Columb. extendunt non minus quam quatuor tendines, secundi musculi anterioris. Piccolh. c. 16. digite. Vesal. Fallop. institut. Plat. 18. pedis muscul. Columb. Piccolh. extendentium minor. Laur. ex Galeni sententia duo hic essent musculi, quorum unus indicem & medium à pollice adducerent, alter anteriorem & parvum extrorsum in latus amoverent: dein ex tibia in pollicem alius infereretur: cum in summa in pollicis superiora, à tibia duo exporrigantur: dein duo in superiori pedis sede: obliquo situ repositi videntur 4. digitos à pollice adducere, Vesal. h. Fallop. institut. Columb. Piccolhom. à ligamentis in latere tali positis, Vesal. Plat. à superiori tarso oritur, Laur. g. Vesal. Fallop. institut. Plat. in 5. nonnunquam 4. Columb. in 5. Piccolh. in 4. interdum 5. Laur. h. Semel & admodum obscure illi quoque exiguum tendinem exporrigi animadvertit, Vesal. inferitur in omnes digitos, Col. Piccolh. nonnunquam & minima tendinem suppeditabat Plat. minimum tendinem non emittit, Laur. i. In externum latus abducens, Ves. versus minimum abducit, Plat. ad latera movent, Fall. instit. digitos movere, oblique extendens, Col. Piccolh. Laur.

a 19. 20. 21. 22.
digit. Vesal.
quatuor mu-
scul. digiti. pedis
inter 3. & 7.

Col. 4. 5. 6. &
7. à partibus
pedum nati.
Piccolh. qua-
tuor in pedis

planta postremo
enarrati, Fall.
instit. quatuor
tendinibus in
pede adnati.

Plat. adducunt
digitos lumbrici,
4. à profundi
seu digiti flex-
oris magni

tendinibus ena-
zi, hac Laur.

super primos digitorum articulos delatus, in tendinem latum, sed brevem definit, qui in primum magni digiti articulum nonnihil introsum inseritur. Hujus usus geminus est, primus ut ipso agente commodius per loca inaequalia incedamus, & sic quasi apprehensio fiat. Alter, ut dum non agit, sit ipsi pedi instar ligamenti, ne dum per plana incedimus, ped & planta amplior fiat, quam par sit, sicque digiti à se invicem abducantur: de hoc musculo D. Julius Cæsser primus ad nos scripsit.

k Inter 3. &
14. dig. pedis,
Ves. Fall. inf.
locarunt inter
7. & 18. Col.
Piccolh. inter-
ossei 8. abdu-
cunt à pedis of-
sibus orti &
spacia metape-
dii opplentes

k Decem^l interossei huic subjacent [tab. 21. fig. 18. 19. Z] qui ad flexores referendi sunt, qui in planta consistentes carneam molem rudem & indigestam, fibris rectis interstinctam ostendit, quæ à pedis initio proficiscitur, & secundum ejus longitudinem ducti, spatia interossea opplent, & in digitorum quinque radices^m seu ad ligamentum primi internodii interiora versus bini inferuntur; quo duobus simul agentibus articulum primum flectant, & altero solo agente, ad latus vel extrosum vel introsum, prout musculi origo fuerit & situs, ducit. Horum tendinibus brevibus & latiusculis, sesamina ossicula corporis nostri majora, ad musculorum robur adnascuntur.

flexioni quoque non parum inserviunt: addit, adduci unius opera pollicem ossi pedis maximo intus attensis. Laur. 1. Non ita exactio numero in pede atque in manu comprehendi distinguere queunt, quare in musculos proprios subdividere nequeo, quamvis sibi implicatos, quasdam inscriptiones commonstrant. Vesal. quia utrinque tendinibus decem quinque discentes digitos, ut in manu, sed potius videntur desinere in ligamentum primi articuli digitorum facti ad hoc, ut magis flectant, quam quod extendant, extensio enim non ita necessaria in digitis pedum est, veluti in manu, Fall. obs.

De Venis Pedis.

CAPUT XXXV.

De his consule Galenum libro de dissect. ven. & arter. 8. & 3. administ. anat. 12.

Venam cavam in truncum superiorem seu ascendentem, & inferiorem, doctrinæ causa, libro primo divisimus, quorum uterque ramos suos per ventres, & per artus distribuit: de ascendente & diaphragma pertransiente, ejusque propaginibus per thoracem libro secundo, per caput, libro tertio egimus: quemadmodum de descendente & ramis per infimum ventrem distributis, libro primo sermo fuit. At de venis per artus disseminatis, cum alii à ramo ascendente per manum ferantur, alii à ramo descendente per pedes, de illis in prima hujus libri parte egimus, de his vero nunc dicendum erit.

Vena cava in ventre infimo ad sacrum os descendens, ubi ad quartam lumborum vertebram pervenit & arteriæ magnæ substrata fuit [tab. 22. O] in truncos duos æquales dividitur: quorum alter dextrum, alter sinistrum crus adit: at priusquam peritonæi cavitate excidant, Iliaci dicuntur [tab. 22. inter O & G] horum tam dexter quam sinister statim in ramos duos [tab. 22. p. 5] interiorem & exteriorem subdividitur, à quo varii soboles disperguntur, quemadmodum libro 1. explicavimus: inde Cruralis dici incipit [tab. 22. G] & postquam ramus internus [p] duabus propaginibus ad os crucis descendit, os pubis [ei] pertransit, & surculum ad coxendicis acetabulum misit, quo in illius regionis musculos femoris interiora amplexantes disseminetur, ramo cutim

cutim in femoris sede interna subit: mox cum ramo crurali interno [char. 2.] jungitur [x] & cessat. At cum eo loci versus femoris plicaturam infimam, cavitas quædam sit, ubi cava ramus in plures propagines dividi debuit, quo venæ propagines firmiores sint, Glandulæ frequentes circumpositæ, quæ etiam arteriæ & nervo illæ cum venâ descendentibus propugnaculo sunt. Etenim plures hoc loci Glandulæ occurrunt, aliæ supra inguen p: ope ossis ilium spinam inferiorem, qua vasa spermatica peritonæi productioni inclusa feruntur: quæ duæ sunt, oblongæ, productionem amplectantes, quæque in lue Venerea intumescunt. Aliæ quatuor, quæ jecoris emuntoria sunt, Venam cruralem circumstant: infra has est & alia magna & oblonga, bubonum pestilentialium sedes.

^a A crurali [tab. 22. G.] quæ venarum cæterarum in crus excurrentium caudex est, & a trunci venæ cava ramo exteriori [tab. 22. s.] p: onder, utrinque rami sex prodeunt.

I. ^b Saphæna seu malleoli [Θ] quæ insignis & longissima, Arteria conjuge carens, una cum nervo per cruris interiora inter cutim & pāniculum carnosum ad genu versus malleolum internum delata in pedis superiora versus digitos pollicem præsertim varie dividitur, absque furculis eo missis, commiscetur. Ab hac communiter propagines quatuor per cutim sparguntur: prima duplex est, altera interior [Δ] quæ adhuc in inguinum sede utrinque ramos ad femoris interiora, inguina & peritonæum mittit: altera exterior [Ξ] & major quæ in femoris anteriora & exteriora, quemadmodum & interior in soboles desinit; secunda ad cruris medium [Π] tibiæ musculum primum adit: tertia ad genu posteriora versus orbiculatim convolvitur [Σ] parte una in patellæ cutim, altera in poplitem: & hæc quando poplitis vena [ch. 6.] solito major est, penitus deest, vel impenso gracilis existit: quarta ad tibiæ medium [Φ ad Ψ usque] soboles antrorsum & retrorsum diffundit, qui cum proximis venis varie coeunt, rursusque dirimuntur. Nonnunquam a tibiæ parte interiore seu malleoli anteriore regione reflexa, ad pedis superiora excurrit [Ψ] & in omnes fere pedis digitos distribuitur; sed furculis supra pedem & ad digitos plurimum variat; siquidem in quibusdam cum aliis ramis commixta, ad digitum minimum, aliquando versus pollicem & indicem excurrit, quare raro in ejusdem hominis utroque pede, eadem venarum distributio, numerus & magnitudo existit. Hæc a medicis in uteri affectibus, præsertim in mensium retentione, circa malleolum secari consuevit: & Hippocrates † venas malleoli secabat. Sane in coxendicis dolore venam ad malleolum externum felici successu hæcenus secare jussimus. Sic etiam a nostris supra pollicem in capitis affectibus pro vena cephalica inciditur.

II. Ischias minor [Ω] prædictæ opponitur, nam quemadmodum illa cruralis, trunci ramus interior, sic hæc exterior est brevis, quæ extrorsum & transversim in coxendicis articuli cutim anteriorem & ejus loci musculos disseminatur. Mox truncus ipse post

^a Vesal. omnes hos ramos, sed absque nominibus exponit: Columbus Saphæna, Ischii & poplitis meminit: Sylvius & Laur. venas sex proponunt, nominibus quibus recensemus

Fall. Saphænam habet & Ischii; Plac. cutaneas quatuor.

^b Cutanea 1. Plac. Externum, Laur.

† 6. epid. Strigam ancilla ex filia patris uteri osculum convolutum habuit & in coxendicem & tibiæ dolor post firmatus est: secta ad malleolum voluit hominem

libidinis pruritum aliquid facere voluit: in talo inquit, venæ sunt, quæ ad renem, femorum atque virilium rationem pertinet: quarum aliqua ad pollicem usque tendunt, quas & Physici & mulieres ad obtrahendos partus & ischiadicos dolores, eodem phlebotomiant loco & emplastrum entaticum applicant quod Sydenham; Africanus in iatrosofistis vocavit ab arrectionis facultate, necesse est & pollicis atque talo imponi præcipit. Quin & Orphici testimonio illum locum principalem esse libidinis affirmat.

lum vena convoluta: Vide apud Gal. lib. d. tremore & palpit. & lib. de Vena sect. Verū Hipp. li. de loc. in h. m. voluit hominem venis malleoli scissis infecundum reddi. Contraria est Fulgentii Placiade sententia, qui malleoli venas ad libidinis pruritum aliquid facere voluit: in talo inquit, venæ sunt, quæ ad renem, femorum atque virilium rationem pertinet: quarum aliqua ad pollicem usque tendunt, quas & Physici & mulieres ad obtrahendos partus & ischiadicos dolores, eodem phlebotomiant loco & emplastrum entaticum applicant quod Sydenham; Africanus in iatrosofistis vocavit ab arrectionis facultate, necesse est & pollicis atque talo imponi præcipit. Quin & Orphici testimonio illum locum principalem esse libidinis affirmat.

post inguina inter musculos femoris os amplexantes immergitur, & de se spargit ordine tertiam.

III. Muscula [char. 1.] quæ gemina est & aliquando sibi mutuo correspondent: harum exterior & minor [char. 1.] tibiæ musculis extendentibus secundo & quarto & in cutim furculos diffundit; interior & major [char. 2.] quique profundior, per femoris musculos fere omnes, potissimum quintum & tibiæ extendentium tertium divaricatur, & tandem finem ejus venæ [et] quæ per pubis ossis foramen in femur deferretur assumit [et] qua aucta ad genu usque, sed inter musculos latitans, descendit.

Maxima vero vena Cruralis dicta [G] in femoris medio sensim posterius contorta, soboles exiguas membranis, nervorum crus petentium offert. Dein ^d emittitur quarta.

^d Cutanea 2.
Plat.

IV. Poplitea, quæ ex duobus ramis cruralibus [char. 3. 4.] unitis conflatur, à qua in exortu posterius sursum furculi in cutim femoris mittuntur, [char. 5.] dein sub cute recta, per medium poplitis flexum delapsa [char. 6.] ad calcem usque [char. 7. inferius] aliquando ad malleoli externi cutim, aliquando & in inferiorem descendit: à qua in progressu ad suræ cutim, ramulos plurimos alios rectos, alios obliquos, alios transversos inæquabiliter, commixtos & cœcuntes, spargit. Nonnunquam simplex occurrit, & interdum ramum à vena ad quintum femoris musculum [char. 2.] missum, ipsa poplitea [char. 3.] assumit, & cum ea junctam in cutim femoris posterius excurrit, & furculos aliquot sursum mittit. Hæc vena est, quæ sub genu ab antiquis frequenter incidebatur, cujus sectionem Hippocrates * in renis dolore commendavit.

* 6. epid. sect. 1.
aph. 5.

V. Suralis: cruris vena magna ad femoris inferiora posterius ramulos in exortum musculorum trium suram constituentium utrinque transmissis [ad char. 8. utrinque] in poplitis regione, in truncum anteriorem & posteriorem discinditur: exterior [char. 9.] postquam oblique versus fibulæ cum tibiæ connexionem ramulum [char. 10.] extorsum in cutim genu anterioris distribuit, mox sub genu in duos ramos seinditur, anteriorem [char. 11.] qui cum fibula inter pedis musculos descendit, & ubi eorum canosa portio finit, etiam cessat, & ad cutim non fertur: exterior vero ^e [char. 12. 13.] secundum tibiæ externam sedem, malleolumque externum, pedisque superiora, extorsum tamen cutim accedit, varios quoque furculos, quemadmodum & poplitea [char. 7.] distribuens, & cum popliteæ furculis, potissimum in pedis dorso se commiscens [char. 20.] varium illum venarum implexum, qui in pedis superiore sede sub cute conspicitur, efficit.

^e Cutanea 3.
Plat.

Interior [char. 14.] recta per tibiæ posteriora descendens, à latere interno ramum spargit [char. 15.] qui per tibiæ internam sedem ^f ad calcis & pollicis [char. 16.] latus internum sub cute disseminatur, & furculis vicinis unitur, rursusque divaricatur, quemadmodum jam tertio de aliis monuimus: quæ causa sane est, cur pars hæc crebro varicibus infestetur: videtur autem hæc venarum & unio & rursus earum distractio necessaria, ne cute læsa, venisque aliquot transversim abscissis, cutis adjacens alimento destituatur. Quare cum in cruribus, tribus aut quatuor locis venæ internæ cum

^f Cutanea 4.
Plat.

cum cutaneis uniantur, maxime vero in pede, si unam & ex superficialiis incidere animus sit, non est quod adeo in delectu solliciti simus quasi peculiares venae essent, ex diversis partibus vel visceribus corporis eductae, & non ex uno trunco propagatae.

At truncus interior [ch. 14.] ramo praedicto [ch. 15.] constituto, in alto latitat, aliam venam educit, quae Ischias major vocatur.

IV. ^b Ischias major [ch. 17.] portione majore per surae musculos delata soboles exiguas diffundit, & ubi ad separationem tibiae ossis a fibula accessit, ab anteriori sede propaginem magnam [ch. 18.] educit, quae ligamento membraneo perforato inter musculos, qui tibiae anteriorem partem occupant fertur, & in descensu furculos musculis vicinis impertit, & sub ligamento annulari delata, in pedis sede superiore, divisa tamen in musculofam ipsius substantiam distribuitur, & digitis singulis binos ramulos largitur. Haec in coxendicis affectibus circa malleolum externum incidere consuevit.

Quod interioris rami [ch. 14.] reliquum est inter dictos musculos posterius porrigitur, pedis humilia petit, & in multos ramulos seriatim absumitur, quorum fere bini, digiti cujusque sedem internam perreptant, aliquando tamen minimo digito quinque, medico duos, medio unum furculum largitur, & tunc a portione prior tantum in quinque digitos majores distribuuntur.

Virginalis ipsi vocatur, & exteriori assignant malleolo, schiaticam illam nominantes.

III. in superioris pedis sede recensent, ex venarum ramulo quopiam, pollicis porrigendo adjunctam, illique popletica vena nomen accommodant.

IV. renalem vocant, ipsam ex ramulis quibusdam confingentes, qui minimo digito sunt proximi. Verum interim venas in poplite & sub genu in sanguinis missione magis quam pedis venas aperiendas negligunt, uti & omnes in corporis alto reconditas. Ves. Quare vera est sententia Hipp. lib. de alim. & Hippocr. lib. de epidem. & Galen. lib. de diff. ven. leg. runt totidem venas pedi tribuunt, singulis rarum propriumque sanguinis educendi munus ascribentes: ac i. statuit, quod internum perreptat malleolum & saphena & metatarsica vena &

De Valvulis, seu Ostioliis venarum.

CAPUT XXXVI.

DE his primus Avicenna egisse videtur, dum cellulas in venis statuit: has Cl.

Hieronymus Fabricius ab Aquapendente a Patavinus Anatomicus anno 1574.

LIII

publi-

a Ostiola venarum nullus prius vidit, quam anno

1574. à me summa cum laetitia inter dissectandum observata fuisse, Aquapen. valvula membranacea in interna capacitae, venarum brachiorum & crurum in cada vere anno 79. sese obtulere hactenus incognita, fertur anno 79. ineunte, Hieron. Fab. Aquapendente Patavii spectantium oculis subiecisse: quas eodem anno currente ipse quoque in theatro nostro hanc membranas venarum repraesentavi, Fabricii observ. admonitus, Salamon Albertus. Piccolhomini venarum & arteriarum distributionem omittens, rationem addit, quia hanc rem celeberrimi anatomici, praeteritis rebus accuratissime tractantes ab illis petendum: Subjungit, unum addere volo magni momenti ab omnibus praetermissum, quod mihi summam admirationem, cum illud comperi, ita excitavit, ut fere in ecstasi ageret, quod est in me- diis venis reconditas esse, innumerabiles pene valvulas, quemadmodum in orificiis vasorum cordis. Haec venarum valvula,

valva maxime conspicua sunt, in divisione ramorum, vena cava, quarum alia superna deorsum, alia inferna sursum spectant: Exempli gratia, ubi vena cava diducitur in jugularem externam & internam, ibi collocata jacent valvae superna deorsum spectantes. Haec valvae venas claudentes, tantum spatii relinquunt, quantum satis sit sanguini in superas partes astracto. Quis si non adesset dum homo, ut dormiat vel ut quiescat decumbit, universus sanguis fluidus exitus irrueret in cerebrum (cujus via a trachix præpotens est) hujus ventriculos infarciens & apoplexiam committens, imo mille cerebri affectus præter naturam procreaturus, similiter in inferioribus venis: Exempli gratia, ubi vena cava bipartito scinditur in tibias progressura sunt collocata valvulae inferne sursum spectantes: ne sanguis cum sit gravior & fluidus, totus repente procumbat in pedes inferioresque partes. In venis itaque à natura constitutae sunt valvae idque ex parvis venarum intervallis, alias sursum alias deorsum spectantes in eorum præclarissimos usus, quos exposui paucis: hæc Piccolhom. Observarunt recentiores: quidam in brachiorum & crurium majoribus venis, ostiola quaedam, valvularum & membranularum instar, qui sanguinis ad inferiores partes ad præconfluentis impetum sistunt: truncus autem vena cava ob admodum semper est patens perviusque, hæc tantum Laur.

publice demonstravit, de quibus tractatum scripsit anno 1603. cum: & Salomon Albertus Witebergæ, anno 1579. ostendit, & anno 1584. de iis scriptum divulgavit.

Valvulae in venis artuum reperiuntur, quæ nihil aliud sunt quam portiuncula tunicae venarum in earum cavitate eminentes, eamque dimidiam interceptantes, & quasi angulum efficientes: quare venarum corpus nusquam textu rariore constat, atque ubi membranulae hæc veluti abscedunt: Ostiola alii appellare malunt.

Sicæ sunt in venis brachiorum & crurum, supra subterque, post alarum & inguinum glandulas, & quidem proxime sub ramorum exortibus, qui à lateribus venarum in partes vicinas nutritionis causa disseminantur; quo scilicet sanguis ad alias partes distribuendus, eo loci subsistat, ne totus per unicum cumque ampliore retumque canalem deferatur, eoque rami minores & oblique propagati frustrentur. Hæc ad venarum capacitatem mediam pertingunt, nec ramorum à cava emergentium meatus occludunt: natura namque valvulas ramis subpicere maluit, quam ostiis eorum præponere: Sic enim humorum regurgitatio exclusa fuisset, quæ tamen necessaria est admodum, quemadmodum revulsio medica docet. Sic in orificio jugularis venæ internæ, bina reperiuntur, ne capite nimium reclinato, sanguis impetu in cerebrum ruens, partem nobilem obruat. At cavæ truncus, qua ventrem medium & infimum perrepat & parte truncus, & jugularis externa, cum tantum capitis partes externas alat, his destituuntur, quo sanguis sine obstaculo, quoquo versum distribui possit, tum ad substantiæ deperditæ restitutionem, tum ad spiritus generationem: sic quoque venæ externæ exiguae innumeræ his quoque destituuntur. Arteriæ quoque valvulis carent, quo sanguis & spiritus vitalis, momento in partes remotissimas ferantur: præter eas quas in cordis historia, ad Arteriæ magnæ & coronariæ exortum, & Arteriæ venosæ orificium, explicavimus.

Numerus earum incertus est, & intervalla quibus disclusæ sunt, admodum dispersæ.

in Vena azygo valvulas collocant Amatus, Hollerius, Rioli, et Eustachius, Carcanus, & Laurent. rident: intra cavam propejocur valvulas esse, quæ sanguinis in hepate elaborati regurgitationem impediunt, Carolus Stephanus scribit: In emulgentibus Vesal. notavit sunt qui intra venas crurales præter valvulas etiam tubulos digiti longitudine ex eadem vena substantiâ conflatos notavimus, ne sanguis magna copia collectus, venam effringat.

in Vena azygo valvulas collocant Amatus, Hollerius, Rioli, et Eustachius, Carcanus, & Laurent. rident: intra cavam propejocur valvulas esse, quæ sanguinis in hepate elaborati regurgitationem impediunt, Carolus Stephanus scribit: In emulgentibus Vesal. notavit sunt qui intra venas crurales præter valvulas etiam tubulos digiti longitudine ex eadem vena substantiâ conflatos notavimus, ne sanguis magna copia collectus, venam effringat.

ia: communiter tamen geminae occurrunt; nisi paulo supra ligamenta transversa, quae tendines manuum pedum & digitorum continent, & ubi venarum ampliando coartari incipit, ibi pauciora apparere incipiunt, donec penitus evanescent. Ubi enim sanguinem plus & diutius remorari conveniebat, duae valvulae; ubi minus una tantum apposta fuit: potissimum autem una apposta, ubi ex ramo majori, minus aliquod vas oblique producit. Quoad intervallum, licet per vasis longitudinem ferantur, atamen quibusdam locis duorum, aliis trium, quatuorve, aliis quinae digitorum intervallo distincta sunt, ut exempli gratia, Axillaris statim in exortu suo, duas habet seriatim dispositas.

In Cephalica quatenus sub deltoide musculo defertur, valvulae duae adsunt, inter se digitis fere quinque distantes: in Basilica per brachii partem internam progrediente, quatuor valvulae satis magnae occurrunt, quarum prima à secunda, intervallo digitorum quatuor; secunda à tertia, trium; tertia à quarta duorum distat: quibus duae parvae simul junctae succedunt.

Sic in pede, in vena cava, antequam subdividatur ad inguina, duae valvulae magnae posita sunt, mox divisa in profundiores seu majorem & in minorem: major duobus locis binas habet valvulas digitorum fere quatuor intervallo distantes: sic ad popliteam unam: hinc ad suram binas mox unica tandem binas sequuntur. At in trunco minore plures reperiuntur: nam in bifurcationis initio, valvulae binas sunt, quibus duorum digitorum intervallo binas aliae, rursus trium digitorum intervallo, duae aliae succedunt. Et in eadem saphenam constituyente, unica occurrit, digitorum quatuor spatio recedens, ab hac binas: & sub poplite, totidem digitorum intervallo, binas aliae: sub his trium digitorum intervallo, unica: hanc quatuor digitorum spatio alia sequitur: sic quinque digitorum intervallo, alia occurrit: mox ad talum binas: sub his spatio digitorum trium unica, & eadem fere distantia, ultimam conspicitur: reliquum Saphenae sine valvulis ad pollicis apicem excurrit.

At quo sanguinis validior cursus retardetur, Valvulae haec non per lineam rectam sive ex eodem latere locatae sunt alias totus sanguis recta per vasis partem liberam defluxisset; quare haec artificio miro sedem suam variant, ita ut si in parte superiore valvulae duae existant, per intervallum quoddam, aliae duae in parte inferiore haereant, ita ut sequentium membranularum cornua praecedentium media sive convexa respiciant, & vicissim; ita tamen, ut in medio se utrinque non contingant, sed tramitem reliquant, quo sanguis deorsum labi, ac in reliquas valvulas aequae incidere possit & sic inferiores valvulae, quod à superioribus delabitur, remorantur, sanguinis vero transitus minime impeditur.

Figura valvulis sigmoideis cordis similes sunt, non vero substantia, nec numero: vel lunae cornutae figuram repraesentant; exterius vero nodis in plantarum ramulis assimilari possunt, nam si in viventibus brachium ad sanguinem mittendum ligetur, per intervalla nodi quidam exterius conspiciuntur, imo in rusticis varicum modo in cruribus intumescere conspiciuntur: & Varices alia de causa non fiunt, nisi quia sanguis crassior à valvulis his detentus, venas earumque valvulas dilatat: sine his enim venae aequaliter dilatarentur & intumescerent. Et haec sursum versus venarum radices apertae sunt, inferius vero & ad latera, venis connatae, cum earum portiunculae sint. Quod si eas calamo venae inserto leviter inspires, tum valvulae utriculi instar, foras protuberabunt.

LIII 2

Sub-

c Indicius autem
liorum trium
digitorum un-
guem imitan-
tur, Aquap.

Substantia earum tenuissima est, quo minus spacium occupent, densissima tamen roboris gratia, ne à sanguinis violento influxu frangantur.

Ulus, sanguinem ad partes inferiores fluentem retardare, ne impetu quodam fluminis instar, propter artuum declivem situm, prolabatur & sic partes inferiores alimenti affluxu opprimantur & tumore premantur, superiores vero alimento defraudentur: sed ut in majoribus vasis ceu fonte alimentum subsistat, quo venis exiguis nutrimentum minime desit. Dein, cum venæ creatæ sint, non solum ut sanguinem in partes vehant & derivent, sed etiam ad ejus perfectionem conferant, procul dubio dum concoctioni incumbunt, valvula sanguinis cursum & impetum retardant. Tum ut venis robur addant, quo in varicibus venarum distensio nimia & ruptio prohibeatur, cum venæ ex substantia membranæ, simplici ac tenui conflatae sint. Sic cum artus frequentissime & vehementer exerceantur, earum calor exciteur, sicque sanguinis copiosus affluxus causari possit, ne ruptionis periculo subiecta sint impediunt: imo etiam ne ex nimia sanguinis attractione, partibus principibus alimentum subtrahatur, obstant.

De Arteriis Pedis.

CAPUT XXXVII.

De his egit Gal. lib. de diff. ven. & art. 9. & 3. adm. anat. 13. & 16. usque part. 10.

Arteria magna circa^a lumborum vertebrae inferiores, vel supra ossis sacri principium in ramos duos insignes Iliacos [tab. 23. vv.] dividitur; horum quilibet utrinque in duos alios subdividitur, internam unum, externam alterum [ξφ] Interior [ξ & tab. 17. lib. 1. g.] propagines duas de se fundit, externam [ο & tab. 17. lib. 1. ff.] Musculam inferiorem nominatam, quæ transversim in musculos ilium ossis sedem externam & coxendicis articulum integentes fertur & absimitur: internam [π & tab. 17. lib. 1. uu.] seu Hypogastricam, quæ recta deorsum fertur, & ad hypogastrii partes, ut vesicam, uterum &c. furculos diffundit: hujus rami [ξ] reliquum [sub s] descendens, primo arteriam umbilicalem [p] sui lateris admittit: dein ab externo ramo primæ divisionis, portionem adsciscit [iuxta φ] sicque aucta, pubis ossis foramen transit, in crus fertur, & in musculos pubis os occupantes distribuitur: tertio, in fine cum alia [ψ] arteria coit [ω] Exterior vero ramus live caudex ipse cum vena sua deorsum latus, in ventre adhuc existens [supra φ] propaginem extrinsecus Epigastricam dimittit [π tab. 17. lib. 1. ch. 2. 2.] sursum abdominis musculos extra ventris cavitatem mittit: intrinsecus aliam pudendam [ο & tab. 17. lib. 1. ch. 15.] quæ secundum pubis os, aliquando extra, aliquando intra peritonæum Arteria existente prorepat: de quibus

a Ad sacri ossis principium in duos grandes truncos bipartitur. Ves. statim in ipsius ossis principio, ut vena cava dividitur. Pla. Arteria in lumborum regione dividitur in duos ramos insignes, quod omnes asserunt, non in illa parte unde incipit os sacrum, sed in ea præcipue in qua est ligamentum cartilagineum, quo tertia & quarta vertebra lumborum colligantur: veluti etiam vena cava non dividitur in principio ossis sacri, sed supra corpus quartæ lumborum vertebrae, Fallop. observat. Juxta ossis sacri initium divisa, Fallop. instituit. ad penultimam lumborum vertebrae, in nonnullis ad ultimam, in duos ramos dividitur, Columb.

quibus consule libri primi caput 20. Hic constitutis Arteriæ magnæ truncus Iliacus peritonæum transiens è ventris cavitate in crura procidens Crurales constituit [φ. & tab. 17. lib. 1. ch. 16.] quæ Venæ crurali æqualis non est, à quibus utrinque rami^b in totum pedem disseminati propagantur.

I. Muscula cruralis exterior [α] ex trunci cruralis parte exteriori procedit & deorsum lata in musculos anteriores, femoris os amplexantes, suis furculis absumitur.

II. Muscula Cruralis interna [ψ] ex dicti trunci parte interiori, aliquando prædictæ ex opposito respondens, propagatur & musculos femoris interiori sedem occupantes distribuitur; & hæc ad genu demissa, suo quodam ramulo, cum hypogastrica ramulo [ρ] extremo commiscetur [ω.]

III. Poplitea [τ] cruralis truncus sensim deorsum prorepens & sub poplite, vena majore comitata descendens, propaginem hanc constituit, quæ furculis aliquot in musculos femoris posteriores excurrit, & cum vena poplitea aliquo usque deducitur.

IV. Suralis: truncus in poplite latitans, vel paulo sub ipso, utrinque propaginem [ΔΔ] profundam emittit, ut partim in articulo genu, partim in tres pedis musculos suram constituentes, qui illic exoriuntur, absumantur: & hæc venæ quatuor in regione femoris, à caudice exoriuntur: nam hinc per popliteum cum vena interiori descendens [Θ] partim ad tibiam, partim ad pedem fertur; per tibiam, vero ipsiusque musculo immersus in tres ramos insignes dividitur [ΑΣΠ.]

V. Tibiæ exterior [Α] ramus primus insignis & superior ab externa caudicis parte pronatus, exterioris venæ ramo ampliorem comitatus, secundum fibulam descendit & in musculos tibiam occupantes, quousque carnei sunt, absumitur.

VI. Tibiæ posterior elatior [Σ] ramus alter paulo inferius ex posteriore & inferiore sede educitur, qui usque ad commixtionem tendinum musculorum suram constituentium, una cum venæ interioris ramo posteriore descendit.

VII. Tibiæ posterior & humilior [Π] ramus tertius ex trunci posteriore & exteriore parte pronatus venæ interioris ramo anteriore comitatus per ligamentum malleolum, quod fibulam tibiam jungit, musculis occultatus, antè & multo cæteris duobus longius excurrit, ligamentum transversum transit, pedis superiora [Φ] accedit, & in musculos digitos abducentes diffunditur: quo loci plerumque ipsius artus motum tactu deprehendere possumus.

VIII. Caudicis cruralis reliquum per tibiam posteriora descendens [Ξ inferius] inter malleolum secundum & tertium digitorum pedis recta descendit, inter calcem & malleolum anteriorem, pedis humiliora subit, & ad malleolum internum pedi ramulum [Υ] offert, qui pollicis musculum accedit, pedisque superiora aliquo usque pergit.

Reliquum [Ω] inter tendines musculorum digitorum pedis in ramulos duos [ab] secatur, quorum quilibet, in furculos quinque absumitur: interior enim [c] polli-

LIII 3.

polli-

mos quamplures, dein ad genua, & popliteum distribuitur, tandem & in anticos tibia musculos & in posticos, omnesque pedu digitos, varie divaricatur, hæc Laur.

c. Vesal. & Plat. ubi pulsum sensibilem edit.

b Ves. & Plat. hanc distributionem etiam persequuntur, Columb. sic.

quemadmodum vena illa dividuntur ad omnes scilicet musculos, tibia pedis, digitorumque: ad eorum enim extremitatem perveniunt: mittunt in super arteriolas tum ad inguini glan- dulas, tum ad scrotum, tum ad penem sub cute: hæc ille.

Femur accedunt utrinque rami ac in inguinibus divaricati partim inter musculos perfunduntur, partim per superficiem deducuntur, donec ad extremum usque pedem assumpti fuerint, hæc Fall.

in inst. Cruralis arteria similis fere ac vena distributio, nisi quod pauciores ejus rami per cutim feruntur: mittit enim in cruris musculos ra-

pollicis duos, duos indices, unum medio, exterior vero [b] duos minimo, duos me-
dico, & unum medio [d] ejusque inferiori sedi largitur.

De Nervis a Pedis.

CAPUT XXXVIII.

De his consule Gal. lib. de diff. nerv. 17. 3. adm. anat. 10. & 11. item 16. us. part. 8.

a Vesal quoque
adhuc mo-
dum fere di-
stribuit, & Pla.
nervi ossis sacri
qui & pedis
nervi dici pos-
sunt, qui inter
ultimas lumbo-
rum vertebrae
& ossis sacri
summitatem,
item a 1. 2. 3.
ossis sacri fora-
mine exiliunt,
Columbus, qui
quarti nervi
distributionem
primo, dein duo
conjugia, qua
nervum quar-
tum sequun-
tur recenset, ut
in fine hujus
capituli in mar-
gine monui-
mus. Ex verte-
bris ossis sacri,
qua sex sunt
quinque ner-
vorum, conju-
gia prosiliunt,
qui omnes in

crura universum iter habent; at nervi qui ex infimis duabus lumborum vertebrae, atque ex ossi sacri quinque forami-
nibus emerunt omnes fere in unum quasi fasciculum coniecti, parte posteriore, qua coxa rima amplam agit in crura
protruduntur pone articulum, amplo operi, abduci musculo: simul autem musculus qui ibi sunt prout fere digni-
tas atque magnitudo suum cuique ramum impertiunt. Unde mox alii in crura sparsi, deorsum per interiora ferun-
tur, qui ad pedis inferiora concedunt, alii vero per exteriora in pedis priora atque superiora pertinentes: alii media in-
ter hos regione positi in musculos sura dirempti absumuntur, Piccolhom. Lumborum quinque sunt conjugationes,
quorum posteriores rami in rachitas feruntur musculos: anteriores vero in abdominis, femorisque internos musculos
ac testes. Ossis sacri paria sunt sex, quae partim in femur partim in musculos vicinos & cutim disseminantur, nec non
collum uteri, sphincteres, musculos ani, vesicae & penem: per totum autem pedem nervi quatuor insignes disseminan-
tur, qui ex tribus inferioribus partibus & quatuor superioribus ossis sacri nascuntur, Laur.
b Primus Vesal. primus brevior & elatior à tertio lumborum pari, Plas. primus & summus, Laur. c 1. 7. & 9. Vesal.
1. 2. & 9. Plat.
d Secundus, Vesal. secundus & longior à quarto lumborum pari, Plat. secundus & inferior, Laur.

Nervi qui juxta cruris initium in femur pedemque totum decurrunt, à spinali me-
dulla exoriuntur, & quidem parte ea, quae in lumborum & ossis sacri vertebrae
consistit: à lumborum enim tribus paribus inferioribus, & sacri ossis superioribus qua-
tuor propagantur; & statim in exortu miscentur, & reticuli instar cōjuncti proceden-
tes [vide t. 16. lib. 3. fig. 1. MM] in nervos quatuor [t. 24. ch. 57. 60. 66. 71.] utrinque exe-
unt: quibus crassities eadem non est, nec ductus idem, licet omnium principium in-
tra peritonaei cavitatem consistat: horumque primus & tertius breviores sunt, quare
ad femur tantum perveniunt: secundus longior, ad tibiam quoque per femur fertur
& illis crassior est: quartus vero qui ceteros, una junctos crassitie superat, sic & lon-
gitudine, cum per femur & tibiam ad digitorum apices deferatur.

b Primus [t. 24. ch. 57.] ex commixtione rami tertii paris lumborum cum quarto
pari, [circa vertebrae 22. 23.] exoritur & supra genu articulum terminatur; hic lumbo-
rum musculus incumbens; parum rotatorem accedit & in femoris musculos duos ex-
tendentes, ramum [58.] ad curam femoris, anteriori & exteriori sedi obductam, ablu-
mitur: major vero pars [59.] tibiae musculo primo & septimo & nono surculos largitur.

Secundus [ch. 60.] è regione conjunctionis tertiae lumborum in inguina in femur abit, ra-
ta prodit [inter 23. & 24.] & cum vena & arteria crurali per inguina in femur abit, ra-
tumque insignem à latere interno [61.] venae Saphenae ad pedis pollicem usque at-
tensum juxta malleolum [62.] descendit: quod propter sectionem venae poplitae &
malleoli interni notandum, ne scalpellum antrorsum actum, nervum praefecerit: &
quemadmodum Saphena surculos varios in descensu communicat, sic & hic nervus
scin-

seinditur, quorum præcipuus est [63] qui circa genu anteriorem anterioremque partem occurrit. Major nervi secundi portio [64.] cum vena & arteria profunda, in femoris musculos anteriores, præcipue femoris quintum & octavum tibiæ digeritur, ita tamen ut membranæ vasa illic colligantibus, soboles exiguas diffundat.

^e Tercius [ch. 66.] ubi lumborum vertebra quarta, quintæ articulatur, potissimum enascitur, qui supra femoris musculum septimum delatus, pubis ossis foramen permeat [67.] & femoris musculo nono & decimo quemadmodum & penis musculus à pubis ossis pronatis, surculos porrigit, & nervos duos ad femoris medium descendentes educit: quorum alter in cutim femoris juxta inguina [68.] spargitur: alter ad musculum tibiæ secundum, & femoris quinti portionem [70] absumitur.

^f Quartus [ch. 71. 72.] tertio sextuplo crassior est, imo omnium nervorum corporis crassissimus, durissimus, validissimus & siccissimus: hic ex ossis sacri paribus quatuor superioribus (sive ex vigesimo quinto ac trium subsequentiū pari) conflatus, femoris posteriora subiens, inter sacrum & ilium os, qua invicem secedunt sinu peculiari defertur: & à ramo posterius [72.] sub femoris musculo primo latitante, cuti nates & femoris posteriora ad medium usque tegenti, surculi diffunduntur & mox ramosalios utrinque [73.] & quidem fere tres ad capita musculorum tibiæ, tertii, quarti, quinti, & femoris quinti distribuit. Hinc inter musculos reconditus infra femoris medium, ramum [74.] in tibiæ musculum quartū mittit, & soboles in cutim juxta genu spargit; humilior deinde ad femoris capita utrinque surculum unum [75.] in capita musculorum trium pedis diffeminat. At truncus ipse, in sinu posteriore ipsius genu seu poplite [76.] in ramos duos crassitie inæquales secatur, [77. 82.] qui in tibiā totam & pedem distribuuntur, cum in tibiā nullus nisi ab hoc nervo ramus mittatur, præter ramum à secundo pari [61.] qui femoris, tibiæ, & pedis interiora percurrit, cuius tamen vices & quarti ramus [83.] aliquando subit.

^g Exterior [77.] gta ciliior est, qui statim bifidus fit, [78. 79.] & major exteriorque [78.] qui statim circa poplitem educitur, secundum fibulam & malleolum exteriorem, ad pedis exteriora, minimumque digitum cuti in progressu surculos offerens descendit: alter vero & interior, qui aliquando major [79.] ubi ramum [80.] ad tibiæ sedem anteriorem misit, juxta fibulam inter musculos peroneos dictos occultatus prorepit, & ramulos ipsi impertiens [81.] versus malleolum externum revolvitur.

^h Interior vero & major [82.] secundum tibiæ sedem posteriorem sub musculis occultatus cum musculo quinto pedis & digitorum flexorib. in tibiā sitis deorsum fertur, & ad malleoli interioris sedem posteriorem reflexus, pedis inferiora accedit & digitis

singu-

ut vult Fall. ego hunc à ramo infimi lumborum parvi potius prodire crederem, Plat. h. Galenus ramum hunc tanquam geminum secundum totam femoris longitudinem deduxit, cum in homine unicam obtineat, circumscriptionem, & si quis ipsius qua investitur membrana, unguib. dirempta, hunc velut in duos nervos dirimere proposuerit, etiam licebit in quamplurimos nervos dividere, cum nihil aliud sit, quam plures nervi instar plurium rectorum funiculorum prorensi & membranæ circumdatis: ac earatione qua quis geminum esse contendit, ego illum decem & octo nervis constare astruam, cum aliquando tot ipsius funiculi numerati occurrerint, Vesal. i. Ves. Col. Plat. & In poplite ramus exterior, Ves. ramus minor ad flexuram genu Col. poplitem accedens ramus exterior, Plat. i. Interior & crassior truncus, Vesal. ramus major ad flexuram genu, Columb. poplitem accedens ramus interior, Plat.

e Tertius Ves. tertius brevior & humilior à quinto lumborum pari, Plat. tertius nervus, Laur.

f Quartus cruris nervus ex elatioribus quatuor paribus coeuntibus, Ves. Plat. Laur. cum primum quatuor nervorum principia exire videntur, maxime corpus nostri nervum constitunt, &c. Co. lumbus, qui hunc primo locorecenjet.

g Ab hoc in penem ramus transmittitur: statim ubi coxendicem egreditur: qui circumductus ad pubis os sub rando dice penis, cum suo pari & vena penetrans per dorsum penis ad glandem ipsius perfertur.

m Alter ramus
 majoris profun-
 dior apertens
 post flexuram
 genu, Colum.

singulis, surculos binos fere communicat: hic etiam bipartitur, & à trunco majore
 [inter 82. & 85.] paulo sub divisione & parte interiore, ramus [84.] prodir, qui in
 cutim suræ distribuitur: mox trunco in tibiā delapso, ac sub tibiā musculus lati-
 tante, duos adhuc ramos propagat: ^m alterum qui antrosum fertur, & qui illo infi-
 gnior [85.] qui ligamentum membræ tibiæ & fibulæ connectens, permeat
 & juxta illud deorsum repit, musculus pedis digitorum, quibus attenditur, soboles
 largiens & ligamentum transversum seu annulare, una cum musculorum dictorum
 tendinibus transiens, pedis superiora adit & in musculos pollicis & eos qui digitos
 abducunt distribuitur.

n Columbus
 postquam ner-
 vum nostri cor-
 poris maxi-
 mum, ejusque
 distributionem
 recensuit, sub-
 jungit: post tria
 foramina ossis
 sacri, sequitur
 4. & 5. in qui-
 busdam, ex qui-
 bus egrediun-
 tur duo alia ner-
 vorum conjugia, quæ post egressum quoque uniuntur, nervum gignentia qui reflectitur & ad musculos natium distri-
 buitur & cutim illarum: in internam abdominis partem mittit nervulos ad musculos recti intestini, in nonnullis ad
 vesicæ quoque in feminis ad uterum ejus cervicem & vesicæ musculos, alii ad perinaum & scrotum: ex posteriore par-
 te ossis sacri, per ea foramina nervuli prosiliunt, parvi admodum brevesque qui ad musculos dorsales, ad nates, ad po-
 sterioremque cutim delegantur. o 6. pathol. 18. p 8. usque part. 16.

Alter vero qui minor est, retrorsum fertur [86.] & posteriorem tibiæ sedem per-
 vadit, & in pedis musculos inter quos deferitur, absumitur. Truncus vero minor [83.]
 secundum tibiæ sedem internam, ad malleolum internum hinc ad pedis latus inter-
 num ad pollicem in progressu surculos varios in cutim spargens, ⁿ excurrit. Et hic
 notandum quod Fernellius ^o quoque monuit, Ischiadicum affectum sedem habere
 natem, qua nervi à lumbis & ob osse sacro emergentes in crura feruntur: quare
 dolor atrox non in solo coxendice consistit, sed in femur quoque & in suram & in
 extremum pedem exporrigitur, quocumque nimirum ab affecta coxendice, nervus
 ille crassissimus, quem quarto loco recensuimus, pertingit. Quod vero nervus hic
 cum aliis anterioribus non commisceatur, ut in brachii nervis fit, hanc rationem
 Galenus ^p affert, quia brachii articulus longius distat à cervicis vertebis, quam fe-
 moris articulus à lumborum vertebis & osse sacro. Et hæc est nervorum in pedes
 distributio.

De Ligamentis ossis ilii, & sacri, & quæ in toto pede habentur.

CAPIT. XXXIX.

De ligamentis cruris & pedis agit Galen. 2. adm. anat. 10.

a Ves. & Plat.
 ligamenta hoc
 capite proposita
 eodem pene mo-
 do recensent:

Laur. succinse admodum; Columbus enumerat sequentia 1. membræum circa femoris caput. 2. quod in femoris caput
 inseritur. 3. quod inter capita inferiora & tibiā 4. quod rotulam ambit. 5. quod ab osse sacro coxendicem accedit. 6. in
 extremo pede, præter vinculum commune, sex alia transversa ut in brachiali, & alia quæ pedis digitis, quemadmo-
 dum digitis manus subsunt: tantum ligamentum inter tibiā & fibulā, & ligam: in foraminibus pubis: Piccolh.

Ligamenta^a quæ ilium & coxendicis os, cum sacro osse, pubis item inter se con-
 nectunt, & quæ ad crus pertinent, explicanda nunc sunt. Ligamentum quod
 ilium

*Ligamenta arthritica (tam brachiorum quam crurum) dicuntur, cui 1. femoris latum 2. teres qua duo coxendicam na-
chune 3. femoris & tibiae capita jungens, 4. inter tibiae & fibulam ea superne & inferne copulans, 5. tibia cum tala, 6.
tarsi ossa copulans, 7. ligamentum transversum in tarso sextuplex, 8. ligam. in rectum ad digitorum extremitatem por-
rectum, 9. ligamenta communia digitorum articulos singulos de vincientia.*

ilium os sacro ossi validissime connectit, commune est, latum & membraneum ^b & b ilii ligamen-
robustum, quod parte ea qua ossa intercedit [tab. 41. lib. 1. fig. 13. ABCD] cartilagineum ^{tum Laur.}
ligamentum & robore & crassitie (quamvis & cartilago intercedat) refert, quo ne-
xum laxum artius constringat; quare nexum hunc si validior impressio fiat, in partu <sup>c Sacri ossis vin-
cula duo Laur.</sup>
non nihil cedere posse, alii quidem ilii ossis & sacri, alii vero & pubis ossium volunt, <sup>d Ligamentum in
ter sacri os &
coxendicis situm</sup>
qui ne nimium cedant ligamentis opus habuere.

Quod vero os sacri coxendici jungit, duplex ^e est & teres: aliud ex ^d ossis sacri quin-
ti & sexti conjunctione pronatum, in coxendicis processum acutum infigitur [tab. 17.
lib. 4. fig. 5. 6. u. tab. 20. fig. 13. 14. i.] Aliud ex eodem loco eductum, in coxendicis poste-
riorem sedem seu appendicem inseritur [tab. 17. fig. 5. X] quo ossa haec firmitus colli-
gentur: quamvis ^e & hoc ligamentum rectum intestinum cum suis musculis, cum ^o
nullum os subiectum sit, sustineat. <sup>oritur ab extre-
mo ossis sacri,
transversum-
que desinit in
acutam coxen-
dicis partem,
colligat haec ossa
& detinet, licet
alter usque ad-
duci possit, ut
scilicet majori
nervo aditus
pareat, Col.
e Ves. Pla. Laur.
f Pubis ossis
vincula duo,
commune, &
foramen occu-
pans, Laur.</sup>

Sic pubis ossa, sicut cartilaginis interventu colligentur, geminum tamen liga-
mentum habent, aliud quod ea circulariter ambit, ne in partu, aut aliis femoris mo-
tibus magnis frangantur: nam si tantum ossa fuissent, id contingere potuisset. Aliud
quod foramen ipsum occupat ^h membraneum est & fibris oblique deorsum latis co-
stat [tab. 21. fig. 16. b.] nam cum ab osse pubis pars, quo levius esset, ablata fuerit, ligamē-
tum substitutum, quo loco ossis musculos sustineat & simul utrumque obturatorem <sup>g Vincula qua
sunt in pubis
foramine, no-
num muscu-
lum à decimo
dividunt, Col.
h Vinculum
membraneum
crassum, arti-
culis omnibus
commune est,
in articulo fe-
moris cum osse
coxendicis, ili
acpubis, Col.
ligamentum
coxendicis &
femoris pri-
mum, ligamen-
tum femoris</sup>
sive femoris nonum & decimum musculum distinguit. Ligamenta cruris triplicia
sunt, alia enim ad femoris, alia ad tibiae, alia ad pedis articulationem referri de-
bent.

Femur, coxendicis articulo duplici ligamento nequitur: altero communi ^h mem-
braneo, quod articulum orbiculatim ambit, [tab. 21. fig. 20. MM] quod ⁱ Graeci *ἰγλός*,
totius articuli nomine vocarunt; quod cetera articulos ambientia, crassitie, duritie,
& robore superat, cum articulus hic corpus totum sustinere & motus validos perfer-
re debuerit. Hoc articulo & femoris cervici accumbit, & solum radici magni proces-
sus orbiculatim adnascitur, quo motus capitis ipsius femoris non impediuntur. Alte-
rum ^k ipsius ligamentum quod priore refecto occurrit, oblongum & cruentum (ob
inignes venas acetabulum coxendicis perrepantes) est, & teres [L] & ob duritiem
nervus ^l cartilagineus censeripotest: hoc in acetabulo coxendicis situm, ex ejus ^m pro-
fundo seu humiliori sede, ubi adeps sinui oblinetur (quo femoris caput facilius mo-
veatur & acetabuli supercilium cessat [tab. 41. lib. 1. fig. 14. c d] ortum ducit, & superius
in femoris caput medium inseritur, idque ne femoris caput è sinu suo facile excidat,
firmiorque sit articulatio, siquidem femur grave & veluti à coxendice pendulum sit:
quare dum hoc ⁿ laxatur, & prolixius sit, saepenumero luxationem causet & aliquan-
do disrumpitur & quamvis os restituatur, luxatus tamen semper claudicat, cum clau-
dicat

M m m m

dica-

commune. Pla. Laur. i Ves. Plat. k Ligamentum femoris secundum, Col. Piccolli ligam. femoris privatim, Plat. Laur.
Ves. & Laur. m Sic Col. Plat. Laur. as Vesalio ex femoris capitis medio prodiit & in acetabulum inseritur. n Col. Picc.

† in conc. pra-
not. vide &
lib. de Gland.
& author. Isa-
goges.

o Tibiam cru-
ri alligant pra-
ter communia
& lata tria
valida & re-
vunda ligamen-
ta, Laur. ac Ves.
& Plat. sex.

P Lig. 4. rotu-
lam ambiens
Coll. ligam. femo-
ris & tibia ca-
pita cingens,
Piccol. ligam.
tibia commu-
ne, Plat.

q Ligamentum
privatum pri-
mum, Plat. ti-
bia rotundum
i. in genu, ex ca-
nali inter con-
dylos medio pro-
diens, in parte
anteriori de-
finit, Laur. ad-
dens & secun-
dum cartilagi-
neū ex reliqua
canalis asperi-
tate in tibia e-

minentem mediam apophysin desinens. r Sic Vesal. in femur recta ubi maxime capita dehiscunt inseritur, Plat.

f 3. inter capita inferiora femoris summamque tibiam, quod ab eorum appendicibus exoritur, & in ea desinit, ut has par-
tes contineat, Col. tibia 3. Laur. 4. Plat. r 5. Plat. u 2. Plat. x 3. Plat. y Ligamenta communia, Plat. z Liga-
mentum membranosum inter tibiam ac fibulam, Col. Piccol. Laur. ligam. tibia musculos continens, Plat.

a Vesal. non modo unit & vincit sed musculos distinguit, Col. tibia & fibula capita supra, & infra interne devincit & ti-
bia musculos interiores ab exterioribus secernit, Piccol. Laur. musculos sustinet & ossa simul nequit, Plat. b Ut pedis &
manus eadem est fere compositio, ita vinculorum, qua ossa connectunt, musculosque continent & firmant, non dissimilis
est structura, nec numerus valde dispar Lau. in extremi pedis articulo inter ipsum tibiaq. & fibulam prater vinculu su-
perius omnibus comune, sex alia conspiciuntur, qua tendines continent, extremo pedi & digitis infer viuentes, Col. quem-
admodum in carpo tam externe quam interne unum est ligamentum transversum, idque sextuplex: sic etiam in tarsor
Piccol. c Sunt etiam transversa ligamenta, interna, externa qua tendines digitos flectentes extendentesque conti-
nent, Laur. d Ad tibia ligamenta, quod tendines continent, refert Plat.

dicatio incurabilis sequatur, cum femur etiam perfecte repositum semper prolaba-
tur, si quidem non ut prius recte cohaereant. Sic quandoque ex abscessu, aut deflexio-
ne in acetabulum coxendicis, ligamenti corruptis crus vel coxa emaciatur, & φθίσις
ἰσχυρὰ, tales coxae, ut Hipp. † vocat, sequitur: nam, ut habet Hippocrates quaecun-
que ossa vitium capiunt, incremento prohibentur, pars quae continet si laboret, eam
quae continetur contagio afficit: quare si ischium corrumpatur, femur integrum ma-
nere non potest: quam tabem & in socero meo & alio Juris Doctore observavimus,
quae difficilime sublata fuit.

Tibiae & fibulae ligamenta sequuntur: ° tibiae primum membraneum est & com-
mune [t. 21. fig. 20. PP] quod universum articulum genu ambit, excepta parte, cui pa-
tella una cum tendinibus illam continetibus, quae per se satis costringunt & retinent;
praepositur, ut tibiam & fibulam femori in articulo genu colligit. 1 Alterum poste-
rius in genu interno situm, robustum ac nervosum, ex tibiae processu nascitur & bi-
fidum utrique femoris capiti inferiori [t. 21. fig. 20. CD] infigitur. Tertium f validissi-
mum est, & cartilagineum, ex tibiae parte prominentiore inter ipsius sinus enatum,
[F] femoris parti posteriori inter capita duo in canalem medium inseritur. [S] Quar-
tum † gracile est & mucosum in articulo genu medio, quod a tibia in femur fertur & no-
semper adest. Quintum † crassum & peneteres est, quod genu externo lateri obducit-
tur, & femoris, fibulae & tibiae ossa colligat [Q] Sextum * dicto gracilius est [R] & mol-
lius, & interno lateri unde nascitur attenditur, & oblique in tibiae priora d fertur. Ti-
bia fibulae quoque committitur y primum ligamento communi, parte superiore jux-
ta articulum genu, quod a parte exteriori ossium connexum amplectitur [r] dein y par-
te inferiore [V] etiam communi membraneo, quod ex tibiae ossis fibulam accedit &
ei fibulam alligat: tum † membraneo ligamento peculiari [X] quod per intervallum
inter tibiae & fibulae os, cui toto ductu valide adnascitur, expanditur & a tibiae osse in
fibulam fibris oblique descendentibus fertur; hoc non solum ossa a junguntur sed
etiam muscoli tibiam occupantes, anteriores a posterioribus distinguuntur & muscu-
lis, qui ei adnascuntur exortus robur praebet.

° Pedis ligamenta plura sunt, quorum alia tendines ad pedes eorumque digitos
transmissos continent, & tria sunt transversa; † alia pedis ossa connectunt. Primum
d [tab. 16. fig. 1. 2. ch. 2. tab. 21. fig. 20. YZ] anterius ad articulum pedis cum tibia situm
est,

est, quod ossa connectit & musculorum aliquot tendines transmittit. Alterum [t. 21. f. 20. a.] à tibiæ osse seu malleolo interno in calcis os inseritur, quod annulos tres veluti ligamenta tria constituit, cum sinus tres ibi sint [tab. 21. fig. 19. ch. 1. 2. 3.] propter tendines pollicis flexoris & digitorum flexoris majoris qui illac transeunt. Tertium ^c [tab. 16. fig. 3. r. & tab. 21. fig. 20. b.] à malleolo externo in calcis os vel à fibula calci implanta- ^c *Ligam. inter-*
tur, ossium conjunctionem adjuvat, & sinibus duobus obducitur, ad tendinum utri- ^c *num & exter-*
usque peronæi transitum, quemadmodum in musculorum historia ostendimus. At ^c *num pedis ten-*
horum ligamentorum, quemadmodum & in carpo usus est, ut primo robur addant, ^c *dines continens*
ut tendines musculorum pedis, ne à suo situ facile dimoveantur, contineant; & ut ten- ^c *Plat.*
dines hi à ligamenti portionem acquirant, quo una cum nervorum exilitatibus pro- ^c *f Ves. Col. Plat.*
ducantur. Sic in digitorum ^f pedis inferna regione, ligamenta etiam transversa, quæ ^c *Est & tertium*
admodum in manu occurrunt, quæ tendines digitorum internodium secundum & ^c *ligamentorum ge-*
tertium flectentes, in officio detinent. 8 Ossa pedis connectentia, vel ad talum, vel tar- ^c *nus in rectum*
sum, vel pedium & digitos referuntur. ^c *exporrectum ad*
^c *extremitatem*
^c *usque tendinū*
^c *musc. digitorū*

Talum, vel tibiæ, vel pedis ossibus connectunt: quæ tibiæ ossibus, horum primum ^c *pedis exporre-*
commune est & membraneum, quod articulum tibiæ cum talo ambit, reliqua car- ^c *ctum, Piccolh.*
tilaginosæ sunt. Alterum à tali partibus internis [tab. 21. fig. 20. c.] quibus malleolo in- ^c *habēt & singu-*
terno excipitur pronatum, tibiæ ossi, qua talum respicit inseritur. Tertium à tali par- ^c *li digiti vinctu-*
tibus externis fibulæ ossi, talum respicienti infigitur. Quæ vero talum pedis ossibus ^c *lum membra-*
connectunt, horum primum ⁱ membraneum est, & commune & articulum calcis ^c *nosum tendi-*
cum talo cingit. Alterum ^k robustius est, & cartilagineum, & à tali sede inferiore jux- ^c *nem firmans,*
ta cervicem oritur, & calci inter duas ipsius cum talo commissuras inseritur. Tertium ^c *Laur.*
cartilagineum quoque est, & articulum totum exterius ambit, quod ex tali cervice ^c *His addit*
pronatum ossi naviculari infigitur. Quartum ^m validum, à tali cervice in os tessaræ, ut ^c *membranam*
illi connectat implantatur. Quintum ^m robustum est, & cartilagineum, quod calcis os, ^c *latam plures*
ossi tessaræ simili committit, & articulum amplectitur. ^c *musculos in cru-*
^c *re simul com-*
^c *plicans: & liga-*
^c *mentum in pe-*
^c *dis planta ten-*
^c *dinis vicem ge-*
^c *rens, Plat.*
^c *h Ligam. tibia*
^c *caput cum talo*
^c *jungens com-*
^c *mune est, Picc.*
^c *Laur.*

Tarsi quoque ossa ligamenti ⁿ durissimis & cartilagineis copulantur, vel vicinis ossibus, vel inter se: vicinis ossibus, ut posterius os tessaræ cervici tali: idemque calci: sic tria ossa, ossi naviculari: & antè pedii ossibus: invicem vero committuntur, ut in pedis parte superiore seu dorso: sic parte inferiore ligamentum validissimum, & peculiare, quod & externe alligat, & ossium quoque media, cum iis inferatur, invicem vincit.

Pedii tandem & digitorum ^o ligamenta, quæ ea simul connectunt, conformatione & ductu manus ligamenti correspondent: & ea quæ pedii ossium intervallis immittuntur, cartilaginea sunt, cætera vero membranea. Hæc de ligamentis pedis.

Mmm 2

De m Inter tali &

tarsi ligamenta posuit, & 6. & 7. loco recensuit Ves. ad tarsi retulit pro 1. & 2. posuit Plat. n Ligamentum septem tarsi ossa copulans, quemadmodum illud, quod octo carpi ossa copulabat, & ut hoc in ossa postbrachialis usque excurreret, ita illud in ossa usque pedii excurrat, Piccolh. ossa tarsi vicinis colligant communia ligamenta invicem vero connectunt, vinculo peculiari, hæc Laur. o Extant quoque communia ligamenta, quæ singulos digitorum pedis articulos devinciunt, quemadmodum etiam in manu, Piccolh.

De Pedis ossibus, & primum de femoris ossē.

CAPUT XL.

Consule Galenum lib. de oss. 21. de ossē femoris, maxime eius figura & situ 3. us. part. 9.

Pedis ossa quadraginta duo sunt, in pede quolibet, quæ in femoris, tibiæ & pedis extremi ossa dividuntur.

Femoris os sicut & humeri * unicum est [tab 25. fig. 1. 2. 3.] ^{μν γ δ ν} Græcis, femur ^{a 3. us. part. 9.} Latinis à ferendo ^b quod his præcipue partibus animal sustineatur, atque feratur, dictum: hoc in homine & simia omnium ossium maximum & longissimum est; in cæteris vero in quibus majori ex parte delitescit ^c ipsa tibia brevius est: hoc à coxa oblique introrsum ad genu ducitur.

Figura ipsius longa est, rotunda & recta, sed non exquisite cum oblique versus interiora ad genu descendat, propter firmam ^e stationem, ambulationem & cursum: nam quibus femur natura rectius, quam convenit conigit, ^e vari & claudi ad genua redduntur, quare hanc formam ^e notare convenit, etiam Hippocrate * monente, ne si fractum restituendum sit, invertatur. Anterior gibba, quod ad ^e sessionem utile est, & ad multa opera, quæ sedentes agimus, cuiusmodi est scribere ^e libro ad femur extenso, & ut femur unum alteri imponamus: in lateribus teres & utrumque laeve: posterius sima & cava: at superius ^e in caput, cervicem, duosque processus, inferius in caput, duabus productionibus & sinibus donatum, desinit.

Caput superius [fig. 1. 2. A fig. 3. XI superius] quod ab appendice orbiculari, quod donatur ^b totum efformantur [fig. 3. XI superius] crassum est, & omnium quæ in corpore sunt maximum, ita ut Hippocrates ^e eximie ^{α β γ δ ε} articulum vocarit: rotundum & oblongum, quo coxendicis acetabulum profundum & cartilagine adactum rectius subeat, quo articulatio hæc, quæ per enarthrosin (quæ diarthrosos species est) fit, validissima sit, idque propter pondus immensum quod femur sustinere debuit; cuius nomine etiam ligamentum robustissimum & teres à coxendicis acetabulo pronatum, quo simul copulantur obtinuit, quod in ejus sinum [fig. 2. B] profundum & angustum paulo sub vertice situm, implantatur: est quoque læve, cartilagine incrustatum, quo femur facillime & expeditissime flecti, extendi, in latera moneri & circumverti possit.

k. Cer-

^e ea quæ primo se exerit, tibia os est. Et Aristoteles propriam femoris & tibiæ sedem ignoravit, quando asserit aves femore destitui, quod omnino falsum, nam id in avibus delitescit, Col.

^{c 3. us. part. 9.} ejus utilitatis occasione non solum hoc, sed etiam tibiæ magis curvam extrinsecus natura fabricata est: probat Galenus, quod qui plurimum curvis sunt cruribus, tales in utero vel prima educatione facti, sive duobus pedibus, sine altero solo stare velint, firmiorem multo & difficiliorem eversionem, quam qui crura habent recta obtinere firmitudinem.

^a lib. de fractur. Gal. 3. us. part. 9. ^f Anterior, exteriorque gibba, posterius interiorque sima, de oss. 21. curvum priore & externa parte, resimul vero partibus contrariis, 3. us. part. 9. ^g Superius, caput obtinet cervicem adactum, ad cervicem duo processus, Vef. extremitas superior tribus eminentiis protuberat, cer-vice, trochantere majore & minore, Plares apophyses caput & trochanteres duo, Laur. ^h Sic Laur. fere totum, Col. Piccolh. ⁱ Lib. de fracturis.

^k Cervix [fig. 1. 2. 3. D] capiti subjicitur, quæ oblonga sursum protensa & intro oblique reclinata est, ne femur, si totum cum capite acetabulo adhæreat, in motu impedatur: At Galenus * femoris cervicem oblongam & obliquam eo sine factam putat, ut musculis parte inferiore situandis, & magnis venis, arteriis, nervis & glandulis, quæ vasorum divisionibus præ sunt, locus relinquatur: quibus vero femoris cervix brevior sit, iis inguina angusta & compressa sunt & ambulantes ad latera claudicare coguntur & βλαστοί † à Latinis valgi dicuntur: & hæc forte causa cur aliqui, licet tibiae & pedes æqualis longitudinis habeant, tamen claudicant: cervicis enim longitudo obliqua in femore ad corporis rectitudinem plurimum confert. Quamvis Galenus † βλαστοί hoc est valga vocentur, quæ in anteriorem partem vergunt: quæ vero in posteriorem βλαστοί καὶ κούρα, hoc est. vara, incurva nominantur. Et qui natura cruribus incurvis sunt, κούρα dicuntur, qualem ducem Archilochus expetit apud Galenum, †† quod ea figura firmam & optimam stationem faciat. Ex hac ubi os latiusculum redditum est [sub D] veluti nodi duo educuntur, quos^l processus vocant, qui appendicibus donantur [fig. 3. X. medium] quæ in nuper natis facile (quem admodum & caput ipsum) divelluntur in adultis vero, cum partibus prominentibus uniuntur [fig. 2. Q. cum V. fig. 1. a cum b] ita ut appendicis vix ullum vestigium appareat. Horum alter superior [fig. 2. Q. V.] major est & sursum, simulque extrorsum vergit: id est vari quidam sunt, sed alter inferior [fig. 1. 2. a] qui longe minor est, & retrorsum simulque introrsum stat: hos τροχῶντες ὀπίσθεν & τροχῶντες sive rotatores^o vocant, vel quod femori rotando facti sint; vel potius, quod his musculi, qui femoris motus perficiunt, inserantur: illum tamen πύξ τροχῶντες magnum rotatorem, & simpliciter^o τροχῶντην βλαστοί, id est ex: & γὰρ πύξ πύξ natium quadam imagine, vel quod natium musculi ibi inserantur, vocant: hunc vero ἴππον rotatorem nominantur. At processus hi linea quadam, quæ posteriori eminenti ab externo ad internum ducitur, simul junguntur: unde femoris os teres redditur. Horum usus, collis modo musculorum quorundam insertionem admittere, & quibundam exortus sedem præbere. Interiori siquidem, musculi primi & secundi femur flexantis tendo infigitur; ad hunc^l linea etiam aspera [fig. 2. cc] oblique in posteriora deorsum ducitur, & ultra modum in partes duas scindi, & caput utranque petere videtur, quæ ad extremum evidentius terminatur, cui femoris musculus octavus implantatur, & tenaciter adhærescit, siquidem ejus beneficio maxime recti stamus.

At processum externum, sinus, impressiones & linea notantur. Sinus [fig. 2. α] qui femoris caput respicit, cui femoris musculus nonus & decimus inseruntur. Im-

Mmm 3

pressio-

καὶ ἢ seu cervix prolata ad interiora reclinata, de off. 2. 1. causam cur foras processerit, vide 3. us. part. 9.

* 3. us. part. 9. † com. 3. de off. med. At Hipp. lib. de articul. luxationis speciem fecit: Simili quoque modo si ad malleolum luxatio fiat & in partem anteriorem inclinet, κούρα id est vari quidam sunt, sed stare possunt: quod si in partem posteriorem luxatio fiat βλαστοί, id est valgi quidam efficiantur, minus autem stare queunt.

†† com. 3. in lib. de articul. 1. Apophyses duas exiguas cervix habet, quas trochanteres vocant, quorum exterior major est, de off. 2. 1. Processus duo seu rotatores, Vesal.

lib. de articul. 1. Apophyses duas exiguas cervix habet, quas trochanteres vocant, quorum exterior major est, de off. 2. 1. Processus duo seu rotatores, Vesal.

Columb. Piccolh. trochanteres duo, Plat. Laur. m. Omnium corporis processuum, nulli alteri ossi commisserum, maximus facile Ves. maximus est, Plat. n. Quod rotando femori facti sint, Columb. addit Piccolh. cum illic emergant musculi femur rotant: posterius assumit Laur. o. Cum simpliciter τροχῶντες dicunt, perpetuo externum subaudiunt, Vesal. trochanter major processus dicitur, cum tamen appendix sit, Fallop. observ. p. Gal. de off. 2. 1. Ves. Col. Laur. q. Trochanter minor cum priori minor & veluti mammillaris sit & processus posterior, Plat. trochantra minus Piccolh. r. Vesal. Columb. Plat. Laur. ut illic exoriantur musculi, qui femur rotant. Piccolh. f. Vesal. lineam in posteriore femore, Col. asperitas obliqua, Plat. t. Vesal. & Plat. in ossibus hominibus & etatibus proventibus 4. impr. siones, compressiones, Vesal. alia ibi asperitates & nonnullas impressiones musculorum occasione fabrefacta: ut in musculorum descriptionibus patebit. Colum. Partes antica, postica, interna, externa, inæquales sunt, multique exasperantur processibus ad musculorum exortum & insertionem, hac Laur.

pressiones ad sedem externam gibbam, quatuor sunt, qui musculorum quatuor tendines excipiunt: prima in posteriore & humiliore sede [fig. 2. Q] ampla, ut musculi primi femoris, secunda [fig. 1. r] in anteriore sede magis aspera, ut secundi; tertia sede elatiore & externa [fig. 1. β inter r & o] quæ gibba est, ut tertii; quarta [fig. 1. 2. V.] in processu apice cæteris angustior, ut quarti femoris musculi tendinem suscipiat. At à radice hujus processus, sede anteriore & exteriore tibiæ musculus septimus exoritur. Linea vero aspera [fig. 2. ss.] à prima impressione deorsum, per femoris posteriora nonnihil oblique ducitur, eique femoris musculus primus implantatur.

Jam vero infra mediam regionem, femur, quo magis descendit [fig. 2. à d a d e] crassius redditur, dilatatur^a & deprimitur [fig. 2. e] quo vena, arteria & nervus hactenus ferantur, & tandem in caput amplum latumque exit, quam latitudinem appendix magna, [fig. 3. XI inferius] constituit: ex hoc capite processus duo, tanquam capita duo [fig. 1. 2. EF] posterius educuntur, inter quæ spatium amplum [fig. 2. I] pollicis latitudine relinquitur, quod tuber è tibiæ capite erūpens suscipit: duo hæc capita extrinsecus aspera sunt, superficie lævia propter cartilaginem circumfusam, ad motum ad genu expeditiorem, quæ retrorsum magis vergunt, & in lateribus vix deprimuntur, propter articulationem cum tibiā [iunge fig. 1. 2. EFI cum tab. 2. 6. fig. 7. GFI] quæ per Ginglymum, quæ diarthroseos species est, fit, cum duo hæc femoris capita^a tibiæ sinibus duobus infideant, & tibiæ tuber inter sinus duos eminens [tab. 2. 6. fig. 7. I. inter GF] à femoris sinu posteriore [tab. 2. 5. fig. 2. I] excipitur: verum & ligamento valido, à tibiæ tubero producto femur cum tibiā non secus, quam superius ipsius caput, cum coxendice, colligatur. Horum capitum alterum internum, quod crassius est; alterum externum, quod latius, magisque depressum, ne ambo cum tibiā æqualiter inarticulentur, & sic motus obliquus, & qui à popliteo musculo fit, impediatur, qui ab externo capite, ubi sinibus asperum est, prodit: & hæc, uti dictum, tibiæ ossis sinum intrant. Ab his quoque veluti processibus, pedem moventes musculi tres primi principium ducunt: quæ admodum in capitis interni latus [M] ubi compressio [fig. 2. K] femoris musculi quinti tendo infigitur: sic etiam eorum latera foraminulis cæcis asperis, quo ligamenta genu articulum continentia inde prodeant.

Sinum quoque^a quadruplicem habet, duos in capitū medio, & ad capitū latera utrinque unū: horū primus anticus [fi. 1. H] levi cartilagine incrustatus, patellæ tuber excipit [fi. 5. gh] alter^b posterius [fig. 2. I] profundus, asper & inæqualis tibiæ tuber [tab. 2. 6. fig. 7. I] suscipit; tertius ad capitis latus exterius [fig. 1. 2. N] per quem tibiæ musculi quarti tendo, qui hic reflectitur, tuto vehitur: quartus ad caput interius [fig. 2. O] quo tendines musculorum primi, secundi, tertii & quinti tibiæ tuto deducantur.

Anterius item ad cervicis radicem, os amplum & asperum est [fig. 1. f] propter tibiæ musculi octavi exortum: posterius in lineam asperam & inæqualem protuberat [fig. 2. dd] cui femoris musculus quintus infigitur.

Tandem, intrinsecus secundum longitudinem ossis, sinus amplus existit, non tam levi-
nexusionis parte, ab interiore alterum, à medio posterioris interiorisque tertium porrigitur, de oss. 2. 1. y Hoc ligamentum teres, quo femur supra infraque insignitur, articuli detinendi gratia, in aliis articulationibus minime reperiuntur, idcirco observatione dignum est, Col. 2. Quam in angulum rectum flecti satius erat, Ves. decipitur Vesal. in musculo flectente tibiā ad externa, Col. motū tibiā rectum tantū præstat, ut flecti in angulū, & in rectam lineam extendi possit, Pla. a Ves. & Plat. sinus posterioris & anterioris ex Galeno meminit. Col. b Cartilagine nequaquā obductū, ut nec latera, Ves.

i Eξον, ὡς πορ
 ὁπῶν; de off.
 22. tuber, Ves.
 Plat. processus,
 Picc. Laur. tu-
 berculum, Col.
 k nulla carti-
 lagine inuncta,
 Ves.

i Tuberculum [fig. 7. HIK] asperum & inæquale è Tibiæ superficie media pronatum, sinus hos duos separat, quod à femoris sinu [tab. 25. fig. 2. I] duo ejus capita inferiora intercedente excipitur: ex cujus ^k apice [fig. 2. 3. 4. 7. I] aspero & sinuato ejusque posteriore regione [tab. 2. 4. 7. K] ligamentum validum prodit, quod femoris sinui medio [tab. 25. fig. 2. I] infigitur, quo articulus omni ex parte munitus in sede sua contineatur. Ab anteriore vero hujus regione [fig. 7. H] aspera ac sinuata, ligamenta educuntur, quæ cartilagine tibie sinus augentes [fig. 8. LM.] tuberculi sedi anteriori jungunt: licet & ligamenti orbicularis genu amplexantis interventu connascantur.

1 à plerisque
 αὐτὴν ὡς ὀφρ
 cata, Ves. Plat.

Capitulum ad externum tibiæ latus ex appendice exsurgit [fig. 4. R] quod cartilagine incrustatum appendicis fibulæ sinum superiorem [fig. 5. Q] subit. Sic anterior sedes appendici proxima [fig. 1. 3. 7. ab] aspera est & foraminulata, quo tendines musculorum tibiam moventium fortius inserantur.

Tibia hinc sensim attenuatur, lineis & sinibus variis distinguitur, & formam triangularem quadantenus imitatur, habet enim angulum unum veluti aciem longam, acutam, in anteriore parte situm; alterum in exteriori, tertium in interiori, inter quos planities interjectæ sunt leviter excavatæ, tum propter levitatem, tum propter musculorum insertionem & exortum; posterius vero rotundum est.

Anterior pars & media in angulum acutum ^m oblongum producit [fig. 1. 3. γγ] quæ adeo acuta ut cultri aciem effingat, quare ἀκυστή seu ⁿ spina tibiæ, dicitur. Linea altera ^o [fig. 1. 2. 3. 4. δδ] quæ posterioris sedis externum angulum educit, acuta est, fibulæque subiecta, quæ ligamentum suscipit, quod fibulam tibiæ ossi colligat: p linea tertia [fig. 1. 2. 3. 4. εε] quæ posterioris sedis angulum internum constituit, obtusa est, & propemodum teres. Quare lineæ hæ tibiæ latera tria constituunt, primum [fig. 1. 3. ζζ] sinuatum & planum, quo eum fibulæ latere [fig. 1. 5. x] musculis anterioribus in pedem descendentibus sedem præbeat: secundum [fig. 1. 3. η] latus internum est & gibbum, quod ἀνὰ πῶτον, q quibusdam ^η contrario sensu dicitur, cum omni protuberantibus carne destituatur, cæteris lateribus maxime posteriore carnosus: tertium [fig. 2. 4. θθ] quod tibiæ musculi posteriores occupant, & in quo superne alia linea aspera oblique delata occurrit [fig. 2. N. 4. κ] pro musculi poplitei insertione.

Supra caput inferius, extrinsecus sinus ^l quoque est oblongus, versus posteriora ductus [fig. 4. 10. 5] qui fibulæ capitis portionem interiorem nonnihil asperam [fig. 5. 6. 11. 7] suscipit, sicque fibula tibiæ jungitur: at ubi ossa hæc conjunguntur, ligamentum validum intercedit, quod ipsa & in ambitu, & ubi se tangunt connectit. Sic posterius depimitur, [fig. 2. 4. 10. m] & velut sinus tres exhibet, qui musculi quinti pedis & duorum digitorum flectentium tendines tres, ad pedes protensos deducunt.

Infe-

impetu ad tibiæ: alliditur, Ves. n Ves. Col. Plat. Laur. o Ves. Col. angulus alter, Picc. p Ves. angulus tertius, Picc. q De off. 22. ocrea interpreti. r Cur factus ille angulus acutus in anteriore parte: an cum in anteriora & aerē nobis adversum progrediamur, hanc facile tibia scindere possit propter acutiem hanc, sicuti acutior sit in navi prora, ut cum pulso facile, minimeque negotio aquas scindere possit, atque diducere, ut navi ipsius expeditus sit motus? Piccolh. f Asper nonnihil & laevi cartilagine nequaquam incrustatus, Ves. laevi cartilagine obductus, Col. Sinu amplo aspero, non incrustato, Pla.

Inferior tibiæ pars seu caput inferius, crassum est, quod ab appendice addita & cartilagine copiosa incrustatum, latiusque redditum, superiore minus est: cuius appendix, una cum fibulæ appendice sinu amplius in superficie efformant [f. 9. de f. g. h.] qui talum [t. 27. f. 3. 4. 5. 6.] fasciunt: at sinus in tibiæ appendice, quasi geminus [fig. 9. 10. e. f.] tuberculo in horum medio leviter prominente distinctus, [fig. 7. 10. d.] est.

Processum ab interno latere [tab. 26. fig. 1. φ. 2. 3. 9. 10. i.] crassum habet, qui parte qua sinum respicit [fig. 9. g.] cavus est, lævis & cartilagine incrustatus, quo cavitas hæc grandior reddatur, sicque talum sinui insertum, ne sua sede dimoveatur, commodius excipiat: latere vero interno tibiæ alteram respicit, gibbus est & excarnis [fig. 2. 3. 9. 10. i.] At parte opposita tibiæ processum alium habere non potuit, quia in hoc finis oblongus, quem fibulæ portio subiret, esse debuit, qui sensim dilatatur, & in duo supercilia definit: quare fibula quoque in processum abiit, ut sic talos ab utroque processu contineretur, ne in alterutram partem dilabatur: quod si ejus luxatio aliquando contingat, ad processum internum magis fit, quam externum, cum fibulæ processus longius producat. Dicuntur hi processus φυεγες malleoli tibiæ quidem, malleolus internus fibulæ vero malleolus externus. Malleolus inter [f. 1. φ. 2. 3. 9. 10. i.] parte posteriore sedes, infima, sinu asperum habet [f. 4. 10. k.] ut ex eo l. gamentum cartilagineum proripat, quo tibiæ tali os colligetur. Sic in ap. pedicis inferiore anterioreque sede [f. 1. 3. 9. l.] sinus est asper & transversim oblongus, unde ligamentum, tali cervicem [tab. 27. fig. 3. N.] tibiæ ossi necdens enascitur. Tandem hoc os, quemadmodum & fibula intus cavitatem habet medullam continentem: nec foraminibus caret. *Idem. Erasmus malleolos in homine tales simul cum Plinio que talus continetur, ac contegitur, ut ne eum tangere possit: ut φυεγες talos reddiderint, Ves. y Usus tibiæ expeditior progressus, Piccolh. tibia pedis causa effecta, Plat.*

DE FIBULA.

Alterum os περόνη & fibula a nominatur, & sic dicta videtur, quia ut fibula b in ædificiis dicuntur feramenta, quibus trabes conjunguntur, ita hoc os tenuius in tibia c significat interv. fibula dicitur, quod tibiæ musculos conjungere videatur: & canna minor vocatur: dum ostotum hoc tibiæ extrinsecus, sicuti radius cubito apponitur, superius quidem sub tibiæ capite [t. 26. f. 1. C. sub A.] sinum fere planum & incrustatum [fig. 5. Q.] inferius tibiæ sinum longum subit [fig. 1. E ad D.] utrinque tamen per arthrodiam (hoc est levem in articulationem, quæ cum motu obscuro fit) quæ synarthroseos species est, articulatur. In medio vero dehiscunt [fig. 2. Y inter V & X.] quo inter utrumque musculi pedis locari possint, præsertim parte superiore cum tibia ibi in sinum flectatur: in quo intervallo ligamentum membraneum [tab. 21. f. 18. K.] fibulam tibiæque medio spatio complectens, reponitur. Longitudine tibiæ ossi æqualis est, nam licet supra ad genu non ascendat, infra tamen tibiæ excedit: latitudine vero & crassitie longe gracilior, & paulo sub medio versus tibiæ os, nonnihil curvatur & latere externo concava redditur [fig. 1. 2. Z.] imo non secus ac tibia, figuram propemodum angularem adipiscitur. *Idem. Erasmus malleolos in homine tales simul cum Plinio que talus continetur, ac contegitur, ut ne eum tangere possit: ut φυεγες talos reddiderint, Ves. y Usus tibiæ expeditior progressus, Piccolh. tibia pedis causa effecta, Plat.*

Nnn

Capi-

Galeo de of. 22. interpretatur suram vertit, at 3. us. par. 13. fibula tenue admodum & multo minus quam tibia os extrinsecus ipsi artensum. a Suræ & fibula, Latinis, Ves. Col. Picc. Arabibus facile minus, Laur. b Piccolh. c per synarthrosin alligatur, de of. 22.

Capita duo habet, supra infraque; unum, quibus appendix coalescit, quæ in processum acutum, non nihil asperatum definunt. Horum superius infra tibiæ caput subsistit [fig. 1. C sub. A] appendice munitum & cartilagine obductum: quod rotundum est, & parte externa insigniter protuberat [fig. 5. 6. c] quo tendinem quarti musculi tibiæ suscipiat, & septimi musculi pedis caput ex eo prodeat. Hujus appendix latere interno sinum habet [f. 5. Q] amplum, cartilagine incrustatum, cui caput appendicis ossis tibiæ articuletur [fig. 4. R].

Inferius caput in acutum tendit [fig. 1. E] & tibiæ ossi tanto declivius descendit, quantum tibiæ, caput superius fibulam excedit, appendice donatur, [fig. 1. E 2. 5. 6. 9. n] quæ crassescens processum malleolum externum dictum demittit, qui interiore magis descendit, & ipsius sinus communis [figur. 7. d e f g b] talum suscipientis, latus externum constituit. [figur. 9. 11. b.] & cartilagine incrustatur. Malleolus hic interno humilior est, latere externo gibbus est, & aliquousque carne nudus tactu deprehenditur: ab hoc musculi aliquot pedis extremi principium sumunt: intrinsecus sinum asperum habet [fig. 2. 6. 11. r] ex quo ligamentum cartilagineum fibulam talo connectens profluit. At supra malleolum sinus quidam [fig. 2. 6. g] ligamento transverso tectus, quo tendines sexti & septimi musculi pedis tutius deducantur observatur.

Inter utrumque caput, fibulæ corpus inæquale est; propter sinus & lineas, propter musculorum insertionem creatas, ita ut circa medium triangula videatur: anterior enim linea acuta & protuberans apparet [fig. 1. 5. ff] posterior vero deprimitur & utrinque lineam extuberantem habet [fig. 1. 2. 5. 6. tt un] quæ lineæ, fibulæ latera tria constituunt [fig. 1. 5. x & 2. 6. β] sic inferius supra appendicem [fig. 5. 6. 11. r] asperitas quædam protuberat, qua sedeligamento valido interveniente, tibiæ annectitur. d

d Fibula usus triplex 1. de articulationis ad astragulum, à qua extenditur & flectitur pes 2. quod quæ potissimum parte ab incidentibus foris laedenda erant; facile omnia tibiæ vasa & musculi hac circumposita est fibula. 3. est in externo femoris capite, quod tibiæ sustinet, ad id loci enim affirmata ad securitatem simul & firmitudinem non parum confert, 3. us part. 13. ut radius motuum manus, ita fibula motui in orbem pedis auxiliatur, Piccolb.

De Patella, seu Mola.

CAPUT XLII.

De hac Gal. lib. de off. 23. 3. us part. 15.

OS quod ipsi genu anteriori præponitur [tab. 25 fig. 4. 5.] Græcis ^a ἐμπροσθεν & ἐμ-
^{γυναικός} γυναικός, Hipp. ^{γυναικός} γυναικός, de natura off. ^{ἐμπροσθεν} ἐμπροσθεν, eidem ^{ἐμπροσθεν} ἐμπροσθεν, in Mochlico, ^{ἐμπροσθεν} ἐμπροσθεν Hipp. de ^{ἐμπροσθεν} ἐμπροσθεν loc. in hom. & Gal. de off. 3. us part. 15. & ἐμπροσθεν, alius ^{ἐμπροσθεν} ἐμπροσθεν. b Patella, mola, Vesal. Plat. rotula Laur. patella, genu mola vel scutum vel scuti forme os, vel genu rotula, Col. Piccolb. c Rotundum Gal. de off. orbiculare & brevi scuto non ab simile, molaris lapidis rotunditate mola, Ves. pene orbiculare, Col. fere rotunda & globosa, Piccolb. in quadrupedibus longius & angustius, in avibus latius & brevius, Ves.

desinens: magnitudine mediocri, latitudine vix at longitudine duos transversos digitos superans, crassitie dispari cum in extremitatibus tenuis sit, sensimque crassior reddatur, ita ut in medio emineat, umbonem referat, quae cum in altitudinem extumescat globo in quodammodo est.

Hoc tendinibus crassioribus musculorum femoris septimi, octavi & noni, qui per genu ad tibiam feruntur, parte superiore tota innascitur, à quibus firmatur, ipsique pro ligamento sunt, quo femori ac tibiae committatur, & ab his foris obducitur: intrinsecus vero, cartilagine laxi & lubrica, magna ex parte (praesertim qua femur respicit) ad motum expeditiorem obducitur. Et si tendines quibus adnascitur, recte aji-mantur, anterieus & in lateribus [fig. 4.] asperum & ex cæcis foraminibus oblitum conspicitur: posterius vero & tubere mediocri prominere [fig. 5. g. h.] & utrinque sinus leviter in sculpi [fig. 5. i. k.] cartilagine incrustati, quorum exterior latior & amplior est: huiusq; tubera à sinu, quod inter capita femoris est [fig. 5. h. inter EF] suscipitur, quem admodum patellae sinus femoris capita suscipit: quare femur patellam excipit & ab ea excipitur, & sic cum femore per ginglynum, cum tibia per arthroidiam articulatur: quare mobilis est, ne articuli huius motum difficilem reddat. Est quin etiam parte anteriore ac inferiore [fig. 5. L] qua in processum ducitur & tibiae elatiorem sedem respicit, aspera & foraminibus donata, quo tendinibus musculorum dictorum rectius innascatur.

Substantia ipsius, dum animal oritur cartilaginea est, talisque aliquot mensibus permanet; postmodum instar cuiusdam durioris appendicis induratur; tandem ossea, dura & solida, qualis in adultis apparet, redditur.

Ullus femoris & tibiae articulum laxum tegere, firmare, & prohibere ne tibiae extensio extra lineam rectam feratur, in illis maxime figuris (ut Galenus loquitur) quæ vnde id est genu flexo, & unde id est geniculatim & curvæ vocantur, ne antrorsum procedentibus & ambulatibus femur ad partes anteriores labatur & luxetur: neve in locis declivioribus euntes (cui totum corpus in anteriora propendeat) cadamus, & quo ti-

Nnnn 2

bia

circi plane perspicimus, Col. potissimum patella in genu vincitur à vinculis ligamentis, sicuti quilibet alius articulus, non nego tamen stabiliri à tendinibus musculorum illuc spectantium, Piccolb. f. Patellae facies exterior levigata, interior exasperata, Piccolb. g. Per ginglymon, Col. per ginglymon per arthroidiam & per syndesmon, Piccolb. h. Patella os parvum, molle, cartilagineum femoris, & tibiae commissuram cogens, Celsus, os extrinsecus cartilagineum, Gal. oss. 3. us. part. 15. & Marinus cum aliis Anatomicis, os cartilagineum separatim vocarunt; sed forte observarunt patellam cui tendinum substantia innata, at si debite emundetur, aut sola in cœmisteris occurrat, perquam solida fortisque cernitur, non in hominibus tantum, sed etiam bobus, Ves. non est os cartilagineum, neque rursus adeo durum ut solidum existimari debeat, at substantia qualis dura appendicis, ut nutrimentum per omnes sui partes suscipiat, Col. ossea non cartilaginea sed non dura solidaque ut femoris tibiae substantia, sed ut substantia durioris appendicis, talem enim efflagitabat illius usus, Piccolb. Cartilaginea dum oritur animal, ossea postea fit, & dura valde in adultis apparet, Fallop. obs. i. Hipp. de locis in hom. mola incumbens, humiditatem à carne in articulum descendere prohibet. Vesal. in sua Chirurgia negat patellam ad firmitatem articulationis quicquam conferre, eaque rupta aut extracta hominem claudicare, quod multis exemplis sibi compertum fuisse asserit. 1. Gal. 3. us. part. 15. ostendit exemplo adolescentis in palestra versantis, cui luciantis mola à ligamenti evulsa à genu quidem secessit, abiit autem sursum ad femur, cui inerat ambo periculosa curvatio in genu & ambulatio in declivibus: ob idque sustentaculo & firmamento opus erat huiusmodi loca permeant. Pareus lib. 14. c. 22. notat, neminem se unquam vidisse non claudicantem, cui istud os fractum fuerit.

d. Tanta est
quanta est ro-
tunditas, quā
efficiunt polli-
cis & indicis
extrema sese
tangencia, Pic-
colb.

e. Neque femori
neque tibiae ali-
ter quam ten-
dinum benefi-
cio commissa:
hoc enim pri-
vatim sibi ven-
dicat, quod al-
teri ossi liga-
mentorum ope
non alligetur,
sed tendinibus
illis ad femoris
os valde diffi-
cile constrigitur,
Ves. suis liga-
mentis, cum fe-
mori tum tibiae
nectitur, quic-
quid alii dixe-
runt, nam ex ap-
pendicibus fe-
moris & tibiae
ligamenta nas-
cuntur, quibus
manifeste mo-
lam utrinque vin-

bia recta & retrorsum contracta genu in angulum rectum flecti possit; forte etiam ut tendines musculorum dictorum defendat, ne in flexura genu à femore antrorsum prominente lædantur, sua duritie femoris impetum sustinens, quemadmodum de ossiculis sesaminibus^m supra dictum fuit.

*m. Ves. mola
cum usum pra-
stat, quem ossa
sesamina in a-
liis articulatio-
nibus: at in chi-
rurg. ad tuse-
lam & securi-
tatem articu-
lationis positam
fuisse asserit.*

Præterea videmus in iis, quibus ea vel contusa, vel disrupta est, in duo vel tria fragmenta, vel in longum, vel in transversum difficilem esse ipsius genu curvationem & angulationem in declivibus locis, ita ut per ea loca ambulaturi seipione indigeant: læpe etiam claudicatio remanet propter callum inductum, qui liberam genu in flexionem impedit. Novimus quendam Juris Doctorem, cui ante plures annos patella ex casu in genu, in duo frusta per transversum (ad eum enim vocati fuimus) fracta, qui quidem non claudicat, sed scalam descensurus, cum genu flectere recte non possit saliendo descendere cogitur. Quare cum mole sive patellæ tanta sit utilitas, non intelligimus quid illi sibi velint, qui de Thebanis narrant, eos quo pernecitate pedum valerent, sibi ossa quædam circa genu exemisse.

De Pedis minoris ossibus, quæ ad Tarsum referuntur.

CAPUT XLIII.

De his agit Gal. lib. de oss. cap. 24. 3. usque part. 6. & 8.

*a Gal. 3. usque
part. 6. pedis par-
tes manus ossi-
miles dicit, tar-
sum pedum &
digitos: subjun-
git, ut partem
pedis, quæ ipsi
tibia, cui totum
crus secundum
rectitudinem in-
cumbit, subja-
cet, unum no-
men quale est
tarsus & pe-
dum non ha-*

Pedis extremi seu parvi, ossa^a triginta octo sunt, Tarsi, septem: Pedii sive metatarsi quinque, digitorum quatuordecim & sesaminum duodecim: de quibus ordine.

Tarsi ossa^b septem sunt, ex quibus quatuor^c nomina propria habent, tria vero à plerisque sine nomine relicta fuere. Primum est [tab. 27. fig. 1. 2. f. & tota fig. 3. 4. 5. 6.] quod à *ἄστρον* & *ἄστρος* Græcis, & vulgò os balistæ nominatur: hoc tibiæ & fibulæ ossium appendicibus tanquam firma basis subjacet, licet soli tibiæ subiectum videatur: quo osse non solum homo, sed reliqua animalia, quæ pedibus in digitos scissis incedunt, donantur. ^d Hoc parte elatiore tuber orbiculare & læve [fig. 3. 5. 6. ABCD] cartilagine incrustatum habet, quod formam basilistæ nucis inversæ, aut rotulæ partem quartam refert, ejusque tuberis superficies veluti quadrata, & lateribus quatuor terminata: quare *τέτραγος*^e id est quatrio à nonnullis nominatur: horum primum^f bet, sed componitur ex tribus ossibus astragalo, pterna & scaphoide, quibus solis nulla est in manu particula, qua proportionem respondeat, sed sunt simpliciter basis solius instrumenti, hæc Gal. Pedis ossa 26. sunt, tali, calcis & naviculare os, 4. tarsi 5. pedii 14. digitorum & sesamina ossicula. Ves. Plat. pedis extremi ossa 26. unde per uno minus quam manus constat, 7. tarsi, cum brachialis sint ossa 5. pedii 14. digit. Col. Piccolb. 7. tarsi, 5. metatarsi, 14. digitorum, Laur. ^b à *ἄστρον*. ^c Pedii os primum, de oss. 24. Tarsi ossa, 7. Col. Laur. at Ves. 4. Plat. 4. quia tria priora ab his separant: at Piccolb. tarsus ut brachiale ex septem struitur, quorum tamen unum geminum putatur, propter lineam quandam, quandamve fossulam oblongam, illud in duas partes determinantem ut tanquam octo numerentur, ita tarsus ex 7. confurgit. hæc ille quicquid dixerit Aristoteles & illum secuti, Col. ^e Prima tria & unum ex quatuor seq. proprium nomen obtinuerit, postrema tria adhuc sunt sine nomine, Col. Piccolb. ^d Sex facies tanquam ressera obicit, quarum superior est quod in modo contraxa levibus quibusdam sinibus & eminentiis inæqualibus efficta, ut cum tibia ginglymo jungeretur: inferior cavata, ut calcem excipiat: reliqua quatuor, anterior, posterior, dextra & sinistra, quasi circumfusa, varie sunt exspectata, ut unus & necessitas expostulabant: hæc Piccolb.

primum & secundum [fig. 3.5.6. ab A ad B. à C ad D] juxta ipsius longitudinem, velut in orbem ducuntur: tertium [ab A ad C] anterius: quartum [à B ad D] posterius fertur. At in medio sinum levem [fig. 3. EE] lateribus hinc inde prominentibus [fig. 3. FF] quemadmodum in rotula ad quam funis reflectitur obtinet, quo cum tibiæ ossis appendice [tab. 26. fig. 9. 10. d ef] per ginglymum copulatur. Latera autem hujus plana sunt & declivia, levi cartilagine incrustata, quo malleolos suscipiant, quorum interius [fig. 5. G] exiguo spatio incrustatum, superficietenus tantum comprimitur, & internum malleolum tibiæ suscipit: exterius vero latius est [fig. 6. H] & ampliter sinuatum, longiusque descendit, quo malleolum externum fibulae, magis descendentem [tab. 26. fig. 9. 11. h] apte admitat. Sic talus cum tibia & fibula jungitur, quæ articulationis pedis recto motui subservit, & quo facilius & sine ossium attritu fiat, cartilagine utrinque incrustatur.

Præterea latere interno, sinum asperum habet [fig. 5. I] quo ligamentum cartilagineum à malleolo interno pronatum, quo talus tibiæ colligatur, recipit. Sic & externo latere [fig. 6. K] alius sinus qui ligamentum ab externo malleolo productum excipit. Sic parte posteriore ad tuberculi radicem, ubi tibiæ & calci committitur [fig. 5. post B D] asperitas, partim ut ligamenta à tibia enata excipiat, partim alia in calcem porrigat. Sinus item in hac posteriore sede [fig. 5. 6. LM] pro transitu tendinum musculorum pedis inferiora subeuntium paratus.

Præterea non solum cum tibia & fibula sed etiam cum osse naviculari conjungitur, quare anterior tali pars in cervicem oblongam [fig. 3. 4. 5. 6. N] producit, quæ e De off. 24. in caput rotundum [O] cartilagine lubrica obiectum desinit, quod ab ossis navicularis sinu amplo [fig. 11. k] & rotundo excipitur, quo pes modice, motuque obscuro in-
trorsum & extrorsum, non nihil etiam in gyrum moveatur.

Ad calcem etiam duplici articulo tali os connectitur: quare inferior tali pars, posterius & sinum amplum & profundum [fig. 4. Q] cartilagine obductum habet, cui calcis ossis caput amplum latumque [fig. 7. 8. 9. P] inferitur: anterius vero & tubere oblongo & levi prominet [fig. 4. S] quod calcis sinus oblongus [fig. 7. 8. 9. R] parte posteriore suscipit. Inter hæc duo spatia, vel horum articulorum medio, cavitas est [fig. 4. TT] profunda & exasperata, cui calcis sinus [fig. 7. 8. 9. R] è regione respondet: cuius cavitatis usus ut mucosam substantiam ac pinguedinem simul contineat, ad ossa hæc, ne motu crebro exiccentur, humectanda, & ligamenta cartilaginea, quæ hoc loco talum calci arctissime jungunt, pronascantur & contineantur: quare in ossibus emundatis & commissis magnum intervallum hic remanet. Aliquando etiam parte posteriore quasi in processum geminum supra calcem, qua ad internam regionem vergit extenditur. Nulla autem appendice donatur, cum pari robore undique indigeat, neque musculorum insertionem excipiat, neque eiusdem principium offerat. Substantia autem ipsius in ortu quidem, quemadmodum & reliquorum tarsi ossium, calce excepto cartilago est: at in adultis intrinsecus fungosa, ubi vero processus emittit, solida & densa, multis tamen foraminibus pervia est.

Nnnn 3

^f Ves. anterius,
^{Col.} interior,
^{Plat.}
^g Ves. posterius,
^{Col.} exterior,
^{Plat.}
^h Columbus:
ⁱⁿ viventibus
^{cartilaginosis}
^{ligamenti} re-
^{pletum,} Ves.
ⁱ Ves. Plat.
^k Columb.
^l Vesal.
^m Sinum am-
^{plum non ha-}
^{bet, quo medul-}
^{lam asserver,}
^{et ubi proces-}

^l Substantia autem ipsius in ortu quidem, quemadmodum & reliquorum tarsi ossium, calce excepto cartilago est: at in adultis intrinsecus fungosa, ubi vero processus emittit, solida & densa, multis tamen foraminibus pervia est.

os maximi
 & 3. de off. 2. 4.
 tarsi secundum
 Col. Piccolh.
 Laur.
 De off. 2. 4. 3.
 us part. 8. Infe-
 rius laeve, poste-
 rius & superius
 rotundum &
 praelongum, ad
 exteriora pedis
 maximum.
 P. 3. us part. 8.

Q. Huius figura
 tetragona puta-
 tur, at cum ha-
 beat latus an-
 terius, posterius
 superius, infe-
 rius, interius &
 exterius, vide-
 tur tessellam
 imitari, Picc.

Per synarthro-
 sin nequitur, de
 off. 2. 4.

Calcis os secundum est [fig. 1. 2. Δ & tota fig. 7. 8. 9.] quod *Algebra* calx, calcaneum, & pedis calcar dicitur, quod omnium pedis summi ossium ^o maximum & crassissimum est, propter firmitudinem; nam pedis extensio & flexio de articulationis tali opus est, quæ ad tibiæ & fibulæ os fit; ad latera vero circumlatio, est de articulationis ad os naviforme; ossium connexus multi & parvi parum prædictis constructionibus auxiliantur; & quemadmodum talus principalissimum est ossium, quæ ad pedes movendos pertinent, sic calx eorum, quæ ad firmationem; & nisi calx talo major esset, non solū talus sed etiam tibia retrorsum laberetur, rectitudine enim tibiæ subjacet & ipsam fere totam solum sustinet, & per hanc femur & per hoc superjacens corpus: necessario igitur insignem magnitudinem obtinuit; alioqui temere natura citanta onera commisisset: idcirco quoque firmam ei conjunctionem esse præstitit, non fallacem nec errabundam: quare & natura ipsius processus, ligamentis plurimis, duris, cartilaginosis latis & rotundis, non solum talo sed aliis etiam ossibus adjacentibus conjunxit, quo firmitudinem convenientem servaret. Quare non solum talo subjacet, eumque sustinet, sed eidem quemadmodum & cubiformi articularur. Talo quidem elatori sede capite suo amplo [fig. 6. 8. 9. P] ipsius tali sinum [fig. 4. Q] subit, & calx sinu suo angustio & fere plano [fig. 7. 8. 9. R] tali tuber [fig. 9. S] admittit, at cubiformi sede anteriore [fig. 11. R] capite suo depresso [fig. 7. i] jungitur. Inferior ejus pars [fig. 2. XTZ] latiuscula est, quo pes tutius consistat, aspera & inæqualis musculorum causa.

Processum habet asperum [fig. 2. YZ, fig. 8. I, fig. 9. Z] transversum, juxta posteriora deorsum latum, à cujus sede anteriore, musculus digitorum quatuor secundum os flectens prodit, & carnosa portio, à qua musculi digiti pollicis adducentes producuntur: quare inter processum cavitas est, ne dum pes humo affigitur, horum musculorum capita inter calcandum comprimantur.

Caput ipsius seu superior sedes, in pueris appendice donata, teretis corporis speciem refert, quæ impressionem levem, ac asperitatem paululum elevatam [fig. 7. 8. 9. ab] habet, in quam ligamenta ossis tibiæ & tali inseruntur: sic posterius depresso & utrinque aspera [fig. 2. 8. 9. c] quo tendo totius corporis maximus & robustissimus qui musculorum primi, secundi & quarti pedis est inseratur. Anterius sinus asperos & profundos habet [fig. 7. VV] qui cum tali sinibus cartilagine opplentur.

Latera vero calcis lata sunt & depresso; horum internum [fig. 2. 8. dd] laeve & insigniter sinuatum, in medio tres inscriptiones [fig. 2. 8. e] quo tendinibus quinti pedis musculi, & duorum ultimos articulos flectentium (illac transeuntium reflectuntur) pedisque inferiora petunt, via sit; quemadmodum etiam venis, arteriis & nervis; quamvis etiam à calcis processu defendantur, qui calcis latus internum impenso cavum reddit. Externum vero latus [fig. 2. 9. Z] depresso est, asperum & inæquale, è cujus humiliori sede musculus digiti parvi abducens prodit: at sede anteriori sinus parvus [fig. 7. 9. S] cartilagine incrustatus, sub processu exiguo occurrit, qua tendines septimi ac octavi musculi pedis transeunt, & ad malleoli externi sedem posteriorem reflectuntur. Qua vero parte digiti minimum respicit, anterius laevis, ob cartilaginem qua incrustatur, & parte superiore capite amplo leviter elato prominet, quo cyboidis ossis sinui fere plano [fig. 1. 2. Θ] articularur: inferne vero sinu obliquo & ad interna vergente cyboidis portionem excipit.

Navi-

Naviculare os tertium est [f. 10. & 11.] quod Græcis à forma *navis* & *oides* naviforme & cymbam referens dicitur, quia oblongum, posterius profundum, anterius cavum & sede superiore gibbum [f. 11. op.] & inferiori cavum [f. 10. 11. q.] est. Hoc in pedis interna parte situm est, huiusque intermedio tarsi præcipua pars talo committitur: nam posteriori sede sinum habet [f. 11. k.] profundum & transversim oblongum [f. 10. lmn] cui tali caput [f. 3. 4. 5. o.] inferitur, qui articulus ad Enarthrosin "obscuram" referri debet, cum ipsius motus obscurus sit. Altera pars, capite oblongo, tribus superficiebus distincto prominet, [f. 10. lmn] quibus tria ossa postrema articulantur [f. 1. 12. 13. ch. 1. 2. 3.] verum cum ita læves sint, dubium an excipiant, vel excipiantur. Latus externum amplum rotundum & sinuosum [f. 10. q. r. & 11. q.] præsertim ubi ossi quinto jungitur: mox sensim angustatur & in processum internum angustum [f. 10. q.] navis rostrum referens definit. Internum vero prominet, ita ut tuber insigne constituat, quod sinum inferiorem [f. 10. 11. q.] cui eminet, majorem efficit, ubi tædo musculi sexti pedis reflectitur. Tandem hoc os asperum est superius & inferius, quo inde ligamenta, hoc os talo & tarsi ossibus connectentia, prodeant. Hæc tria sunt ossa, quibus in manu nihil assimilari potest & cruris basis existunt, quare inter tarsi ossa veteres non retulere.

Sequuntur quatuor alia quæ sola Tarsum * constituere voluerunt & carpo in manu assimularunt, quæ ligamenti simul juncta fornem imitantur cum superficiem superiorem convexam & arcuatam, inferiorem concavam habeant: quare cubiforme calci, tria sequentia cum naviculari junguntur & simul sursum à terra elevantur. quia hæc constructio validior est & figendo pedi & corpori sustinendo: domus enim camerata firmiores & diuturniores sunt: quæ idcirco etiam prominere debuerunt, quo inferne cavitas relinqueretur, quo partim tendines musculorum, qui sub plantam mittuntur, partim ipsi muscoli qui ab inferiore parte tarsi oriuntur & in digitos pedis diriguntur, tuto loco collocentur: nam si planta plana fuisset, muscoli cum suis tendinibus compressi, nec suo defungi munere potuissent, nec sine magno dolore id contigisset. Præterea ubi lateribus hæc committuntur, cartilagine non obducuntur, sed solum ubi naviculari ossi proxima sunt, reliqua parte ligamenti cartilaginosis copulantur: appendicibus quoque destituuntur, & substantia tali & naviculari ossi similia sunt. Quantitate etiam & figura discrepant [confer f. 1. cum 2. & 12. cum 13.] cum duo prima multo majora sint, duobus in medio positris, & quatuor pedii ossibus junguntur: sed de his singillatim.

Cubiforme os, quartum est [f. 1. 2. 13. char. 4.] & Græcis à forma cubum tessaræ imitante

mine utar. Ves. vide Gal. 3. us. part. 6. & 8. qui à tarsi ossibus tria prima separat: & lib. de off. 24. explicato astragalo scaphoide, calce & cyboide at, tria ossa parvula inferiori scaphoide parti, per synarthrosin copulari & post quatuor hæc primam partem pedis quam tarsum vocant finiri. Non video, cur tria illa priora à tarsi ossibus seungi debeant, sicuti ab aliis anatomicis factum fuit, satentibus quatuor posteriora, quæ soli tarsi appellatione dignantur, ad brachiale tantum referri debere, tribus primis absque relatione designatis, Colum tarsus ex quatuor ossibus, ex duplicatis brachiale constituitur, ex pluribus & minoribus apprehendendi instrumentum, ex grandioribus & paucioribus ambulandi instrumentum componi debuit. Ves. tarsus ex quatuor ossibus constat, Fall. de off. 7. Os scaphoide seu pedis quartum, de off. 24. tarsi quartum, Ves. 4. tarsi (quod cæteris primum) Col. Piccolh. Laur. os scaphoide & os tessaræ quadratum est Laur.

[Pedis os 2. scaphoide de off. 24. tarsi os 3. Col. Piccolh. Laur.

[Parva & imbratilis potius est similitudo, Fallop. de off. Scapham aut Phaselum imitatur, Col. facies exterior rotunda convexusque est, ut

exteriorem navis fundum imitatur, Piccolh. u. Columb. ad enarthrosin,

qua synarthrosos species est, Piccolh. per hoc circumducitur, Plat.

x Tagodis Græcis, quatuor pedis ossium series subinde universam superiorem pedis partem intelligunt, ut Gal. in lib. de administ. sect. facit. Latini plurimum hanc ossium

struem plantam nunciant, verum planta nomen latius patet: quare tarsi no-

z. Ves. dicitur

x. Socius, quia

habet a. late

ra inferius

superius &

duas partes la

terales & quæ

admodum quæ

que cubicum

corpi sex par

tibus constat,

sic quoque hoc

os, quia tessera

similitudinem

habet, Fall. de

offi.

a. Ves. Col. Picc.

b. Committitur

ginglymo diar

throscos, quia

ut suscipit

ita suscipitur

cum motu ob

scuro, Picc.

c. Ves. sinus duos

habet pedii ossa

duo extrema

susciipientes,

Col.

d. i. tarsos, Ves.

5. tars, Col.

Piccol. tarsitria

ossa, Plat.

e. Tria tars ossa

sanaviculari

coarctata pro

prio carent no

mine, at non

nullis simul

omnia & & &

dñ appellatur

Ves. tars ossa

quatuor sunt,

tria & &

dñ appellant.

quia sunt dura &

cunei ferrei similitudinem habent, Fall. de off tria innominata sunt, at tamen numeri, situs, & acfor

me ratione distinguuntur. Col. idem Piccol. tria innominata a Fall & & & dicuntur, Laur. f. 2 tars, Ves. 6. Col.

Piccolh. g. Plat. anterior, Col. h. Plat. posterior, Col. i. 3. tars, Ves. 7. Col. Piccolh. k. Plat. anterior, Col. l. Plat.

posterior, Col.

tante, quod quasi latera^z sex habeat: & quia variis formis præditum πολύμορφον^a multiforme, Arabes grandinosum vocant. Hoc pedis lateri externo calci præponitur, cæteris majus est & latere primo [f. 13. x] posterius^b calci [f. 7. i] inæquali superficie jungitur, & terræ innititur, dubium an suscipiat, an suscipiatur: secundo latere [fig. 12. αβ] antèrius, pedii ossi quarto & quinto superficie^c continua committitur, eaque basis instar fulcit: tertio interius [fig. 12. 13. γ] septimo tarfi ossi jungitur: quarto exterius [fig. 12. 13. δ] quod latus obscure planum est & quemadmodum duo sequentia latera nulli ossi cohærent; quintum enim latus superius planum sed asperum, [fig. 12. 13. ε] & sextum inferius est [fig. 2. ζ. fig. 3. ζ]. Tandem extrema sedes processum habet sinu medio [fig. 2. η] oblongo & oblique delato divisum, ad quem tendo musculi septimi pedis revolvitur.

Cuneiforme majus seu tarfi^d quintum [fig. 12. ch. 1. fig. 13. f] quod quemadmodum & sequentia^e duo χαλκοειδής, id est, cuneiformia quod cuneum referant, nominantur: hoc pedis latus interius occupat & è regione pollicis situm, antèrius sinuatum [fig. 13. γ] quo navicularis processus portionem excipiat, quemadmodum retro, primum pedii os suscipit, quod an sinuatum an prominens incertum est, quod posterioribus his ossibus commune est, quatenus invicem aut cum pedii ossibus copulantur, ita ut in modum glenes committi videantur, cum sinus obscuros habeant: videtur tamen hæc pars duo exilia tubercula obtinere, cum pedii os cavitatem duplicem præseferat: superior pars modica est, aliquantulum convexa, qua sexti ossis sinui superficiali jungitur: inferior denique crassior est, quo terræ firmitus hæreat.

^f Cuneiforme minus seu tarfi sextum [fig. 12. 13. ch. 2.] si partem superiorem quæ pedem spectat consideres, latum & nonnihil arcuatum est, & veluti quadrilaterum apparet: si partem inferiorem quæ plantam spectat, angustissimum & quasi in aciem abiens, sicque cuneiformam, quemadmodum & septimum illi proximum refert, & aliis cuneorum modo, ad ea arctius jungenda interposita videntur. Et hoc^g posterius cum naviculari [fig. 13. i] antèrius leviter prominens cum pedii ossi secundo [fig. 12. x] interius cum quinti tarfi ossis latere externo, exterius cum interiore septimi jungitur.

ⁱ Cuneiforme medium seu tarfi septimum [fig. 12. & 13. ch. 3.] hoc inter quartum & sextum situatur, quadrangulo nonnihil simile sed longiusculum, quod posterius^k sinu exiguo [f. 13. u] naviformis tuberculum suscipit: antèrius pedii os tertium admittit [fig. 12. λ] & lateribus ossis sexti & quarti latera attingit, cuneique instar inseritur: inferius processu extuberat [fig. 13. θ] cui quintus pedis musculus inseritur, [quatuor tarfi ossium simul nexorum faciem anteriorem fig. 12. at posteriorem fig. 13. exhibet.]

De

De Ossibus Pedii & Digitorum pedis.

CAPUT XLIV.

De his agit Gal. lib. de off. cap. 25. 3. us. par.

Pedium secunda pedis pars est, quam Græci ^{πεδον}, Celsus plantam, alii pecten, a ^{πέντε} Hipp. & quod metacarpo ^b in manu respondeat, metatarsum vocant [f. 27. f. 1. ch. 1. II. III. IV. V.] Ex ossibus ^c quinque componitur, quæ tarsi ossibus articulantur & digitorum ossa sustinent. Tarsi quidem, aliqua ex parte planis, iisque levibus superficiebus committuntur [f. 12. 1. x. λ. α. β.] primum pollicis præpositum, tarsi ossi interno, quod indici secundo, quod medium tertio [f. 2. inter π & π] duo reliqua ossi cubiformi [f. 2. b. Differt à post-brachiali quia ex quatuor tantum ossibus, pedion ex quinque componitur, Fall. de off. c. Non quatuor ut postbrachiale, quia tria ossa habet pollex, non duo, ut Gal. voluit, Ves.] per arthrodiam coarticulantur: & quemadmodum tarsi ossa antèrius lineæ rectæ non sunt posita, sic & pedii ossium aliud alio magis in posteriora porriguntur: hæc tamen una serie & acie, quemadmodum & digitorum ossa locantur, quod ad stabilitatem & firmitatem plurimum confert. Oblonga sunt, teretia, utrinque in capita desinentia: nam ubi cum tarsi ossibus articulantur, crassa sunt ac sinuata & lateribus sibi proxima, quæ sensim à se mutuo recedunt, tenuia fiunt, in medio intervallo [f. 1. 2. v. v.] pro musculis interosseis relinquunt. Capita vero inferiora quæ in sinus profundos digitorum, & quidem primorum articulorum inferuntur, [f. 1. 2. ξ in ϕ] orbiculata sunt, & appendice parte posteriore adacta; horum capita magis versus superiora, minus versus inferiora diducta sunt, secus quam in manibus fiat; siquidem pedum digitos in extensione plus sursum quam manuum elevari oportuerit: quod articulationis genus ad enarthrosin referendum videtur. Horum primum, quod pollicis præponitur, cæterorum crassissimum est, cæterisque brevius, capiteque magis orbiculato, quo pollex aliis magis in latera moveatur: quod parte ea qua tarso articulat sub capite sedeque inferiore in tuberculum seu processum prominet [f. 2. π] ut ei tendo septimi musculi pedis inferatur, quo loci sesamina ^d duo apposita sunt, aliis majora & cartilagine incrustata. Secundum os indicem sustinens, longissimum est, quemadmodum & quintum minimo subiectum: hujus enim ultimi longitudinem processus insignis [f. 2. ϵ] qua tarso articulat, auget, quod in pedis latus externum producit, quo tendo musculi octavi pedis implantetur. Hæc supra infraque appendicem cartilagine incrustatam obtinere: & tota substantia & sinu longo medullam complectente, metacarpi ossibus respondent: foraminulis quoque pertusa sunt, quo per ea venulæ & arteriolæ, quemadmodum per cætera ossa, ad ea nutrienda & fovenda subeant.

Digitorum ossa pedii ossibus succedunt, pedis partem tertiam explent & numero quatuordecim sunt, [f. 1. A. E. f. 2. A. E.] cum singuli ex ossibus tribus pollice excepto, ad digitorum manus similitudinem consent, [f. 1. 2. σ v.] à quibus substantia,

O o o o

structu. c. Pes à manu

natur, hæc enim 27. efformatur ossibus 8. brachialis 4. postbrachialis & 15. digitorum: pes autem 26. calce, tale, natum.

Interpretes plan-
tam reddidere:
pedis vestigium
etiam, Ves. Col.
b. Differt à post-
brachiali quia
ex quatuor tan-
tum ossibus, pe-
dion ex quin-
que componi-
tur, Fall. de off.
c. Non quatuor
ut postbrachia-
le, quia tria
ossa habet pol-
lex, non duo, ut
Gal. voluit, Ves.

d. Excipi à Se-
saminis jure
hæc possunt, se-
quidem majora
sunt & cartila-
gine quadam
incrustata qua
tenus videlicet
articulo inha-
rent, Col.

naviculari, 4. tarsi: 5. pedii: & 14. digitorum, cum tamen Gal. 2. com. in Hipp. lib. de fractur. scribit pedi non aliter quam manui 27. adesse ossa: parum perpendens se bis cubum imitans os enumerare: aut præter id os alia 4. tarsi recensere: quemadmodum fecit eodem lib. cum 4. tarsi ossa cubum referenti ossi & illi quod cymba assimilatur articulari, sed parum anatomicè tradit, Vesal.

structura, ac situ parum discrepant: nisi quod articuli primi sinu profundiore constant, cum in eos pedii ossium capita profundiora inserantur, & quamvis capita pedis ampla sint, sinum tamen non tam amplum ut manus obtinere, ut sic digiti extendendo magis elevari & subjectis nonnihil cedere possint, dum stando teræ innitimur. At pollex ossibus duobus efformatur [f. 1. φχ] quo cavitatis pedii anterior sedes firmius terræ innitatur. Verum ossa hæc omnia infra supraque appendices habent, & cartilaginibus firmiter, ad lubricam magis articulationem, quæ per ginglymum fit incrustantur, extremis exceptis, cum nulli ossi alteri articulentur, sed ipsi ungues adhæreant. Internodia quoque breviora sunt, quam in manu, superne gibba, inferne sima, quo tendines musculorum secundum & tertium articulum flectentium, rutilissime admittant: & prima secundis, & secunda tertiis majora sunt & medium os in quatuor digitis, quadratum esse videtur. Sic pollicis ossa in pede quam in manu crassiora sunt reliqua tenuiora, tandem & medulla referta existunt.

De ossibus Sesaminis & unguibus.

CAPUT XLV.

f Sesamina car-
tilagines sunt
& ut plurimum
ad consistentia
annos usque
perdurant, ex-
ceptis illis duo-
bus, quæ in pede
sub pollicis pri-
mo articulo re-
periuntur, Fall.
obs.
g Ves. & Plat.
num Arabes
& vere occulti
illi & tenebri-
cosi philosophi
recte sentiant
Theologis disce-
ptandum relin-
quo, Ves.
h In cervis, ca-
nibus, leporibus
utpote siccis a-
nimantibus, ut
in hominibus
senibus reperi-
untur, Ves.

Sesamina ossa [tab. 27. f. 2. ψω] eadem propemodum serie & numero ac in manibus existunt, duodecim numero, quæ in quatuor digitis tanto minora minusque conspicua, quanto manus digiti, pedis digitos magnitudine superant. Sed ut pedis pollex ossibus majoribus quam manus pollex efformatur, sic quoque sesamina multo ^f majora obtinuit [tab. 15. f. 11.] quare primo pollicis articulo ad pedii ossis caput quod huic inarticulatur, duo insignia apposita sunt, quæ nervæ parti musculi pollicis primum os flectentis subjiuntur: & horum internum ipso exteriore dimidio fere majus est, adeo ut pisi musculi decorticati dimidiam partem æquet & forma nonnihil respondeat. Hoc ossiculum Arabes & Albaram vocant, quod nulli igni, nullique corruptioni obnoxium, semper illæsum conservetur, ex quo ad ^{dva} ^{βιωτιν} quasi totum corpus repullulet, ut ex semine planta, fabulantur. Secundo vero pollicis articulo subiectum, quod exteriore illo multo minus est, tendini musculi secundum pollicis flectenti inneditur: de reliquis ut in manu judicium esto.

Bina huc referri possunt ossicula ^h in poplite juxta femoris os, capitibus musculorum duorum priorum pedem moventium [tab. 20. fig. 13. ab] innata, quæ superficie sua lubrica capitum inferiorum femoris elatiorem sedem spectant: quibus hoc peculiare, quod non aliorum sesaminum modo, musculorum tendinibus sed eorum exortibus innitantur: quemadmodum & ossæ pars in senibus cubiformi ossi apposita, quæ in tendine musculi pedis septimi [tabul. 21. figur. 19. f.] ibi reflexi, occur-

Præter-

Præterea quemadmodum articulo, quo postbrachiale os minimum digitum sustinens brachialine dicitur, externo lateri ossiculum apponi diximus, si etiam non raro in pede ad externum latus articulationis ossis pedii digitum parvum sustentantis [r. 27. f. 1. 2. 4.] quo quintum pedii os cubiformi ossi articulatur, ossiculum ad inferiorem tendinis musculi pedis octavi reperitur. Hæc licet eundem usum quem in manibus præstare videantur, in pede tamen efficiunt, ut pes stantibus & ambulanti- bus etiam per loca aspera firmiter sit, humo æqualiter aptetur, & ne digitum stamus aut ambulamus à lapidibus, vel realiqua altiore, velut everli, prompte luxentur. Denique pedum digitorum extrema non minus quam manuum ungibus cuti extrinsecus commissis & teguntur & muniuntur^a de quibus pauca.

Unguium quos Græci *ὄνυχες* τὸν πόδα, id est, pingo, vel fodio vocant, radix *ῥίζα*, summa pars alba seu lunula candicans *ἀνὰ ὀλὴν* & pellicula radici adnata *ἄρ- ρημὸν* dicitur, ut plenius in lib. partium externarum explicavimus. Hos ex concoctionis tertiæ excrementis crassioribus pronatos^b volunt, idcirco continuo crescere accretione imperfecta, solius alimenti appositione, quare in longum, non latum, nec profundum augeri, ejusque nomine ex numero partium viventium excludendos esse, cum tamen venam arteriam & nervum in unguium radicem porrigi Galenus^c attestet, à quibus alimentum, vitam & sensum aliarum partium modo assumere voluit. Et sane non solum nervi duo ad unguium radicem feruntur, sed etiam cum venis sub ungibus ad digitum summum repunt, non tamen sensu præditos dicimus, cum per ipsorum substantiam non distribuuntur, quemadmodum nec venæ, quæ alimentum radici apponunt: & sane ungues dentium more, per alimentum ad radicem appositione augentur, quod satius fuit, cum indies atterantur, idcirco semper in longum potius, quam latum & profundum crescunt.

Substantia^e sunt mediæ naturæ inter ossa & cartilagine: mediocriter duri, quo externorum impetum effugiant: flexiles, ne frangantur & cedere possint: pellucidi, quare pro ratione carnis subiectæ vel rubent vel^f livent: tenues, convexi, quo digitis se accommodent, quod ad securitatem quoque confert: quo vero minus vacillent circa radicem ligamento colligantur: & quia illos carni & cuti connasci necessum fuit, cutis unguium radici extrinsecus circumnascitur: caro vero illis interior subnascitur: sub quibus

Oooo 2

^a Aristotele, lib. de spirit. 6. hinc forte Fæsius in notis in lib. de superfat. Hipp. secutus Plinium l. 11. c. 45. ungues nervorum clausulas summas vocat, à natura firmitatis & soliditatis gratia datos, qui si deficiant, imbecillitatem summam indicare.

^b III. Ungues, pili, cornua, rostra avium & calcaria, & si quid hujusmodi aliud est, ex cibo gignuntur adventitio & nutritio, quem tum à femina, tum de suis sibi acquirunt, Arist. 2. gen. an. 6.

^c IV. ab osse & carne derivat & ab utroque conflare statuit Arist. 2. part. 9. ex cute seccata componit, 10. prob. idcirco Æthiopum nigros esse, quia ex cute nigra originem habeant. non leviter illorum sententia accedo, qui ungues ex ossis, nervi, cutis, quidam & carnis addunt, portione gigni censent, Vesal. tum à cute, tum à tendinibus musculorum digitos extendentibus originem trahunt, Col.

^d 2. ad. an. d. Ves. e Ungues cartilagine: sunt & inter eos soli nudi, sicuti dentes inter ossa, ut vi majori operentur, Plat. in quibusdam animalibus ungues præ nimia duritie nihil ab ossibus differunt, Arist. 3. hist. an. 11.

^f De varietate colorum in animalibus, Arist. 3. hist. an. 9. bilis qua est in hepate cum disrumpitur ungues puniceo sunt colore, Hipp. de affect. inter.

^a Vide Gal. 1. us. part. 10. & 11. Arist. 3. hist. an. 9.

^b Opiniones de unguium materia.

^c 1. unguium materia est humidum glutinosum à calore ex seccatura & a resalutem ad extremas partes emissum, Hipp. de carnibus ungues den-

^d sissimi cum ex materia den- sissima constant Hipp. de nat.

^e II. Empedocles ungues per congelationem à nervo constitisse ait, monen-

g quod ego pri-
mus observa-
vi, Col.

h commodita-
tis gratia un-
gues fabrefa-
ctos & extre-
ma membra
munita fuisse
ostendit Plato
in Timao. Un-
gues recte natu-
ra molita est,

quippe qua ca-
teris animalibus
eos vel ad
ad usum alium
dederit, homini
operimenti tan-
tum gratia ex-
cogitavit, digi-
tos enim extre-
mos integunt
& tumentur, A-
rist. 4. pars. an.

10. & in fine cap. unguis eadem causa obtinent pedes qua manus: extrema enim munienda operiendaque potissimum sunt, propter imbecillitatem. Hipp. Digiti partibus carnis mollia corpora duntaxat apprehendunt: dura autem sine unguis adminiculo completi nequeunt, quia caro ipsorum tum reflectitur, ob id firmamento indigemus, & sal.

bus usque ad digitorum extremitates tendines & deferuntur, qui sub iis dilatantur: hanc causam esse volunt, quod adeo exquisitus sensus sub ipsis sit, & quod ex punctione dolor summus persentiat. Verum Hippocrates † vitalitatem fortis ex unguibus cognosci prodidit, nam cum puer nascitur, qui vitalis futurus non est, caro unguibus supereminet, unguis etiam tum in manibus tum in pedibus deficiunt, quorum defectus imbecillitatem summam indicat. Similiter & morborum * signa ex iis depromit, inde salutis & mortis indicia petit, nam in tabe adunci fiunt, ut etiam in superatis & peripneumoniacis: manuum & pedum unguis in hydrope contracti evadunt: si fiant lividi in ægrotantibus, imminenti mortis certum signum est: quin etiam morum & ingenii ligna ab unguibus peti, Porta in sua physiognomia declarat.

Ullus ^h digitorum extrema quæ molissima sunt, ne ab externis occurrentibus lædantur tueri; quare duritie sua firmamentum præbent: & manibus quidem rebus minimis apprehendendis, quæ facile effugerent, nisi digitorum extremis carnosiss, durum corpus carnes firmans & stabiliens apponeretur, acutie sua auxilio sunt: pedibus vero ut statione magis resistere possint: at quod iis qui in manibus sunt, fricare & scalpere & defendere possumus, hoc secundarium esse censemus. Sed de unguibus plenius alibi, & quidem peculiari tractatu, in quo de pinguedine, adipe, & pilis quoque sermo erit. Et hæc omnium partium corporis nostri vera historia, earundem- que rerum usus esto.

Con-

FINIS LIBRI IV.

CONCLUSIO.

Cum ad finem huius operis pervenerimus, tibi DE VS, qui solus immortalis es, tibi inquam Trinuno & Unitrino, Hygiæ & Panaceæ parenti sit honos & gloria in secula, quod pro ineffabili tua misericordia, inexplicabili clementia, inexhausta bonitate (ut qui solus ipsa bonitas & sapientia es) mihi misero peccatori tua adfuiisti gratia, tuoque auxilio, ut ea quæ nunc ab annis pene quadraginta in humani corporis fabrica, adeo admiranda & suspicienda, in qua potentiam tuam, sapientiam & bonitatem declarasti, inter dissecandum observavi & observata, communium præceptorum Hippocratis, Aristotelis & Galeni dico, & recentiorum classicorum (qui inde tanquam ex fontibus sua hausere) lætatione comprobari cognovi, in hoc opus conferre potuerim. Tibi æterne DE VS, quod me vita & beneficiis toto meæ vitæ tempore adeo clementer affeceris, mihi que tua cura spiritum servas, sit laus in secula, tibi sapienti DE O hymnum cum regio tuo Propheta canam. Etenim:

*Massæ recentis rudia adhuc primordia,
Rudisque massa semina,
Ceu scripta haberes, corporisque lineas,
Motum statumque noveras,
Et membra nondum cum forent, quid adderēt
Dies sciebas singuli.
O Domine, tu me protinus susceperas
Alvo parentis editum.
De te pependisse, parentis pendulus
Infans adhuc ad ubera.
Ab usque partu tu Deus meus: tutus
Ex matris alvo me favor
Est prosecutus ———
Et os & humeros totiusque corporis
Sic arte mira fabricam
Finxisti, acumen nullum ut humani ingenii
Ratio ve possit assequi.
Qui me parentis ventre conditum, curis
Tenello amictu involveras:*

O O O O 3

Com-

*Compago mira corporis nostri, tue
Miraculum est solertia.*

*Stupenda cuius opera nec nostra ass: qui,
Sed nec negare mens potest.*

*Nam nulla nostri tam minuta est corporis
Pars, ut tuam scientiam*

*Fugiat: nec ulla claustra pectoris latent
Te conditorem pectoris.*

*Hac mente tacita cogitanti mihi stupor
Torporque sensus alligat.*

*Animus labascit, cum tua miracula
Perpendo mecum dextera.*

*Citius inibo numerum, arena in littore
Quot. voluat astus corpora.*

*Quamvis ocellis per vigil nunquam meis
Dulcem soporem indulsero.*

*Revolue mentis intimos sinus Deus,
Latebrasque nostri pectoris.*

AMEN, AMEN.

INDEX



INDEX
RERUM ET MATERIA-
RUM INSIGNIORUM ORDINE
Alphabeticus digestus.

A		<i>Apoplexia unde fiat</i>	363.
<i>Adominus muscoli</i> 29. <i>Eorum ve-</i>		<i>Aqua acervatim irruens cur turbationem & tus-</i>	
<i>na</i> 33. <i>Tendines & usus</i> 34.		<i>sim multam moveat</i>	543.
<i>Achilles qua parte corporis fuerit</i>		<i>Arabes cur pilos habeant duros & crispas</i>	266.
<i>mortales</i> 626.		<i>Agemus</i>	255.
<i>Acidula ad plures libras hausta cū</i>		<i>Arteria magna rami</i> 77. <i>Eorum usus</i>	78.
<i>citius quam binis horis mingen-</i>		<i>Arteria unde habeant pulsum</i>	234.
<i>do excernantur, per quas vias ad renes ferantur</i>		<i>Arteria soporales</i>	240.
143.		<i>Arteria aspera quid sit, qua ejus connexio, substan-</i>	
<i>Acromion</i>	256.	<i>tia</i> 248. <i>sensus, cartilagine</i> 249. <i>glandula</i> 251.	
<i>Actionem omnem fieri per contactum</i>	406.	<i>usus</i>	ibid.
<i>Aegyptiorum & Ethiopum capita nullas habere</i>		<i>Arteria primaria quae</i>	232.
<i>suturas</i>	271.	<i>Arteria quid sit, ejus substantia cur sensu careant</i>	
<i>Ethiopes omnes esse crispas & cur</i>	264-266.	<i>arteriarum genus quotuplex</i>	232.
<i>Ala quid</i>	551.	<i>Arteria magna rami per thoracem & collum disse-</i>	
<i>Alarum fœtor unde</i>	177.	<i>minati</i>	238.
<i>Albadaran quid</i>	168.	<i>Arteria magna, ejusq; ortus</i> 232. <i>usus</i>	233.
<i>Almocarim</i>	269.	<i>Arteria carotides</i>	240.
<i>Ambulatio conveniens quomodo fiat</i>	611.	<i>Arteria aorta</i>	232.
<i>Amoris dulcedo</i>	136.	<i>Arteria cava sive aorta</i> 55. <i>ejus divisio</i>	ibid.
<i>Amygdala quid</i>	509.	<i>Arteria venosa</i>	229.
<i>Anima sentientis sedem non esse caritatem aliquā</i>		<i>Artus quid, & qua eorum divisio</i>	548.
<i>corporis, sed solidam partium substantiam</i> 314.		<i>Asthmatici cur quidam multis annis sint, necta-</i>	
<i>Animalia cur alia recta, alia prona incedant</i> 649.		<i>men semper paroxysmum habeant</i>	251.
<i>in marg.</i>		<i>Auditum ad cultum ingenii capeffendum esse ne-</i>	
<i>Animalia quadrupedia cur non possint sedere</i> 611.		<i>cessarium per accidens</i> 411. <i>in marg.</i>	
<i>Animalia qua carent oculis, carere & aurib.</i> 412.		<i>Auditus primum principium</i>	358.
<i>in marg.</i>		<i>Auditu cur plures capiantur à nativitate</i>	ibid.
<i>Animalia quadam unde noctu videant</i> 400.		<i>Auditorius nervus</i>	343.
<i>Annuli cur digito minimo proximo à veteribus</i>		<i>Auditorii nervi exortus</i>	358.
<i>sint gestati</i>	599.	<i>Auditus praeipuum instrumentum</i>	448.
<i>Antiaedes quid</i>	509.	<i>Auditorius nervus</i> 447. <i>ejus usus</i>	448.
<i>Anus & ejus muscoli</i>	139.	<i>Auditus cur per oscitationem impediatur</i>	449.
<i>Apoplectici cur thoracis motum aliquantisper con-</i>		<i>Auditus cur noctu melior</i>	ibid.
<i>servens</i>	349.	<i>Audium tria requirere</i>	451.
		<i>Auditus obiectum</i>	ibid.
		<i>Audi-</i>	

INDEX.

Auditus medium quoduplex ibid. instrumentum
ibid.

Auditus quomodo fiat ibid.

Auditus utilitas 454.

Aves non habere caritatem auricularum, Et cur
411. in marg.

Auris membrana vellicata cur sequatur tussis sic-
ca 447.

Auribus implantatus aer. 448. Ejus substantia.

ibid. hunc aerem non esse eundem cum externo.

450. esse eundem cum animalis spiritus Et quis

ejus usus. ibid. aurem esse audiendi sensorium

451. aurium glandula. 454. Earum usus ibid.

Aures cur amba efficiantur a nativitate 358. cur

ex morbo solum una ibid.

Auricula quid 412.

Auriculis quam animalia careant, Et qua non

412. in marg.

Auribus interius affectis masticatoria summo opere

convenire 423.

Auris tympani seu concha membranula, varia

ejus nomina, situs, figura, substantia 425. 427.

usus 428.

Auris annulus vel circulus ossis 426.

Aurium tinnitus causa 427.

Aurium ossicula quot 248. Eorum situs 429. Mal-

leus ibid. cauda vel pediculus 430. incus 430.

stapes 431. substantia 435. usus 436.

Auris interna musculi 437. Eorum usus 440.

Aurium ossis petrosi cavitates qua & quot 441.

aurium fenestella & aquaductus 443. labyrin-

thus 444. cochlea 445.

Aures unde dicta, Ejus partes esse plures, & quodu-

plexes ea sint 411.

Aures quid, aures non esse auditus principalissima

instrumenta, aurium situs ratio, 412. aurium

figura, magnitudo, numerus, divisio, unde fi-

ant magna, auris pinna 413.

Auris cur memoria consecrata, auris lobus sive fi-

bra, ejus usus, capreolus, scapha, helix, anthelix,

advearium, cerumina & marmorata auris

excrementa unde generentur, quis eorum usus,

Et sapor, auris hircus, ejus usus 414. auris totius

externa usus, substantia partes externa quodu-

plexes, Cuticula, cutis 415. Vasa 416. auris ex-

terna musculi 417. aurium humanarum motus

cur rarus & sensibus minus perspicuus ibi. car-

tilago 418.

Auris interna partes esse plures, os petrosum

419. os labyrinthi foramina 420.

Auris meatus usus 422. auris canalis, qui in

os fertur ibid.

ejus constructio & usus 423. 424.

Arba usus in viris 366.

Bilthasseisse quid 416. in marg.

Bilis in vesica collectio an sit ad vitam necessaria

158.

Bilis quomodo purgetur 158.

Brachii musculi 551. 552. 553. 554.

Brachiale quid, & qui ejus musculi 585.

Brachiale quid, & qua ejus ossa 603.

Buccula quid 466.

Bucca quid 465.

Buccarum musculi 467. usus 469.

C

Cæcorum vitæ morore & tristitia perfundis
370.

Cæsaries unde dicta 264.

Calvaria sutura Calvarios Aethiopum, Mauro-

rum & eorum, qui calidas regiones versus me-

ridiem & æquinoctialem incolunt, esse duriores

nullis aut paucis suturis discretas 271.

Calvaria suturas pro capitis figura non muta-

re situm & numerum 272. suturarum causas

non esse prominentias capitis ibid. sutura quo-

duplices qua earum nomina, suturas plures no-

habeat mas, quam femina 272. sutura notha

273. sutura calvaria cum maxilla superioris

ossibus communes quot & qua 274.

Calvaria quid, qua ejus figura & cur ex pluribus

ossibus constet 271.

Calvarie suturarum usus 275.

Calvaria substantia, squamma, 276. superficies

ibid.

277. foramina

Calvitium solis hominibus evenire in parte priora

capitis 267.

Calvitium non evenire ante coitum 266. in mar-

gin. 266.

Calvities unde fiat 266.

Canes etiam canescere 138.

Canum uterus 266.

Canities unde 267.

Canities a prima origine unde fiat

Capilli cur sint longissimi & crassissimi, unde ha-

beant nomen, unde fiant crispi 264. unde sim-

plexes, multi vel pauci diversus color 265.

Capillorum usus 267.

Cauteria occipiti infixæ cur oculis & visioni ma-

gnum usum afferant 358.

Capra uterus qualis 138.

Capitis calcar 424.

Capit.

INDEX.

Capitis ligamenta	571.	differat, ejus situs 300. Cerebrum esse omnium	
Capitis motus quatuorplex 563. Ejus musculi	ibid.	partium frigidissimum 301. in marg. Cur in	
Caput unde habeat nomen, quis ejus situs, caput		summo loco corporis locatum, qua ejus figura,	
esse divinisimum membrum, Et cur in sublimi		magnitudo 301. Cerebrum esse homini maxi-	
positum 259. Ejus figura, magnitudo, divisio		mum inter omnia animalia, proportionem sui	
260.		corporis & inter omnes maribus majus, quam	
Capitis musculi 270. figura quatuorplex qua natu-		fœminis ibid. in marg.	
ralis, quæque depravata ibid. quatuorplex depravata	271.	Cerebri connexio, substantia, temperamen-	
Capitis cutis vulnera cur sola sutura non egeant	270.	tum, color 302.	
Caput esse animalium facultatum sedem & ratio-		Cerebrum solo motu perpetuo posse calefieri ibid. in	
nis domicilium 270		marg. ejus divisio, cerebrum esse facultatum	
Caput raro inveniri sine sutura 271.		animalium principium. Cerebri anfractu-um	
Capitis ossa propria quatuorplex 277.		usus 303. 304.	
Capitis cutis, ejus vasa 268. usus, pinguedo, panni-		Cerebri corpus callosum 305. ejus usus	
culus 269.		ibid.	
Caro quatuorplex sit 24.		Cerebrum medullam non esse ibid. in marg. nec er-	
Carpus quid, & qui ejus musculi 585.		jam esse incrementum, nec inter partes conti-	
Cataracta ubi fiat 403.		nuas connumerandum ibid. cerebri ventricu-	
Cerebri & uteri consensus unde 125.		lorum septum 306.	
Cerebri nates quid sint 362.		Cerebri ventriculi sive cavitates quæ ibid. eorum	
Cerebri testes quid 362.		usus 308. Fornix 309. ejus figura, substantia ib.	
Cerebri ventriculorum usus ibid.		plexus choroides 310.	
Cerebri altera sectio 355.		Cerebri glandula pinealis, ejusque figura 311. sub-	
Cerebrum esse commune sensorium seu instrumen-		stantia, usus, situs 312.	
tum omnium sensuum 465.		Cerebri quartus ventriculus 313. duplex excre-	
Cerebelli pars 355.		mentum 315.	
Cerebellum quid 303. in cuius gratiam factum,		Cerebrum nunquam esse adeo sanum, quin in ven-	
ejus situs & forma 322. quomodo à cerebro dif-		triculis excrementa humida colligantur ibid.	
ferat ibid. ejus divisio, substantia, sinus, proces-		Cerebri usus, substantia 317.	
sus 323. Eorum usus, ejus cerebelli 324.		Cerebrum esse animalis spiritus fontem ibid.	
Cerebellum 357. ejus processus 358.		Cerebrum non refrigerare cor ibid.	
Cerebellum esse primum auditus principium ibid.		Cerebrum an & quomodo sentiat 318.	
Cerebri vena 295.		Cerebri ventriculos sentire ibid.	
Cerebri substantia nullas venas aut arterias in-		Cerebrum an moveatur 319.	
taxi, quemadmodum alius visceribus ibid.		Cerebri nates & divisionis ratio 322.	
Cerebri substantiam venas & arterias ingredi		Cerebrum quomodo in qualibet corporis parte re-	
ibid.		periatur 322.	
Cerebri arteria 296.		Cervices nervi qui & quos eorum conjugationes	
Cerebri ventriculi, quos 360.		347.	
Cerebrum quatuorplex ibid. figura ibid. divisio		Cervicis medulla laseur pereat interdum femo-	
361.		ris motus, ille so brachiorum & thoracis mo-	
Cerebrum unde dictum, ejus propugnacula, Cerebri		tu 329.	
esse primum sensorium, nervorum principium		Cervicis vertebra quos & quales 257.	
& anima sentientis sedes 299. Cerebrum om-		Cervicis musculi 566.	
nia sanguine prædita habere, ex cæteris fere nul-		Cervicis nervi 214.	
lum, nisi per proportionem ibid. in marg. Cere-		Cilia quid 377. eorum usus 381.	
bri præstantia, esse universale sentiendi princi-		Clavicula 187. Earum usus 188.	
pium, cerebrum esse membrum divinisimum,		Clitorum quid, ex quibus constat ejus substantia 135.	
& partem principem, cerebri majorem esse di-		musculi 136.	
gnitatem quam cordis, esse medullam capitis,		Coccygis os 169.	
quomodo à medulla spinali & aliorum ossium		Colli vertebra quos 257.	
		Colli glandula 508.	
		Colli nervi 211. quatuorplex ibid. unde oriuntur	
		ibid.	

P P P P Colla

INDEX.

Collum musculi	566.	mina.17.vafa.18.usus	12.
Collum unde dictum.eius situs,figura,divisio,mu-		Curicula quid,quaeq.eius materia	12.
sculi 183. ossa,vasa	184.	Curicula generalis causa.13. Substantia & usus	
Colore aliquid carere , quomodo cognoscimus		14.	
403.		Cutus an sentiat	269.in marg.
Columna quid	506.		
Coma unde dicta	264.	D	
Conuulsio quid.	331.	Deglutitio qualis sit actio	511.515.
Cordis propter vitam maiorem esse necessitatem quam.canebri.	300.	Deglutitio quomodo fiat.253.Et qualis sit actio	ibi.
Cordis motus quomodo differat à motu arteriarum		Dentium alueloli. Eorum nomina	487.
234.		Dentibus vivificans vim formatricè ad extremum senium usq.manere ibid. dentes unde dicti,esse ossa, quomodo ab alijs ossibus differant,cui semper crescant, quomodo à frigido efficiantur,an sint partes corporis.488. cur sint durissimi, Eorum color, forma, differentia, species, magnitudo, numerus, cui plures dentes sine signa longioris vita, dentes nec igne, nec flamma cremari per quid excauantur, an maribz sint dentes plures,quam feminis	489.
Cordis utilitas.	234.	Dentium numerus cur non in omnibus aequalis dentium situs , nervos & eius utilitas.	490.
Cordis structuram in lucem editorum à structura adhuc in utero consensorum differre, & quomodo	234.	Dentium evulsionem quis primus invenit	493.
Cor unde nonnunquam habeat pilos	104.	Dentes quorum nervorum beneficio serviant 34.	
Cor quid, & unde dicatur,ejus situs	215.	Dentium articulatio, dentes in homine quotuplices, quotuplices item in ruminantibus & piscibus	491.
Cor non esse partem principem, sed maxime necessariam. ibid. Cur sit in quolibet animali unicū, ejus figura 216. Magnitudo partes 217. vasa 218. 219. 226. substantia, fibra, an sit musculus, ejus motus 220. quod duplex hic motus 221. ejus usus ibid..		Dentes cur à sono aspero citra contactum offendantur	344.
Cordis ligamenta: motus cordis in qua parte originatiser resideat. Cordis cavitates seu ventriculi	221.	Dentes incisorii qui. Eorum situs, figura, unde dicti,numerus,nomina	492.
Cordis pili quid significent	223.	Dentes canini, unde dicti. Eorum numerus, situs, figura.492. radices,cur oculares dicti. Et cur eorum extractio periculosa censeatur	493.
Cordis ventriculorum divisio	ibid.	Dentes molares unde dicti, eorum situs, figura, cui facilius erodantur & frangantur. Eorum substantia, esse durissimos omnium ossium.493. Eorum nomina. ibid. Magnitudo, cur numero reliquos dentes superent, cur eorum numerus in hominibus variat, reliquorum vero dentium non item. Dentes sapientia unde dicti, dentes sensus et intellectus, Genuini 494. ignorantia. ibid. dentium molarium numerum non esse definitum, sed qui longiores habeant maxillas, iū quinque esse utrinque ibid. qui vero minores, quatuor. ibid. Eorum radices, cur omnes perforata	495.
Cordis septum	ibid.	Dentes quinam citius & qui serius erumpant, Et cur in hominis serius, quam in brutis.502. Cur homo sine dentibus nascatur. ibid. quando & quomodo	502.
Cordis aures 224. Earum usus	225.		
Corporis partes omnes an simul & semel eodem tempore formetur	118.		
Corpus totum foras introq. esse spirabile	234.		
Cofte quor 190 Earum divisio 191. substantia, Figura. Longitudo 192. usus	193.		
Coxa os	169.		
Coxendicis ossa	169.		
Cranii ossa quos sint. 277. propria quotuplicia. 278.			
Cranceres quid	488.		
Crispidum quid	264.		
Crocodylo superiorem maxillam esse mobilem	479.		
Cruvi ligamenta	642.		
Crynrum utilitas numerus	611.		
Cubiti motus, & musculi	572.		
Cubiti ligamenta	588.		
Cubitūs quid, quis eius situs, & ossa	601.		
Culeus quid	202.		
Cunnius	136.		
Curgulio quid	50.		
Cutis situs , descriptio.15. materia. Color, Substantia, figura 16. Connexio, differentia, forma			

INDEX.

- quo ordine puerulis excidant. *ibid.* Et cur pri-
mores primo. *ibid.* Quot nam dentes circa an-
num septimum in qualibet maxilla erumpant.
503. Dentes etiam post octuagesimum annum
prodiisse. *ibid.* idque rarius viris, quam mulie-
ribus usu venire. *ibid.*
- Dentium vena, arteria nervi 496.
Dentes cuidam post centesimum & quartum asa-
ris annum renatos esse *ibid.*
Dentibus soli inter ossa molle genus nervorum in-
esse *ibid.*
Dentium dolores unde. 497. unde eorum sensus
498.
Dentestactus specie propria donari *ibid.* Eorum
partem quamlibet non aqualiter sentire. Et
qua magis qua que minus sentiat *ibid.*
Dentibus proprium esse, ut nec ab omnibus, qua
immutant, nec ab his, qua molestiam asserre
possunt, a que affici. *ibid.* frigidis vero magis af-
fici, quam calidis. *ibid.* Et quare *ibid.*
Dentes cur debuerint sentire 499.
Dentes etiam aliquo modo discernere sapes *ibid.*
Dentium cavitas interna qualis 499. & quali
membrana succingatur 500.
Dentium dolor unde. *ibid.* Dentium cavitas u-
sus *ibid.*
Dentium generatio, eius generationis tempus du-
plex. Dentium imperfectorum substantia 501.
Dentitionis symptomata 502.
Dentes cur regenerari possint *ibid.*
Dentium facultatem conformatricem nunquam
esse otiosam *ibid.*
Dentes sapientia quando enascantur *ibid.* modus
generationis horum dentium. 504. Dentium u-
sus primarius *ibid.*
Dentes incisivos soli homini esse *ibid.*
Diaphragma unde dictum. 193. varia eius nomi-
na, definitio, situs, origo 194.
Diaphragmate affecto cur continuo mens sensusq;
perturbentur *ibid.* in marg. An sit musculus.
ibid. an musculus unicus. 195. Eius figura, sub-
stantia, membrana vena. 195. Nervi. Eius vul-
nera cur communiter sint lethalia, cur ad ea se-
quatur risus Sardonius. Eius foramina, usus &
motus 196.
Dentium numerus & substantia 199.
Dentium ossa. 607. ossium horum forma & ma-
gnitudo *ibid.*
Digitos quatuor extendentes musculi 581.
Digni pedum quomodo à digitis manuum diffe-
rant 612.
Digitos quatuor moventes musculi 578.
Doloris ischiadici sedes 642.
- Domus nuper illita qur magis resonet. 416. in
marg.
Dorsi musculi 568.
Dulcedo amoris 136.
- ## E
- Ebris cur obiecta visus appareant duplicia.
390.
Echo unde fiat 453.
Empyicorum sectio ubi instituenda, & quomodo
193.
Epiglottis unde dicta, quid sit, eius situs, figura,
substantia, qua animalia ea careant. 541. mem-
brana, musculi, usus 545.
Epilepsia unde fiat 363.
Epiploon quid 43.
Eugion 130.
Eunuchi cur non calveant 266.
- ## F
- Facies quid, unde dicta, faciem soli homini esse
datam, eius partes. 365. foramina, pinguedo,
membrana 366.
Faciem signa certa vita subministrare 367.
Facultates principes, imaginatio, ratiocinatio &
memoria an sedibus distinguantur 313.
Facultatum ut nec anima sentientis cavitatem a-
liquam corporis sedem non esse, sed solidam par-
tium substantiam 314.
Facultatem sentientem non ferri extra corpus.
451.
Facultatum omnium esse consensum inter se mu-
tuum & promptissimum 472.
Fauces, vide œsophagus.
Fauces quid. 508. Earum glandula. 509.
511.
Faucium musculi deglutitioni inservientes.
511.
Femoris os, unde dictum, qua eius figura.
646.
Femur quid. 613. 618. Eius musculi quot & qui
ibid.
Fibula ligamenta 644.
Fibula unde dicta. 651. eius capita. 652. usus *ibid.*
Fistula lachrymalis unde fiat 373.
Focile maius & minus 602.
Fœminas omnes habere partes, quas etiam habent
mares, & quomodo differant 111.
Fœminarum defunclarum cadauera cur prona
fluitent, contra quam virorum 137.
Fœminam esse imperfectiorem mare. 111. in
marg.

INDEX.

Fœmina cur sint sine barba 263.
Fœtus viri ex matre vivente excisi historia 173.
Fœtus casura quam pramittenda 173.
Fœtus in utero mortui signa 173.
Fons pulsatilis 280.
Fontanella 280.
Frontis cutis unde moveatur, eius musculi 368.
Frons cur depilis 369.
Frontis os, quatuorplex, eius connexio, figura, substantia, sinus 278.
Fora, foramina & processus 279.

G.

Galeum non tantum simias, sed etiam homines secuisse 494.
Galsmach 506. in marg.
Gargareon unde dictum, quid sit, Eius substantia, musculi 506. usus 507.
Gargareonem non temere esse abscindendum. ibid.
Gargareone amputate an & quomodo vox ledatur ibid.
Gargareonem esse soli homini propriam. ibid.
Gargalus quid 506.
Taurus quid 466.
Gena, Earum divisio 465.
Germani cur pilos habeant modice auferiles, grates, rectos Et rufos 266.
Gingiva utilitas 491. unde dicta, 219. Substantia: ibid.
Glandula pituitaria 314. Eius situs. ibid. Forma, substantia, usus 315.
Gloria quid 538. Eius figura, compositio 539. usus 540.
Grande bala 177.
Gula vide œsophagus.
Gustum esse homini adeo necessarium, ut sine eo conservari non possit homo, cum nutritionis causa sit comparatus 370.
Gustum & odoratum fere in omnibus consentire 462.
Gustationem non perfici sine madore. 510.
Gustus principalissimum instrumentum. 519.
Gustus humidissimi beneficio fieri 525.
Gustus medius ibid.
Gustus cur homini sit exactior. ibid. obiectum 526.
Guttur os, Eius nomina, situs, figura 512. Compositio, connexio, sinus, processus 513. usus 514.

musculi 515. 516. horum musculorum usus ibid.

H.

Hepar unde dictum 147. hepar inter omnia viscera primum profici, quomodo sit venarum principium, eius situs & figura 148. numerus 149. Lobi 150. connexio, membrana, substantia 150. Vena ibid. arteria, nervi, usus, alimenta. ibid.
Iudæus quid 506.
Hominibus solis animalium evenire, ut parte prærecapiti calveant 267.
Hominum caput cur pilosius, quam reliquum corpus, ceterorum autem animalium non 267.
Homo cur inter animalia pedestria bipeda solus erectus factus 610.
Homo cur solus possit sedere 611.
Homo cur solus risu letetur 197.
Hominem totum in facie velut compendiosè a tabella comprehendere 366.
Hominem remisse olfacere & nihil odorabilem absque dolore vel voluptate percipere 462.
Homines caudatos inveniri 169.
Homo cur solus canescat 266.
Hominem ad imaginem Dei esse creatum 1.
Hominem esse miraculum divinum ibid.
Hominem ex se moveri quemadmodum cœlestia corpora ibid.
Hominem esse universi exemplar parvum mundum & cur ibid.
Hominis causam naturam cuncta genuisse 2.
Hominem veluti parvum tres partes obtinuisse 2.
Hominis substantiam constituentia cur sine continentia, contenta & impetum facientia 3.
Hominem divinum quid in se habere ibid.
Humani corporis actiones esse varias, imò sibi mutuo contrarias 4.
Homo quomodo & quanto tempore in utero formetur ibid. 5.
Humani corporis divisio 6.
Humani corporis ventres quomodo differant 8.
Humana nature fontes qui & quos 226.
Humeros quale & quantum 599.
Humero motus & musculi 551. 552. 553. 554. ligamenta 557.
Hy 202.

INDEX.

Hymenis situs 130. varia de eo opiniones ibid. 131.
Ejus historia ibid. Substantia & caruncula
hymenis varia nomina 132. caruncularum u-
sus 133.
Hypochondriis blande tractatis cur oriatur titilla-
tio & sequatur risus 197.
Hysterica passiones magis curari ex retento semi-
ne, quam menstruis 125.

I

Ignis triplex Platoni 407.
Illyrii cur pilos habeant modice autiles, graciles,
rectos & rufos 266.
Incubus unde fiat 363.
Indi cur pilos habeant duos & crispas 266.
Infantes cur serius articulata voces proferant
518.
Infantes quinam citius vel tardius dentiant
501.
Insundibulum quid 314.
Inodorabile quid 462.
Isehiadici doloris sedes 642.
Insecta non habere splenem 147.
Intestina quid & unde dicta 57. Eorum differen-
tia 58. Tunica 65. vasa, fibra 66. pinguedo &
ejus 67.
Isthmus seu isthmion quid 508.
Instrumentum quodlibet, quod ex pluribus parti-
bus componitur, unam habere similem, cui ac-
cepta porissimum alio referenda sit 406.

K

K^Εφαλη unde dicatur
κ^Ιοις quid
κ^Ιω quid
κ^Ιε^Ις
κ^Ια^Ιρ^Ις

L

Labia quot 465. 469. unde dicta 466. eorum
substantia 469. usus & musculi proprii
470. vasa 471.
Laborum & buccarum musculi communes 467.
Lacryma quid 373. earum generatio, usus, via &
exitus, 374. exitus ratio ibid.
Lacrymalis puncta 373.
Lacrymalis caruncula 373.
Lacticia quid 454.
Larynx unde habeat nomen, quid sit. ejus situs,
numerus & figura 527. magnitudo, connexio,

partes 528. motus, musculi 529. 530. musculorum
usus 533. Cartilaginee 534. eorum numerus &
nomina ibid. sinu rimula 538. rimula situs,
ibid. membrana 544. vasa 545. glandula ibid.
Libidinosiores facile calvescere 266.
Lien vide splen.
Ligamenta quid 556. eorum usus ibid. differentia
557.
Lingua cur nullius animalis pinguis 519.
Lingua vena, arteria, corpus & usus 520. 521.
Linguae esse ministrum cerebri ibid.
Lingua musculi ibid. 522. 523. Glandula 524.
Lingua unde dicta, quid sit, ejus situs, figura 517.
magnitudo, connexio, compositio, ligamenta, su-
nica 518. Substantia, ejus carnem non esse mu-
sculosam, Nervi 519.
Lingua cur plurimarum rerum judex possit esse
ibid.
Lingua parva 538.
Liquida cur non ita facile deglutiantur ut solida
254.
Literi dediti cur raro rideant 472.
Lumborum nervi 352.
Luna mons 577.
Lus quid 167.
Lux quae tenuior, velocior & deductior est cur cor-
pora densa & solida pertransire non possit 427.
in marg.
Lux cur in nigrum fortius agat 391.
Lycopogon 264.

M

Mamma virorum, an & quale habeant lac-
ta 177. earum compositio & usus 178.
Mammae feminarum, earum nomina & etymolo-
gia, quibus animalibus denegata sint, earum si-
tus in mulieribus 178. numerus, forma & partes
179. vasa 180. substantia 181. areola 182.
Mammarium muliebrium usus 182.
Manus quid 548. earum actio, figura, numerus,
digiti, primaria pars, ungues, 549. vena, ar-
teria, usus. Divisio, ejus partes quatuorplex, mu-
sculi, ossa 550.
Manus extrema ossa 603.
Materia purulenta per quot vias à thorace & la-
tere expurgari possit 243.
Manus totius ossa quatuorplex sint 599.
Manus summa ligamenta 588.
Manus totius vena 589. arteria 594. nervi 596.
Manus extrema musculi 574. 575. vasa manus
substantia 576.

INDEX.

<i>Manus interna cur depiles</i>	263.	<i>Mons luna</i>	577.
<i>Marem esse perfectiorem fœmina III. in marg.</i>	255.	<i>Motum voluntarium esse duplicem</i>	197.
<i>Mater dura & pia vide meninx crassa & tenuis.</i>	125.	<i>Motus in universum quot sint</i>	384.
<i>Matrix quid</i>	472.	<i>Motus organum immediatum esse musculum</i>	331.
<i>Maxilla quotuplex, earum motus</i>	474.	<i>Mulieres esse quasi monstra natura</i>	96.
<i>Maxilla inferior luxatio cur sape lethalis</i>	478.	<i>Mulieres gravida unde emittant semen</i>	128.
<i>Maxilla inferior cur homini respectu aliorum animalium minima ibid.</i>	478.	<i>Mulieres cur non aque possint projicere lapides, ut viri</i>	187.
<i>Maxilla unde dicta, quotuplex</i>	478.	<i>Murcus quid</i>	579.
<i>Maxilla superior quid, quotuplex eius consideratio, figura, prominentia ibid. foramina, cavitates connexio</i>	479.	<i>Musculorum membrana propria 22. ejus usus</i>	23.
<i>ejus futura, ibid. quomodo à calvaria determinetur</i>	480.	<i>Musculi intercostales 184. eorum numerus ibid. usus</i>	186.
<i>Maxilla ossa</i>	481.	<i>Musculos omnes secundum fibrarum directionem habere</i>	186.
<i>Maxilla inferior, ejus figura 484. cur homini inter omnia animalia pro totius corporis mole brevissima ibid. ejus figura ibid. processus</i>	485.	<i>Musculum omnem capite suo alicui rei debere inniti, plerumque à parte immobiliori, & in partem immobilem implantari</i>	194.
<i>Maxilla inferior luxatio cur plerumque lethalis ibid. ejus & ossa ibid. cavitates foramina, medulla</i>	486.	<i>Musculum nullum gustare</i>	519.
<i>Maxilla inferior cur inter omnia ossa sola habeat venas</i>	ibid.	<i>Musculi inferioris ventris</i>	161.
<i>Mediastinum quid, ejus origo, substantia</i>	199.	<i>Musculus palmaris 576. ejus usus</i>	ibid.
<i>vasa & usus</i>	200.	<i>Musculi in genere, eorum fibra cava fibrosa 23. v. na 25. Membrana & usus</i>	ibi.
<i>Medulle spinalis ortus duplex</i>	361.	<i>Musculi principium & caput 26. variatio rationis substantia</i>	28.
<i>Medulla spinalis & ejus membrana 326. ejus substantia usus, ejus vulnera & affectus</i>	327.	<i>Musculorum omnium actionem esse motionem ibid.</i>	ibid.
<i>Medulla spinalis an moveatur 328. ejus figura, cavitas & numerus ibid. usus</i>	330.	<i>Muti cuius foraminis beneficio ore aperto audiunt</i>	287.
<i>Medulla spinalis in parte inferiore laeso cur sit major 329. usus</i>	330.	<i>Mydriasis quid</i>	397.
<i>Medulla spinalis nervi</i>	347.	<i>μύλα</i>	179.
<i>Medulla spinalis 356. ejus origo</i>	357.	<i>Myrtax quid sit</i>	465.
<i>Medulla quotuplex</i>	326.		
<i>Medulla proprie quid, & quid improprie, quomodo à cerebro differat</i>	325.		
<i>Meninx tenuis quid sit, ejus situs, figura, magnitudo 194. usus</i>	195.		
<i>Meninx crassa, ejus figura & magnitudo, connexio 289. quotuplex hac meninx sit, ejus foramina 290. Canales, sinus 291. usus</i>	293.		
<i>Mentula muliebris</i>	135.		
<i>Mentum quid & unde dictum</i>	466.		
<i>Mesenterium quid. quæ ejus figura 68. membrana, vasa, glandula 69. adeps & usus</i>	70.		
<i>Metacarpium quid. qui & quot ejus musculi 584.</i>			
<i>Mobile omne moveri super aliquo quiescente cui innititur</i>	233.		
<i>Mola quid & quæ ejus forma 652. substantia & usus</i>	653.		
<i>Mons veneris</i>	137.		
		N	
		<i>Narium situs ratio</i>	412.
		<i>Nasus quid, nasum non esse odorandi instrumentum</i>	336.
		<i>Nasus quid, quis ejus situs & divisio. Naso inesse venustatis & quid regium divisionis usus 455. ejus cutis 456. vibrissi, musculi ibid. 457. phyltrum</i>	457.
		<i>Narium ossa, septum 458. cavitas cartilagineæ 459. vasa, tunica, usus nasi externi</i>	460.
		<i>Nasus internus eiusque partes</i>	461.
		<i>Nasus an habeat interius operculum</i>	463.
		<i>Nasum esse semitam rerum odorabilem 464. ejus gratia potissimum nasus creatus sit ibi dicitur.</i>	ibi.
		<i>Naturam ex fronte & vultum etiam in ipso oris lenio loqui</i>	366.
		<i>Natura humana fontes qui & quot</i>	226.
			Natu.

INDEX.

Naturalia non debere assimilari artificialibus, & cur	538.	conspiciatur	277.
Nephriticis doloribus unde vomitus	214.	Nomen quid	466.
Nervorum spina dorsalis coniugationes quot.	354.	Nympha, earum nomina, numerus, definitio, figura, color & substantia	134.
Nervus auditorius	447.		
Nervi à medulla cerebri duplices	214.		
Nervorum mollicies & durities unde pendent	447.		
Nervorum prima coniugatio. 337. secunda, tertia & quarta coniugatio. 340. quinta. 343. sexta. 344. coniugatio vaga. 345. septima. 345. octava	346.		
Nervorum substantiam non esse eandem.	346.		
Nervi cervicis	214.		
Nervi recurrentes, eorumque recursus ratio	212.		
Nervi quosdam oriri solum à cerebro, quosdam vero à cerebello. 3. quosdam ab utroque simul	338.		
Nervi nullo nasci immediate ex aliquo duorum principiorum, sed omnes ex suis principiis vel mediante medulla spinali, vel mediante processu transversali	ibid.		
Nervi optici, eorum exorsus. 337. substantia	338.		
unde sic dicti	339.		
Nervi opticos motorios esse principales, eorum usus	339.		
Nervus quid. 330. unde dicatur	ibid.		
Nervorum genera. ibid. Substantia, membrana, eorum actio per quam partem perficiatur	331.		
Nervus non esse proprie instrumenta sentiendi & movendi	ibid.		
Nervus non alios esse sentientes, alios motorios	ibid.		
Nervus ad utrumque nempe sensum & motum ex natura sua se indifferenter habere	332.		
Nervi unde dicantur sentientes & unde motorii.	ibid.		
Nervorum usus	332.		
Nervi cur non aequaliter in omnes partes distribui	333.		
Nervorum magnitudo cur diversa	ibid.		
Nervorum origo & principium. ibid. &	334.		
Nervorum paria quot. ibid. &	335.		
Nervum nullum sine coninge produci. ibid. & quomodo producantur	ibid.		
Noctu cur melius audiamus quam interdiu.	449.		
Nucha per casum contacta cur homines nonnunquam statim moriantur, licet forinsecus nihil	192.		
		O	
		Occipitios. 280. unde dictum ibid. in marg.	
		Eius connexio, figura, Substantia, sinu foramine 281. processus	281.
		Occiput	261.
		Occiput non callescere	267.
		Oculos moventes nervi	340.
		Oculorum nervi qui & quotuplices	358.
		Oculis carentia animalia etiam carere auribus.	412.
		Oculi humoris aquei alter usus	408.
		Oculus quot naturaliter habeat refractiones. ibid.	
		humoris crystallini usus ibid. alimentum. 410.	
		humor vitreus an habeat venam. 411. Eius alimentum	ibid.
		Oculorum situs ratio	412.
		Oculo uno clauso alterius pupilla dilatetur, & auctius videamus	338.
		Oculi humoris albugineus sit ne excrementarius.	403.
		crystallinus unde dictus	ibid.
		Oculus gemma. ibid. crystallinum & vitreum esse partes similes, ibid. humorem aquicum amissum renasci	ibid.
		Oculi humoris vitreus	405.
		Oculi humorum utilitas	ibid.
		Oculos esse visionis instrumenta	ibid.
		Oculi potissima pars cui actio adscribenda	406.
		Oculi partes quotuplices	ibid.
		Oculum humanum non habere lucem insitam	407.
		alias nocte videret.	
		Oculum partes constituentes qua & quot.	383.
		Oculorum adeps eiusque usus. ibid. musculi	384.
		Oculi cur non moventur antrosum	ibid.
		Oculum esse corporis nostri partem mobilissimam	ibid.
		Oculi humani mosus quot	ibid.
		Oculus sinister cur expeditius contrahatur	ibid.
		Oculi humani musculi quot	ibid.
		Oculorum musculorum situs 385. Cur parvi. ibid.	
		Oculi cur rotundi, ibid. musculorum numerus & nomina	385. 386. 387.
		Oculorum vasa, nervi quales & quomodo ab aliis differant. 388. nervorum coniunctio qualis & quae eius utilis. 389. nervorum opticorum usus	ibid.
		Oculo uno moto cur moveatur & alterum	ibid.
		Oculi musculi paralyti & convulsione affecti cur abiectionem	ibid.

INDEX.

abieſta ſape appareant gemina. 390. Item opti-	ibid.	Oeſophagus unde dictus 251. quid ſit, eius connexio	subſtantia figura 252. Tunica 253. muſculi 254.
cui conuulſis vel relaxatis	ibid.	vaſa & uſus	ibid.
Oculorum ſpiritus	ibid.	Oeſtrum ueneris	136.
Oculi morientium & ueneri nimium indulgenti-	ibid.	oſis	202.
um cur parui	ibid.	Olfactus inſtrumentum ubi latitet	412.
Oculorum membrana	ibid.	Olfactum eſſe in hominibus inter ſenſus medium	ibid.
Oculi cum mundo & ovo comparatio. ibid. Mem-	391.	462. & quomodo	ibid.
branarum numerus & nomina	391.	Olfactus medium 462. inſtrumentum 463. 464.	
Oculus cur ſit rotundum & in medio protuberans	392.	olfactus quomodo fiat	465.
Oculi uidentis tenſio unde	393.	Olfactus inſtrumenta	359.
Oculorum tunica adnata. 391. innominata. ibid.	ibid.	Olfactu laſo cur ſimul etiam auditus nonnihil aſſi-	359.
cornea. 392. uvea ſeu choroidea. 395. aranea, ſeu	400.	ciatur	
cryſtallides	400.	Omentum quid 43. eius connexio, compoſitio, for-	46.
Oculi pupilla. 396. huius pupilla dilatatio cur vi-		ma 44. vaſa, pinguedo 45. uſus	256.
ſus abſit. 397. coarctatio uero acutiſſimi viſus	ibid.	Omioplate	487.
cauſa	ibid.	Ori ſitus ratio	412.
Oculorum varietate numeroſa ſolum hominem	398.	Os unde dictum, eius ſitus, ſitusque ratio, cur ho-	
notari	398.	mini exiguum, eius partes qua & quoruplices	466. eius uſus
Oculi iri quid & unde dictus. 399. Corona ibid. e-	ibid.	Os arcuale	424.
ius colores colorumque cauſa. ibid. huius varie-	ibid.	Oſſicula ſeſamoides 609. unde ſic dicta, eorum ſi-	ibid.
tatis colorum uſus	402.	tus, figura, numerus, uſus	512.
Oculi membrana vitrea & retina. 401. retina u-	402.	Os lambdoidea	512.
ſus	402.	Os ſpongioſum 287. eius ſitus, figura, partes, fora-	
Oculi humores. ibid. aqueus. ibid. albugineus, cry-	403.	mina, ſubſtantia, foraminum uſus 288. rima	289.
ſtallinus	403.	Os jugale, eius ſubſtantia	478.
Oculos eſſe in corpore, inſtar ſolis in mundo	370.	Os colatorii	284.
Oculos eſſe ſolu portas	ibid.	Os hyocides	169.
Oculus unde dicatur, quid ſit	ibid.	Os innominatum	280.
Oculi philoſophiam deberi	ibid.	Os cuneiforme unde dictum 284. eius figura, ſub-	
Oculum humanum autorem noſtrum primo om-	ibid. in marg.	ſtancia, proceſſus, ſinus 283. caritates foramina. ib	270.
nium deſcripſiſſe.	ibid. in marg.	Oſſa omnia cuius beneficio ſentiant	303.
Oculus quenam animalia careant	ibid.	Oſſis ſacri nervi	ibid.
Oculos diuina membra à Galeno uocari	371.	Os ſacrum 168. eius figura, proceſſus & ſpina	424.
Eorum ſitus, numerus, figura, magnitudo	ibid.	Os clauale	424.
Oculi optimi qui, & qui etiam deteriores	ibid.	Os ſtyl oide	169.
Oculi cur non etiam in poſterioribus partibus poſi-	ibid.	Oſſa pubis	424.
ti ibid. in marg.	ibid.	Os calaminum	424.
Oculorum partes qua & quoruplices, Orbita ſanus	372.	Os ſagittale	284.
ſeu circuli anguli 372. Foramina angulorum,		Os paxillare	280.
eorumque caruncula 373. Glandula.		Os memoria	280.
Odoris exquisitum iudicium in quo ſit poſitum	427.	Os baſillare	280.
Odoratus inſtrumentum principale quod	337.	Os coxa	169.
Odorem unumquemque à ſtate magis, quam hye-	465.	Os non eſſe creatum propter reſpirationem	461.
me percipi	465.	Oſpyxides	169.
Odorem requirere dilatationem pectoris	461.	Os coccygis	169.
Odorandi facultas unde & ubi fiat	462.	Oſſa coxendicis	642.
Odoratus obiectum, medium	462.	Oſſis ilii & ſacri ligamenta	325.
Odorem eſſe hominib. ſtupidiſſimum omnium ſen-	462.	Oſſium medulla quali	Oſſa
ſuum	462.		
Odorum differentia ibid. odoratum & guſtum fere	ibid.		
in omnibus conſentire	ibid.		

INDEX.

Ossa omnia, qua vitium capiunt, incremento prohiberi	644.	Partem nullam sine musculo motu voluntario moveri	368.
Os ypsiloides	512.	Partium omnium motus quid requiratur	103.
Os prora	280.	Partes continentes communes	12.
Oscitantes cur minus audiamus	449.	Partes alias in prima corporis constitutione, alias primam constitutionem gigni	488.
Oscitatio sive oscedo quid 477. unde dicta ibid. eius causa ibid.		Partem nullam excrementa nutrire excepto liene	145.
Oscitantem insipientes cur simul oscitent ibidem.		Partus Casareus quotuplex	172.
Oscitantes cur minus audire possint ibid.	Oscitatio quotuplex	Passionem non fieri à consuetudine	488.
Ovis uterius qualis	138.	Pecten	137.
		Patella quid, qua eius forma 652. substantia & usus	653.
		Pedis motus & musculi	624.
		Pedis digitorum musculi	628.
		Pedum vena	632.
		Pedis ligamenta	644.
		Pedis ossa quot	646.
		Pedis extremi ossa quot	654.
		Pedum planta cur depiles	263.
		Pedis arteria 638. nervi 646. Ligamenta	642.
		Pedum figura & magnitudo 611. articulationes	612.
		Pedes in quibus manus similes	ibid.
		Pedum musculi 613. vasa ibid. curis eiusque sensus, divisio ibid. ossa ibid.	
		Pegu insula incolae puellis infantibus pudenda filo consuevere	137.
		Petrus quid	314.
		Penis unde dictus, eius situs, figura & tegumenta 105. partes forma, substantia 106. Canalis, membrana, musculi 108. vasa 109. glans 110. proprium & frenum seu vinculum ibid. penis usus ibid. penem non esse animal, sed animalis instrumentum ibid. in marg.	
		Penis famineus	135.
		Pericardii humor qualis sit, eius ortus 203. copia & usus	204.
		Pericardion quid, qua eius connexio, figura, origo, substantia & vasa 201. usus	202.
		Periostium quid	270.
		Peripneumonici cur aures madeant & parotides superuenientes salutare sint	344.
		Pericranium unde dictum, eius substantia exortus & usus	269.
		Peritoneum quid 35. qua eius connexio, substantia divisio 36. Foramina 37. Tunica, vasa & usus	38.
		Perispicillorum inventio unde	409.
		Perispicilla quot habeant refractiones	408.
		Pharynx quid	508.
		Pharygethon quid	508.
		Phylitum quid	465.
			Phyme-

INDEX.

<i>Phymosis quid</i>	133.	quibus non, eorum situs, connexio. 248. motus, figura, divisio 241. Lobi. ibid. substantia 242
<i>Pilorum agritudo quæ</i>	266.	
<i>Pilorum nutrimentum</i>	267. usus ibid.	
<i>Pilorum subalarium usus</i>	177.	<i>Pulmo cur rarior in adultis. ibid. membrana. 243.</i>
<i>Pili cur in cute inhorrescant</i>	267.	<i>Pulmonum vomica per quatuor vias expurgantur. 243. vasa 244.</i>
<i>Pili quibus animalibus à natura dati, quid sint & unde fiant. 261. Quæ ad illorum generationem & conservationem requirantur, Eorum materia, causa efficiens & locus. ibid.</i>		<i>Pulmonum ulcera cur sint sine dolore ibid.</i>
<i>Pilos semper nasci in locis glandulosis, nisi superflua adsit humiditas, nasci quinetiam ubicunque in corpore glutinosum existit 262.</i>		<i>Pulmo an & quomodo sentiat 244.</i>
<i>Pili qualem requirant cutim, pili quotuplices. Eorum forma. 263. unde fiant crispi. 264. unde simplices, unde multi vel pauci. Eorum duplex origo, diversus color 265.</i>		<i>Pulmo cur copiosiore alimento egeat, quam cætera partes 246.</i>
<i>Pinguetinis situs. 19. differentia, vena. 20. usus 21.</i>		<i>Pulmonum arteria quo motu moveantur ibid.</i>
<i>Pisces cur non habeant pilos 262.</i>		<i>Pulmonum usus 247.</i>
<i>Pisces omnes mammis carere præter delphinum 178.</i>		<i>Pulmonis vomica per quam viam per urinas evacuetur 231.</i>
<i>Pituita sedes 362.</i>		<i>Pulsus nominis primus auctor. 234. unde fiat & quibus motibus absoluitur ibid.</i>
<i>Placenta 192.</i>		<i>Puncta lachrymalia 573.</i>
<i>Pleura 190.</i>		
<i>Pleuritidis materia quot modis expurgetur. 244.</i>		
<i>Pleura quid & unde dicta. 197. 198. eius origo, substantia, quotuplex. 198. Eius vasa, & usus 199.</i>		
<i>Plavetia 255.</i>		
<i>Pleuriticorum vena sectio triplex. 208. in marg.</i>		
<i>Plexus choroidis. 364. Eius usus ibid.</i>		
<i>Podex, eius musculi 139.</i>		
<i>Pollex unde habeat nomen, quot item ossa, & musculos, & motus 579.</i>		
<i>Pollicem flectentes musculi. 579. 580. 581.</i>		
<i>Pollicem musculi extendentes 587. 584.</i>		
<i>Ponti cur pilos habeant promissos & simplices. 265. & molles 266.</i>		
<i>Potus portionem ferri in asperam arteriam 543.</i>		
<i>Processus mammillares, eorum numerus usus, situs 336.</i>		
<i>Processus non esse nervos 337.</i>		
<i>Psittaco utramque maxillam esse mobilem 479.</i>		
<i>Pubes 137.</i>		
<i>Pubem no vissime canescere 267.</i>		
<i>Pubis ossa 169.</i>		
<i>Pudendum muliebri, varia eius nomina de serpio, eius fossa, foramen 134.</i>		
<i>Partes externa 136.</i>		
<i>Pueri parvi cur careant pilis 266.</i>		
<i>Pueri cur non calveant 266.</i>		
<i>Pulmones quid, quibus animalibus sint dati &</i>		
		<i>R</i>
		<i>Radius quid. 602. eius usus 603.</i>
		<i>Recipiens ærecepti natura debere esse denudatum 409.</i>
		<i>Remulus 192.</i>
		<i>Renes unde dicti, Eorum situs. 80. connexio numerus. 81. figura, magnitudo, glandula. 82. adspersa membrana, substantia 83. venter, vasa. 84. Caruncula. 86. structura & usus 87.</i>
		<i>Respirationis musculi. 558. 559. utilitas. 559. motus ibid.</i>
		<i>Respiratio quotuplex ibid.</i>
		<i>Rete mirabile. 315. unde sic dicatur eius usus. An in omnium hominum capitibus reperiat. 316.</i>
		<i>Rhoici qui 647.</i>
		<i>Rijus quid sit & cuius facultatis actio. 471. Quot & quis requiratur 472.</i>
		<i>S</i>
		<i>Saliva quid, eius usus 310.</i>
		<i>Sanguificatio & varia de ea opiniones 153.</i>
		<i>Seri Sanguinis utilitas 153.</i>
		<i>Saphena 633.</i>
		<i>Sapores non percipi, nisi quatenus natura humiditas aut liquidus inhaerent 523.</i>
		<i>Saporum species 526.</i>
		<i>Sarmata cur pilos habeant modice nucleis, graciles, rectos & rufos 266.</i>
		<i>Scapula motus & musculi 554. 555.</i>
		<i>Scapularum ossa, eorum figura, & processus. 256.</i>
		<i>Appendices 257.</i>
		<i>Secundaria</i>

INDEX.

2999

INDEX.

appendix 282. processus, foramina 283. sinus 284.		Varices unde fiant	637.
Temporum pili cur non penitus sint amputandi 268.		Vari qui	647.
Tempora non callescere	267.	Vasa spermatica preparantia	91.
Temporum vulnera cur inducant cecitatem 474.		Vasa semen muliebrem deferentia seu ejaculatoria 116. eorum forma & substantia ibid.	
Tenigo quid	135. 136.	Vasorum uniones	595.
Testium muliebrium situs, quomodo differant à testibus virilibus	113.	Vasa semen deferentia 97. eorum nomina ibid. numerus 98. substantia & usus ib.	
Testiculorum muliebrium pilis refertorum histologia 114. qua horum pilorum sit materia 115. horum testium usus ibid.		Paula quid	506.
Testes unde dicti, quid & quot illorum sint 93. eorum situs 94. Tunica 95. figura substantia 96.		Vena in genere quid sint 46. eorum substantia, valvula, tunica 47. Connexio, usus, numerus 48.	
Thoracis nervi 211. quotuplices ibid. unde oriuntur ibid.	215.	Venas per se non sentire	47.
Thoracis musculi 558. 559. motus	559.	Vena porta quid, ejus divisio 49. quomodo differat à vena cava 54. ejus usus	55.
Thorax cur non ex osse uno debuerit conformari ibid. musculorum numerus ibid. musculi proprii 560.		Vena ischias minor	633.
Thorax unde habeat nomen 175. ejus & figura ib. substantia, divisio, partes 176. cutis, pinguedo, panniculus & vasa	177.	Vena suralis	634.
Thoracis ossa	187.	Venarum ostiola seu valvula 635. earum numerus & intervalla 636. figura 637. substantia & usus	638.
Thoracis musculi, & ossa 255. Nervii vertebra		Venarum post aures sectio ad quid utilis	416.
Thoracis partes contenta 200. quotuplices ea sint 201.		Vena cava truncus ascendens 205. ejus rami ibid.	
Thoracis ligamenta	572.	Vena cava quid, quaque ejus constitutio 72. divisio	73.
Thoracis nervi quotuplices sint	350.	Vena arteriosa	228.
Thracis cur pilos habeant promissos, simplices & molles	265. 266.	Vena poplitea	634.
Thymus quid, ejus situs, varietas & erymon 201.		Vena cava	227.
Tibia quid, qui & quot ejus musculi	613.	Veneris æstrum	136.
Tibia quid 649. ejus ligamenta 644. ossa	649.	Ventris inferioris divisio 10. ex quibus constat 12.	
Tibia unde dicta ibid. ejus figura ibid.		Ventris inferioris musculi 166. nervi ibid. ossa 167.	
Tibia spina 650. spina illius usus ibid. in margin.		Ventris inferioris partes contenta	38.
Tirillatio cur soli competat homini	197.	Venter inferior mulieris quomodo à ventre inferiore viri differat	170.
Tonsilla quid, quot, earum figura, varia nomina, usus 509. 510. tunica, substantia,	510.	Ventris medii musculi	182.
Tonsilla	254.	Ventriculus quid, varia ejus nomina, numerus, situs	159.
Tribades	136.	Ventriculi calor an à calore hepatis intenso minuitur 160. ejus magnitudo qua & unde nascitur, qua ejus connexio 160. figura orificia 161. 162. substantia 162. membrana, fibra 163. vasa 164.	
Tussi cute sicca cur excutitur, cum aures profundius expurgemus	344.	Ventriculum delectari quidem, non autem nutriri chylo ibid.	
Tussis quid	243.	Ventriculi fundum, potissimum parte sinistra & foris & intus esse nigricantem 164. usus 165. propria actio ibid.	
		Ventriculum inter partes nutritioni inservientes esse precipuum	166.
Vacca uterua	138.	Vertebrarum ligamenta	571.
Valgi	647.	Verticis ossa vide synchypitis ossa.	766.


INDEX.


<i>Vesicula seminaria</i> 98. earum situs ibid. numerus 99.			
<i>Vesicam urinam non astrahere sed depulsam accipere</i> 105.			
<i>Vesica biliaria</i> quid, quis eius situs, figura, substantia, vasa, quantitas, membrana 155. eius partes 156. an bilem attrahat & ea nutriatur ibid. eius meatus 157. usus 158.			
<i>Vesica urinaria</i> unde dicta, eius situs, quibus animalibus sit data, quibusque magna, cur ea distenta urina suppressio sequatur & quibus partibus connectitur 101. ubi secanda ad extrahendum calculum ut ventris capacitas maneat illa ibid. in marg. eius numerus, substantia, figura, partes ibid. <i>Vesica duplicis</i> in virgine inventa historia 102. <i>Vesica membrana</i> qua & quot 102. fibra, foramina 103. eius collum & collimusculus ubi & quomodo sectio in extrahendo calculo sit faciend. <i>Vesica vasa</i> & usus 104.			
<i>Viso perfecta</i> quid requirat 397.			
<i>Visionem fieri per pyramidem</i> 392.			
<i>Viso cur ex diuturna inspectione defatigetur & deterior reddatur, ad virides vero & herbascentes, ut olera ceteraque recreetur</i> 398.			
<i>Viso quomodo fiat</i> 406. 407.			
<i>Visionis instrumentum esse aquosum</i> 407.			
<i>Viso quomodo & quibus absolvatur</i> 409.			
<i>Visum respondere proportionem elemento stellarum</i> 370.			
<i>Visum principatum habere inter sensus externos & cum auditu reddere vitam beatiorum</i> ibid.			
<i>Visum coducere ad ea, qua vita necessaria sunt magis vel per se</i> 411.			
<i>Visus unde alatur</i> 408.			
<i>Vita omnis unde sit</i> 223.			
<i>Vitiliginis vera causa</i> 266.			
<i>Vina quid & quis eius usus</i> 602.			
<i>Umbilicalia vasa qua & quotuplicia</i> 40. distribu-			
	tio		41.
<i>Vomiturientibus cur inferius labrum tremat</i> 470.			
<i>Vocis primum & principalissimum instrumentum</i> 250.			
<i>Vox quid sit</i> 528.			
<i>Voces nostra cur hyeme sint graviores quam aestate</i> 449.			
<i>Vocis formanda & edenda instrumentum proprium</i> 538.			
<i>Vox quid sit, qua vocis generanda materia officina vocis</i> 547. usus ibid.			546.
<i>Vrachus</i> 43.			
<i>Vreteras unde dicti quid & quot eorum sint</i> 88.			
<i>Vreterum figura, substantia</i> 89. vasa & usus 90.			
<i>Vterum esse natura campum</i> 117.			
<i>Vterus unde dictus</i> 118. eius diversa nomina & situs ibid. Connexio & ligamenta 119. utero exempto facinram vivere posse 120. uteri figura 121.			
<i>Vteri partes externa qua & quot</i> 137.			
<i>Vteri interior cavitas quanta</i> 127. substantia ibid. collum ibid. uteri septo medio divisi historia ibid. cervicis seu colli foramen ibid. uteri cervix 129. eius varia nomina ibid. quid sit, eius situs magnitudo substantia ibid.			
<i>Vteri magnitudo, partes, membrana</i> 122. Fibra vena & arteria 123. uterum omnium partium corporis muliebris esse imbecillimam ibid. eius nervi 125. uteri & cerebri consensus unde ibid. uteri partes dissimiles 126. eius fundus, cornua & eorum usus ibid. uterum in mulieribus non esse bipartitum 127.			
<i>Vulnera ad scapula processum internum cur periculoissima</i> 396.			
<i>Vultus unde dictus</i> 365.			
<i>Vulva unde dicta</i> 134.			
<i>Vulva labia</i> 137. eorum substantia, muscoli ibid.			
	Z		
<i>Zeudeck</i> 173. 280.			

FINIS.

Errata benevolus lector ita corrigat.

7. 5. lin. ult. partis. p. 6. l. 15. in insignes. p. 8. l. 2. Situs. p. 13. l. 11. viscofo. Ibid. in marg. l. 43. subiecta. p. 14. l. 27. vitiosiss. Ibid. ult. exuvie. p. 18. l. 29. hypochondrio. p. 19. l. 36. Argentarius. p. 20. l. 13. in marg. Vesal. p. 20. l. 28. calorem, qui. Ibid. 39. densum. Ibid. l. 42. interioreque. p. 31. l. 7. Substernitur. p. 25. l. 35. mensculus spiritibus. p. 36. lib. 16. in marg. mesenterio. p. 42. l. 22. laborantibus. Ibid. l. 38. paracentesim. p. 63. l. 12. Segregantur. p. 66. l. 19. portio. p. 67. l. 30. post alias partes adde distribu debet. Et. p. 67. l. 8. in marg. dele, hunc. p. 68. in marg. l. 12. constant. p. 80. l. 33. in marg. dele, ad. p. 81. l. 12. pro accedit sinister, propter, lege, accedit, sinister propter. p. 84. l. 25. coagmentantur. p. 112. l. 11. in marg. vena. p. 114. l. 12. hysteromotoriam. p. 124. l. 41. in marg. obstructio. p. 133. l. 8. constringitur. Ibid. l. 11. cavitate. Ibid. l. 21. conceptum. Ibid. l. 22. prepositam. Ibid. l. 32. in marg. coeuntes. Ibid. l. 46. Compactio in ore. p. 144. l. 16. in marg. augeatur. Ibid. l. 43. in marg. lieni. p. 145. l. 4. in marg. exudarit. p. 145. l. 29. impedita. p. 149. l. penult. in marg. lobos. p. 150. l. 26. post, inspiratio adde, quam expiratio. p. 151. l. 16. in marg. contingunt. Ibid. l. 36. radicibus. p. 156. l. 30. post, canalem, adde, qui in canalem. p. 157. l. 8. cysticus. p. 158. l. 36. digestionem. p. 159. l. 2. Subtile. p. 161. l. 3. minusque. p. 162. l. 2. veteribus. p. 164. l. 28. quo. p. 164. l. antep. in marg. pro autem lege ausim. p. 165. l. 12. exquisitissimus. p. 197. l. 25. post calefacit, adde. Et quamvis leviter calefaciat. p. 198. l. antepenult. Superne. p. 203. l. 41. in marg. concoctionis. p. 207. l. 40. cava in p. 211. l. 17. in marg. nulla. p. 218. l. 30. dele futurus. p. 219. l. 16. dilatationis. p. 222. l. 7. in marg. nonnunquam. p. 224. l. 4. angustum. Ibid. l. 10. cedat. p. 231. l. 33. levem. p. 232. l. 2. levem. p. 233. l. 27. dele. siquidem. p. 233. l. 46. in marg. post inigne adde, cui. p. 244. l. 2. dele, siue materia in arteriam magnam delata in arterie magna ramum caliacum, qui ad ventriculum abit, in quem effundi potest. Ibid. l. 14. attamen. p. 277. l. 9. post, leia, adde, est reicienda. p. 278. l. 11. & cor. p. 279. l. 4. Facti. Ibid. canora. p. 280. l. 5. Cur. p. 281. l. 17. dele in p. 282. l. 12. dele, & parte aliqua in basi, in adultis duo sunt. p. 286. l. 45. in marg. post transcolari adde, quia dicit Galenus 11. vs. part. satius esse transcolari. p. 289. l. 18. Et. p. 290. l. 10. in marg. quidem. Ibid. l. 37. membrana. p. 292. l. 21. torcular. p. 293. l. 13. pro Et qualem, lege, si qualem. Ibid. l. 14. grunum. p. 294. l. penult. post cranium vero adde, medullam spina & nervos ambit Et investit, quomodo vero. p. 299. l. 9. in marg. caloris. p. 300. l. 38. in marg. qui. p. 302. l. 30. assimilavit. p. 311. l. 3. vena. Ibid. l. 6. dele, partim ex venis à sinu quarto crasse meningis. p. 315. l. 20. exsiccatione. Ibid. l. penult. feruntur. Ibid. l. 34. in marg. decumbit. p. 316. l. 5. Ingrassia. p. 316. l. 23. sphenoidis. p. 460. l. 23. in marg. Et. continua. Ibid. l. 28. membrana. p. 462. l. 16. acerbis. p. 463. l. 22. in marg. Sonos. p. 467. l. ult. clavicularem. p. 468. l. 7. validius. Ibid. l. 31. canum. p. 469. l. 36. in marg. ac. p. 470. l. 31. in marg. duos. p. 473. l. 8. mola. p. 477. l. 23. infarcto. Ibid. l. 28. y. p. 482. l. 17. abscessus. Ibid. l. 24. in marg. quomodo. p. 483. l. 26. cera. p. 487. l. 23. implentur. p. 491. l. 16. edentalia. p. 495. l. 22. maxime. p. 503. l. 25. si. Ibid. l. ult. divinus. p. 505. l. 32. quia. Ibid. l. ult. membra. p. 506. l. 39. in marg. a. Ibid. quam. p. 509. l. penult. has. p. 510. l. 26. humiditas. p. 511. l. penult. in marg. aërophagios. p. 519. l. 4. febricitantibus. p. 520. l. 6. dua. Ibid. l. 26. precipue. Ibid. l. 28. illa. p. 585. l. 24. cubitus. p. 588. l. 14. ducitur. p. 595. l. 46. in marg. dele, Et lib. de dissect. Venar. ult. non omnes conjunctas habere arterias simul dividit. p. 599. l. 5. in marg. sinistra. p. 607. l. 32. externarum. p. 609. l. 14. in marg. manuum. Ibid. l. 36. descripsisse. p. 611. l. 5. in marg. docuplos. p. 613. l. 28. a. p. 617. l. 19. permixtus. Ibid. l. 22. trium. p. 621. l. 14. finis. Ibid. l. penult. nervus. p. 625. l. 23. dele in p. 626. l. 9. hac. p. 627. l. 42. immititur. p. 640. l. 18. parvum. p. 646. l. 21. efformatur. l. 24. diarthroscos. p. 651. l. 16. internus. Ibid. l. 21. caret. p. 654. l. 12. mola.







ILLVSTRI
&
GENEROSO DOMINO
JOHANNI BERNARDO
LIB. BARONI à KUNOVITZ &c.

*Jam Tandem,
ET
Vix Tandem:
SED
Sat cito, si sat bene,*

ICONUM
THEATRI ANATOMICI
EDITION. PROMIS.

CASPARUS BAUHINUS BASILIENS. ARCHIATROS
& Professor ordin.

OFFICIET AMOR.
Mon. Pub.

TYXH *нѣ* HONOR
offert.

ANNO M.DC XX. CAL. FEB.

3
CASPARUS BAUHINUS
BASILEENSIVM ARCHIATROS

Artis Medicæ Studiosis

S.



V A ratione studiis vestris prodesse possem, mecum jam olim deliberanti, in mentem venit, cum Anatomicum & Botanicū studium, Medico maxime necessarium sit, nobis ad laborandum esse, qua via commodiore ad utriusque cognitionem perduceremini: quare in Botanicis non pauca, captui vestro accommodata dedimus: propediem, Deo volente, Pinacem Theatri nostri Botanici (quod supra millia quatuor, plantarum exhibebit) quam plurimis studiose urgentibus, publici juris facturi: cujus Prodromum, qui supra sexcentas plantas à me primum descriptas continet, jam ante annum Typographo cudendum misimus. In Anatomicis, inter cætera vidistis Institutiones Anatomicas, in Tyronum gratiam quinto editas: Theatrum nostrum Anatomicum prius quidem cūsum, jam vero locis infinitis auctum ad morbos accommodatum, ab erroribus repurgatum, observationibus & figuris aliquot novis illustratum, proximo mercatu, Deo concedente, cum jam sub prælo sit, videbitis. Nunc vero Tabulas nostras Anatomicas, separatim cum literarum ex adversa parte explicatione, facilioris doctrinæ & minoris laboris causa exhibemus, easq; correctiores quam prius fuerint, quo iis & seorsim in dissectionibus & conjunctim cum nova Theatri editione & uti, & Institutionibus jungere possitis. Valete.

A 2

TAB. I. Corporis humani partes anteriores exhibet.

- A. Pars capillata, τριχωτός.
 b. Frons, μέτωπος.
 c. Tempora, κρότφοι.
 d. ad d. Faciei circumscriptio.
 e. Major, seu internus oculi angulus.
 f. Minor, seu externus oculi canthus.
 * Palpebra inferior immobilis.
 g. Mala, μάλα.
 h. Bucca, γνάθος.
 i. Nasus externus, εὐν.
 l. Auris externa.
 o. Collum, αὐχὴν καὶ τραχήλος.
 o. ad E. Truncus, ὤμων.
 pp. Juguli, σφαγγί.
 qq. Claves, κλειδιά.
 r. Pectus, στήθον.
 f. Mamma dextra.
 ff. Mamma sinistra, huic regioni
 epithemata cordialia applicanda.
 tt. Papille mammarum, θηλαίμαστον.
 u. Scrobiculus cordis, καρδιά antiquis, quæ pars pro Ven-
 triculi orificio inungi consuevit.
 u. ad E. Infimus venter, ὑδὲς καὶ σῆξ.
 x. sup. Epigastrium, seu suprema infimi ventris pars.
 yy. Hypochondria seu præcordia.
 † Hepaticæ remedia hoc loci applicanda.
 z. sup. Regio umbilicalis, seu media infimi ventris pars.

A medium umbilicus, radix ventris, ὁμφαλός.

BB. Latéra, πλάγιοι.

C. Hypogastrium, seu infima pars infimi ventris, ἡ ἔσχα.

DD. Iliæ, quibusdam κατεσώτες.

E. Pubes, seu pecten, κλεις καὶ ἥβη.

FF. Inguina, ubi bubones fiunt, βουβόνες.

G. Penis cum præputio.

H. Testes cum scroto.

II. Humeri, ἑπαιμίδες.

KK. Brachia, βραχίονες.

L. Gibber, ὠχών.

M. Cubitus, πήχυς.

N. Brachiale, καρπός.

O. Postbrachiale, μετακαρπιαίον.

P. Palma seu vola manus, ἡνέαρ.

Q. Q. Femoris pars anterior & media, cui cucurbitula
 affigi solent, ad prouocandos menses, μηρόν.

RR. Genu, γόνυ.

SS. Tibia, Κνήμη.

TT. Suræ, καὶ ἑσχατὰ μέρη.

VV. Tarsus.

XX. inferius: Dorsum pedis, σῆξ καὶ ποδὶς.

T. Malleolus internus, σφυρόν.

Z. inferius: Malleolus externus.


aa. Digni pedis, δάκτυλοι τῶν ποδῶν.

B. inferius: Pars sub malleolo, in qua Saphæna aperi-
 tur.

TAB.

LIB. I.

TAB. I.



A 3

TAB.


TAB. II. Partes posticas continet.

- a. Synciput, $\beta\epsilon\lambda\gamma\mu\phi$
 B. Vertex, $\kappa\epsilon\gamma\epsilon\upsilon\phi\eta$.
 C. Occiput, $\kappa\epsilon\tau\eta\varsigma\ \kappa\epsilon\ \iota\upsilon\lambda\omicron\nu$.
 d. ad d. Facies, $\pi\epsilon\delta\omicron\sigma\tau\omega\nu$.
 e. Supercilia, $\delta\phi\epsilon\upsilon\varsigma$.
 f. Palpebra superior, $\beta\lambda\epsilon\phi\alpha\rho\omicron\nu$.
 g. Globulus nasi.
 h. Cervix, $\omicron\upsilon\chi\eta$, ubi Nuchæ ea pars, qua laqueo seu se-
 raceo perforari solet.
 II. Humerus seu Axilla, $\delta\mu\epsilon\varsigma$.
 KK. Scapula, $\delta\mu\epsilon\pi\lambda\acute{\alpha}\tau\eta$.
 2. 2. 3. huic parti cucurbitula affiguntur.
 4. 5. 5. 6. Dorsum, $\rho\acute{\omega}\phi$.
 3. 9. Spina dorsi, $\epsilon\sigma\chi\epsilon\varsigma$.
 L. Locus sub Axilla seu Ala, $\kappa\epsilon\chi\alpha\lambda\eta$.
 * Gibber brachii.
 MMM. Latera.
 NN. Lumbi, vel Renum regio, $\delta\sigma\phi\upsilon\varsigma$.
 OO. Comendicis regio, cui remedia ad Ischiadem appli-

cantur.

- P. Os sacri regio huic in morbis recti intestini applican-
 da sunt remedia.
 Q. Coccygis regio.
 RR. Nates, $\kappa\lambda\omega\upsilon\varsigma$.
 SS. Femoris pars posterior, quibusdam semen.
 TT. Popples, $\iota\gamma\nu\varsigma$.
 VV. Sura.
 XX. Pes seu parvus pes, $\pi\omicron\delta\varsigma$.
 ZZ. Calx seu Calcaneus, $\pi\eta\gamma\epsilon\iota\alpha$.
 aa. Planta pedis, $\kappa\epsilon\gamma\iota\lambda\omicron\nu\ \tau\omicron\upsilon\ \pi\omicron\delta\delta\iota\varsigma$.
 b. Ulna, $\delta\lambda\acute{\iota}\nu\alpha$.
 c. Cubitus, $\pi\eta\chi\upsilon\varsigma$.
 dd. Carpus.
 ee. Dorsum manus.
 g. Index, $\lambda\epsilon\iota\gamma\epsilon\nu\omicron\varsigma$.
 h. Pollex, $\alpha\upsilon\lambda\epsilon\chi\epsilon\iota\phi$.
 ii. Medius, $\mu\epsilon\delta\iota\omicron\varsigma$.
 k. Medicus, seu annularis, $\iota\alpha\pi\epsilon\gamma\iota\varsigma$.
 l. Auricularis, seu minimus, $\alpha\upsilon\tau\iota\varsigma$.

TAB.



TAB. III. & IV. Venas cutaneas quæ secantur, & scarificantur, exhibent: altera quidem anteriores, altera vero posteriores: quæ majori ex parte in plerisque hominibus eodem modo distribuuntur, præsertim illæ quæ inciduntur.

- a. 1. 2. Jugularis externa colli latera scandens: quæ sine periculo vix secari potest, cujus rami in collo scarificantur.
- b. 1. 2. Bipartita hujus vena sectio.
- c. 1. Jugul. externa ramus interior, oris & hioidis musculos petens lingua subternitur, ubi secari solet.
- d. 1. 2. Ramus externus ad occipitium.
- e. 1. 2. Rami ad buccam & nasum pertingentes.
- f. 1. 2. Vena frontis, quæ in media fronte, ubi secari solet, cum ejusdem vena lateris alterius ramo jungitur.
- g. 2. Vena puppis.
- h. 1. Vena per tempora, cui jungitur portio vena frontis.
- i. 1. 2. Vena quæ ad aures fertur, & occipitium irrigat.
- k. 1. Ramus ab axillaris parte superna prodiens ad musculos colli posteriores.
- l. 1. 2. Ramus à cephalica ad cutim & musculos brachium elevantes: hic scarificatio fit.
- m. m. 1. 2. Vena Cephalica seu externa, brachii exteriora nervo comitata perreptans, quæ ad tuberculum cubiti flexura secatur, sorte tutius paulo humilins, ubi à nervo desleat.
- n. 1. Venula ex Cephalica per cutim brachii dispersa.
- o. 2. Ramuli à vena capitis ad scapulam externam, cujus pars quadam inter carnem & cutim fertur.
- p. 1. Cephalica hic tripartito dividitur.
- q. 1. Primus ad musculos à tuberculo externo humeri pronatos, abit.

r. 1. 2. At secundus ad cubiti flexum hepatica ramo y. notato jungitur, utriusque conjunctio 3. notatur.

s. 1. 2. Tertius oblique super radium & partem exteriorem brachii fertur, ramulos cuti largiens, quorum præcipuus ad flexuram cubiti extrinsecus, ubi ad carpum pervenit, vena Hepatica jungitur [* in fig. 2.] & paulo inferius varie divisa totam fere manum nutrit.

t. 1. 1. Vena hepatica, basilica seu interna, quibusdam axillaris, quæ in sinistro lienaris vocatur.

u. 1. Ramus ex hepatica bipartito divisus, internam & externam cutim brachii nutriend.

x. 2. Ramulus ad musculos cubiti & cutim, quæ externa ejus pars tegitur.

y. 1. Hepaticæ ramus anterior ad cubiti flexum Cephalicæ. notato jungitur, medianam 3. notatam constituens.

z. 1. Ramus hepatica retro latus ad brachii caput internum divisus.

* 2. A prædicto ramus brachiale petens, ramulis sparsis, & ad carpum supra minimum digitum Cephalicæ ramo jungitur.

1. 2. 1. Venæ duæ cubiti anteriores ab hepaticæ ramo, quæ per manus interiora cum nervis excurrunt, & in exortu loco hepaticæ secantur.

3. 1. Mediana, sive communis ex Cephalicæ & Basilicæ ramis conflata.

4. 1. 2. Vena communis supra carpum partitio, à 3. & 4. cubiti communi vena ex duobus ramis conflata, ad cubiti exteriora, mox posteriora, juxta 4. sinistra manus ad externam sedem propagata, & vicinis venis commiscetur: hæc non secatur.

LIB. I

TAB. III




B

§. 2. Hujus

5. 2. Huius partitionis ramus externus, manus exter-
nam partem adiens, ad ipsius internam quoque par-
tem ramulos mittit.
 6. 6. 2. Vena communis ramus, qui sub pollice pro ce-
phalica inciditur.
 7. 2. Vena salvatella, vena communis & cephalica ra-
mus, qui sub minimo digito pro hepatica, vel lienari
secatur.
 8. 2. Vena inter medium & annularem, quae quibus-
dam Syele Avicennae.
 9. 2. Ramus versus digitum medium.
 A. A. 1. Surculi prodeuntes à venis, quae geniculatim
juxta lumbos producuntur, qui in lumbis scarifican-
tur.
 B. 1. Rami ab Epigastrica prodeuntes, & ad 4. Abdo-
minis musculos distribuit, cuius insignior ramus in se-
ctione Iternia saepe vulneratur.
 C. C. 2. Vena ab externo ramo trunci cauae prodeuntes,
per musculos & cutim nativam dispersa.
 D. 1. Vena per musculos pectorales, per mammas & ea-
rum cutim distributa.
 E. 1. Vena mammas petentes à Mammaria prodeun-
tes.
 F. F. 1. Venula à substratis ramis emergentes thoracem
adeuntes, è quibus praecipue scarificantur in scapulis.
 † †. 1. Ventrem petentes venula à subjectorum muscu-
lorum venis progressa.
 G. 2. Ramus qui per pectoris latus fertur.
 H. 2. Vena humerum, musculos scapulae & glandulas
sub axillis petens.
 II. 1. Vena cruralis interior juxta inguina emergens,
& sub cute ad pedem progrediens, cui nervus toto du-
ctu preponitur.
 K. K. 1. Praedicta vena ramus per femoris interiora in-
guina adiens.
 L. 1. Vena cutim, quae femoris anteriorem partem tegit,
perreptans.
 M. M. 1. 12. Cruralis per interiorem & exteriorem fe-
moris partem delata.
 N. N. 1. 2. Tibiae interior, quae sub cute in multos ra-
mos divisa fertur: & hic aperiri potest, quando sangui-
nem mittere volumus.
 O. 1. Praedicta ad interioris malleoli partem antero-
rem abit, & in pedis superiora exhauritur.
 P. 2. Ramus à crurali vena, ad coxendicem, ejus loci
musculos & cutim venulas mittens.
 Q. 1. Ramus. 7. & 9. tibiae musculo & cuti femoris sur-
culos largiens.
 R. S. 2. Ex duabus propaginibus junctis vena musculos
posteriores femoris & cutim sursum perreptat.
 T. 2. Vena poplitis, quae majore parte sub cute per Popli-
tem fertur & in
 V. 2. Sura cutem numerosa sobole spargitur.
 X. X. 1. Cruralis vena interior ramus ad sura musculos
& cutim.
 T. 1. Tibiae vena interior, per illius interiora per pedem
internum nervo comitante delata, quam sub genu lo-
co Saphena secant.
 Z. Z. 1. 2. Cruralis vena portio ad interioris malleoli
posteriores sedem, seu vena malleoli Saphena dicta,
qua sub interno malleolo secatur.
 α α inferius. 1. Cruralis vena exterior ramus, seu Ti-
biae vena exterior, per illius externas partes & pedis
superiora divaricata.
 3. pro β. 1. Dicitur ramus portio per malleolum externum
repens.
 γ γ. 1. E pedis venis illa est, quae ad Pollicem Cephalica
nomine, non tamen satis tuto, cum nervum adjun-
ctum habeat, secatur.

LIB. I

TAB. IV



B 2

TAB.

TAB. V. Exhibet figuram hominis, cui Cutis cum suis Venis, pinguedine, & tota membrana carnosae adempta sunt, ea tantum parte, carnea membrana excepta, qua musculi naturam induit, quatenus musculis commiseratur: quem admodum etiam fibrarum ductus in musculos inferantur, demonstrat.

- a. Musculus frontis.
- b. Musculus temporalis.
- c. Musc. claudens palpebram.
- d. Alas nasi aperiens.
- e. Pars anterior ossis jugalis.
- f. Muscul. Labri superioris nasum petens.
- g. Masseteris principium.
- h. Latus Musculus carnosae constans membrana.
- i. k. Principium quod à clavicula mediatae oritur & à summo humero.
- l. quod per obliquum ascendit versus partem anteriorem usque ad l.
- m. Musculus brachium attollens.
- n. Musculus pectoralis.
- o. Membrana huius musculi pars, quae nervosa tenuitatis primi abdominis musculi iungitur.
- q. q. Carnea eiusdem portio ex 6. & 7. costa, & eius insertio.
- r. Brachium deorsum trahens musculus.
- f. Musc. obliq. descendens abdominis.
- t. t. t. Musc. serrati majoris insertio.
- u. u. Linea alba ad quam concurrunt ambo obliqui descendentes, totum abdomen tegentes.
- x. Penis cute denudatus.
- y. Vasa seminaria.
- aa. Testes carnosae memb. involuti.
- β. Musc. anterior cubitum flectens.
- γ. Posterior cubitum flectentium.
- δ. Musculus cubitum extendens.
- ε. Musc. bicornis brachiale extendens.
- ζ. Musc. latum summae manus tendinem producens.
- ξ. Eius tendo.
- η. Muscul. radium supinans.
- θ. Musc. superior radium pronans.
- ι. Brachium flectentium secundus, cuius initium x. & tendo λ.
- ο. Portio musculi quorum alter brachialis, alter pollicis tendines offert.
- π. Ex carne primi pollicis internodium.
- ρ. Musc. brachialis insertus seq. adjacet.
- σ. Musc. in duos sectus tendines, quorum unus primo pollicis articulo: alter in sequentes inseritur.
- τ. Musc. primus femoris, initium υ. & tendo φ. insertio χ.
- ψ. Musc. secundi femoris finis.
- ω. Musc. tertij femoris finis.
1. Sextus tibiae princip. 2. membranofus fere solus 3.
4. Tibiae musculus novus.
5. Tibiae octavus.
6. Femoris sexti & septimi portio.
7. Glandula inguinum.
8. Femoris octavus.
9. Tibiae secundus.
11. Malleolus internus.
12. Pedis musc. sextus: ortus 13. finis 14.
15. Pedis septimus.
16. Tendo musc. pollicem erigentis.
17. Musc. quatuor digitos extendens.
18. Pollicem abducens.
19. Ligamentum transversum,
21. Tendo noni musc. pedis.
21. Primus. 22. Quartus pedem movens.
23. Tendo tertij musculi.
24. Musc. tertium os. 4. digitorum flectens.

LIB. I.

TAB. V.



B 3

TAB.

TAB. VI. Omnes infimi ventris musculos, à
sinistris quidem obliquos: à dextris, pyra-
mibalem, rectum & transversum exhibet.

A. Obliqui externi vel descendenti superior
pars non separata, quo connexio eius bb. cum
ferrato ee. pateat & implantatio CC. ad li-
neam.

dd. Linea alba albam.

B. CC. Obliqui descendenti inferior pars, à
linea alba d. separata: CC. eius tendo.

D. Obliquus ascendens musculus.

EEE. Rectus musculus dexter, à quo ambo o-

bliqui remoti sunt.

I. 2. 3. recti musculi intersectiones.

F. Pyramidalis dexter, sinister enim ut & re-
ctus, obliquo ascendenti subjacent.

fg. Obliquorum externorum principium car-
nosum ab osse ilij. f. ab osse pubis, g. quem-
admodum & pyramidalis.

GG. Transversus musculos.


HH. Fibre obliqui ascendenti.

I. Fibre obliqui descendenti, ut decussatio pa-
teat.

KK. Fibre transversus musculi.

T A B.

LIB: I. TAB. VI.



B 4

TAB.

TAB. VII. Est musculorum rectorum, transversorum & pyramidalium, solis obliquis remotis.

A A. Recti abdominis musculi.

b b. eorum principium nervosum.

c c. Rectorum implantatio.

d d d d d. Intersectiones nervosae rectorum.

e e. Linea alba, ubi recti à se recedunt.

f. Rectorum coniunctio sub umbilico.

g. Pyramidales musculi, qui impares pingi debebant.

h. Membrana oblique ascendens, quae trans-

versi musculi tendini valide adhaeret, & ad rectum musculum accedit.

i. Obliquus ascendens ab abdomine hic reflexus.

k k. Productio peritonaei cum vasis seminariis.

l l l. Transversi musculi.

m. Inguina.

n. Circuli tres, qui penis abscissi corpora ostendunt.

o. Ospectoris ex carae.

p p. q. Serratus major sive Thoracis secundus.

r. s. t. huius amplitudo.

T A B.

LIBI.

TAB. VII



C

TAB. Fi.

TABULA IIX.

TAB. IIX. FIG. I. *musculos rectos cum suis vasis, & infimum ventrem (remotis omnibus musculis) peritoneo intectum ostendit.*

A A B C D. *Peritonæi superior, inferior & laterales partes, his characteribus notantur.*

E E. *Linea alba, ab ossis pectoris cartilagine ad ossium pubis commissuram descendens, cui obliquorum & transversorum musculorum tendines firmissimè connascuntur.*

F. *Cartilago ossis pectoris siue sterni.*

G. *Umbilicus, qui ademptis omnibus musculis, ad vasorum umbilicalium demonstrationem, reservari debet.*

H H. *Peritonæi productiones utrinque Vasa seminaria continentes, quibus in Hernia, vel Intestinum, vel Omentum illabitur.*

** *Foramen, vasis seminarii virorum viam præbens.*

I I. *Vena & arteria ab Epigastrica, quæ sub rectis musculis hic propendunt, sursum delata & in humiliorem abdominis partem distributa.*

K K. *Vena & arteria à Mammariâ interna,*

sub osse pectoris prodeuntes, quæ per rectos musculos deorsum feruntur & superiorem abdominis sedem implicant.

1. 2. *Rectorum musculorum exortus, qui reserati propendunt, quo vasa conspiciantur.*

3. 4. *Venarum dictarum anastomoses, abdomini cum naribus, & uteri cum mammis consensum facientes.*

L L. *Venarum soboles in peritonæi latera excurrentes.*

M. *Transversus musculi portio à peritonæo divulsa, & retrorsum flexa.*

N. *Ilium ossis sedes denudata, cui obliqui & transversus musculi committuntur.*

O O O O. *Serrati majoris ad costas insertio.*

FIG. II. *Quæ à sculptore inversa est, venas & arterias à Mammariâ descendentes, sub rectis musculis & alias ab Epigastrica, sub ipsiâ ascendentes, proponit.*

a. *Descendentes notat, sub osse pectoris à trunco Cavæ & Aortæ prodeuntes.*

b. *Ascendentes ab Epigastricis.*


c c. *Anastomoses seu concursus vasorum descendantium cum ascendentibus.*

T A B.

LIB. I. TAB. VIII.

FIG. I.

FIG. II.



C 2

TAB.

TAB. IX. Ventrem inferiorem, partibus continentibus omnibus cum peritoneo remotis, & visceribus omnibus in naturali situ adhuc locatis, una cum Omento & vasis Umbilicalibus exhibet.

AA BB. Peritonæi in quatuor partes dissecti & reflexi interior & anterior superficies.

B. superius: Umbilicalis venæ in hepar implantatio.

C. Umbilicus à peritoneo liberatus.

D. ad B. superius Vena Umbilicalis.

EE. Ventriculi pars anterior inflata, quæ nec ab Hepate nec ab Omento obtegatur.

FF. Hepatis gibba sedis portio.

G. Vasa per peritoneum disseminata.

* Mucronata cartilago sterni.

H. Vesicæ urinariæ fundus.

I. Peritonæi ad vesicæ fundum nexus.

KKKK. Omentum intestinategens.

MN. Vasa cum nervis ventriculi fundum amplectentia.

O. Coitus vasorum utriusque lateris: ita ut M. N. & O. suturam indicent, cuius Aristot. 3. hist. & 4. part. an. meminit, dum Omentum à medio ventre oriri & dependere dicit.


PP. Ventriculi fundum perreptantes vasorum soboles.

QQQQ. Vasorum propagines Omento superiori distributæ & adipe cinctæ.

aa. Arteriæ binæ umbilicales, ad vesicæ latera, ad arteriæ magnæ ramum prorepentes.

b. Ligamentum vesicæ, quod pro Vracho ostenditur & in Umbilicum terminatur.

FIG. II. Venam umbilicalem exhibet. A. quidem venæ partem umbilico conterminam. B. ejusdem, quæ hepatis inseritur.



TAB. X. FIG. I. Omentum integrum & undique liberum & nulla parte divulsus, sacculum, aut rete piscatorum minus referens ostendit, cum venarum, artiarum & nervorum per ipsum dispersorum serie.

aaaa. Membrana superioris omenti anterior facies.

bbbb. Omentici culus quo Ventriculi fundo adnascitur.

ccc. Omenti inferioris pars supra Colon elatior.

d e f. Membranam, vasa & adipem omenti exprimit.

g. Vena portae truncus, qua ex hepate prodit, ab omenti membrana inferiore suffultus.

h. Arteria cum nervo hepatis cavum & bilis vesiculam petens.

i. Vasa pylorum posteriore potissimum sede accedens, arteriam conjugem habens.

kk. Vena & arteria cum nervo dextram partem fundi Ventriculi petens.

llmm. Corpus ventriculi implicantes rami, à vase k. quae etiam omenti superiorem membranam pervadunt mm.

n. Vena & arteria duodeno & jejuni principio exporrecta, nervulum socium saepe admittentes.

o. Vena portae divisa in ramum dextrum & sinistram, ubi notandum, ramum sinistram Splenicum dictum, non ex Hepate prodire, sed duobus transversis digitis, infra Hepar ex Vena portae trunco prodire.

p. Ramus dexter in mesenterium & intestina excurrrens.

q. Ventriculi posteriora accedens vena.

r. Ventriculi sinistram orificium coronae instar

amplectens, vena & arteria.

t. Mesenterij arteria (sculptor male quasi ex vena produxit.)

u. Arteria ad inferiorem omenti membranam.

x. Colo intestino & omenti membrana vena & arteria cum nervo transmissa.

x. Inferius omentum petens vas.

yy. Lienis vasorum series à ramo splenico.

z. Ventriculi sinistram fundum petens ramus.

aaa. Pancreas sub vasis & duodeno intestino, inferiori omenti membrana innatum.

FIG. II. Omenti inferiorem membranam superiorem remota cum intestino Colo, quod continet & vasis, exhibet.

AA. Omenti inferioris pars elatior à dorso pronata quae Ventriculo posterius subjicitur, & duabus membranis Colon, secundum ventriculi fundum continens.

B. Vena à sinistro trunco Portae & Arteria, cum plerumque attento nervo, in omentum.

C. Vena insignis & arteria Omento & Coli communicata, cui nervulus quibusdam sedibus additur.

D Vena, omenti latus sinistram perreptans.


E. Coli pars dextra, quae hepatis cavo substernitur, hic abssecta.

F Coli sinistra pars Lienis incumbens.

GG Coli pars ventriculi fundum perreptans.

HHH. Omenti inferioris humilior pars à Colo quodammodo pronata.


II. Omenti superioris divulsi residua portiones, ut ostendatur, quomodo omentum per se conferri possit.



- TAB. XI. Ventrem inferiorem exhibet, Omenti membrana superiore dilacerata, & sursum super thoracis exteriora, & ventriculū extensa; & Ventriculū sursum ad pectus ex sua sede tractum quo humilior Omenti membrana rectius conspiciatur & Venae portae cum ramis aliquotae monstrari possit. Intestina item suo loco posita, & Lienis pars, ostenduntur.
- aaa. Omenti superioris interior seu posterior sedes, quam & alam superiorem nonnulli appellant.
- bb. Ventriculus extuberans Omenti membrana superiore tectus.
- cc. Omenti inferior membrana seu ala humilior sursum collecta, quo situ totum plerumq; invenitur, quo Colon, ventriculo attensum, occultatur.
- d. Vasa ad lienem, qui Omento occultatur.
- e. Caudex venae portae.
- f. Vena Portae ramus splenicus.
- g. Vesica urinaria.
- * Peritonei cum vesica connexus.
- i. Ligamenti vesicae, quod Urachus dicitur, portio.
- kl. Arteria duae umbilicales, vesicae lateribus adnexae.

LIB. I.

TABXI



D

TAB. Vi.

TAB. XII. *Viscera infimi ventris propriis sedibus locata exhibet, Costarum inferiorum finibus effractis & cum Septo transverso, cui peritonaeum adnectitur, (quo hepatis, lien & ventriculus conspiciatur) reflexis.*

- A. Cartilago ensiformis ossis pectoris.
- B B. Peritonaeum, cum Septo & costis disruptis, extrorsum flexum.
- C C. Hepatis gibba pars.
- D. Ligamentum hepatis Septo sive Diaphragmati alligans.
- E. Vena umbilicalis portio, ad Hepatis fissuram inserta.
- F F. Ventriculus cibo repletus.
- G. Lienis portio, in anteriora vergens.
- H. Cecum intestinum posterius.

I. Crassorum intestinorum principium, ubi Valvula.

I. ad K. Intestinum Colon à rene dextro ad hepatis usque cavum K ad L. Colon fundo ventriculi subiectum ab hepatis cavo ad lienis regionem.

L. ad M. Colon à liene ad os pubis.

N. Colon in rectum desinens.

O. Recti intestini initium sub vesica.

P. Coli depressa sedes.

Q Q. Coli cellulae sive semiglobuli extuberantes.

R S T. Intestina tenuia maxima ex parte sub umbilico.

aa. Arteria duae umbilicales, vesicae lateribus adnexae.

b. Vesicae fundum.

* Vesicae cum peritoneo connexio.

T A B.

TAB. XIII. Venam portæ eiusque ramos, qui ad vesicam bilariam, ventriculum, lienem, omentum, mesenterium & intestina mittuntur, exhibet.

I. 2. 3. 4. 5. Venæ portæ rami superiores per hepatis cava disseminati.

AAAA. Distributio illorum, formam hepatis exhibet.

B. Truncus sive caudex Venæ portæ ex hepatis cavo prodiens.

CC. Cystica gemellæ ad vesiculam bilariam, ut eam nutriant.

D. Gastrica dextra (sed sculptor malè continuam facit cum vena R. notata, cum ex ipso trunco prodire debeat.) ad posteriorem fundi Ventriculi partem pylorum versus.

E. Trunci Venæ portæ in duos ramos divisio.

F. Ramus sinister, qui elatior & Splenicus dicitur, qui cum ex Hepate non prodeat, ex eo humorem sæculentum Lien rapere non potest, sed à Mesenterico trunco rapit.

G. Ramus dexter, qui grandior & humilior seu Mesentericus.

H. Gastroepiplois dextra in dextram fundi ventriculi, & omenti membranam superiorem distribuitur.

I. Intestinalis, ad duodenum & jejuni initium.

K. Gastrica minor.

L. Epiplois dextra in inferiorem omenti membranam.

M. Pancreæ, per Pancreas sparsæ.

N. Gastrica major ad posteriorem Ventriculi sedem ejusq; orificium sinistrum.

OO. Venæ duæ prædicti rami, posteriora Ventriculi implicantes.

P. Gastrica majoris in elatiore Ventriculi regione bipartitio.

Q. Coronaria stomachica.

R. Coronariæ ramus secundum elatiorem Ventriculi partem procedens, ejus orificium sinistrum cingens.

S. Epiplois postica, in inferiorem Omenti membranam & colon intestinum.

T. Splenici rami divisio.

V. Epiplois sinistra (cujus radix in integra figura V. distributio vero in peculiari figura V. T. ostenditur ad Omenti membranam inferiorem.

X. Gastroepiplois sinistra, ad Ventriculi & Omenti membranam sinistram.

YZ. Ventriculi sinistrum latus petentes, reflexæ ab illis, quæ elatiora lienis petunt.

Z. (supremum) Vas breve per quod humor melancholicus in Ventriculum effunditur, notat.

aaaa. Lienis substantiam perreptantes ramuli, lienis imaginem ostendentes.

bc. Mesenterica dextra duplex b. sinistræ.

ddd. Venæ Mesaraica, intestinis inserta.


ee. Coli intestini vena.

ff. Rectum intestinum implicantes venæ.

gg. Hemorrhoidales venæ anum amplectentes.

LIB. I.

TAB. XIII



D 3

TAB. Fi-

- TAB. XIV. FIG. I. *Arteria magna trunci portionem exhibet, à qua arteria Celiaca prodit & Celiacæ ramos, qui Venæ portæ ramos comitantur.*
- g. *Vas breve arteriosum, ad Ventrículi partem sinistram.*
- m. *Arteriæ Celiacæ exortus.*
- n. *Celiacæ dexter ramus.*
- o. *Epiplois dextra, in humiliorem Omenti membranam.*
- p. *Gastrica dextra, in dextram ventriculi sedem posteriorem pylorum versus.*
- q. *Intestinalis, qua duodeno intestino & jejuni initio exporrigitur.*
- r. *Gastroepiplois dextra, quæ in dextram fundi ventriculi sedem, & superiorem Omenti membranam diffeminatur.*
- s. *Cysticæ gemellæ ad vesicam bilariam.*
- t. *Arteriæ in hepatis cavum distributæ.*
- u. *Celiacæ sinister ramus lienem potissimum adiens.*
- x. *Gastrica major, ad posteriorem ventriculi sedem, ejusque sinistrum orificium.*
- y. *Soboles in mediam ventriculi sedem qua dorso innititur.*
- z. *Coronaria stomachica, orificium ventriculi sinistrum cingens.*
- α. *Gastrica sinistra, in ventriculi superiora ad dextrum orificium.*
- β. *Epiplois postica, ad inferiorem Omenti membranam & colon intestinum.*
- γ. *Epiplois sinistra, ad inferiorem Omenti membranam.*
- δδ. *Rami lienis cavum subeuntes.*
- e. *Gastroepiplois sinistra, ad sinistram fundi ventriculi sedem & supernam Omenti membranam.*
- ζ. *Mesenterica superior.*
- ηη. *Emulgens dextra & sinistra ad renes.*
- ιι. *Spermatice dextra & sinistra.*
- FIG. II. *Venarum & artiarum Celiacarum mutuam connexionem cum Pancreate & Splene ostendit.*
- aa. *Vena, arteria & nervus, quæ pylorum implicant.*
- b. *Venæ portæ ramus minor seu splenicus.*
- c. *Portæ ramus major mesentericus.*
- d. *Vena & arteria ad duodenum.*
- e. *Ad Omenti membranam inferiorem vasa.*
- f. *Arteriæ radix, quæ Venæ portæ ramos comitatur.*
- g. *Vena & arteria coronalis ventriculi.*
- h. *Vasa ad Omentum inferius & colon.*
- i. *Pancreas, distributioni vasorum præfectum.*
- k. *Vena ad Omenti inferioris sinistram partem.*
- llm. *Vasorum series ad lienem ll. ad m. insertionem denotat.*
- nnn. *Vasa ventriculo oblata ab illis reflexa.*
- ooo. *Vena & arteriæ, intestinis transmissæ.*
- p. q. *Mesenterium petentes duæ arteriæ.*
- rrrrr. *Glandula, mesenterii vasis subjecta.*
- t. *Venæ portæ caudex.*
- u. *Meatus vesiculæ bilis, ad duodenum.*
- x. *Vesiculæ bilariæ vena.*
- y. *Arteriæ & nervi, ad jecur & vesicam bilariam.*
- φφ. *Rami duo, posteriora ventriculi petentes.*
- * *Vena & arteria hæmorrhoidalis.*

LIBRI PRIML

27


LIB. I.

TAB. XIII

FIG. I.



FIG. II.



D 4

TAB.

TAB. XV. Intestina tam tenuia quam crassa proponit, & quidem FIG. I. Tenuium figuram & ductus cum caeco & coli intestini portione exhibet. FIG. II. Crassorum figuram, ductus, cum Ilei intestini extremo, & ani musculos. FIG. III. una cum crassorum figura etiam Coli valvulam ostendit. FIG. IV. Intestini Coli & recti portionem, intestinorum tunicas demonstrandas.

H. I. Pylorus ligatus cum portione aliqua ventriculi.

I K. R. Duodenum intestinum.

L. I. Porus biliaris, bilem in intestina perferens.

M. I. Jejunum intestini initium.

N. I. 2. 3. Intestinorum tenuium finis.

O. I. 2. 3. Intestinorum crassorum principium, ubi Cecum Galeni.

† 3. Valvula intestini Coli, non rotunda, sed laxo principio utrimque intestini lateribus adposita.

P. I. 2. 3. Cecum intestinum posterius.

Q. R. S. T. V. 2. 3. Colon intestinum ab O. ad Q. a rene dextro ad jecur: à Q. ad R. secundum ventriculi fundum: ab R. ad S. à liene

ad os pubis: ab S. ad T. Coli recursus ad umbilicum: à T. ad V. deorsum de novo ad rectum intestinum deductum.

* 3. Colon intestinum dissectum, quò valvulam ostendat.

XX. 2. 3. Coli depressa sedes.

YY. 2. 3. Coli intestini cellulae siue semiglobuli extuberantes.

Z. 2. 3. Intestini recti initium.

a. 2. 3. Recti intestini orbicularis musculus fecum excretionis praefectus.

b. c. 2. 3. duo ejusdem recti musculi intestinum post excretionem retrahentes.

d. 2. 3. Sedes qua rectum intestinum peni virorum, cervici uteri mulierum interventu musculo sa substantia connecti solet.

ee. 4. Prima & exterior tunica à mesenterij membrana pronata, fibras rectas obtinet.

ff. 4. Secunda ipsorum tunica, transversis & rectis fibris praedita.

g. 4. Tertia & intima tunica obliquis fibris donata, & corpus intestinum constituens.

hh. 4. Mesenterij portio rectum intestinum ossi sacro nectens.

LIB I

TAB. XV.

FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.





FIG. IV.



E

TAB.

- TAB. XVI. FIG. I.** Mesenterii exortum, situm, connexionem & vasa ostendit, intestinis à medio ventre sursum & deorsum ad latera deductis. **FIG. II.** Mesenterium è corpore exemptum & liberum proponit.
- A A B B.** Peritonæi portiones extrorsum reflexæ & superne costis ruptis instratæ.
- C C C C.** Intestina tenuia.
- D.** Cecum intestinum.
- E E E E.** Colon intestinum tenuia ambiens.
- F.** Recti intestini initium.
- G.** Vesica, cui peritonæum * adnatum, ubi ipsæ alteram membranam offert.
- H. I. 2.** Mesenterii centrum, ubi peritonæum arteriam magnam & venam cavam vertebris adnectit.
- I I. I. 2.** Corpus glandulosum, vasorum (quæ centro inferuntur) distributioni adpositum, quæ aliquando scirrhusæ reddite, tabem causant.
- K K. I. 2.** Glandula distributionibus vasorum, ad intestina delatorum, interjectæ.
- L M M M. 2.** Mesenterii pars quæ tenuia intestina dorso alligat, circumscribitur.
- N. ad O. 2.** Mesenterii portio, coli dextram partem dorso jungens.
- O. ad P. 2.** Inferioris Omenti membrana coli partem ventriculi fundo attensam dorso alligans.
- P. ad Q. 2.** Mesenterii pars coli sinistram partem à liene ad rectum intestinum protensam connectens.
- Q. ad R. 2.** Mesenterii pars, rectum intestinum dorso nectens.
- S. 2.** Mesenterii membrana gemina unguibus divulsæ inter quas vasa feruntur, & adeps & glandula continentur.
- T T.** Mesenterii prima T. altera membrana T.

T A B.

LIB. I.

TAB. XVI.

FIG. I.



FIG. II.



E 2

TAB.

TAB. XVII. *Vena cava & arteria magna ramos, per insinum ventrem disseminatos, proponit.*

AAA. Septum transversum, sive Diaphragma.

BG. Hepatis gibba pars, dextra B. sursum elevata, quo vesicula biliaria conspiciatur. sinistra G.

CC. Hepatis cava.

D. Vesica biliaria sursum elevata cum hepate.

EE. Renis utriusque anterior sedes, quorum sinister altior.

H. Ligamentum, hepar septo nectens.

I. Vena umbilicalis ubi hepati inseritur.

K. Vena cava truncus.

L. Arteria magna truncus.

N. Stomachus septum permeans & hepatis sinus.

a. Vena porta caudex.

b. Vena cystica ad vesicam biliariam.

c. Meatus vesicae biliariae ad duodenum.

de. Vena emulgentes cum subjectis arteriis emulgentibus.

f. Vena adiposa dextra ex emulgente.

g. Vena adiposa sinistra ex trunco.

hi. Vena spermatica dextra, ex cava; sinistra, ex emulgente.

ll. Vreteres.

mmm. Vena & arteria lumbares.

np. np. Muscula vena & arteria superior.

n. Vena cava supra os sacrum divisio.

oo. Vena & arteria sacrae.

p. Vena cava ramus iliacus.

q. Arteria iliaca.

r. Arteria & vena iliaca subjecta, in ramum

internum & externum, divisio. Internus & externus s. notatur.

ff. Interior ramus transversus.

ffff. Muscula media propagines interioris ramum transversum, quae ad nates, & ea quae coxendicis ossi adnascuntur, petunt.

tt. Penis vena & arteria a ramo g.

uu. Hypogastrica, ad vesicam & uterum propagines a ramo s. in omnes fere hypogastrii partes.

xx. Locus, ubi arteriae umbilicales inseruntur.

y. Rami externi portio, quae interior augetur.

1. ch. Rami interioris reliquum.

2. 2. Epigastrica, exterioris rami propago, abdominis inferiora sursum ad umbilicum perreptans.

3. Muscula inferior, coxendicem accedens vena sine arteria, eiusque sedis musculis & cuti soboles derivans.

4. Arteria magna diaphragma penetrans.

5. Arteria phrenica.

6. Arteria caliaca.

7. 9. Arteria ad Hepar.

8. Arteria cystica, ad vesicam biliariam.

10. Arteria Mesenterica superior.

11. Arteriarum spermaticarum ortus.

12. Arteria Mesenterica inferior.

13. Vena & arteria spermatica conjunctio.


14. Arteria magna divisio in ramos iliacos, & ascensus super venam cavam.

15. Pudenda, interioris rami propago, ad genitalia.

16. 17. Vtriusque trunci g. s. reliquum ad Cruram mittitur.

LIB. I.

TAB. XVII




E 3

TAB. FI-

- TAB. XIIX. Ventrem inferiorem à membranis, intestinis & ventriculo inanitur, cum plerisque huius ventris vasibus proponit.
- A A. Septum, cum peritoneo & costis aliquot, sursum reflexum.
- B B. Hepatis cava. Hepar enim elevatum, ut cavaeque cum vesicula biliaria ostendatur.
- C. Ligamentum hepatis sinistrum, quo Septo alligatur.
- D. Umbilicalis vena.
- F. Hepatis sinus ventriculo cedens.
- F. Ventriculi orificium sinistrum, male superius dictum.
- G. Tubera & impressiones in hepatis cavo, ubi Vena porta prodit.
- H. Vesiculabilis.
- I. Vena porta abscissa & ramuli ad vesiculam.
- K. Hepatis nervus à stomachico prodiens.
- L. Arteria hepatis & vesicula communis.
- M. Nervus hepatis & vesicula communis à costali dextro.
- N. Meatus vesiculae biliaria, ad intestina abscissus.
- O. Lienis anterior & cavae regio.
- P. Linea lienis cui vasa splenica implantantur.
- Q. Vena cava truncus.
- R. Arteria magna truncus.
- S. Arteria Celiaca abscissa.
- TV. Renes, membrana sua pingui adhuc involuti.
- XY. Venae adiposae, ad membranam praedictam.
- ab. Venae emulgentes cum subjectis arteriis, serosum sanguinem deducentes.
- cc. dd. Uterus ab utroque rene ad vesicam.
- e. f. Spermaticae venae ad testes.
- gg. Venae ad peritoneum à spermaticis.
- hi. Arteriae spermaticae, ad testes.
- k. Arteria mesenterica inferior.
- l. Arteria magna supra Venam cavam conscensus & ejus, cum vena cava in duos truncos divisio.
- m. Arteria lumbaris, ad lumborum carnes & peritoneum.
- n. Arteria sacra, ad ossis sacri foramina.
- o. Recti intestini pars, vinculo intercepta.
- p. Vesica urinaria.
- * Vesica cum peritoneo connexio.
- q. Vasis semen à teste deferentis hic reflexi portio.
- rs. Scrotum seu cutis penem & testes investiens.
- t. Panniculus carnosus scroto subjectus, testem utrumque ambiens.
- u. Tunica à peritoneo testis propria cum suis vasibus.
- x. Penis excoriat pars propendens.

LIB. I.

TAB. XVIII



E 4

TAB.

TAB. XIX. Tabula hæc renem hu- D. I. 2. Vreter.

manum exhibet. FIG. I. Integrum eee. 2. Ureter apertus & per renem
cum glandula imposita. FIG. II. expansus, fistularum seu ductuum for-
Renem dissectum. ma.

A. I. Ren humanus integer.

B. I. Glandula reni imposita.

C. I. Vena & Arteria emulgens.

fff. 2. Carunculae papillares angustissi-
me perforata, quæ ureterum fistulas
ingredientes, serum in eas percolant.

TAB.

FIG. I.





FIG. II.



TAB. XX. FIG. I. Renis vasa à carne separata exhibet. FIG. II. Ad Vesalii imitationem renes dissectos, & quidem prima renem per gibbum secundum ejus longitudinem sectum, ut in secundum renis sinum pertingat, nulla renis portione ablata: Secunda renem cui universa prope substantia septum constituens cultello orbiculatim adempta est, quo totum sinum secundum ostendat: Tertia, primi sinus ramos omnes ostendit, renis carne penitus ablata. FIG. III. Commentum quorundam de feri percolatione exprimit; & prima quidem renem à gibbo versus cavum dissectum cum cribro: Secunda renis mediā partem exhibet cum cribro.

A. Vena cava truncus.

B. Arteria magna truncus.

CC. Vena emulgens bipartito divisa.

DD. Arteria emulgens gemina.

E. Vena spermatica à trunco.

F. Ureteris latitudo in renis corpore, in cuius latiori parte sepius calculi maxime ramosi haerent.

FIG. II.

αβ. 1. Anterior & posterior renis portio.

γγ. 1. Orificia ramorum primi sinus.

δδ. 1. Corpus primi sinus, in quod vena & arteria renis terminatur.

ε. 1. 2. Foramen, quod ureteris est initium.

ι. 1. 2. Ureteris pars.

αβ. 2. Circulus inter αβ. ductus sinum secundum renis indicat.

ηθ. 2. Hujus sinus posterior & anterior pars. θ.

FIG. III.

A. Vena & arteria emulgens.

BB. Sinus, in quem urina ex primo sinu colatur.

CC. Sinus, in quem vasa serosum sanguinem profundere volunt.

D. 2. Renis substantia, orbiculatim hos sinus amplectens.


EE. Colatorium renis, seu membrana cribri modo pervia, per quam urina ex sinu B. in sinum C. cum bile percolari fingunt.

FF. Ureter urinam ex secundo sinu excipiens.

TAB.

LIB. I.

TAB. XX.



F. Z. TAB.

TAB. XXI. Hac figura est renis pueri, qui quarto post partum die in Nosodochio Argentiniensi obiit, & à Doctore Johanne Rudolpho Saltzmāno apertus fuit, qui quidem fugebat, sed nihil per alvum aut vesicam deiciebat : in quo intestina flatibus distenta, podice non pervio: renes in octo partes lineis distinguebantur : ureteres sero distenti ad vesicam angustissimi, ita ut non nisi stylum parvum admitterent, mucro referri seri

transitum intercludentes, sic in vesica non nisi mucus, non tamen admodum copiosus, repertus est.

Renes bubulis similes. FIG. I. Renis dextri faciem anteriorem. FIG. II. posteriorem exhibet.

aaaa. Renis corpus octo lobis constans.

bb. Ureter sero distentus.

cc. Vasa emulgentia.

dd. Ureteris pars inferior præter solitū angusta.


T A B.

LIB. I.

TAB. XXI.

FIG. I.

FIG. II.



F 3

TAB.

TAB. XXII. Ventrem inferiorem cum osse pubis diducto, quo vasa generationi infervienti cum testibus, vesica & pene clarius conspiciantur, proponit: Hepatis quin etiam & renum situm naturalem.

aa. Peritonæi & septi transversi pars cum costis disruptis, & sursum extrorsumq; reflexis.

bb. cc. Hepatis convexa bb. at sima pars cc.

de. Ligamentum hepatis dextrum & sinistrum,

f. Vena porta truncus abscissus.

g. u. Vena cava truncus.

hl. Adiposa vena dextra & sinistra.

i. Arteria magna in Venam cavam conscensus & divisio.

k. Arteria celiaca.

mn. Vasa emulgentia, serosum sanguinem ad renes deducuntia.

oopp. Membrane pingues ab utrisque renibus divulsæ.

qq. Ureteres, ad vesicam urinam deferentes.

tu. Spermatice vena dextra juxta u. ex Vena cava exorta.

xy. Spermatice sinistra duplex exorta: x. ab emulgente, y. vero, à trunco cavae.

α. Arteriarum Spermaticarum origo.

β. Peritonæum petentes rami à spermaticis.

γ. Spermaticorum vasorum transitus per peritonæi productiones.

δ. Varicosum vas pyramidale in testem.

ε. Paraastates.

ζ. (Sed sculptor 3. ch. posuit) testis interiore involucri adhuc tectus.

η. (Sculptor posuit H.) deferentis vasis descensus.

ι. ad x. deferentis vasis reflexus sursum.

ν. Vesica.

* Rectum intestinum.

ξ. Prostata glandula, quibus vasa deferentia inseruntur.

ε. Vesica musculus sive sphincter.

στ υ. Penis duo corpora στ. vasa penis υ.


φχ. Testis involucrium.

ψω. Musculus testis cremaster dictus, & ipsius vasa ω.

TAB.

LIB. I.

TAB. XXII.



F 4

T A B.


- TAB. XXIII. *Renes cum vasis urinariis & seminariis, venæ cavæ & arteriæ magnæ portione, testibus, vesica & pene exhibet. Figura quidem prima anteriorem faciem, quem admodum secunda posteriorem ostendit.*
- aaa. 1. *Renis dextri anterior regio.*
 bbb. 2. *Renis sinistri regio posterior.*
 c. 1. dd. 1. 2. *Latus externum c. internum cum sinu & tubere, dd.*
 ee. 1. 2. *Sinus duo, ad latus internum, quibus vasa emulgentia h. inseruntur.*
 ff. 1. 2. *Venæ cavæ truncus.*
 gg. 1. 2. *Arteriæ magnæ truncus.*
 hi. 1. 2. *Vena & arteria emulgens, serosum sanguinem ad renes deducens.*
 kk. 1. 2. *Vena adiposa dextra: quam in Fig. 2. Sculptor male ex arteria emulgente educit, cum ex venaprodeat.*
 l. 1. *Adiposa sinistra, ex venæ cavæ trunco producta.*
 * inter g. & l. 1. *Arteria Celiaca, quæ ad ventriculum, mesenterium & vicinas partes fertur.*
 mn. 1. 2. *Vreteres ad vesicam.*
- opq. 1. 2. *Spermatica dextra, quæ juxta p. exoritur, sinistra quæ ex emulgente vena enata.*
 r. 1. *Arteriarum seminalium exortus.*
 s. 1. 2. *Surculi à venis spermaticis peritonæo distributi.*
 t. 1. 2. *Varicosum vas pyramidale.*
 u. 1. 2. *Parastata seu epididymis.*
 x. 1. *Testis sua tunica adhuc involutus.*
 y. αβ. 1. 2. *Deferentis vasis exortus y. descendus α. ejus revolutio β.*
 γ. 1. 2. *Ductus huius vasis nervi instar reflexus.*
 δ. 2. *Coitus vasorum deferentium.*
 ε. 1. 2. *Vesica urinaria in 1. Fig. aperta, in altera ejus pars posterior.*
 ζζ. (Sculptor posuit 33.) *Vesicula seminalia aperta.*
 ηη. 2. *Glandula prostatica.*
 θ. 2. *Sphincter musculus vesicæ, urinæ excretioni præfectus.*
 ι. 1. 2. *Corpora duo penem constituentia.*
 κκ. 1. *Vasa, quæ ad penem & cervicem vesicæ abeunt.*
 λ. 1. *Meatus communis urinæ & semini diffusus.*
 ♀. *Vreterum in vesicam implantatio.*

LIB. I.

TAB. XXIII.

FIG. II.

FIG. I.



G

TAB.

TAB. XXIV. FIG. I. *Natura lusum in vasis seminariis, emulgentibus, & renis sinistri situ, proponit, prout in publica sectione nobis occurrit.*

a b. *Ren dextera sinister b sub Arteria magna & Vena cava divisione.*

c. *Substantia glandulosa & adiposa, qua erat loco renis sinistri.*

d e. *Vena cava d. Arteria magna e.*

f g. *Vesica urinaria f. Testes g g.*

1 2. *Emulgens vena dextra gemina, quarum prima gemino est exortus.*

3. *Arteria emulgens dextra.*

4. *Emulgens vena sinistra.*

5. *Arteria emulgens sinistra.*

6 6. *Emulgentes vene due ad sinistrum renem.*

7 8. *Arteria emulgentes sub bifurcatione ad renem sinistrum.*

9. *Emulgens vena sinistra quarta.*

10. 10. *Spermatica vena dextra.*

11. 11. *Spermatica arteria exortus 11. conjunctio cum vena 12.*

13. *Spermatica vena sinistra.*

14. *Spermatica arteria sinistra.*

15. *Vena a spermatica sinistra ad peritoneum comite arteria.*

16. *Spermatica vena sinistra cum emulgente vena unio.*

17. *Vasa deferentia.*

18. *Ureteris dextri insertio.*

19. 20. *Ureteris sinistri ortus 19. Ejus implantatio 20.*

FIG. II. *Vasa seminaria cum testibus exhibet.*

u u u. *Ureteres.*

60. *Vena & arteria spermatica.*

11. *Tunica testis a peritoneo pronata.*

a. *Vena & arteria spermatica peritonei productionem ingredienti primum, deinde egre-*

dientia.

μ. *Varicosum corpus seu vena & arteria mirabilis implicatio.*

ν. *Sinister testis proxima tunica tectus.*

ξ ξ. *Vasorum semen deferentium revolutio.*

ο ε. *Vasis semen deferentis ascensus ad pubis os.*

π 5. *Vasorum deferentium a pubis ossa posteriorare flexus. (sculptor pro π. posuit π.)*

τ φ. *Ipsorum coitus & insertio in glandulas prostatas φ.*

χ. *Musculus testis.*

FIG. III. *Testium varias formas & partes ostendit.*

AB. *Testiculi dextri pars anterior.*

CCD. *Vena & arteria seminalis illic abtruncata ubi ex peritoneo excidit, & C. varicosi corporis initium, D. vero basin notat.*

E. F. *Deferentis vasis sursum conscendentis portio, & ipsius a tellere recessus.*

H. *Deferentis vasis seu Epididymidis superficies porosa, qua testis involucri connascitur.*

I. *Vasis ejusdem gibba pars, qua involucri non connascitur.*

L. M. *Testis pars anterior L. posterior M. cum intimo ejus involucri & varicoso corpore.*

NN *Vasorum spermaticorum prima commixtio.*

OO. *Varicosi corporis pyramidalis basis & in testis intimum involucri insertio.*

P. *Testis, intimo involucri adhuc obductus, superiorem regionem ostendens, in quam varicosum corpus inferebatur.*

Q. R. S. *Intima testis tunica juxta R. a teste detracta, sed ubi S. ipsi adhuc obducta.*

T. V V. *Testis per medium dissectus: vasorum per ipsius substantiam distributio V V.*

T A B.

LIBRI PRIMI

34

LIB I.

FIG. I.

TAB XXIV





FIG. III.

FIG. II.




G 2

TAB.

- TAB. XXV. *Musculos penis, ani & vesicæ.* item penis corpora tria demonstrat. FIG. I. & II. penem excoriatum coxæ adhuc adherentem FIG. III. eundem separatum cum vesicæ. FIG. IV. & V. penem absectum & transversim dissectum peculiariter autem in fig. V. Arteria per penis corpus distributa, monstratur. FIG. VI. penis canalem divisum ad vesicæ introitum. FIG. VII. vesicæ & penis anteriorem sedem, unâ cum vasis umbilicalibus. FIG. IIX. vesicam muliebrem cum vasis umbilicalibus & ureterum portione, exhibet. FIG. IX. penis corporum posteriorem faciem ostendit.
- AB. 1.2.3.4.5.7.9. Corpora duo penem constituentia.
- CC. 1.3. Exortus duorum penis corporum.
- D. 1.2.3.4.5.7.9. Glans penis.
- EE. 4.5. Corporum penis substantia fungosa & rubra.
- F. 4.5. Corporum penis mutuus connexus, & penis exterior substantia nervea, orbiculatim fungosam substantiam complectens.
- G. 1.2.4.5.7.9. Vesicæ meatus sive canalis communis peni subtensus.
- H. 1.1.2. Musculorum penis primum par in 1. Fig. adhuc adnatum, at in 2. à principio dependens.
- K. L. 1.2. Musculorum penis secundum par in Fig. 1. adnatum, in 2. ab insertione dependens.
- M. 1.2. Sphincter recti intestini.
- N. 3.7.8.9. Sphincter vesicæ & musculus orbicularis.
- OO 2. Membrana ossium pubis foramina occupans.
- P. 2. Ligamentum teres à coxa in femoris caput.
- Q. 3.7.8. Vesicæ corpus.
- R. 3.7. Prostata in quas semen elaboratum deferitur.
- SS. 3.8. Ureterum portiones.
- TT. 3. Vasorum semen deferentium portiones.
- VV. 7.8. Arteria umbilicales.
- X. 7.8. Ligamentum vesicæ Urachus dictus.
- Y. Z. 7.8. Umbilicus Y. vena umbilicalis Z.
- aa. 7. Vena & arteria penis.

LIBRI PRIMI.



G 3

TAB.

TAB. XXVI. Ventrem inferiorem mulieris, intestinis remotis, peritoneo & omento sursum reflexo, & mesenterio relicto exhibet: potissimum autem uteri & vesicæ situm naturalem ostendit.

ABCD. Peritonæi reflexi superficies interior.
EE. Mesenterii pars intestina tenuia dorso jungens.

FF. GG. Mesenterii membrana gemina nimirum F à G. divulsa: & inter eas Vasorum & Glandularum vasorum distributionibus interpositarum series.

HH. Mesenterii pars colon intestinum, quarecto intestino K. proximum, committens.

I. Mesenterii pars, qua colon intestinum cum ileo intestino continuabatur.

K. Rectum intestinum præsectum, & vinculo interceptum.

L. Uteri fundum integrum, à quo nihil avulsum.

M. Testis dexter, adhuc membrana seminaria

vasa deducente & à peritoneo nata, tectus.

N. Testis sinister illa membrana, quæ ei solum incumbit, detectus.

OO. QQ. Membrana à peritoneo pronata, testes cum vasis seminalibus & vasis uteri elatiorem sedē implicantibus dorso nec tens, utrumque pariter continens, & cum alterius lateris membrana, uteri secundam tunicam constituens.

PP. Carnea fibra in hanc membranam excurrentes, uteri musculum dextrum & sinistrum constituentes.

R. S. Cervix uteri inter R. & S. ea adhuc membrana obducta, qua peritoneo adnectunt.

T. Vesica posterior facies.


VX. Umbilicus cum parte venæ umbilicalis X. à peritoneo sectione liberata & cum vasis umbilicalibus deorsum reflexa.

Y. Vesicae ligamentum in brutis urachus.

ZZ. Arteriae duæ umbilicales, secundum vesicæ latera prorepentes.

LIB. I.

TABXXXVI




G 4

T A B.

- TAB. XXVII.** *Venter inferior, remotis mesenterio, intestinis, ventriculo, & nonnullis membranis, ostenditur, quo uterus, vesica, cateraq; instrumenta & vasa generationi inservientia, rectius conspiciantur. Mamilla item mulieris excoriata, exhibetur.*
- ABCD.** Peritoneum supra infraq; reflexum.
EF. Hepatus gibba **E** caua **FF.**
G. Vena porta caudex, hic praefectus.
HI. Venacava **H.** Arteria magna **I.**
K. Arteria Celiacæ, venam portæ comitantis radix.
LM. Vena adiposa ad renum tunicam.
NO. Renis utriusque facies anterior.
TV. Emulgentes vena & arteria, serosum sanguinem ad renes deducentes.
aab. Ureter dexter ad humiliora. à portione, quæ juxta **b** vesicæ adhuc adheret abscisus, quia vesicæ fundum in sinistrum latus retractum est.
c. Ureter sinister juxta **r.** vesicæ insertus.
dd. Vena spermatica dextrum testem **i.** adiens.
ee. Vena spermatica sinistrum testem **i.** petens.
f. Arteria magna truncus, unde arteria spermatica procedunt.
gh. Arteria spermatica, dextra & sinistra.
ii. Testis dexter & sinister.
ll. A vase spermatico ramus uteri fundum petens.
mm. Vas semen deferens. Tuba Fallopio.
n. Spermatici vasis ramus, vas deferens ambiens.
oo. Vas lumbrici instar ad uterum deductum nonnullis cremaster.
p. Uteri fundum.
q. Intestini recti portio.
rs. Vesicæ fundum, cui ureter sinister & vena à cervice uteri ducta juxta **r.** inseritur.
tu. Cervix vesicæ. juxta **u.** pudendo inserta.
x. Cervicis uteri pars supra pudendum.
yy. Pudendicarunculae cuticulares, in quarum mediorima, utrinque vero colles apparent. Mammillarum literæ.
ææ. Mammillarum venæ ab illis quæ cuti summo humero obductæ offeruntur.
ß. Mammillarum venæ ab illis, quæ per axillam in manum porriguntur pronatæ.
γ. Corpus mamillæ.
δδ. Glandula & pinguedo undiq; corpori mamillæ adstrata.
εε. Vasa mammaria à jugulo sub osse pectoris descendencia.

LIB. I.

TAB. XXVII.




H

TAB.

- TAB. XXIIX. FIG. I.** Uterum è corpore resectum cum adnatis vasis, testibus, vesica & membranis, & ceruice ejus sursum convoluta, quo fundi uteri orificium conspicitur vesicam item apertam, quo ejus cavitas & ureterum insertio patet, exhibet.
- A.** Uteri fundum nulla membrana detectum.
B B. Uteri cervix sursum eversa.
C D. Uteri fundi pars in star glandis penis, in cervicis uteri superiorem partem protuberans in cujus medio orificium conspicitur.
E E. Membrana uterum peritoneo connectens ipsiusq. vasa continens.
F. Testis sinister.
G. Vena & arteria spermatica.
H. Vasorum spermaticorum pars uteri fundi superiorem sedem petens.
I. Vasorum spermaticorum altera pars testem accedens.
***.** Vas semen deferens à teste in uterum.
K. Testis tunica cum vasorum implexu.
L. Vesica dissecta cavitas.
M. Ureterum in vesicam inserti.
N. Ureteres à renibus abscissi.
O. Cervicis vesica in pudendum insertio.
- FIG. II.** Uterum cum suis vasis à membranis & vesica liberum proponit.
- aa.** Spermatica vena & arteria.
bb. Rami à spermaticis peritoneo distributi.
cd. Uteri fundus c. ejus cervix d.
e. Vasa inferiorem uteri sedem & cervicem implicantia.
ff. Vasa uteri fundum petentia à vase spermatico producta.
gg. Vas semen deferens seu tuba.
hh. Spermatici vasis ramus tubam ambiens.
ii. Testes.
kk. Ligamenta uteri inferiora, nonnullis cremasteres uteri.
- I.** Pudendum, in quod cremasteres desinunt.
m. Cervicis vesica portio.
- FIG. III.** Uterum ab omnibus vasis spermaticis exceptis, liberum ostendit, ubi Tubae forma ommissa est.
- aa.** Vasa spermatica.
bb. Ramus à spermaticis ad uteri fundum.
cd. Uteri corpus seu fundum c. ipsius cervix d.
e. Vesica cervix in uteri collum desinens.
ff. Testes.
gg. Vasa deferentia seu jaculatoria.
hh. Horum vasorum divisio, quorum ramus alter in cornua **kk.**
ii. Ramus alter in cervicem desinens, beneficio cujus gravide semen ejaculantur.
kk. Cornua uteri.
- FIG. IV.** Uterum è corpore exsectum fundum per medium dissectum, & tunicarum in non pregnantibus crassitiem & rimam pudendi dilatatam exhibet.
- A B.** Sinus fundi uteri ad cujus latera cornua.
C D. Linca in star sutura sinum nonnihil distingens, & in uteri fundo sinum leviter protuberantem exhibens.
E E. Substantia fundi uteri, seu interioris tunice crassities.
F. Protuberantia uteri in sinu medio.
G. Orificium fundi uteri.
HH. Tunica seu secundum involucrum fundi uteri à peritoneo.
III. Membranarum à peritoneo pronatarum uterum alligantium portio.
KK. Cervicis uteri initium.
L. Vesica cervix, uteri cervici inserta, ac uterinam in illam projiciens.
m. Clitoris in summitate pudendi.
n. Pudendi inaequalitas, ubi hymen locatur.
o. Pudendi foramen in rima muliebri.
p. Caruncula cuticularis pudendi.

LIB. I.

TAB. XXIII.



H 2

TAB.

TAB. XXIX. FIG. I. Canis uterum exhibet, cum in canum sectionibus ob defectum cadaverum humanorum sese exercere soleant juvenes.

- A. Vena & arteria spermatica.
 - B. Vasorum spermaticorum portiones, ramos uteri sede superiore porrigentes.
 - C. Testis ac vas semen deferens.
 - DD. H. Membrana uterum peritonæo connectens.
 - E. Vena ac arteria uteri cervicem & humiliorum fundi partem implicantes.
 - F. Fundi uteri dextra pars exteriora tunica obducta.
 - G. Fundi uteri sinistra pars, media ex parte exteriora tunica liberata.
 - GH. Involucrum exterius G. interius H. notat.
 - I. Vas semen deferens sinistrum à teste liberatum.
 - K. Regioni fundi uteri orificium.
 - L. Cervix uteri, parte sinistra exteriora membrana detecta.
 - M. Cervicis vesicæ portio.
 - N. Cutis ad pudendum relicta.
- FIG II. Vacca uterum (cui ovis similis licet minor sit) propter cornua exhibet, cum in o-

vis pregnantis sectione juvenes exerceri soleant.

- A. Testis sinister.
 - B. Vas semen deferens in uteri cornua.
 - C. Sedes orificii fundi uteri.
 - D. Sedes, qua uterus bipartitur.
 - E. Uteri due partes arietis cornua referentes.
 - FF. G. Uteri tunica exterior F. interior G.
- FIG. III. Vacca secundinam exhibet.

- AA. Involucrum exterius fetus vacca.
- BB. Sedes, quibus involucrum exterius utero necitur vasaque admittit: ubi & carnea substantia, qua lienis substantia assimilatur.
- CC. Venarum concursus, uti & artieriarum per involucrum, hoc ad umbilicalium vasorum constitutionem.
- D. Sedes, ad quam venæ & arterie per involucrum exterius sparsæ magis colliguntur, & umbilicalibus vasis constituendis proxima sunt.

FIG. IV. Vacca secundinam ostendit.


- AA. Carnea substantia involucri exterioris superficiei obnata, qua transversim totum involucrum secus quam in homine cōplectitur.
- BB. Exterioris involucri sedes carnea substantia AA non obtecta, sed venulis & arteriis interstincta.

LIB. I.

TAB. XXIX.


FIG. I.

FIG. II.



III.

IV.



H 3

TAB.

TAB. XXX. Effigies gravida mulieris, cujus venter decussatim apertus est, ex quo omentum exemptum est, ut ventriculus, intestina & uterus melius conspiciantur.

ABC. Peritonæi pars interior,

EE. Hepatis convexa pars.

FF. Ventriculus.

GH. Coli intestini pars, quæ ventriculo subjicitur.

IK. Membrana, quibus uterus ossibus hæret.

L. Uterus ad umbilicum usq; ascendens.

MN. Tunica à peritonæo pronata, quæ testiculos, vasa & partem uteri anteriorem obvolvunt, & uteri tunicam externam constituunt.

O. Colli uteri anterior pars.


P. Vesicæ sedes.

Q. Urachus dictus, ligamentum vesicæ: alterum Q. abundat.

RR. Arteriæ umbilicales.

ST. Umbilicus S. Vena umbilicalis ab hepate absecta T.

T A B.



TAB. XXXI. FIG. I. Uterum gravida ad rectos angulos divisum, quo secundina adhærescens conspiciatur, exhibet.

ABCD. Uteri fundum in quatuor partes dissectum.

E. Cervicis uteri pars.

FF. Venæ & arteria cervicem uteri amplexantes.

G. Caro exteriori involucri adnata, seu uteri placenta, vel hepar uterinum ex congerie vasorum, quæ fœtus sanguinem per umbilicum ingerunt.

HH. Exterior fœtus involucri in utero, quod Allantoidem vocant.

FIG. II. Secundinas ab utero avulsas, quemadmodum FIG. III. involucri pro urina fœtus capiendâ proponit. At FIG. IV. Secundum Anatomicorum sententiam Allantoidem & Amnion aperta, cum fœtus naturali situ exhibet.

aa. 2. Vasa distributa.

KK. 2. Carnea placenta vel secunda.

LLL. 3. Involucri exterioris apertum, cui parte posteriore secunda coalescit, quod Allantoidem esse volum.

M. 3. Interior huius involucri superficies.

N. 3. Vasa ex hepate uterino producta fœtus umbilicum constituentia.

* Vasorum umbilicum constituentium insertio.

OO. 3. Interius involucri fœtus adhuc integrum, quod Amnion vocant.

P. 4. Allantoidis externa sedes P. interna

R. 4. Secunda seu placenta.

ST. 4. Vasorum series juxta T. in unum vas collecta.

VV. Amnii exterior sedes.

XX. Eiusdem interior sedes.

T. Vas umbilicale fœtus umbilico insertum.

Z. Fœtus uti in utero complicatus.

FIG. V. Ex sententia Vesalii involucri fœtus ostendit; in primis membranam vesicam, quæ fœtus urinam excipit.

A. Exterior involucri fœtus, secundum longitudinem dissectum.

B. Interius involucri, seu Amnion adhuc integrum.

C. Mollis admodum & tenuis membrana instar vesicæ ex meatu urinam per umbilicum efferente, expansa fœtus urinam dum in utero est, asseruans.


LIBRI PRIMI.

67

LIB. I.

TAB. XXXL.

FIG. I.



TAB.

TAB. XXXII. *Secundina cum vasis umbilicalibus in foetu humano delineantur.*

AAAA. 1. *Caro placentæ aut hepar uterinum vasis firmandis dicatum.*

BBB. 1. 2. *Amnios membrana (B. in 2. figura medio debet esse E.)*

CC. 1. *Vasa umbilicalia intestinulo tecta.*

D. 1. 2. *Vena umbilicalis & arteria duæ umbilicales.*

EE. 2. *Membrana chorion.*

FFF. 2. *Venarum & arteriarum rami per chorion sparsi.*

GG. 2. *Vasorum umbilici conjunctio, quatenus sua tunica, intestinulum aliquod referente, obvolvuntur.*

TAB.

LIB. I.

FIG. I.

TAB. XXXII





FIG. II.



I

TAB.

TAB. XXXIII. FIG. I. Fœtum DDD. Amnios tunica.

dierum quatuordecim, in quo partes
omnes delineate sunt, ostendit.

A. Fœtus.

BB. Vasa umbilicalia coeuntia.

CCC. Vasorum umbilicalium per cho-
rion divaricatio.

FIG. II. Fœtum abortivum exhi-
bet, qui vigesimo quinto die à conce-
ptione propter vasorum umbilicalium
ruptionem, sanguine privatus excidit:
cujus magnitudo vera exprimitur.

T A B.

LIB. I. TAB. XXXIII. FIG. I.





FIG. II.



TAB. XXXIV. FIG. I. *Intestini recti portionem cum suis musculis à corpore resectam exhibet, quam partem dum intestina eximimus in corpore relinquere solemus.*

A. *Intestini recti portio, cui vinculum injectum.*

BC. *Musculi duo, podicem post excretionem, sursum retrahentes.*

D. *Musculosa substantia penis radici adnata, in mulieribus ad infimam pudendi partem commissa: hinc etiam musculi duo penis pronascuntur.*

E. *Sphincter seu circularis ani musculus, podicem contingens, ne invitis excrementa excidant.*

FIG. II. *Lienis è corpore exempti varias ostendit facies. 1. quidem anteriorem, unà cum omenti portione & vasis. 2. Lienis cavam regionem. 3. eius gibbam partem. 4.*

Lienem cum sulcis, quos aliquando à costis habet 5. Lienis cavam dissectam exhibet.

A. *Lienis sinistrum latus, dextram enim ac mediam ejus sedem omentum integit.*

BB. *Omenti inferior membrana vasa deducens.*

CC. *Omenti superior membrana, qua vasa ad ventriculum perferuntur.*

DE. *Lienis superior D. inferior E. sedes.*

FG. *Dextrum & sinistrum lienis latus.*

HH. *Linea in cava lienis regione, cui vasa inferuntur.*

IK. *Lienis substantia dissecta ostenditur.*

LL. *Lienis gibbum cum sulcis, quos costae impressere.*


MM. *Lienis gibbum sine sulcis.*

N. *Vena & arterie in splenem.*

TAB.

LIB. I.


FIG. I.



3.



FIG. II.



4.



TAB. XXXIV.



5.



TAB. XXXV. Hepar cum suis venis exhibit. FIG. I. Hepatis gibbam & anteriorem partem. FIG. II. Hepatis gibbam & posteriorem sedem unâ cum Venâ cavâ caudicis portione. FIG. III. Venâ cavâ quâ portionem posteriori hepatis parti subientem, quâ longâ sectione divisa ac aperta est, ut propaginum foramina, quâ Venâ cavâ in hepar diffundit, ostendantur.

A A. 1. Hepatis anterior & gibba pars.

B 1. Vena umbilicalis.

C C. 2. Hepatis posterior & gibba pars.

D. 2. 3. Venâ cavâ sedes, quâ septum transversum permeat.

E E. 2. Venâ phrenicâ, quâ in septum distribuntur.

F G. 2. Hoc intervallo sedes notatur, quâ cavâ caudex posteriori hepatis sedi innascitur.

H. 2. Ligamentum præcipuum hepar septo alligans.

I. 2. Ligamentum hepatis partem sinistram septo connectens.

K. 2. Venâ portæ portio.

L. 2. Sinus hepatis ad sinistrum ventriculi orificium.

M N. 3. Venâ cavâ propagines ex hepate prodeuntes.

P P. 3. Venâ cavâ radices per hepar dispersæ.

FIG. IV. Radices venarum cavâ & portæ per hepar sparsas, earumque Anastomoses ex Archangeli Piccolhominei & Andreae Laurentii sententia exhibit.

A. Venâ cavâ truncus ab hepate sursum contendens.

B B. Venâ cavâ truncus à convexo hepatis emergens, deorsum contortus, omnes partes sub hepate pervadens.

C C C C. Venâ cavâ radices per hepatis substantiam.

D D D D. Radicum cavâ extremitates, quæ in medias radices venâ portæ penetrant.


E E. Venâ portæ truncus princeps.

F F. Venâ portæ radices sunt, quæ cum nigriores apparent, etiam per hepatis substantiam fusæ, quæ sub inferiore hepatis parte conveniunt, truncumq; constituunt.

G G G G. Radicum venâ portæ extremitates, quæ venâ cavâ radices medias subeunt.

LIB. I

TAB. XXXV.



K

TAB.

TAB. XXXVI. Venarum cavæ & portæ radices per hepatis parenchyma disseminatas, earundemq; anastomoses exhibet: item truncum venæ umbilicalis, portæ & cavæ, quemadmodum nunc ab annis triginta quatuor in nostris Anatomiis demonstrare consuevimus: singulis truncis ante hepatis coctionem & separationem bacillos indendo, quo vasa patentia & non corrugata demonstrari possint.

A. Venæ cavæ truncus, quæ diaphragma penetrat.

B. Diaphragmatis portio.

C C. Cavæ caudicis portio, quæ posteriori hepatis sedi adnascitur, hic notatur.

D D. Cavæ caudex, qui per infimum ventrem fertur, rematis propaginibus.

E E E E. Cavarum radices per parenchyma hepatis

dispersæ, omnes albæ.

F G. Umbilicalis vena extra hepar F. intra hepar G.

H H. Venæ portæ truncus extra hepar.

I I. Venæ portæ portio dextri lateris à portæ portione sinistri lateris divulsa, quæ rectius vasa demonstrantur, truncus vero portæ H H supra cavam deducitur, quod in figura non observatum fuit.

K K K K K K. Venæ portæ radices per hepar dispersæ.

L L L. Radicum portæ cum radicibus cavæ Anastomoses.

M. Anastomosis hæc canalem emulatur, & communem & continuum veluti ductum, qui stylum satis magnum admittit, à quo in omnes undique tam cavæ quam portæ fibras etiam minimas, vie patent.

T A B.

LIB. I.

TAB. XXXVI.



K 2

AB.

- TAB. XXXVII. FIG. I. *Ventrem inferiorem, in quo peritonæum cum omento ablatum, ventriculus cum intestinis in sinistrum latus depressus, ut mesenterij pars, ac in ipsum venæ portæ series conspiciatur: hepar sursum elevatum, quo ipsius cavum cum vesica biliaria fundo & vasis ad vesiculam & ab eadem ductus ad intestina appareant, exhibet.* FIG. II. *Vesiculam bilis, ejusdemq; meatus & vasa, ut communiter Anatomici proponunt, ostendit.*
- AA. 1. *Peritonæi una cum costis reflexi pars.*
 BBC. 1. *Hepatis cavum.*
 D. 1. *Gibbi hepatis sedis portiuncula.*
 E. 1. *Hepatis fissura pro venæ umbilicalis ingressu.*
 FF. 1. *Inæqualitates in hepatis cavo juxta venæ portæ exortum.*
 G. 1. *Ligamentum hepatis partem sinistram septo colligans.*
 H. . *Hepatis sinus ventriculo cedens.*
 IK. 1. *Ventriculus sinister sursum pressus.*
 L. 1. *Ventriculi orificium sinistrum cum vasis idamplexantibus.*
 M. 1. 2. *Ventriculi dextrum orificium seu pylorus duodeno junctus.*
 N. 2. *Duodenum intestinum pyloro junctum.*
 O. 1. *Nervus, jecoris cavo insertus, à nervo ventriculi orificium implicatibus.*
 P. 1. 2. *Vesicula bilis.*
- Q. 2. *Meatus vesiculae biliaris, inter portam & cavæ radices per hepar dispersa.*
 RS. 2. *vena porta R. vena cava S. radices per hepar.*
 a. 2. *Meatum bilis concursus in unum ramum.*
 b. 1. 2. *Cervix vesiculae, cui meatus insertitur.*
 c. 1. 2. *Meatus vesiculae in duodenum intestinum.*
 d. 2. *Duodenum apertum, quo meatus insertio pateat.*
 e. 2. *Arteria in jecoris cavam & vesiculam.*
 f. 2. *Nervulus jecoris & vesiculae, à sexti paris costaliramo.*
 gg. 2. *Vena cystica à porta.*
 i. 1. *Pancreas duodeno adnatum.*
 k lm. 1. *Mesenterium: at k. vena porta dextritrunci distributionem in mesenterium, denotat.*
 m. 1. *Mesenterij pars, cui coli dextra pars committitur.*
 n. 1. *Vena ad posteriorem sedem recti intestini porrecta.*
 o. 1. *Vesica urinaria fundi pars.*
 p. 1. *Ren dexter pingui membrana obductus.*
 q. 1. *Ureter dexter à rene ad vesicam.*
 r. 1. *Vena & arteria spermatica dextra.*
 s. 1. *Rami à dictis vasis ad peritonæum.*
 t. 1. *Vas semen deferens.*

LIBRI PRIMI.

79

LIB. I.

FIG. I. TAB. XXXVII





FIG. II.



K 3

TAB.

- TAB. XXXIIX. FIG. I. *Vesica biliaris ex hepate exempta naturalem situm, ejusdem formam & vasa proponit.* FIG. II. *vesicam bilariam hepati adhuc adnatam, sed apertam quo valvula conspiciantur, & etiam porum biliarium ex hepate in intestinum exhibet.*
- A. 1. *Vesica biliaris fundus in situ naturali.*
 B. 1. *Sinus ad cervicis vesicæ exortum, quo loci intrinsecus valvula situata.*
 C. 1. *Cervix vesiculæ.*
 D D D. *Meatus vesiculæ biliaris inter venæ portæ F. & cavæ G. radices per hepatis substantiam distributi.*
 E. 1. *Meatum vesiculæ concursus.*
 F. G. 1. *venæ portæ F. & venæ cavæ G. radices per hepar distributæ.*
 H. 1. *Porus biliaris, meatus latior quam sit cervix vesiculæ ex meatum concursu ortus.*
 II 1. *Meatus communis & pori biliarii H. & cervicis vesicæ G. usque ad intestinum.*
 K. 1. *ventriculi dextrum orificium intestino junctum.*
- LM. 1. *Duodenum intestinum apertum, ut meatus communis insertio ad M. pateat.*
 N. 1. *Arteria in hepatis cavitate & vesiculam dispersa.*
 O. 1. *Nervulus hepatis & ejus vesiculæ communis à sexto pari prodiens, qui nimis magnus sculptus est.*
 P P. 1. *Cysticæ gemellæ propagines à venæ portæ in vesiculam, sed longe tenuiores erant sculptendæ.*
 q q. 2. *Hepatis cava pars.*
 r. 2. *Vesiculæ fundum dissectum.*
 s. 2. *Vesiculæ exterior facies.*
 t. 2. *Vesiculæ sinus peculiaris.*
 u. 2. *Cervix vesiculæ.*
 x. 2. *valvula terna, aliquando tantum bina ad cervicem.*
 yy. 2. *Porus biliaris apertus, qui crassiorem bilem recta ab hepate ad intestinum deferret.*
 z. 2. *Cervicis vesiculæ & pori biliarii in unum meatum concursus.*
 a a. 2. *Meatus ex vesiculæ fundo, tenuiorem bilem in vesiculam deferentes.*

LIB. I.

TAB. XXXIIX.

FIG. I.





FIG. II.



K 4

TAB.

TAB. XXXIX. Ventriculū cum œsophago proponit. FIG. I. utriusq. anteriorem faciem cum vasis illi insertis. FIG. II. posteriorem sedem exhibet. FIG. III. ventriculi tunicas & fibras. FIG. IV. ventriculū inversum ostendit.

A. 1. 2. Oesophagi à faucibus præsecti orificium.

B. 1. 2. Oesophagi rectus inaccessus ab A. ad B.

C. 1. 2. Oesophagi supra quintam thoracis vertebra à B. ad C. dextrorsum inclinatio in 1. at in 2. sinistrorsum.

D. 1. 2. Ejus ad sinistram inclinatio à C. ad D. in 1. at in 2. dextrorsum.

E. 1. 2. Tonsilla duæ in faucibus œsophago adpositæ.

F. 1. 2. Glandosum corpus in medio ductu ad quintam thoracis vertebra, œsophago subiectum.

G. 1. 2. Oesophagicum ventriculo connexus, ubi ventriculi orificium superius constituitur.

H. 1. 2. Ventriculi orificium secundum seu Pylorus.

I. K. 1. 2. Ventriculi pars superior I. inferior K.

L. L. 1. Ventriculi anterior sedes.

M. N. O. 2. Ventriculi posterior sedes: at M. prominentior sinistra N. dextra partis, O. verò impressionem ventriculi, qua vertebris innititur, notat.

P. 1. 2. Duodenum intestinum.

Q. R. 2. Mentus vesicula bilis in duodenum ad R.

S. 2. Glandulosum corpus duodeno subnatum, vasa illius fulciens.

TV. 1. 2. Nervus dexter & sinister sexti paris, œsophagum & ventriculi sinistrum orificium amplexans.

XY. 2. Nervus sinister ventriculi superiora perreptans, & ad jecur usque excurrents,

a. 2. Gastrica dextra seu prima ventriculi vena, à trunco porta, & arteria à trunco calia- co, ad pylorum.

b. 1. 2. Gastroepiplois dextra vel secunda vena cum arteria & nervo ad ventriculi fundi dextram regionem.

c. 2. Gastrica minor seu tertia ventriculi vena, conjuge à ramo splenico arteria carens.

ddd. 1. 2. Coronaria stomachica, vel quarta vena cum arteria, orificium sinistram cingens, ramus Gastrica majoris.

e. 1. Rami secundum elatiorem sedem ventriculi à ramo d. ad pylorum contententes cum arteria.

f. 1. 2. Gastrica major: seu quinta vena cum arteria & nervo ventriculi fundi partem sinistram perreptans, à ramo splenico derivata.

g. 1. 2. Vasa ab illis, quæ lienem petunt.

h. h. 3. Tunica prima & extrema à peritoneo.

i. 3. Tunica secunda ventriculi, ab ipso minis atque prior divulsa.

k. 3. Prima & intima tunica à duabus exterioribus hac parte libera.

l. 4. Sinistri orificii extuberantia circularis introrsum vergens, ubi œsophagus ventriculo continuatur.

m. 4. Dextri orificii extuberantia orbicularis, seu pylori circulus.

n. 4. Ventriculi superficies interior.

T A B.

LIB I.

TAB XXXIX.

FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.




FIG. IV.



L

TAB.

- TAB. XL. FIG. I. *Ossum infimi ventris anteriorem.* FIG. II. *posteriorem partem (cum sibi invicem corresponsdeant) proponit.* FIG. III. IV. & V. *unam ex quinque lumborum vertebrais, tertia quidem ejus anteriorem: quarta posteriorem: quinta vero lateralem faciem exhibet.*
- a. 2. *Ultima thoracis vertebra.*
b. ad c. 1. 2. *Lumborum vel renum vertebra quinque.*
c. ad d. 1. 2. *Os sacrum, latum.*
d. 1. 2. *Coccygis vel caudæ os.*
e e f. 2. *Processus laterales e e. processus posterior vel spina f.*
g h. 2. *Processus superior g. inferior h.*
i i. 1. 2. *Coxæ ossis eminentior pars.*
k. 2. *Infimus processus coxæ.*
l l. 1. 2. *Sinus in inferiore ejus ossis parte.*
m m. 1. 2. *Os ilium seu lumbare.*
n n. 1. 2. *Coxendicis os seu coxæ.*
- o. 2. *Angulosa extremitas ossis coxendicis.*
pp. 1. 2. *Pectinis & pubis os.*
qq. 1. *Pubis ossis foramen.*
A A. 2. 4. 5. *Appendix superior corporis vertebrae.*
B. 3. 5. *Appendix inferior.*
C. 3. 4. 5. *Spina lumborum vertebra superior pars seu lata aspera g. linea.*
D. 5. *Spina hujus inferior sedes, seu linea inferior.*
E. 5. *Sinus ad latum linea D. consistens.*
F G. 4. 5. *Appendix spinae triangulum referens.*
H. 3. 4. 5. *Transversus alterius lateris processus.*
I. 4. 5. *Processus ascendens dexter.*
K. 4. 5. *Sinus processus ascendentis sinistri.*
L M. 2. 5. *Supercilia hujus sinus anteriore & posteriore loco.*
N. 4. *Processus descendens alterius lateris.*
O. 4. 5. *Caput illius processus descendentis.*

T A B.

LIB. I.

TABXXXX.

FIG. I.

FIG. II.



IV

III

V



L 2

T A B.


- TAB. XLI. FIG. VI. Sacri osi cum coccyge anterior. FIG. VII. posterior facies. FIG. IIX. Coccyx viri antrorsum curvatus. FIG. IX. Coccyx mulieris retrorsum curvatus. FIG. X. Osi sacri & coccygis simia anteriorem refert partem. FIG. XI. Eorundem posteriorem.
- A. ad F. 6. Osi sacri partes sex, quinta lumborum vertebra supposita.
- ad G. ad K. 6. 8. Coccygis ossa 4. osi sacro adhaerentia.
- LL. 6. 7. Osi sacri secundi processus transversus amplius, reliquis ad R. usque sensim angustatis.
- M. 7. Osi sacri sinus inaequalis, cui os ilium dextrum jungitur.
- N. 7. Sinus huius exterior sedes planior.
- O. 7. Tuberculum longum sinum hunc anteriorem ab inferiore Φ . notato distinguens.
- Φ . 7. Huius sinus, superior & inferior sedes.
- R. 6. 7. Processus transversus extuberantia, cui ligamenta junguntur.
- S. 6. 7. Processus ascendens primi osi.
- T. 7. Sinus huius processus, capitulum processus descendens quinta lumborum vertebra, excipiens.
- VX. 7. Supercilia huius sinus utriusque.
- T. 7. Processuum descendendum primi osi cum processibus ascendentibus secundi osi connexio.
- Z. 6. 7. Processuum transversorum primi & secundi osi coalitus.
- a. 6. 7. Sacri osi cum Coccyge connexus.
- b b. 6. 7. 8. Ligamentum cartilagineum osium Coccygis laxum connexum intercedens.
- c. 7. C. 8. Cartilago Coccygis ossa mucroni adnata.
- d d d. 7. Spina osi sacri.
- e f g. h. i. k. 7. Foramina inter spinarum intervalla pro spinalis medullae transitu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. in fig. 6. & 7. Foramina, per quae osi sacri transeunt nervi.
- FIG. XII. Coxendicis osi pars anterior, quae doxtro sacri osi lateri committitur. FIG. XIII. Coxendicis interior, quemadmodum FIG. XIV. exterior sedes. FIG. XV. Cartilago pubis osi commissuram in viro, at FIG. XVI. in muliere intercedens proponitur.
- Coxa osi pars supra T. ad f. in 13. & 14. & ilium os distat: quod vero infra est ad R. usque & Φ . coxendicis est: reliqua quae super est, pubis os dicitur.
- ABCDD. 13. Ilii osi anterior facies, quae osi sacro jungitur, tubere CC. in duos sinus ABDD. distincta.
- EEG. 13. Ilii sedes posterior ab osse sacro dehiscens, quae à cartilagine repletur.
- H. 13. 14. Posterioris sedis pars extra osi sacri processum educta.
- KK. 13. Impressio in Ilii parte interna pro exortu musculi quinti dorfi.
- L. 12. 13. Ilii osi appendicis latus internum.
- M. 12. N. 13. 14. Appendicis anterior finis M. posterior vero N.
- OO. 12. 14. Appendicis huius latus externum.
- P. Q. R. 13. Tuber, à quo femoris musculus decimus prodit.
- s. 13. Amplitudo hac femoris musculo septimo principium praeber.
- S. 12. 13. 14. Sinus coxendicis elatior, super quem femoris musculus sextus & septimus cum nervo feruntur.
- T. 12. 13. 14. Tuber elatius super hunc sinum.
- V. 12. 13. 14. Tuber alterum humilius.
- XYX. 14. Linea obscura in dorso osi Ilii X. altera ibidem YY.
- T. 12. 13. Sinus pubis osi superior.
- ab c. 12. 14. Coxendicis acetabulum femoris caput admittens, cuius sedes altius cavata c.
- d. 14. Sinus, quo acetabulum incisum est.
- e. 12. 14. Supercilium acetabuli.
- f. 13. 14. Sinus coxendicis pro nervi quarti cruris transitu.
- g. 13. 14. Processus acutus coxendicis.
- h. 12. 13. 14. Sinus, ad quem femoris musculus 10. reflectitur.
- i. 12. 14. Appendix osi coxendicis.
- k l m n. 14. In hac appendice impressiones variae.
- o. 14. Appendix posterior terminus.
- p. 12. P. 14. Pubis osis asperitas, cui cartilago adnascitur.
- q. 12. 13. 14. Pubis osis foramen.
- f. 12. 13. 14. Sinus supra pubis osis foramen.
- t. 12. 13. 14. Processus humilior osis pubis.

LIB. I.

TAB. XXXXI.

FIG. VI.

VII.



K 3

TAT.



LIBRI SECUNDI TABULÆ.



TABULA I. Exhibet corpus, quale relinquitur, ubi viscera omnia ex infimo ventre remota sunt: quod in posteriora reclinatum, quo diaphragma-

tus situs commodius videatur: alteram etiam Thoracis partem adhuc intactam ostendit.

- a. Diaphragma in sua sede.
- e. Arteriae magna dissecta foramen.
- hi. Diaphragmatis duo carnosus exortus, aliis tendines.
- k. Diaphragmatis diviso arteriam transmittens.
- l. Ejus foramen sinistrum aërophago viam præbens.
- m. Diaphragmatis foramen pro vena cava ascendens.

n.o. Venaphrenica n. arteriaphrenica o.
pp. Femoris musculorum sextum par, quas
Jous vocant.

qq. Femoris musculorum septimum par illi
cavitatem implens.

r. Dorsi musculus quintus.

s. Os sacrum cum nervis aliquot ex ipsius medulla.

t u. Os pectoris t. Cartilago ensiformis u.

xx. Costæ. yy. Intercostales musculi.

AB. Pectoralis musculus seu brachii primus in
sua sede A. Idem usq. ad implantationem se-
paratus B.

CC. Serratus major, thoracis musculus secundus.

D. Serratus minor seu scapulae primus.


E. Deltois seu Epomis, brachii secundus musculus ejus exortus ad t.

F. Clavicula.

T A B.

LIB. II.

TAB. I.



L 4 TAB.

TAB. II. Figuras habet undecim: harum quatuor claviculam, 1. anteriorem: 2. posteriorem: 3. inferiorem ejus partem: 4. mulieris, quæ magis quam in viris recta est: 5. cartilagine binas utrinque clavicula articulis interpositas: 6. sterni partem anteriorem: 7. ejusdem posteriorem: 8. mulieris sterni anteriorem partem cum foramine ostendit.

A. 1. 2. 3. Clavicula capitulum sterno articulat.

B. 1. Angulus hujus capituli primus.

C D. 1. 2. 3. Angulus secundus & tertius.

E. 1. 3. Clavicula anterior linea eminentior.

F G. 2. 3. Linea inferior, quæ juxta G. aspera est.

H. 1. 2. 3. Clavicula medium tres.

I. 1. 2. Exterior pars latior & curva.

K. 1. Asperitas in hac sede.

L M N. 3. Clavicule inferior sedes sinuata & aspera, & circa N. oritur ligamentum, quod in scapula processum interiorem insiguitur.

O. 2. 3. Clavicule tuber sterno oppositus.

P. 3. Asperitas inferior interioris sedis.

Q. 1. 2. 3. Capitulum planum, quo scapule jungitur.

R. 4. Clavicula mulieris.

S I. 5. Cartilago, clavicula cum scapula articulum intercedens S. cartilago altera articuli cum sterno T.

a. 6. Sterni ossis primi extuberantia.

b c. 6. Impressio utring, ad extuberantia latera.

d. 7. Sterni sedes posterior cavata.

e f. 6. Sinus claviculas admittens.

g. 6. 7. Sinus, cui costa prima articulatur.

h. 6. 7. Ossis primi cum secundo articulatio.

i. 6. 7. Sinus, cui costa 2. jungitur.

k l m n o. 6. 7. Sinus alii, quibus costa sequentes quinq; articulantur.

p q r. 6. Linea, quæ post ossi coalitum remansere. st. 6. 7. Sterni ostertium s. cum cartilagine t. u. 8. Foramen ad cordis figuram efformatum.

FIG. IX. Thoracis ossium partem anteriorem X. posteriorem. XI. Costam veram confractam. XII. Costa duodecima confracta partem posteriorem exhibet.

à char. 1. ad char. 12. in 9. & 10. figura costas duodecim ostendit: septem superiores veras, quinque inferiores nothas.

A B. 9. Costarum cum suis cartilaginibus coalitus.

C D. 9. Costarum cartilaginum cum sterno articulatio.

E. 9. Cartilaginis capitulum obtusum.

F F. 9. Costarum spuriarum cartilagine acute.

g h i. 9. Sternum in medio costarum g. surcula superior.

G H. 9. Costa undecima intervallum, quo nonnunquam cartilago à vicinis debiscit: 12 vero semper.

I I. 9. Cartilaginum in aequalis extuberantia.

K. 9. Cartilago ensiformis.

K. 11. Sinus in costa inferiore parte in longum deductus.

L M. 11. Capitulum, quo costa vertebra articulatur L. capitulum, quo transverso processui jungitur M.

N. 12. Capitulum obtusum costa undecima & duodecima.

O. 11. 12. Tuberculum, cui musculus dorsi 11. inferitur.

P. 11. Asperitas inter duo capitula ligamentum producens.

Q. 11. Asperitas cum levi extuberantia, cui musculus thoracis sacro lumbus dictus implanatur.


R. 11. Costa fracta fungosa substantia.

T A B.

LIB. II.

TAB. II.

FIG. I.



M

TAB.

TAB. III. FIG. I. *Medium ventrem cutis & musculis resectis, sterno remoto & costis effractis ex sinistro latere exhibet, quo thoracis amplitudo, ipsius membrana & pulmo conspiciantur.*

A. *Cartilagine costarum sinistri lateris retracta.*

B B. *Costa ossea à cartilagine divisa.*

CC. DD. *Musculi intercostales ossium intervalla CC. cartilaginum intervalla DD. opplentes.*

E. *Clavicula in sua sede detecta.*

Ee. *Vasorum axillam perreptantium series.*

G. *Jugularis exterior, hic statim cutim separantibus occurrens.*

HH. *Mediastinum sive membrana thoracis amplitudinem dividens.*

II. *Septi transversae superficies.*

K. *Mediastini cum septo connexus.*

L. *Protuberans hac sedes cordis causa adeò prominens.*

MN. *Vena & arteria mammaria sinistra sub sterno descendens.*

OO. *Ramuli vasorum M. ad mediastinum.*

PP. *Nervus diaphragmaticus mediastino suffultus.*

Q. *Vena, quae à jugulo cum nervo ad septum transversum descendit, & mediastino ramulos largitur.*

RSTV. *Pulmonis pars, sinistram cavitatem occupans & RT. lobum superiorem, SV. inferiorem notat.*

TAB. II. *Diaphragma seu septum transversum exemptum.*

abcc d. *Septum a. ejus nervosa pars bcc d.*


fg hi. *Ejus carnosae pars fg. duo exortus carnosae hi.*

k. *Septi divisio, arteriam magnam transmittens.*

l. *Ejus foramen sinistrum, oesophago viam praebens.*

m. *Foramen dextrum, pro vena cava ascensu.*

LIB. II.
FIG. I.



TAB. III.
FIG. II.



M 2

7 A B.

TAB. IV. *Medium ventrem exhibet anteri-
us & ad latera cute & musculis denuda-
tum: sterno cum costarum cartilaginibus ab
ossibus & mediastino liberatis, sursumq; re-
flexis, ipsisq; ossibus extrorsum refractis, ut
ea, quae thorax in se continet, conspiciantur.*
AAA. *Sterni & cartilaginum costarum con-
nexarum sedes interna.*
BC. *Vene mammae, sub sterno ad rectos
musculos descendentes.*
DE. *Arteria mammae descendentes usq; ad
umbilicum.*
F. *Glandula in jugulo vasorum distributioni
praefecta.*
GG. HH. *Mediastini dextra & sinistra sedes,
qua ante divisionem adnata erat sterno.*

I. K. *Dextra & sinistra superficies pulmonem
spectans.*
LL. *Intervallum inter utramque mediastini
membranam.*
MM. *Protuberans haec regio situm cordis si-
nistrae partis ostendit, in eam enim apex
vergit.*
N O. *Pulmonis dexter lobus elatior N. humi-
lior O.*
P Q. *Pulmonis sinistri lobus superior P. infe-
rior Q.*
RR. *Septum transversum à sterno & cartila-
ginum mucronibus quibus adnascitur libe-
rum.*
S. *Cartilago ensiformis, vel mucronata.*
TV. *Cutis ab anteriore thoracis parte deor-
sum tracta.*


TAB.

LIBRI SECVNDI.

91

LIB. II.

TAB. IV.



M 3

T A B.

TAB. V. FIG. I. Cor pericardio inclusum una cum pulmone & septi transversae portione, cui pericardium connatum, ostendit, una cum portione vasorum quanta cordis involucro obducitur.

- A. Vena cava ascendens portio.
 a. Arteria magna portio.
 B. Pericardii initium, vena cava & arteriose, & arteria magna pertinacissime adherens.
 C. Pericardii venula.
 DEF. Pericardii anterior sedes, & basis cordis figuram referens, D E. & mucro F. notat.
 ab F. ad G. Pericardii connexus cum septo transverso in hominibus.
 H. Septi transversae pars ejus nervi II.
 II. Septi transversae, à medulla spina cervicis prodeuntes.

LMNO. Pulmonis quatuor lobi seu fibrae.

FIG. II Pericardium divisum, cor ejusque vascula parte anteriore exhibet.

- A. Sedes, qua pericardium vasis cordis continuatur.
 BB. Pericardium à cordis anteriore sede in latera reflexum.
 CDE. Cordis pars anterior, cujus basin CD. mucronem E. notat.
 FG. Vena cava F. vena arteriosa G.
 H. Arteria magna: at arteria venosa non nisi corde in dextrum latus reflexo, conspici potest.
 IK. Auricula cordis dextra I. sinistra apex K.
 LL. Vena & arteria coronaria cordis, & rami ab his vasis prognati.
 MNOP. Pulmonis lobi quatuor.
 Q. Septi transversae pars.

TAB.

LIB. II. FIG. I. TABV.





FIG. II.



M 4 TAB.

TAB. VI. FIG. I. *Vena cava in jugulo divisionem exhibet: à dextris quidem eo modo, quo vulgo creditum fuit in duos truncos, subclavium unum, & alterum superclavium dividi: unde scrupulosus ille Cephalica in capitis affectibus, vel Basilica, in affectibus subclaviculari, vel delectus A sinistris, unus truncus, ex quo utraque brachii vena prodeat, quemadmodum revera occurrit, proponitur.*

AA. Vena cava truncus à corde ad jugulum.

B. Coronaria vena cordis.

C. Vena azygos sive sine pari.

ddd. Vena dictæ ramis seu intercostales inferiores.

D. Cava in jugulo divisio.

EE. Vena mammaria, utrinque à vena cava ramis prodeunt.

F. Intercostalis superior.

GHI. Subclavia, ex qua cephalica HH. & hepatica II.

KKLL. Jugularis interna KK. externa LL.

M. Subclavia, ex qua hepatica dextra Q.

N. Superclavia ex qua cephalica dextra P.

OO. Cervicalis.

P. Cephalica.

Q. Hepatica sive basilica.

FIG. II. *Vena cava à dextro cordis sinu ad jugulum usq. conscendentis, portionem ad fibrarum naturam in venarum corpore ostendendam proponit.*

AA. Vena cava truncus.

B. Vena azygos.

C. Cava in jugulo divisio utrinque in duos ramos, ut vulgo creditur.

DD. Subclavii ram. EE. Superclavii.

FFGG. Jugulares externæ F. internæ G.

FIG. III. *Fibrarum rudem delineationem proponit.*

ABC. Transversas A. obliquarum utriusque generis BC.

DE. Rectas D. at E. triplicis fibrarum generis implexum exprimit.

FIG. IV. *Vena azygos distributionem ostendit, de qua plenius tab. 8.*

A. Caudicis vena cava portio.

B. Vena azygos exortus.

O. Ejus divisio ad septimam vel octavam costam.

DDDD. Intercostales vena dextra & sinistra.

TAB. VII. *Vena cava truncum & ramos,*
prout per tres ventres diffeminatur, propo-
nit.

A. *Vena cava truncus infra hepar.*

aa. *Radices cavae ex hepate prodeuntes, trun-*
cumq; ejus constituentes.

ß. *Alia radix à sima hepatis parte surgens.*

B. *Cava sedes inter hepar & septum transver-*
sum.

C. *Phrenica, quæ ad septum transversum.*

D. *Orificium quo cava cordi connascitur.*

E. *Coronalia cordis.*

FF. *Vena azygos truncus.*

GG. *Intercostales vena à prædicto trunco, at*
sculptor à dextris non recte eas produxit, sed
quasi distinctæ forent vena à cava trunco
prodeuntes, ab iis quæ à vena sine pari scul-
pfit.

H. *Trunci cavae juxta jugulum bipartitio.*

II. *Vena subclavia ad brachium tendens.*

K. *Intercostalis superior.*

LL M. *Mammaria descendens L. Mamma-*
ria descendens M. cum Epigastrica i. con-
junctio.

NN. *Cervicalis.*

O. *Muscula.*

PP *Thoracica superior.*

Q. *Scapularis gemina.*

RR. *Thoracica inferior.*

SS TT. *Jugulares interna S. externa T.*

V. *Externa sub auris radice bipartito divisa.*

xy. *Interior ramus x. exterior y.*

z. *Faciei exporrectus ramus.*

c. *Frontis vena.*

a. *Tempora perreptans ramus.*

* *Occiput accedens propago.*

aa. *Vena cephalica velexterna brachii.*

bb. *Muscula superior.*

dd. *Humeri summum petens vena aliquando*
gemina.

mm. *Basilica vena*

z. *Vena cava truncus sub hepate.*

nn. *Adiposa dextra n. sinistra n.*

th. *Emulgens utraque.*

λλ μμ. *Spermatica dextra & sinistra.*

v. *Varicosi vas initium.*

ξ. *Lumbares.*

o. *Vena cava bifurcatio in iliacos.*

π. *Muscula superior.*

ρς. *Iliaci sinistri diviso in ramum interiorem*
& exteriorem s.

τ. *Muscula media per musculos coxae & cutim.*

φ. *Sacra vena, ad os sacrum delata.*

ψ. *Hypogastrica interioris rami s. propago ad*
vesicam & uterum.

ω. *Vena ex ramo externo s. quæ ramulis vena*
interna jungitur, non procul ab ossis pubis
foramine.

Γ. *Epigastrica, exterior rami s. propago sursum*
lata

Δ. *Pudenda, interior rami s. propago ad geni-*
talia.

Θ. *Cutanea cruris vena prima usq; ad digitos*
pedis.

Α. *Inguinum sedi oblati ramus.*

Ξ. *Femoris cutim perreptans ramus.*

Ω. *Muscula inferior coxendicis articuli sedem*
perreptans.

1. *Vena ad 7. & 9. musculum tibiae.*


2. *Vena ad 5. musculum femoris.*

LIBRI SECUNDE

101

LIB. II.

TAB. VII



N 2


TAB.

- TAB. IIX. *Et si venæ cava truncum per utrumque ventrem disseminatum proponat, appositatamen fuit propter venæ azygos distributionem, & ramorum huius cum thoracica venarum conjunctionem, quæ hic à dextris tantum ostenditur.*
- aa. Venæ cava à jugulo ad os sacrum.
bb. Venæ cava in Iliacos ramos divisio.
cc. Cava divisio in jugulo, utrinque in subclavium.
dd. Truncus venæ azygos, qui in propaginem venæ cavae * inditur.
ee. Ramus sinister à venâ sine pari, qui in emulgentem f. inseritur.
gg. Renes, quorum dexter inferior, sinister altior.
hh. Ureteres.
i. Intercostalis superior sinistra.
l. Venam mammariam dextram descendens.
- mn. Venæ jugularis interna m. externa n.
o. Venamuscule ad musculos cervicis.
p. Trunci subclavii in Cephalicam & Basilicam divisio.
qq. Venæ Cephalica seu humeraria.
rr. Venæ Basilica quibusdam axillaris.
st. Venæ thoracica superior s. inferior ad externos thoracis musculos tt.
u. Venæ cephalicæ ramus, antequam sub humerum abeat ad musculos brachium elevantes & cutim.
xxx. Venæ in thorace ab azygo, quæ uniuntur cum extrinsecis à thoracica exteriori (quæ à Basilica oritur) promanantibus.
yyy. Venæ extrinsecæ thoracis, quæ cum ramis venæ sine pari intrinsecis uniuntur.
z. Basilicæ ramus, qui cū cephalica A jungitur.
A. Cephalicæ ramus, qui cū Basilica Z. iungitur.
B. Mediana dicta venæ.

TAB.

LIB. II.

TAB VIII



N 3

TAB.

TAB. IX. FIG. I. Cerebrum, cerebellum cum nervis (ut vulgo creditur) ab iis prodeuntibus, exhibet: quapropter nervorum sexti paris, per utrumq; ventrem distributionem, adposita est.

- AB. Cerebrum A. Cerebellum B.
 C. Processus seu tubera cerebri, sed non mamillares.
 DD. Dorsalis medulla cranio excidens.
 E. Processus mamillaris, olfactus instrumentum.
 F. Nervus opticus, seu primum cerebri par.
 G. Oculi tunica, in quam nervus expanditur.
 H. Nervus motorius oculi: seu 2. par.
 I. Tertia conjugatio seu tertii paris nervorum durior, & minor ramus antrosum delatus.
 K. Quarta conjugatio, seu 3. paris nervus major acرافior, deorsum vergens.
 L. Nervi I. propago frontem accedens.
 M. Nervi I. propago maxillam superiorem petens.
 NN. Narium tunica: in textu nervus à ramo I.
 O. Temporalis musculi nervus à ramo I.
 P. Nervus contortus à nervis k. & b.
 Q. Nervus ad dentium superiorum alveolos à ramo K.
 R. Maxillam inferiorem perreptans à nervo K.
 S. Labro inferiori oblata sboles rami R.
 TT. Dentes inferiores accedentes furculi à ramo R.
 VV. In lingua tunica diffusus ramus nervi K.
 XX. Nervorum par. quartum in palati tunica.
 Y. Nervorum par. ipsius auditus.
 a. Auris membranula ad quam 5. nervus abit.
 bc. Ramuli duo quinti paris cum nervo P. coeuntes.
 d. Octava conjugatio, seu quinti paris nervus faciem accedens.
 ee. Sextum nervorum par.
 f. Cervicis musculos petens ramus, à nervo e.
 g. Ramuli ad laryngem.
 h. Bifurcatio nervi in duos ramos.
 iii. Interior ramus: vertebrae attensus intercostales roborans, qui intercostalis dicitur.
 kk. Exterior ramus furculi in musculorum capita ad os pectotis & claviculas.
 lm. Dextri nervi ramuli l. recurrentem nervum dextrum m. constituentes.
 n. Recurrentium insertio ad laryngis musculos.
 op. Nervi sinistri ramuli o. recurrentem sinistram p. constituentes.
 qq. Pulmonis tunica ramuli à 6. pari.


- r. Pericardii & cordis nervuli, & ad pulmonis tunicam.
 s. Stomacho commisi nervi utriusq; lateris.
 tuu. Stomachicus dexter in sinistram ventriculi orificium t. stomachicus sinister in dextram ventriculi orificium uu.
 x. Hepatis cavum subiens nervus à ramo u.
 yz. Omenti dextri y. Coli intestini z.
 α. Intestinum duodenum, & jejuni initium petens nervus.
 β. Ventriculi fundi dextri nervus.
 γ. Hepatis & vesiculae bilis nervus.
 δ. Renem dextrum accedens nervus.
 ε. Mesenterium & intestina petens ramus.
 ζ. Vesica dextram partem implicans ramus.
 η. Omenti sinistram partem pervadens ramus.
 θ i. Colo & omento derivata sboles.
 x. Lienis inserti ramuli.
 λλ. Ventriculi fundi sinistri nervus.
 M. (Pestum pro μ.) Mesenterii sinistri & intestinorum ramus.
 ν. Renem sinistram accedens propago.
 ξ. Vesica sinistram latius perreptantes.
 o. Septimum nervorum par.
 π. Ramulus à 7. pari ad musculos à styloide pronatos.
 ρ. Propago 7. paris ad musculos linguae hyodii & laryngis.
 σ. Sexti & septimi paris in unum nervum coitus.
 FIG. II. Recurrentes nervos exhibet, una cum Arteria magna, & arteria aspera portione.
 A. Arteria magna orificium à corde abscissum.
 aa. Coronales arteria.
 BCD. Arteria magna diviso in duos truncos descendentem C. & ascendentem D.
 EF. Axillaris sinistra E. dextra F.
 GH. Carotis dextra G. sinistra H.
 IKL. Aspera arteriae caudex I. diviso KL.
 MNN. Aspera arteria caput seu larynx M. glandula ad ejus radicem NN.
 OO. Dexter & sinister nervus.
 P. Revolutio ramulorum nervi dextri ad axillarem dextram arteriam.
 QQ. Recurrens nervus dexter.
 R. Revolutio ramulorum nervi sinistri ad arteriam magnam truncum descendentem.
 SS. Recurrens nervus sinister.

TAB.

LIB. II.

TAB. IX.

FIG. I.



N 4

TAB

TAB. X. FIG. I. Cordis dextrum latus à pericardio penitus liberum, & in sinistrum latus reflexum, una cum pulmonibus exhibet, ut vena cava continuas ad cordis basim conspiciatur, una cum vasis & diaphragmatis parte.

A. Cordis dextrum, & magna posterioris sedis regio.

B. Auricula dextra.

C. Vena cava inter cor debiscens, unde ortum ducere Aristoteles voluit.

D. Ostendit locum transitus vena cava per diaphragma.

E. Diaphragmatis pars.

F. Vena cava ad jugulum tendens.

G. Vena azygos initium.

H. I. Arteria magna truncus H. descendens I.

K. Nervus sextiparis portio, unde cor nervulum acquirit.

L M N O. Pulmonis quatuor lobi.

P. Vasorum pulmonem advenientium series.

FIG. II. Cor in dextrum latus convolutum proponit, quo sinistrum ipsius latus, & Arteria venalis cum ipsius nervo conspiciatur.

A B C. Cordis sinistrum latus & posterioris sedis magna regio.

D. Vasa cordis basim cingentia.

F. Auricula sinistra.

G H. Arteria venalis, ejus distributio in pulmonem sinistrum, sed non rectè expressa.

I K L. Vena arterio a I. ejus ramus ad sinistrum pulmonem K. ad dextrum L.

M. Auricula dextra apex.

NN Vena cava.

O. Arteria magna caudex.

P R S. Truncus descendens P. ascendens R S.

Q T. Axillaris arteria sinistra Q. dextra T.

V X. Carotides seu triseria arteria.

Y. Aspera arteria caudex.

a. Nervus dexter sextiparis.

b f. Ramuli recurrentem dextrum f. constituentes.

c d. Nervus sinister sextiparis d. ramuli recurrentem constituentes c.

e. Hujus surculus pulmone sinistro oblatas.

g. Nervus recurrens sinister.

h. Nervus cordis basim adiens.

i k l m. Pulmonis lobi.

n o. Diaphragma.

FIG. III. Cor per transversum dissectum, quo ventriculorum crassities pateat.

A C D. Vasorum cordis portiones.

B E. Auricula cordis dextra B. sinistra cum venalis arteria portione E.

F. Cordis mucro.

G G H H. Ventriculus cordis dexter G. sinister H.

I I. Septum distinguens ventriculos.

FIG. IV. Ossa cordis, quemadmodum aliqui exprimunt, proponit. FIG. V. Cor à pulmone & diaphragmate li-

berum per dextrum ventriculorum, & vena cava orificium dissectum.

A B. Vena cava pars à diaphragmate ad jugulum, sed A. depressius, B. elatius pingendum erat.

C C C. Cava orificium in dextrum ventriculorum.

D E. Cava ascendens & descendens orificia.

F. Auricula dextra in versa ruga, qua in sinistro latere posita, quia cor per medium dissectum est.

G. Coronalis vena initium.

H H H. Circulus protuberans in cava orificio.

K L M. Valvula tres vena cava.

N N. Filamenta vel fibra valvularum.

O O. Carneae portiones, quibus filamenta adnascuntur.

P. Sinus vena arteriosa orificium spectans.

Q R. Cordis portio ventriculorum dextrum ambiens.

FIG. VI. Cor per dextrum ventriculorum, & vena arteriosa orificium dissectum.

A B. Vena cava & arteria magna portio.

C D. Vena arteriosa orificium, & duorum ipsius ramorum.

E F G. Valvula tres sigmoides.

H H. Septum ventriculorum cordis.

I K. Valvularum vena cava una I. ejus filamenta K.

L. Carneae portio, cui implantantur.

M. Auricula dextra in versa & propendens.

FIG. VII. Cor per sinistrum ventriculorum & Arteria venalis orificium dissectum.

A. Arteria magna caudex.

B. Vena arteriosa portio.

C C. Arteria venosa orificium.

D D. Circulus in ejus orificio protuberans.

E E. Valvulae duae arteriae venalis.

G G. Filamenta à valvulis deorsum ducta.

H H. Carneae portiones quibus innituntur.

I. Auricula sinistra in versus versa.

K. Septum ventriculorum.

L. Sinus arteria magna orificium petens.

M M. Cordis portio ventriculorum sinistram ambiens.

FIG. IIX. Cor per sinistrum ventriculorum & Arteria magna orificium dissectum.

A. Arteria magna orificium.

B C D. Valvula ejus orificio praefixa.

E F G. Coronarium arteriarum principia E F. earum portiones prominentes G.

H I k L. Arteria venosa orificium H. ejus valvulae duae I k. earum filamenta L.

M. Carneae portiones, quibus adnascuntur.

N. Auricula sinistra in versa.

O. Vena arteriosa portio.

P Q. Cordis substantia ventriculorum sinistram ambiens.

R. Septum ventriculorum cordis.

S S. Substantia ad arteria magna radicem, qua aliquando in brutis ossa fit.

T A B



TAB. XI. Unionem vasorum cordis qualis in fœtore peritur, & paulo post in lucem editis aboletur. proponit.

a. b. 1. 2. 3. Cava vena truncus ascendens a. descendens b.

c. 1. 3. Auricula dextri ventriculi.

d. 1. 2. 3. Arteria magna truncus ascendens.

e. 1. 2. 3. Axillaris arteria sinistra.

f. 1. 2. 3. Arteria magna truncus descendens.

g. 1. 2. 3. Arteria venosa, quæ in 2. fig. aperta est.

h. 2. Anastomosis, prout illa in arteria venosa apparet.

i. 2. 3. Membranula foramen hoc valvula in-
star occludens.

k. 3. Anastomosis, prout in vena cava apparet.

l. 1. Canalis ab arterie magnæ trunco descen-
dente in venam arteriosam.

m. 1. Vena arteriosa à dextro ventriculo sur-
sum ad pulmones lata.

n. 1. Vena & arteria per cordis tunicam lata.

o. 2. Sinister cordis ventriculus apertus.

p. 1. Cordis anterior pars pulmones spectans.

q. 3. Cordis posterior pars vertebrae respiciens.

r. s. 2. Valvula arterie venosæ cum suis filamen-
tis r. & carnis implantationibus s.

T A B.

LIB. II.

TAB. XI.

FIG. I.





FIG. II.



FIG. III.



O 2

7 A B.

TAB. XII. Arteria magna truncum cum suis ramis prout per tres ventres feruntur, ob oculos ponit.

A. Arteria magna orificium, qua cordi continuatur.

B B. Arteria coronales.

C D E. Arteriae in descendentem D. ascendentem E. divisio C.

F. a. Subclavia dextra, cujus origo a. altior sinistra.

G. b. Subclavia sinistra, cujus origo b.

H. Costarum octo intervalla petens.

I. Intercostalis superior.

K. Phrenicae utrinque.

* Truncus, ubi diaphragmatis fissuram transiit.

L L. Mammaria.

ccc. Ad musculos intercartilagineos & mammas.

MM NN. Cervicalis M. ejus in os occipitis ingressus NN.

OO. Muscula.

PP. Axillaris dextra & sinistra.

Q Q RR. Thoracica superior Q inferior R.

SS TT. Scapularis S. Humeraria T.

V V. Axillaris reliquum brachia accedens.

XY. Carotis dextra & sinistra.

ee. Conjunctio mammariarum cum epigastricis.

ff. Carotidum in faucibus divisio.

gh. Ramus externus g. internus h. qui ad laryngem fauces & linguam fertur.

i. Ad calvariae basin in duos ramos distribuitur.

l. Ad buccas & faciei musculos rami g. distributio.

m. Distributio rami g. sub auris radice.

no. Tempora perreptans n. auris posteriora o.

p. Celiaca. q. Mesenterica superior.

rs. Emulgentes. tt uu. Spermatica.

z. Mesenterica inferior. y y y y. Lumbares.

α Umbilicales arteriae. β. Muscula superior.

δ δ. Arteriae bifurcatio in iliacos. ε. Sacra.

ζ ζ. Interior sinistri trunci ζ ζ. exterior, qui crus petit η η.

θ. Muscula inferior. λ λ. Hypogastrica.

μ. Ductus reliquus qui ramo ab exteriori ad auctus per os pubis fertur.

ν ν. Epigastrica, cui junguntur mammaria ee.

ξ ξ. Pudenda. ω ω. Cruralis.

FIG. II. Arteriae portionem exhibet, ut à tergo existit, & à sede posteriore ramos inferiorum costarum intervallis dirigit.

FIG. III. Arteria magna, qua ex corde prodit, portio hic aperta pingitur, quo tunica & fibrae ejus conspiciantur.

AAA. Tunica aranea tela similis.

BBC. Tunica arteriae interior B. exterior C.


DE. Arteriarum coronalium exortus.

1. 2. 3. Valvulae tres Arteriae orificio in corde praefectae.

LIB. II.


TAB. XII.

FIG. I.



0 3 TAB.

- TAB. XIII. FIG. I. Pulmonis è thorace e-
 vulsi anteriorem sedem, à quo cor cum mem-
 branis præsectum est, exhibet, at FIG. II.
 Pulmonis posteriorem sedem gibbam, qua
 dorsum spectat. FIG. III. Venam arte-
 riosam. IV. Arteriam venosam denuda-
 tam à pulmonum substantia exhibet.
- AA. 1. 2. Oesophagus sub aspera arteria.
 B 1. 2. C. 1. Aspera arteria. C. 1. Vena arterio-
 sa.
 D. 1. Arteria venosa.
 EFGH. 1. 2. Pulmonis quatuor lobi.
 K. 1. Diaphragma.
- I. 2. Canalis pulmonum.
 A. 3. Vena arteriosa orificium.
 abc. 3. Valvule tres vene arteriosæ.
 BC. 3. Tunica interior B. exterior C.
 DEF. 3. Divisio vene arteriosæ D. in truncos
 duos EF.
 GGGG. 3. Distributio per pulmonis substan-
 tiam.
 ABBCC. 4. Orificium arterie venosæ, quo
 cordi adnascitur A. ejus divisio in truncos
 quatuor.
 EEEE. 1. Distributio per pulmonem.
 F. 4. Tunica simplex hujus arterie.



TABULA XIV.


TAB. XIV. FIG. I. Laryngis ee. 1. 2. Ligamenta membranosa.
 & arteria aspera anteriora, ejusque f. 2. Membranosa pars fistulae.
 ramos per pulmonis substantiam disse- g. 1. h. 2. Laryngis anterior pars g. po-
 minatos, exhibet. FIG. II. La- sterior h. 2.
 ryngis & caudicis arteria posteriora ii. 1. Glandula kk 1. Cartilago scu-
 proponit. talis, l 1. 2. Epiglottis.
 aa. bb. 1. 2. Aspera arteria fistula aa. 1. mm nn. 2. Cartilago arythenoides m.
 ejus divisio. Crycoides n.
 ccc. 1. Distributio per pulmones. o. 2. Rimula seu glottis.
 dd. 2. Cartilagines semicirculares.

TAB.

LIB. II.

TAB. XIV.

FIG. I.



II.




P

TAB.

- TAB. XV.** *Utriusque ventris cavitatem, visceribus & diaphragmate vacuam exhibet: & quinam muscoli, quæ etiam ossa, visceribus ablati, & sterno remoto, super sint, ostendit.*
- AB.** *Cervicem flectentium primus, seu longus.*
- CC.** *Cervicem flectentium secundus, seu scalenus.*
- DDDDD.** *Intercostales muscoli exteriores.*
- EEEE.** *Intercostales muscoli interiores.*
- FF.** *Serratus major seu thoracis secundus.*
- G.** *Serratus minor seu scapule primus à suo exortu liberatus.*
- H.** *Pectoralis seu brachij primus ab exortu separatus.*
- I.** *Deltoides seu brachij secundus.*
- K.** *Humeros ex carne.*
- L.** *Cubiti musculus primus, seu biceps.*
- M.** *Cubiti musculus secundus, seu brachialis.*
- N.** *Clavicula extrorsum flexa.*
- O.** *Thoracis musculus primus, seu subclavius.*
- P.** *Scapule processus elatior.*
- Q.** *Capitis musculus sextus sive obliquus inferior.*
- R.** *Capitis musculus secundus.*
- S.** *Scapule musculus quartus sive levator.*
- TV.** *Ossis hyoddis muscoli quarti duo ventres.*
- XX. aa.** *Dorsi musculus quintus, cui principium aa.*
- YY. bb. cc.** *Femoris musculus sextus seu psoas, cuius principium cc. tendo bb.*
- ZZ.** *Femoris musculus septimus.*
- do o.** *Os sacrum d. ex cuius foraminibus nervi prosiliunt o. sed nimis magni ad egressum sculpti.*
- e.** *Femoris quinti musculi portio ab osse pubis.*
- f.** *Os pubis denudatum.*
- k.** *Femoris musculus nonus, seu circumagentium primus.*

LIB. II.

TAB. XV.



P

2

TAB.

TAB. XVI. Thoracis ossa posteriora exhibet. FIG.

I. Thoracis vertebra media, cui reliqua decem penè
similes, anterior pars. FIG. II. ejusdem posterior.

FIG. III. Vertebra undecima posterior facies.

FIG. IV. Vertebra duodecima posterior pars. FIG.

V. Thoracis vertebra tres media una cum costa arti-
culatione. FIG. VI. Duarum vertebrarum nexum

cartilagineum exhibet. FIG. VII. Scapula par-
tem, dextra interiori, at FIG. IX. ejusdem ex-

teriori, & FIG. IX. Lateralem partem pro-
ponit.

A. 1. 2. 3. 4. Vertebra pars superior, cui inferior corre-
spondet.

B. 3. Appendix superior capitis vertebra, cui similis in-
ferior.

B. C. 1. Sinus costam excipiens B. sinus alter minor C.

D. 3. 5. Sinus undecima vertebra, cui costa undecima in-
articulatur, & in 5. cum costa ostenditur.

E. 4. Sinus in duodecima vertebra.

F. 4. Asperitas ligamentum huius articuli producens.

G. 2. 3. 4. Foramina in corporum sede posteriore.

H. 1. 2. 3. 4. Processus transversi vertebrarum thoracis.

K. 1. 5. Sinus in apice transversus processus, cui costa ar-
ticulatur.

L. 1. 2. Processus transversus gibba sedes.

M. 1. Processus transversus cava regio.

N. O. P. 1. 2. Spina tribus lineis in latera tria distincta.

Q. 1. Asperitas in spina latere interiore.

R. 3. Vertebra undecima spina.

S. 4. Spina duodecima vertebra.

T. V. 1. Processuum ascendunt facies antica.

X. T. 2. 3. Horum processuum postica facies.

a. b. 2. 3. Processuum descendunt facies exterior.

c. 1. Eorum anterior facies incurvata.

e. f. 4. Processus ascendentes duodecima vertebra unde-
cima subeunt.

g. h. 4. Processus descendentes 12. vertebra, qui prima lum-
borum vertebra process. ascendunt sinibus inarti-
culantur.

i. l. 5. Vertebra tres media simul articulata.

m. n. 5. Sinus corporum vertebrarum costa capitulum
suscipiens.

o. 5. Costa articulus ad transversum processum.

p. 5. Costarum circularis ductus a. D. ad p. rectorum, in

de ad s. antrorsum delatus.

q. r. 5. Costa cum sua cartilagine coactus.

s. 5. Cartilaginis capitulum obusum.

ch. 1. 2. fig. 6. Cartilago utriusque vertebra appendice
suis corporibus conglutinans.

ch. 3. 4. fig. 6. Appendices utriusque vertebra.

ch. 5. fig. 6. Ligamentum cartilagineum utramq. ver-
tebram jungens.

SCAPULARUM
triplex delineatio.

AB. 7. 8. Scapula sinus seu acetabulum, quod os hamum
subit.

a. 8. Cartilago sinum adaugens, qua etiam scorsim pi-
cta & K. notata.

CD. 7. 8. Cervix seu collum scapula.

E. 7. 8. Processus minor scapula.

F. 7. 8. Tuberculum huius, cui clavicula nectitur.

f. 7. Asperitas ipsius ligamentum educens.

GH. 1. 8. 9. Spina scapula GH. spina crassior pars ap-
pendice donata I.

K. 7. 8. 9. Acromion appendice constans.

L. 7. Sinus acromii claviculam sustinens.

M. M. M. 7. Alveoli ex costarum contactu.

NO. 7. Spinae radice interna sedes cava.

P. 7. Scapulae acuties lateris superioris.

Q. 7. Sinus inferioris lateris, unde musculus cubitum
extendentium primus oritur.

S. 8. Extuberantia exterior inferioris lateris.

T. 8. Impressio inferioris lateris, a quo quartus brachii
musculus, rotundus major dictus oritur.

V. V. 8. Cavius scapulae externa sedes.

X. T. 7. 8. 9. Appendix basis scapulae X. alia inferioris an-
guli T.

Z. 7. 8. 9. Angulus superior basis scapulae.

φ. 7. Huius anguli protuberantia interior.

α. 7. 9. Sinus lateris superioris scapulae.

b. 9. Scapula tenuissima sedes.

c. 9. Foraminulum hic interdum conficitur, per quod
vena ad ossis nutritionem irrepant.

T A B.

LIB. II.

TAB. XVI.

FIG. I.



II.



III.



IV.



V.



VI.



VII.



VIII.



TAB. XVII. Cervicis ossa proponuntur.

FIG. I. Occipitii os à calvaria separatum.

FIG. II. Conjunctionem septem vertebrarum cervicis, qualis est parte posteriore:

quemadmodum FIG. III. parte anteriore & FIG. IV. faciem lateralem exhibet:

at FIG. V. Ligamenta primam & secundam vertebra connectentia, quemadmodum FIG. VI. cartilagine, quae inter has aliquando reperiuntur, proponit.

A. 1. Foramen ossis occipitii pro spinalis medullae transitu.

B C. 1. Capitula duo ossis occipitii, quae primae cervicis vertebrae coarticulantur.

D. 1. Asperitas, cui ligamentum inseritur.

E. 1. Sinus in posteriori capitulorum sede primopar nervorum viam praebens.

F F. 2. 3. Cervicis prima vertebra.

G H. 2. 3. 4. Sinus primae vertebrae, capitula duo occipitii ossis excipientes.

II. 2. 3. Transversus processus primae vertebrae.

L. 2. Sinus, qui cum occipitii ossis sinu E. communem ductum efficit, nervis paratum.

M. 2. 4. Aspera sedes eo loci, ubi prima vertebrae cervicis spina destituitur.

N N. 2. 3. Cervicis vertebra secunda, cuius corpus in medio extuberans, & utrinque depressum λ in 3 fig. ostendit.

O. 2. 3. 4. Appendix (vulgo processus) secundae vertebrae, dens dictus.

P. 2. Foramen ex sinu dentis & primae vertebrae formatum, ad nervorum ramulos transmittendos.

Q. 2. Asperitas, ubi foramen non conspicitur pervium.

R. 2. Processus descendens secundae vertebrae.

S S. 2. 3. Cervicis tertia vertebra.

T. 2. Processus descendens tertiae vertebrae.

V V. 2. 4. Processus vertebrarum à posteriore parte per medium divisi.

X. 2. 4. Processus vertebrae septimae posterior, qui fissus non est, ut priorum ββ.

Y. 3. 4. Vertebrarum summi processus.

Z. 3. 4. Processus duo primi extraordinarii in parte altissima vertebrarum.

αα. 2. Processuum lateralium pars extraordinaria.

ββ. 4. Processus per medium divisi.

γγγγ. 3. Vertebrarum corpora notantur.

aa. 3. 4. Foramina processuum lateralium.

bb. 4. Nodorum processus infimi.

ch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vertebrae septem notantur.

FIGURA V.

A B C D. Cervicis vertebra prima A B C secunda D D.

E F. Ligamentum membraneum primam vertebrae occipitis ossi colligans E. primam secundam connectens F.

G. Corpus secundae vertebrae.

H. Dens secundae vertebrae.


I. Ligamentum dentem occipitis ossi alligans.

K. Ligamen in prima vertebra dentem obvolvens.

FIG. VI. Cartilagine, quas inter duas primas vertebrae nonnunquam Vesalius reperiri monet.

LIB. II.

FIG. I



II.



V.



III.

TAB. XVII.



IV.



VI.



TAB. XIIX. FIG. I. Universi dorsi vertebrae connexas exhibet.

A. ad B. Cervicis vertebrae septem.

C. ad D. Thoracis duodecim vertebrae.

E. ad F. Lumborum quinque vertebrae.

G. ad H. Sacrum os, ex sex vertebis.

I. ad K. Coccygis os secundum recentiores ex quatuor ossibus.

L. L. Corpora vertebrarum.

M. N. Processus transversus vertebrae M. descendens N.

O. O. P. P. Processus ascendentes O. O. Posteriores P. P.

Q. Q. Foramina in lateribus vertebrarum, nervos transmittentia.

R. R. Ligamentum cartilagineum vertebrae interpositum.

FIG. II. Vertebra prima cervicis anteriorem & superiorem faciem: at III. ejusdem posteriorem & superiorem, sicut IV. inferiorem & posteriorem exhibet: Sic V. secunda vertebra anteriorem. VI. posteriorem. VII. inferiorem partem ostendit: at IIX. Vertebrae tertiae cervicis anterior & superior: in IX. posterior & superior facies proponitur.

A. 2. 3. 4. Foramen dorsale medulla.

B. 2. 3. Cavitas dentem secunda vertebrae admittens.

C. 3. 4. Sinus ibidem cartilagineo incrustatus.

D. 2. Extuberantia in externa huius sinus sede.

E. F. 2. 3. Sinus prima vertebrae, occipitis duo capitula excipientes.

G. G. 2. 3. 4. Processus transversus prima vertebrae.

H. 2. Foramen huius transversus processus.

I. 3. Sinus, qui cum occipitis ossis sinu E. communem efficit ductum nervi paratum.

K. 3. 4. Aspera sedes, ubi vertebra prima spina caret.

L. L. 4. Sinus duo prima vertebrae, secunda vertebrae tubera M. N. excipientes.

M. N. 5. 6. Tubera duo vertebrae secunda, sinus prima ingredientia.

O. 7. Dens seu appendix secunda vertebrae.

P. 5. Tuberculum huius appendicis cartilagineo incrustatum.

Q. 6. Dentis posterior sedes.

R. 6. Eius sinus cui transversum ligamentum obvolvitur ipsum in cavitate vertebrae primae continens.

ST. 6. Sinus ad latera dentis, radices nervorum secundae partis anterioris ramulos emittentes.

V. 5. Dentis mucro.

X. 3. Asperitas, ubi foramen non pervium conspicitur.

T. 6. Sinus secunda vertebrae, qui cum sinu Z. foramen efficit, per quod nervorum paria transeunt.

Z. 4. Sinus prima vertebrae.

a. 5. 6. 7. Spina secunda vertebrae bifida.

b. 5. 6. 7. Processus transversus vertebrae secunda.

c. 7. Foramen transversus processus b.

d. 6. 7. Processus descendens secunda vertebrae, cuius sinus d. in sexta figura ostenditur.

e. 6. 7. Sedes, qua secunda vertebrae corpus deorsum porrigitur.

f. g. 8. Corporis vertebrae tertiae inferior sedes f. eius duas partes eminentes g. g.

h. i. m. 8. Processus ascendentes duo h. i. descendentes duo l. m.

n. o. p. 8. Processus transversus.

r. 8. 9. Spina seu posterior processus.

s. t. 8. Spinae apices duo.

u. x. 9. Processus vertebrae tertiae descendens u. ascendens x.

y. 2. 9. Processus transversus vertebrae tertiae.

α. 8. 9. Foramen huius transversus processus.


β. γ. 9. Corporis tertiae vertebrae sinuata sedes superior.

δ. 9. ε. 7. Sinus inferiorem partem δ. superiorem partem ε. foraminis, nervorum paria ducentis, constituens.

LIB. II.

TAB. XIII.

FIG. I.



Q

TAB.



LIBRI TERTII TABULÆ.



TABULA I. Capitis figuras exhibet. FIG. quidem prima, Naturalem & inculpata[m] capitis conformationem ab altero latere proponit: reliquæ quatuor figuras depravatas, quarum tres priores, interdum casu inveniuntur.

TAB. II. Depravatam, in qua anterior eminentia, à frontis elatiore sede producta, abest:

posteriore reservata.

FIG. III. In qua posterior eminentia occipitis, anteriore remanente, abest.

FIG. IV. In qua capitis eminentia amba periere.

FIG. V. Imaginaria potius est, in qua caput ad utramque aurem magis prominet, quam antè, vel postè: tale autem caput, in natura consistere non posse, Galenus affirmat.

TAB.

FIG. II.



LIB. III.

TAB. I.

FIG. III.



FIG. I.




FIG. IV.



FIG. V.




- TAB. II. Capitis aliquot ossa & suturas. FIG. quidem VI. Latus sinistrum, at FIG. VII. Latus dextrum, osse jugali remoto, ostendit.
- AB. Sutura coronalis, sive sutura prima & propria.
- CD. Sutura lambdoidæa, sive propria tertia.
- E. Sutura sagittalis, sive propria secunda.
- FGH. Sutura quarta propria circularis.
- IK. Verticis ossa. L. Frontis os.
- M. Occipitis os.
- N. Temporum ossa utrinque.
- O. Sphenoides sive cuneiforme os. x. 7. Hujus foramen quintum in oculi orbita.
- P. 7. Processus ossis sphenoidis quatuor, 2. 3. 4. 5. ch. inscripti.
- Q. Maxilla superioris os primum.
- R. Hujus prominentia ad tempora.
- S S S. Semicirculus temporalem musculum proferens.
- T T. Maxilla superioris os quartum.
- V X. 6. Os jugale.
- Y. 6. Sutura in osse jugali, quam aliqui quar-
- tam suturam communem faciunt.
6. aa. 7. Quarta sutura propria pars anterior.
- b. Sutura quinta calvarie propria obliqua ab H. ad g.
- c. 7. Squamma ossi sphenoidi aliquando adnata.
- d. 7. Linea squammam hanc ab osse sejungens.
- ee. Sutura secunda communis pars inferior ad palati latera.
- f. 7. Sutura prima maxille superioris in mala.
- ggg. Sutura prima communis in supercilii latere.
- h. 7. Sinus temporum, pro maxilla inferioris articulatione.
- ik. Appendix styloides temporum.
- k. Processus mammillaris temporum.
- lll. 7. Occipitii capita, quibus vertebra prima articulatur.
- m. 6. Sutura inter os maxilla & frontis.
- n. 6. Os maxille superioris tertium.

TAB.

LIB. III.

FIG. VI.

TAB. II.



VII.



Q 3

T A B.

TAB. III. FIG. IIX. Calvaria anterior sedes, ipsius

& maxilla superioris ossa foramina & futuras exhibens.

A A. Foramen in frontis osse.

B B. Foramen ossis quarti maxilla superioris in mala.

C. Foramen ossis secundi maxilla superioris, in oculi angulo interno.

D D. Foramen quartum ossis sphenoidis in oculi latere externo.

E E G H. Foramen primum E. secundum G. tertium H. ejusdem ossis, in oculi sede.

I I. Frontis os. K. Verticis os sinistrum.

L. Temporum os sinistrum.

M. Processus mammillaris, cui Appendix styloides adiacet.

N N. Sphenoides sive cuneiforme os in sinistri temporis & dextri oculi cavo.

Γ Γ Γ. Maxilla superioris os primum in mala sinistra & oculi utraq. orbita.

Δ Θ Λ Λ. Maxilla superioris os secundum Δ. tertium Θ. quartum Λ Λ. in sinistro oculo.

Ξ Ξ. Maxilla superioris os quintum in naso utring.

Ο Ο. Septum narium.

P. Sutura prima communis in osse jugali.

Q. Sutura secunda communis pars superior in oculi sede ad S. porrecta.

R S T V X Y Z. Sutura 3. communis per oculi sedem oblique ducta.

a D. Inferius (debebat esse parvum d.) Sutura 3. externa maxilla superioris in mala, & inde per oculum ad Q.

b. Sutura 3. externa max. sup. à b. ad c.

c. Sut. 2. externa max. sup. in oculo.

e. Sutura quarta extern. e. ad Ξ.

f. Sut. 6. externa max. sup. in nasi medio.

g. Sut. 2. interna in naso inferior.

h. Sutura septima externa maxilla superioris.

i. Sut. spuria maxil. super. ad oculum sede elatiore.

FIG. IIX. Calvaria basin, multaq. foramina & suturas proponit.

A. Coronalis sutura extremum.

C C. Lambdoidea sutura humiliora utring. seu additamēta.

D. Sphenoidis foramen 4. in oculi sedis externo latere.

F. Sutura quarta propria pars.

H. Occipitis foramen magnum pro dorsali medulla.

K. Verticis ossis sinistri portio.

L L. Frontis ossis portio.

M M. Occipitis ossis humilior sedes.

N. Sphenoidis rima & temporum ossibus communis à sinistris ab n. ad o. ducta.

O O P. Sphenoides os O O. Processus P. illius quatuor 2. 3. 4. 5. insigniti.

Q R. Sphenoidis foramen sextum in faucibus (positum A

pro Q. ejusdem foramen septimum R.

Γ Σ Α Π. Maxil. sup. os primum Γ. quartum Σ Α. sextum Π. ubi sculptor inter c. & Π. suturam non satis expressit.

T T. Temporum ossa utringue.

V. Temporum ossis foramen quartum ad auditum.

Σ. Septum narium.

X. Temporis ossis foramen primum in basi.

Y Y. Os jugale.

a a. Sutura quarta propria pars anterior.

b. Sut. 5. propria oblique pars humilior.

c. Septimum inferior pars vomer referens, ubi 3. positum.

d. Sut. 2. communis pars superior.

f. Sut. 1. externa maxill. sup. in mala.

g. Sut. 1. communis in supercili latere.

h. Sinus temporum, cui maxilla inferior articulatur.

ii Appendix styloides.

k. Processus mammillaris.

ll. Tubercula ossis occipitii.

m m. Sutura sexta calvaria propria obliqua.

n n. Sutura septima transversa (frustra ad foramen primum in ossa temporum adpositum y.)

op. Linea incipiens à jam dicta per tempora scandens, quae divisioni similior, quam linea.

qq. Sutura secunda calvaria communis pars inferior in narium amplitudine.

r. Linea auditorii meatus.

s a. Petrosa ossa.

t u. Sutura quinta externa maxilla super. transversa.

X y. Sutura septima externa recta (x. parvum esse debet.)

α β. Sutura spuria maxilla superioris in palato.

γ. Auris foramen.

δ. Temporum foramen quintum juxta ipsius processus (ubi x. delendum.)

B. Foramen occipitis, quod non semper adest.

E. Foramen occipitii secundum pro sexto pari, & vena ac arteria jugulari.

H. Foramen occipitii primum pro medulla transitu.

ζ. Foramen tertium pro septimi partis transitu (positum 3. pro ζ.)

η λ. Narium foramina duo.

μ ν. Foramina duo in palato, seu quartum ossis sphenoidis.

ξ. Sphenoidis foramina quina in basi.



ω. Foramen ossis quarti maxilla sup. in palato.

Nota, ad latus dextrum M V. denotant cavitatem, quam os jugale constituit pro musculi temporalis transitu.

LIB. III.

TAB. III.

FIG. IIX.



24 TAB.

TAB. IV. FIG. X. Calvaria interiorum humiliorumq. partem cum multis foraminibus praesertim ossis sphenoidis, exhibet.

FIG. XI. Calvaria interioris elatiorem partem ab humiliori abscissam.

AAB. Sphenoides os A. huius foramen primum B.

C. Angulus huius foraminis.

D. Sinus huius ossis anterior transversus, in quos nervi optici abduuntur D. sinus huius ossis posterior quadratus, in quo glandula pituitaria delitescit.

F. Meatus anterior, per quem pituita collecta derivatur.

G. Foramen secundum ossis sphenoidis in oculi sede elatiore.

H. Foramen tertium in oculi profundo.

I. Spongiosum ossis foraminula.

K. Rima huius ossis, per quam dura meninx annectitur.

L. IO. II. Cavitas frontis ossis inter duas illius squamas.

M. Sphenoides os hoc loco saepe foramen habet.

N. Rima ossis sphenoidis & temporum communis.

OQR. Ductus postremus sphenoidis.

QR. Sphenoidis foramen sextum Q. septimum in faucibus R.

SS. IO. II. & T. Inscriptiones venarum, veluti sulci in cranio ex venis durae meningis.

V. Foramen sphenoidis octavum ad nares.

X. Eiusdem foramen quintum.

Y. II. Fontanella: pars quae difficulter induratur & tenuior est.

ZZ. Cavitas pro cerebri extuberantiis anterioribus.

a. Foramen temporum sextum, seu auditus quartum.

bc. Foramen occipitii secundum b. tertium c.

de. Foramen eiusdem primum d. secundum e.

fg. Sinus duo posteriores calvariae, pro cerebello.

h. IO. II. Sinus tertii & medii extremum.

ii. II. Sinus huius ductus per calvariae longitudinem.

i. IO. Sinus cum osse occipitis communis.

m. II. Foraminula in verticis ossium interna sede.

nn. IO. II. Sutura coronalis n. sagittalis o.

PP. II. Sutura Lambdoides.

qq. IO. II. Sutura quarta seu squamiformis.

rr. Sutura huius pars anterior, os sphenoides quadam ex parte ambiens.

s. Sutura Lambdoidis pars, aliis sutura sexta propria.

t. Linea, quae extrema Lambdoidis committit, aliis sutura obliqua septima propria transversa.


uu. Sutura octava propria transversa.

x. Septum ossis spongiosi.


xx. Processus clinoides ossis sphenoidis.

LIB. III.
FIG. I.

TAB. VI.



II.



R

TAB.

TAB VII. FIG. III. Cerebrum utraque membrana detectum, & in latus diductum, quo processus falci similis, qui cerebrum dividit, cum calloso corpore conspiciatur.

AA. Cerebri pars dextra. BB sinistra.

CC. Anfractus sive convolutiones cerebri.

DD. Processus durae membranae seu falx, cerebri dextram & sinistram partem intercedens.

EEE. Vasorum initia ex tertio sinu in tenuem membranam hic abrupta: sive Venulae reptitia.

F. Ductus à quarto sinu, vena modo in humiliorē sedem crassa membrana excurrentes.

GG. Huius ductus propagines in eandem membranam sursum aliquousq; excurrentes.

HH. Surculi ab humiliori sede tertii sinus propagati.

II. Principia vasorum, quae à quarto sinu in tenuem membranam secundum superiorem callosi corporis regionem perferuntur.

K. Initium vasis à quarto sinu pronati, quod sub fornice in tertium ventriculum & dehinc ad plexus constitutionem excurrit quem extimo fœtus in volucro aliqui comparant.

LL. Callosum corpus cerebri.

MM. Sinus utring; ad corporis callosi latera, in cerebro conspicui.

N. Processus falcis portio, quae septo, olfactus organorum sinus dirimenti, connascitur, nimirum octavi capitis ossis processui.

OO. Tenuis membrana portio à cerebro divulsa.

PP. Crassa membranae portiones reflexae.

FIG. IV. Cerebrum membranis liberum, ablata utring; cerebri portione, quò cerebri medulla ac ventriculi in conspectum veniant. proponit.

AAABBB. Cerebri medulla in calvaria adhuc relictæ pars dextra & sinistra.

CCC. Cerebri portio ablata.

DDD. Divisiones, seu lineae partim cerebri anfractus, partim ejus substantiae varium colorem commonstrantes.

EEEE. Cortex cerebri ejus medullam ambiens, qui quasi luteus & subcinericius magis est.

GGHH. Cerebri medulla, ad amussim alba, qua compressa saepe rubris punctis interstincta apparet.

III. Callosum corpus utring; à cerebri substantia liberum, utramq; ejus partem conjungens.

KK. Callosi corporis portio.

LLMM. Ventriculus cerebri dexter & sinister.

NN. Sinistri ventriculi superioris sedis portio.

OO. Plexus choroides.

PP. Vena graciles ventriculorum substantiae connatae.

Q. Alia ab iisdem vasis profecta, in tenuem membranam sub calloso corporis anteriore sede excurrentes.

LIBRI TERCIJ

LIB. III.
FIG. III.

TAB. VII.




FIG. IV.



R 4 TAB.

TARULA IIX.

18

1 AB. IIX. FIG. V. Idem quod prior ostendit, nisi quod callosum corpus anteriore sede, à cerebro separatum in posteriora reflexum, & à septo ventriculos distinguente divulsus cum fornice conspicitur: quare characteres ab A usque ad R. idem ostendunt quod in figura quarta.

R R R. Callosi corporis reflexi superficies inferior.

STV. Fornicis superficies triangularis cuius circumscriptio est ab S ad T, & à T ad V, & ab V ad T.

XX. Septi ventriculorum inferior pars fornicis continua.

YY. Septi superior pars calloso corpori continua.

FIG. VI. Fornicem antè liberatam, sursumq; in posteriora retractam, quo inferior ipsius superficies & vasa à quarto sinu prodeuntia, sub fornice delata conspiciantur, ostendit.

AAA. Fornicis seu corporis testudinis modo extructi superficies inferior.

B C. Anguli duo fornicis, quibus ventriculis

continuatur.

D E. Ventriculus dexter & sinister.

FG. Arteria à carotidibus per inferiorem posterioremq; ventriculorum sedem ad plexum choroidem efformandum conscendentes.

H. Vas à quarto sinu prodiens, sub fornice, in tertium ventriculum abiens.

IKL. Hujus vasis divisio, cujus portio ventriculorum dextrum K. altera sinistrum L. petit.

MN. Plexus choroides ab arteria FG. & vase H. constitutus.

OO. Venule per cerebri ventriculos à vasis K. & L. productæ.

P. Alia ab his extra ventriculos ad tenuem membranam dispersæ.

Q. Meatus ex communi concavitate dextri ac sinistri ventriculorum, seu à tertio ventriculo rectà declivis versus pelvim perti-nens.

RS. Canales seu sinus ventriculorum substantiæ insculpti pituitam ad meatus E. insigni-tiorificium deducentes.

T A B.

LIBRI TERTII
TAB. IV.

LIB. III.

131

Fig. X.





Fig. XI.



R

TAB.

TABULA V.


- TAB. V. FIG. XII. Sphenoidis & spon-
goidis ossis internam superficiem exhibet.
FIG. XIII. Verticis ossis portiones du-
as nonnihil invicem se junctas exhibet, quò
futura fabrica commodius conspiciatur.
FIG. XIV. Verticis ossis portionem à re-
liqua ossis parte serra divisam ostendit, quo
calvaria substantia pateat.
- AA. Spongiosum sive octavum os.
B. Septum olfactus organa sive processus mam-
millares interstriguens.
CD. Cavitates duæ ossis sphenoidis.
E. Septum cavitates distinguens.
F. Foramen alterius duarum cavitarum innæ-
res desinens.
G. Cavitas recta sub duobus prioribus sita.
HH. Processus alis vesperilionum similes.
a. o. 14. Superior seu exterior lamina a. intè-
rior o.
c. 14. Substantia cavernosa in medio.

TAB.

LIB. III.

TAB. V.

FIG. XII.



XIII.



XIV.



R 2

TAB.

TAB. VI. FIG. I. Caput, cui calva ablata est, exhibet, quo cerebrum crassa meninge obtectum contueri studiosus lector possit.

A A B B. Crassa membrana.

C C C. Huius membranae sinus tertius, secundum capitis longitudinem expositus.

D D. Ductus venarum modo in membranam excurrentes, seu vena cerebri secunda.

E E. Cerebri vena quinta.

F F F. Venula calvariam perforantes, pericranium accedentes.

G G G. Fibrae crassae membranae, suturam coronalem transeuntes, & pericranium constituentes.

H H I I. Fibrae sagittalem suturam H. aliae Lambdoidem transeuntes I.

K. Unum tuberculum eorum quae inaequalibus calvariae sinibus plerumque iuxta sagittalis sutura cum coronali coitum conspicuis, adnasci solent.

L. Cavitas in frontis osse iuxta superciliarum sedem.

M N. Cranium M. Pericranium N. notat.

FIG. II. Cerebrum crassa meninge detectum, ipsiusque sinum tertium per medium divisum proponit, quo tenui meninge obvolutum ostendatur.

A A A. Crassae meningis pars cerebrum dividens.

B B. Sinus crassae meningis tertius apertus.

C C. Vasorum initia ex sinu tertio in tenuem membranam.

D D D. Vasorum horum propagatio.

E E E. Tenuis meninx cerebrum proximè cingens.

F F F. Vasa secundum cerebri anfractus excurrentia.

G G G. Abiis propagines, crassae membranae latera percurrentes.

H H H. Crassa membrana deorsum reflexa.


T A B.

LIB. III.
FIG.

TAB. VIII.
V



VI



S

T A B.

- TAB. IX. FIG. VII.** Cerebrum, quod ablata portione, qua & ventriculos superiores efformabat, & cerebello incumberebat, ostendit, & vas à quarto sinu ductum à plexu choroide avulsum & elevatum est, quo communis dextri sinistriq; ventriculorum concavitas sedes, seu tertius ventriculus, una cum ejus cavitatis meatibus, dura matris quatuor sinibus, & cerebellum conspiciantur.
- A A B B.** Cerebri portiones in calvaria adhuc reliquæ.
- C C C.** Linea cerebri anfractuosa versus cerebri basin, ejus corticem à medulla distinguentes.
- D D** Cerebri cortex.
- E E E.** Cerebri medulla alba lineis circumscripta.
- F G.** Arteria carotidis sive soporalis portiones.
- H** Ventriculi tertii humilior sedes nonnihil distenta.
- I.** Meatus anterior tertii ventriculi ad pelvim cerebri pituitam deferens.
- K.** Meatus posterior tertii ventriculi ad quartum sive cavitatem cerebello & spinali medulla communem.
- L.** Glandula pinealis, cui vas venosum V. cum in suo situ est, accumbit.
- M N.** Nates & testes cerebri, tenui membrana adhuc obtecti.
- O O** Processus crassæ meningis inter cerebrum & cerebellum.
- P P Q Q** Sinus primus & secundus crassæ meningis.
- R.** Torcular, seu quatuor sinuum congressus.
- S.** Tertius sinus principium.
- T.** Quartus sinus apertus.
- V.** Hujus sinus vas reflexum & abruptum, quod in ventriculos porrigitur.
- X X.** Cerebellum tenui meninge intectum.
- Y.** Ductus à quarto sinu in tenuem meningem, qua cerebellum & testes tegit.
- Z Z.** Crassæ meningis connexus cum osse petroso auditus organa continente.
- FIG. IIX.** Cerebri adhuc portio ablata testibus divisis, quo tertii ventriculi ductus in quartum cernatur, & cerebellum crassæ meningis denudatum.
- A A B B.** Cerebri portio residua.
- C D E.** Lineæ, cortex & medulla cerebri.
- F G.** Arteriae carotidis portiones.
- H.** Ventriculi tertii anterior pars.
- I.** Meatus ad pelvim cerebri pituitam deferens.
- K.** Meatus alter à ductu L. ad primum meatum I. delatus.
- L.** Ventriculi tertii posterior pars ad quartum descendens.
- M.** Glandula pinealis in latus depressa.
- N O P Q.** Testes & nates divisi.
- R R.** Cerebellum tenui meninge investitum.
- S S.** Vasa tenuem meningem implicantia.
- T T.** Ab his ramuli ad arterias carotides.
- V V.** Crassæ meningis, qua cerebellum investiebat & à cerebro dirimebat.
- X X.** Vasa à crassæ meningis in tenuem qua cerebellum vestit.
- Z Z.** Crassæ meningis ad calvariam nexus.

LIBRI TERTII

141

LIB. III.

TAB. IX.

FIG. VII.



S 2

TAB.

TAB. XII. FIG. XIIX. Caput à sinistris exhibet, à dextris nonnihil sublevatum: cerebri portionem, cerebello exempto, residuam & nonnihil elevatam, inq. posteriora reflexam, quo olfactus instrumenta conspiciantur.

A A B B. Cerebrum tenui meninge obvolutum.

C C. Cerebri tubera, nonnullis mammillares processus.

D E. Olfactus organum unum in sua adhuc sede D. alterum E. cum cerebro in posteriora reflexum.

F. Sinus sinistri olfactus organi, crassa meningem multis exiguis foraminibus perforata, hic tectus.

G. Septum organorum olfactus.

H. Vena sexta cerebri in crassam meningem.

I. Vena quinta cerebri per foramen nervorum quinti paris calvariam subiens.

K. Falx portio septo adnexa.

L M N. Sedes cerebelli.

O P Q. Sinus crassae meningis dexter, sinister & medius.

S S S. Calvaria duplex tabulatum.

FIG. XIX. Caput occipitio innitens proponitur, quo cerebri portio in posteriora depen-

dens, & olfactus organa, nervorum optico-
rum coitus & arteria carotidis nami appa-
reant.

A A B B. Cerebri portio tenui meninge tecta.

C C. Tubera cerebri, quibusdam mammillares
processus.

D E. Olfactus organa una cum cerebro reflexa.

F F F F. Superiores sinus calvariae, quibus tubera cerebri incumbunt: inferiores sinus organorum olfactus.

G. Septum haec organa & eorum sinum distinguens.

H. Vena sexta hic calvariam intrans.

I. Vena quinta cerebri.

K. Vas venae instar à crassa meningem in tenuem excurrens.

L L. Principium eorum ductuum, qui per crassam meningis latus excurrunt, venarum instar, arteriis commissa.

M N O. Nervi optici dexter & sinister M N. ipsorum coitus O.

P. Arteria carotidis ramus, ad pelvis latus crassam meningem perforans.


Q R. Ramus huius arteriae vetriculum dextrum petens Q. alius ad tenuem meningem R.

S. pelvis pituitam cerebri excipiens.


T A B.

LIB. III.
FIG. IX.

TAB. X.



.XII.



.X.



.XII.



S

7 A B.

TAB. XI. FIG. XIII. Vasa cerebri ipsorumq;
distributionem, præsertim per dextrum latus exhibet,
sive ea à vena jugulari interna, sive arteria carotide,
sive à sinibus dura matris prodeant.

A. Jugularis interna, qua jam calvaria proxima est.

B. Arteria carotidis sive soporalis.

CD. Vena prima C. secunda D. ad sinus delata.

EF. Tertia crassam meningem perreptans E. quarta in
sinum F.

GH. Quinta & sexta ad crassam meningem.

I. Arteria prima.

Q. Hujus ramus musculos cervicis perreptans.

KL. Arteria secunda in sinum K. tertia incomitata L.

r. Hujus ramulus.

MN. Sinus primus & secundus crasse meningis.

O. Sinus utriusque congressus.

PPQ. Sinus tertius crasse meningis P. hujus finis Q.

R. Sinus quartus crasse meningis.

SS. Sinus primis rami in vicinas membranas.

TTTT. Sinus tertii rami in tenuem meningem diffusi.

VVXX. Sinus tertii ramuli inferiores VV. superiores

XX. per crassam meningem distributi.

YY. aa. Sinus quarti surculi sursum YY. deorsum
aa. missi.

b. Sinus quarti ductus superior per falcem excurrens.

cc. Surculi ab hoc ductu sursum excurrentes: nota scul-
ptorem supra T. pro c. posuisse G. & pro altero par-
te c. magnum C.

def. Sinus quarti ramus superior dexter & sinister d e.
& inferior f. ad tenuem meningem.

gh. Ramus dicti ductus antrosum g. ad choroidem re-
trosum h. ad cerebellum reflexus.

i. Vas insignis, in quod quartus sinus definit.

K. Superius (sculptor debebat k. parvum posuisse) ya-
sis hujus in cerebro bipartitio.

lm. Rami duo hujus bipartitionis.

n. Surculus ad auditus organum.

ooq. Vena & arteria tertia distributio.

ppp. Surculi à ramulis o. in tenuem meningem.

Q. pro q. Arteria tertia in calvaria introitu divisa.

st. Ramus ad narium amplitudinem s. hujus finis in
nasi extremo t.

uu. Rami duo ad calvariam intrantes.

x. Ramus ad oculum à coitu ramorum uu.

β. (Sed positum est e.) ramus ad tenuem meningem.

γ. (A posuit sculptor) ventriculorum dextrum accedens
ramus.

δ. Plexus choroides utrinq; à ramo γ. efformatus.

FIG. XIV.. Rete mirabile secundum Galeni descri-
ptionem.

AB. Arteria calvariam subeuntes, & rete mirabile
constituentes

CD. Rami in quos rete illius propagines conjunguntur.

E. Glandula pituitaria.

FIG. XV. Glandula pituitaria cum pelvi & arteriis
carotidibus.

A. Glandula pelvim excipiens.

B. Pelvis seu infundibulum.

CC. Arteria carotides.

DE. Arteria ramus in crasse meningis latus D. ejus ra-
mus alter ad nares E.

FF. Arteria in altera latere in duos ramos secta: in al-
tero vero rursus coeans.

G. Arteria crassam meningem perreptans portio.

H. Propago alia calvariam egrediens, & oculos petens.

FIG. XVI. Rete mirabile cum glandula, quemadmo-
dum in vitulorum, & bouum capitibus reperitur.

A. Glandula pituitaria.


BC. Arteria soporales calvariam ingredientes.

DD. Rete mirabile.

LIB. III.

TAB. XI.

FIG. XIII.



XIV.



XV.



XVI.



S 4 TAB.

TAB. X. FIG. IX. Cerebellum modicè è calvaria supra cerebri portionem manibus protractum, ac deorsum modicè inversum propendens, quo inferior superficies & spinalis medullæ cavitas conspiciantur, exhibet. & præter venarum quarundam & nervorum progressus, etiam primus & secundus duræ membranæ sinus aperti exprimuntur.

AA. Cerebri portio in calvaria & quidem ejus sedere reliqua.

BCD. Cerebelli partes tres reflexæ tenui meningē involutæ, ac dorsali medullæ connatæ.

E. Processus vermiformis posterior.

FGH. Spinalis medullæ initium è calvaria ad H. procidens.

I. Ventriculi quarti pars potior spinali medullæ insculpta sive sinus spinalis medullæ, calami mucroni non ab similis.

KL. Vasa in cerebellum à vasis, quæ in primum & secundum sinum exhauriuntur K. alia à crassa meningē in tenuem sparsa L.

MN. Nervorum par quintum & sextum.

O. Apex quarti ventriculi calami mucroni similis.

PQR. Calvariæ sinus posterior pro cerebelli sede, crassa meningē adhuc obductus.

SSTT. Sinus primus & secundus crassæ meningis.

FIG. X. Cerebri portio, à qua spinalis medullæ initium sumit: dein cerebellum à spinali medullâ ademptum cum testibus, natibus,

glandula pineali, & quarto ventriculo sive cavitate spinalis medullæ, quæ cum cerebelli cavitate quartum ventriculum efformat, simul ostenduntur.

AA. Spinalis medullæ partes à cerebro sectæ.

BC. Sedes, quibus hæc medulla cerebello erat adnata.

DE. Testes, quod illis glans, penis quasi modo incumbit.

FG. Nates, quod meatus ex tertio ventriculo in quartum terminus, podici conferri possit.

H. Glans pinealis.

I. ad K. Ventriculi tertii pars ad quartum sub testibus.

KLMN. Ventriculi quarti pars in medullâ incisa.

O. Ventriculi quarti mucro.

P. Sedes, qua spinalis medulla calvariæ egreditur.

FIG. XI. Calvariæ portio crassa meningē adhuc obducta, quam nervi optici, pelvis & arteriæ carotides transeunt.

AB. Nervorum opticorum portiones.

CD. Arteriæ carotides.

E. Pelvis propendens.

F. Foramen crassæ meningis, per quod pelvis glandulam petit.

GG. Nervorum paris secundi portiones.

FIG. XII. Pelvis erecta, & ductus quatuor pituitam à glande deferentes.

A. Glans. B. Pelvis.

CDEF. Meatus ad pituita egressum.

LIB. III.

TAB. XII.

FIG. XVIII.



T

TAB.

TAB. XIII. FIG. XX. Caput in aurem reclinatum, calvariae internam basin crassa meninge tectam exhibet: tanta cerebri & spinalis medullae portione asservata, quanta nervorum cerebri paribus videndis sufficit.

AA. Cerebri medullae pars cum spinalis medullae initio.

BB. Opticorum nervorum portio, quae calvariam egrediuntur.

CC. Pelvis pituitae cerebri excipiens.

D. Meatus a tertio ventriculo in pelvim pituitae deducens.

EE. Arteriae carotidis rami juxta pelvim duram membranam perforantes, & calvariam ingredientes.

G. Nervorum secundum par oculos movens.

H. Tertia conjugatio, seu tertii grandior radix.

I. Nervorum, quartum par, aliis tertium par (notandum I. denotare non eundem ramum, qui L. insignitus est, sed eum, qui proxime ipsi K. incumbit.)

K. Nervorum cerebri quartum par.

L. Nervorum quinti paris minor radix.

M. Nervorum cerebri quintum par.

N. Nervorum sexti paris principia ac furculi
(notabis errasse sculptorem, dum nervo M. notato etiam N. adposuit, cum proximi sit nervi liera.)

O. Nervorum septimi paris principia.

FIG. XXI. Cerebellum è calvaria exemptum, à spinali medulla evulsum, & supinum jacentens exhibet, cum processibus vermiformibus separatis.

AB. Cerebelli dextra & sinistra pars, membranis denudata.

CD. Mediae cerebelli partis anterior & posterior regio.

EE. Processus vermiformis anterior E. posterior F.

GG. Cerebellum hoc loco spinali medulla adnascebatur.

H. Sinus cerebelli, qui cum spinali medulla sinu, quartum ventriculum constituit.

IK. Processus vermiformis anterior I. posterior K.

TAB.

LIB. III.
FIG. XX.

TAB. XIII.



.XXI.



T 2 TAB.

TAB. XIV. FIG. I. Cerebri & cerebelli à membranis liberatorum basis, ut nervorum, qui cerebri dicuntur, exortus ostendantur. FIG. II. Cerebri, cerebelli spinalis medulla & nervorum latus unum exprimit.

AA. 1. 2. Cerebrum.

BB. 1. 2. Cerebellum.

CC. 1. 2. Tubera cerebri, quibusdam mammillares processus.

DD. 1. 2. Spinalis medulla ex cerebri basi principium.

EE. 1. 2. Spinalis medulla pars calvariam egressura.

FF. 1. 2. Processus mammillares olfactui inservientes.

GG. 1. 2. Nervi visoris, seu primum par cerebri.

HH. 1. 2. Visoriorum nervorum coitus.

II. 1. 2. Oculi tunica, in quam visorius expanditur & degenerat.

Juxta KK. 1. 2. Nervorum secundum par pro motu oculorum.

LL. 1. 2. Nervorum tertium par, vel tertii paris minor radix communiter Anatomicis.

MM. 1. 2. Nervorum quartum par, seu tertii paris major radix communiter Anatomicis.

NN. 2. Nervorum tertii paris propago cutem musculosam frontis accedens.

OO. 2. Ejusdem propago ad maxillam superiorem.

PP. 2. Ejusdem propago in narium tunicam degenerans.

QQ. 2. Ejusdem propago in musculus temporalem.

RR. 2. Nervi quarti paris ramus capreoli instar convolutus, qui in tempor. musculus inseritur.

SS. 2. Ejusdem propago ad superiores dentes & gingivas, foboles seriatim distribuens.

TT. 2. Ejusdem propago ad maxillam inferiorem.

V. 2. Propaginis T. ramus ad inferius labrum.

XX. 2. Surculi à propagine T. in denium inferiorum radices diffusi.

YY. 2. Nervi quarti paris in lingua tunicam absumptio.

ZZ. 1. 2. Nervorum quartum par vulgo Anatomicis (nobis vero ab ipsorum tertio non videtur separandus) in palati tunicam.

aa. 1. 2. Nervorum quintum par ad auditum.

φ. 1. 2. Nervus auditorius in cavitatem ossis petrosi expansus.

* Nervi quinti paris pars durior supra asteriscum, quæ pro distincto nervo censi possit.

b. 1. 2. Ramulus ex durior parte quinti paris: ex * producendus erat.

c. 1. 2. Ramulus ex durior parte quinti paris inferior.

d. 1. 2. Nervum hunc quinto pari adscribunt, cum tamen planè distincta sit conjugatio, quam octavam facimus ne ordinem aliorum interrumpamus.

e. 1. 2. Nervorum par sextum.

f. 2. Hujus ramus ad cervicem illig, incumbens muscululos accedit.

g. 2. Ramulus alter ad Laryngis muscululos in descensu transversim propagatus.

h. 1. 2. Nervorum cerebri septimum par.

i. Septimi paris cum sexto unio.

l. 2. Septimi propago ad muscululos ab appendice styloide pronatos.

m. 2. A septimo pari ad lingua, hyoidis & laryngis muscululos.

op q. 1. Foramina tria, per quorum o. pituita ex tertio ventriculo pelvim accedit: p q. transitu arteriarum carotidum ad ventriculos.

TAB.

LIBRI TERTII

FIG. I. TAB. XIV.





FIG. II.



T 3

T A B.

TAB. XV. FIG. I. *Spinalis medulla propria dicta vera effigies, cum suis membranis & nervis ab ea prodeuntibus.*

A. *Spinalis medulla principium, ubi cranioper occipitii foramen magnum jam excidit.*

B. *Ejus in lumborum vertebrae crassities.*

C. *Ejus in filamenta diviso.* D. *Septem cervicis nervi.*

à D. ad E. vel à 7. ad 19. *dorsi nervi.* Ab E. ad F. *Lumborum nervi.*

Ab F. ad G. *Offis sacri nervi.* H. *Medulla finis in filamenta.*

IKL. *Ostenduntur quidam nervi, quomodo aliquot filamentis à medulla prodeant.*

MM. *Nodi ostenduntur, qui ex filamentorum conjunctione oriuntur.*

NO. *Membrana medullam investientes.*

FIG. II. *Spinalem medullam nudam, tam in*

cranio, quam extra cranium existentem, prout alij proposuerunt, cum suis nervis exhibet.

A. *Spinalis medulla initium in cranio.*

3. 4. 5. 6. 7. *Charact. ostendunt ex Vesalii etiam sententia, quomodo haec paria, quae cerebri dicuntur, ab ipsa medulla in cranio adhuc existente originem ducant.*

B. *Ipsius è calvaria egressus.*

C. *Funiculi in quos dividitur.*

D. 7. *Cervicis medulla & nervorum paria septē.*

E. 19. *Thoracis medulla nervorum paria duodecim.*

F. 24. *Lumborum medulla, & nervorum paria quinque.*

G. 30. *Offis sacri medulla, & nervorum paria sex.*

H. *Spinalis medulla extremum.*


T A B

LIB. III.

TAB. XV.

FIG. II.

FIG. I.



T 4


TAB.

TAB XVI. & XVII. Cum iisdem utantur characteribus conjunguntur: nam Tab. XVI. spina vertebras & inde prod. untes nervos anteriore facie, quemadmodum Tab. XVII. posteriorem partem exhibet.

- A 1.1. Spinae medulla vertebralis subiens.
 B C. 2. Cervicis vertebra septima.
 ch. 1.1. ad 30.1. Vertebrae totius spinae indicans.
 C D. 2. Inter has thoracis vertebra duodecima.
 D E. 2. Lumborum vertebra quinta.
 E 2. Sacrum os.
 F 2. Primi paris nervorum spinalis medulla posterior propago.
 G 1.2. Hujus distributio in musculos capitis.
 H. 1. Primi paris anterior propago.
 I K. 2. Secundi paris posterioris propaginis sursum distributi ramus tenuior l. crassior K.
 L. 2. Coitus tertii paris rami cum secundi paris ramo K.
 M M. 1.2. Secundum par in capitis cutim ad cervicem usque distributum.
 N 1. Secundi paris propago anterior.
 ch. 3. in 1. Tercium par, & tertia vertebra.
 O. 1.2. Tertii paris ramus posterior, retrorsum primum, deinde antvorsum sub musculus reflexus, quem ductum omnes parium rami ad 24. imitantur.
 P. 1. Tertii paris ramus anterior quadripartitus.
 Q. 1. Primus ramus ad musculos cervicem flectentes.
 R. 1. 2. Secundus cum quarto pari coit.
 S. 1. Tertius ramus cum ramo K. commixtus.
 T. 1. 2. Quartus ramus ad illius loci musculos transversis vertebrarum processibus commissos.
 ch. 4. in 1. Quartum par cum quarta vertebra.
 V. 1. 2. Quartii paris ramus posterior.
 X. 1. 2. Quartii paris ramus anterior tripartitus.
 Y. 1. Primus ramus propaginem R. admittens.
 a. 1. Secundus ramus musculos petens.
 b. 1. Tertius ramus quinti paris portionem e. accedens.
 ch. 5. in 1. Quintum par.
 c. 2. Quinti paris ramus posterior.
 d. 1. 2. Quinti paris ramus anterior.
 e. 1. Hac portio diaphragmaticum nervum potissimum constituit.
 f. 1. 2. Ramus nervi d. summum humerum perreptans, sub quo s. boles scapulam adeunt.
 g. 1. 2. S. boles nervi f. ad cutim summi humeri.
 h. 1. 2. nervi f. ad brachii musculum secundum.
 i. 1. 2. Ramus al. r. eidem & cuti insertus.
 ch. 6. in 1. Sextum par.
 k. 2. Sexti paris ramus posterior.
 l. 1. Sexti paris ramus anterior.

- m. 1. Surculus illius ad diaphragmaticum constituendum.
 n. 1. 2. Diaphragmaticus nervus ex tribus surculis b e & m. conflatus.
 o. 1. 2. Hujus in diaphragma distributio.
 p. 2. Sexti paris ramus scapulae cavitatem petens.
 q. 1. 2. Rami l. implexus cum vicinis ramis, cujus portio brachium adit.
 ch. 7. in 1. Septimum par nervorum.
 r. 2. Septimi paris ramus posterior.
 s. 1. Septimi paris congressus cum ramis proximis.
 t. 1. 2. Hujus surculi ad scapulae & brachii musculos.
 ch. 8. in 1. Octavum par, seu thoracis primum.
 u. 2. Octavi paris ramus posterior.
 x. 1. 2. Octavi cum septimo coitus à quo in brachium nervi aliqui.
 y. 1. Octavi paris ramus pectoris summum petens.
 a. 2. Surculi ab octavo pari seu quarti nervi brachii ad euntes, in hujus loci musculos.
 ch. 9. in 1. Nonum par nervorum.
 β. 2. Noni paris ramus posterior.
 δ. 1. Hujus ramus anterior.
 ζ. 1. Surculi ab hoc ad thoracis musculos.
 ch. 10. ad 20. in 1. Paria nervorum ad costarum intervalla.
 η. 1. Intercostalium nervorum surculi ad radices costarum, costalem nervum à sexto pari cerebri enatum, augentes.
 θ θ. 1. Rami ab intercostalibus ad musculos thoracis insertos.
 ι. 1. Rami ad musculum pectoralem seu brachii primum.
 κ. 1. Rami ad dicti musculi humiliorum sedem.
 λ. 1. Rami ad musculos obliquos abdominis.
 μ. 1. Ad brachii musculum latissimum dictum.
 ν. 1. Ramus ad papillam.
 ο. 1. Rami à 18 & 19. pari ad principium musculi s. moris lumbalem seu sextum.
 π. 1. Brachii primus nervus in cutem sede externa.
 ε. 1. 2. Brachii secundus (sculptor posuit p.)
 σ. 1. Ab hoc nervi ad primum cubiti musculum seu brachii primum.
 τ. 1. 2. Brachii tertius.
 υ. 1. Ejus ramus ad cutim brachii.

TAB. XVI. LIB. III.




F. TAB.

- Φ.1. Ramulus ad cubiti musculum 2. seu brachium.
 Ξ.1. Ad cutim anteriorem brachii.
 Ψ.1. Congressus tertii nervi cum secundo.
 ω.1. Secundus cum tertio post conjunctionem deorsum repens.
 Γ.1.1. Secundi nervi surculus ad secundum musculum radii seu supinatore longiorem.
 Δ.Δ.1.1. Secundi nervi superior ramus ad brachiale excurrentes ad pollicis primum internodium.
 Θ.1.1. Secundi nervi medius ramus.
 Α.1.1. Ejus progressus ad manum usque.
 Ε.1.1. Secundi nervi ramus inferior.
 Π.Σ.1.1. Hujus rami duo ad internam manum.
 Φ.1.2. Quartus brachii nervus.
 Γ.2. (pro Ψ) Ab hoc nervi ad musculos cubitum extendentes.
 Ω.2.2. Ramus ad cutim brachii parte posteriore.
 32.2. Ad externam brachii cutim.
 33.2. Ramus cubitum externum ad brachiale perreptans.
 34.2. Quartus nervi ad cubitum bipartitio.
 35.2. Ramus elatior dictae divisionis.
 36.2. Hujus in anteriorem pollicis, indicis & medii sedem surculi.
 37.2. Divisionis dictae humilior ramus ad ulnam.
 38.2. Ab hoc soboles ad musculos ab externo humeri tibi-bera natos.
 39.40.41.2. Rami tres ad musculos ab ulna enatos.
 42.2. Finis rami 37. juxta carpi articulum.
 *1.2. Quintus brachii nervus.
 43.1. Tertius & quintus nervorum brachium accedentium soboles ad musculos cubitum internum occupantes.
 44.1. Ramus 3. nervi ad volam & digitos.
 45.1. Ramus 5. nervi ad internam manum.
 46.1. Propago rami 45. ulna attonsi ad externam manum.
 81.2. Sextus brachii nervus.
 47.1. Ejus finis juxta manus articulum.
 48.1. à Sexto nervo surculi passim ad cutim.
 49.20. ad 24.1. Nervorum paria quinque à lumborum vertebra.
 49.1. Ramus ad testes à 20. pari.
 50.50.1. Musculorum abdominis nervi.
 51.1. Ab his soboles ad musculum latissimum brachii.
 52.52.2. E lumborum vertebrae rami posteriores.
 49.25. ad 30. Nervorum paria sex ab osse sacro procedunt.
 53.1. Ramus par 25. ad coxendicis internam.
 54.55.2. Ramus coxendicis externa perens absque conjugatione ad clunium cutim & musculos.
 *2. Peni communicatio nervus hinc prodit.
 56.1.2. Spinalis medulla finis.
 57.1. Cruris primus nervus.
 58.1. Ab hoc rami ad cutim.
 59.1. Ab hoc ad musculos.
 60.1. Cruris secundus nervus.
 61.61.1. Ab hoc rami ad cutim.
 62.1. Pedis summum accedens ramus.
 63.1. Geni imbricantes surculi rami 61.
 64.1. Secundi nervi ramus ad musculos.
 65.1. Ab hoc rami ad femoris musculum quintum seu tricipitem.
 66.1. Cruris tertius nervus.
 67.1. Surculus ad musculos occupantes pubis ossis foramen.
 68.1. Ramus ad cutim internam femoris.
 69.1. Tertius nervi portio ad musculos.
 70.1. Hujus portio ad tibiam siccantem musculum secundum.
 71.1.2. Cruris quartus nervus omnium crassissimus.
 72.1.2. Hujus ramus ad cutim femoris parte posteriore magna ex parte diffusus.
 73.1. Alius ad musculos à coxendicis appendice natos.
 74.1. Ramus ad quartum tibiae musculum & in cutim.
 75.1. Surculi à quarto pari ad capita musculorum pedis.
 76.1. Quartus nervi divisio in poplite in duos truncos.
 77.1. Exterior ac gracilior truncus.
 78.78.1. Hujus ramus ad cutem tibiae parte anteriore ad minimum usque digitum.
 79.1. Alius musculus insertus.
 80.1. Ramus cutim parte anteriore tibiae implicans rami 79.
 81.1. Rami 79. pars ad pedis musculos.
 82.1. Quartus nervi interior truncus.
 83.83.1. Ramus internam tibiae sedem sub cute in pedis humiliora perreptans.
 84.1. Ramus trunci 82. posteriorem sura sedem sub cute pervadens.
 85.85.1. Ramus trunci 82. anteriora tibia ad pedis superiora perreptans.
 86.1. Ramus trunci 82. posteriora tibia pervadens & musculi distributor.
 87.1. Interioris trunci reliquum in pedis digitos.

LIB. III.

TAB. XVII.



F 2

TAB.

TAB. XIIX. Cerebrum una cum cerebello, spinali medulla & nervis totius corporis proponit.

- A. Cerebri partem ad narium summum ostendit.
 B. Partem eam, qua ad latus sinus consistit.
 C. Cerebri partem posticam ostendit.
 D D. Cerebellum E. Pro. effus maxillaris dexter.
 F. G. Nervi optici ortus F. eorum conjunctio G.
 H. Tunica, in quam opticus abjuntur.
 I. Nervorum cerebri secundum par.
 K K. Tertiis parvis radix minor.
 L. Crassior ex communi sententia.
 M. Quartum par nervorum.
 N. Quinti parvis gracilior radix.
 O. Eiusdem insignior radix.
 P. Membrana a auris, quam tympanum vocant.
 Q R. Quinti parvis radices majoris propagines.
 S T. Nervorum par sextum S. Septimum par T.
 V. Spinalis medulla ex cerebri basis medio initium.
 X. Septi transversus nervus dexter abscissus.
 T. Humeri summum perreptans ramus à quinto pari.
 Z. Brachii nervus primus, à quo ramus in cutem.
 A. Brachii nervus secundus, & ramus in cubiti primum musculum.
 B. Brachii nervus tertius, & propago antè in cutem.
 C. Ramulus à nervo tertio ad cubiti musculum fluctantium secundum.
 D. Nervi secundi cum tertio congressus.
 E. Ramulus à tertio ad radii musculum secundum.
 F. Nervi secundi distributio in duos ramos impares.
 * Divisionis huius ramus minor secundum radium cuti ad pollicem expositus.
 a. Spinalis medulla sedes, qua calvariam egreditur.
 1. 2. & c. Nervorum triginta paria à spinali medulla, hi characteres indicant: septem cervicis: duodecim thoracis: quinque lumborum, & sex ossis sacri.
 b. Ramus secundi nervi brachii crassior in partes duas scissus.
 c. Nervi tertii rami in musculos cubiti sparsi.
 d. Nervi à tertio pari ad pollicem, indicem & medium.
 ee. Brachii nervus quartus.
 f. Huius ductus per humeri interiora.
 g. Huius rami tripartitio, ubi cubitum attingit.
 hh. Cuti externa cubiti rami à quarto distributus.
 i. Ramus elatior divisionis quarti nervi
 k k. Manus externam sedem petens Ramus i.
 ll. Ramus humilior divisionis nervi quarti cubiti posterio-rem sedem pervadens.
 m. Brachii nervus quintus.
 n. Huius nervi rami à sparsi in musculos ab interno brachii ossis tuberi pronatos.
 o o. Ramus quinti nervi manus & digitorum internam se-


dem accedens.

- p. Rami o. soboles ad manus & digitorum externam se-
dem.
 qq. Brachii nervus sextus, & ipsius sub cute ductus.
 rr. Intercostales nervi illic praecisi, ubi cum costis antrosum
reflectebantur.
 ss. Rami posteriora petentes hic undique obvi.
 tt. Nervi thoraci incumbentes musculos advenientes.
 uu. Nervorum rr. cum ramo à sexto pari cerebri descen-
dente commixtio.
 xx. Nervi à lumbis in abdominis musculos & cutim dedu-
cti.
 y. Ramus tertium petens hic abscissus.
 z. Nervus femoris musculum sextum petens.
 e. Cruris nervus primus.
 αβ. Huius furculus ad cutim α. & musculi insertus β.
 γ. Cruris nervus secundus.
 δδδ. Ab hoc nervus cuti ad pedem usque expositus,
& per crura interiora delatus ad pedis exteriora sub
cute excurrentes.
 e. Ramus secundi nervi ad musculos.
 ζ. Cruris nervus tertius.
 ηθ. Huius furculus ad cutim η. ad musculos θ.
 ι. Cruris nervus quartus.
 κκ. Nervorum à sacro osse propagines anteriores.
 λ. Spinalis medulla finis.
 μ. Ramus à quarto nervo musculi à coxendice pronatis
insertus.
 ν. Ramus alius ad cutim posteriorem femoris.
 ξ. Propago in tibia musculum quartum & ad cutim
geni.
 οο. Nervi musculorum pedis capita petentia.
 πρ. Cruralis nervi quarti in truncos duos diviso, ac
minorem: ρ vero maiorem notat.
 σ. Ramus à trunco π in cutem tibia externam ad par-
vi digiti extremum dispersus.
 τν. Propago trunci π. ad musculos τ: alius ad cutim
tibia anteriorem ν.
 φφ. Ramus trunci ε ad tibia interna & pedis cutim,
ad pollicem usque singulis digitis furculos offerens.
 χ. Soboles trunci ε. ad tibia posteriorem cutim.
 ψ. Ramus totius trunci ρ. ad tibia & pedis antio-
rem partem.
 ω. Trunci ρ ad pedem descensus.

TAB.

LIB III

TAB XVIII—



V 3

7 A B.

TAB. XIX. FIG. I. Exhibet cerebrum è calvaria exemptum, crassa meninge denudatum & inversum, cujus pars dextra spinalis medulla, & septem parium nervorum originem secundum vulgaram opinionem proponit: pars verò sinistra eorundem verum exortum ostendit.

AAAA BB. Cerebrum AAA. Cerebellum BB.

CC. Cerebri tubera, quibusdam processus mammillares.

D. Dorsalis medulla principium reliquæ cognitum.

E. Eius terminus in calvaria.

F. Olfactus organi principium vulgo statutum.

H. Nervus opticus ascripta origo.

I. Tunica, cui nervus opticus inseritur.

2. Secundum par nervorum oculis motam præbens.

3. 4. 5. 6. 7. Nervorum paria, quibus etiam Vesalius ortum ex dorsali medulla initio tribuit.

8. Tertii parus ramus Anatomicus, qui antrosum fertur, nobis verò tertium par.

9. Quinti paris nervorum ramus Vesalius, nobis octavum par.

10. 11. 12. 13. Cerebri cortex, nam 8. 9. 10. 11. est ipsius cerebri medulla, quæ non continua sunt, sed contigua, ut ex altera parte colligitur.

a b. Opticus nervus totus, & ubi b. est reflectio nervi in posteriorem partem spinalis medullæ.

c. Nervorum opticorum concursus.

d e. Secundi nervi pars communiter ignota, cuius principium e. ostendit.

f g h. Medulla cerebri oblongata, in spinalem medullam desinens.

k. Processus transversalis cerebelli, qui pons dicitur.

ii. Auditorius nervus ex hoc processu.

lm. Olfactus organi ductus inter supremam & mediam cerebri prominentiam latitans, & ubi l. ibi origo est.

n. Cerebri mediæ prominentiæ à reliquo cerebro dissecta.

o. Principium posterioris prominentiæ cerebri, unde medulla dissecta fuit.

p. Intercussatio, quam opticus nervus cum nervo oculorum motorio facit.

FIG. II. Cerebrum inversum, & ejus partes in basi invicem distractas, spinalis medulla ex cerebro & cerebello exortum, ventriculi amplitudinem, & nervi optici ex medulla originem, proponit.

1. 2. 3. Spinalis medulla dimidium in latus suum distractum.

4. 5. Eiusdem medullæ cum ventriculo conjunctio.

6. Spinalis medullæ portio ex cerebello nascentis.

7. Nervus opticus in posteriore regione spinalis medullæ reflexus, & ventriculi cavitatem ingrediens.

8. 9. 10. Cerebelli pars sinistra, à qua dextra remota est.

11. 12. Rima ventriculorum secundum ingrediens, partim à corpore fornicis, partim à spinalis medullæ interiore parte formata.

13. 14. Cerebri dextra & sinistra partis conjunctio per corpus callosum.

a. Spinalis medullæ pars dextra in suum latus sursum reflexa, quod ipse exortus in ventriculi cavo conspicitur.

b. Hujus medullæ principium ventriculi cavum respiciens.

d e. Nervus opticus reflexus circa spinalis medullæ radicem, cuius origo * ostenditur.

* Nervus optici prima origo.

f g h. Ventriculi cavitates tota, s. anteriorem, g. mediam,

h. posteriorem cavitatem in cerebro exsculpsam notat.

i k. Plexus choroides dictus, circa radicem spinalis medullæ in ventriculo.

lm. Cerebri basis portio cum spinali medulla constituens rimam, qua ventriculorum ingreditur.

n o. Corporis conjungentis duas cerebri portiones, longitudo.

p q r. Cerebri portiones reflexæ, quod ventriculi cavitates conspicitur.

LIB. III.

TAB. XIX.

FIG. I.






FIG. II.



V 4 TAB.

- TAB. XX. FIG. I. *Oculum integrum nulla parte dissectum cum suis ossibus, palpebris & ciliis representat.*
 FIG. II. *Oculi palpebrae excoriatae proponuntur.*
 FIG. III. & IV. *Musculos palpebrarum exhibet.*
 FIG. V. *Palpebras separatas & inversas.*
 FIG. VI. & VII. *Oculi integri cum suis musculis & calvaria extracti, & palpebris liberati figuram ostendit.*
 FIG. VIII. *Oculi globi anterior sedes proponitur.*
 A. I. *Frontis os.*
 B. I. *Maxilla superioris os.*
 C. I. *Os jugale.*
 D. I. *Nasus.*
 E. I. 3. *Palpebra superior.*
 F. I. 3. *Palpebra inferior.*
 aa I. *Tarsi.*
 bb I. *Pili Palpebrarum.*
 c. I. 6. *Canthus major.*
 d. I. 6. *Canthus minor.*
 e. I. 5. 6. 7. 8. *Membrana adnata dicta, quae in 6. 7. 8. venis intertexta,*
 f. 7. 8. *Iris.*
 g. I. 2. *Carvum superioris palpebrae & in 7 & 8. pupilla.*
 h. I. 2. *Subcarvum in inferiore palpebra.*
 mn. 4. 7. 8. *Foramina duo in angulo majore, quae puncta lacrymalia dicuntur.*
 o. 7. *Nervus opticus.*
 pq 7. *Mentinx tenuis p. crassa q. opticum investientes.*
 r. 7. 8. *Caruncula in angulo interno.*
 G. *Palpebrarum cartilaginee sive Tarsi.*
 HH. 2. *Palpebrae musculi orbiculares excoriatae.*
 I. 2. *Cornea tunica a iride & pupillam continens.*
 K. 3. 4. *Palpebrae orbicularis musculus seorsim positus at in 4. totam palpebram ambiens proponitur quem Vesalius in duo divisit.*
 L. 4. *Hoc loco Vesalius secundum constituit.*
 M. 3. 4. *Palpebrae rectus musculus seorsim positus.*
 N. 5. *Palpebrae exterior pars.*
 O O O. 5. *Palpebrae conjunctiva & interior facies.*
 P. 6. *Ossis sphenoidis portio interna, per quam nervus opticus transit.*
 Q. 2. 6. *Crasse meningis portio.*
 R. 6. *Nervorum opticorum concursus.*
 S. 6. *Nervus oculi motorius.*
 T. 6. *Adeps inter musculos.*
 V. 6. 7. 8. *Adnata tunica pars palpebris subten-
sa.*
 X. 6. *Membrana à pericranio ad tarsum.*
 Y. 7. *Musculi oculorum unius lateris.*



TAB. XXI. FIG. I. Oculi plerosq; musculos in sua sede exhibet.

FIG. II. oculum sursum revolutum, quo alii musculi conspiciantur, ostendit.

FIG. III. & IV. musculos oculi separatos posteriore & anteriore parte cum suis nervis proponit.

FIG. V. Bovis oculus est cum suis musculis jam separatis prout nobis Vesalius exhibuit.

C B. Palpebra A. Tarsus B.

A. Palpebram attollens musculus.

D. 1. 3. 4. Musculus oculi rectus superior: in 3. & 4. cum nervo.

E. 2. 3. 4. Musculus oculi rectus inferior: in 3. & 4. cum nervo.

F. 1. 2. 3. 4. Musculus oculi rectus externus.

G. 1. 2. 3. 4. Musculus oculi rectus internus.

H. 1. 2. 3. 4. Musculus obliquus superior, seu trochlea, cujus tendo a. trochlea b. notatur.

I. 2. 3. 4. Musculus oculi obliquus inferior.

K. 1. 3. Nervus opticus.

a. 1. 2. Musculi obliqui superioris tendo.

b. 1. 2. Trochlea dicta, cartilago exigua, per quam tendo hic transit, & in 3. & 4. ab offere revulsa proponitur.

c c c c c. 3. 4. Nervi oculorum motorii.

α β. 5. Palpebra musculus secundus in oculi cavitate latens, cujus latus tendo β. in palpebram inseritur.

γ. 5. Palpebrarum pili sive Cilii.

δ ε. 5. Musculi duo recti oculum sursum deorsumq; trahentes.

ζ η. 5. Recti duo ad latus dextrum & sinistrum moventes.

θ. (Sculptor ponit B.) 1. 5. obliqui duo leviter circumagentes.

κ. 5. Musculus septimus, qui in plures dividi potest.

λ. 5. Nervus opticus.

T A B.

TAB. XXI.

LIB. III.

FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.



FIG. IV.



FIG. V.



TAB. XXII. FIG. I. Oculi membranas
& humores ad veri oculi imitationem per
lineas ductas exprimit.

FIG. II. Corneam tunicam cum portione
nerui optici.

FIG. III. Eandem sectione transversa divi-
sam.

FIG. IV. Uveam cum portione nervi optici.

FIG. V. Uvea humana.

FIG. VI. Cornea uvea & choroides. VII.

Uvea interior superficies. VIII. Cornea
posterior pars cum retina dicta ab oculo sepa-
rata. IX. Hyaloides tunica. X. Humores tres
simul juncti. XI. Chrystalloidis anterior se-
des. XII. Chrystallinus tunica adhuc te-
ctus XIII. Chrystallinus nudus à latere
positus. XIV. Chrystallinus humanus. XV.
Ejus tunica. XVI. Aqueus chrystallino su-
perfusus. XVII. Ciliares processus per hy-
alidis tunica anteriora radiatim sparsi.
XVIII. Vitrei humoris sedes. XIX. Aquei
humoris sedes. XX. Vitreus chrystallinum
continens.

FIGURA I.

a b c. Chrystallinus humor a. Vitreus b. Aque-
us c.

d. Tunica adnata, seu potius ligamentum.

e. Cornea tunica pars opaca.

f. Uvea tunica tenui meninge

g. Retiformis tunica, seu nervus opticus ex-
positus.

hi. Hyaloides h. Chrystalloides tunica i.

kk. Processus ciliares.

l. Impressio uvea à crassa tunica abscedens.

m. Cornea tunica pars crassa meningis.

nn. Adeps inter musculos.

o. Nervus opticus.

p q. Crassa meninx p. tenuis meninx q.

rr. Musculi.

FIGURARUM Sequentium earumq. lite-

rarum explicatio.

a. 2. 4. 8. Nervus opticus.

b. 2. 4. Tenuis meninx nervum opticum ve-
stiens.

c. 2. 3. Crassa meninx nervum opticum ve-
stiens.

d. 8. Cornea tunica pars posterior.

e. 8. Retina dicta tunica conglobata.

f. 2. 3. Iris oculi.

g. 2. 3. Oculi circulus minor vel pupilla.

h. 2. 3. Vasa per crassam membranam dispersa.

i. 3. 6. Uvea tunica, at in 3. quemadmodum
vasa duram cum uvea conjungant.

k. 6. Cornea seu dura tunica revoluta.

ll. 3. 4. Fibra & vasorum filamenta, quibus u-
vea tunica cornea necitur.

mm. 4. 5. Uvea impressio, qua à cornea rece-
dit.

n. 4. 5. 6. 7. Pupilla.

oo. 7. Ciliaris processus.

p. 7. Uvea principium ex tenui meninge dilata-
ta, at p. in 17. ciliares processus per hyaloidis
anteriora sparsi.

r. 9. Hyaloidis sinus chrystallinum suscipiens.

si. 2. 15. Chrystalloidis tunica latitudo.

t. 12. 13. 14. 16. Chrystallini humoris pars poste-
rior spherica.

u. 11. 14. 20. Ejus pars anterior depressa.

x. 10. & 20. Vitrei humoris amplitudo.

y. 10. 16. 19. Aquei humoris amplitudo.


z. 10. Sedes qua vitreus ab aqueo humore, in-
terveniente hyaloide tunica, distingui-
tur.

a. 10. & 16. Sedes, qua uvea in aqueo humore
natat.

β. 18. Vitrei humoris cavitas, quae exempto
chrystallino humore remansit.

δ. 19. Aquei humoris cavitas ob eandem cau-
sam.

T A B.



TAB. XXIII. FIG. I. *Cutim capitis cum pinguedine, glandulis auribus subjectis, & musculis occipitis & auris exhibet.*

A A. *Cutis capitis cum pinguedine circa auris radices.*

B B. *Musculus auris à pericranio ortus.*

C. *Musculus triangularis cutim occipitis movens.*

D D D. *Vena jugularis externa rami.*

E. *Fibra auriculæ.*

F F. *Auriculæ circumferentia Helix dicta.*

G. *Aurium glandule, in quibus Parotides sunt.*

FIG. II. *Musculos aurium, superciliarum & maxillæ aliquot proponit.*

A. *Musculus semicircularis auris, auriculam sursum trahens, qui in priori figura B. notabatur.*

B C D E F G. *Musculus quasi tripartitus.*

H. *Auriculæ pars posterior, in quam musculus prædictus insigitur.*

I I I I. *Auris circumferentia ala dicta.*

K L. *Auriculæ fibra K. Tragus L.*

M M M. *Cranion pericranio & perioſtio, adhuc obductum.*

N N N. *Musculi temporalis circumferentia.*

O. *Pericranio adhuc tectus musculus.*

P. *Membrana dictum musculum integens detracta.*

Q Q Q. *Musculi temporalis pars carnosæ.*

R R. *Os jugale.*

S S. *Maxillæ inferioris processus acutus.*

T T. *Maxillæ inferioris pars.*

V. *Musculus masseter ab osse jugali, à quo oritur, hic remotus, quò temporalis implantatio in maxillæ processum pateat.*

X. *Musculus buccas constituens.*

Y. *Fibræ carneæ ad labia.*

Z. *Musculus labii inferioris.*

a a. *Supercilii musculus.*

b b. *Palpebra superior, musculum fibræ per transversim ductis, obtinens.*

c. *Supercilium musculo circulari donatum, quo oculi externæ partes valde constringuntur, Placentino.*

LIB. III.

TAB. XXIII.

FIG. I.



FIG. II.



X 4

TAB.

TAB. XXIV. Aures & aurium partes internas diversas exhibet. FIG. I. Aurē externam integram cum ossis temporum parte proponis.

- a. Auricula inferior seu fibra.
- bb. Auris circumferentia, quae helix nominatur.
- cc. Auris protuberantia interior, quae anthelix dicitur.
- d. Concha auriculæ.
- e. Tragus, in qua parte pili sunt.
- f. Antitragus.

FIG. II. Temporū os sinistrum per auditus instrumentum medium divisum, circa quod utrinque ductus alii qui separatim describuntur.

- A. Jugalis ossis pars.
- B. Sinus, cui maxilla inferior articulatur.
- CC. Petrosū os intra calvariam protuberans.
- D. Foramen ossis temporum secundum pro arteria carotidis transitu.
- E. Squama inter foramen hoc & cavitatem primam.
- FFF. Petrosum ossis cavernositas.

- aa. Meatus auris externus.
- bb. Canalis ossis ipsius meatus.
- c. Hic meatus tympanum adponitur.
- d. Meatus interior, in quem nervus inseritur.
- ef. Hic quoque os petrosū perforatur.
- ggg. Canalis nervi auditorii ab e. ad g. in osse temporum, hic tamen canalis ad osse lateris supra fig. f. separatim depictus est.

- αβ. Foramina duo in canali principio & fine.
- γδ. Foramina duo alia in externa & interna sede.
- h. Cavitās prima (alio secunda) à c. ad E. pertingens.
- ii. Canales duo primae cavitatis.
- k. Foramen elatius, quod stapedis osse clauditur.
- l. Foramen humilius semper apertum.
- m. Cavitās secundae in osse.
- 1.2.3. Cuniculi tres secundae cavitatis separatim depicti.
- n. Cavitās tertia sub hac superficie latens.

FIG. III. & IV.

- o.3. Os oblongum pyramidalem figuram exhibens.
- p.3.4. Tympanum membrana.
- q.3.4.* Annulus ossis ad tympanum * qui etiam separatim pingitur.
- r.4. Malleus r. Incus s. Stapes t.

FIG. V. ossis temporum portionem proponis, quod prope foramen auditorium per medium divisum conspicitur, quod nervi, ossicula & membrana appareant secundum Vesalii mentem.

- A. Foraminis auditorii pars.
- B. Membrana transversim foramini obducta.
- C. Ossiculum auditus malleolo assimilatum.
- DG. Nervus auditorius D. ejusque distributio per amplum foramen auditus G.
- E. Hujus nervi ramus per foramen cecum ad tempora.
- F. Ramus alius elabens foramen, per quod vena ingreditur.
- HI. Cavitas rotunda in cuius parte anteriore situm est ossiculum secundum I. notatum.

FIG. VI. Auditus organi vasa, membranas, ossicula & foramina delineat ex Platero.

- αα. Foramen primum organi auditus.
- β. Nervus auditorius bipartitus, ubi foramen quartum subit.
- γ. Vena jugularis cum nervea portione cavitatem primam.
- δ. Per illius foramen secundum juxta δ. pervadens.
- εε. Arteria cavitatem per foramen tertium subiens, & nervus per idem foramen elapsus.
- η. Eadem per illius foramen quintum procedens (Sculptor H. posuit.)
- ιι. Nervi quinti humilior portio in secundam & tertiam cavitatem pertingens.
- θθ. Nervi quinti elatior portio per canalem arctius sum ad ε. usque ubi clabitur, ductus.
- κ. Tympanum primam cavitatem claudens.
- λ. Ossiculatricia auditus invicem juncta.
- μ. Cavitās tertia seu buccinum organi auditus.
- ν. Cavitās secunda seu fodina tribus cuniculis excurrentibus (Sculptor V. posuit)
- ξπ. Canalis seu aqua ductus nervum & arteriam vehens foraminibus duobus se aperiens.

FIG. VII. & IX. Ossicula tria auditus humani & vituli conjuncta & separata exhibet.

pστ. Malleus p. Incus σ. Stapes τ.

FIG. IX. Musculum ab Aquapendente inventum exhibet.

TAB.

LIB. III

TAB. XXIV.

FIG. I.

III.



T

TAB.

TAB. XXV. FIG. I. Auricula anterior facies excoriata proponitur.

FIG. II. Ligamentum auriculae, quo cranio alligatur, exhibet.

A A. Auricula depressa.

B. Auricula pars posterior.

CCC. Ligamenti totius circumscriptio.

D. Jugalis ossis pars.

EEE. Cranii partes.

FIG. III. Processus petrosus disruptus cavitatem primam, & ejus foramina exhibens.

FIG. IV. & V. Labyrinthum, cochleam, duas fenestellas, & tres semicirculos exhibet.

F. 3. 4. 5. Foramen ovale, sive fenestra labyrinthi: in 4 effracta est.

G. 3. 4. Fenestra cochleae sive foramen tortuosum.

H. 3. Aqua ductus seu foramen caecum inter processum mamillarem, & appendicem styloideam.

I. 3. Processus mamillaris.

K. 3. Cavitas ad processum mamillarem, cujus facies exterior tota spongiosa est.

L. 3. Facies interna.

M. 3. Occipitis tuberculum primae vertebrae articulatam.

V. 3. Foramen sexti paris nervorum, vena jugularis interna, &c.

NNN. 4. 5. Semicirculi tres.

O. 4. 5. cochleae facies interior.

T A B I

LIB. III.

TAB. XXV.

FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.




FIG. IV.



FIG. V.



T 2 . T A L .

TAB. XXVI. *Figure Musculos in aurium
cavitatibus sitos, aurium cavitates aliquas,
tympani membranulam & circulum osseum
ipsi dicatum, cum tribus ossiculis auditus,
proponunt.*

a b Musculus externus, cuius insertio b.

c. Malleus tympani membrana tectus.

d. Membrana tympani.

e. Circulus osseus.

fg. Os mastoide f. Os temporis g.

h. Cavitatis primæ circulus.

i. Musculus internus, cuius bifidus tendo fig. 5.

ostenditur.

*k k. Pericranij portio sub osseo circulo pro-
gressa tympani membranam constitu-
ens.*

l. Malleus sub membranula latitans.

m. Incus.

*n. Circuli ossei e. imperfectio, ubi ipsius origo
& finis.*

op. Ossis jugalis pars o. Ossis basilaris pars p.

qr. f. Cavitatis primæ q r. stapes f.

tt. Conchæ circumferentia.

u. Protuberantia in media cavitate.


TAB.

LTB. III.

TAB. XXVI

FIG. I.

FIG. II.



T 3

T A B.

TAB. XXVII. FIG. I. Musculos frontis, palpebrarum & buccarum proponit. FIG.

II. Musculos nasi, labiorum, maxilla inferioris, & ossis hyoidis exhibet.

A. I. 2. Frontis musculus ejusq. recta fibra.

B. I. 2. Temporalis musculus.

α β γ 2. Ejus principium semicirculare.

C E. 1. Palpebrae musculus primus, totam palpebram occupans.

F D. 1. Nasale musculus tertius, qui & in labrum superius desinit.

G H. 1. Labii superioris musculus.

G. 2. Ossis jugalis sedes excarnis.

Γ. 1. Platysma myodes buccis & toti sedi inferiori expansus, sive latus musculus carnosus constans membrana, & praecipuus buccarum labiorumq. & anterioris collicutis motuum.

δ ε ζ θ. Circumscriptio hujus musculi.

I. 1. Os jugale. I. 2. Musculus masseter seu maxilla secundus.

K. Anterior 2. Cartilago nasi elatior.

L. 2. Nasale.

M. 2. Buccas formans musculus.

N. 2. Labii inferioris musculus.

O. 2. Musculi quinti maxilla inferioris portio.

P. 2. Os hyoides hac sede reponitur.

Q R. 2. Ossis hyoidis musculus primus, arteria aspera adnatus.

S. 2. Ossis hyoidis musculus secundus sub mentem.

T. Inferius 2. Ossis hyoidis musculus tertius maxilla attensus. T. superius 2. insertio musculi septimi capitis.

V V. 2. Ossis hyoidis musculi quarti duo ventres.

K. Posterior (pro X.) capitis musculus septimus, ejus insertio ad T. superius.

κ λ. 2. Masseteris principium ab osse jugali.

μ. 2. Insertio hujus musculi in maxillam inferiorem.

ν. 2. Nervulus ad frontem ex oculorum cavo excurrentes.

π. 2. Nervulus ad faciem propagatus.

ρ σ. 2. Musculi capitis septimi duo principia.

τ. 2. (posuit T.) insertio in mamillarem processum.

υ. 2. Clavicula.

φ. 2. Locus, ubi vasa permeant caput ad euntia & nervi ad brachium mittuntur.

LIB. III.

FIG. I.

TAB. XXVII.




FIG. II.



T 4

T A B

TAB XXIIIX. FIG. III. Musculos aliquot maxilla, laryngis & ossis hyoidis exhibet.

- A. Foramen frontis ossis in oculi sedis margine, nervulum tertii paris ad frontis & superioris palpebra musculos, emittens.
- B. Temporalis musculus.
- C. Labiorum fungosa substantia unâ cum nervis ad ipsam utrinque porrectis.
- E. Foramen in mala nervulum ad faciem, potissimum ad superius labrum & alam nasi ducens.
- G. Ossis jugalis portio hic ablata, ut temporalis cum massetere musculo coitus conspiciatur.
- I. Masseter musculus sive secundus maxillam inferiorem movens.
- K. Capitis musculi septimi abscisa portio.
- L. Os hyoides aliquot musculis nudatum.
- M. Buccinator.
- m. ossis hyoidis musculus sextus Fallopii.
- OP. Maxille musculus dictus digastricus.
- Q. Laryngis musculorum communium secundus.
- R. Laryngis musculorum communium primus.
- S. Capitis musculi secundi portio.
- VV. Ossis hyoidis musculi quarsi duo ventres.

X. Scapula musculus quartus sive levator.

Y. Thoracis musculus primus subclavicular.

FIGURA IV. Partes in ore latentes exhibet.

- A. Temporalis musculi portio.
- B. Maxille inferioris processus acutus, cui temporalis musculus inseritur.
- * Palatum
- C. Maxille inferioris sinistra pars.
- D. Maxille inferioris musculus quartus in ore latitans.
- E. Gargareon sive uvula.
- F. Glandule ad gargareonem elatiores sive Tonsilla.
- G. Glandule ad Laryngem humiliores.
- H. Capitis & colli musculi confusi.
- I. Lingua cum epiglottide.
- K. Arteria aspera à musculis detecta.
- L. Vasorum ad bronchia congeries, & primus dorsi musculus.
- M. Cervicis musculus secundus.
- NO. Maxille inferioris quintus musculus digastricus ab ortu pendens (partem mediam tendinosam, quæ N. & O. intercedit, sculptor omisit)
- X. Scapula musculus quartus à cervice prodiens.

TAB.

TAB. XXIII

LIB. III.

FIG. III.



FIG. III.



T A B.

- TAB. XXIX. FIG. I. *Maxilla inferioris anteriora sive partem externam: at II. ejusdem posteriora sive interiora ostendit.*
- A. Capitulum, quo ossi temporum articulatur.
 B. Cervix illius capituli.
 C. Processus, cui musculus temporalis inseritur.
 D. Sinus cedens musculo maxillae inferioris tertio.
 E. Asperitas, cui mansorius musculus inseritur.
 F. Foramen interius per quod tertii paris nervorum ramus ingreditur, & ad dentium radices fertur.
 G. Foramen exterius per quod nervulus egres-
 sus in labrum disseminatur.
 H. Asperitates, quibus muscoli implantantur.
- FIG. III. *Dentes unius lateris, tam superiores quam inferiores proponit.*
- AA BB. *Dentes superiores octo AA. inferiores BB.*
 C. *Molaris dentis basis.*
 D. *Incisorii dentis acies.*
 E. *Molaris dentis confracti cavitas*
- FIG. IV. *Os hyoides quod ad linguae radicem situm est, anteriore & posteriore sede cum processibus exhibet.*
- ABC. *Majoris ossis anterior sedes.*
 * *Extuberantia illius.*
 D. *Ejusdem posterior sedes quodammodo compressior.*
 EF. *Processus illius humiliores utrinque.*
 G. *Connexus humilioris lateris, cum latiusculo grandiori ossis hyoidis ossiculo.*
 HH. *Apex illorum, quibus laryngi junguntur.*
 IK. *Processus elatiores & subtiliores.*
 LMN. *Ossicula terna horum processuum.*
- FIG. V. *Os hyoides processibus seu cornibus carens, cujusmodi in humano cadavere reperimus.*
- OP. *Ejus anteriorem partem O. & posteriorem P. proponit.*


TAB.

LIBRI TERTII

181

LIB. III.

TAB. XXVIII.



Z 1

TAB.

TAB. XXX. & XXXI. FIG. I. & II.

Linguam cum suis musculis à corpore resectā proponit: 1. quidem latus dextrum, sic & secunda musculis nonnihil detectis.

FIG. III. Linguae corpus secundum longitudinem divisum, ejusque ligamentum, sublatis ab ea omnibus musculis, exhibet.

AAA. Lingua tunica toti ori, œsophago & asperæ arteriæ communi investita.

BB. Tunica os succingentis portio ab ore secundum maxillæ inferioris latera dissecta: pars enim supra lineam tunica infecta est, quæ autem sub linea est, nunquam succingitur.

C. Tunica ejusdem pars, à palati intimo cum lingua præcisa.

D. Musculi basiglossi seu primus musculus Vesalio: mihi quartus vel ossis hyoides sextus Fallopio.

E. Ceratoglossi seu secundus musculus Vesalio: mihi quintus.

F. Styloglossi seu tertius musculus.

G. Myloglossi, musculus quartus Vesalio.

H. Caro ex glandulis, seu nonus lingue musculus Vesalio.

II. Ligamentum lingue, cui lingua corporum fibrae continuantur.

KKLL. Linguae substantia musculoſa ipsiusque fibrae, à dextris KK. à sinistris LL.

TAB. XXXI. FIG. I. Laryngem proponit cartilagine scutiformi in duas partes incisa: verum scutiformis pars cum epiglottide inversa est, ut ex literis colligere est.

FIG. II. Larynx glottida sive rimulam ostendens.

aa. 1. Scutiformis dissecta.

b. 1. Epiglottidis cartilago rimulam tegens.

cc. 1. Arytenoides cartilago.

d. 1. 2. (At in 2. male q. positum) Glottis seu rimula.

ee. 1. Musculus internus rimulam efformans seu thyroides internus.

f. 2. Musculus aperiens sive crycoarytenoides posticus.

g. 2. Musculus transversus arytenoidis sive arytenoides.

TAB.

FIG. I.



FIG. III.



FIG. II.



TAB. XXXI.

FIG. II.

FIG. I.



- TAB. XXXII. FIG. III. *Laryngis aliquot musculos cum portione nervi proponit.* par 2.
 FIG. IV. *Laryngis musculos proprios omnes, rimulam, epiglottida & cartilagine ostendit.* i. 7. *Gula sive Oesophagus.*
 FIG. V. *Laryngis pars posterior cum musculis separatis cartilaginibus & epiglottide.* k. 3. 6. *Aspera arteria pars anterior.*
 FIG. VI. *Laryngis anterior facies cum nonnullis musculis.* l. 3. 7. *Musculi gulae, oesophagici, sive communium. par 3.*
 FIG. VII. *Musculum gulae transversum, item duos communes unum cum nervis recurrentibus exhibet.* m. 3. *Nervi, in musculorum communium par secundum, descendens portio.*
*b. 4. 5. 6. 7. Epiglottis; * 4. Ejus principium.* n. 3. 4. 5. 6. *Scutiformis cartilago in 4. diducta, quo glottis & musculi conspiciantur: in 5. scutiformis cavum ostendit: in 6. anterior & exterior facies.*
† 5. Radix & fundamentum ejus. o. 4. *Cavitas seu ventriculus, inter cartilagineum thyroideum & arythenoidem.*
c. 5. Arythenoides cartilago. r. 4. *Musculi crycoarythenoidei laterales, seu propriorum par tertium.*
d. 4. Glottis seu rimula, modulanda voci accommodata. ss. 4. 6. *Crycothyroidei antici, seu propriorum par primum: in 6. alter separatus est, alter in sua sede existit.*
e. 4. Musculus thyroides internus sive propriorum par 4. t. 5. *Crycoidis cartilaginis spina.*
f. 4. 5. Musculus crycoarythenoides posticus sive propriorum, par secundum. u. 6. *Cavitas media in cartilagine scutiformi, epiglottidis gratia efformata.*
g. 4. 5. Musculus Arythenoides sive propriorum par 5. xx. 7. *Bronchii musculi seu communium, par primum.*
h. 3. Musculus Hyothyroides sive communium, yy. 7. *Nervi recurrentes, sive vocales.*

LIBRI TERTII.

183

LIB. III.

TAB. XXXVII.

Fig. III.



Fig. IV.




Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VI.



Z 4

TAB.

TAB. XXXIII. FIG. I. *Laryngem integram ex suis cartilaginibus tribus compositam, cum osse hyoide & fistula portione exhibet.*

FIG. II. & III. *Cartilaginem thyroideam seu scutiformem: at*

IV. V. VI. *Cartilaginem crycoidem seu innominatam: &*

VII. IIX. IX. *Cartilaginem arytanoidem. sic*

X. *Epiglottidem à sculptore minus recte sculptam, praesertim propter pediculum appositum: tandem*

FIG. XI. *cartilaginem bronchii proponit.*

ABB. I. *Oshyoides A. ejus processus BB.*

C. I. *Tubercula cartilaginea & ligamenta membranosa alternatim posita, quibus scutiformis processibus jungitur.*

D. I. *Scutiformis cartilago lateralis.*

F. 2 & 3. *Hujus faciem anteriorem & posteriorem commonstrat.*

à G. ad H. 2. 3. *Linea in prima cartilaginis medio.*

IK. I. 2. 3. 4. *Scutiformis cartilaginis processus superiores. ossi hyoidei articulati.*

LM. 2 & 3. *Hujus processus inferiores qui in prima figura cartilagini crycoidi articulantur.*

NO. 6. *Sedes crycoidis ubi processus hi coalescunt.*

P. I. 5. *Cartilaginis crycoidis pars posterior.*

Q. 4. 5. *Crycoidis cartilaginis sedes interna.*

R. 4. 5. *Crycoidis inferior regio circularis.*

S. 4. 5. 6. *Hujus circuli posterior sedes.*

T. 5. 6. *Hujus linea posterior.*

VX. 6. *Hujus cartilaginis sinus utrinque.*

YZ. 4. 5. 6. *Tubercula duo crycoidis, quae arytanoidis sinus subeunt.*

α. I. *Cartilago arytanoides.*

βγ. 7. 8. 9. *Arytanoidis partes duae.*

δδ. 8. 9. *Hujus cartilaginis vacuum, quod membranis clauditur.*

εε. 8. 9. *Hujus cartilaginis latera, quibus crycoidi articulat.*

ζζ. (pro ζζ) 8. 9. *Hujus cartilaginis processus lingulam laryngis efformans.*

η. 9. *Sedes tertia cartilaginis superior osculo gutturnii seu malubrii similis.*

θ. 10. (Sculptor posuit N) *Epiglottidis basis, laryngem spectans, scutiformi cartilagini continuata*

ιλ. 10. *Epiglottidis apex palatum spectans.*

κ. 10. *Epiglottidis basis.*

μν. 11. (Sed inversa sunt literae) *aspera arteria fistula cartilaginis utraque facies, Graecorum Sigma sive Latinorum C. referens.*

Ξ I. *Aspera arteria, sive fistula laryngis.*

Π I. *Membrana quae posteriore parte cartilagine fistula conjungit.*

T A B.

LIB. III.

TAB. XXXIII

FIG. I.



II.



III.



III.



V.



VI.



VII.




VIII.



IX.



X.



XI.



TAB.



LIBRI QUARTI

TABULÆ.

Et si tabulæ septem ordine sequentes, musculos humeri, scapulæ, thoracis, capitis, cervicis & dorsi exhibeant, prout à natura locati sunt: attamen de singulis seorsim agemus.



TABULA I. Corpus proponit, quale occurrit post viscerum ram infimi quam medii ventris demonstrationem, eorundemq; ablatione, brachio dextro cum suis musculis in naturali situ (pectoralis & serrato

minore excepto, qui propter ossis pectoris ablationem separari debuerunt) sinistro vero à thorace, propter scapulam & claviculam retracto, ut quæ sub scapula latitant, in conspectum veniant.

A A. Biceps seu cubiti primus musculus.

B. In sinistro, Brachialis seu cubiti secundus musculus.

D E. Cervicis musculorum primum par sub oesophago.

F. Cervicis secundus à prima costa enatus.

G G. Intercostales musculi exteriores.

H H. Costis impostæ latera, musculis intercostalibus internis adponenda.

I. Clavicula sinistra è sede remota & denudata.

K. Clavicula dextra in sua sede.

L. Pectoralis seu humeri primus à principio remotus: α β γ circumscriptus. δ e. ipsius tendinem & insertionem proponit.

M. Deltoideus seu humeri secundus musculus. ζ η. (Sculptor posuit H.) principium ipsius: & insertio illius.

N. Deltoideus à principio separatus & reclinatus.

O. Rotundus major seu humeri quartus.

Q. Cubiti tertius seu extendentium primus (debebat esse C.)

R. Subscapularis seu humeri septimus musculus.

v. Insertio ipsius in humerum.

ξ. Tendo latissimi musculi seu humeri tertii.

S. Serratus minor seu scapula primus musculus ab implantatione elevatus.

T T. Femoris musculus septimus, seu Iliacus internus.

Υ. Subclavius musculus seu thoracis primus.

Z Z. Serratus major seu thoracis secundus musculus.

Σ Σ. Dorsi musculus primus seu quadratus.

Ω. Radii pronator rotundus musculus.

α α. Tibiam flectentium primus musculus.

β β. Tibiam flectentium secundus musculus.

σ σ. Femur flectentium musculorum primum par, seu lumbales cujus caput a. tendo b. notatur.

υ υ. Femur flectentium tertium par.


φ φ. Nervorum paria ad femur.

ω. Os sacrum.

T A B.

TAB. I.

LIB. IV.



44 2

TAB.

TAB. II. Musculos posteriore corporis sede locatos proponit.

- A. Bicipitis seu primi musculi cubiti pars.
 B. Brachii seu musculi secundi cubiti elatior & exteri. r pars.
 C. Cubiti musculus tertius.
 D. Cubiti musculus quartus.
 K. Mastoidis seu capitis musculi septimi in mammillarem processum insertio.
 MM. Deltois seu humeri musculus secundus.
 NN. Latissimus seu humeri tertius.
 xλμ. His line is circumscribitur, cujus tendinis ad insertionem portio, precedenti tabula & notatur.
 O O. Rotundus major seu humeri quartus.
 P P. Suprascapularis inferior seu humeri quintus.
 Π. Radii supinatoris primi musculi pars.
 * Abdominis musculi oblique descendentes portio.


- T. Cucullaris seu scapula musculus secundus.
 οπ. Hujus exortus ab occipitio.
 ρσ. & ab octo vertebrarum thoracis spinis, a cervicis spinis a σ ad π.
 τδ. Ejus insertio in scapula spinam, humerum & claviculam.
 φ. Semicirculus ejus membranaceus.
 β. Tibia musculus quintus seu semimembraneus.
 γ. Tibia musculus quartus seu biceps.
 δε. Tibia musculus tertius seu seminervosus.
 ζ. Tibia musculi sexti seu extensorum primi carnosae pars.
 η. Tibia septimus seu extrudens secundus tendine membranaceo sexti interfectus.
 μμ. Femoris primus seu natiū author primus.
 i k l m n. Principium illius i k l. insertio m n.
 ν. Femoris secundus a primo pene occultatus.
 ρ. Femoris musculi quinti seu tricipitis portio.

LIBRI QUARTI

191

TAB. II.

LIB. IV.



Aa 3

T A B.

TAB. III. Musculos aliquot capitis & thoracis, cucullari subjectos: item aliquot musculos scapulae & humeri, exhibet.

A. Thoracis musculi quarti seu serrati postici superioris pars prominens.

Δ. Capitis musculus primus seu splenius.

EE. Capitis musculi secundi seu complexi insertio,

I. Clavicula denudata.

M. Deltoidis seu humeri secundi musculi pars posterior.

ζη. (Sculptor H. posuit) ejus origo posterior.

θ. Implantatio in humerum.

NN. Latissimus seu humeri musculus tertius.

ω. Connexus hujus musculi cum osse ileo, latere inferiore à μ. ad ω. deducto.

ω. Sedes qua scapulae basis angulo inferiori incumbit.

O. Humeri musculus quartus seu rotundus major.

ς. Dorsi musculi aliquot hic se offerunt.

P. Humeri musculus 5. seu super scapularis inferior.

Q. Humeri musculus 6. seu super scapularis superior.

S. Latissimi seu humeri musculi tertii principium à vertebrarum spinis.

V. Scapulae musculus tertius seu Rhomboides.

Φχ. Ejus à spinis vertebrarum principium.

ψω. Ejus in scapulae basim insertio.

X. Scapulae musculus quartus sive levator.

* Abdominis oblique descendens musculi pars.

β. Tibiae musculus quintus seu semimembraneus.

γ. Tibiae musculus quartus seu biceps.

δε. Tibiae musculus tertius seu seminervosus.

η. Tibiae septimus seu extensor secundus.

μμ. Femoris primus.

V. (Debebat esse) Femoris secundus sub primo situs.


ρ. Femoris musculi quinti, seu tricipitis portio.

LIBRI QUARTI.

193

LIB. IIII.

TAB. III.



Aa 4

TAB.

TAB. IV. Musculi potissimum thoracis, capitis & scapulae proponuntur, cucullari, latissimo & rhomboide remotis.

A. Thoracis musculus quartus seu serratus posticus superior.

B. Thoracis musculus 5. seu serratus posticus inferior.

ab. Abdominis musculus obliquè descendens principium membraneum à spina dorsi.

C. Cubiti extendentium primus. c d. huius initium à cervice capitis humeri. c. & ab humiliore scapulae basi. d.

E. Ossis hyoidis musculus quarti ortus à scapula.

GG. Intercostales musculi exteriores.

I. Clavicula denudata.

M. (N posuit sculptor superius) Deltois seu humeri musculus secundus.

4.5. Char. initium deltoideis.

N. Inferius humeri musculus 3. seu latissimus separatus.

O. Humeri musculus 4. seu rotundus major.

P. Humeri musculus 5. seu super scapularis inferior.

1.2.3. Char. cuius initium à scapulae basi 1. 2. ejus insertio in humeri articulum 3.

2. Humeri musculus 6. seu super scapularis superior.

X. Scapulae musculus 4. seu levator.

Z. Thoracis musculus 2. seu serratus major.

7.7. char. Costæ.

Γ. Thoracis musculus 6. seu sacrolumbus.

Δ. Capitis musculus 1. seu splenius.

EE. Capitis musculus 2. seu complexi insertiones.

Φ. Dorsi musculus 2. vel longissimus.

Ω. Dorsi musculus 4. seu semispinatus.

TAB.

LIB. IIII.

TAB. IV.




Bb

T A T.

- TAB. V. Musculi capitis, thoracis, humeri & scapulae aliquot delineantur.
- I. Scapulae processus summus humerus dictus.
- O. Humeri musculus quartus, seu rotundus major, cui octavus Fallopii adiacet, qui nonnullis rotundus minor dicitur.
- Q. Humeri musculus sextus seu super scapularis superior.
- X. Scapulae musculus quartus, sive levator.
- Z. Thoracis musculus secundus, seu serratus major.
- Γ. Thoracis musculus quintus, sive sacrolumbus.
- αβ. Locus illius, quo dorsi musculo longissimo pertinaciter adheret.
- γγ. Tendines huius musculi oblique costis inserti.
- ΔΔ. Capitis musculi par primum, seu splenii.
- 8.9. char. Eorū longitudo, initium 8. insertio 9.
- 10.11.12. Latera huius musculi 10.11. interval- lum quo invicem abscedunt 12.
13. Complexi duo juxta insertionem.
- φ. Dorsi musculus secundus, vel longissimus.
- Ω. Dorsi musculus quartus, sive semispinatus.
- δ. Scapula nuda.
- ρ. Abdominis musculi transversae pars.

LIB. III.

TAB. V.



Bb 2 TAB.

TAB. VI. Capitis & dorsi musculi: aliquot
etiam thoracis, scapulae & humeri propo-
nuntur.

ABCDEFGG. Musculorum capitis pars se-
cundum seu complexi duo: prima pars AD.
secunda pars BC. tertia pars EF. sub G. e-
mergens, & ad F. inserta: G. quarta pars hu-
jus musculi vel octavus capitis musculus Fal-
lopio, quem quartam partem secandi fecit
Vesalius.

GG. (Inter costas) intercostales musculi ex-
terni.

LM. Principium musculi secundi, dorsi L. ejus
ad vertebrae tendines M.

O. superior: Humeri musculus 4. sive rotundus
major.

OO. inferius: Thoracis sextus sive sacrolumbus

ab exortu propendens.

Q. Humeri musculus sextus sive super scap-
ularis superior inversus.

V. Ligamentum tertium articuli humeri.

K. Scapulae musculus quartus sive levator,

Z. Thoracis musculus secundus, seu serratus
major.

Æ. Musculus cervicis tertius sive transverse-
lis.

Π. Cervicis musculus quartus, sive spina-
tus.


Σ. Dorsi musculus primus, sive quadratus.

Φ. Dorsi musculus secundus, vel longissimus,
cujus principium L. tendines ad vertebrae
MM.

Ω. Dorsi musculus quartus sive spinatus.

δ. Scapulae dorsum ex carne.

TAB.



TAB. VII. Capitis & cervicis musculos ostendit.

AB. Capitis musculorum tertium par, sive Recti majores.

C. Processus mamillaris.

D. Processus transversus primae vertebrae cervicis.

E. Processus secundae vertebrae cervicis.

FG. Capitis musculorum quartum par sive Recti minores.

HI. Capitis musculorum quintum par sive Obliqui superiores.

KL. Capitis musculorum sextum par sive Obliqui inferiores.

X. Scapulae musculus quartus sive levator.

Δ. Cervicis musculus secundus, sive scalenus, quem Fallopi thoracis octavum facit.

Π. Cervicis musculus quartus sive spinatus.

Σ. Dorsi musculus primus, sive quadratus.

Φ. Dorsi musculus secundus, vel longissimus.

ab. Sinus ejus, quo dorsi tertio musculo sive sacro credit a principium ejus b.

Υ. Dorsi musculus tertius sive sacer.

γδ. Ejus principium γ. finis vero δ.

Ω. Dorsi musculus quartus sive semispinatus.

ε. Ejus extremitas superior sub quarto cervicis musculo.

TAB.

LIB. IIII

TAB. VII



BB 4

TAB.

DE MUSCULIS MANUS.

TAB. IIX. Figuris quatuor, musculos humeri, cubiti, carpi, radii & digitorum manus proponit.

- A. 1. 2. 3. Cubiti musculus primus seu biceps.
 B. 2. 3. 4. Cubiti musculus 2. seu brachialis.
 C. 2. 3. 4. Cubiti musc. 3. sive longus, vel pars eius.
 D. 4. Cubiti musculus quartus, sive brevis.
 E. 1. 2. Musculus in vola.
 F. 3. Flectentium quatuor digitos musculus primus.
 G. 3. Flectentiū quatuor digitos secundi portio.
 H. 3. Flectentium pollicem primus.
 I. 3. Clavicula à sede remota & denudata.
 K. 1. Clavicula in sua sede.
 L. 1. Pectoralis seu humeri musculus primus.
 αβγ. Ejus circumscriptio & exortus.
 δ ε 1. & 2. Pectoralis musculi insertio.
 M. 1. 2. & 4. Deltois seu humeri secundus musculus.
 ζ H. (pro α) 1. ejus principium latum.
 θ. 2. Ejus insertio.
 N. Deltois separatusejusq. pars interior.
 O. 4. Rotundus major seu humeri quartus.
 P. 4. Suprascapularis inferior seu humeri quintus.
 P. 4. Inferius extendentium 4. digitos primus.
 Q. 1. Extendentium quatuor digitos secundus.
 S. 1. 3. Extendentium quatuor digitos quartus.
 V. 4. Extendentium pollicem secundus.
 Y. 3. Subclavius seu thoracis primus.
 Z. 2. 4. Extendentium pollicem quartus.
 a. b. 3. Scapula processus elatior a. humilior b.
 c. 3. Ligamentum latum articuli scapulae cum

de. 3. Ligamentum teres inferius d. teres superior e.

f. 3. Conjunctio horum duorum ligamentorum.

g. 3. Humeri os ex carne.

h. i. 1. 2. Digitorum musculorum portiones ab externacubiti sede, ad manum tendines propagantes.

l. 2. (1. positum) Tendines in manu in indicis exteriorem sedem exporrecti.

i. 2. 3. 4. 5. 6. Char. in fig. 2. & 4. ligamentum transversum brachialis in tot annulos, divisum.

n. 3. Exortus musculi primi digitos flectentis sub musculo α notato.

o. 3. Carnea partes hujus musculi, quatuor tendines rrrr perforantes.

p. q. 3. Ligamentum transversum brachialis divisum, & utrinq. in latus reflexum.

rrrr. 3. Tendines quatuor ad digitos delati.

st. 4. Cucullaris musculi superior s. inferior sedest.

u. 4. Cubiti musculi tertii & quinti conjunctio, quos Vesalius dividit.

x. 4. Insertio illius & una ex carnis portio.

Δ. 1. 3. 4. Carpum flectens primus musculus.

Θ. 1. 2. Carpum flectens secundus musculus.

Δ. 4. Carpum extendens primus musculus.

Ξ. 2. 4. Carpum extendens secundus musculus.

Π. 1. 2. 3. 4. Radii supinator primus musculus.

Ω. 1. 2. 3. Radii pronator alter.

a. 3. Subscapularis insertio humeri musculi.

TAB.

TAB VIII

LIB IV



Cc

T A B.

TAB. IX. Musculos cubiti, radii, digitorum exhibet.


- C. 4. Musculorum lumbricalium insertio in primum os digitorum.
- d. f. 3. Tendinum portiuncula juxta insertionē abscissa, quorum d. insertio est musculi tendinibus adnati: e. primi f. secundi digitos flectētis.
- h. 2. Scapulae angulus, cui musculus scapulae levator dictus in precedentibus tabulis x. notatus inseritur.
- i. 2. Scapulae processus elatior, summus humerus.
- k. 2. Superscapularis superioris insertio.
- l. 2. Scapulae processus inferior.
- n. o. 1. 2. Bicipitis caput exterius nervum n. caput interius nervum o.
- p. q. 1. 2. Coitus horum duorum capitum p. tendo huius musculi q.
- f. 2. Radii supinatoris musculi pars ubi ab humero cubitum accedit.
- t. 2. Tendo illius latus, radii appendici insertus.
- u. 2. Principium musculi secundi, quatuor digitos flectētis.
- A. 1. 2. Biceps seu cubiti primus, qui in quarta à sua insertione dependet.
- B. 1. 2. 3. Brachialis seu cubiti musculus secundus.
- C. 1. 2. 3. Longus, cubiti musculus tertius.
- E. 1. Musculus in vola, cuius tendo latus μ.
- F. 1. 2. Flectentium quatuor digitos primus in 2. propendens.
- G. 2. 4. Flectentium quatuor digitos in 4. propendens β. tendines ostendit.
- HH. 2. Musculi lumbricales, horum insertio c. 4.
- f. 2. 4. Flectentium pollicem primus: in 4. à sua insertione dependens. tendo ipsius ε.
- K. 1. 2. Flectentium pollicem secundus.
- L. 2. 4. Flectentium pollicem tertius.
- N. 1. Deltois musculus inversus.
- N. Superius in 3. latissimis, sive musculi tertii brachii tendo.
- N. Inferius in 3. 4. ulnae ex carnis.
- O. Superius in 3. rotundus major brachii musc. 4.
- O. Inferius 3. 4. radius nudus.
- Q. 3. Superscapularis superior, cuius insertio f. 2. k.
- R. 3. Subscapularis musculus, cuius insertio a.
- S. 1. Superius: serratus minor, n. d. amplitudo illius qua costis adnascitur. x. locus ubi scapulae.
- S. Inferius. 1. 2. minimi digiti musculus crassior, sive extendentium quartus.
- X. 1. Extendentium pollicem musculus tertius.
- X. 2. Sedes qua musculus G. quatuor partes carneas profert.
- β. 4. Tendines musculi secundi quatuor digitos flectentes.
- γ. d. 2. Sedes qua secundi musculi tendines γ. tendines primi musculi δ permeant.
- ε. 2. Tendo pollicem flectētis primi, musculi in manu positis inversus.
- η. d. 1. 1. Serrati minoris amplitudo qua costis necitur.
- η. 2. Digitorum musculi in manu tendinibus quatuor secundi musculi adnati sive musculi lumbricales.
- λ. 1. Carpi flexoris initium & insertio.
- μ. 1. Musculi palmaris tendo.
- ν. 1 (Sculptor posuit V.) ligamentū transversum.
- Γ. 1. Interosseus seu minimi digiti gracilior musculus in vola manus.
- Δ. 1. Carpum flectentium primus.
- Θ. 1. Carpum flectentium secundus hic propendens.
- Π. 1. 2. 3. Radii supinator primus: in 3. ab implantatione dependens.
- Φ. 3. 4. Radii pronator primus & quadratus.
- Ω. 1. 2. 3. 4. Radii pronator rotundus.
1. 2. 3. Char. 4. flectentium pollicem quartus, quintus & sextus.
- * Ligamentum ulnam & radium intercedens.

T A B.

TAB. IX.

FIG. I.

LIB. IV.



TAB. X. Musculos humeri, cubiti, radii, carpi:
item digitos extendentes, proponit.

A.1.2. Bicipitis sive musculi cubitum flectentis
primipars.

B.1.2.4. Brachii elatior & exterior pars.

C.1.2.4. Cubitum extendentium primus ab hu-
miliori scapula sede, alius cubiti quintus.

D.1.2. Cubitum extendens alter, sive brevis ab
humeri cervice ortus.

E.1. Carpi extendentium secundus seu bicornis.

M.1.2.3. Deltois seu humeri secundus.

N.3.4. Ulna excarnis.

O.1.2. Rotundus major seu humeri quartus
musculus.

O.3.4. Radius magna ex parte denudatus.

P.1.2.3. Suprascapularis inferior seu humeri
quintus.

P. inferius in 1.2. Musculorum extendentium
quatuor digitos, primus: in 2. propendens,
cujus initium a. tendines b.

Q.1.2. Extendentium quatuor digitos secundus,
in 2. propendens.

R.2.3. Extendentium quatuor digitos tertius, in
3. propendens; in duas portiones scissus o.p.2.

S.1. Extendentium quatuor digitos quartus.

T.1. superius; Cucullaris seu scapulae secundi mu-
scoli portio.

T.1. inferius Extendentium pollicem primus.

V.2.3. Extendentium pollicem secundus.

Y.3. Carpum extendentis secundi exortus.

Z.1.2.3.4. Extendentium pollicem quartus.

ab.1.2. Extendentis quatuor digitos primi ex-
ortus ab humeri tubere a. tendines ipsius b.

a.4. Radii supinatoris brevioris initium.

c.1. Carpi extendentis primi origo ab humeri
superiore tubere.

e.4. Cubitum extendentis longi altera pars.

d.1. Ejus insertio ad minimum digitum.

e.2. Scapulae spina ac summus humeri.

fg.2. Cucullaris musculi origo parte posteriore &
scapulae spina.

h.2. insertio illius.

i.2. Ligamentum membranicum radii superio-
rem partem humero colligans.

k.l.m.n.2.3. Pars elatior musculi pollicem ex-
tendentis secundi V signati, ossi carpi inserta.

k.l. Pars humilior bipartito divisa, l. altera
carpi ossi pollicis subiecta, m. altera pollicis in-
serta n.

o.p.2. Extendentium tertius R. notatus in du-
as portiones scissus.

q.4. Scapulae dorsum nudum.

r.2. Carpum extendentis secundi ortus.

s.t.3. Ipsius tendinis bicornis ortus s. insertio r.

x.1.2. Ulnae excarnis sedes.

Δ.1.2. Carpum flectentium primus.

Λ.1.2. Carpum extendentium primus, m.2. pro-
pendens, cuius origo c. insertio d.

Π.1.2.4. Radii supinator primus, cuius initium
α insertio β in 4.

Σ.2.3.4. Radii supinator brevior, cuius initium
δ insertio γ.

Ξ.2.3. Carpi extendentium secundus seu bicornis
tendine.

αβ.4. Radii supinatoris primi initium ab hu-
mero α. insertio vero β.

γ.4. Radii supinatoris brevioris insertio.

δ.4. Locus ubi sinus pro tendinibus vehendis
parati sunt, & cartilaginem illius loci conti-
nent.

ζ.4. Ligamenta ossa carpi mutuo juncen-
tia.

* 3.4. Ligamentum inter ulnam & radium
medium.

T A B.

TAB. X.

LIB. IV.



C. 3

Γ AB.

TAB. XI. Musculos an quot cubiti, radii, pollicis & inter osseos adumbrat.

q. 1. 2. Scapula nuda. 1. & in 2. interior ejus pars.

B. 1. 2. 3. Brachialis seu cubiti secundus, cujus geminus exortus. 3. V. notatur, debebat esse v. 2. insertio o.

C. 1. Cubitum extendentes muscoli, qui pro tribus à Vesalio recensentur, i. tertius, n. quintus, & quartus.

G. 2. Brachii muscoli insertio.

N. 1. 2. 3. Ulna ex carnis.

O. 1. 2. 3. Radius ex carnis.

Q. 1. Super scapularis superior sive scapulae musculus sextus inversus.

R. 2. Super scapularis musculus propendens.

X. 2. Pollicis internodium secundum flectentes duo muscoli.

Γ 2. 3. Interosseus musculus radio additus, ac in 3. interossei in manus vola ossium metacar-

pi intervalla replentes.

Σ. 1. Radii musculus supinator brevior propendens.

Φ. 3. Radii musculus quadratus dependens.

Ω. 1. 2. Radii musculus pronator rotundus: cujus insertionem G. notat, hic in 2. ab insertionem suspensus.

θ. 1. Os humeri ex carne prorsus.

η λ. 1. Tertius, quartus & quintus n. musculus cubiti, seu extendentes tres.


μ. 1. Radius pronatoris Ω insertio.

υ ξ ο. 2. 3. (Sculptor posuit 3. V) brachii seu musculi humeri secundi utrinque exortus, & insertio in 2. G. in tertia o. juxta articulum protuberant.

1. 2. 3. Char. 1. flectentium pollicem quartus, quintus, sextus.

* Ligamentum ulnam & radium hic intercedit, tab. 10. inter N. & O. expressum.

TAB.



Cc 4

T A B.

TAB. XII. FIG. I. Venas, cephalicam, basilicam, eorumq; ramos proponit.

- H. Vena cava sub pectoris osse juxta jugulum bipartitio.
 I. Vena subclavia utring, supra l. jugularis exterior & interior cum cervicali.
 K. Vena intercostalis superior.
 LL. Mammaria, sub osse pectoris ad mammas.
 O. Muscula ad musculos cervicis inferiores & thoracis superiores.
 P. Vena ad musculos pectori instratos, ad ejus regionis cutim & mamillam.
 Q. Vena in thorace posteriora ac scapula sedem cavam & vicinos musculos.
 * Venula in glandulis sub axillis sitas.
 R. Ramus qui secundum thoracis latera potissimum in musculum latissimum distribuitur.
 a. Humeraria seu cephalica vena.
 b. Ramus ad musculos colli posteriores.
 cc. Mediana five communis vena.
 dd. Rami à cephalica in musculam brachium elevantem.
 ee. Venula ex cephalica, per cutim brachii & musculos brachium abducentes dispersa.
 f. Cephalica divisio tripartita.
 g. Ramus primus ad musculos à tuberculo externo humeri pronatos.
 h. Cephalica ramus ad medianam constituendam.
 i. Cephalica ramus tertius oblique supra radium.
 k. A ramo tertio furculi ad cutim.
 l. Ramus tertius ad carpum cum basilica ramo x. notato, jungitur, ubi l. positum est.
 m. Basilica vena.
 no. Ramus per capita musculorum cubiti, n. ramuli ad dictos musculos o.
 p. Basilica ramus insignis oblique latus, & nervo quarto comitatus.
 q. Basilica in ramos duos divisio & quæ, q. notatur, per petud cum arteria incedit.
 † Basilica vena ramus profundior bipartitus.
 r. Alter ramus per carnem & cutim (in tota venarum

tab. ponitur T.)

- f. Ramus hujus ad cutim brachii.
 t. Ramus basilica qui cum cephalica ramo h. medianam, cc. constituit.
 u. Basilica ramus ad humeri caput internum.
 xx. Ramus ex suprascripto carpum petens, & versus digitum minimum, cephalica se conjungens.
 y. Cutim ad cubitum externum nutriens.
 z. Superius z. notat propaginem ex basilica ramo t. insigni: o. z. inferius, ex basilica ramo x. ad brachii partem internam.
 β. Mediana supra carpum partitio, sed debebat β. altius locari.
 γδ. Hujus ramus externus partem manus externam adiens γ. à quo ramulus ad partem internam δ.
 z. Ramus alter versus medium & annularem.
 q. Vena pollicis monticulum implicans, cum ramo d. notato coiens.
 FIG. II. Arteria ramos per totam manum excurrentes exhibet.
 G. Arteria mammaria pectoris ossi intrinsecus attensa.
 H. Arteria cervicalis ad cervicis musculos posteriores.
 I. Scapularis ad musculos scapula.
 K. Humeri summum conscendens arteria.
 L. Thoracica superior, ad musculos pectori instratos.
 M. Thoracica inferior, thoracis latera perreptans.
 N. Axillaris arteria, brachium accedens & ramulos musculi largiens.
 O. Cubiti sedem externam accedens.
 PP. Ad articulum cubiti.
 Q. Arteria ramus superior secundum radium delatus.
 R. Surculus manus exteriora petens, ubi pulsus tangi consuevit.
 S. Arteria ramus inferior secundum ulnam delatus.
 * Ramulus ad musculos circa minimum digitum.
 T. Rami tam superioris quam inferioris distributio in manum & digitos.
 X. Arteria sub cubiti flexu bipartitio.

TAB.

LIBRI QUARTI.

211

TAB. XII.

FIG. I.



LIB. IV.

FIG. II.



Dd

7 A B.

TAB. XIII. FIG. I. II. Nervos totius manus proponit illa anteriorem, hac posteriorem faciem ipsorum exprimit.

A.1. Spinalis medulla vertebra subiens.

Char. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. cervicis vertebra septem & thoracis dua.

Char. 5. in 1. Quintum par nervorum e medulla in cervicis vertebra contenta.

c. 2. Quinti paris ramus posterior.

d. 1. 2. Quinti paris ramus anterior.

f. 1. 2. Ramus nervi d. summum humerum perreptans sub quo soboles scapulam adeuntes.

g. 1. 2. Soboles nervi f. ad cutim summi humeri.

h. 1. 2. Ramus nervi f. ad musculus brachii secundum.

i. 1. 2. Ramus alter eidem & cuti insertus.

Char. 6. in 1. sextum par.

k. 2. Sexti paris ramus posterior.

l. 1. Sexti paris ramus anterior.

m. 1. Surculus illius, ad diaphragmaticum constituendum.

p. 2. Sexti paris ramus scapulae cavitatem petens.

q. 1. 2. Rami l. in plexu cum vicinis ramis.

Char. 7. in 1. septimum par nervorum.

r. 2. Septimi paris ramus posterior.

s. 1. Septimi paris congressus cum ramis proximis.

t. 1. 2. Hujus furculi ad musculos scapulae & brachii.

Char. 8. in 1. Octavum par seu thoracis primum, supra primam thoracis vertebra.

u. 2. Octavi paris ramus posterior.

x. 1. 2. Octavi cum septimo coitus.

y. 1. Octavi paris ramus pectoris summum petens.

aa. 2. Surculi ab octavo pari in hujus loci musculos.

Ch. 9. in 1. Nonum par nervorum.

β. 2. Noni paris ramus posterior.

δ. 1. Hujus ramus anterior.

π π. 1. Brachii nervus in primis cutim.

p. 1. 2. Brachii nervus secundus.

ss. 1. Ab hoc nervi ad cubiti musculus primum seu bicipitem.

τ. 1. 2. Brachii nervus tertius.

v. 1. Ejus ramus ad cutim brachii.

φ. 1. Ramulus ad cubiti musculus secundum seu brachiaura.

χ. 1. Ad cutim anteriorem brachii.

ψ. 1. Tertii nervi cum secundo congressus.

ω. 1. Secundus cum tertio post conjunctione deorsum repens.

Γ. 1. Nervus ad musculus radii secundum seu supinatore longiore.

Δ. 1. Secundi nervi in tres ramos divisio.

EE. 1. Secundi nervi ramus superior seu primus, ad carpi pum excurrans ad pollicis primum internodium.

Θ. 1. Secundi nervi ramus medius.

Α. 1. Ejus progressus ad manum usque.

Ξ. 1. Secundi nervi ramus inferior & tertius.

Π Σ. 1. Hujus rami duo ad manum internam.

Φ. 1. 2. Quartus brachii nervus.

Υ. 2. Ab hoc nervi ad musculos cubiti extendentes.

Ω. 2. Ramus ad cutim brachii parte posteriore.

ζ. 2. Ad brachii cutim externam.

33. 2. Ramus cubiti externum ad carpi perreptans.

34. 2. Quarti nervi ad cubitum bipartitio.

35. 2. Ramus elatior dictae divisionis.

36. 2. Pollicis, indicis & medii furculi ad externam partem.

37. 2. Divisionis dictae humilior ramus.

38. 2. Ab hoc soboles ad musculos ab externo humeri tubere enatos.

39. 40. 41. 2. Rami tres ad musculos ab ulna enatos.

42. 2. Finis rami 37 juxta carpi articulum.

* 1. 2. Quintus brachii nervus.

43. 1. Tertii & quinti nervorum soboles ad cubitum internum.

44. 1. Ramus tertii nervi ad volam & digitos.

45. 1. Ramus quinti nervi ad manum internam.

46. 1. Propago rami 45. ad manum externam.

8. 1. 2. Sextus brachii nervus.

47. 1. Ejus finis juxta manus articulum.

48. 48. 1. A sexto nervo furculi ad cutim.

FIG. III. Nervorum brachium accedentium plexum nudum ex Vesalio proponit.

Char. 5. 6. 7. 8. 9. Radices parium nervorum à quibus nervi manum adeuntes producuntur.

A. Quinti paris portio, sive primus nervus.

B. Secundus nervus.

C. Tertius nervus.

DDE. Quartus nervus, qui ex posterioris sede prodit, congressus quinti paris & sexti, portionemq. assumit ex posteriore sede congressus septimi paris: ac deinde sub octavi paris, nonisq. congressu, prorepens etiam ab illo assumit, ramum E. insignitum.


F. Quintus } brachium petens nervus.

G. Sextus }

T A B.

TAB. XIII.

LIB. IV.



Dd 2

TAB.

TAB. XIV. Ossa humeri & cubiti delineata exhibit. FIG. I. Humeri dextri anteriorem, quemadmodum FIG. II. posteriorem sedem proponit.

- AB C. 1. 2. Humeri caput quod scapula sinum subit.
 D. 1. E. 1. 2. Ejus processus anterior D. alter posterior E.
 FG. 1. 2. Sinus ipsius capitis orbicularis.
 H. 1. 1. Sinus rectus recta deorsum latus.
 K. 1. 2. Sinus rotula humeri quae cubitum excipit.
 LM. 1. 2. Rotulae labra duo, internum & externum.
 N. 1. 2. Sinus anterior in rotula sede super. ore.
 O. 2. Sinus alter posterior.
 P. 1. 2. Caput humeri cui radius articulatur.
 Q. 1. 2. Linea in humeri latere externo extuberans.
 R. 2. Sinus processus exterioris humeri.
 S. 1. 2. Tuberculum humeri interius.
 T. 1. V. 6. Sinus anterior tuberi interioris T. alter eiusdem posterior V.
 XZ. 2. Longitudo humeri inter ipsius extrema crassiora.
 Y. 2. Sedes media ubi humeros contorquetur.
 a. 1. Linea anteriore sed. prominens ad usque ducta.
 b. c. 1. Impr. siones utrinque ad lineam.
 d. 1. Superior humeri gibba pars.
 e. 1. 2. Asperitas in humeri medio latere externo.
 f. 1. Alia paulo elatior versus anteriora.
 FIG. III. & IV. Cubiti sinistri interiora & exteriora. FIG. V. & VI. Ulnae sinistra interiora & exteriora. FIG. VII. & VIII. Radii sinistri interna & externa sedes. FIG. IX. Radii sinistri pars inferior. FIG. X. & XI. Radii dextri inferior & superior pars. FIG. XII. & XIII. Ulnae dextera inferior & superior extremitas.
 A. 3. 4. Cubiti pars superior qua humero articulatur.
 B. 3. 4. Hujus pars inferior carpum spectans.
 C. 3. 5. 13. Ulnae processus anterior & superior.
 D. 3. 4. 5. 13. Ulnae processus posterior & superior.
 E. 3. 4. 5. Sinus ulnae humeri rotulam excipiens.
 F. 13. Extuberantia in sinu praedicti medio.
 GG. HH. 13. Latus internum juxta tuber depressum G. latus externum H.

- I. 13. Sinulus asper sinister cui dexter alio latere respōdet.
 L. 3. 5. 13. Asperitas in ulnae processus radice.
 M. 3. 4. 7. 8. II. Cervix radii.
 O. 1. 1. Radii sinus, quem humeri caput ingreditur.
 P. 3. 4. 5. 6. 12. Ulnae cervix.
 Q. 3. 4. 5. 6. 12. Ulnae appendix.
 R. 3. 4. 5. 6. 12. Ulnae processus stiloides.
 S. 1. 2. Sinus in ulnae appendicis basi.
 T. 3. 4. 7. 8. 9. 10. Cartilago huic sinui innata.
 V. 4. 6. Sinus in ulnae appendicis latere.
 XYZ. 4. 6. Anguli tres processus posterioris ulnae.
 a. a. 3. 4. Linea seu eminentia ulnae prima.
 b. b. 3. 5. Linea ulnae secunda.
 * 3. 5. Linea ulnae inferior obliqua.
 c. c. 3. 4. 5. Acuties ulnae radium respiciens.
 d. 3. 6. Latus ulnae exterius primam.
 e. 4. 6. Latus exterius secundum.
 f. 3. 5. Latus v. ferius asperum.
 g. g. 4. 6. Linea in latere externoeducta.
 h. 1. 3. Radius cum ulna supra h. infra i. commissio.
 k. k. 3. Intervallum quo ossa haec debisunt.
 l. 13. Ulna sinui in quo radius caput vertitur.
 m. 7. 8. II. Capiti radii sedes sinui ulnae l. infidens.
 n. 3. 7. Radii appendix inferior.
 o. 9. Radii sinus ulnae capitulum excipiens.
 p. 5. 12. Ulnae capitulum radii sinui o. ingrediens.
 q. 3. 4. 7. 8. II. Asperitas sub radii cervice protuberans.
 r. r. 3. 4. 7. 8. Linea acuta, radii ulnam respiciens.
 s. s. 3. 7. Radii latus internum asperum.
 t. t. 4. 8. Radii latus externum leve.
 u. 4. 7. 8. Asperitas in radii longitudinis medio.
 x. y. 3. 10. Sinus radii cui brachiale jungitur.
 z. 3. 10. Tuberculum in sinuum horum medio.
 α. 3. 7. 8. 9. 10. Processus sinus x.
 δ. δ. 4. 8. Sinus radii interior geminus, tendines vehens.
 ε. ε. 4. 8. Sinus radii exterior geminus.
 η. 4. 8. Sinus quartus ligamentum producens.
 θ. 4. Sinus communis radii cum ulna.

T A B.

LIBRI QUARTI

21



Dd 3 TAB.

TAB. XV. FIG. I. & II. Manus ossium internam faciem illa fig. hac verò, externā exhibet. FIG. III. & IV. Carpi ossium internam & externam sedem. FIG. V. Carpi ossium partem posteriorem cubito articulatam. FIG. VI. Eorum anteriorem partem metacarpo junctam proponit.

A.1.2. Metacarpi os primum pollicis subiectum. I. II. III. IIII. Metacarpi ossa quatuor reliqua digiti commissa.

B. C. 1.2. Pollicis ossa duo.

D. E. F. 1.2. Indicis ossa tria: idem in digitis cæteris.

G. 3.6. Carpi ossis quinti rotula, cui metacarpi os primum articulatur.

a. b. 6. Rotule hujus longitudo.

c. d. 6. Rotule latus internum c. externum d.

e. 3.4.6. Sinus ad rotulam quem metacarpi os secundum attingit.

H. 3.4.6. Carpi ossis sexti sinus, cui metacarpi os secundum jungitur.

f. 3.4.6. Sinus hujus pars quam metacarpi os tertium vix attingit.

I. 3.4.6. Carpi ossis septimi sinus, cui metacarpi os tertium jungitur.

K. 3.4.6. Carpi ossis octavi sedes, metacarpi os quartum admittens.

L. 3.4.6. Ejusdem ossis sinus, metacarpi ossis quinti rotulam suscipiens.

M. 1.2. Ossiculum carpi octavi ossis articulo externe nonnunquam appositum.

N. 1.3.6. Processus carpi ossis octavi in volam extuberans.

O. 1.3.6. Processus carpi ossis quinti, à quo ligamentum pronascitur.

P. 2. Appendix ossium carpi, quibus metacarpo articulantur.

Q. 2. Appendix alterarum capitulo digitorum sinum subiens.

R. 1.2. Metacarpi ossium intervallum.

S. 1.2. Sesamoidea ossicula duo, articuli primi lateri interno & externo preposita.

T. 1. Sesamina duo, in digitorum quatuor articulis primis.

V. V. 1. Sesamoides unum, in articulo secundo & tertio digitorum.

Char. 1.2.3.4.5.6.7.8. numeri hi, in figuris sex, carpi ossa octo denotant.

FIG. VII. Ossa duo articulum primum digitorum efficientia. FIG. VIII. Articulum secundum. FIG. IX. Articulum tertium constituentia, proponuntur.

A. 7. Metacarpi os indicem sustinens.

B. 7. Indicis os primum.

C. 7. Metacarpi ossis caput rotundum.

D. 7. Indicis sinus caput prædictum suscipiens.

E. F. 8. Indicis os primum E. secundum F.

G. H. 8. Capitula duo ossis primi indicis.

I. K. 8. Sinus duo ossis secundi indicis.

L. 8. Sinus inter capitula duo primi ossis.

M. 8. Capitulum inter sinus duos secundi ossis.

N. 9. Indicis os secundum ejusq. capitula duo.

O. 9. Indicis os tertium sinum continens.

FIG. X. Unguis a digito avulsi facies utraq.

A. 10. Unguis interior sedes cava.

B. 10. Ejus radix mollis quam cutis obtegere solet.

C. 10. Unguis externa sedes gibba.

FIG. XI. Sesamoidea ossicula in pede & manu.

A. 11. Sesamoidis ossiculi pollicis pedis primo articulo prepositi facies inferior.

B. 11. Ejusdem sedes superior articulum spectās.

C. D. 11. Ossiculi alterius pars superior C. humilior D.

a. a. 11. Ossicula ad pollicis articulum in manu.

b. b. 11. Ad indicis articulum.

c. c. 11. Sesamina digito minimo manus adposita.


T A B.

TAB. XV.

LIB IV

FIG. I.

FIG. II.



III

IIII

V





VI

VII

IIIXA

IX



TABULA XVI. DE MUSCULIS PEDIS.

TAB. XVI. cum sequentibus sex, Musculos tibiae, femoris & pedis exhibet.

FIG. I. Crurū sinistri anteriorem partem musculofam proponit.

FIG. II. ejusdem internam & lateralem partem, quemadmodum

FIG. III. ejusdem externam lateralem partem exprimit.

AA. 2. Os sacrum.

B. 2. Ligamentum ab osse sacro ad coxendicem ductum.

C. 1. 2. Pubis ossis sedes.

H. 2. Pedem extendens musculus tertius, seu plantaris.

I. 2. Pedem extendens quartus, seu soleus.

K. 2. Pedem extendens 5. seu Tibialis posticus.

L. 1. Pedem flectentium 1. five Tibialis anticus.

M. 1. 3. Pedem flectentium 2. seu Peroneus primus.

N. 3. Pedem flectentium 3. seu Peroneus secundus.

P. 1. 3. Digitorum extendentium musculus secundus, seu Digitorum tensor.

R. 2. Digitorum flectentium 2. seu Digitorum flexor magnus.

T. 1. 2. Abductor pollicis inferior musculus.

V. 3. Musculus Abductor minimi digiti.

*** 2.** Tendines ad pedis digitos delati.

X. 2. Femoris decimi musculi interna pars quasi triplex a. c. f.

Y. 1. Abductor digitorum superior musculus.

a c f. Femoris musculi decimi quasi triplex pars, e. f. ad magnum femoris processum fertur.

† 2. Nervus magnus decimo musculo incumbens inter x. & a.

α 1. 2. Tibia musculus seu flectentium 1. five longissimus.

a. 1. 3. Principium ejus. **b. 1. 2.** Tendo ejus.

β. 1. 2. Tibia musculus seu flectentium 2. seu gracilis.

d e. 2. Exortus illius: ad b. tendo ipsius.

γ 2. 3. Tibiam flectens tertius, seminervosus.

δ. 1. 3. Tibiam flectentium 4. seu Biceps.

ε ε. 2. 3. Tibiam flectentium 5. seu semimembraneus.

ζ. 1. 2. 3. Tibiam extendens primus seu membranosus.

η. 1. 3. (Sculptor posuit H.) Tibiam extendens 2. seu Vastus externus.

θ. 1. 2. Tibiam extendens 3. seu Vastus internus.

κ. 1. 2. 3. Tibiam extendentium 4. seu Rectus.

μ. 3. Femoris extendentium 1. seu Glutaeus major.

ο. 2. Malleolus internus. **1. 3.** Malleolus externus.

ρ. 1. Tibiam extend. primi carnosae pars.

ρ. 2. Femoris extendentium 5. seu triceps.

σ. 2. Femur flectentium 1. seu lumbalis.

τ. 2. Femur flectentium 2. seu Iliacus.

υ. 1. Femur flectentium tertius.

ψ. 1. 2. Pedem extendens 1. seu Gastrocnemius internus.

ω. 1. 2. 3. Pedem extendens 2. seu Gastrocnemius externus.

p. 1. Digitorum extendentium secundi portio, quam pedis nonum musculum facit Vesalius.

q. 3. Processus major femoris, rotator dictus.

r. 3. Ligamen transversum à fibula in calcem pertinens.


t. 2. Femoris musculi quinti portio.

x. 2. Tibia os nudum.

y. 1. 3. Digitorum extendentium primi tendo.

ch. 2. pro Z. ponitur in 1. & 3. Ligamentum transversum supra pedem notat.

TAB.



Ee

T A B.

TAB. XVII. Femoris & tibiae musculos potissimum proponit.

- α. 4. Tibiae musculus primus seu longissimus.
 β. 4. 5. Tibiae musculus 2. seu gracilis.
 γ. 4. 5. 6. Tibiam flectens 3. seu seminervosus.
 δ. 4. 5. 6. Tibiam flectentium 4. seu biceps.
 ε. 4. 5. 6. Tibiam flectentium 5. seu semimembraneus.
 ζ. 4. Tibiam extendens 1. seu membranosus.
 η. 4. 5. 6. Tibiam extendens 2. seu Vastus externus.
 θ. 4. 5. 6. Tibiam extendens 3. seu Vastus internus.
 ι. 4. Tibiam extendens 4. sive Rectus.
 κ. 4. 5. Femur extendens 1. seu Gluteus major.
 λ. 4. 5. Femur extendens 2. seu Gluteus medius.
 μ. 6. Femur extendens 3. seu Gluteus minor.
 ν. 5. Femur extendens 4. seu Iliacus externus.
 ξ. 4. 6. Femur extendens 5. seu Triceps vel quadriceps rectus.
 ο. 6. Musculi huius pars posterior.
 π. 5. 6. Femur circumagens 2. seu Obturator internus cum carnosae portionibus supra infraque illi adnatis.
 ϕ. 4. Pedem extendens 1. seu Gastrocnemius internus.
 ω. 4. Pedem extendens 2. seu Gastrocnemius externus.
 αβγδε. 4. Femur extendentis primi principium abc. insertio illius de.
 fg. 5. 6. Tibiam flectentium tertii seu seminervosi exortus f. tendinis initium g.
 hk. 5. Femur extendentis secundi origo semi-

circularis h. insertio in femoris processum k.
 hk. 6. Tibiam flectentium quarti seu bicipitis caput h. carnosae portio qua adangitur k.

H. 4. Pedem extendentium 3. seu Plantaris.
 I. 5. Tibiam flectentis 5. seu semimembraneae portio.

m. n. 6. Caput huius m. tendinis principium o. sinus cui tibiam flectentium tertius insertus n.

p. r. 4. Tibiam extendentis primi seu membranosae pars carnosae.

p. 6. Ilii ossis dorsum nudum.

q. s. x. 6. Femur extendentis tertii circumscriptio.

f. 6. Femur extendentis 3. & 4. insertio.

t. 5. 6. Femoris processus magnus & exterior.

u. 5. 6. Ligamentum à sacro osse in coxendicis processum acutum.

x. 5. Ligamentum ab osse sacro in coxendicis sedem posteriorem.

y. 5. Nervus quartus cruris omnium maximus in quo humor colligitur Ischiadem cansans.

* 4. Sinus venae cruris maximae & arteriam cum nervo vehens.

1. 2. ch. 6. Nervus 4. in poplite bipartitus, ramus major 1. minor 2.

3. 4. ch. 6. Abdominis musculi oblique ascendentis initium membraneum à dorso spina.

8. 9. ch. 6. Carnea portiones duae seu marsupium carneum femur circumagentium secundo sive Obturator interno adhaerens.

LIBRI QUARTI.

215

TAB. XVII
FIG. IV.

LIB. IV.
FIG. VI.

FIG. V.



E 2

T A B.

TAB. XIIX. *Tibia & pedis muscoli aliquot depinguntur.*

a 7.8. *Tibiam flectentium musculus primus, seu longissimus.*

b 7.9. *Tibiae flectentium musculus 2. seu gracilis.*

c 7.8. *Tibiam extendens 1. seu membranosus.*

d 8.9. *Tibiam extendens 2. seu Vastus externus.*

e 7.8.9. *Tibiam extendens 3. seu Vastus internus.*

f 9. *Sinus cui femoris musculus nonus incumbit.*

g 7.8. *Tibiam extendentium 4. sive Rectus.*

h 2.3 ch.8. *Principium 1. tendo 2. locus ubi tendo subditis tendinibus connascitur.*

i 8. *Femoris musculus seu extendentium 1.*

k 8.9. *Femoris musculus seu extendentium 2.*

l 9. *Femoris musculi 5 seu tricipitis portio.*

m 8. *Femur flectentium 1. seu Lumbalis.*

n 8. *Femur flectentium 2. seu Iliacus internus.*

o 7.8.9. *Femur flectentium 3. sive liividus.*

p 8. *Pedem extendens musculus secundus externus.*

q 7.8. *Tibiae musculi primi tendo juxta genu.*

r 7. *Tibiae musculi 1.2 & 3 insertiones.*

s 8. *Malleolus internus.*

t q 7. *Tibiam extendentis musculi primi carnosae pars p. membrana illius amplissima q.*

r s 7.8. *Origo illius r. 7. at insertio s. 8.*

u x.9. *Tibiam extendentis secundi principium t. insertio u. tendo x.*

y 8. *Digitorum extendentis primi tendo ad pollicem.*

C. 7.8.9. *Pubis ossis sedes.*

H. 7. *Pedem extendens 3. seu planiaris.*

I. 7. *Pedem extendens 4. seu Soleus.*

K. 7. *Pedem extendens 5. seu Tibialis posticus.*

L. 7.8. *Pedem flectentium 1. seu Tibialis anticus.*

M. 8.9. *Pedem flectentium 2. seu Peroneus 1.*

N. 8.9. *Pedem flectentium 3 seu Peroneus 2.*

O. 8.9. *Digitorum extendentium 1 seu Pollicis tensor.*

P. 7.8.9. *Digitorum extendentium secundus.*

p. 8.9. *Illius portio quam pedis 9. musculum facit Vesalius.*

10. 11. 12. ch.8. *Exortus illius 10. divisio in tendines 11. insertio 9. musculi 12.*

R. 9. *Digitorum flectentium 2. seu Digitorum flexor magnus.*

T. 7. *Abductor pollicis inferior.*

X. 8.9. *Tibiae os nudum.*

Y. 8.9. *Abductor digitorum superior.*

Z. 7.8. *Crureus distinctus quibusdam musculus.*

Æ 7. *Pedem extendens primus, seu Gastrocnemius internus.*

LIBRI QUARTI.

223

TAB. XIX

LIB. IV.

FIG. VII.

FIG. VIII.

FIG. IX.



223 TAB.

TAB. XIX. Femoris, tibiae, pedis & digitorum musculos nonnullos exhibet.

- a. 10. Ilii ossis spina à musculis denudata.
 b. 10. Femoris processus major exterior.
 ab. 12. Femoris flectentium primi, seu lumbalis musculi origo a. tendo illius b.
 e. 12. Ossis pubis sedes denudata.
 f. 12. Os femoris ex carne.
 g. 12. Patellae sedes posterior articulum respiciens, anteriori sedetendinibus innata.
 h. 12. Tibiam extendentis 2. seu Vasti externi tendo.
 i. 12. Tibiam flectentis 4. seu bicipitis insertio.
 k. 12. Tendinum 7. 8. & 9. musculi in unum connexio.
 l. 12. Tendo tibiae musculi 9 seu recti.
 m. 12. Tibiae ossis anterior sedes ex carnis.
 n. 10. Pedem flectentium musculi secundi exortus.
 n. 12. Fibulae anterior sedes denudata.
 o. 12. Ligamentum inter tibiae os & fibulam repositum.
 o. 10. Malleolus externus.
 pq. 10. Pedem flectentium secundi corpus anterius & posterius.
 r. 10. Tendinis huius musculi initium à medio corporis illius.
 j. 10. Pedem flectentium tertii tendo ad externum malleolum reflexus.
 y. 10. Tibiam extendentis tertii seu Vasti interni origo.

- δ. 10. Tibiam flectentium quartus seu biceps.
 θ. 10. II. 12. Tibiam extendens 3. seu Vastus internus.
 ζ. 10. Femur extendentium 3. seu Glutaeus minor.
 ρ. 10. II. 1. Femoris musculus 5. seu triceps.
 σ. 10. II. 12. Femoris musculus 6. seu lumbalis.
 6. ch. 12. Femoris musculi 5. portio anterior.
 τ. 10. II. 12. Femoris musculus 7. seu Iliacus internus.
 υ. 10. II. 12. Femoris musculus octavus.
 φ. 12. Femur circumagens 1. seu Obturator externus.
 ω. 10. Pedem extendentium 2. seu Gastrocnemius externus.
 A. II. 12. Os sacrum.
 H. 10. Tibiam extendens 2. seu Vastus externus.
 M. 10. 12. Pedem flectentium 2. seu Peroneus primus.
 N. 10. 12. Pedem flectentium 3. seu Peroneus secundus.
 O. 10. Digitorum extendentium 1. seu Pollicis tensor.
 T. II. Pollicis abductor inferior.
 V. 10. Digiti minimi abductor.
 X. 10. Tibiae os ex carne cum ligamento ipsum & fibulam intercedente.
 Υ. 10. II. Digitorum abductor superior.
 Z. 10. Crureum musculus faciunt.
 Σ. II. 12. Dorsi musculus primus seu quadratus.

T A B.

LIBRI QUARTI.


TAB. XIX.

LIB. IV.

FIG. X.

FIG. XI.

FIG. XII.



Et 4

TAB.

TAB. XX. Femoris & pedis musculos proponis.

- α. 14. Tendo ex tribus pedis musculis conflatus & calcis insertus.
 β. 14. Tendinis peronei 1. initium ē medio illius corpore.
 γ. 14. Tendo peronei 2. ad malleolum externum reflexus.
 δ. 13. Tibiam flectentium 4. seu biceps dependens.
 ε. 13. Tibiam flectentium 5. seu semimembraneus dependens.
 ζ. 15. Ligamentum in pedis planta, tendinis lati vicem subiens.
 η. 13. Tibiam extendens 2. seu Vastus externus.
 θ. 13. 14. Tibiam extendens 3. seu Vastus internus.
 ι. 13. 14. Ligamentum ab osse sacro in coxendicis ossis processum acutum.
 λ. 14. Tibiam oblique movens, sive Popliteus.
 ξ. 13. Femur extendentis tertii portio.
 π. 13. Femur extendentis 4. seu Iliaci externi portio.
 ρ. 13. 14. Femur extendentium 5. seu triceps.
 σ. 13. Musculi quinti pars altera.
 τ. 14. Femur flectentium 1. seu Lumbalis.
 υ. 14. Femur flectentium 2. seu Iliaci interni tendo.
 φ. 14. Femur circumagens 1. seu Obturator externus.
 χ. 13. 14. Femur circumagens 2. seu Obturator internus.
 ψ. 13. Pedem extendens primus & secundus, seu Gastrocnimius internus & externus.
 ω. 14. Pedem extendens primus.
 ω. 14. Pedem extendens secundus, seu Gastrocnimius externus.
 αβ. 13. Musculorum duorum pedem extendentium principia.
 αβδω. 13. Carnea eorum principia c. horum contiguitas d. & ω.

εε. 13. Surae utriusque extuberantia.

- f. 13. Tendinis horum duorum musculorum initium.
 g. 13. 14. Illi ossis dorsum ex carne.
 h. 13. 14. Femoris ossis caput ligamento membraneo unitum.
 l. 14. Coccygis os ex carne.
 m. 13. 14. Femoris processus exterior & magnus.
 n. 14. Femoris linea aspera cui femoris musculus 5. seu triceps inseritur.
 q. 14. Pedem extendentis quarti initium.
 r. 14. Pedis 1. & 2. musculi insertio.
 seu. 14. Femoris musculi 10. tendines tres ad coxendicis os reflexi.
 u. 13. Femur extendentis musculi quinti posteriori partem caput nervum.
 x. 13. Illius caput carneum.
 y. 13. Muri formam praeficiens.
 z. 13. Tendo primae partis femoris capiti interiori insertus.
 6 ch. 13. Tertia pars musculi quinti.
 7 ch. 14. Altera pars musculi quinti.
 8. 9. char. 13. Carnea portiones duae, seu marsupium carneum femur circumagentium secundo adhaerens.
 H. 13. 14. Pedem extendens 3. sive Plantaris.
 I. 14. 15. Pedem extendens 4. sive Soleus.
 † 15. Cavitas inter tendinem praedicti musculi & alios.
 O. 14. Tibiae os & femoris caput externum denudatum.
 P. 14. 15. Pedem extendentis musculi tertii tendo.
 * 15. Tibiae ossis sedes ex carne.
 T. 15. Abductor pollicis musculus inferior.
 V. 15. Abductor digiti minimi musculus.

T A B.

LIBRI QUARTI.

227

TAB. XX.

LIB. IV.

FIG. XIII.



FIG. XV.



FIG. XIV.



Ff

T A B.

TAB. XXI. Pedis & digitorum ejus musculos exhibet: at FIG. XII. & XIX. pedem dextrum, quemadmodum & precedentes dua, sed magis à musculis denudatum proponunt.

a. 16. Ilium ossa dorsum nudum.

b. 16. Ligamentum membraneum pubis ossu foramen occupans. (do m. 18. 19.)

l. m. 18. Pedem extendentis musculi 5. initium l. ejus tendinis musculi 1. pedem flectentis portio.

p. 16. Femur circumagentis 1. portio.

xx. 16. Carnosa partes dua, musculi decimi femoris tendines vestientes.

x. 19. Pedem flectentium musculi tertii insertio.

A. 18. 19. Tibia os.

B. 18. 19. Fibula. (opifex.)

D. 18. Sinus cui tendo insidet, secundi pollicis internodii

E. 18. Officula juxta primum pollicis internodium.

F. 19. Ligamentum tibia & fibula ossa intercedens.

H. 16. Pedem extendentium tertius, seu Plantaris.

I. 16. Pedem extendentium quartus, sive Soleus.

K. 18. 19. Pedem extendentium 5. seu Tibialis posterior.

M. 16. 18. 19. Pedem flectentium 2. seu Peroneus 1.

N. 18. 19. Pedem flectentium 3. seu Peroneus 2.

O. 18. Sinus quo tendo vehitur musculi, tertium os quatuor digitorum flectentis.

Q. 16. 17. 18. Digitorum pedis flectentium primus, seu Pollicis flexor.

R. 16. 17. Digitorum pedis flectentium 2. sive digitorum flexor magnus.

S. 16. 17. Digitorum pedis flectentium 3. seu digitorum flexor alter.

T. 16. Abductor pollicis inferior.

V. 16. Abductor minimi digiti.

X. 17. 18. Lumbricales quatuor musculi.

Z. 19. Interossei musculi.

A. 16. Tibiam oblique movens, seu Popliteus.

G. 16. Femur flectentium primus, seu Lumbalis.

T. 16. Femur flectent. 2. seu Iliacus internus.

ψ. 16. Pedem extendentium 1. seu Gastrocnemius internus. (ternus.)

ω. 16. Pedem extendentium 2. seu Gastrocnemius ex-

* 16. Femoris os nudum. (sculpti.)

I. 2. 3. char. 19. Sinus tres tendinibus tribus vehendi in-

3. ch. 16. Ligamentum à digitorum articulo pendens lati tendinis vicem gerens.

4 5. ch. 16. Poplitei musculi exortus & ejus insertio 5.

13 ch. 16. Digitorum pedis flectentium primi exortus.

14 15. char. 16 17. Tendo illius musculi 14. ad pollicem insertio 15.

16 ch. 16. Digitorum pedis flectentis musculi secundi principium.

17. ch. 16 17. Tendo illius illic enatus.

18. ch. 17. Tendo in partes quatuor divisus.

19. ch. 18. Tendinum commixtio.

20. 21. ch. 16. Digitorum pedis flectentis tertii exortus à calcce 20. ejus in tendines quatuor divisio 21.

22. ch. 16. 17. 18. Carnea portio pedis ossibus ad pollicem adnata.

FIG. XX. Ligamenta femoris & tibia articuli ossibusq. cohaerentia exhibentur.

AB. Femoris os A. ejus caput superius B.

CD. Capita inferiora duo.

EF. Tibia os E. tuber ejus superius F.

G. Sinus inferior.

HI. Malleus interior H. Fibula I.

K. Malleus exterior. (ossi jungens.)

L. (superius) Ligamentum teres femoris os, coxendicis

L. (inferius) musculi pedis quartus.

MM. Ligamentum femoris cum coxendicis osse articulum orbiculatum ambiens.

N. Ligamentorum portiones ex magno & externo femoris processu in musculorum substantiam, ac potissimum in tibiam moventium septimi absumpta.

O. Ligamentum femoris processus parvo affixum.

PP. Ligamentum membraneum genu articulum involvens ea parte excepta, cui Mola praepositur.

QR. Ligamenta genu articulo peculiaris, ejusq. lateri externo & interno adposita. (risos insertum.)

S. Ligamentum ex tibia ossis tubere F. notato, infensa-

TV. Ligamentum fibulam tibia supra infraq. connectens.

X. Ligamentum membraneum, fibulam tibia ossi toto ductu committens.

YZ. Ligamentum transversum quod tendines, qui à tibia anteriori sede in pedis superiora porriguntur, annuli ritu complectitur. (tus.)

α. Tendo ex tribus pedis musculis conflatus & calcis insertio.

a. b. Ligamenta calcem tibia & fibula jungentia: à tibia osse ad calcem a. à fibula ad calcem b. insertum.

c. d. Ligamentum cartilagineum, à maleolo interno, in tali latius insertum c. aliud fibulam talo jungens d.

T A B.

FIG. XVI.

TAB. XXI.


LIB. IV.

FIG. XIII.

FIG. XIX

FIG. XVII.

FIG. XX.



Ff 2

TAB.

TAB. XXII. *Vena cava in pedem utrumq;
distributionem exhibet.*

N. *Litera hac frustra irrepfit.*

O. *Vena cava ad lumborum quartam vertebram supra os sacrum, in duos truncos iliacos divisio Δ referens.*

π. *Muscula superior, per musculos lumborum, abdominis & peritoneum disseminata.*

ρ s. *Iliaci trunci sinistri bifurcatio in ramum exteriorem σ. & interiorem ρ.*

τ. *Muscula media, rami ρ propago in femoris musculos exteriores & cutim natum.*

χ. *Rami ρ congressus cum vena rami 2.*

ε s. *Rami ρ per pubis ossis foramen transitus.*

G. *Cruralis vena caudex, earum venarum quae in crus feruntur.*

Γ. *Epigastrica, rami s propago sursum ad abdominis musculos rectos delata.*

ΔΔ. *Pudenda, rami s propago qua transversim ad genitalia fertur.*

Θ. *Saphena seu Malleoli vena.*

Λ. *Saphena ramus interior ad femoris interiora, inguina & peritoneum.*

Ξ. *Saphena ramus exterior & major, in femoris anteriora & exteriora.*

Π. *Saphena ramus secundus, ad tibiae musculum primum.*

Σ. *Saphena ramus tertius, ad genu posteriora orbiculatim convolutus.*

Φ. *Saphena ramus quartus, qui per tibiae partem interiorem sub cute fertur, inq; varios furculos distribuitur: & hic secari potest.*

Υ. *Ramus hic, deducendus erat a sculptore usq; ad ch. 7. ad anteriorem malleoli interioris sedem quo in pedis superiora terminaretur, quemadmodum ad ch. 7. recte fit.*

Ω. *Ischias minor: rami exterioris s propago, in*

musculos coxendicis articulo insidentes & ejus loci cutim.

1. *Muscula hujus ramus exterior & minor ad tibiae musculum 2. & 4. fertur.*

2. *Muscula ramus interior & major, per femoris musculos potiss. 5. & tibiae 3. distribuitur.*

3. 4. 5. *Duobus ramis 3. 4. cruralibus coeuntibus furculi 5. posterius ad femoris cutim abeunt, & per medium poplitem descendit.*

6. *Poplitea quae ab antiquis frequenter incidebatur.*

7. *A poplitea ramuli per surae cutim ad calcem.*

8. *Suralis: haec ad femoris inferiora in truncum exteriorem 9. & interiorem 14. dividitur.*

9. 10. *Suralis ramus exterior 9. ramulum extrorsum in cutim genu distribuit 10. (omissit sculptor ch. 10. & male cum 6. & 9. junxit.)*

11. *Suralis rami externi sub genu divisio in ramum internum 11. inter pedis musculos delatum.*

12. 13. *Illius ramus exterior secundum tibiae exteriora ad malleolum externum & pedis superiora variis furculis distributus.*

14. 15. 16. *Suralis ramus interior 14. per tibiae posteriora: hujus per tibiae interiora ramus 15. qui ad calcem & pollicem 16. descendit.*

17. 18. *Ischias major: a suralis ramo interiore 14. per surae musculos: ab hac magnus ramus 18. inter tibiae musculos delatus ad pedis superiora ejusque digitos distribuitur.*

20. *Interioris trunci 14. reliquum post malleolum internum delatum in digitos absimitur.*

TAB. XXII.

LIB. IV.



Ff 3 TAB.

TAB XXIII. Arteria magnæ in utrumq.
pedem distributionem proponit.

- λ. Mesenterica inferior arteria.
- μμ. Lumbares quæ lumborum vertebrae geniculatim accedunt.
- νν. Arteria magnæ in iliacos supra os sacrum diviso.
- ξ. Iliaci sinistri divisio in ramum anteriorem & exteriorem φ.
- ο. Musculi inferior interioris rami propago exterior in musculos coxendicis articulum tegentes.
- π. Hypogastrica: interioris rami & propago interior, ad vesicam penem, uterum, &c.
- ρς. Vena umbilicalis, cum ramo ξ. conjunctio ad γ.
- ττ. Epigastrica quæ sursum ad abdominis musculos rectos mittitur.
- υ. Pudenda: quæ transversim secundum pubis os ad pudenda repit.
- φ. Iliacus ramus externus.
- χ. Muscula cruralis exterior.
- ↓. Muscula cruralis interna, quæ ad musculos femoris internam sedem occupantes mittitur.

ω. Hujus cum hypogastrica ramo conjunctio.
Γ. Poplitea.

ΔΔ. Suralis arteria propagines utringq. in genu articulum & pedis musculos tres.

Θ. Suralis, quæ cum vena interiore descendit & in tres ramos dividitur ΑΣΠ,

Λ. Tibia exterior in tibiae musculos.

Σ. Tibia posterior elatior per tibiam anteriorem.

Πφ. Tibia posterior & humilior, musculis occultatus sub ligamento transverso pedis superiora accedit φ. & in musculos digitorum absimitur.

ΞΥ. (inferius) Cruralis caudex inter calcem & malleolum internum, cui ramulum Υ offert in pedis superiora.

Ω. Cruralis reliquum ad ipsos digitos inter ipsorum musculorum tendines distribuitur.

αβ. Rami Ω divisio in ramum anteriorem & exteriorem αβ.

γ. Rami interioris divisio in ramos quinq. ad pollicem, indicem & medium.

δ. Rami exterioris divisio ad medium, medicum & minimum.

T A B.

LIBRI QUARTI.

155

TAB XXIII

LIB IV



Ff 4 TAB.

TAB. XXIV. Nervos totius pedis exhibet.

20. ad 24. E Lumborum vertebris egredientia paria quinque.

50. 50. Nervi ad abdominis musculos.

51. Rami ab his ad brachii musculum latissimum.

25 ad 30. Sacri ossis nervorum paria sex.

53. Ramus paris 25. ad ilii ossis sedem internam & musculos abdominis inde prodeuntes.

57. Crus seu femur subiens nervus primus.

58. Ab hoc rami ad cutim.

59. Ab hoc ad musculos femoris exteriora occupantes.

60. Cruris nervus secundus.

61 62. Ab hoc rami per femoris & tibiae interiora ad summum usque pedem 62.

63. Aramo 61. furculi genu implicantes.

64. Nervus secundus rami ad femoris profundiora.

65. Ab hoc rami ad femoris musculum tricipitem.

66. Cruris nervus tertius.

67. A nervo tertio soboles in musculos pubis ossis foramen occupantes.

68. Alius ramus ad femoris cutim sede interna.

69. Nervus tertii portio profunda ad musculos.

70. Portio ad tibiae flectentium musculum 2.

71. Cruris nervus quartus & crassissimus.

72. Hujus propago ad cutim femoris parte posteriore.

73. Alia propago ad capita musculorum à coxendicis appendice pronatorum.

74. Alia ad tibiae musculum quartum & incutim ad genu articulum.

75. Surculi à nervo quarto ad capita musculorum pedis.

76. Quarti nervi in duos truncos in poplite divisio.

77. Hujus divisionis gracilior & exterior truncus.

78. 78. Dicti trunci ramus cuti subtensus, & ad externam tibiae & pedis sedem delatus.

79. Hujus portio praecipua inter tibiae & fibulam.

80. Ramus anteriorem tibiae sedem sub cute implicans, à ramo 79.

81. Portio praecipua rami 79. ad pedis musculos.

82. Nervi cruris quarti interior & crassior truncus in poplite.

83. Ramus internam sedem tibiae & pedis perreptans.

84. Ramus trunci 82. in surae cutem sparsus.


85. 85. Ramus trunci 82. tibiae anteriora ad pedis superiora perreptans.

86. Alius ramus inter pedis musculos posterius excurrentes.

87. Trunci 82. reliquum secundum malleolum internum delatum singulis digitis sede inferiore ramulos duos largitur.

TAB. XXIV.

LIB. IV.



- TAB XXV. FIG. I. & II. Femoris ossis anteriorem & posteriorem sedem exhibet.
- FIG. III. Femur ostendit, cujus appendices sua sede dimovimus, ac veluti quodam interstitio à reliquo osse disjuximus.
- FIG. IV. & V. Illa patella anteriorem sedem asperam: hac ejusdem posteriorem sedem in crustatam proponit.
- A.1.2. Femoris caput coxendicis acetabulum subiens.
- B.2. In femoris capite sinus cui ligamentum teres inseritur.
- C.1.2. Appendicis femoris cum ipso osse conjunctio.
- D.1.2.3. Femoris cervix.
- E.F.1.2. Femoris capita duo inferiora.
- G.1.2. Appendicis inferioris coalitus.
- H.1.1.2. Sinus inter duo femoris capita.
- K.2. Capitis interioris pars, unde pedis musculus primus prodit.
- L.2. Alia pars à qua pedis 2. & 3. musculus oriuntur.
- M.2. Alia pars cui tendomusculi 5 femoris infigitur.
- N.1.2. Capitis externi lateris sinus pro tibia musculo quarto.
- O.2. Interni lateris sinus per quem tendines porriguntur.
- P.2. Extuberantia ad quam dicti tendines reflectuntur.
- Q.2. Femoris processus exterior: & inter Q. & D. sinus.
- α. 2. (Omissum in figura quemadmodum & β) sinus est sedis interna hujus processus.
- R.1.2. Processus hujus cum femore unio.
- SS.2. Linea aspera à processus externi impressione.
- T.1. Processus externi anterior impressio.
- β Inter T. & V. impressio alia elatior.
- V.1.2. Impressio quarta in processus apice.
- X.3. Quatuor X femoris appendices quatuor indicant.
- T.3. Tria T. femoris capita tria notant.
- Z.3. Femoris duo processus.
- a.1. Femoris processus anterior.
- b.1. Processus coalitus cum femore.
- cc.2. Linea à processu interiore obliquè descendens.
- dd.2. Linea secundum femoris longitudinem ducta.
- e.2. Femoris amplitudo in hac parte.
- f.1. Asperitas à qua tibia musculus octavus prodit.
- gh.5. Patella tuber sinum qui est inter femoris capita I. notatum subiens.
- i.5. Sinus qui femoris capiti interno aptatur.
- k.5. Sinus qui femoris capiti externo congruit.
- l.5. Asperitas inferior.
- m.4. Patella anterior sedes aspera.

TAB. XXV.

LIB. IV.

FIG. I.

II.

III.



IV.

V.



Gg 2

TAB.

- TAB. XXVI. Tibia & fibula ossa cum cartilagini-
bus circa genu exhibit.
- FIG. I. & II. Tibia integra & quidem dextra ante-
riorem & posteriorem faciem proponit.
- FIG. III. & IV. Tibia ossis anteriorem & posteri-
orem sedem.
- FIG. V. & VI. Fibula anteriora & posteriora.
- FIG. VII. Tibia ossis partem superiorem, cui femur
articulatur.
- FIG. IIX. Cartilagineas binas tibiae articuli sinum
ad genu adaugentes.
- FIG. IX. Tibia integra in eam sedem qua anteriore
facie talum excipit.
- FIG. X. Tibia ossis partem infimam ex parte poste-
riore.
- FIG. XI. Fibulae inferioris sedis internum latus quo
talo articulatur, ostendit.
- AB.1. Tibia ossis appendix superior.
- AB.2.3. Linea coalitus appendix cum osse.
- C.1. Fibula appendix superior.
- C.5. Appendix huius cum osse coalitus.
- DD.1. Tibia appendix inferior.
- D.3. Appendix huius coalitus.
- E.1. Fibula appendix inferior.
- E.5. Appendix ad os coalitus.
- FG.2.4.7. Tibia ossis sinus femoris capita excipien-
tia.
- HIK.7. Tuber dictos sinus dirimens. K. & L. in 2.3.4.
idem indicant.
- LM.8. Cartilago tibiae externum sinum adaugens, in-
ternum vero M.
- N.8. Cartilagineas dicta hac sede crassissimae videntur.
- O.8. Hic vero tenuissima.
- P.8. Huius sedibus in apicibus terminantur.
- Q.5. Fibula sinus levis cui tibiae capitulum articulatur.
- R.4. Tibia capitulum fibulae articulat.
- S.4.10. Tibia ossis sinus, fibula sedem inferiorem exci-
piens.
- T.5.6. Fibula latus internum quo tibiae ossi committi-
tur.
- VX.2. Fibula ad tibiae os contextus superior V. infe-
rior X.
- T.2. Intervallum inter tibiae & fibulae os.
- Z.1.2. Fibulae introsum obliquatio qua exterius finis
est.
- ab.1.3. Tibia ossis sedes anterior in quam musculi tibiae
extendentes inferuntur.
- c.5.6. Fibulae appendix processus superior, cui tendo mu-
sculi 4. tibiae inseritur.
- defgh.9. Huic sedi tali pars superior articulatur. def.
in 9 & 10. superiorem regionem ostendit: at d. tuber
notat.
- h.9.11. Externum latus quo talo apratur.
- Φ.1. Malleolus interior, sive tibiae ossis appendix interio-
ris processus.
- i.2.3.9.10. Malleolus internus.
- k.4.10. Malleolus interioris finis unde ligamentum car-
tilagineum talo inseritur.
- l.1.3.9. Sinus inaequalis in tibiae ossis appendice inferiori
unde ligamentum cartilagineum enascitur, quod ad
tali cervicem mittitur.
- m.2.4.10. Sinus per quos tendines tres ad pedem dedu-
cuntur.
- n.2.5.6.9. Malleolus exterior seu fibulae processus in 1. E.
notatus,
- op.1.5. Fibulae pars ea quae nuda occurrit (male P. pos-
itum.)
- qq.1.6. Hac fibulae sede sinuata tendines pedum mu-
sculi 7. & 8. reflectuntur.
- r.6.11. Fibulae appendix sinus, a quo ligamentum in-
talum.
- ss.1.5. Fibulae linea prima.
- tt.1.2.5.6. Fibulae linea secunda.
- uu.1.2.5.6. Fibulae linea tertia.
- xx.1.5. Fibulae latus primum modice prominens.
- αα.1.5. Fibulae latus secundum.
- ββ.2. (in 6.B.) 6. Fibulae latus tertium.
- γγ.1.3. Tibiae ossis linea prima.
- δδδ.1.2.3.4. Tibiae ossis linea secunda.
- εε.1.2.3.4. Tibiae ossis linea tertia.
- ζ.1.3. Tibiae ossis latus primum.
- η.1.3. Tibiae ossis latus secundum.
- θ.2.4. Tibiae ossis latus tertium.
- κ.2.4. Linea aspera tertii lateris tibiae pro musculo po-
pliteo. (fig. 2. N. pro κ positum.)

T A B.

TAB. XXVI.

LIB. IV.

FIG. I.

II.

III.

IV.



68 3

T A R.

TAB. XXVII. Pedis minoris ossa proponit. FIG. I. & I. Pedis dextri ossa compacta facie superiore & inferiore exhibet. FIG. III. IV. V. VI. Tali latera superiora, inferiora, interiora & exteriora. FIG. VII. II. IX. X. XI. Navicularis ossis anteriorem & posteriorem faciem. FIG. XII. XIII. Tarsi ex quatuor ossibus compositi faciem anteriorem & posteriorem ostendit.

ABCD 3. 5. 6. Tali tuber, tibia ossis appendici articulum, & huius tuberis latera quatuor.

EE 3. Sinus tali tuberis insculptus.

FF 3. Tali tuberis partes duae prominentes.

G. 5. Tali tuberis latera internum cartilagine incrustatum, malleolo interno commissum.

H. 6. Tali tuberis sinus externus cartilagine obductus, malleolum externum excipiens.

I 5. Tali sinus asper ligamentum cartilagineum à malleolo interno recipiens. (no recipiens.)

K 6. Tali sinus ligam cartilagineum à malleolo externum recipiens. (no recipiens.)

LM 5 6. In tali parte posteriore sinus duo.

N. 3 4 5 6 Tali cervix.

O. 3 4 5 6. Tali caput ossis navicularis sinum subiens.

P. 7. 8. 9. Calcis ossis caput cartilagine incrustatum, tali sinum subiens.

Q. 4. Tali sinus amplius calcis caput suscipiens. (culatur)

R. 7. 8. 9. Calcis sinus, cui tali capituli inferior sedes articularis.

S. 4. Tali capituli sedes inferior, calcis sinum ingrediens.

TT. 4. Tali sinus asper unde ligamenta cartilaginea calcis infiguntur. (sinu recipiens)

VV. 7. 8. 9. Calcis sinus asper, ligam. cartilaginea ex tali XYZ 2. Calcis sedes. (condis.)

YZ. 2. I. 8. Z. 9. Calcis sedis processus pro musculo edu.

ab. 7. 8. 9. Ab a. ad b. calcis sedis superioris intervallum.

c. 8. 9. Calcis sedes postica.

d. 2. 8. Calcis latera internum. (tuntur.)

e. 8. Sedes qua tendines pedis inferiora petentes refunguntur. (guntur.)

f. 7. 9. Calcis latera externum. (guntur.)

g. 1. 9. Hic tendines musculi 7. & 8. pedis exporri.

h. 7. Calcis sedes anterior qua talo committitur.

i. 7. Calcis sedes qua ossi cubiformi articuletur.

l. m. n. 10. Ossis navicularis sinus tali caput os suscipiens.

l. m. n. 10. Ossis navicularis tres leviter prominentes superficies, quibus tarsi ossibus articulantur.

op. 11. Ossis navicularis superior sedes, pedis superiora respiciens.

q. r. 10. & q. 11. Illius inferior sedes.

q. 10. 11. Sinus quo pedis musculus & deducitur.

st. u. 13. Tarsi ossium trium interiorum superficies plana, qua naviculari coarticulantur.

x. 13. Cubiformis ossis sinus leviter excelsus, quo calcis articuletur.

α β. 12. Cubiformis sedes, cui pedis os annularem suffulciens jungitur. (tur.)

γ. 12. 13. Cubiformis sedes, qua tarsi os tertium articulat.

δ. 12. 13. Cubiformis sedes pedis latera externum spectans.

ε. 12. 13. Cubiformis superficies in pedis superiore sede.

ζ. 2. 13. Cubiformis sedes terram spectans: at fig. 2. ponitur 3 sub 4. (flectitur.)

η. 2. Cubiformis sinus ad quem tendo musculi 7. pedis re-

θ. 13. Tarsi ossium tertii processus, cui pedis musculus quintus inseritur, (male B. pro θ.)

ι. 12. Tarsi ossium intimi sedes, cui pedis os pollicis praepositum copulatur.

κ. 12. Tarsi ossis secundi sedes, cui pedis os indicem sufficiens articulat. (ritur, articulat.)

λ. 12. Tarsi ossis tertii sedes, cui pedis os, cui medius inni-

μ. 1. 2. Ossis cuius pedis os digito parvo praepositum, ossi cubiformi committitur.

ν. 1. 2. Intervalla inter pedis ossa.

ξ. 1. 2. Pedis ossium capitula, digitorum sinus subeuntia.

π. 2. Pedis ossis processus, cui tendo musculi 7. pedis implantatur. (musculi 8. pedis suscipiens.)

ρ. 2. Pedis ossis processus minimo praepositus, tendinem

σ. τ. υ. 1. 2. Indicis ossa tria.

φ. ω. 2. Sesamina ossicula, duo pedis ossi pollicem sufficiens supposita.

* 2. (ponendus asteriscus sub x.) Sesaminum β culum pollicis internodio secundo praepositum.

Γ. 1. 2. Talus.

Δ. 1. 2. Calx.

Θ. 1. 2. Os naviculare.

Λ. E. 1. 2. Digitorum pedis ossa.

Φ. X. 1. 2. (at in i. p. pro Φ) Pollicis ossa duo.

1. 11. 111. 1 V. V. 1. Pedis ossa quinque.

1. 2. 3. 4. in fig. I 2 12. 13. Tarsi ossa quatuor.


1. ch. 12. 13. Cuneiforme majus seu tarsi quintum.

2. ch. 12. 13. Cuneiforme minus seu tarsi sextum.

3. ch. 12. 13. Cuneiforme medium seu tarsi septimum.

4. ch. 12. 13. Cubiforme os.

T A B.



EXPLICATIONES LITERARUM. quæ in Tabulis integris ossium, venarum, arteriarum, & valvula- rum ipsarum venarum reperiuntur.

TAB. I. Sceleti virilis faciem anteriorem, seu compagem omnium ossium & cartilaginum viri, prout parte anteriore conspicitur, exhibet.

TAB. II. verò Sceleti faciem posteriorem.

TAB. III. Sceleti partem lateralem proponit: quare characteres tabulis his tribus appositos simul explicabimus.

A.3. Sutura coronalis, τεφανιαία.

B.2.3. Sutura litera Δ similis, λαμβδοειδής.

C.2. Sutura sagittalis, όβελιαία.

D.2.3. Contextus squamiformis, δεπιδοειδής.

α.2.3. Os verticis, βρεγματικός.

β.1.3. Os frontis, μετώπου, seu coronale, inverecundum.

γ.2.3. Os occipitis, ινίς.

δ.2.3. Temporum ossa, έστιάκοταφών.

ε.3. Appendix in osse temporis stylis imaginem referens, στυλοειδής.

ζ.1.2.3. Processus in osse temporis uberis papillam referens, μαρσεειδής.

η.3. Calvaria sedes lapidosa.

θ.3. Processus cuneiformis ossis vesperilionum alas referens, πτερυγοειδής.

F.1.2.3. Os jugale, ζυγωμα.

G.1.2.3. Maxilla inferior.

KLMN.1.2.3. Spina φαχίς.

ab I. ad K. Cervix τετραχηλός.

à K. ad L. Vertebra thoracis.

ab L. ad M. Vertebra lumborum.

ab M. ad N. Os sacrum, ιερόν.

N. Coccygii ossis, κόκυξ, cauda os.

O.1.3. Pectoris, στήθον.

P.1.3. Cartilago ensiformis, ξίφοειδής.

I.2.3. usq. ad 12. in 1.2.3. Costae thoracis 12. πλάγια.

Q.1. Clavicula κλείδες.

R.2.3. Scapula, ώμο, πλάτη.

χ.1.2.3. Scapulae processus superior, seu summus humerus, άκρωμιον.

μ.1.3. Scapulae processus inferior, άγκυροειδής.

δ.1.2.3. Humerus seu brachii os, βραχιόν.

TV.1.2.3. Cubitus, πήχυς.

X.1.2.3. Radius seu cubiti os superius, κεράς.

Υ.1.2.3. Ulna, cubiti os inferius, πήχυς.

υ.3. Cubiti processus, ώλεκτρονον.

ξ.1.3. Processus ulnae stylum referens, στυλοειδής.

Z.1.2.3. Brachiale, καρπός.

ΓΓ.1.3. Postbrachiale, μετακαρπιον.

ΔΔΔ.1. Digiti, δάκτυλοι.

Θ.1.2.3. Ossa, sacri ossis lateribus commissa, utrinque unum in tres veluti partes distinctum.

ο.1.2.3. Prima pars, ilium os, λαχόνων.

π.1.2.3. Secunda pars, coxendicis os, ισχίον.

ρ.1.2.3. Tertia pars, pubis os, ήβης.

σ.1.3. Cartilago ossium pubis unionem intercedens.

Λ.1.2.3. Femur, μηρόν.

τ.1.2.3. Femoris processus major exterior, rotator, τετρακνήμιος.

υ.1.2.3. Ejus processus minor & interior.

Ξ.1.2.3. Patella, rotula, στήμιυλς.

ΠΣ.1.2.3. Tibia, κνήμη.

Φ.1.2.3. Tibiae os interius & grandius, τετρακνήμιον.

Ψ.1.2.3. Tibiae os exterius & gracilius, fibula, περόνη.

Φ.1.2.3. Tibiae processus, seu malleolus internus.

X.1.2. Fibulae processus, seu malleolus externus, σφυρόν, uterq. dicitur.

Ω.1.2.3. Talus, balista os, άσπάλαλός.

α.2. Calx, πτέρνα.

β.1.3. Os naviculare, σκαφοειδής.

cc.1.2.3. Tarsus ex ossibus quatuor, ταρσός.

def.1.2.3. Tarsio ossa tria interiora, χαλκοειδή quibusdam.

g.1.2.3. Tarsi os extimum, cubum referens, κυβοειδής.

hh.1.2.3. Pedium, πέλδιον, planta, aliis μετάρσιος.


ii.1.2.3. Pedis digiti.

k.1.2.3. Osicula sesamina, σσημοειδή.

T A B.

OSTIUM TABULA IV.

TAB.



Hb

T A B.

OSSIUM TABULA II.
OSSIUM TABULA II.

TAB.

II



TAB.

TAB. OSSIUM TABULA III.



Hb 2

T A B.

TAB. IV. *Mulieris Sceleton seu contextus ossium & cartilaginum exhibetur, quo constet mulieris ossa omnia quidem in genere proportionem habita, viri ossibus minora esse: at in hac tabula ea tantum partes notantur literis, quibus mulier à viro, in ossibus & cartilaginibus, discrepat.*

A. *Sutura sagittalis ad nasum descendens & frontis os dividens, quæ aliquando in mulieribus, rarissime in viris, & in infantibus semper reperitur.*

B B. *Thorax antèrius nonnihil propter mammillas depressus.*

C C. *Clavicula minus curvata, nec ita ut in viris sursum intorta.*

D. *Pectoris os aliquando pertusum foramine cordis formam exprimente, per quod vena à mammariis extorsum ad mammam feruntur.*

E. *Costarum cartilaginee quæ in mulieribus ossis nonnihil propter mammarum pondus.*

F. *Dorsi pars supra lumbos reflexa.*

G G. *Ilii ossium amplitudo extorsum magis educta, quo uterus gravidæ his veluti fulcris innitatur.*

H H. *Pubis ossium processus humiliores extorsum educti, quo amplior sit cavitas K.*

I. *Pubis ossium commissura anterior cartilagine crassa oppleta, quo in partu nonnihil laxentur seu cedant.*

K. *Cavitas ampla coxendice & osse sacro circumscripta.*

L. *Coccyx retrorsum curvatus, quo partui minus obstet.*

M. *Femoris ossa ob cavitatis hujus seu pelvis amplitudinem, superius magis ab invicem distant: quare etiam mulierum femora crassiora sunt.*

T A B.

TAB.

IV.



OSSIUM TABULA V.

TAB. V. *Skeleton pueri modo nati, in quo ossa adhuc cartilaginosa, vel membranosa proponuntur.*

- a. *Membrana crassa & ferè quadrata, inter os frontis & verticis, quorum partes supplet.*
- c. *Frontis os à sutura sagittali in partes duas aequales divisum.*
- d. *Maxilla inferior in ossa duo separatio.*
- e. *Temporis ossis pars squamiformis, in medio quidem ossea sed in ambitu membranæ.*
- f. *Altera pars quæ ossis petrosi partem efficit, meatu auditorio cartilagineo existente.*
- l. *Alveoli maxillarum.*
- m. m. *Vertebra corpus à posteriori ipsius parte distinctum.*
- n. n. *Vertebrarum pars posterior, ossiculis geminis latis & processibus cartilagineis constans.*

o. *Sacrum os vertebrae quinque, cartilagine tamen interveniente constitutum.*

p. *Coccyx cartilagineus.*

q. *Pectoris os in ambitu cartilagineum, in medio ex pluribus ossibus compositum.*

rr. *Coxæ ossis pars amplior ex tribus ossibus, cartilagine intercedente compositum.*

ss. *Hujus ossis secunda pars, coxendicis & pubis ossium partes constituens.*

t. *Tertia pars sed posterior, easdem quæ secunda partes efformans.*

uu. *Patella genu cartilaginea.*

x. *Brachiale seu carpum cartilagineum.*

y. *Pedium cartilagineum.*

* *Et si appendices ossium in infantibus omnes cartilagineæ sint, signum tamen hoc, manifestiores, ut humeri, scapula, cubiti, ilii, femoris & tibiae notat.*

TAB.

OSSIVM TABVLA V.

TAB.

V.

FIG. III.



Hb 4

TAB.

TAB. VI. *Ossa & cartilagine embryonis exhibet.*

FIG. I. *Embryonem quadraginta duorum dierum jam dearticulatum proponit, cuius ossa omnia caseo concreto vel butyro similia extant.*

FIG. II. *Embryonis abortivi circiter trimestris, ossa tenella & magis adhuc quam pueri cartilaginosa, ostendit.*

aa. 1. *Inter has literas spatium illud occurrit, quod in calvaria summo molle & membranaceum, & Arabes Zeudech, vulgus Fonta-*

nellam vocat.

a. 2. *Membrana crassa frontis & verticis ossa intercedens.*

bb. 1. *Humeri extrema cartilaginea.*

b. 2. *Membrana ossium capitis divisionem, ubi futurae sunt intercedentes.*

cc. 1. *Cubiti & radii appendices molles, & ab ossibus fere separatae.*

dd. 1. *Femoris & tibiae appendices.*

ee. 1. *Pedii ossa omnino cartilaginea.*

z. 2. *Ungues etiam in foetu immaturato conspicui.*

TAB.

TAB.

VI.

FIG. II.



FIG. I.



11

TAB.


VENARUM OMNIUM TABULA.

- T A B.** hac, Vena cava integra & ab universo corpore libera proponitur: cum qua conferenda est tab. 7. lib. 2. c. m in hac plures litera apertius conspiciantur, ut qua in literis convenient: sic etiam tab. 12. & 22. libri 4.
- A.** Vena cava truncus.
- a.** Soboles à cava hepatis digesta.
- B.** Ostendit quomodo truncus cava in thorace propter cordis situm dextrorsum incurvetur.
- Inter A. & B.** vena cava sedes inter hepatis gibbum & diaphragma. at tab. 7. B. Rectius locatum est.
- C.** Phrenica sinistra, à qua surculi ad pericardium quod diaphragmati connascitur.
- D.** (quod inter E & F. inferius locari debet, ut rectè tab. 7.) orificium quo cava cordi connascitur: quod forsitan cava initium Vesal.
- E.** Coronaria quæ cordis basin corona modo cingit, & surculos per exteriora ad mucronem usq; spargit.
- FF.** Azygos venæ truncus secundum vertebrarum dextrum latus ad lumbos descendens.
- GG.** Intercostales inferiores, seu venæ azygos rami, ad costarum intervalia, à quibus surculi ad musculos costæ & vertebri instratos, & membranas thoracis, distribuuntur.
- H.** Venæ cava, in duos truncos Subclavios, juxta jugulum sub sterno, divisio.
- II.** Subclavia utrinq; ad brachium tendens, quæ ab aliquibus axillaris dicitur.
- K.** Intercostalis superior, quæ ad costarum superiorum intervalia (ad quæ intercostales prior ramos non miserrat) communiter tria, soboles mittit.
- LL.** Mammaria descendens: hæc sub sterno ad abdominis musculos rectos descendens, surculos costarum verarum cartilagineum intervallis, mediastino, musculis pectori instratis & cuti abdominis largitur.
- M.** Mammaria conjunctio cum venâ Epigastricâ G. ascendente, circa umbilicum sub rectis musculis.
- N.** Cervicalis ad calvariam ascendens surculos musculis cervici incumbentibus tribuit.
- O.** Muscula quæ in musculos cervicis inferiora & thoracis superiora occupantibus, multis surculis propagatur.
- P.** Thoracica superior quæ musculos pectori instratos, & jus regionis cutim & mammillas adit.
- Q.** Scapularis gemina, in scapula sedem cavam, & musculos vicinos distribuitur. Sic inter P. & R. aliquando venula quæ ad glanulas sub axillis sitas feruntur.
- R.** Thoracica inferior, secundum thoracis latera deorsum ducitur, & potissimum in musculum brachii latissimum distribuitur.
- S.** Jugularis interna quæ postquam arteria aspera surculos largita est, calvariam subit.
- T.** Jugularis externa.
- V.** Hujus sub auris radice divisio.
- X.** Exterioris ramus, oris interiora subiens, & in partes in ore contentas variè divisus.
- Y.** Ramus exterior juxta fauces, in faucium musculos & totam capitis cutim.
- Z.** Rami T. portio in faciem exporrecta.
- αα.** Frontis vena a portio temporæ perreptans a.
- *.** Occipitis cutim accedens propago.
- αα.** Venæ cephalica seu externa brachii, quæ aliis humeraria.
- b.** Muscula superior, cephalica propago ad musculos colli posteriores.
- Inter b. & d.** parte posteriore, à cephalica ramus prodit, qui ad scapula externam partem fertur, ejusq; portio inter carnem & cutim excurrit.
- d d.** Humeri summum petens vena à cephalica, in musculum brachium elevantem & cutim ipsius.
- ee.** Venula ex cephalica per cutim brachii & musculos disperse.
- f.** Cephalica divisio in partes tres.
- g.** Ramus primus in altum immersus, ad musculos à tuberculo externo humeri pronatos.
- h.** Ramus alter ad medianam constituendam.
- ii.** Ramus tertius obliquè supra radium & brachium externum.
- k.** Ab hoc surculi ad cutim, quorum præcipuus **k.** notatur.
- l.** Ramus tertius ad carpum, qui cum basilica ramo **x.** jungitur ubi l. positum est.

T A B.

TAB.

VII.



li 2

TAB.

- m. Basilica quæ à dextris hepatica, à sinistris lumbis.
- no. Basilicæ ramus ad capita musculorum cubiti n. per ipsos musculos o.
- p. Basilicæ ramus insignis oblique latus, & musculus ab externo tubere prodeuntibus, furculos exhibens, & cum nervo quarto descendens.
- q. Basilica in ramos duos divisio, & quæ q. notatur, cum arteria perpetuo incedit.
- f. Ramus hujus ad cutim brachii.
- t. Basilicæ ramus qui cum cephalicæ ramo h. medianam æ constituit.
- u. Basilicæ ramus ad humeri caput internum.
- xx. Ramus ex supradicto carpum petens & versus digitum minimum cephalica se coniungens.
- y. Vena in cutim ad cubitum externum excurrent.
- z. Superius z. notat propaginem ex basilicæ ramo t. insignito: z. inferius ex basilicæ ramo x. ad brachii partem internam.
- æ. Mediana sive communis vena.
- β. Mediana paulo supra carpum partitio, (debebat divisio supra γ. fieri.)
- γδ. Hujus partitionis ramus externus, manus externam partem adiens γ. à quo ramulus ad partem internam δ.
- ε. Ramus internus sub ε. qui versus medium & annularem potissimum absumitur.
- ζ. Vena pollicis monticulum implicans, cum ramo δ. notato, coiens.
- ζ. Vena cava truncus, unde rami prodeunt ad partes sub hepate positas (anguinem devehentes.
- η. Vena adiposa sinistra in adipem renum.
- θ. i. Emulgens utraq. serosum sanguinem ad renes deferens.
- λμ. Spermatica utraq. feminis materiam ad testes deferens.
- ν. (sed positum V) Varicosi vas initium.
- ξ. Lumbares, quæ geniculatim ad vertebra, dorsalem medullam & musculos lumbis incumbentes, & peritoneum mittuntur.
- ο. Vena cava bifurcata in iliacos literæ Δ. non absterilis.
- π. Muscula superior, ramus transversus, ad musculos abdominis & peritoneum.
- εσ. Iliaci sinistri divisio in ramum anteriorem ε. & posteriorem σ.
- τ. Muscula media, rami ε. exterior propago, per musculos coxæ & lunium cutim distributa.
- υ. Interior propago ejusdem rami ρ. ad sacri ossis foramina.
- φ. Sacra ad ossis sacri foramina elatiora.
- χψ. Hypogastrica, ad viscera, ani musculos & uteri collum.
- ω. Vena ex ramo externo σ. notato, quæ cum ramulis vena interna juxta ossis pubis foramina jungitur.
- ei. Vena quæ ubi pubis os transit, ramum unum in coxendicis acetabulum & musculos illius loci distribuit.
- x. Ramulus alius, qui cutim ad f. moris internam sedem subit.
- χ. Congressus dictæ venæ cum ramo ch. 2. notato, & in crus distributo, (quod tab. 22. melius exprimit.
- Γ. Epigastrica, exterioris rami & propago peritoneum perforans, cui quemadmodum & abdominis musculis & cuti ramos offert: cujus ramus præcipuus cum Mammaria descendente circa umbilicum ad M. jungitur.
- Δ. Pudenda, rami & propago interior, transversim ad genitalia excurrent.
- Θ. Saphæna seu malleoli vena, sive Cruralis trunci ramus interior, qui per cruris interiora sub cute ad summos digitos perreptat.
- Λ. Saphæna propago prima interior, inguinum sedi oblata.
- Ξ. Eiusdem propago exterior, ad anterioris femoris regionis autem versus exteriora digesta.
- Π. Saphæna propago secunda, ad tibia musculum primum.
- Σ. Saphæna propago tertia, ad cutim patellæ & in popliteum.
- Φ. Saphæna propago quarta, antrosum & retrorsum soboles diffundens.
- Υ. Ab hac rami ad anteriorem, interiori malleoli sedem pedis superiora omnesq. ferè digitos.
- Ω. Ischias minor seu Muscula interior, cruralis trunci ramus exterior, ad coxendicis musculos & ejus loci cutim.
1. 2. & hac Muscula dici potest. 1. quidem exterior & minor, ad musculos aliquot tibia: 2. verò interior & major ac profundior, ad femoris musculos.
3. 4. Poplitea, ex duabus cruralibus conflatur, quæ sub genu incidebatur.
5. Ab hac furculus ad cutim femoris sursum porrigitur.
6. Major

6. Major vero portio, per flexuram genu sub cute ad calcem usq³ fertur.
7. Et ad malleoli externi cutim.
8. Suralis, qua ad musculos suram constituentes excurrit.
9. Suralis divisio, in truncum externum 9. & internum 14.
10. 11. Exterioris divisio sub genu, in ramum internum qui secundum fibulam pedis musculos accedit, 11. & interiorem 12. 13.
12. 13. Qui secundum tibia sedem externam ad pedis superiora descendens in ramos varios finditur, & in pedis dorso cum poplitea se commiscet 20.
14. Suralis ramus interior, per tibia posteriora fertur.
15. Hujus ramus descendens ad calcis & pollicis latus internum, in furculos varios finditur.
17. Ischias major, à trunco interno 14 prodiens per sura musculos fertur.
18. Hujus propago ad pedis superiora delata, digitis singulis binos furculos largitur.
19. Interioris trunci 14: reliquum, post malleolum internum, pedis humiliora adit, & in omnes digitos absumitur.
20. Poplitea cum Surali ramo 13. commistio.

T A B. hac Arteriam magnam integram & ab omnibus partibus denudatam cum suis ramis exhibet: cum hac conferri possunt tab. 12. lib. 2. & tab. 12. lib. 4. fig. 2. & tab. 23.

- A. Arteria magna orificium seu initium, qua cordi continuatur.
- B. Coronaria, basin cordis corona modo cingens.
- C. Arterie magna in truncos duos V. i. divisio.
- D. Subclavia sinistra, oblique sursum ad costam conscendens.
- E. Intercoastalis superior seu ramus qui costarum superiorum intervalla quatuor soboles largitur.
- F. Cervicalis, quae per vertebrarum cervicis processus transversos, medulla & musculis vicinis furculos largiendo calvariam accedit.
- G. Mammaria sinistra, sub sterno ad umbilicum excurrens soboles media sterna, musculis pectoralibus & abdominis distribuit.
- H. Muscula seu ramus musculos posteriores cervicis accedens.

- I. Scapulares, ad scapula cavum & musculos incum.
- K. Humeraria, humeri summum conscendit. (benter
- L. Thoracica superior, in thoracis musculos anteriores sparsa.
- M. Thoracica inferior secundum thoracis latera procedens brachii musc. latissimum adit.
- inter L. & M. in tab. 12. lib. 4. fig. 2. ramulus occurrit, qui a glandulas accedit.
- N. Axillaris arteria, in brachium excurrens, & humeri musculi ramulos largiens.
- O. Ramus cubiti sedem externam accedens & in alto latitans.
- P P. Ramuli ad cubiti cum humero articulum.
- Q. Arteria ramus superior secundum radium delatus & pollicis, indici ac medio furculos offerens.
- k. Surculus manus exteriora petens, inter pollicis os primum, & postbrachialis indicem suffulcienti deductus, ubi pulsus tangi consuevit.
- S. Arteria ramus inferior secundum ulnam delatus & digito parvo anulari & medio soboles communicans.
- * Ramulus ad musculos circa minimum digitum.
- T. Rami tam superioris quam inferioris, in manum & digitos distributio.
- V. Arteria magna truncus ad jugulum ascendens, ejusq³ in jugulo divisio X Y Z.
- X. Carotis seu soporalis sinistra.
- Y. Subclavia dextra, in easdem propagines in quas & dextra D dividitur.
- Z. Carotis dextra, apopletica, somni, letargica & subtoni vena Arabum interpretibus.
- a. Carotidis sinistra in faucibus divisio.
- b. Divisionis ramus exterior, in faciem, tempora & auris posteriora.
- c. Ramus interior ad laryngem, fauces & linguam.
- d. (Sed positum p.) hujus ad calvaria basin in ramos duos divisio, qui sinum membrana dura subeunt.
- e. Propago rami b. ad faciei musculos.
- f. Rami b. sub auris radice distributio.
- gh. Hujus ramus anterior tempora percipiat g. posterior vero secundum auris posteriora sub cute fertur h.
- i. Arteria magna truncus ad dorsi vertebrae descendens.
- kkk. Intercoastales inferiores, ad octo costarum inferiorum intervalla, à quibus furculi medulla, musculi dorso & thoraci adnatis, offeruntur.
- l. Phrenica seu diaphragmatica.

- ζ. Mesenterica superior: notandum supra ζ. Caliacum truncum ablatum, ne literarum multitudo in tam parva tabella obscuritatem pareret: quæ supra, lib. 1. tab. 14. explicata fuit.
 ηθ. Emulgens dextra & sinistra, ab Aorta in renes exporrecta.
 ιι x x. Spermatice seu seminalis, utrinque, ad testes.
 λ. à sinistris infra μ. Mesenterica inferior, pot. sinum in colon ejus lateris excurrentis.
 μ μ. Lumbares, quæ transversim & geniculatim vertebrae accedunt, musculis adnatis & peritoneo furculos largientes.
 π. inferius. Muscula superior, ad abdominis latera & musculos excurrentis.
 υ υ. Arteria magna bifurcatio in duos truncos iliacos: & ad latera, intrinsecus tamen, ramuli Sacras constituent, quæ tab. 12. lib. 2. melius exprimuntur.
 T. Iliaci trunci sinistri divisio in ramum internum ξ. & externum φ.
 ξ. Iliacus ramus interior.
 ϑ. Musculus inferior: rami interioris propago exterior, in musculos ilium os & coxendicem integentes.
 Ϙ. Hypogastrica, rami interioris propago interior ad vesicam, penem, uteri cervicem.
 ϑ ϑ. Umbilicalis arteria.
 σ. Rami ξ. reliquum, ab externo ramo portionem assumens juxta φ & pubis foramen, in crura delabitur.
 τ. Epigastrica sursum ad musculum rectum abdominis ascendit, & cum Mammaria circa umbilicum jungitur.
 υ. Pudenda, secundum pubis os transversim prorepit.
 φ. Cruralis truncus extra peritoneum.
 χ. Muscula cruralis exterior, in femoris musculos anteriores.
 ψ. Muscula cruralis interior, in femoris musculos interiores.
 ω. Hujus, cum rami σ. conjunctio.
 Γ. Poplitea, in femoris musculos posteriores.
 Δ Δ. Suralis, quæ genu articulo & musculis suram constituentibus ramulos communicat.
 Θ. Arteria cruralis, sub poplite in ramos tres divisio.
 Λ. Tibia exterior, fibulam comitatur & in musculos absumitur.
 Ξ. Cruralis portio præcipua.
 Σ. Tibia posterior elatior.
 Π φ. Tibia posterior & humilior, pedis superiora accedens. φ.
 Υ. Propago cruralis, pedis sedem internam & superiorem petens & ad malleolum ramulum spargens.
 Ω. Propago ad pedis humiliora, cuilibet digito furculos duos largiens.


T A B.

LIBRI QUARTI.

257

TAB.

II.



11 4


TAB.

TABULÆ QUATUOR SEQUEN-
tes Valvulas seu Ostiola quæ in Venis manus & pedis
reperiuntur; proponunt.

- T**AB. I. FIG. I. *Brachium ad vena sutionem ligatum exhibet: at FIG. II. & III. venas duas crurum inversas.*
- A. Cephalica ramus medianam constituens.* *G. Basilica truncus sub utaneus.*
- BC. Basilica B. ejus ramus medianam constituens. C.* *HH. Valvula in venis Brachii.*
- D. Mediana ex Cephalica, & Basilica ramis.* *IK. Vena prima cruris.*
- E. Mediana per cubiti medium delata supra* *NN. Valvula gossipio plena.*
- radium divisa.* *FFF. Valvula gossipio plena.*
- radium divisa.* *OOO. Valvula vacua.*

TAB.

VALVULÆ IN VENIS.



Kk

T A B.

TAB. II. *Valvulas in brachio ferè dimidio, & ad venæ jugularis internæ exortum ostendit.*

a. *Vena Subclavia.*

bb. *Venæ orificium inter jugularem internam, & axillarem.*

c. *Valvule duæ ad jugularis internæ exortum.*

d. *Jugularis interna aperta.*

e. *Ejus juxta caput divisio.*

f. *Glandula sub aure.*

ggggg. *Costæ quinq; abscissæ.*

h. *Valvula ad venam Axillarem.*

i. *Axillaris vena à Subclavia producta.*

k. *Axillaris in Cephalicam & Basilicam divisio.*

ll. *Cephalica seu humeraria.*

mm. *Valvule duæ in Cephalica digitis quinque ferè distantes.*

n. *Musculus deltoïds brachii.*


oo. *Basilica seu hepatica.*

pqr s. *Valvule quatuor : quarum prima à secunda, digitorum quatuor; secunda à tertiâ, trium; tertiâ à quartâ duorum intervallo distat.*

t. *Valvule duæ simul junctæ in Basilicâ.*

u. *Ala seu cavitas sub brachio.*

T A B.



TAB. II.

TABULA III.
VALVULÆ IN VENIS.

TAB. III. Venam & Arteriam cruralem exhibet, totiusq; venæ cruralis ramum minorem seu exteriorem apertum proponit.

abcd. Arteria cruralis per medium divisa valvulis carens.

efg. Venæ cruralis aperta.

h. Valvulæ duæ in crurali venâ.

i. Venæ Cruralis diviso in ramum profundiorrem seu majorem, & exteriorem sive minorem.

k. Ramus profundior seu major.

l. Ramus exterior seu minor Saphenam constituens.

m m. Valvulæ binæ duobus in locis: quatuor ferè digitis inter se distantes.

n n n. Valvulæ binæ tribus in locis: prima in bifurcationis initio: alia duorum, alia trium digitorum interstitio.

o. Valvula unica à duabus postremis digitis quatuor distans.

p. Valvulæ duæ ubi ramus popliteus.

q. Valvulæ duæ sub poplite digitorum quatuor interstitio, ubi nullus ramus occurrit.

r. Valvula unica tribus digitis à prædictis distans.

s. Valvula unica à prædictâ digitorum quatuor intervallo.

t u. Saphena.

x. Valvula à præcedenti digitis quinque distans.

y. Valvulæ duæ ad talum.

z. Valvula à prioribus digitorum trium interstitio.


æ. Valvula ultima Saphenæ: reliquum enim Valvulis caret.

T A B.

LIBRI QUARTI.
VALVULÆ IN VENIS.

263

TAB. III.



KK 3

TAB.

TAB. IV. *Venæ cruralis, ejusq. rami profundioris seu majoris cum Arteria progredientis valvulas usq. ad bifurcationem conspiciendas exhibet.*

β. *Cruralis venæ ramus profundior, cum præcedentis tabulæ ramo k. circa d. quod Arteriam denotat connectendus: qui in priori tabulæ malè bipartitus pingitur.*

γδ. *Arteria cruralis cum præcedentis tabulæ d. nectenda.*

εη. *Valvula binæ cum propagine è venâ.*

ζ. *Poples.*

θ. *Valvula unica magna cum propagine.*

ι. *Sura.*

κ. *Valvula duæ sine ramo.*

λ. *Valvula una cum propagine utring. una.*

μ. *Valvule duæ sine propagine.*


ν. *Venæ crurales ejusq. rami profundioris subdiviso in ramos duos, qui suas quoq. valvulas obtinent.*

TAB.

LIBRI QUARTI.
VALVULÆ IN VENIS.

265

TAB. III.



kk 4

TAB.

G A L E N U S.

I I. *De Composit. Medicam.*

κατὰ τόπους.

Χαλεπὸν αὐθροπον ὄντα, μὴ Διφμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὅλως ἀγνοήσαντα,
τὰ δὲ κακῶς κείνοντα, τὰ δὲ ἀμελέστερον γεγράφαντα.

Quam rectè

C I C E R O

Philipp. XII.

Posteriorēs cogitationes sapientiores esse solent.

F I N I S.

SOLI DEO GLORIA.

IN HAC APPENDICE

TABULÆ DECEM EXHIBENTUR.

quarum

TAB. I. II. & III. ad LIB. I. CAP. XXII. referendæ.

TAB. IV. FIG. I. ad LIB. II. CAP. XXIX. at FIG. II. ad LIB.
II. CAP. XXII. referenda.

TAB. V. FIG. II. & TAB. VI. ad LIB. I. CAP. XXII. pertinet.

TAB. VII. cum LIB. II. TAB. VI. FIG. I. & II. conferenda.

TAB. IIX. FIG. I. ad LIB. II. CAP. XXI. & FIG. II. ad LIB. II.
CAP. XXI. reponendæ.

TAB. IX. FIG. I. & II. ad LIB. II. CAP. XXI. sicut FIG. III. ad
LIB. I. CAP. XLV. referendæ.

TAB. X. quæ Brachii venas internas & profundas exhibet,
ad LIB. IV. TAB. XI. FIG. I. quæ magis venas externas
proponit, reducenda.

TABULA PRIMA

Figura I. In qua Ren dexter sinistro major est,
utroque æqualem fere altitudinem
habente.

- ab. Ren dexter a. sinister b.
c. Glandula reni dextro incumbens, figura, forma &
substantia reni (quod rarius sit) respondens.
d. Glandula reni sinistro insidens.
ee. Vena cava truncus.
ff. Arteria magna truncus.
g. Venula à cava supra emulgentem, in renis dextri
membranam pinguem disseminata.
h. Venula à cava, vel ab emulgentis dextre parte supre-
ma ortum ducens, quæ partim in diaphragma, par-
tim in glandulam reni dextro incumbentem, partim
in substantia renis supernam regionem distribuitur.
ii. Vena emulgens dextra & sinistra: dextra humilior
brevior, & magis obliqua ipsa sinistra: at sinistra
quæ altius orta, longior & minus obliqua quam dex-
tra.
k. Vena spermatica sive seminalis dextra.
ll. Arteria spermatica dextra & sinistra.
mm. Ureter dexter & sinister.
n. Vena spermatica sinistra, ab emulgente (i) orta.
o. Venula à medio emulgentis sinistra (i) procedens, quæ
partim in diaphragma, partim in glandulam renis si-
nistri (d) partim in renis pinguem tunicam superius
disseminatur.
p. Venula ab emulgente sinistra (i) in tunica pinguis
partem inferiorem distributa.
qq. Arteria emulgens dextra & sinistra.
r. Arteria Mesenterica inferior.

Figura II. Renem finistrum habet majorem
& altiorem dextro.

- a. b. Ren dexter a. sinister b.
c. d. Glandula renibus incumbentes, instar placentula-
rum depresso ac lata (ut plurimum enim tales occur-
runt) quæ aliquando non renibus, sed diaphragmati
adherent: etque valide alligantur.

- e. e. Vena cava truncus.
ff. Arteria magna truncus.
h. Venula à cava parum supra emulgentem dextram re-
nata quæ in dextram renis glandulam (c) inseritur,
& in tunicam renis pinguem distribuitur.
ii. Vena emulgens utraque, quarum dextra altius ori-
tur, & simul cum Arteria in ramos quatuor divi-
ditur: at sinistra quæ humilior, cum Arteria in ramos
quinque dividitur.
k. Vena spermatica dextra, duplici principio, altero ab e-
mulgente (i) altero à vena cava (e.)
ll. Arteria spermatica dextra & sinistra.
mm. Ureter dexter & sinister.
n. Vena spermatica sinistra, duobus principiis ab emul-
gente, antehujus divisionem orta.
o. Vena juxta emulgentem finistram à cava orta, quæ
ramulum unum ad peritonæum, alterum bipartitum
in glandulam mittit: unde alter ramulus ad perito-
næum, alter ad tunica pinguis egrediens superiorem
abit.

Figura III. Ren dexter altior est sinistro.

- a. b. Ren dexter & sinister.
c. e. Vena cava truncus.
ff. Arteria magna.
hh. Vena emulgens sinistra gemina, æqualis magnitudi-
nis: quarum superior satis pene obliqua deorsum pro-
cedit, inferior vero parum & transversa ducitur, am-
bæ, instar X se intersecant: nam eminentior inferius,
humilior vero superius reni inseritur.
ii. Vena emulgens dextra gemina, oblique deorsum ad
renem tendit, quarum inferior minor est.
k. Vena spermatica dextra ex duobus principiis ab emul-
gente constituta.
l. Arteria spermatica dextra & sinistra.
mm. Ureter dexter & sinister.
n. Vena spermatica ab emulgente inferiore nata.
qq. Arteria emulgens dextra & sinistra.
r. Arteria mesenterica inferior.

APPENDICIS.

3

TABULA I. AD LIB. I. CAP. XXII. referenda.
TABULA I. II. ET III. AD LIB. I. CAP. XXII. referenda.

I FIGURA I.





FIGURA II.



FIGURA III.



a 2

TAB.

Figura I. In qua ren dexter, major & nonnihil humilior : sinister minor, & parum elatior est.

- ab. Ren dexter (a) sinister (b)
 c. d. Glandula renibus incumbens, depresso ac oblonga, ac si dua placentula forent.
 e. e. Vena. ff. Arteria magna.
 g. Vena a cava (e) juxta hepatis originem ducens, quae partim glandula (c) corp⁹ perforat, partim ej⁹ superficie perreptat.
 h. Venula ab emulgente (i) enata eidem glandula inserta.
 i. Vena emulgens dextra superior, nonnihil sinistra inferius enata.
 k. Vena ab emulgentis dextra (i) parte superius orta, & in renis tunicam pinguem distributa.
 l. Emulgens dextra inferior, priore minor.
 m. Vena spermatica dextra.
 n. Arteriola ab aetia emulgente (o) superne principium sumens, glandula dextra infixi.
 o. Arteria emulgens dextra.
 p. Arteria ab emulgente (o) inferne orta, in renem dextrum juxta emulgentem inferiorem inserta.
 qq. Ureter dexter & sinister.
 r. Vena emulgens sinistra admodum magna, nonnihil altior dextra, parum oblique procedens.
 s. Vena ab emulgentis latere superiore orta, inque duos ramos divisa, quorum interior bifidus, in medio arteriam continens, in diaphragma, non longe a sinistro foramine distribuitur, & antequam ad ejus partem membranosam perveniat, cum propriis diaphragmatis venis coit. Ad exterior ramus, partim in glandula (d) substantiam, partim in ejus superficiem, ac membrana pinguis renum partem superiorem dispenatur.
 t. Vena ab emulgente (r) juxta renem orta, in membrana pinguis sedem mediam.
 u. Vena ex eodem fere quo prior loco prodiens, in membrana pinguis partem inferiorem disseminatur, a qua ramulus prodiens, cum vena spermatica (x) jungitur.
 x. Vena spermatica ubi ea ab emulgente (r) prodit, ex eodem loco rami quatuor oriuntur, quorum primus cum emulgente in renem tendit, alter posteriora juxta vertebrae sursum reflexit, & ramo sinistro vene sine parti usitur. Tertius ad latus sinistru ileoru deductus, in partes proximas disseminatur. Quartus vena spermatica producit, cum quo portio vena (u) per renis membrana pinguis disseminata jungitur.
 y. Arteria emulgens sinistra.
 a. Arteria sinistra in diaphragma distributa.
 b. Arteria Mesenterii.
 c. Arteriola ad glandulam sinistram (d) tendentes.
 n. Arteria spermatica.
 o. Arteria Mesenterii inferior.
- Figura II. Ren dexter sinistro major & humilior.
 ab. Ren dexter (a) sinister (b)
 c. d. Glandula dextra instar placentula depresso (c) sinistra oblongior reni incumbens (d)

- cc. Vena cava. ff. Arteria magna.
 g. Vena a cava parum sub hepate orta, glandulam dextris renis (c) perforans.
 h. Vena ab emulgente (i) originem ducens, superiore ramo dextram glandulam (c) penetrat, medio, ejus superficiem perreptat, inferiore in membrana pinguis partem supremam distribuitur.
 ii. Vena emulgens dextra & sinistra quae maxima.
 k. Vena ab emulgente dextra, fere tota membrana pinguem perreptans, praecipuo ramo cum vena spermatica (n) juncto.
 m. Vena spermatica dextra.
 n. Vena spermatica cum ramo vene adiposae conjunctio.
 qq. Ureter dexter & sinister.
 r. Vena a media emulgente parte superna enata, a qua.
 s. Venula in diaphragma non longe ab ejus arteria sinistra.
 t. Vena glandulam (d) penetrans, & ejus superficiem ac membranam pinguem perreptans.
 u. Venula ad renis membranam pinguem, supra ejus medium distributa.
 x. Vena emulgentis sinistra ramus sursum juxta vertebrae reflexus qui cum altero extremo vene sine pari coit.
 y. Vena spermatica sinistra.
 a. Vena spermatica sinistra ramus, in renis membranam pinguem parte inferiore distributus.
 b. Arteria sinistra diaphragmatis.
 n. Arteria spermatica. o. Arteria mesenterii inferior.

Figura III. In qua ren dexter, sinistro aliquantulum humilior est.


- ab. Ren dexter & sinister.
 c. d. Glandula instar placentula renibus incumbens.
 e. e. Vena cava. ff. Arteria magna.
 g. Vena a cava (e) supra emulgentem dextram (i) orta, in tres ramos divisa.
 h. Illius (g) ramus primus qui partim in glandula (c) superficiem distribuitur, partim eandem perforat, ac membrana pinguis partem superiorem perreptat.
 i. Vena emulgens dextra.
 k. Vena (g) ramus alter, in totam fere renis membranam pinguem dispergitur.
 l. Vena (g) ramus tertius, qui in peritoneum juxta vasa emulgentia (i) dexteri lateris dispenatur.
 m. Vena spermatica dextra. n. Arteria emulgens dextra.
 o. Vena emulgens sinistra, major, & origine altior dextra.
 p. Vena ab emulgente (o) in duos praecipuos ramos distributa.
 qq. Ureter dexter & sinister.
 r. Vena (p) ramus, partim in peritoneum, partim in glandula (d) superficiem ac corpus, partim in membranam pinguem renis sinistri digeritur.
 s. Ramus alter vena (p) in peritoneum circa vasa emulgentia disseminatur.
 t. Vena spermatica sinistra.
 u. Vena ab emulgente (o) in membrana pinguis partem inferiorem.
 x. Arteria emulgens sinistra.
 n. Arteria spermatica. o. Arteria Mesenterii inferior.

TAB.

APPENDICIS.
TABULA II. AD LIB. I. CAP. XXII. referenda.

II.


FIGVRA I.



FIGVRA II.



FIGVRA III.



a 3

TAB

Renes ab adipe & membrana externa repurgati, hac tabula proponuntur, & vasorum emulgentium ac spermaticorum varietas ostenditur.

Figura I. a. b. Ren dexter minor & parum elatior (a) sinister major & humilior (b) e. e. Vena cava. ff. Arteria magna.

b. Vena emulgens dextra superior, in tres ramos divisa.

i. Vena emulgens inferior, venâ spermaticâ dextrâ producens.

m. Vena spermatica dextra.

n. Arteria emulgens dextra, in duos ramos inaequales divisa.

o. Vena emulgens tertia, quae in humiliores renis partem cum arteria comite inseritur.

p. Arteria emulgens inferior, ab arteria cruiali prodicens, in

q. Ureter dexter instar oblongae vesiculae, sinistram renis partem usque ad ejus summitatem perreptans.

r. Vena emulgens sinistra, in tres ramos simul cum arteria dividitur, nullamque venam spermaticam producit.

f. Arteria emulgens sinistra.

i. Vena spermatica sinistra, à cava (c) enata.

u. Arteria spermatica. x. Arteria Mesenterica inferior.

aaa. Cavitates tres in rene in quas urina colatur: una in summitate: altera in medio, quae major: tertia in sede infima, & à qualibet earum unus Ureter oritur.

β. Ureter primus à prima cavitate ortus, qui deorsum tendens usque ad arteria magna in lumbis divisionem cum aliis duobus jungitur.

γ. Ureteris ramus secundus à media cavitate ortus, deorsum oblique fertur, fere usque ad renis humiliorem sedem.

δ. Ureteris ramus tertius amplius, qui tribus principibus ab ultimâ cavitate ortum ducit: hic parumper deorsum productus, angustior redditur, & primū cum secundo meatus unitur: dein cū primo junctus, unū ureterem efformat.

Figura II. Renem dextrum sinistro elatiorē exhibet.

ab. Ren dexter & sinister. ee. Vena cava. ff. Arteria magna.

g. Vena emulgens dextra, multo altior sinistra, simul cū Arteria in tres ramos aequales divisa, & supra renis medium inserta.

i. Vena emulgens altera, quae transversim in renem medium inseritur.

k. Arteria emulgens altera supra spermaticas orta, & transversim supra cavam procedens, sub vena emulgente altera (i) reni inseritur.

l. Arteria emulgens tertia sub spermaticis (y) orta, reni infimū inseritur.

m. Vena spermatica dextra.

n. Ureter dexter.

o. Vena emulgens sinistra, major & humilior dextra, in duos ramos divisa.

p. Ramus vena (o) in duos partitus, quorum primus glandulam (r) reni incumbentem perforat: alter in renis partem anteriorem dispergitur.

q. Vena (o) ramus secundus bipartitus, cujus pars altera sursum fertur in renem: altera deorsum in renem sub ejus medium.

r. Glandula reni incumbens.

f. Vena spermatica sinistra, ex ramo (q) pronata.

i. Vena ex ramo iliaco orta, in renis sedem infimâ inseritur.

u. Arteria emulgens sinistra in duas partes divisa.

x. Arteria altera à trûco iliaco orta. y. Arteria spermatica.

z. Ureter sinister instar vesicae oblongae satis dilatatus, in anteriori sede renis oblique positus in quem plures meatus ex rene feruntur, multis arenulis interdum pleni.

Figura III. Ren dexter sinistro minor, & sinister propter magnitudinem supra elatior, infra humilior dextro apparet.

a. b. Ren dexter & sinister. ee. Vena cava. ff. Arteria magna.

g. Vena emulgens dextra in duos ramos divisa, altero in elatorem, altero in humiliorem renis partem inseritur, ante divisionem spermaticam (b) producens.

b. Vena spermatica dextra.

i. Vena altera ad renē oblique sursum tendens reni infigitur.

k. Vena tertia transversim ad renem producit.

l. Arteria supra emulgentem orta, quae duobus ramis in renis summitatem inseritur.

m. Arteria emulgens dextra cum vena emulgente (g) deorsum procedens.

n. Arteria tertia transversim ad renem tendens.

o. Arteria quarta, ex divisione arteria magna enata, oblique sursum ad renis posteriorem & inferiorem sedem protrahitur.

p. Arteria quinta, ex ramo iliaco orta, oblique sursum ascendens, in renis anteriorem & imam sedem inseritur.

q. Ureter dexter in principio satis latus, cujus tria principia per renis anteriora egredientia conspiciuntur.

r. Vena emulgens sinistra in quinque ramos divisa: quorum superior in glandulam (s) inseritur, unde ramulus ad membranam pinguem egreditur: alter oblique deorsum tendit & bipartitus in renis sedem anteriorem, circa ejus medium inseritur. Tertius sursum oblique reflectitur, & secundum instar X intersecans, in renis partem anteriorem & superiorem inseritur. Quartus, deorsum oblique tendens, in renis anteriorem & humiliorem sedem infigitur.

s. Ramus quintus emulgentis (r) qui retrorsum ad lumbos reflectitur, & inter primam & secundam ejus vertebrae ad medullam spinalem penetrat.

u. Vena alia à sinistra iliaca enata, sursum oblique ascendit, in duas propagines (quae tertiam arteriam comprehendunt) dividitur, & in renis anteriorem & humiliorem sedem inseritur.

x. Vena spermatica sinistra.

y. Arteria spermatica.

z. Arteria sinistra prima juxta renē bipartita, cum vena emulgentis ramo primo & tertio reni inseritur.

a. Arteria sinistra secunda, sub arteria mesenterica inferiore orta, bipartita prope renē inseritur, altera ejus parte sub mediū renem, altera cum vena emulgentis quarto ramo.

β. Arteria tertia, paulo ante divisionem arteria magna orta, inter ramos secundae vena sinistra procedens, simul cū illis in renem infigitur.

δ. Arteria mesenterica inferior.

ε. Ureter sinister ex quinque propaginibus à renibus procedentibus cōflatus vesicae oblongae instar per passoriam recurvatā refert, aut Threiciā gladiū altera parte flexū repraesentat calculi plenū ab Eustachio inventum.


Tab.

APPENDICIS.
TABULA III. AD LIB. I. CAP. XXII. referenda.


7

FIGVRA I.


III



FIGVRA II.



FIGVRA III.



TAB.

Figura I. Renes tres exhibet, unum in dextro latere, qui naturalis est, in sinistro vero duos præter naturam, in quo Arteria spermatica defunt.

- a. Ren dexter.
- b. Ren sinister præter naturalis, admodum parvus, depressus, substantia sola similis ei qui naturalis est, & uretere, & arteria destituitur.
- cc. Vena cava.
- dd. Arteria magna.
- ee. Venæ emulgentes duæ æquales & æque distantes, in quarum medio Arteria.
- f. Ureter dexter.
- g. Vena emulgens sinistra gracilis dextra elatior, transversa sine comite arteria procedens.
- h. Vena spermatica sinistra.
- i. Vena a cava orta è regione secundæ lumborum vertebra, quæ sub arteria transversa procedit.
- k. Vena alia, parum supra cavæ venæ divisionem emergens, quæ sub arteria procedens cum prædicta coit.
- l. Vena (i & k) conflata, in renis sedem posteriorem, versus latus externum inferitur.
- m. Arteria bipartita ab arteria magna ante divisionem orta & in renis superficiem ante ac retro distributa.
- n. Arteria altera, à trunco iliaco principium sumens, in renem sinistram humiliores unam cum vena inferitur.
- o. Ren sinister humilior à summitate quartæ lumborum vertebra usque ad os sacri initium producit: superius angustior, inferius latior, ac ureterem, qui tamen hic non videtur, ex posteriore sui regione producit.

Figura II. renis vasa exhibet, scilicet Venam & Arteriam, emulgentem, & Ureterem cum eorum ramis, tota renis substantia remota & abrafa.

- a. Vena emulgens in rene in quatuor vel quinque ramos (bbbb) primum divisa, qui dein in multos alios (cccc) hique in tenuissimos rursus per renis substantiam vario modo diffusos, scinduntur, ac invicem permixti uniuntur (dddd).
- bbbb Venæ emulgentis rami primi.
- cccc Ramorum primorum subdivisio.
- dddd Ramorum venarum emulgentium unio.
- e. Arteria emulgens simul cum Vena procedens, eandem distributionem (fff) quam illa habens.
- fff. Arteriæ emulgentis rami.
- g. Ureter, qui quam primum in renem penetrat dilatatur, & in duas (hh) quandoque in tres partes dividitur, quarum una sursum (i) altera deorsum (e) tendit, ambe vero in alios ramos, interdum quatuor, sæpe quinque subdividuntur: quo fit ut Ureteris divisiones octo, ad summum novem aut decem sint, quæ in latam finem inflat coli rotundi desinunt.
- hh. Ureteris divisio prima.
- i. Ureteris ramus ascendens.
- k. Ureteris ramus descendens.
- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ureteris divisiones octo.
- lll. Ramorum ureteris orificia extrema, quorum quodlibet à caruncula papillari clauditur.

APPENDICIS.

9

TAB. IV. Fig. I. similis habetur Lib. I. Tab. XXIV. Fig. I.
Fig. II. aliquantum similis exhibetur Lib. I. Tab. XX. Fig. I.

IV

FIGURA II.




FIGURA II.



TAB.

Figura I. Renes quatuor in una veluti massa con-
junctos, sinibus tamen atque valis in-
ter se divisos, exhibet.

A. Vena cava. B. Arteria magna.

ccc. Vena emulgens sinistra, quæ in renem non fertur,
sed multas propagines inserit, ipsa vero deorsum pro-
cedit renis membrana adherens, tandem in Iliacam
(e) inseritur.

DD. Vena emulgens dextra, super renem quoque usque
ad litteram X delata, ubi in inferiorem dextrum si-
num dispergitur.

E. Vena adiposa.

F. Arteria spermatica dextra.

b. Arteria spermatica sinistra.

Ggg. Vena spermatica sinistra, quæ inuicem iunguntur,
& una sunt in (f)

f. Coniunctio aliquot Venarum spermaticarum, ab e-
mulgentia sinistra exortarum.

HHHH. Propagines variæ ab emulgente sinistra produ-
ctæ, quæ in superiorem sinistram sinum disperguntur.

III. Vena spermatica dextra, quarum duæ a cava &
duæ ab emulgente dextra, in unum coeunt.

d. Locus unionis quatuor spermaticarum.

KK. Arteria in renis summitatem utrinque inserta.

LL. Ureterum multiplices propagines, quarum pars à
supremo sinu procedit, pars vero ab inferiore iuxta
(p) coeunt.

p. coniunctionis ureterum locus.

MMMM. Ureterum sinistri lateris, superiorum & infe-
riorum exitus, qui in (a) copulantur.

a. Coniunctionis ureterum sinistorum locus.

N. Emulgens sinistra altera, superiori sinui infixa.

O. Arteria quæ implantatur sinistro & inferiori sinui.

PP. Venarum ab emulgente sinistra prodeuntium rami,
sinistro, infimoque sinui insiti.

RR. Arteria Iliaca dextra & sinistra.

Q. Q. Vena Iliaca dextra & sinistra.

T. Locus ubi arteria notabilis magnitudinis ab Arteria
magna producta insigitur, in parte tamen supposita,
quæ superiacet & arteria magnæ & vena cava: arte-
ria autem magna intra O & N venam cavam con-
scendit.

u. Renis dextri sinus superior.

x. Renis dextri sinus inferior.

Y. Sinus sinistri regio inferior.

Z. Sinus sinistri regio superior.

Figura II. Regem & Ureterem per medium di-
visum & in latus situatum ostendit.

AAAA. Renis substantia circa ureteris ramos.

BBBB. Caruncule papillares, instar acutæ glandule seu
papillæ mamillarum extuberantes, ramosum urete-
ris extrema claudentes: quæ secundum ipsarum lon-
gitudinem media divise sunt, quo earum lineæ hinc
inde velut à centro ad circumferentiam productæ cõ-
spiciantur: ob quas eiusmodi caruncule ex pluribus
quasi fibris concurrentibus, contextæ apparent.

CC. Ureter cum suis ramis (aaaa) per medium divisus,
qui hanc cavitatem solam in rene humano ex ramo-
rum concursu efficit.

aaaa. Ureteris rami divisi, quorum extremis glandule à
substantia renum extuberantes, operculi instar in-
cumbunt.

EEEE. Ureteris foramina quæ sine ordine distributa sæ-
pe occurrunt, quæ & ipsa parvas quoque glandulas in
cavitatem internam spectantes, admittunt.

F. Foramen Ureteris extra renem procedentis.

G. Ureter extra renem deorsum tendens.

APPENDICIS.

TABULA V. Fig. II. conferenda cum LIB. I. TAB. XIX. Fig. II.

V FIGURA I.





FIGURA I.



b 2

TAB.

Quæ renes caninos exhibet transversim locatos.

D. Ureteris foramen & principium.

Figura I. Ren caninus per medium dissectus, absque aliquius particula remotione.

aaaaa. Renis circumferentia, eiusdem cum reliquo corpore substantia.

bbb. Linea subalba cum fibra, per renis substantiam dispersa, & a centro ad circumferentiam producta.

cccc. Foramina quædam vasorum, quæ in renis divisione incisa fuerunt: anteriora enim cum posterioribus connectuntur.

ddd. Renis pars magis alba & subcineritia, diversis in locis maculis quibusdam rubristincta, renis cavitatem instar septi per medium dividens.

e. Foramen & principium ureteris.

Figura II. Renem offendit, illa parte, quæ instar septi renis cavitatem per medium dividit, detracta.

aaaa. Renis substantia.

AA. Membraneum corpus vasâ operiens, eademque complectens, à qua cavitatis renis magna ex parte efformatur.

BBB. Renis partes carnosæ, inter corporis membranei divisiones existentes.

CCC. Corporis membranei rami, invicem connati, quibus vasâ undique sub & supra complectuntur.

Figura III. Ren caninus, à quo non solum pars illa detracta est, quæ renis cavitatem instar septi dividit, sed etiam corpus membraneum quod in Figura II. vasâ obductum erat, & renis cavitatem internam magna ex parte efformabat.

aaaa. Renis substantia inter ramos vasorum.

AAA. Cavitatis quæ à corpore membranofo vasâ incumbente, & à membrana substrata, in qua multa pinguedo continetur, quæ vasorum ramis undique obducitur.

bbbb. Venæ emulgentis rami tenuissimam tunicam habentes, cum quibus Arteria emulgentis rami distribuuntur: quibus membrana subiacer pinguedine repleta, quæ cum renis tunica propria continua est: sicut pinguedo cum ea, quæ circa vasâ extra renem circumfusa est.

cccc. Venarum cum venis & Arteriarum cum arteriis coniunctio: & Vesalius ex venarum & arteriarum coniunctione tertium corpus fieri voluit.

dddd. Canaliculi ex coniunctione corporis membranofo & alterius membraneo vasâ substrata, facti: & instar vagina per renis substantiam distributi, Venarum & arteriarum ramos, per renis substantiam difusos continentes.


TAB.

APPENDICIS.


13

TABULA VI. cum LIB. I. TAB. XX. Fig. II. conferenda.


VI FIGVRA PRIMA



FIGVRA II



FIGVRA III



l 3

TAB.

Tabula hæc Venam azygos, five sine pari dictam
& ejus ramorum varietatem exhibet.

Figura I. II. & III. multa communia habent.

- A. Vena cava truncus supra cor abscissus.
- B. Vena azygos five sine pari.
- cccc. Venæ intercostales, vel sine pari, rami.
- d. Venæ sine pari divisio circa decimam thoracis vertebram.
- e. Vena cava truncus, unde emulgentes prodeunt.
- ff. Emulgentes venæ.
- g. Venæ sine pari coniunctio cum Vena cava iuxta exortum emulgentis dextra.
- hh. Dexter & sinister ramus venæ sine pari, qui cum prima vena sui lateris, in lumbis sub emulgente orta coniungitur.
- ii. Lumbares venæ.
- k. Venæ sine pari ramus sinister, qui cum alio ab emulgente orto coniungitur, priusquam venam spermaticam producat.
- l. 2. Venæ à sinistro cavae trunco in iugulo, sub ortu venæ sterni enatæ, in ramum interiore & exteriorē divisa.
- m. 2. Interior ramus sub brachii arteria sinistra, ad thoracis tertiam vertebra reflexus, iuxta costarum radices usque ad nonam, singulis ramulis offerens, descendit, quo ubi pervenit cum ramis Venæ sine pari octavarum & nonum intervallum nutrientibus (n).

coniungitur.



- n. 2. Coniunctio venæ sine pari cum alia vena.
- o. 2. Exterior ramus cum diaphragmatis nervo sinistro descendens, in eius lateris mediastinum & pericardium propagines distribuit, tribusque bifidis furculis (p) diaphragmatis carnosæ parti inseritur.
- p. 2. 3. Ramuli in diaphragma disseminati.
- q. 3. Venæ sine pari ramus, qui iuxta costarum radices sursum reflexus, tertium, quartum, quintum & sextum eorum intervalla sinistra lateris nutrit.
- r. 3. Venæ à cavae trunco sinistro, in iugulo orta, in duos ramos divisa.
- s. 3. Exterior ramus cum diaphragmatis nervo sinistro procedens, in hoc & in mediastinum distribuitur.

FIGURA IV.

- AA. Vena cava truncus.
- b. Vena azygos dicta, quia communiter sola & à dextris ex cavae trunco procedit.
- c. Venæ azygos à sinistris ad tertiam vertebra similior à cava enata.
- dd. Intercostales superiores.
- eeee. Intercostales.
- ff. Venæ sine pari dictæ sinist.

APPENDICIS.
TABULA VII, cum LIB. II. Tab. VI. Fig. I. & IV. conferenda.

15



TAB.

Figura I. Cordis ventriculū dextrū, secundum ejus longitudinem incisum, cum Valvulis tribus Venæ cavæ orificio præfectis ostendit: præterea Auriculam dextrā, qua parte venæ cavæ adheret, divisam.

A. Vena cava.

B. Auricula.

C. Membrana reticulum efformans, qua vena cava ab hepate ascendente, quam primum in dextram auriculam degenerat præfecta est, & illius partem mediam & anteriorem occupat.

D. Membrana cornuta lunæ figuram referens, orificio venæ coronariæ, seu operculum ultra medium obducta.

E. Vena cavæ orificium ad iugulum ascendens.

FFF. Valvule tres venæ cavæ orificio præfectæ.

GGG. Carnosæ explantationes quibus valvularum filamenta implantantur.

Figura II. Cor exhibet, cum Arteriæ venosæ ramo per quem vomica Pulmonum per urinas expurgari potest.

A. Cor. BBB. Pulmones.

CC. Arteriæ venosæ truncus apertus.

D. Arteriæ venosæ truncus supra cor.

EEE. Ramus ex arteriæ venosæ supra cor productus, & deorsum latus, & foramen eius rami.

F. Illius rami supra emulgentes implantati foramen.

GGG. Arteriæ magnæ aperta.

HH. Emulgentes.

TAB.

APPENDICIS.

TABULA IIX. cum LIB. II. TAB. X. Fig. V. conferenda.

17

FIG. I.

IIX





FIG. II.



TAB.

Figura I. & II. Materiam adiposam in cordis ventriculis enatam, iisque irradicam, & per Arteriam magnam & Venam arteriosam distributam, qualem in Hydrope & Phthisi extinctis sæpius observavimus, exhibent.

- A. 1. Materia adiposa in ventriculo sinistro reperta.
 BBB. 1. Eius corporis radices, maxime cordis septo adherentes.
 C. 1. Eius divisio in arteria magna.
 DD. 1. In axillares.
 EE. In Carotides.
 F. 2. Corpus adiposum in ventriculo cordis dextro observatum.
 GGG. 2. Hinc inde ad cordis substantiam radicatum.
 HH. 2. Divisio in Venæ arteriosæ ramos in pulmones.

Figura III. canales, seu meatus proponit, per quos bilis tam syncera quam permixta, ab hac parte in intestina repurgatur: quæ fig. ad caput 45. libr. 1. referenda.

- A. Intestinum cui porus biliaris communis implantatur.
 B. Eius insertionis foramen.
 C. Meatus communis in quem & bilis crassa permixta, ab hepate per D. & tenuior à vesicula biliaria per B. infertur.
 D. Canalis sive porus biliaris, inter venæ cavæ & portæ radices, per hepatis substantiam (dd) dispersus.
 E. Cervix vesicæ biliaris in meatum communem, C. defluens.

TAB.

APPENDICIS.

19

TAB. IX. Hujus tabulae Fig. III. ad librum primi caput 43. referenda.



TAB.

Figura I. & II. Brachii humani dextri venas, & præsertim eas quæ in profundo sitæ sunt, exhibent.

- A. Vena cava truncus in iugulo.
- B. Jugularis interna radix.
- c. Jugularis externa radix.
- d. Vene subclaviæ, in hamerariam sive cephalicam, sive axillarem divisio.
- e. Vena Cephalica sive hameraria.
- f. Vena basilica, multis axillaris dicta.
- g. Hameraria in duos ramos divisio, parum supra cubiti flexum, quorum interior cum basilicæ ramo coniunctus, communem sive medianam constituunt.
- h. Vene basilicæ ramus, Communem constituens.
- i. Rami interioris hamerariæ propago, quæ in flexu cubiti, cum Axillari sive basilicæ profunda iungitur.
- k. Thoracica, cuius rami venæ sine pari ramis iunguntur, Vesalio ignota.
- l. Basilica sive axillaris profunda.
- m. Vena communis superficialis radix.
- n. Arteria quæ axillarem venam comitatur.
- o. Basilicæ sive axillaris divisio, parum supra internum humeri tuberculum in duos ramos: quorum alter ramus (b) cum hamerariæ ramo (g) communem superficialiam (m) constituit.
- p. Basilica sive axillaris profunda, plerumque supra medium longitudinis humeri enata, & quidem aliquando humiliter vel altius, quæ gemina esse solet, & Arteriam hinc inde complectitur.
- q. Axillaris profunda utriusque in medio fere ductu coniunctio, quæ mox bipartita, & circa cubiti, flexum (supra l.) iterum unitur: quem ramum, Eustachio monente, Vesalius ignoravit.
- r. Basilica sive axillaris huic abscisa quo profunda rectius conspiciatur.
- s. Vena communis profunda, ex basilicæ profunda & hamerariæ ramo, Communem constituente, vel ab ipsa Comuni enato, congressus: de qua re, ait Eustachius, Vesalius nimis petulanter Galenum reprehendisse.
- t. Vena communis profunda ramus humilior, iuxta ulnâ incedens, non semper unus sed interdum geminus (quod Vesalius eodem monente non animadvertit,) qui in medio Arteriam comprehendit, musculis vicinis surculos offerens, & in manum internam distributa, digitis aliquot surculos largitur.
- u. Vene communis profunda ramus elatior iuxta mediū incedens, qui non raro sicut humilior geminus est, & sub musculo pollicem flectente deorsum procedens, vicinisque musculis propagines offerens, in pollicis vel

indicis sedem internam distribuitur.

- x. Vena communis profunda ramus medius, (qui à Vesalio nec describitur nec pingitur) qui inter musculos secundum & tertium digitorum intermedium flectentes, totam membranei ligamenti ulnæ & radii longitudinem perreptans, musculis ei incumbentibus surculos tribuit, & interdum geminus existens arteriam hinc inde comprehendit.
- y. Propago a prædicto medio ramo venæ communis profunda circa quartâ ulnæ partem orta: quæ ligamentum membraneum ulnæ & radii perforans, ad posteriora transit, & in musculos ab ulnâ procedentes, aliosque eisdem incumbentes distribuitur: hæc propago, quæ interdum gemina est & Arteriam mediam comprehendit, oscitater (ut ait Eustachius) à Vesalio prætermittitur.

Figura III. & IV. Venas & arterias aliquot dextri brachii sinistæ demonstrant.

- A. Vena cava truncus in iugulo.
- B. Vena iugularis interna, minor externa
- c. Vena iugularis externa duobus principiis enata, multo maior ipsa interna.
- d. Vena hameraria, quæ à clavicula & musculo, ab ea in primam costam inserto, media comprehenditur, & iuxta illius cum sterni articulum foras erumpit.
- e. Hameraria à musculo deltoide & pectorali operta.
- f. Axillaris sive Basilica.
- g. Hamerariæ supra cubiti articulum divisio.
- h. Hamerariæ ramus per cubiti exteriora distribuitur.
- i. Hamerariæ ramus qui circa cubiti medium cum alia ab axillari enata, coit.
- k. Ramus axillaris qui thoracis latus sub cute diffunditur.
- l. Axillaris ramus cum hamerariæ ramo (i) communem constituit.
- m. Axillaris divisio non longe à cubiti articulo.
- nn. Arteria simul cum axillari vena eodem modo quo in homine internus eius ramus, profunda est: Et sub primo musculo cubiti flectente Venam comitem habens, usque ad cubiti flexum procedit.
- o. Axillaris ramus exterior, arteriam comitem habens, qui cum alio hamerariæ, e regione extremitatis carnosæ, primi musculi cubiti flectentis inter hunc & alium obliquum radii coniungitur.
- p. Propago (arteria interdum destituta) à coniunctione ramorum hamerariæ & axillaris procedens, qui sub obliquo radii musculo demergitur.
- q. Axillaris ramus inferior, parum supra cubiti articulum ortus, qui profundus simul cum arteria iuxta os cubiti incedens multas propagines vicinis musculis offert.
- r. Axillaris exterior, quæ secus quæ in homine Arteriam comitem habet, & parum supra cubiti articulum dividitur. TAB.

APPENDICIS.

21.

TAB. X. cum Tab. XII. Fig. I. Lib. IV. conferenda.


X


FIG. I. FIG. II. FIG. III. FIG. IIII





6 3


TAB.

















3 22 -

Am. Gen
A